




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/01





Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/D/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/D/1




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
T8X29U1

1783⁽¹⁾
D/1

L

2412 32, 198.



2H42

32,198


Handwritten text in a cursive script, likely a list or inventory, with several lines of text that are difficult to decipher due to fading and bleed-through from the reverse side.

Handwritten text, possibly a signature or a date, located below the main block of text.

Diostorides Jo. Ruellio Interprete
Una cum Hermolaj Barbari Perreolarijs
& Marcolli vngely in singula capita
Conservis.

1559

Franciscus Nassus Noëns Anonymus parisen. 1559.



non infelicitate saltem, uelit in hoc autore uersari. Quamobrem et cōmentarios subieci-
 mus, eodem nimirum delectu atq; consilio. Vnum Hermolai Barbari, qui Corollaria inscribit:
 de quibus illud affirmare habemus, nihil eruditius, nihil uberius, nihilq; magis uarium, post u-
 num Plinium, latinæ linguæ editum esse a quoq; mille retro quingentis annis, qui non solum
 gloriæ suæ, uerum literis etiam, & literis omnibus tam satisfecerit. Dignus plane q̄ti assidue
 in manibus teratur ab omnibus studiosis, nedum ab medicis, in quibus sic *ut rhy pithodov* cernes
 contractum Theophrastum, Plinium, Paulum, Aetium, Orobasiū: ex grāmaticis uero, q̄ re-
 rum uocabula descripserunt, Athenū, Pollucem, Gellium, Suidam, Victruuium: ex Geo-
 graphis Strabonem & Solinum, ut nihil sit abstrusum in singulis (quantum ad rem q̄dem me-
 dicam attinet) quod idem non apertissime legas in Corollarijs. Quæ ob hoc forsasse sic inscri-
 pta, ut simplicium quidam quasi Colophon existerent. In quibus id solum dolemus, quod in-
 castigatiora ad nos peruenierunt: deinde mutila, et uix in Quintum usq; librum porrecta: quæ si
 usq; ad Venenorum librum perfecta fuissent, dñ boni, præter unum Plinium forsasse, quem stu-
 duit imitari, quem haberet tamen meliorem thesaurum, seculorum omnium medicorū cœtus &
 Alterum Marcelli Vergilij iunximus, uiri ex æquo docti, & lōge diligentissimi, nec ab eruditiss
 etiam minus probati, qui tñ sicubi proluxius ea tractabat, quæ uel non admodū necessaria, uel
 non proxime ad rem facere uidebantur (sic em̄ interdū rhetoricatur & ludit homo, uel lynceo
 ipso in dijudicandis rebus perspicacior) data opera decurtauimus: ne & in inensum cresceret uo-
 lumen, & rhetoricis magis præstigijs, q̄ utilibus & necessarijs cōmentarijs obturbaremus lecto-
 ri. Monuerunt id nos initio ipso operis aliquot studiosi, cum aliqui & ipsum quoq; integrum
 adscripturi Vergilium fuisset. Postremo, ne nostra quoq; opera abesset, sic in utrisq; cōmen-
 tarijs iudauimus, ut multo em̄ctiores, luculentioresq; nunc habeas, q̄ ex ueteri editione erāt.
 Uterq; sine punctis erat, uterq; sine artificio grāmatico, & ibi desierant periodi, ubi spiritus de-
 fecisset lectoris. Ex bonis græcis, mala latine facta tā multa, ut non plures neuos habuerit Ther-
 sites. Ex latinis igitur, quæ perperam scripta erant, in ordinem cōgimus, ex græcis quæ manife-
 ste deprauata erant restituimus. Sicubi hiatus erat, uel scrupulus, quem uel instaurare, uel ex-
 cutere non ualebamus, * asterisco signauimus, ut et alijs esset ansa diuinandi: eo tamē consilio,
 ut omnia latinis literis permitteremus, partim ut consuleremus græcæ linguæ ignaris, partim
 q̄ in prilitato Lexico retractamus ad uerbum omnia, nouo opere Pandectarum, longe meliori
 opera, q̄ si facta tecta, quod dicitur, nunc restaurassemus. Præterea ubi illi ad uerbum ex Theo-
 phrasto, Plinioq; & alijs mutauerunt quædam, uel transcripserunt (ut in toto fere opere) no-
 tas & capita signauimus. Indicem dictauit, & eum quidem locupletis. **I O A N N E S**
S C H O T T V S *ἡρξηναι ἀπὸ τοῦ* operis, ut em̄ctæ naris, ita uigilantis. Quæ omnia quan-
 to labore nobis constiterint, quantūq; alias editiones euicerimus, nulli certius æstimabunt, q̄
 qui similem aliquando telam nobiscum texuerunt, aut nostram hanc cum Italiæ editionibus
 contulerint. Planèq; falsum esse conuincemus, nullos libros emaculatiores prodire, q̄ qui ex
 Italia emerferint. Id totum igitur (mi Capito) in tuum effundimus sinū, tibiq; nuncupamus.
 Tui erit uicissim uetustissimum, & eundem longe utilissimum autorem nobiscum a barbaro-
 rum tyrannide uindicare: ut sicut iam pridem meliores literæ florere cœperunt, ita quocq; uetus &
 simplex Medicina caput tandē exeret ac regnet. Argent. Anno ab orbe redempto. 1529.

I O. R V E L L I V S S V E S S I O N E N.

Antonio Disomo, Regio Consiliario, utriusque Linguae
peritissimo, S. D.



M V M S A E P E mecum reputarem, humanissime simul ac eruditissime Antonio Disomo, omnium ferme disciplinarum conditione, illud in primis cum admiratione mihi, tum miseratione dignum occurrebat, quod saluberrimae humano generi artes, uel diuinitus nobis datae, uel mortalium studio adinuenta, ita affectae iaceant, ut ad interitum spectare uideantur: quibus olim excolendis, ueteres usque eo diligentia omnem, & operam impenderunt, ut intentatum nihil, indiscussumque reliquerint. Etenim per aliquot iam secula, & qui discunt, & qui docent, neglecta uera liberalium scientiarum maiestate, ad echinatas captionum, cauillationumque argutias diuercentes, dici docti, haberi, quod esse malunt. Quod ut in ceteris ferri, dissimularique fas sit, in ea tamen arte nefarium est, quae ad tuendam salutem hominum, nata, incorrupta semper, augustaque esse debet. Quae tamen fere iam inde ab auorum nostrorum memoria, tam turpi ac desidioso consensu deserta exoleuit, ut uideatur, ne flagitiosa fortasse suis professoribus, aut inhonesta uideatur, qui principum eius partem, quae cognitione delectat, medicamentorum constaret, uel rei difficultate deteriti, uel ingenio diffusi, uel iudicio lapsi, a se abdicarunt, rudique medicamentariorum ministerio delegarunt: existimantes fortasse dignitatem amplitudinique suae non parum detractum iri, suamque auctoritatem eleuari, si ea ipsi tractent, quorum officinae sibi iam cognitionem uendicarunt. Cum ceteri artifices ignominiosum sibi esse putent, si imprudentes sui negotij conspiciantur, aut uniuersam instrumentorum suppellectilem non plane ac memoriter teneant. Proinde ars illa praestantissima, sine qua natura manca merito ac mutila esse censetur, priscis temporibus clara & percelebris, literarumque monumentis diligentissime tradita, posterioribus seculis, adeo a se ipsa degenerauit, ut simulacrum eius tantum, uel potius umbra nomenque remanserit. Quippe cum olim Haerbarij idem atque Medici essent, scidit inde se studium: hominumque inertia simul & incuria factum est, ut ab ijs destituta quorum erat propria, circulatorum, ne dicam impostorum, praeda facta fuerit. Cuius igitur pluribus scriptorum monumentis admoneretur, apud antiquos gloriae fuisse Simplicium curam, ac memorabiles illos Graecorum duces, hoc illustri studio semper floruisse: huic parti ruinosae, nutanti, breuique casurae, adhibendam esse manum duxi. Nec aliud occurrebat praesentius auxilium, uel a medicis ignorantiae tenebris affereretur, ac errores expiari, innumeraque monstra domari possent, quod ut ea quae Graecis literis hac de re tradita erant, latinis illustrarentur, ac quae sine graui perniciē dissocari non poterant, a ceteris medicis partibus auulsa, suo corpori restituerentur. Pedacium igitur Dioscoridem, praestantissimum huiusce partis auctorem, tot seculorum suffragiis comprobatum, pro medioeritate nostra, latinitate donauimus, tuoque nomini dicamus. Quod te acerrimi iudicij uirum, omnium bonarum literarum, ac utriusque linguae studiosissimum cognouimus: nec parum laudis tibi ex ea re peperisti. Simul ut extaret pignus mutuae inter nos beneuolentiae: simul ut mortales officio cumulatione demereremur. Quod quidem opus non paruo sane negotio a nobis elucubratum, ueluti primitias industriae nostrae & maioris laboris praeludium, laeta fronte suscipias. De quo id constantissime ausim polliceri, esse quasi quoddam naturae promptuarium, ex quo res omnes, haerbae, fruges, frutices, arbores, fructus, quibus arua, campi, pascua, montes, conualles, plana confragosaque uestiantur, & uisceribus terrae abdita, in humani generis praesidium depromi facile possunt, ac denique ueluti a quodam rei medicamentariae seminario, in humanum usum transferri, e quo uita omnis ea haurire queat, quibus humanae salutis prospiciatur, & morbis omnibus consulatur. Quae uero meae partes fuerunt, quoniam in propria harena, ut dicitur, uersari uidebar, cum sum professione medicus, dedi operam, utinae & praestiterim, uti omnia ex fide responderent, & ut latina oratio, Graeci auctoris sensum fideliter redderet: ne absurda peregrinitas, medicinam quoquomodo pollueret, etiam si res ipsa elegantiam ac nitorem non facile admittat. Curaui praeterea, ut idem utrobique sensus seruaretur, nulla uocum nouitas, nec triuitalia uerba, aut exposita: quibus quaerendis, Latinos fere omnes euoluimus. Cum uero latina me defecerunt, Graecis quidem, & fere iam receptis uti malui, quam noua, aut barbara licenter admittere. Sed nihil eque me torset, quam ueterum manuque exaratorum exemplarium inopia (illud enim tantum nactus sum, quod bibliopola typis excusum circumferunt) in quo permulta manifestissime deprauata, ex uaria auctorum lectione, & praesertim in libris Venenorum, ex uetustissimo Pauli Aeginetae codice, ad pristinam sinceritatem restitui-mus. In quibus studiosos omnes rogatos uelim, ut boni consulant. Vale Parisiis, Calendis Martij. Anno Domini. M. D. XVI.

BEI, in Libros eius, de Medicinali materia,
ad ARIVM Præfatio. IO. RVEL-
LIO Sueffionensi interprete.



VANQVAM amicissime Ari, complures non ueterum modo, sed recentiorum quoq; de medicamentorum compositione, uiribus, atq; probatione cōmentati sunt, nobis tamen nec uanum, nec a ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incesse, tibi ostendere tentabimus. Cum eorum nōnulli absolutum nihil ædiderant: alij q̄ plurima quæ auditu percunctando didicere, scriptis tradiderant. Siquidē Bithynus Iolas, et Heraclides Tarentinus, omiſſa prorsus Hærbarū tractatione, rem sane q̄ paucis perstrinxerūt. Neq; uero omnes illi de metallicis quicq; rebus, aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Crateuas aut Hærbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidētur, radices multas apprime utiles, hærbasq; haudquaq; adnotatas reliquerūt. Nec sic quoq; prisca laude sua fraudandi sunt, quos & si pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum, e quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinalem materiam uernaculam cognitamq; uulgo, dignam censuerunt, quæ ab eis literis exacte mandaretur, ut medicamentorum uires, probationesq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uero reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in acruum congeriemq; extulerūt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, Euphorbiū nascentis in Italia, Chamelææ succum esse contendit: Androsamonq; eandem hærbam cum Hyperico esse: quinetiam Alöen in Iudæa fossilem nasci, & pleraq; his similia citra effectuum explicationem exponit, quæ prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine iſdem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepanteis, nullaq; cognatione coniūctas uireis collidentes: alij per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quo facilius memoriæ mandarentur, genera, & eorum effectus, a sua cognatione disiungentes. Nos uero ab ineunte (ut ita dicam) iuuentute, iungi desyderio cognoscendæ materiæ allekti, permultos Mundi tractus peragruimus (nec enim nescis, nos militarem uitam exegisse) tuoque hortatu cōmentationē in sex Libros contulimus: quod opus tibi dicamus Ari, grato nostro animo obsequētes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omnis eruditione excultos, tum uero in eos, quis

cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles, in nos etiam aliquanto peculiaris. Enimvero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis erga te charitas, quam una degentes nouimus, cum mutuiam inter uos beneuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosque qui in Commentarios nostros incident, ut ne in uerbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritiâ curam. Etenim partim res oculis subiectas exactissime cognouimus, partim narratione omnibus consona, indagationeque rerum apud singulos uernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine utentes, genera Medicinarum, uiresque describamus. Quod autem necessaria sit Medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret: quæ & toti arti coniuncta sit, & ab ea expugnandis mentibus uitæ remedia petantur. Quare per medicamentorum compositiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, quamplurimum opitulante singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam uernaculam, familiaremque materiam complectemur, ut perfecta sint quæ scriptis relinquemus. Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur, & recondantur. Intempestiue enim decerpta, conditaue, aut nullo, aut euano muniere funguntur. Serena etenim cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalloribus, uel imbres infesti sint: quemadmodum, si loca in quibus prodeunt cliuosa, & uentis exposita sint, & perflata, frigidaque, & aquis carentia. in his enim locis uires eorum longe ualidiore intelliguntur. Contra, quæ in campestribus, riguis & opacis, cæterisque locis a uento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoque magis, si non suis horis peropportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandum, quod sepe præcoci, aut serotina loci natura, aut anni clementia, maturius, aut celerius adolescunt. Nonnulla propria uis hyeme florent & folia pariunt, quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est, horum peritiâ assequi, necesse est ijs prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti hæbæ dumtaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter multitudinem foliorum faciem, caulium proceritates, florum, seminisque magnitudinem, nonnulli qui olim has ætatum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus impo-
suit, qui hæbas quasdam, uerbi gratia Gramen, Quinquefolium, et Tussilaginem, emittere florent, fructum & caule negant. Ergo qui sapius ad uisendas hæbas & earum loca se contulerit, earum cognitionem maxime conse-

quetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex hærbaeis medicaminibus
Veratri genera, nigrum inquam & candidum, multis edurare annis: reli
qua a trimatu inutilia. Quæ uero ramis scatent, sicut Stichas, Trixago,
Polium, Abrotonum, Seriphum, Absinthium, Hyssopum, & alia id ge
nus semine pregnantia, demetantur, Flores quoque antea quam sponte
sua decendant, Fructus autem ut maturi excutiantur necesse est, & semina
ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus, et foliorum
elici debet, germinantibus adhuc cauliculis. Lac & lachrymæ excipian
tur, inciso per adolescentiam caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut
recondantur eximere conuenit, cum hærbae suis folijs exuuntur. Siccan
tur etiam expurgatae inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ
luto, aut puluere sunt obstitæ, aqua elui debent. Flores, & omnia quæ iu
cundum odorem efflât, arculis tiliaceis nullo situ obductis reponantur.
Nonnunquam charta, aut folijs semina, ut perennent, apte inuoluun
tur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitrea, aut cor
nea conuenit. Ficulis, etiam si modo rara non sit, accommodat: & li
gnea, præsertim e buxo: sed ænea uasa liquidis
oculorum medicamentis, quæ aceto, pice
liquida, aut cedria componuntur.
Adipem autem & medul
las stagnæ uasis
recondi con
uenit.

**T H O. D. Aucuparius, can
dido lectori.**

Dum uirtus animi, dum mens diuina Deorum
Ad sacra uel solum scandere templa sinunt,
Dotibus his, altâ conscendit Apollinis arcem,
Sancta Dioscorides atria dignus adit.
Magnaq; pro meritis aperire sacraria Phœbi.
Dum datur, has medicas arte ministrat opes.
Ille Dioscorides pater antiquissimus, autor,
Pœoniæ largas protulit artis opes,
Rerum uirtutes, rerum cognoscere causas,
Rerum naturas, historiamq; docet,
Antidotū morbis, certissima pharmaca præstat,
Et quæ præsentī cætera multa Libro.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Primus.

IO. RVELLIO interprete.

De IRI. CAP. I



PRI S, ab aliquibus Illyrica, ab alijs Thelpide, ab alijs Vrania, a nonnullis Catharon, aut Thaumastos, a Romanis Marica radix, a quibusdam Gladiola, ab alijs Cōsecratrix, ab Aegyptijs Nar appellat. A cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert Gladiolę, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores summo caule, alterno situ incurui evariant. Siquidē candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cerulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quędam cœlestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatę, durę, odoratę: quę frustatim dissectę, in umbra siccantur, & traiectę lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica, & inter has laudatissima quę pumili fere & densa constat radice, frangenti contumax, subrussa colore, gustu amaro, odore perç suavi ac sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quę dum tunditur, sternutamēta mouet. Secundum locum habet Aphricana, candidans, gustuq amara. Teredines in uetustate sentiunt. tunc tñ odoratiores reddi solent. Vis omnib. excalfactoria, extenuans. Contra tussim efficac, humorum qui ægre reiiciuntur crassiciem digerunt. Bilem, crassamq pituitam, ex hydromelite drachmis septem epotę, purgant. Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Eadem potę ex aceto, auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, cōuulsis, a uento refrigeratis aut rigentibus, & quibus genitura effluit. Menses, ex uino potę, pellunt. Decoctum earum, feminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq in eis uenarū spiracula. Ischiadicis infunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditę, partus extrahunt. Quinetiam coctę & illitę, strumas, ueteresq duricias emolliunt. Siccę quoq ulcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa corpore operiunt. Dolorib. capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotę cum albo veratro, et duabus mellis partibus, lentigines, & uitia cutis in facie emaculant. Pesis, Malagmatis, & Acopis inferuntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

A

ἰρίσιλλυρικά
καθάρων
θαυμάσιος

B



HERMOLAI BARBARI

Patrij Veneri, & Aquileiē. Patriarchę

Corollarij Liber Primus.

IRIS Illyrica.

HIRIS æstate floret. Folio arundinaceo. Caulem habet cubitalem, atq retortum, similem Asphodelo, sed minorē, durioremq. Sunt qui Hierida appellat.

altum surgentes, diximus. Hoc enim, si Euclidi, & graecorum grammaticis credimus, lineis quas Parallelas dicunt, proecipue competit. Nec alio pertinet ea uox. π ut significetur, nō temere, neq; in latera, aliarum plantarum modo, caules Iridis spargi, sed in altum nullo inter se concursu ferri, & flores in bis ita disponi, ne alter alterum impellat, simulue concurrat. Quod totum, ut nobis uidetur, parum feliciter reddidit Ruellius, dicens alterno situ flores in Iride uariari.

Diximus praeterea, in arcum flexos, nullo illic arcus uestigio, quonia floribus ea flexura sit, & graeca uox ϵ πικμπή, quae id exprimit, in arcu frequens reperiatur.

Subiecinus deinde, & in arcu illo uariantes tam multos colores, praesentis temporis participio usi: quoniam quemadmodum in coelesti arcu, colores illi plures ex mathematicorum & speculata docentium ratione, non sunt, sed ex opposita lucis accessu, ideo apparent, & refractis lineis uidentur, non dissimili modo & Iris cum luce colores mutet: idq; Dioscoridem intellexisse omnes uolunt, cum dixit, ϵ πάραι, id est, uidentur, quia non sunt in arcu illo tam multi colores, sed ratione accedentis lucis uariant & uideantur.

DE ACORO. CAP. II

ACORVM aliqui Choron Aphrodisias, Romani Venercam, aut Radicem nauticam, Galli Piper aqueum uocant. Folia Iridis habet, angustiora tamen. Radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum tendentes, & summo cespite sparsas, geniculis inter ceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimū est densum, candidum, plenum, non exesum, odoratum, cuiusmodi colchidicum, & galaticum, quod Aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit. Prodest lateris doloribus, & iocinoris, atq; pectoris. Item torminibus, uulsis, ruptis. Lienem absumit. Vrinae stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur. Ad muliebres infusus Iridis modo utiliter impo-
nitur. Oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno usu commiscetur.

BARBARICOROLL.

ACORUS, & Acorum, folijs Iridis, sed pediculo longiore. Radices ei Dioscorides subalbidas, Plinius nigras, minusq; uenosas reddidit. Ipse rubentem intus uidi, foris colore inter nigrum atq; candidum. Raram inuentu, falso tradit Apuleius. Nec nisi cum florem emiseric cognoscibilem. Locis cultis, & hortis, pratisq; nascentem. Legendam Augusto mense. Aphrodisiam, & Sandicem nauticam, & Syngentianam, alio codice Radicem nauticam, & Vnguentianam, & Piperapium uocatam. Vt deprauatum in Dioscoride quis putet, Piperaciū, pro Piperapium. Quandoquidem apes, suspensa in uasis earum herba, nunq; diffugere, idem autor proditum reliquit. Arbitrantur & ea parte mendam esse, qua in Dioscoride, Aspletion appellari legitur. Asplenon uerius existimant, q; radix Acori lienem comminuat. Optimē Pontice, post Calaticā, mox Creticā, candidiores Ponticis. Sed primae in Colchide, iuxta Phasin amnem, & ubicunq; in aquosis. Recentibus uirus maius q; uetustis. Siccantur utribus in umbra, digitalibus frustis. Sunt qui radicem Rusci Acoron uocent, proinde ut hanc nonnulli Acorū siluestrem appellare malint. Acoro flores aureos, croceosue attribuunt. Semen spissum, atq; gliscens, non sine odoris gratia. Haberi ferunt in Chio, Hellespontoq; & Euxino mari. Radicem Acori subrubentem, uenis intrinsecus neruosis, praetenuibus, & candidis, eaq; indigenas Iridis loco uti.

EX M. VERG. COM.

ACoron, genere neutro. Sunt qui, q; herba sit, foeminino Acorum dicunt.

Aphrodisiadem. Fortasse, quia immodice uenerem excitat.

Piperapium, Solus Apuleius, quicunq; ille fuit, Piperapium dictam fuisse testatus est, quod ea in alueribus suspensa, nunq; facto examine, apes in colonias fugerent: nec tamen causam reddidit, nec inuenta barenus a me est.

Idem praeterea, Sandicem nauticam, & Syngentianam ait uocari, incerta nobis pariter nomina huiusmodi origine & causa. Quae ego hoc loco non posuissē, nisi ante nos, in Corollario suo, has uoces Barbarus inseruisset, pluriq; q; aequum erat fecisse eas uideret, & nisi in antiquo latino Dioscoride, in extrema

A

ἀκρον
χρὸν ἀφροδισίας

καλλιαν

B

Lib. 15. cap. 13.

Cespitis coronide, omnia illa ab Apuleio dicta, tanquam legitima proles scriptori huic adiecta fuissent.

Obiter quoque monendum cenfeo, quod in Apuleio legitur, Sandicem nauticam dici Acorum, uideri nobis ex Dioscoride acceptum, & si id sit, corrupte Sandicē, pro radice legi, tanque facilis in una litera lapsus, radice in sandicem est, ut id potius, iudicio meo, sic legendum in Apuleio fuerit, quam importuna hoc loco uocis usus inferendus.

Subinde, quoniam Iridi similis, et cognata Acorus sit, eadem illa appellatione potuisse quondam uocari. Et ut in Iride radix Marica, Naronica, donec certius aliquid inueniretur emendata nobis est, sic etiam in Acoro, pro radice nautica, Naronicam legi eodem modo posse. Nec est quod miretur aliquis, latinarum uocum tam graues mendas, cum graecarum in latinis, non dissimiles passim uidere liceat.

Primam habet bonitatis existimationem quae densa, etc. Priuatim illud opinamur, non densam, sed amarā legi quondam potuisse. Monueruntque nos, probatiores in Graecis codices, in quibus una tantum mutata litera, non πικρὸν, quod densum, sed πικρὸν, quod amarum significat, legitur. Quod & Galenus aperte innuit dicens, saporem Acoro acrem, cum amaritudine aliqua esse. Non tamen cōmunem lectionem damnamus.

DE ME O CAP. III.

μεν
ἀνθεμιν

ME O N, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, Anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. Binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguā exalfaciētibz. Quae feruefacta ex aqua, uel trita citra coctionem, praclusorum renum uesicaeque farctae uitia potu leniunt. Vrinae difficultati medentur. Stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, cōmotae uuluae, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle in elegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, deflectionibus feruefacta. Infantibus autem illitae imo uentri, urinas mouent, quod si plus quam deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

ὁρμηδὸν
ματι

D
Plinius lib. 20.
capite. 23.

BARBARI COROLL.

ME V, graeci μεν, producta priore syllaba, non diphthongo, sed uocali longa, ex Galeno. Genera eius duo. Nobilius Athamanticum, ita dictum, quod ab Athamante inuentum sit. Siue quod laudatissimum in Athamante reperiatur. In Italia non nisi a medicis feri solitum. Folijs Anisi, caule interrim bipedali. Radicibus multis, & obnigris. Alterū rufius. Est & Geum inter herbas longe distans a Meo, radículas, ut inquit Plinius, tenues, & nigras habens, & beneolentes. pectoris & lateris doloribus quaerenda. Cruditatibus quoque discutiendis. Iocundo sapore. Sunt tamē Pliniani codices, in quibus Gethin haec, non Geum scribatur. quod recte nescio.

EX M. VERG. COMM.

ME O N. Plinius Meo id, non Meon appellat, qua uoce posteriores etiam aliquot usi sunt.

Caule, folijsque Aniso similibus. Variant in figura, & historia eius antiqui Graecorum codices. In aliis quibus enim legitur Aniso, in aliquibus, Anetho folijs similibus esse. Plinius Aniso similia dixit. Nosque in ambiguo, ueluti alterius testis accessione, quae pluribus testimonijs confirmabatur, Anisi lectionem magis probauimus.

Quod Athamanticum uocant. Cur Athamanticum diceretur, Plinius eodem loco exposuit. Nisi forte Athamanticum, subtrahito e litera, legendum, docuerit Dioscorides, & in Athamania nasci, cuius regionis gentē (autore Byzantio Stephano) aliqui Thessaliae, aliqui Illyrico adsignant. Nec refert, in Macedonia nasci Meon dixisse Dioscoridem: quoniam non longe distant inter se, Macedonia, et Thessalia. Suspicio tamen haec magis, quam decretum sit.

DE CYPIRO.

κύπριον
ἔρπον

CYPIRUS, quem aliqui Erysisceptrum, ut Aspalathum appellant, Romani lunci radicē, aut luncū. Folia fert Porraceis, proxima, sed longiora, & exiliora. Caulem odorati lunci, cubitalem aut maiorem, angulosum. In cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices, quarum

ces, quarum in medicina est usus, contiguus inter se oleis oblongis rotundisue similes, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis et palustribus enascitur. Optima est grauissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi: qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ a Cicladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat. Urinam ciet. Ad calculos, aquamque subtercutem utilissime bibitur. Aduersus scorpionum ictus remedio est. Perfrictionibus uuluarum, & præclusionibus, fotu prodest. Pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascant uorentque, farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, et unguentorum spissamentis adijci solet. Aliud Cypiri genus tradit in India nasci Gingiberis effigie, quod manducatum croci uim reddit, & illitum præsentem Psilotri uim exhibet.

BARBARI COROLL.

Cypirus Gladioli nomine apud nostros, aliud est quam Cyperus is, quem latini radicem Iunci, ut Dioscorides hoc loco, Columellaque testatur, uel Iuncum quadratum, ut Cornelius. Cyperus pro Gladiolo, ut Theodorus Gaza uertit, a Theophrasto peculiarem habere quandam æqualitatem in caule describitur. Radice tamen inæquali, partim crassa, carnosaque, partim gracili atque surculosa. Hanc & in altum agi. Ideoque contumacem emori atque uelli. Nasci e latere huius radiculam, unde cauliculus erumpat alius. Sunt qui non distinguant, uicinitate nominis fallente, sed discrimine multo separatur. Cyperus, siue Cypirus is, qui latine Gladiolus, & Xiphion a Dioscoride suo loco dicitur, radice bulbosa. Laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo, postea Phœnice uisitur. Cretico candor odorque propinquus Nardo. Acrior hic Naxio, ex illis Phœnicio, nullus Aegypto. Nam & ibi puenit. Tradunt, non egredi barbaros domibus, nisi ab hoc suffitu. uegetiores enim, firmioresque sic fieri. Dulcis huic radix, & quæ decocta panem etiam gratiorem faciat, ut inquit Theophrastus, unde sumpsit Plinius. Ponderosior utique simul subacta. Hoc ipso nomine palustris alter Cyperus, siue Gladiolus ostenditur, quem Iulio mense ad radicem secari præcipiunt. Tertioque die in sole contineri, dum candidus fiat. Quotidie autem ante solem occidentem in tectum referri: quoniam nocturni rores palustribus officiant. Sit palustris hic qui floreat uere cum Viola nigra, sed utique post Anemonem, quæ Timonia uocatur, comitatur Hyacinthis, & Gladiolus appellatus, an, quod magis puto, Xiphion, Theophrastum secutus, querendum & æstimandum relinquo. Est enim uagum & commune multis nomen Gladiolus. Folium simile nomini. At Cyperus, de quo nunc agitur, Iunci trianguli, ut Plinius interpretatur, ut Celsus, quadrati species, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguisque profilit, cuius radicem cum oblonga est, Cyperidem appellat. Laus prima Hammoniaci. Secunda Rhodio. Tertia Thracio, si Plinium sequare. Nouissima Aegypto, qui & confundit intellectum, quoniam et Cypiros ibi nascitur, qui est Gladiolus. Sed & Cyperus pro Iunco durissima uixque spirans in Aegypto. Cæteris odor ipsam Nardum imitatur. Nonnulli distinctionis gratia Cypiron pro Gladiolo, Cyperon pro Iunco triangulari, siue quadrato nominant. Non desunt qui Pseudocypirum uocent Gladiolum: de quo Plinius, semel quod meminim, dixit. Ocyssima omnium Cypirus, & Pseudocypirus frutex. Protinus enim, inquit, floret, semineque profert. Quadratus & angularis, ad differentiam rotundi Iunci, quem Schoenon greci uocant, cognominatus intelligitur. Penultimam Cyperi, quæque diphthongo longa, quæque uocali breuiem greci scribunt. Dicitur hæc & neutro genere Cyperum a Paulo. Habetur & Cyperus Indica: quam Plinius, Cyperin appellat, etiam si quibusdam exemplaribus Cypera legitur. Non possum non mirari, quamobrem Laurentius Valla, Cyperum in Herodoto, Siler, conuerterit.

EX M. VERG. COMM.

Cyperon. Non poterunt hoc loco facile secerni. Cyperus, Cypirus, & in feminino genere Cyperis, quæ tria, multa nominum similitudine, genere, & ut a toto pars inter se differunt. Cyperus siquidem, de quo nunc agimus, in Iuncorum genere anguloso caule, & odorata radice est. a Celso. lib. 3. cap. 22. quadratus Iuncus, a Plinio lib. 21. cap. 19. triangularis primo, mox angulosus dictus, graui, inter graues auctores, in angulis eius

A

Celsus Lib. 3.
cap. 22.
Theophrastus
lib. 9. cap. 7.

B

Plinius lib. 21.
cap. 19.

D I O S C O R I D I S

C discordia. Nisi Dioscorides, cum dicens, utriusq; bystoriā consumasse, & omnem inter eos, ueluti litē dis remisse uideatur.

Cyperus autem palustris herba est, Gladiolus quondam, a cultellati solij figura, ut credimus dictus, mul tis locis laudatus, & in Aegypto, si Plinio credimus, nullius odoris.

Cyperida postremo, foeminino genere, radicem Cyperi ueteres dixerunt, non omnem, sed eā, quam hic oblongæ oliuæ similem, præcipui in medicina usus, laudauit. Quæ una fuit causa, ut posteriores medici Cy perin, siue Cyperida tantum nouerint. Sic enim Paulus ægineta multis locis appellat. Quam uero Plinius eo dem capite dixit, per se Indicam herbam esse, quæ Cyperis uocetur, Zingiberis effigie, & commanducatam Croci nim reddere, diuerse a Dioscoride traditur. Non enim Cyperida, sed Cyperum dicit appellari. quæ in India nascatur Zingiberis effigie. Credimusq; nos, ab utroq; idem dici, uarietatemq; uocā, non aliud esse, q̃ ga a potiore parte, & quæ sola usum habet, tota quondam etiam dicta fuerit planta. Quod a Romanis ita dem factum est, qui Lunci radicem Cyperum dixerunt, totam plantam, et utiliorem eius partem simul signan tes, quæ appellatione usus Columella aliquando est.

Sunt qui Erysiceptrum uocent. Nulla a nobis deprehensa hætenus appellationis huius origo est, & cau sa: quando, ut ex utriusq; bystoria patet, nihil simile inter se habent, Cyperus & Aspalathus, & licet ali quas habeant in medicina pares uires, non tamen æquales sunt, id est æqualia, uel quæ hodie sic uocant, quid pro quo. Nisi fortasse multis quoq; plantis commune sit hoc nomen. s. Aspalatho, Cypero, Verbenaci, alijsq;. Ex quo enim per multas uagatur plantas, oportet in eo commune aliquid intelligere, quo se diuersis cō ciliet rebus.

DE CARDAMOMO CAP. V.

Cardamomum optimū est, quod ex Comagene, Armenia, Bos phoroq; deuehitur. India quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, contractum, quod em̃ huiusmodi non est, intempestiuum iudicatur, & gustu acre, subamarum, & odore caput ten tans. Excalfactoriam uim habet. Potumq; ex aqua, facit ad comitiales, is chiadicos, tussis, neruorum resolutionem. Item ad rupta, uulsa, tormina. Latas uentris tineas excutit. Ex uino aut potum renibus, difficultati uri næ, a scorpione ictis, neq; non omnibus uenenum uiibrantibus auxilio est. Cum cortice radicis Lauri epota drachma, calculos comminuit. Par tus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

Cardamomum, Theophrastus refert, alios e Media putare, alios ex India cum Amomo at q; Nardo, et plurimis id genus aduehi. Simile Amomo, frutice toto prædicat, semine ob longo. Quatuor eius genera, uiridissimum, & pingue, acutis angulis, fricanti pertinax, quod & maxime laudatur, Proximum ruffo candicans. Tercium minutius atq; nigrius. Peius, uari um & friari facile, odorisq; parui. Id quod uerius est, uicinius esse Costo debet. Præciū optimi, ait Plinius, in libras denarij. 2. Recentiores Mauritani, hoc non Cardamomum, sed Cordume ni, et syluestre Caros uocant. Cardamomi uero nomine genus aliud intelligūt, in geminas di uisum species. Alterum lentis amplitudine. Alterum ciceris obnigri, in quo granum albū sit, gustu mordaci. Vtrunq; odoratum. Quid, q̃ officinæ Cardamomo utuntur alio, q̃ quod a Mauris, & a Dioscoride perscribitur, duplicis fastigh, minus & maius appellantes, cui simile id semen sit, quod uulgo Melligeta dicitur, prælatum uiribus.

A D D I T I O

Author Pandectarum, nescio quid hic lepidum somniat de Cardamomo & Cardumeni, indicans ali quid esse corruptum in Dioscoridis textu, & apud Plinium. Mirum, quomodo hic tam lynceus fuit, in alijs co tus talpa. Quare posthac illius nemis innotari, uel eas reprobare, omitemus.

DE NARDO CAP. VI.

Duo Nardi genera, unum Indicū, alterum Syriacū appella tur. Non quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo ori tur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci gene

Veri Cardamomi

repelluntur

D
In uiribus
repperitur

Theophrastus
Lib. 9. cap. 7.

Plinius lib. 12.
capite. 12.
Gale. 7. simplis.

videtur in diuina
repperitur

re præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perq̃ odoratum, ac Cyperum redolēs. breui spica, amaro sapore linguā siccante, q̃ diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem Nardū quoddam Gangitis uocatur, a fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente: quod genus ob multam loci in quo prodit uliginem, uiribus infirmius est, atque procerius adolescit, oppletas ferēs spicas, ab radice comatas, unaque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autem odoratius, spica breui, odore Cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharítico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, cādidiore caule, Hircorum uirus supra modū redolente: quod improbat. Madefactum uendi solet. Quod uitium ex eo deprehēditur, q̃ cādida sit spica & squalida, nullocq̃ puluere obsita. Adulteratur* Stilbio cū aqua, aut Palmeo uino, inspissationis ponderisq̃ causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radici bus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluēdis manibus utilem. Vim habent excafactoriam & exiccantem. Vrinam mouēt. Aluum potu sistunt. Vuluæ profluuiā, saniemq̃ apposita supprimunt. Nausea ex aqua frigida auxiliantur. & cardiacis, inflationi, iocineri, regio morbo, renum uitij. Aquæ autem incoctæ foru ad inessum, uulua inflammationibus medēt. Ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad denfiorem pilum reducunt. Perfusis humore corporibus insparguntur. Miſcentur antidotis. & in ficiuli non picato ad ocularia medicamenta recon duntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

NARDI BARBARI COROLL.

Nardum, siue Nardus, in Thracia exili odore nascitur, siue ut Theophrastus scripsit, radice potius quædam imitantes odore Nardum, sed leuiter. Quanquam Plinius, inuentam in Thracia nuper herbam dicat, cuius folia nihil ab Indica Nardo specie dissentiant. Principatus in unguentis Nardo apud ueteres stetit. Frutex est graui & crassa radice, sed minuta nigraq̃ ac fragili, quamuis pingui, situm redolente, qualem Cupressi, aspero sapore, folio paruo, densoque. Cacumina in aristas se spargit. Ideo gemina dote Nardi spicas, & folia concelebrant. Alterum genus apud Gangem in totum reſcitur. Adulterat Pseudonardo herba, quæ ubiq̃ nascitur crassiore atque latiore folio, colore languido, in candidum uergēte. Sic hæc fortasse quæ Dioscorides Samphariticam appellat. Item sua radice permixta, ut Stilbio ponderis gratia, & Gummi, & Argenti spuma, & Cyperi cortice. Precium spicæ in libras denarij. 50. foliorum uero eius quod maiora hæc habet, Hadrospheron uocatur, denarij. 30. Eius autem quod minima, & ob id Microspheron appellatur, laudatissimumq̃ est, denarij. 75. Odoris gratia omnibus maior recentibus. Nardo color, qui in ueterauerit, nigriori melior. Indica, Syriacæ præfertur a Galeno. Nigrior, & ualidior etiā nonnunquam Syriaca. Reliqua genera in mēione gallici Nardi, montaniquē dicemus. Sed poscimus identidem, quæ sint illæ nouem species, quas Nardum Indicū representare Plinius existimet. An Gangetis prima, Ozenitis, ab odore uirulento dicta. Secunda, Pseudonardus. Tertia, Syriaca. Quarta, Gallica. Quinta, Cretica, id est Phu. Sexta, Baccharis. Septima, Hirculus. Octaua, Aslaron. Nona, Thracia. Quidā usum Nardi omnē abdicāt, ob ancipitē ex ea medicinā, propterea q̃ in Nardo quiddā ueneni delibutorij uice nasci ferāt; e quo Pison illud uocatū Indi cōficiant. Exitiale nō potu modo, sed in sudore corporibus appositū, etiā si ab leuigulis purgari, & elui curiosissime, moris sit, fortasseq̃ hoc sit aut nō dissimile quod Phariacō a Dioscoride, ac Plinio, Phariacō ab Atheno dicitur, gustu Nardi omnino, sed resolutionē faciens neruorū, cū alienatiōe mētis, atq̃ spasmō. Aduersari autē huic ueneno maxime Cydoni-

A

ἐν τῇ τῷ χύμα

καὶ χύμα

καὶ σπινθῆ

* Barbar. σίμυ

καὶ σίμυ

ἐν τῇ τῷ χύμα

B

Pli. lib. 12, ed. 12.
Theophr. lib. 9
cap. 7.Nouem species
Nardi.Nardus in neu
neu.

C am, Philarcus prodidit. Notatu dignū, a Dioscoride, ceterisq; ueteribus, Nardū Cyperi odore cōmēdari, a Plinio Cupressi. Malim qdem librarij fuisse culpā. Sed si Plinio tribuēdus error foret, affinitate uerbi lapsū esse dicere, Cyparissizin, pro Cyperizin legentē. Neq; dici potest, cōtra deceptū esse Dioscoridem, non Plinium. Quando quidem Cyperum idem ipse Plinius odorē Nardi referre alio loco scribat. Aduertēdum est & illud, omnia Nardi gener a herbas esse, prāter Indicū. In hīs probatio una, ne sint fragilia, & arida potius q̄ sicca folia. Hirculus porro, qua uitari Nardum sinceram dicunt, nō grauitate odoris modo, sed similitudinē etiā nonnullam animalis eius nomen accepit. Græci τρέγον uocant. Illud, ne quem fallamus, nō scendū. Syriacam Nardum duplicis esse generis. Vnum in India, sed parte montis in Syriam spectāte, quam Plinius sub Indicę uocabulo complectitur. Alterum in orbe nostro, id est, Syria, Ciliciaque. Hoc aliqui Gallico præponunt. Aliqui contra, Gallicum Syriaco tali præferunt. De Gallico mox dicemus. Calenus Indicam Nardum accipit quoties absolute Stachyn, id est spicam Nardi nominat, quasi spicam cæteræ non habeant, sed herbā dumtaxat, quē admodū & Plinio uidetur. In Gedrosia quoq; Nardum est. Sed sub Indico cōtineri credimus.

EX M. VERG. COMM.

A ltera Indicū spectat. Credimus, statim in ipsis foribus, perijisse huic capiti alteram regionem, Indiācam scilicet. Siquidem incipiens hoc caput Dioscorides, duplicem esse Nardum ait, uocariq; Indicam alterā, alteram uero Syriacam: subiecitq; statim, non ideo Syriacam dici, quia in Syria nascatur, sed quod montis in quo nascitur, altera pars Indiā, altera Syriam spectat: exigebatq; rei, & dictionis sequax necessitas, ut quē admodum dixerat, non ideo Syriacam. &c. sic etiam de Indica aliquid diceretur: nec aliud dici posse uidebatur, ob ea quæ statim sequuntur, q̄ quod de Syriaca dictum fuerat, non ideo scilicet Indicam dici, quia in India nascatur, sed quod. &c. Quam ob causam nos Indicam etiam reddidimus, & si in nullo græcorum inuenim id a nobis fuerit.

Desyderari eodem loco etiam hic potest mōis nomen, & situs in quo Nardus nasci dicitur, siue in India, siue alibi is esset: & si ob ea quæ Plinius libro. 12. rettulit, & hic paulo post de Gange dixit Indiā Nardi nates assignandi sint. Leniora tamen hæc sunt.

D Illud in medio capite grauius, in quo non diuersa tantum, sed contraria penitus omnia leguntur. In pluribus siquidem, sed minus probatis legitur. Ausferendum in usu Nardi, si quid luti radicibus eis hæserit, cum cribro eximendus puluis. In paucioribus autem, sed probatoris fidei, ut nos reddidimus, Ausferende scilicet in usu eius primum radices. &c. Videturq; prior lectio illa, Nardi radicibus ad medicinam uti, ex quo in eum usum purgari eas iubet: idque Paulus Aegineta libro sexto etiam confirmat, fuisseq; hanc Serapionis ætate huius loci lectionem.

Profunt & stomachi erosionibus, quas Græci Cardilogmos dicunt. Sciendum illud est, quam Græci ex multo tempore ὑπερλας, id est, cor dicunt, antiquissimis in ea gente Peloponnesiacisq; belli tempore, quo Hippocrates, medicinam suam commentatus est, non cor, sed uentriculum & ostium stomachi significasse, eaq; uoce intellexisse antiquissimos Græcos, stomachum & eius ostium tantum, non cor penitus aliud ab eo. Testis significationis eius est Hippocrates grauis autor, & qui pro oraculo in hīs merito habendus sit, pluribus locis ea pro stomacho usus est. Hæc multis etiam alijs in commentario suo Vergil.

A D D I T I O.

Cyperum imitante, id est, angulosum Iuncum.

Hircum spirante, id est, bircinum, uel Hircorum uirgus.

Frutice pumilo. Breni, uel decurtato. Adulterant statum Stibio. Αλιζοι Αι αυτον εμφρακτουτες τιμμι. Est autem Stimmi, ut inquit Plinius lib. 33. cap. 6. lapis spumæ candidæ, nitentisq;, non tamen translucens. Stimmi appellant alij Stibium, alij Alabastrum, alij Labasum. Duo enim genera, mas, & foemina. &c.

Abundancias foeminarum, id est, uulue fluxiones & proflumina.

Nono fistili. cui testorium non sit obductum. εν αγγειω καινω δουνηθη, κατε nouo picato.

De NARDO Celtico.

CAP. VII

Celticum Nardum nascitur in Liguriæ alpibus, Saliunca patrio nomine appellatum. Prouenitq; in Istria. Exigue fruticat, & cū radice uellitur. Alligatur manualibus fasciculis, manipulatimque componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido. Florem luteum. Foliorum, ac cauliculorum dumtaxat usus est, & odoris suauitas. Vnde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra, paulo solo atque

ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν
ἀλυσίαν

lo atque humenti subiecta, charta reponere, postridie repurgare, siquidē utile ab acroso, alienoq; propter humoris uim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ Hirculus uocatur, ab odoris grauitate. Sed facilis cognitio. Namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, uti uerum Nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa cohærens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacum pollet, sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum Absinthij decocto bibitur. Item aduersus lienem, renum & uesicæ uitia, & uenenatos ictus ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfaciētia unguenta.

BARBARI COROLL.

Nardum Gallicū, siue ut Græci appellant, Celticū, laudatur in orbe nostro post Syriacum, quippe quod Syriaco sit leuius, neq; multū ab Indico differēs, ut Plinius existimat. Preciū sicilis. Hoc & Aliucā uocari, Dioscorides Alpinis populis tradit. Credo Saliuncā legendū, a uicinitate pro Saliuncæ. Quam nostri foliosam quidē, sed breuem, & quæ neci non possit, describunt. Radici numerosæ cohæret herba uerius q̄ flos. Densa, uelut manu pressa. Breuiterque cespes sui generis. Pannonia gignit hanc, & Norica, & Alpiū aprica. Urbium Eporedia tantæ suauitatis, ut metallum esse cœperit. Vestibus interponi eam gratissimū. Seruius hanc uulgo appellari, Orci tunicam putauit. De Hirculo herba, cuius Dioscorides hoc loco meminit, superius mox absolui.

EX M. VERG. COMM.

Celticam Romani Gallicam, Id est, nascit in alpihus Lygurie Celtica Nardus, sed ab incolis regionis sue uocabulo Gallica appellata est. Suspicionemq; & coniecturam hanc nostram confirmauit, quod est illius aduerbium ἐν γαλλίᾳ, manifesta in Græcis significatione, quasi dicas, regionis modo & nomine, quod totū nos reddidimus, ab incolis gentis sue nomine appellata. Nec aliud est quod certū & pro comperto nobis de ea dici possit, & Genuates quidā Herbariā pro celtica Nardo, quæ est spicati floris colore inter ceruleum & purpureum, Lauendulam exhibuerūt, notam passim herbam. Atque sic dicta, quoniam magnum uetigal genti illi hæc herba est, quotannis in Apricam eam ferentibus mercatoribus, ubi lauandis, fouendisq; corporibus in balneis Lybes ea neuntur, nec nisi decocto eius ablui mane domo egrediuntur. Idem, nullam talē herbam bircini odoris nouisse se dicebant. Quo fit, ut peritioribus censendum relinquamus, an Celtica Dioscoridi Nardus ea sit, quam Genuates Celticam spicam, & Lauendulam, dicunt. Nobis nō uidentur alteri alterius respondere notæ. Nam Dioscorides suam luteo flore describit, Genuates suam colore inter purpureum & ceruleum ostendit: ob quas causas suspicantur proprii generis herbam, Gallicam hanc Nardum esse. ἀλλοῦ γὰρ. Ruellius, Saliunca. Sed omnē, ut uidetur, doctissimorum nostra ætate uirorum, pro Saliunca, & Gallica Nardo disceptationē excitauit una Dioscoridis in hoc capite uox, quæ nec una, nec eadem in antiquis græcis est, sed in aliquibus Saliunca, in aliquibus Aliunca, in aliquibus etiam geminato, ll, Alliuca legitur. Ex qua tam multiplici lectione, oborta nobis suspitio est, utrum in ea uoce esse, ut plarumque fit in his quæ latina a Græcis, & a latinis græca imperitis alterius linguae librarijs scribuntur: nec Saliuncam illic legendum esse, uerum ex quo sunt in quibus duplum ll est, & in omnibus totam dictionem finire ea syllaba, Gallica, pro Saliunca legi posse.

Prodest eodem modo & lieni. In aliquibus græcis non prodesse simpliciter scribitur: ut non tantum cui parti, uerum in quo eius partis malo etiam mederetur, intelligeremus.

Demontano NARDO. CAP. VIII.

Montanum NARDVM, quod ab aliquibus Thylacitis, & Niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, caule & folijs Eryn-

A

τρεῖς

ἐν γαλλίᾳ

καλτικὴ γὰρ λέγεται
Lib. xi. cap. 7.
& Lib. 20.

B

Lauendula quæ
sic dicta est.

ἐρυνὴ γὰρ λέγεται
Θυλακίτις γὰρ

D I O S C O R I D I S

Cgio similibus, minoribus, minime tamē spinosis, asperisq̃. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu Hastulæ regiæ, sed lōge graciliorib. & exilioribus. Neq̃ caulem, neq̃ fructum, neq̃ florem profert. Ad eadem quæ Celticum efficax.

N B A R B A R I C O R O L L.

Nardus montana, quam & Syriacam, & Ciliciam uocare possis: a Galeno Pyritis appellata est, nec priuatim a Plinio describitur, sed inter Nardi genera promiscue refertur.

E X M. V E R G. C O M M.

Aquibus scilicet Thylacitis, ὀθλακίς, ὀθλακίον q̃ masculino, nec minus θυλάκιον neutro genere, græci uocāt ex animalium corio factum sacculum, peramq̃ & utrem: ab his nominibus adiectiua forma θυλακίτις uox facta est, qua ueteres Nardum hanc dicebant. propterea, q̃ ex Cilicia, Syriaq̃, mercatoribus in Græciam sacculis bis clausa, uenalis afferretur: eratq̃ id nomen quasi nota gentis, & a gente bonitatis in hac herba. Indicant id meliora græcorum Lexica, in quibus uox θυλακίον ὀφεί, exponitur, θυλάκιος περιφύοντις τὰ ἀρώματα, quod est, ex corio sacculis circumferentes aromata.

Folia cum Eryngio similia habet. Dissidet hoc quod mox a fine subiungit, Non caulem, non florem, non semen fert. Quomodo caulem habet, & non caulem? Sed quod nocuisse huic capiti credimus, rerum uox cumq̃ similitudo & uicinitas est. Habent siquidem græci κλάνας κλάδος, & καυλόσ, quibus diuersas in plantis germinationes ostendant, ut aliquando certius nos etiam docebimus. Faciuntq̃ facile fuit, ut in priorē illa parte qua nunc legitur καυλόσ, id est caules, non id, sed κλάδος, aut κλάνας quondam legeretur, & a parrumperto, diligentiq̃ homine, altera pro altera uox accepta fuerit: ideo nos ramulos illic reddidimus. nam in posteriore illo, caules necessario reddēdi erant. In pluribus siquidem naturæ ordo hic est, ut ad florem & semen, caulem prius proferri oporteat. Quæ duo in montana Nardo hic negaturus, tertium etiam negare congebatur. Qui autem ab nobis ramuli in herbis dicuntur, hi sunt qui infructuoso genere, quale Absinthii, Ruta, Thymus, pluraq̃ alia sunt conferti ab uno principio, pluresq̃ oriuntur, & eadem altitudine fere inrer se crescunt.

D Minora tamen, nec Eryngij modo aspera. In paucioribus græcis, non τραχία, quod asperum, sed παχία, quod crassum significat legitur. Nec aliud Serapionis ætare legebatur. Tota in eo res uersabatur, asperitatem ne, an crassitudinem, Dioscorides excepisse uideatur. Nos quoniam Eryngio asperitas, & aculei a Dioscoride assignantur, illud malimus, quod eiusdem scriptoris autoritate defendi & confirmari poterat.

D E A S A R O C A P. I X

Asarum, quod & ipsum aliqui siluestre Nardum appellant, Magi Sanguinem Martis, Latini Perpescam, alij Bacchar, Osthanes Thesam, Aegyptij Cerea, alij Nardū rusticū, Galli Bacchar, Aethrusci Succinum. Odorata herba est, qua in coronamentis utuntur, Hederae folijs, minoribus multo, rotundioribusq̃. Floribus Cytini Hyoscyami, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos, & molles. Radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, gramine nō dissimiles, longe tamē graciliores, odoratas, quibus odor inest Cinnamon proximus. Asperum siccumq̃ solum amat. Eius radix, ruptis, conuulsis, in tussi uetere, & spirandi difficultate, & si urina ægre redditur, opifera est. Mensesciet. Contra serpentū ictus, eam in uino bibere, salutare est. Folia, ut quæ astringant, illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, incipientibus agilopijs, mammis tumentibus a partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnum gignit. Crateuas herbarius de eo ita scriptū reliquit. Asarum excalfactoriam uim habet. Urinam cit. Hydropicis, & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potumenses

ἄσaron
ἄσμα κρῖνος
ὀίσαν
βακχαρ
σοῦκκινγμ
ἀσεννδμυ κντιν

Crateuas herbarius.

menſes trahūt, & Veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vm-
broſis montibus prouenit, ſed plurimum in Ponto. Phrygia, Illyrico, &
Italiae luſtiniendi agro.

B A R B A R I C O R O L L.

Aſaron, præter cæteras differentias, molliora quoq; folia obtinet q̃ Hederæ. Radice Galli-
ci Nardi, Semine, ſaporis calidi ac uinoſi. Bis anno floret, Autumno, & Vere. Optimum in
Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyrio. Effoditur cū mittit folia, ſitum ocyſſime tra-
hens, ac ſenſcens. Error librarij eſt in Plinio, qui alicubi iubere uidetur ſiccandū in ſole,
alicubi in umbra. Niſi quis poſteriorē locum ita legat. Nō q̃ ſiccandum ſit in umbra, ſed q̃ ſi
tū celerrime in umbra ſentiat. Non ignorandū, Baccarē aliud omnino eſſe q̃ Aſaron, etiā me-
dicinas, quas Dioſcorides Aſaro dicauit, Plinius apud nos Baccari magna ex parte acceptas
reſcit. Nec mirum, cū ſit earum natura uiribus & effectu proxima. Cæterum Perpenſam, huc
Perpreſam (nā utrunq; legitur, ut in Baccare latius expoſui, non Aſaron, ut Dioſcorides, ſed
Baccarē intelligi Secundus noſter uoluit. Cōtra quoq; deſcriptio Aſari a Dioſcoride facta, cō-
gruit Baccari multis paribus. Primū, q̃ odor ei Cinnamomo uicinus redditur, ut Aſaro. De-
inde, q̃ gracili, nec humido ſolo prouenit, ut Aſaron. Alioquin reprehēdūt a Plinio, q̃ Nar-
dum ruſticū, radicē Baccari appellauere: quia Nardum ruſticū proprie ſit Aſaron. Quod ue-
ro Dioſcorides Coronamentariā eſſe dicit herbam Aſaron, id Baccari potius q̃ Aſaro conue-
nit. Propterea, q̃ Aſaron uocari ſcribunt, quoniā in coronas atq; ſerta nō addatur. Legebatur
in Dioſcoride, Romanos Aſaron Peritrefam uocare: nos Perpenſam, aut Perpreſam ex Plinio
correximus. Autor is eandē opinor herbam. 11. libro Perpenſam. 26. Perpreſam nominat. Co-
dices etiā ſunt, in quibus non Perpreſa, ſed Sparſa legitur, ut exiſtimo corrupte. Legitur
& Aſarus, non pro Aſaro, ſed pro Ariſaro mendose. Quid enim incolumē relinquit Medico-
rum imperitiæ. De Ariſaro agemus ſuo loco.

E X M. V E R G. C O M M.

Aſaron. Græcis adiectiuum eſt, ſignificatq; illis idem quod ἀσάρον, id eſt, quod in ornatum non ue-
niat, & quo ornari nequeamus. autor Plinius, Cæterum obſtat quod ſequitur, Coronaria & odorata verba,
Aſaron eſt. Reſpondeo. Non id aduerſatur. Poſſunt enim plantæ, earumq; partes, ob præcipuam eius uſus
cauſam, coronariæ eſſe, ut mox dicemus, & nihilominus quia aliquid aliud impediāt, in coronas non addi.
Sunt qui ruſticam Nardum appellent. Haud dubium, quin ob odoris ſimilitudinem. Cæteræ appellatio-
nes nobis incognitæ, ideo exentiendas poſt nos alijs relinquitur.

Cogor uel nolens appellare Ruellium: quoniā & ipſe, & alijs interpretes, intelligunt in Aſaro caulicu-
los aſperos & molles, contrario (niſi mutata ſit latinarum uocum antiqua eſtimatio inter ſe) & ob id ſimul
impoſſibili habitū. Qui enim poteſt ſimul aliquid aſperum & molle eſſe? & cur poſt ſeminis hitoriam, q̃
in his quæ cauſcunt, in caulibus, plerūq; abſoluit Aſari cauſes, importuna, & parum congrua ſermonis
ſerie in Dioſcoride deſcripſerint: cū nec molles, ſed raros græci omnes illic habeāt, nec cauſes eo loco, ſed cauſa
pides, acuminatq; aliqua, quæ in eo ſemine ſe proferunt, hic ſcripſor deſcripſerit. Video lapſum. Crediderunt
illi, nihil aliud græcis, & huic præſertim ſcripſori, καυλός, καὶ καυλὶα ſignificare, quam in oleribus, plantiſq;
alijs, ad florem, & ſemen in altum ſurgentes. ueluti uirgas, cum tamē Homerus καυλὸς δόρυ τας ſuos dixerit, et
omnia eius gentis Lexica indicent, καυλόν, et eadem ratione καυλόν, præter cōmunem illam in plantis ſignifi-
cationem, in extremo baſtili ferramento acuminatam ſummam partem, in quam cauſa deinde cuspis ferrea
inferitur, ſignificare: quæ uocis non illa eſtimatione reddendus, iudicio noſtro, fuerat hic locus. Hic enim poſt
rotā ſeminis figuram, quā nucleis acinorum ſimilem, dicebat habere idem ſemen, oſtendit uelut in echina-
to caſtāneæ calice, acuminata quædam, nō tamen ut in illo conſerta & denſa, ſed rara, nec mollia, uerſi aſpe-
ra, neque anguloſa iridem, ſed angulorum figura modo et ſpecie. γωνιώδης enim ea appellat, non γωνίωδης, q̃
ab illis fuerat diligentius obſeruandum. Nō enim parui refert in pictura, ſeu modo uel ſpecie. In illo ſiquidem
manifeſti anguli erunt, in hoc quod angulis ſimile ſit. Videtur tamen Plinius hoc aliter indicaffe, cum ait,
Aſaro ſemen acinoſum & uenofum eſſe, nec extare in eo acuminatū quid, ſed per longitudinē uenas extendi.

A D D I T I O.

Subtiles, obliquæ, &c. Quæ ab hoc loco ſunt, uſque ad id, Aſarum excaſſatoriam habet naturam. &c.
in Vergilio deſyderātur, putatq; idē, ab ſciolo quopiam fuiſſe infera, qui ut Plinij ætate etiā aliqui inue-
niebantur, Baccarem ruſticum Nardum credidit, & appellauit eadem appellatione, deceptus, quod Aſa-
ron ruſticum, Nardus etiā dicebatur, Aſarum et Baccarem ſimul miſcuerit, diuerſis aliqui foliorum, radi-
cum, & in quibus utraq; naſcitur locorum notis a Dioſcoride deſcriptis.

A

Plinius lib. 12.
capite. 13.Idem libro. 21
capite. 6.

B

C

φού
ἀγρία νάρδος
ἐλαφοβοσκῆ
ἰπποερινῆ
σχῆς ἢ μέλας
ἐλλείβορος

PH V, quod & aliqui siluestre Nardum appellāt, nascitur in Pon-
to, folio Olufatri, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui,
cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto. Floribus Nar-
ciso proximis, maioribus, teneris, & in albicante purpureis. Radice su-
perius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa, in nigri Vera-
tri, aut lunci odorati modum, capillamentis inuicem contextis, flauescēti-
bus, odoratis, cum quadam odoris grauitate Nardum emulantibus. Ex
calfacit. Vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prae-
stare potest. Ad lateris etiā dolorem efficax. Menses ciet. Antidotis inseritur.
Adulteratur radice Rufci ammissa: sed maleficium deprehenditur, quā
hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

B A R B A R I C O R O L L.

Lib. 12. cap. 11.
et lib. 20. ca. 21.

PH V, Creticum Nardum nonnulli uocant. Radice uillosa, imitanteq; auium pedes. In
Plinij codicibus corrupte Aliphu, pro Phu legitur.

E X M. V E R G. C O M M.

QV A M pro Dioscoridis Phu, ætatis nostræ Herbarij ostēdunt. s. Valerianam herbam, longe mi-
nor ea est quæ ab hoc scriptore describitur. Nec omnes omnino utriusq; inuicem sibi respondent
notæ, quæ tamen præcipue a Dioscoride numerantur, conuolutæ glomeris modo. Et ut Plinius ait, uillosæ ra-
dices, earumq; Nardi odor, & albicans in caule purpura, in nostra pariter sentiuntur. Credimusq; nos, ut in
animalibus etiam sit, quæ non eadem mole corporis, ingenijq; sui natura ubiq; nascuntur, in alieno orbe ca-
li, aut terræ beneficio, Phu banc proceriorem nasci. Quoniam & in nostro orbe cubitalis aliqui uisa fuerit.

D

μαλαβάρων

φού
ἀσπερον
νάρδος

De MALABATHRO.

CAP. XI

MAlabathrum arbitratur aliqui esse Indici Nardi foliū, falsi qua-
dam odoris cognatione. Per multa enim Nardum olent. quæ
admodum Phu, Asarum, Niris: secus autem res se habet. Namq; Mala-
bathrū foliū sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, Lentis palu-
stris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum, statim lino transu-
itur, & siccatum reconditur. Tradunt, siccatis æstiuo feruore aquis, hu-
mum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidē re-
nasci. Laudatur recens, cum nigredine quadam candidās, integrum, nec
fragile, odore caput feriens, quod diu insuauis odore permaneat, & Nar-
dum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirum uero & minutum con-
tustum, præsertim si cariosum uirus olet, uisiosum est. Easdem Nardo for-
titur uires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehementius ciet, ac sto-
macho magis pdest, Malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibus-
q; tritum, & in uino feruefactum, cōmode illinitur. Subditum linguæ,
oris halitum & suauitatem cōmendat. Vestium quoq; odorem interpo-
situm seruat, & ab erosione tuetur.

Lib. 12. cap. 16.
et de medica-
mentis eius Lib.
23. capite. 4.

B A R B A R I C O R O L L.

MAlabathrum Plinius arborem Syriæ affirmat esse, folio cōuoluto, arido colore. Ferti-
lis in AEgypto. Laudatius in Indiæ paludibus, sine radice fluitans. Improbant candidū. Ce-
lerime situm in netustate sentit. Odor in uino sufferuefacti antecedit alios. In precio quidem
prodigio simile est, a singulis denarijs ad tercentum peruenire libras, ut idem inquit autor, o-
leum autē ipsum in libras. 60. Sunt codices in quibus non oleum, sed folium scribatur. Si hæc
uera sunt,

uera sunt. Malabathri gemina conditio. Alterum palustre, ut Dioscoridi uidetur. Alterum ex arbore. Nunc medici nec primum, nec secundum, sed tertium Malabathri genus nouere, appellatum a Mauritanis suis Tenbul, cuius furculi cum folio, quale Arbuti huc Lauri est, pollicares plerumque ad nos ferantur, & fructus quoque laurinis bacchis simillimus. Omnia tria genera folij appellatione significari consueuerunt, sed priora duo maxime. Foliatum inde unguentum, quo foeminas locupletes oblini Romae solitas, Galenus auctor est. Graeci Phyllon, hoc est, folium uocant. Herbae genus in saxosis montibus repertum. Nostri uulgo Folium syluestre nominant, ut suo loco differemus. Notandum, uariare Dioscoridem a Plinio, quod alter Malabathrum probari scribat, quodam salis gustu, alter nullo.

EX M. VERG. COMM.

Malabathron. Primum illud nouisse omnes uolumus, hoc ipsum ab antiquis graecis folium simpliciter fuisse dictum. Sic Plutarchus in libello cui titulus est, Quod bruta ratione utuntur, appellat, odoramentis alijs coniungens, simulque numerans Cinnamomum, Nardum, Arabicum Calamum, & folium Malabathrum. s. hoc. Quae uox ex antiquo & probatoris mihi fidei graeco codice, instaurata a nobis illic est, ubi legitur. Et nisi id fiat, non nasci folium, quae in cunctis alijs deerat. Ab hac appellatione Malabathrinum unguentum foliatum Marciali, & plerisque alijs, & graecis & latinis scriptoribus dictum est, & ob odoris similitudinem idem Nardino esse creditum aliquando.

Et Niris, quae montana Nardus. &c. Non *νῆρις*, quae montana Nardus ab eo dicta est, uerum *νῆρις* in aliquibus legitur. Sed nos malumus, quod ex eodem scriptore seruari poterat. Et si forte utroque loco *νῆρις* legi quondam potuerit, non adeo tamen similis odor est, ut mutanda temere ea uox fuerit.

Probatum recens & nigredine albicans. Habet plures Graecorum codices descriptas his uerbis Malabathri notas. *ἔστι λεκκὸν τὸ πρόσφατον καὶ ὑπόλευκον*, probatur scilicet recens, & quod albidum, non omnino album, id enim *τὸν ὑπόλευκον* significat. Sequitur deinde. *ἐν τῷ μελανίζειν τε ἀθραύσον καὶ ὀδύνηρον*, quae latinis uocibus reddi quidem possunt, sed parum sequaci & congruente sensu. Si enim dicas, in nigrescendo in fragile, nec in partes discriptum, quis erit sensus? & quae rei natura? Siquidem nulla in colore causa est, cur magis, minusque frangatur aliquid, & in suis partibus integrum seruetur. Accedit & illud, quod copula illa *τε*, uerbo subiecta, alterius in sermone membri ueluti principium facit, quicquid in lectione Graecorum consueuerunt, facile in alijs obseruare hoc potuerunt. Quod nisi Plinius, aliique omnes, nigricantem colorem Malabathro adsignarent, confidentius & uicium hoc loco testaremur, & ut consueuimus in integrum etiam restitueremus. Vnus igitur tantum inuentus mihi est codex, in quo legitur *ἐν τῷ μελανίζειν τε ἀθραύσον καὶ ὀδύνηρον*, quorum uerborum sit sensus. Et in mollescendo in fragile, & in suis partibus integrum, ut nihil de colore illic agatur, sed de tenaci lentore: doceatque Dioscorides, probari Malabathrum id, quod recens & albidum sit, quodque cum mollescit lentore admittit, tenaces uires tunc acquirat, fiatque in fragile, & in suis partibus integrum seruetur. Quod in multis humor natiuus, & accedens facit, fiunt enim eo firmitiora, & ualidiora. Quemadmodum contra arescentia franguntur.

Prodest oculorum inflammationibus. Sunt exemplaria graeca in quibus legitur, *καὶ πρὸς τὰ ὀφθαλμια καὶ πρὸς τὰς φλεγμονὰς ἀρμόζει*, & ad oculorum praeterea lippitudines & inflammationes accomodatum est: ut duo intelligatur mala. Sunt itidem in quibus, *καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας καὶ φλεγμονὰς*, id est, ad oculorum inflammationes, ut unum tantum mali genus intelligatur. Nos posteriorē hanc lectionem, monente Plinio, magis probauimus, qui de unguento Malabathrino legit epiphoris, id est, inflammationibus uino expressum, utilissime imponitur.

DE CASIA CAP. XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam cognitur, crassi corticis sarmento, folijs Piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, Coralij aemula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto seruire astringens, aromatica, uisnoso odore: cuiusmodi est quae ab incolis Achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, Daphnitis. Huic praefertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine: quae Rosam odore imitatur, praecipui in me-

A

φύλλον

B

κεντρικ

αχυν

λαφνίτις

ρῆρις

b

C dicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blas-
sto cognomē est. Reliquæ uiles, & quæ Aphemū dicitur, nigra, insuauis,
cortice tenui, ac rimoso: & quæ Darcā & Citton uocāt barbaro nomine.

Εἰς τὸν μυσκλῆτιον

Δάρκα καὶ κίττον

Theoph. li. 9.
capite. 4. 5.

Plin. lib. 12.
capite. 20.
Item lib. 12.
capite. 19.

B A R B A R I C O R O L L.

Cassiam Theophrastus fruticem magnitudine Salicis Amerinæ prodidit, sed multis furcu-
losisq; brachiata ramis. Crassiore q; Cinnamomum sarmehito, præterea nervosissimā, & fo-
lo cortice commendabilem, qui ei cutis tenuitate obducitur. Neq; aliter detrahatur, q; si præsu-
tas corio bubulo uirgulas bicubitas, enati uermes eroserint, cortice tuto, intactoq; propter a-
maritudinē, odorisq; acrimoniam futuro. Hæc iuxta Cinnamomi capos in Ethiopia, Troglo-
dytis permixta connubio, sed in montibus nascitur. Dissentia Dioscoride Plinius, Theophra-
stus (ut arbitror) secutus, q; Dioscorides crassum eius corticē esse scribat. Illi cute uerius, q; corti-
ce uestiri tradant, quem conteri, atq; in Cinnamomo leuari exinaniriq; precium sit. Amplitudo
fruticis cubitorum trium, ut idem Plinius existimat. Color triplex. Cum primum emicat, cadi-
dus pedali mēsurā. Deinde rubescit, additio sesquipede. Ultra nigricans: quæ pars inquit maxi-
me laudatur, ac deinde proxima. Damnatur uero candida. Eligendam recentem maxime, &
quæ sit odoris mollissimi, breui tunicarum fistula, & non fragili, quæq; plurima, minimū pon-
deris faciat. Ceteræ notæ congruunt. Lactam uocant talem, barbaro uocabulo. Alia est Bal-
samodes, ab odore dicta, sed amara, ideoq; utilior medicis. Hanc esse, quam Dioscorides Ze-
giri, et Galenus Gizer, Aetius Ozem uocarūt. Haud multum absūm quin credam. Nominat
& Mottoden Galenus speciem Cassiæ uiribus proximam, appellatā Gizer. Nigra unguentis
expetebatur. Precia nullis tam diuersa. Optimæ in libras. xl. ceteris. xv. His addidere Mango-
nes, quam Daphnoideum uocant, Isocinamon cognominatam, preciumq; eius faciūt. ccc. Ad-
ulteratur Syrace, & propter similitudinē cortice Lauri furculis tenuissimis. Forteq; Daphno-
ides eadē sit Cassia, quam Daphnitin a mercatoribus uocari scribit Dioscorides. Fabulæ sunt,
Cassiam, Cinnamomumq; nidis auium decuti plumbatis sagittis, aut circa paludes quasdā col-
ligi, propugnante diro serpentium genere, ut Theophrastus ait, uespertilionumq; ut alij. Sci-
endum, q; ubi nos in Dioscoride conuertimus, quandam haberi Cassiam redolentem hyrcinū
uirus, Mauritanii odorē Porri transfulerunt, præsizusam, nō trifisusam legētes. Vtra lectio sit
uerior, experti iudicent. Nō conuehitur modo Cassia, præter q; rarissima inter Xylocinnamo-
mi fasciculos quandoq; inuenta, nigriciæ argumēto. Cassiam latini correpta priore syllaba pro-
nunciat, etiam si apud Græcos fere omnes geminata cōsonante scribitur. Vergilius. Nec Ca-
sia liquidi corrumpitur usus oliui.

E X M. V E G R. C O M M.

D Ab incolis quæ talis est Lada. In cunctis fere legitur. Ab incolis quæ talis est Achy. Et in a-
liquibus non Achy, uerum Ad, legitur, quæ uox quoniam in aliquas literas eius, quam Plinius
Ladam uocari dicit, incurrit, Lada a nobis restituta est, nulla tamen certa ratione, tam enim no-
bis Achy nunc barbara uox, quam Plinio tunc erat, & nobis modo Lada est.

Tertia est, quæ rubus Mosylyticus appellatur. Cum in cunctis fere legeretur *κασσίαν*, comū-
ni omni germinum appellatione ex melioribus græcis *κασσίαν*, id est, rubum reddidimus. Neq;
(ut credimus) ab re. in fruticoso enim genere Cassia censetur, in quo & rubi numerantur, uerifi-
mileq; est, contractiore hac rubi uoce, magis q; ampliore illa & cōmuniore germinis Cassia si-
gnari solitam, præsertim a regione: non aliter q; Lygusticum, Piper agreste, multaq; alia in plā-
tarum genere appellamus.

Mosylycus. Apromontorio & emporio Ethiopiæ Mosylo, unde afferebatur, dictus est.

Vt quæ Aphysemon uocatur nigra. & c. *ἀφυσέμων* in multis legitur, *ἀφυσέμων* in meliori-
bus inuenitur: potuitq; ob eam appellari cassiam, quod tenui & disrupto eius cortice tibiā-
& fistularum more inflari non poterat, id enim *φυσάει* Græci dicunt, & *φυσάειρα* *ἀνθρώπου*, id est, tibi-
as uocant, & hic *φυσάειρα*, folium, fistulam, de Cinerula, & bulla in metallicis agens, appellat.

In odorifera Arabia. Ea est, quæ inter Persicū, & Arabicū mare a geographis describitur.

Habet crassi corticis Cassia omnis sarmentum. In græcis est, *πάχυν* *παχέριον*, quod signifi-
cat uirgam, qualem. s. in uitibus, multisq; alijs uidemus. Eam crassi corticis dicit Dioscorides.
pro crassitudine. s. totius materiæ, in qua crassissimus sit cortex, exigua interior medulla. In ali-
quibus hoc loco legitur, *κατὰ ἰσὺν*, uoces duæ, nihil, nisi emendatur significantes: credimusq;
ex Theophrasto restitui posse *κατὰ ἰσὺν*, ueluti uiticis.

Et Piperis folio est. Legitur in aliquibus *κατὰ ἰσὺν*, in aliquibus, *κατὰ πινέριον*. Potiorem illā

Iectionem sequutus est Mauritanus Serapiō. Nobis in tam multa in plantarum solijs naturæ uarietate, difficilis coniectura & ratio fuit: et licet utraq; lectione dici plura potuissent, tutius tamen uisum est, ex cognatiōe locorū, uicinitateq; Piperi folio similē potius facere: credimusq; omnē hanc uarietatem ab imperitia librariorum & incognitæ rei dubitatione irrepsisse.

Daphnitim. Si Plinio credimus, a Lauro facta appellatione, quoniam scilicet ob similitudinem Lauri cortice adulteratur, & a Mangonibus Daphnoides dicitur. In quo certe dissidet a Dioscoride. Verū id alijs excutiāt. Aut certe sic dicta Daphnoides, a portu Arabiæ, cuius meminit Strabo. lib. 16. qui thus, myrrham, & alia odoramenta fert.

Odore Porraceo, Mutauimus & hoc, quod in quibusdam habetur *τραχύς*. Nā in melioribus, porraciore odore habetur. Et Mauritanus Serapion quoq; sic legit.

De Pseudocasia CAP. XIII.

Similior huic est Pseudocasia, q̄ ut explicari possit: quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hæretemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, plena, ab alia distans. Damnatur candicans, scabra, hircinū uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, et malagma ta, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur. Lentigines tollit, cum melle illita. Menses trahit. Contra uiperarum ictus pota auxiliatur. Aduersus intestinas, inflammationes omnes, et renū uitia, pota proficit. Foemina in solia desidentibus, aut suffimētis, prodest ad dilatationem uulvæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, Cinnamomi uicem supplet. Nā eosdem effectus præbet. Ad plurima perq; utilis.

BARBARI COROLL.

Habetur & Cassia odorata genus herbæ, ut in Thymelæa, siue potius Chamelea demonstrabimus. Aliud etiam genus est, quæ ætas nostra Cassiam appellat, & cognomento fistulæ. Ab aromatica, ligneaue discriminat, ueteribus ignotâ, pinde ut fere nobis mō lignea, aliqñ in nostro quōdā orbe feri cœpta, extremiq; impij Rom. margine, qua Renus alluit. Viuere in aluenijs apum solita. Etia si color aberat ille torridus sole, atq; ob id simul idē odor. Ceterū scire oportet, si qñ Cassiā syringa, hoc ē, fistulā, in antiq; autorib. legere cōtigerit, nō p ea capiendā esse, quæ nūc Cassiā fistula dicatur, colore rubro nigrās, laminis intus carnosiss, quas parietinē discludunt, seminibus siliquæ Ceratiæ, ad deijciendā bilē usq; mire ualēs, sed p lignea, siue aromatica, cuius una quoq; species ab ipso Dioscoride platea Syrinx, idēst, lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe Felix, si mō liber eius est, qui circūfertur, appellationē Fistulæ, simpliciter Cassiā odoratā, siue aromaticā intelligit. Inuenio tñ apud græcos autorem, q Paulū, et Oribasiū ita loquentes induxerit. Cassia Syrinx aduersus flauā bilē, pdest: & itē eos, q pter naturā pallescent: itē anginas, & laterū dolores, & peripneumonicos. Hæc Paulus. At Oribasius. Refrigeria inquit ieciniōis calores intempatos. Hæc recētiōres græci calidā, & humetā abscessū primo phibent. Idē fere Mauritanus. De Cassia qua bilis per aluū detrahitur, & ppter ea Cathartice dici potest. Nam aromatica, siue lignea ex calfacit, atq; siccāt abscessū fere tertio. Porro Cassia Cathartice partim in India, partim in Aegypto nascitur, folio Iuglādīs. Alexandriē sibi uisam Pōticus Facinus retulit, dū ista pderē. Siliquas habet plōgas, ac teretes, utrinq; fastigatas, duo fere pedes, pceras, carne intus nigra, gustu p dulci, sed plane medicato, ligneis distinguētib; mēbranis, & ossibus siliquarū intercurrentib; ut p dixi. Eligūt ponderosā, collucētē, plenā, & quā si cōcussieris, inclusa intus ligna nō sētias. Negociatores in hortis Alexandriē nascentē pferūt. Iam & Asiē cōmunis facta dicitur. Seritur & apud nos, uerū frustra. qā nec ad frugē puenit, & celeriter opprimitur. Quid sit Myrrha Cassia Hippocrati, cuius semē laudat uolumiē, fēminarū morbis dicato. *κασιό* inquit *τὸν καρπὸν*, haud scio reddere. Nisi quis p Smyri herba cepit, cuius cibo menstrua foeminarum iuuari constat. Strabo Cassiam odoratam e stagnis colligi, non solum ex arboribus in Arabia felice, quosdam in India, maiorem eius partem existimasse prodit.

A

ψευδοκασία

B

καθαρτική

b. n.

C E X M. V E R G. C O M M.

C Vam hodie nostræ ætatis medici ligneam appellant unguentarij, uisæque delicis magis q̃ medicine q̃ndā quæsitus frutex, ideoq; ab omnibus Poetis passim celebratus, diuersus omnino ab ea arbore, quæ eadē, nūc Casia appellatiōe, filiquas potius q̃ fistulas fert Cylin draceas, longitudine fere cubitales, lighofas, colore nigro, & quasi ex sole igniue torridas, in tra quas lignosi iudē p̃ interualla orbiculi sunt, & inter orbiculos semina concreta, ceu pulte ni gra inuoluta: cuius tanta in mollienda aluo usus est, tā multus, tamq; quidianus, ut sine ea uix possit nostrorū temporū medicina stare. Quo magis ueterū negligentia, aut fortunā demirari licet, qui aut eā ignorauerint, aut uti noluerint. Neq; em̃ hæcenus de ea q̃c̃q; aut in hoc, aut in cæteris inuētum a nobis est, quod merito miremur, & uix credibile uideatur.

Ei quoq; parū recte fistulæ nomē, et ex eo diuersitatis nota adiecta ē. Silique em̃ magis, q̃ si stulæ nomē illi cōgruit, p̃pterea, q̃ undiq; clausa, aliarū filiquarū in leguminib; modo semina sua intra se claudit, medica hæc Casia, et ad maturitatem perducit.

Cauendum igitur, ne in antiqua medicina, uidelicet, quæ supra Galeni ætatem tractata est, fistulā Casiam inueniētes, medicam hanc nostræ ætatis credamus, eandemq; credentes, graui periculo ea utamur. Ligneam enim illi semper intelligunt, quæ medicæ & posteriori huic nomē & appellatiōem suam ex similitudine largiri potuit.

D E C I N N A M O M O C A P. XIII.

πινναμόμον

μούσλλον

μωσυνλίτις

C Innamomi genera plura patriū sibi nomē uendicātia. Præfertur tñ Mosyllū, qđ Casia, cui Mosolyti nomē est, aliquā referat effi giem. Sed in eo genere, recens, nigrum, ex uiuoso in cinereū uergens, le ue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctū, perq; iucunde olens. Optimi fere tempamētū odoris proprietate cōstat. Inuenitur em̃ in opti mo, quodq; seorsum nascitur, odor Cardomomo p̃ximus. Insup, acre et mordens, & cū calfactiōe quadā tenus falsū, qđ non cito cōfricanti hirsu tū, aut friātī lanuginosum, leuib; tñ internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculū. Facilis est hmōi p̃batio. Namq; fragmen ta, adiecticia quædā sunt. Quæ aut potētius spirāt, suo halitu cū nares cō sulūtur, olfactū explētia, deterioris dignotionē impediūt. Est etiā nū Mō tanū, crassū, pumile, fuluescēs admodū. Ternū a Mosylo, perq; suauiter olet, nigrū, fruticosū, paucis intercedētibus geniculis. Quartū, fungosū, cādicās, aspectu tuberosū, uile, ac friabile, magnā habēs radicē, Casia pla ne representātē. Quintū genus, gustu amarū, et cortice fuluē Cassiæ simile, tangenti firmū, minus neruosū, densa radice firmatū. Iis quæ Thuris, Ca sia, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrū, rugosum, leue, lignosum. Radicem autem ut inutilem reijcito.

D mo, quodq; seorsum nascitur, odor Cardomomo p̃ximus. Insup, acre et mordens, & cū calfactiōe quadā tenus falsū, qđ non cito cōfricanti hirsu tū, aut friātī lanuginosum, leuib; tñ internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculū. Facilis est hmōi p̃batio. Namq; fragmen ta, adiecticia quædā sunt. Quæ aut potētius spirāt, suo halitu cū nares cō sulūtur, olfactū explētia, deterioris dignotionē impediūt. Est etiā nū Mō tanū, crassū, pumile, fuluescēs admodū. Ternū a Mosylo, perq; suauiter olet, nigrū, fruticosū, paucis intercedētibus geniculis. Quartū, fungosū, cādicās, aspectu tuberosū, uile, ac friabile, magnā habēs radicē, Casia pla ne representātē. Quintū genus, gustu amarū, et cortice fuluē Cassiæ simile, tangenti firmū, minus neruosū, densa radice firmatū. Iis quæ Thuris, Ca sia, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrū, rugosum, leue, lignosum. Radicem autem ut inutilem reijcito.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. libro .12.
capite. 19.
Theophrast.
lib. 9. cap. 45.

C Innamomum in partes quinque concidunt. Præcipua bonitas tenuissimis ad longitudinē palmi, pauloue amplioribus. Secunda proximi breuiore mensura. Vilissimæ, quæ radicem antecedunt, quoniam ibi minimum corticis, in quo summa gratiæ. Qua de caussa præferun tur cacumina, ubi plurimus cortex. Ipse frutex duorum cubitorū altitudine amplissimus, pal micq; minimus. Quatuor digitorum crassitudinis. Statim a terra sex digitis surculosus, arido si milis. Cum uiRET, non odoratus. Folio Origani, siccitate gaudens. Sterilior imbre, ceu contra ria ceteris natura. Gignitur quidem in planis, sed densissimis in uepribus, rubisque. Difficilis collectu. Verior sententiā est, nasci in Aethiopia, Troglodytis cōnubio permixta: Non ut He rodotus, quo situ Liber pater educatus esset, ex inujs rupibus, auiq; nidis peti, & priuatim Phœnicis. Neque, ut alij, in Arabia. Igitur mercatores illi a cōterminis uehunt per maria uasta ratibus sine gubernaculo, sine remis ac uelis, sed hyberno per brumā, curis tū maxime flanti bus, Primus his portus Gebēnitarum Ocila, siue Acila ut Strabo, Ptolomeus Ocelis, Produ n

tur

tur uix quinto anno reuerti mercatores, & interire multos. Contra reuehunt uireæ; & aenea, uestes, fibulas, cum armillis, ac monilibus.

EX M. VERG. COMM.

Mosylicum. Ita legit & Plinius lib. 6. capite. 29.

Quod colore nigro, & cum uino diluitur Cinereo. Duplex in græcis eius partis lectio est. *τεππίον*, i. in *τὸ δ' οἶνον*, quod si uerbum uerbo reddatur, in uino cinerescens significat. Sunt itidē in quibus una adiecta syllaba *τῆ*, alius indicetur sensus, *τεππίον ἐν τῷ οἶνῳ*, i. in uinoso colore cinerescens, quasi mixtum describens colorē, & ex eo uarium Cīnammū, in quo Cinereus, & ex uino rubens color esset, pariterq; ac nigrū probaretur. Quam lectionē secutus est Mauritanus Serapion, priorem uero illam antiqua Dioscoridis tralatio. Cur aut in alteram partem magis inclinauerit animus, ea ratio est tota ex sermonis serie. Numerat hic probatoris Mosylici plures notas, laudatq; recens & colore nigrum, cūq; de colore eatinus egisset, nulla interiecta copula, aut diuisionis nota alia, subiicit statim *τεππίον ἐν τῷ οἶνῳ*, & c. idest, ut nos reddidimus, & cū uino diluitur cinereo, ut non ad uarium in eo colorem pertineat, sed ad mutatum, cum uino maduerit, qualia multa uidetur quotidie oleo, aceto, humoribusq; alijs cōpersa, ex alio in aliū mutari colorem. Nam si uoluisset uarium, & ex uini cinerisq; colore mixtum Cīnamomū pariter ac nigrum laudare, copula, diuisionisq; alia nota aliqua alterum ab altero secerni oportebat. Cetera in commentario latissime.

Rutæ, Cardamomoue similis odor. Fuisse aliqñ huius loci eam lectionem in latinis testatur Serapion, in græcis uero probatissimè mihi fidei antiquissimus codex, in quo manifeste nulla mutationis alicuius suspitione adhuc seruatur & legitur, *ἢ ὅς μὴ πικρὸν ἴσται ἢ καρδαμόμου ἴσται*, quasi latine dicas, rutescens, aut Cardamomo equalis odoris. Suspecta mihi præterea eodē loco Cardamomi uox est. Siquidē inoleuit toto hoc opere multis locis idem, frequēsq; uicium, in quo sepius uel uocum uiciniate decepti, parum diligētes græcorum librarij, uel ob uitrium similitudinem aliquam, equalia rati ueteres eiusdem gētis medici, Cardamon, quod significat Nasturcium, pro Cardamomo; inuicemq; pro Cardamo, idest, Nasturcio, Cardamomū scripserint. Auxit suspicionem, qd in antiqua tralatione Nasturcij, nō Cardamomi; præterea qd Cardamomum odorem tenet, Cinnamomum autem suauis odoris laudatur.

DE PSEUDOCINNAMO. CAP. XV.

Est etiānum genus aliud, cui Pseudocīnamo cognomen est. Inualidi odoris, solutarūq; uirium. Vocatur etiā Zingiber, cū tñ sit Xilocīnamomū, præbens quandā Cīnamomi faciem. Est aut lignosū Cīnamomum, sarmenta longa robustaq; ferens, odore longe Cīnamomo inferiori. Sunt qui Xylocinnamomū, à Cīnamomo differre dicant, qd a natura eius abhorreat. Cīnamomum omne excalfacit, emollit, et cōcoquit. Vrinā ciet. Tam menses q; partus potū, aut ex Myrrha impositū pellit. Contra bestias quæ uirus eiāculantur, uenenasq; cōuenit. Caliginē, pupilis oculorū obuerfantē, discutit. Crassiciem extenuat. Lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitū detergit. Contra tussēs, defluxiones, aquā subtercutē fusā, renū uitia, & urinæ difficultatē efficax est. Vnguentis preciosis inseri solet: & in sumā, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbræq; siccātū, quo diutius eduret, reconditur. Est & quoddam Cīnamomum, quod aliqui Pseudocīnamomon appellant, perq; denso atque crasso sarmento, longe tamen inualidius Cinnamomo et odore et gustu.

BARBARI COROLL.

Ipsum lignum in fastidio est, propter Origani acrimoniā. Xylocīnamomum uocatur. Preciū in libras. 20. Quidam Cīnamī (nam & Cīnamū dicitur) duo genera tradidere, candidius, nigricansq;. Et qñdam præferebatur candidū. Nunc contra, nigrum cōmēdatius, autore Plinio, atq; etiā uariū preferunt candido. Certissimo argumento, si sit scabrum, atq; ut inuicem triū cōtumaciter frietur et inhorrescat. Improbatur molle imprimis, aut cui albicat cortex. Ius eius

4-ενδοκίμα-
μομον
ζιγγίβερ
B

Ca Gebanitarū Rege solo p̄ficiscitur. Is edicto mercatu uēdit. Precia q̄ndā fuere in libras denario rum mille. Auctum id parte dimidia est, incēsis (ut ferunt) syluis ira barbarorum: aut etiam for te fortuna. quoniam austri tam ardētes ibi afflare solent, ut aestatibus syluas accendāt. Coronae ueteribus fiebant ex Cinnamomo interrasili auro inclusē. Radicem eius magni ponderis aureę paterā impositam uidisse, Plinius meminit, ex qua guttā editę, annis omnibus in grana dura bantur. Pseudocinnamomum, Galenus Cinnamomidem quoq; appellari scribit.

DE AMOMO. CAP. XVI.

Amomū

AMomū exigue fruticat, ex ligno se cōuoluēs in uuā modū, flore ceu cādidę Violā, paruo. Folijs Vitis albę similib. Laudatur q̄ maxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subruffo, ualde odo rato. Medicū, qm̄ in cāpestrib. et aquosis enascitur, infirmius esse cōstat. Est aut magnū, subuiride, tactu molli, frutice uenoso, odore Origani. Pō ticū uero subruffū, paruū, fragile, racemosū, fructū turgēs, et odore nares feriēs. Deligito recēs, cādidū, uel subrubrū. qđ nec astricū cohereat, nec cōuoluatur, sed solutū diffudatur, seminis plenū, uuis paruis simile, gra ue, odoratū, mō cariē nō cōtraherit, acre, gustu mordēs, simplici colore, nō euariāte. Vim habet calfaciēdi, astringēdi, exiccādi. Somnū allicit, et illiū frōti, doloris sensū aufert. Inflammatiōes & meliceridas cōcoqt, discu titq;. Inuat q̄s scorpis p̄cussit, ex Ocymo illitū. Et podagricis confert. In flamationes oculorū uiscerūq; lenit ex uua passa. Ad uuluarū uitia in pes sis, aut in seffionib, utile ē. Decoctū iocineri, renibus, podagrę potu cōue nit. Antidotis imiscetur, & p̄ciosissimis unguētis. Adulteratur herba A momo simili, quā Amomis uocatur, sed sine odore, sine fructū. Nascitur in Armenia, flore Origani. Quare in huiuscemodi p̄bationibus, fragmē ta fugiēda sūt. Eligenda aut quā ab una radice integros furculos emittūt.

Amomū p̄dicit

D

Amomū

BARB.
Plin. libro. 12.
capite. 13.
Theophrast.
Lib. 9. cap. 7.

AMomum quidā ex India, aliq; ex Media importari narrāt. E uite Indica, quę sit labrusca, ex istimatur nasci, frutice uenoso, palmi altitudine. Carpitur cū radice. Manipulatim leniter componitur. Protinus fragile laudatur. Punici mali folijs simile, nec rugosis, colore ruffo. Se cunda bonitas pallido. Herbaceum peius. Pessimūq; candidum; quod & uerustate uenit. Precium uuā in libras sicli. 70. friato uero Amomo. 48. Nascitur & in Armeniā parte, quę uo catur Ocene. Adulteratur mali granati folijs, & gumi ligdo, ut cohārescat uuę modo, conuo luatq; sese. Est & quę uocatur Amomis minus uenosa, atq; durior, ac minus odorata, quo ap parer aut aliud esse, aut colligi imaturū. Nec mirādū, siquādo Plinius a Dioscoride nostro dis sonat, qm̄ sicut p̄cia rerū, ita & notę, & experimēta quoq; uariātur. Neq; ulla medicīnę pars in certior, q̄ quę ab alio orbe q̄ nostro petitur, id qđ & ratio psuadet. Amomum q̄le nūc officinę p̄ferunt fabulosa specie, nec odoris argumēto, nec alia rōne cōgruit cū eo qđ hic describitur. Origani odore sentitur. In pluribus Origani, in melioribus aut Rutā legitur, Rutāq; anti quam lectionē fuisse ex iunioribus indicat Serapion: licet & de Origano in eo aliquid le gatur. Nos in parum diuerso odoris duarū plantarum sensu, cōmunem in grācis lectionē, & antiquam Dioscoridis interpretationem secuti, Origani odore sentiri diximus.

VERG.

VERG.

DE COSTO. CAP. XVII.

Costū

Precellit Arabicus, cādidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secūdū locū sibi uēdicat Indicus, leuis, plenus, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, et odo feriēs. Optimus ē recens, albus, abūde plenus, dēsus, a teredinib. nō erofus, sine graueolētia, gustu calidus ac mordēs. Vis ei excafactoria. Vrinā ciet. Menses pellit. Vitijs quę uuluā male hñt, tā impositū, q̄ fotu auxiliatur. Cōtra uiparū morsus

sextatē bibere pdest. Itē aduersus pectoris dolores, cōuulsa, inflatiōesq; ex uino & Absynthio. Venerē ex mulso stimulat. Latas uētris tineas ex aqua pellit. Rigētibus, ex oleo, ante febrīū significatiōes, & neruorū resoluōib. oblinitur. Vitiā cutis ī facie, cū aqua, uel melle illitus emēdat. Ad datur in anūdora & malagmata. Sūt q̄ amīstis Helenij Comageni p̄du ris radicibus, adulterēt. Q̄dprehēsu facile est. Siquidē neq; gustu fer uet Heleniū, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Costus, & Costū dicitur, & per diminutiōē a Strabone, Costariū. Huius radix ī precio. Fructus īutilis, Plinius Indicū dumtaxat uidetur nouisse Costū. Primo statim introi tu amnis Indi, ī Patale insula cōpertum. Duo eius genera faciens, nigrum, & quod melius eo iudicat, candidum, Preciū. 16. ī libras singulas.

Ex aqua et melle. Quē ī grēcis est, cōiunctio ἔ, nos mutauimus ī ρ, uertimusq; ex aqua & melle, nō ut aliq; uel p̄pterea, q̄ Mel molliēdi & extēdi uim per se etiam habet: sic ī uetustissimis etiā legitur, & ratio etiā nō repugnat. Asperā, & discolorē ceu a sole cutē. Id enim sic, græca habent, ἰσχυρὰ, ἰσχυρὸν em̄ illi solem, cōiunctaque prepositione, ἰσχυρὰ, quasi ī aduerbio sub sole sit, & ephildas, multo sole adustas, namq; origo & causa a sole fuit.

De ODORATO IUNCŌ. CAP. XVIII.

Odoratus Iuncus, ī Africa & Arabia nascitur. Laudatissimū ex Nabathea. Proximū Arabicus, quem aliqui Babylonīū cogno mināt, Alij Teuchitin. Pessimū ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manib; confrican do Rosæ odorem emittit. Igneq; mordacitatis ad linguā. Floris, & arundi num, radicisq; est usus. Vim urīnē ciundæ habet. Menses pellit. Discutit inflatiōes. Caput aggrauat. Modice astringit, cōminuit, excoquit, ac ue narum spiracula laxat. Vrinā mouet. Flos eius ī potu utilis sanguinē re ſcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum. Miscetur antidotis. Radix astringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, cō uulsis, cum pari pondere Piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uul uæ inflammationibus, ad defidentium foris, utile est.

Iuncū odoratū Schoenon græci uocāt, & Hippocrates Schoenō myreplicō, & Schoenō He dyosmō: & florē eius Schoenu anthos. Cornelius Celsus Iuncū rotūdū, ut ab angulari diffē rat, Cypero a græcis appellato. Rotūdū & ī Cāpania inueniri tradūt, utiq; minus pollutē. ī Arabia sane cū Calamo odorato nascit, cōuale quā dicemus, nihil aspectu differens a ceteris. Prouenit & ī Syria, Cœle cognomiata, Iuncū rotūdū uinosæ mordacitatis ad gustū sentiri perhibēt. Preciū ī libras, denarij qnq;. Noscendū uero Babylonīū, & Teuchitin a Dioscoride pro eodē genere intelligi: nō sic a ceteris, q̄ppe qui Teuchitin, eundēq; nobilissimū, qui e Naba thea sit, appellēt. Proximū Babylonīū. Pessimū ex Aphrica, ac sine odore. Dicit et Lētiscus ar bor siue frutex, a græcis Schinos, nō Schoenōs, ut quidam e pitioribus falso interpretati sunt. Vulgaris porro lūcus quo ad utilitū nexus utimur, itē rotūdus, & odoratus, nō Schinos, sed Schoenōs, unde, funes appellati. Recētiōres lūcum odoratū cū funario palustrisq; cōfundunt. Græci quanquā & palustrē & odoratū Schoenō uocāt. Quoties tamē de odorato intelligi uo lunt, Schoenū. i. Iuncū, absolute nomināt. Alterū uero genus Helis, hoc est, Palustris, adiectio ne discrimināt. Dicitur & Schoenōs mensura quædā sicut astarus, & parasanga barbarorū. Schoenon. Græci cōmuni aliorum Iuncorum uoce ρίον, diphthongo, ut a Lentisco arbo re differat, quam ρίον idem appellant. Priuatim tamen ī hoc tantū genere, seruata hæc uox ab illis est. Nam ceteros Iuncos additis cōmuni omniū nomini notis aliquibus, Oxychoe non, & Oloschoenon dixerunt. Præterea cū ceteros masculino genere plerumque dixē rint, hanc fœminino dixerunt. Nos, quia nō licēbat discriminē hoc uti, docentibus Plinio & Celsō, ī Iuncorū genere eum constituimus. Deinde, quoniam nō satis id erat, sed oportebat

A

BARB.

VERG.

χοίρος

τευχίτις

B

BARB.

Plin. libro. 12.

capite. 15.

Theoph. li. 4.

capi. 13. de na

tura Iuncorū.

& li. 9. cap. 7.

VERG.

b iij

C ab alijs ratione aliqua secerni, eodem Celfo authore rotundum diximus. Neque explentibus his etiam rem totam, odoratum adiecimus. Locus in eo authore est libro. 3. cap. 21. suntque eius hæc uerba. Iunci quadrati & rotundi semine. Illud Cyperum, hoc schoenon græci dicunt. Pauloq; post. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascitur, sed quæ inter aromata asseruntur significabo. Ex quibus ratio cinari facile est, q̃a Schoenõs a græcis uocetur Iuncus, q̃a tereu forma sit rotundũ, quia inter odorata numeretur, odoratũ dici oportere.

Capitis grauedines tamen facit. Variat hic antiquiores græci libri. Nam in aliquibus καρι-
καρινν, in aliquibus καρωτικὴν legitur, neq; sensu in scriptore hoc, neq; eodẽ in homine periculo. Siquidẽ prior illa uox, caput aggrauas, simpliciter significat, quod multa possunt, & inter cæ-
tera ebrietas: altera nõ dissimile lethargo somnum indicat. Inexpugnabilis enim somni plura genera sunt; inter ea & καρος est, a lethargo tãtum differens, quod in lethargo sequitur, in Caro somnus præcedit. Hunc Plinius semper soporem reddidit. Quæ autem uerior sit, & ex rema-
gis lectio, nõ satis pro cõperto nobis est.

Frangit præterea, maturat & aperit, μαλακτικὴν, quod mollire est, in pluribus legitur. Credit-
musq; adiecta forte eam uocẽ, quoniam maturet hic Iuncus. Quod etiam ἐρπητικὴν passiuẽ legi-
tur, i. frangere. Sunt in quibus legatur ἐρπητικὴν, i. uutrire. Sed parum nobis id probatur, ideoq;
Cum pari Piperis pondere. Videtur poderis huius mensura hic de- (nihil mutauimus,
esse, nisi forte æstimandam medicis eam reliquit.

Decocto eius præterea insidẽtibus. Antiquiores aliqui græci habebat ἀποέμα, quod deco-
ictum, alqui ἀποέρευμα, quod dilutũ authore Plinio significat. Est autem dilutum, aqua humor
ue aliquis, in quo maduerit quippiã. Nos quoniam maiore ui decoctum, q̃ dilutũ est, illud
seruauimus quod communius erat.

καλαμος
ἀρωματικός

DE CALAMO ODORATO. CAP. XIX.
Calamus odoratus in India nascitur. Melior est fuluus dense, geni-
culatus, & qui assulose frangitur, plena araneorũ fistula, albicãs,
lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus.

D Vrinam potu ciet, quare cum Graminis, aut Aprij semine coctus, in aque
subter cutem fusæ morbo, renũ uitij, stillicidio urinæ, ruptisq; cõmode
bibitur. Menses & potu & appositu pellit. Tussi suffitu medetur per se,
aut ex resina Terebinthina, hausto per arundinem fumo. Ad muliebres
inseffus decoquitur. Et clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagma-
tisq; odoris gratia, commiscetur.

Plin. lib. 12. ca-
pi. 22. & de a-
lijs generibus
Calamorum.
lib. 16. cap. 36.

B A R B A R I C O R O L L.
Calamus aromaticus, siue ut Hippocrates Myrepicos, id est, unguentarius & odoratus,
in Arabia nascens, cõmunis Indiæ, atq; Syriæ est. In qua uincit omnis a nostro mari stadijs, ut
Theophr. inquit. cl. Inter Libanũ montẽ, aliũq; ignobilem, nõ ut Strabo, & aliĩ quidã existima-
uere Antilibanũ, lacu Gennefaretide, ubi conuallis amplissima, et pulcherrima, quã Aulonem
cognominant, sed in cõualli modica prope stagnũ, palustribus per estatẽ siccatis. In eo tricenis
stadijs Iuncus & Calamus odorati gignũtur. Sed præstantior odore Calamus, statim e longin-
quo inuitat. Mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis. Araneũ eius, ut ait Plin. in fistula florẽ
appellant, magno Domitij errore in quadã Papinij poetæ syluula, non distinguẽtis harundinẽ
nem saccarũ fundentem, ab odorata. Calamo precii in libras denarij. 11. Reliqua probatio, ut
niger sit. Dãnantur aliubi. Nobilior, quo breuior & crassior, lentusq; in frangẽdo. Succũ eius
Elaterio similem excipiũt. Legi, & in Meotide odoratũ nasci Calamũ, radice subalbida, & sine
fistulis, plena intus, & amara, specie Acori. De quo & falsi quidã sunt, Acorũ eam putantes.
Quanto autẽ amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrũq; tamẽ genus Acorũ odore superat.
Teredinibus ut Acorũ incessitur. Omninoq; uicariũ pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Her-
culis columnis, prorsusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non
sunt plane, maxima tamen germanitate uisuntur, ut autores pleriq; tradunt.

EX M. VERG. COMM.

CALAMVS odoratus a Dioscoride appellatur. A Plutarcho in libello cui titulus est.
Quod bruta ratione utuntur, Arabicus dictus est; & quam hic natale solum illi Indiam
assignat,

assignat, ille Arabia. Quod & Theophr. indicat, et Plinius, qui in Arabia nasci eū confirmat. Comūem tū Indis esse, & Syria, nostra etate etiā adeo notū est, ut nō sit lōgius de eo agendū. Relinquimus pręterea qđ ad amaritudinē ptinebat, ppter ea, qđ in meliorib. ea uox nō legitur. Dubitauimus etiā, legendū ne esset, simul cū gramine, & Apī semine decoctū odoratū calā mū mederi. &c. an disīgi duo illa oporteret, cū gramine scilicet, aut Apī semine: ppter ea, qđ utriusque lectiōis certæ essent in antiquis Græcis uoces.

Dubitauimus itē, reddi ne oporteret, cū gramine, aut graminis semine. Neq; ab re. cū seminis uox illa utrūq; facile cōplecti, & ambobus cōpetere posset. Placuitq; nobis in similibus, & quæ easdē uires haberent disīunctione uti, relinquereq; utentibus alterutrius electionem. propterea, qđ in pluribus disīunctim ea legebantur, & si nō satis alterū utentibus esset in usu, geminanda, & cōiungenda medicis relinquere. Placuit etiā, gramē magis, qđ graminis semen reddere, propterea, qđ in decretis, & medicina graminis, hic ipse post docet decoctum eius, urīnæ an gustijs mederi.

Assulose frāgitur. Plinio, Viētruiūq; & plerisq; etiā alijs antiqua & honesta uox est: quæ primū significant, quæ marmorarij in cædendo marmore fragmēta dispellunt, & quæ in frangendis alijs rebus in longitudinē magis, qđ in latitudinē fragmenta disīciuntur. Et quoniā Calamus hic in frangēdo assulus huiusmodi ex se mittit, ideo a nobis sic redditus locus est. Id enī significant quos hic græce σινδλμοσ appellat.

Decoquitur fœminis ad insidendū. Nullum habetur certum muliebris mali genus, facile tamen est, ex curationis & remedij ratiōe muliebriū locorū affectionē aliquā intelligere. Iuniores dolores, eius partis reddiderūt. Nos quoniam nihil a Diosc. certum precipitur de ea re, medicis censendū relinquimus, nō omittentes tamen, uideri nobis ex hīs quæ alibi in similibus obseruauimus, menses, & quod ad menses pertineat magis ea uoce, qđ dolores significari.

De BALSAMO

CAP. XX

Balsamum, arbor albæ Violę, Lycij, aut Pyracāthæ magnitudine cōspicitur. Foliū Rutę proximū, longe cādidius, perpetuo uirēs, in Iudęa solū quadā ualle et Aegypto nascēs. Iis differēs modis, scabricia, pccritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, Theristū uocāt, quasi demessile. Fortassis, quoniā ob gracilitatē facile demetatur.

BARBARI COROLL.

Balsamo ali j Punicæ magnitudinem reddunt. Ramis frequentibus, semine Terebinthi, colore, amplitudine, figura: quod & odoratius quidam lachryma sua prædicant, Casamum, & Carbobalsamum uocantes.

EX M. VEGR. COMM.

Violæ, aut Lycij magnitudine crescit. Cum suspecta nobis fuisset hæc uox quæ est in græcis λινδιον, id est, Violæ, cuius magnitudine Balsamū cōspici Dioscorides hic ait, nihil tamē mutauimus. propterea, qđ in cunctis græcis, quos hætenus uidere licuit, integra et aperta uox illa inuenitur, nullaq; diuersę lectiōis, nec obsoleta quidē uestigia aliubi uidētur: cū tamē parū uerisimile sit, Dioscoridē arborē frutici plerūq; cubitali in magnitudine exquasse. Et quā Plinius Viti, Theophrastus uero Punicæ similē dixerūt, Violæ cōparasse. Nō dico autē Violā florē, sed eius plantā, quæ ramosa, pendētibus ex uno pediculo pluribus aliqñ, & diuersi coloris floribus, in Italia cubitalis, pauloue altior floret. Nisi, forte cœli terręq; bñficio speciosior Viola alibi nascitur. & arborefcit. Sed parū id uerisimile est, nec sine ueterū autoritate credēdū. Caret ratiōe etiā, ad similitudinē tertij alicuius generis, duo alia inæqualia cōiunxisse, dicereq; Balsami arborē Violæ, aut Lycij magnitudine uideri. Siquidē Lyciū, siue Pyxacantham, i. buxēā spinā dicere eandē malis tricubitali altitudine hic paulo post esse dicit, quæ in nullis Violis mensura hætenus uisa, aut audita est. Ex his, quoniā nec Theophrasto, nec Plinio, nec sibip̄ cōueniret hoc loco Dioscorides, suspicati sumus subesse uicium. Quale autē id sit, & quomodo instaurandū, nō ausim ego adserere: qm̄ nulla sit uitis, aut Punice cū Viola in græcis appellatiōibus similitudo, nullq; cōcurrāt eedē literę, aut syllabę, ex quibus licuisset sequaci cōiectura uerę lectiōis uestigia odorari. Non tatebimus tamē, quod hoc ipso momento scribētibus in mentē uenit, potuisse ab imperitis librarijs & herbarijs locū misceri. Quodq; unū, ac simplex erat λινδιον, i. geminari, & qm̄ notior Viola qđ Lyciū sit, cū Lycio Leucoion etiā scribi, quę tota Lycij similitudinis ad Balsamū in magnitudine relatiō legitima est, & aliorū hystorię respōdet.

A

B

βάλσαμον
πυρακάνθη

θεριστόν

Theophr. lib.
9. cap. 6.
Plinius lib. 12.
cap. 27.

C Quod Pixacautha, id est, buxea spina dicitur. Non dixissem ego hoc loco, πικραυθα, id est, buxam spinam, non πικραυθα, quæ nulla in plantis est, legendum in Dioscoride esse, nisi interpretes alij uoces magis quæ res secuti, numerum illic plantarum auxissent Viola, aut Lycij, aut Pyracanthæ, &c. tria quæ, duo alioqui erant connumerantes. Lycium siquidem & Pyracantha idem sunt, si huic ipsi cum de Lycio agit credendum est. Quæ enim inter Lycium & Pyracantham distincta legitur particula, appellationes Lycij alterat, non disiungit, & numerat plantas.

De OPOBALSAMO. CAP. XXI.

ὀποβάλσαμον

A Estiuus sub ortu canis ardoribus, arboris unguibus ferre inciditur, manatque e plaga succus, quem Opobalsamum uocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quam seni, septeniue congi cogantur. Inibi quoque podus duplo repeditur argento. Succus probatio est, ut sit recens, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, pellucidus, leuis, astringens, ac modice mordens gustu. Sed uarie uitiatur, misto ab alijs quibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani unguento. Item Susino, Metopio, Melle, aut cypria Cara. Quod maleficium facile deprehenditur. Namque merus in lancem ueste fusus, neque maculam facit, neque si eluatur nota relinquit. Vitiatus autem inhæret, & ut lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua, aut lacte celerrime liquatur, lactescitque: uitiatus uero olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus, senescens crassescit, deteriorque redditur. Allucinaturque aqua concretum pessum ire, ad ima sidere arbitrantur, postea dissipatum supnat. D

C **B A R B A R I C O R O L L.**
Editur sub canem, parte qua maxime uideatur esse pregnas, & caudice, & cacumine. Sudor e plaga manat æstate tota. Sarmæta quoque eius & surculi odore præstare, amputantur, & ueniunt magno, alioquin grandesceret arbuscula, nisi succideretur. Balsamum Syluestre, Theophrastus reperiri nullo, testis est. Omnibus odoribus Balsamum præfertur: quodam in duobus tantum hortis, utroque regio, altero iugum, xx. altero pauciorum. Hiericunta nominant, quamquam & Palmietis constitit, tanto quaestui, ut Iudæis opes ex Opobalsami uectigalibus creuissent, Troguus pdat. Is humili Picæ, quidam Cyaso Terebinthoque, ut Strabo, quidam Myrto simile dixerunt. Sed Viti similior esse, Plinio constat. Maleolis feri cepta, impletque colles, uinearum modo, quæ pedata non sunt. Tonderetur, nitescitque rastris. Intra tertium annum a satum fructifera. Folium Tuberis (id genus mali est) a Plinio reddi putant. Sed mendosum in eo locum esse arbitror. Nec tuberis scribendum, sed Rutæ, nam & exemplaria sunt, in quibus ita legitur, folium proximum rubet, corrupte, ut pleraque alia, pro Rutæ. Alioquin Theophrastus, & Dioscorides Rutæ folio, sed exalbido Balsamum describunt. Pausanias nunc Myrto, nunc Sampsuco, a quo non per b, sed per p, Balsamum pronunciat. Id ipse in Arabia gigni scribit, arbore uiperis obfessa, quarum morsu nemo extinguitur: quoniam succo eo pastæ, noxiu uirus habere desinunt. Ab Hierosolymis captis ferere fiscus Balsamum coepit. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera. Capillaceum, Theristo uocant. Alterum scabrum, incuru, fruticosum, odoratius, Ostraco. Tertium Eumeces: quia procerius leui cortice. Huic secunda bonitas. Nouissima Theristo. Semen eius est uino proximè gustu, colore ruffo, nec sine pingui, peius in grano, quod leuius, atque uiridius. Ramus crassior Myrto. Incidebatur ante ferreis unguibus, sed quoniam ferro uitalia lederetur, transiit usus ad uitrum, & lapides, ossesue cultellos. Inciditis manus artifice librameto temperatur, ne quid ultra corticem desquamet lacessatue. Succus lanis parua colligitur in cornua, ex his nouo fictili conditur, crassiori similis oleo, & in musto cadidus. Rubescit deinde, simulque durefcit traslucidus. Sub Alexan. & Theophr. temporibus toto die estiuo unam concham impleri iustum erat: omni uero foecunditate maiore hortu semicongios bisenos, e minore binos. At Plinius æuo etiam singularum arborum largior erat uena. Ter omnibus pcutitur æstatibus. Postea deputatur. Amputatio ipsa & surculus. 800. uenit. Intra quantum demum annum, corticis ad medicamentum pretium est etiam ante quam ligni. Ex hoc buxosum est optimum, quod est odoratissimum. Ex semine autem maximu, & poderosissimu, mordens gustu, feruens que in ore. Lachryma debet esse pinguis & tenuis modice ruffa, & in fricatione odorata cum austero. Secundus

ro. Secundus cadide color, Peior uiridis, crassusq. Pessimus niger, qppe ut oleū senescit. Ex oī incisura maxime pbatur, qd ante semel fluxit. Vitiatur semie suo, ut uix possit dephēdi fraus. Itē & oleo Rosē, Myrti, Resina, Galbano, neglīme gūmī: quonīā ipsū quoq; inarescit manu inuerfa, & in aqua fider ut Balsamū. Quod Cera & Resina pmutatū est, in carbone nigriori flāma detegitur. Nam mentitum melle, contrahit muscas. Metopio adulteratum, in aqua circulo candido cingitur. Nec aliubi Seplasiā maior improbitas, quippe sextarius, qui mille denarijs uendente fisco emebatur, mox, 300. tantum denarijs constabat.

EX M. VERG. COMM.

Secta ferreis unguibus, &c. Credimus nos unguēs ferreos a ueteribus Græcis Ferramenta dicta fuisse, quæ humani unguis figura cōuexa acie essent; qualia quondā in fabrica uidentur adhuc multa, quæ dimidiato orbe lunata ab eius partis similitudine, nomen inuenisse potuerunt. Sed quid, quod Plinius ferri adhibitionem omnino damnavit, in Balsamo colligendo? Rependitur, quo loco nascitur, duplo ad pondus eius argento. Ideo scilicet, quod nullū in eo adulterium committitur, id quod in alijs gūmīs, oleis, & unguētīs fit. Author Theophr. lib. 9. qui inter cætera testatur, uendi purum & sine admixtione aliqua, duplo ad pondus eius argento. Quod monuisse legētes placuit, ne cui frigidum id & sine ratione dictum uideretur. Idq; etiam Plinius significasse uidetur.

Qui citissime penetret. In Græcis habetur *ὑδαρτος*, quam uocem nouissimus interpres, pelucidam interpretatus est, ex Plinio ut uidetur eam auguratus, qui Balsami lachrymam, inter cætera dixit translucidam esse. Antiquus Dioscoridis interpres, serenam, nulla, ut nobis uidetur, in Balsami notis significatione. Serapion, uelocis resolutionis, quasi *ὑδαρτος* tunc legere tur. Nobis in eadem Græcorum lectione, nihil mutare placuit, sed bona fide, nec absurdo sensu reddere ut legitur, qui citissime penetret. quando græcis uerbū notissimum est *διειρύν*, quo *διειρύνει* xps *διανύειν*, ab altero extremo p mediū aliqd ad alterū transire, & absolui, moueriue aliquid significet, quod tenuitate sua potest Balsami liquor, qui a Plinio etiā tenuis laudatur. Lactis modo albescit, *γαλακτοῦται* uertimus, lactis modo albescit, ne si lactescit simpliciter dixissemus, incertum legentibus esset, quæ nam ex tam multis lactis qualitatibus, sapore, s. candore, substantia, liquore, & hoc aut fluido, aut coagulato intelligenda esset. candorq; elegimus: quoniam lac omne, semper, et in cunctis animantibus candido colore sit, deeatq; & tutius sit, ex eo magis, quod inseparabile, præcipuū, necessariū, & sine quo nullū id erit, qd ex cunctis alijs ostendi & indicari aliquid. Sic enim lacti candor competit, & inest, ut terræ pondor & cessatio. Nec est qd credat aliquis, posse eo uerbo significari fluidū lactis liquorē, debuissetq; a nobis reddi, lactis mō liquefcit: qm id etiā indicarat Dioscorides, celerrime disijungi, disijciq;.

De XYLOBALSAMO. CAP. XXII

Eligni genere, quod Xylobalsamum uocāt, probatur recēs, tenue, fuluū, odoratum, quadam tenuis Opobalsamum spirās. Necessarius etiam seminis erumpit usus. Quare eligatur flauum, plenū, grande, pōderosum, mordens gustu, feruens in ore, modice Opobalsamum olens. Adulteratur semine Hyperico simili, quod a Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirū ignauia, sapore Piperis. Efficacissima uis inest succo, & qd maxime calfaciens. Abstergit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. Medetur perfrictionibus uulua, cum rosaceo cærato appositus. Menses quoq; secundas, & partus extrahit. Rigores illitu discutit. Vlcerā sordida expurgat, & cruda concoquit. Vrinam potui ciet. Aegre spirantibus prodest. Datur in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium ictus. Miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua autoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commode potui datur doloribus lateris, pulmonum uitijs, tussi, ischiadicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinae difficultati, torminibus, ac serpentum morfibz. Ad muliebres fusa

ξύλοβ ελίβαμ

C fitus perquam utile est. Vuluam aperit in deflectionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum easdem habet vires, aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, uulsis, uenenatorum ictibus opitulatur. Vrinam cit. Ad capitis uulnera cum sicca Iri conuenit. Squamas ossium extrahit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

X B A R B A R I C O R O L L.

Xylobalsamo precium in libras sex. Romæ in triumpho Impatoris Vespasiani arbusculam ostendere. Plurimum in Aegypto nasci perhibent, regione quæ nunc Solis oculus, siue fons dicitur, quondam Heliopolis. Incidi autumnus ad liquorem, qui & oleum Balsaminum uocatur. Strabo et in Syria Coele nasci prodidit, ualle illa fertili quæ Libanum & Antilibanum interiacet iuxta lacum Gennesaritin. In Arabia quoque Sabæorum tractu maritimo. Admonendi sumus, Dioscoridem in huius mentionis calce dicere, Xylobalsami decoctum cum Iride sicca mederi capitis uulneribus. ἀνὰ γὰρ δὲ καὶ λεπιδας, nos squamas detrahere conuertimus, ut uel porriginem intelligas. Est enim porrigo, ut Celsus ait, ubi inter pilos quadam quasi squamula surgit ea, quæ a cute resoluuntur, modo sine ulcere, modo exulcerato loco. Vel quemadmodum recentiores, de squamis fractorum ossium. Sed & caruncula quæ inter uiuam & emortuam ossis ad usum partem subit expletura quod abscessit, quasi testa tenuis & angusta, ut idem Cornelius testatur, squama, id est, lepis, a Græcis appellata est. Liberum estimaturis esto.

De ASPALATHO. CAP. XXIII.

Aspalathus, quem alij Erysisceptron, alij Phasganon, Syri Diaxy lon uocant, frutex est surculosus, multis spinis horrens. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur. Optimus est grauis, detractio cortice rubens, aut in purpuram uergens, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum astrictione obtinet. Unde decoctum cum uino ad oris ulcera coluenda conuenit. Ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur. Subiectum in pecto partum extrahit. Aluum sistit eius decoctum. Et sanguinis reiectionem potu cohibet. Vrinæ difficultatem inflationesque discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Aspalathus in Aegypto quoque nascitur. spina syluestris, magnitudine arboris modica, candida flore rosæ: cuius radix unguentis expetitur. Idem frutex humilior in Syria, & Nisyro, Rhodiorumque insulis prouenit: quam alij Sceptum Elisei, alij Adipsatheon, alij Diplacon, alij Diacheron, ut Plinius, uel Diaxyton, ut Dioscorides, uocant. Nascitur & pluribus locis, sed non perinde odoratus. Tradunt in quocunque frutice, sed in Aspalatho amplius, celesti arcu in cum innixio suauitatem odoris inenarrabilem fieri. Laudatur colore ruffo, uel igneo, et odore Castorei. Permutatur in libras quindecim. Sane per Hispanias multi & ad odores, & inter unguenta utuntur spina, quam uocant Aspalathum. Sed ea uulgaris est, ex qua fulloniarum implentur urnæ. Radicisq; usus tantum habetur: nec dum comperi, sit idem uulgaris spina, & topiaria, de qua in Acantho diximus. Radicem nigram Hippocrates cum uocat, radicem Galeo significat Aspalathi, crisæo Phocidis agro commendatissimam.

E X M. V E R G. C O M M.

Aspalathon. Admodum procliuus est hic lapsus in Asphaltum. quod monemus propter indiligentes librarios. Asphaltum bitumen est, Aspalathon inter odoratos fructes, & spinas censetur.

Sunt qui Phasganon appellant & Sphagnon. Quorum prior dictio Gladium indicat, altera autem ab iugulando, quod ῥάπτειν greci dicunt, potuisse fieri uidetur. Credimusque nos sic dictum Aspalathum ab aliquibus, quod aculeatus frutex gladii modo aculeis suis pungat et quoleret. Quod in Theocriti bucolicis pastor, a spina in pede percussus, ab alio monebatur, ne discalcarius per montem ingrederetur, qui Rhamnis & Aspalathis fronderet.

ἀσπάλθος
ἔρυσισκεπτρον
σφάγνον
φάσγανον
διδάκλον

Theophr. lib. 9.
cap. 7.
Pli. li. 12. c. 24.

Syri, Dyaxilon. Eadem dicendi forma, qua nos in Plinio eius florē Diaporphyron dici monuimus. Neq; hoc loco Diaxylo aliud significat, q̄ mediolignū, ex eo, q̄ ligno flor est frutex. Et contra narium ozenas, Ozenas nos adiecimus, quoniā & Plinius ita legit. Sanatoris ulcera, & ozenas, ut in pluribus græcorum adhuc legitur.

B De MUSCO. CAP. XXIII
 Ryon, id est, Muscus, a quibusdam Splachnon appellatur. In Cedro arbore, Populo alba, & Quercu inuenitur. Optimū est Cedrinum. Proximum Populneum. In quo genere cādidum & odoratius præstat, nigricans improbat, Astringendi uim habet. Decoctum insistentium uuluis utile. Unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur. Thymiamatum, acoporumq; compositionibus cōueniens.

B ARBARI COROLL.
 Ryon, hoc est, Muscus, uerbum ex uerbo. Dicitur & Ipnon. In Cyrenaica prouincia maxime probatur. Secundum locum obtinet Cyprium, ab eo Phoenicium. Fertur & in Aegypto nasci, quin & in Gallia: nec dubitatur. Sunt & hoc nomine panni arētes muscoso uillo, quales e glādiseris sola fere, quæ uocatur Aegylops, fert, non in cortice modo, uerū e ramis dependētes cubitali magnitudine, sed odore præstantes. Candidissimis, atq; altissimis prima dignatio, proxima rutilis, nulla nigrantibus, & in insulis petriscq; nati damnatur, omnesq; quibus Palmarū, atq; non suus odor est. Ex Bryo & balanino oleo expeditissimū, primūq; unguētum fuisse ueteribus tradunt. Differentia hæc: q̄ Bryon aliarū arborum cani quidam sunt, ut dixi, Bryon uero Populi candidæ uua circa Cnidum optima, aut Cariam, insistentibus, asperisq;. Secundā in Lycia Cedro pertinentem ad unguentum prædicat, Paulus & in Picea uel Larice Bryon nasci prodidit a Galeno priore scriptum. Est & Bryon θαλάσιον, hoc est, marinū, ut suo dicitur loco. Muscus, preciosissimum odoris genus est, & quod Muscus uulgo nominatur ab Aetio, itēq; Paulo, sed & a Phocione grāmatico. Recentior Moschus odoratus capræ, seu quod idem est, dorcadis peregrinæ sanies ē ex umbilico eius, aut uomica. Gazellā uocant animal id barbari, ut uerba Hieronymi ad Demetriadem, hoc nōnullis significant. Muscus inquit, & Oenāthe ex peregrini mavis pellicula. Sed Muscus Hieronymo aliud non est q̄ Bryon, de quo hic agitur. Nam & Plinius eadem fere mentione de Bryo & Oenāthe disputat. Quis aut sit peregrinus mus, odorata celebratus pellicula, non uideo, nisi quis animal hoc intelligat, ex quo Zibettū, siue ut recentiores græci uocant Zapetion excipitur: quanquam & compositionis quoddā genus est Zapetion ex animalis Musco, Agalochō, & orientali succino. Hæc ipsa cōpositio etiā Neruocari solet a græcis quibusdā. Sed uox est Arabica. Inuenio & Muscilion dici quandam herbam, ab odore Musci, ut conijcio, quam & Dorcida uocant, naribus uitiosis & foerentibus accommodat: ut Aetius existimat, nisi quis pro Dictāno accipiat, qd̄ & Dorcidiū appellat.

E X M. VEGR. COMM.
 Splachnon. Ex qua ratione, nullam nobis habet manifestam rationē. Siquidem græci. ωλδχον, quæ latinis exta sunt, appellauerūt, nec ē q̄ animatiū extis: & Musco arborum cōueniat. Cedro. Illud animaduertēdum, quas hic Cedros dicit, Aeginetā Pinos dicere, sed uiciū subesse credimus, quoniam statim Dioscoridi subscribens, omnibus alijs cedrinum Muscum, & ipse antefert.

Populo alba. Non uidetur & uicio carere. Cedri tantum meminit, & albę Populi, desydera tur enim Quercus. Nisi legētib; damnatam uoluerit esse, quam tacitus arborem præterisset. Habet adstringendi uim. Ne hic etiam conuenit Dioscorides cum Paulo, quoniam hic adstringere, ille discutere, & medio critere mollire dixit. paruo, ut uidetur, discrimine: quod peritioribus censendum relinquimus.

A De AGALLOCHO. CAP. XXV
 Gallochum, lignum est, quod ex India atq; Arabia deportatur, Thuia ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cū quadam amaritudine. Cute uestitur aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, cōmendandi halitus gratia. Sudores arcet to

A

Bryon

ωλδχον

Plin. lib. 12.
capite. 23.

B

αγαλλοχον

Thuia

Cto corpori insparsum. Pro Thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmę unius pondere, humida stomachi uitia, et imbecillitatē, feruoreq; mulcet. Si lateris, iocinerisue dolor ex cruciat, si dysenteria, aut tormina infestat, ex aqua bibere pdest.

BARB.

A Galochon Aetius & medicorum uulgus Xylaloen idest, lignum Aloes appellat: a non nulla similitudine coloris Aloes, ut arbitror. Nō animadueto ubi de hoc genere loquitur Galenus. Recentiores græci tradūt sub terra condi solitū Agalochon, nō alias odoratū futurum, q̄ ubi teredinibus computruit. Fastigia eius summa quatuor. Indicū, Sapphicum, ex urbe Sappho. Speon, & Hygron, idest, humidum, quod ipsum deinde in species quatuor conciditur. Arabes nonnulli semen huius arboris esse uolunt, id quod Haormiam ipsi uocat, similitudine Piperis minuti, colore subrubēs, quapropter & Piperellam dixere. Agalochon Aetius in thymiamate myrsipico idē esse, quod & Tarum putat. De Taro Plinius. Ex Casia inquit, et Cinnami cōfinio Cancamum, & Tarum inuehitur per Nabatheos, Troglodytasq; n̄s uicinos.

VERG.

Quod, scribente & commentante hæc Dioscoride, barbara appellatione Agalochon dicebatur, secuta Græcorum ætas Xylaloem, facta ab amaritudine nomine, quasi Aloes lignum appellauit. Tradideruntq; id posteriores Græci, quibus quantum credendū sit, ex huius scriptoris historia & notis facile erit nouisse. Paulus Aegineta, nihil non idē, Dioscoridi de eo tradit, etiā usq; ad uerbum: in hoc uno tantū diuersus, quod non *πλευρᾷ πόνει*, ut Dioscorides, lateris doloribus, uerum *πλευρῆτι*, idest, laterali dolori opitulari eam ait, quæ quantum differant, alibi diximus.

Thyis ligno simile. Quæ sit hæc arbor, non facile nobis fuit cōiungere, Theophrastus eam libro primo, inter siluestres arbores, quæ perpetuō frondent, numerauit, nec Cupressō dissimilem alibi descripsit. Credideruntq; aliqui, eam esse, quam Homerus quinta Odissæ rhapsodia, a Circe ad odorē sumi & lucē incendi dixit. Et quā Plin. lib. 13. Trogerem, ab alijs uocari ait. Licet non n̄s idem literis in Homero, & Theophrasto utraq; scribatur, liceatq; ob id, non esse in utroq; eundem suspicari. Variantq; antiquiores græci etiā hoc loco. Suntq; in quibus non Thyiæ, sed Sorbo simile Agolochō legatur: quod more nostro, ne quid, f. relinquitur, dictis hætenus a nobis adiicitur.

De Narcaphtho. CAP. XXVI.

D

*νάρκαφθον
νάρκαφθον*

Narcaphthum ex India deferitur, corticosum, simile Sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Constrictionibus uulua suffitu prodest.

BARBARI COROLL.

Nascaphthon prætermisum a Plinio arbitror consulto, q̄ incerta esset natura eius, ut aliorū quoq; plurimū: quæ ille orbi nostro tantū nominib. cognita esse tradit, ut sericatū, gabaliumq;. Paulus & Lacapsithō nominat, inter ea, quæ a quibsdā in Cyphi heliacū addūtur: et corticē Piceæ, uel alterius arboris existimat. Ego Lacaphthon idē esse cū Nascaphtho ratus sum.

EX M. VERG. COMM.

In antiquissimo quodam codice sublatū erat hoc caput, nec deprehendi aliquod eius uestigium potuit, sed ne Plinius quoq; meminit: quod equidem sciam non leui suspitione, nisi Paulus id confirmaret, qui habet fere omnia, quæ hic dicuntur.

Quod torminibus subuenit. Variant ab impresso duobus locis hoc capite antiquiores græci. In aliquibus enim legitur, *ὑποφθμίνον ἀρκύον*, idest, quod torminibus subuenit, nullo eius remedi antiqui alicuius scriptoris testimonio. Siquidem nec Paulus Aegineta in Narcaphtho meminit, neq; antiqua Dioscoridis translatio, ideo nos id negleximus.

Astrictis foeminarum locis. Sūt in quibus *μύτραν ἐνὶ ωμίνην*, & in quibus *ἐνὶ γυναικὶν* legatur: significatq; altera uox, quod angustum præclusumq; sit, altera quod astrictū, nec humores remittens: qualia sunt nulla uitio curta, aut rimosa fictilia, primumq; illud angustiarū & præclusionis uitium, quod græci *φίμω* dicunt, in ostio muliebrium locorum, ex præcedente exulceratione, aut durata illic inflammatione fit. Alterū ad suppressos menses, et elus partis fluoresp̄inet. Nos in ambiguo id maluimus, qd̄ ab antiquo medicine, autore Pau. Aegineta cōfirmabatur.

De Cancamo. CAP. XXVII.

*κάνκαμον
ἐνὶ γυναικὶν*

Cancamum Arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodammodo similis, olidi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes

eo ex Styrace & Myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum ponderc ex aqua, aut mulso aceto, aliquot dies ebibatur. Lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis. Menses cum aqua mulsa pellit. Oculorum cicatrices confestim emendat. Vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. Aduersus gingiuas humore pregnanteis, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

BARBARI COROLL.

Cancamum ex collimitio Casiae, Cinnamigi per Nabathæos, Troglodytasq; confines ad uehitur. Qui confedere ex Nabathæis, non in solo compertum Plinio. Nec sum nescius Laccam a barbaris hoc genus uocari aliam, q; quæ de Purpurarum floccis conficitur tinctoribus. Est & gummi quoddam arboris Lacca dictum, & tinctoris utile. Nec an ea Cancamum sit hoc de quo agitur, satis habeo compertum. Democritus certe, si modo eius liber est qui de tingenda Purpura circumfertur, Lacchan nominat inter colores hoc, et florem Achaicum appellat: idē autor, sicut florē Syriacū, quod Rhiziō priuatim uocari tradit ad eundē usū. Sit autē flos Achaicus, aut Syriacus id quod nos modo Cremes dicimus, an diuersum, nō cōstat. Paulus odoratum esse Cancamum prodidit. Differt Cancamum a Cancano, q; Cancanus herba est a Galeno dicta, a Dioscoride Calalia. Nam Caualis alia est, ut post dicitur. In quo fœdissime neoterici diffliuant. Græci lignum quoq; aridum Cancanon appellant.

EX M. VERG. COMM.

Laxandi uices ultra odoris usum Cancamo Aegineta tribuit. Nec relinquit etiam, quod hic ait, potu eius ad gracilitatem obesos contrahi.

Cicatrice oculorum exierit. Cicatricem uocat Galenus, cum in nigra oculi parte ex profunda ulceratione crassior oculo membrana superuenit, & candido colore conspicitur.

DE CYPHI. CAP. XXVIII.

CYphi, thymiamatis compositio est, dicata Dijs, qua abūde AEgyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet. Suspriosis datur in potu. Permultæ cōponendi rationes, quarū una hæc est. Sumitur Cyperi dimidiū sextariū, cū pari Iuniperi adultæ modo. Vuæ passæ pinzguis, exemptis uinaceis, minas duodecim. Resinæ repurgatæ minas quin q; Calami, & Iunci odoratorum, & Aspalathi, singulorum minam. Myrrhæ duodecim. Vini ueteris sextarios nouem, cum duabus Mellis minis. Vuā detractis uinaceis tufam, cū uino & Myrrha subigito. cætera tufa & cribrata adijcito. die uno humorem conbibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis asciscat crassitudinem. eliquatam Resinam accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

BARBARI COROLL.

CYphi urebantur uestiginis omnibus AEgyptij, Matutinis Resina, Meridianis myrrha. Ea erat miscella, ut Plutarchus inquit, sexdecim literis sacris contenta, ex melle, uino, uua passa, cypero, resina, sefeli, aspalatho, myrrha, bitumine, iunco, bryo, calamo, utroq; iunipero, cardamomo, lapatho. Quamquam Lacaphtho forte, non Lapatho scribendum sit in Plutarcho, ut ex ijs quæ in Nascaphtho diximus comprehendi potest. Confundebantur hæc non temere, aut fortuito, sed præuentibus de scripto, qui rationem & ordinem præcinerent, quo quicq; loco, tempore, mensura, cōficiendū esset. Placuit uero numerus sexdecim, q; is e quadrato quadratus existeret. Talis. n. linea circumcurrens per oras, æqualem cum area sua mensum habet. De quo latius in libello dictū est, quem ex antiquis autoribus de Iside & Osiride condidimus. Sunt & aliæ thymiamatis huius, & pro arbitrio cuiusq; rationes, sed duæ in medicina cognomentis insignibus, Heliæon & Seleniacum, hoc est, solarium & lunare.

EX M. VERG. COMM.

ERant Cypheos huius confectioes uariæ, quod hic a principio statim testatur. Videturq;

Plin. libro. 12.
capite. 20.

1599

B

*

*

c 4

C hoc loco ea describi, quæ in frequentiori medicinæ usu, forte & notior omnibus erat. Nā quæ a Plutarcho describitur, amplior est. Hæc decem, illa sexdecim rebus constar, ad explendum quadratum numerum. Non tacendum etiam hoc loco, quod suspicati sæpe sumus, non esse Dioscoridis legitimum hoc caput, quod in antiquissimo omnium mihi & probatissimo codice non legitur, nec eius meminerit Paulus Aegineta, cum medicam omnem materiam lib. 6. p. curreret, quod agendum nō erat hominī, qui in curandis morbis, usus eo sēpenumero fuisset. Quodque in eam suspicionem nos magis traxit, illud est: quod parum uerisimile est, simplicem medicam materiam docentē hominem, compositam illi miscuisse. Nec est quod miretur aliquis, in græcorum scriptorum codicibus, tam multas & tam graues labe. Quo em̄ malo facto latina res iam pridē perijt, eodē & Græca collabefactata est, et qđ adhiēdi cōtinue antiquorū decretis aliqd, uiciū nunc oēs tenet, idē antiquores tenuit: dū uolumus oēs aut sapientiores uideri, aut ocio consulentes, parata & exposita eodē loco omnia habere. Suspectio tñ, non decretum hoc sit. Neq̄ enim nos rem damnamus, nec legētibz inutile fuerit, tā multa de Aegyp̄tiorum Sacerdotum & medicorum Cyphi narrata a nobis, & ex antiquitate repetita fuisse.

DE CROCO. CAP. XXIX.

C Rocum ab aliquibus Castor, ab alijs Cynomorphos, a magis Herculis sãguis appellatur. Optimū in medēdi usu Corycēū, recēs, et boni coloris, paulū cādidi gerēs in capreolo, oblōgū, oibus suis partibus cōstās, nō fragile, plenū, a quo detractū ē nihil, qđ madefactas manus inficit, nec sitū redolet, aut cariē senuit, subacre. Sin huius generis nō ē, aut uetus, aut humore p̄fusus creditur. Secūdus locus datur Coryceo, e tractu Lyciē cōtermio. Tertius Lycio, e mōte Olympo. Dein ex Aegibus Aetoliē. Cyrenaicū e Centoria, inter sicilica oīa uiribus p̄stat. Omnīū ad obsonia usus. Itali tñ ob succi copiā, et coloris uenustatē, ad Thuiē infectus uisurparūt. qbus de causis magno uēditur. Vtilissimū in medicina qđ ante descripsimus, Adulteratur imisto Crocomagmate tuso, atq̄ etiā Sapē sublitu cōtrita, q̄ pōdus adhiēciatur, simul argēti spuma, aut Plumbagine. Sed maleficū declarat insidēs puluis, p̄feru si Sapā oleat. Thessalus ipm̄ tñ odoratū esse uoluit. Alij exitiosū, trib. drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquēdi, emolliēdi, atq̄ substringēdi habet. Vrinā cit. Elegātē colorē p̄stat. Qui ex Passō biberint, crapulā nō sētiēt. Oculorū fluxiōes, illitū cū humano lacte, cohibet. Additur in potiōes, quę interaneorū causas tempantur. Ad uulū etiā, sedisq̄ cataplasinata cōmode pmiscetur. Venerē stimulat. Vergentes ad ignem sacrum inflāmationes mulcet. Auricularijs collectionibus utile. Quo facilius conteratur, in calido fictili sole siccarī oportet, celeriterq̄ uersari. Vrinam mouet radix ex Passō pota.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 21.
capite. 6.

C Rocum folio angusto, adusq̄ capillamenti exilitatem, germine ac flore serotino, per autumnum occasu uergiliarum: qui paucissimis diebus marcescat. Cum folio florē expellit obiter, quin & prius uidetur. Subest radix multa, carnosa, perucax. Calcatum melius surgit, & quasi pereundo lætius prouenit: semitas eo fontesq̄ amat. Seritur radix Bulbo. Duo genera eius, montanum, & satiuū. Prius hebes, posterius odoratū, utrunq̄ primis imbribus. Emicat autumno, ut dixi, post Aphacen. Inodori duo genera, candidum, ac spinosum. Viret bruma, & colligitur, siccatq̄ in sole. Sed in umbra melius est Hyberna. Crocū syluestre optimū. Sere re in Italia nō expedit, ad scrupula usq̄ singula areis decoquentibus. Satiū maius, nitidiusq̄, sed leui momēto degenerat. Omnino infecundū natura ubiq̄, uel Cyrenis, ubi laudatissima oīa. Quidā Phlegreō Croco scđm locū adsciscūt, Probatio, synceri, ut manu imposita reperit, uelut

ueluti fragile: dilutum et humidū sedet. Altera probatio, si manu plata ad os, leniter faciē, oculosq; mordeat. Esse inquit Plinius, & per se genus satui blādisimum, uulgo cum sit medio sui candidū Dialeucon uocatū. Cyrenaico uitiū, q; omni Croco nigrius, & q; celerrime corrūpitur. Laudatur breuibus capillis in Lycia. Año septimo, uel octauo transfertur in locū subactū; atq; ita degenerans reuocatur. Vitis eius in coronis nuscq; ppter angustia folij, nisi quē ad mulcendā ebrietatē fieri a quibusdam soleat. Vino mire congruit, p̄cipue dulci, quo & aqua facillime soluitur, nulloq; alio dulci. Tritū ad theatra replenda, utq; hoc nonnulli apud Dioscoridem intelligant, cum *στύαν* dicit, errore librariorum *στύαν* pro *στύαν* scribentū. Sed nos imutare lectionem antiquam, ausi non sumus. Ideoq; mortarijs tingendis, conuertimus. p̄sertim cū de mortarijs atq; Croco mentionem quodā loco habitam a Plinio sciremus. Afferuatur pixidula e cornu. Acerrima Croco uis tribuitur; ut illatū manus palmę, cōtinuo pueniat ad cor.

EX M. VEGR. COMM.

Croci appellationum nulla est a nobis certa ratio, quę plures etiam, quam in impresso Dioscoride, in antiquis alijs gręcis leguntur, nihil igitur de his agemus.

Integer, friabilis. In aliquot gręcis legitur, *ἄσπαστος*, quod est fragile, & tenaci lentore durū. In aliquot uero, *ὑδρακτος*, quod friabile significat, contrario penitus sensu; prioremq; illam lectionem, secuti sunt iuniores omnes. Plinius alteram his uerbis cōfirmat. Probatio sinceri imposta manu, crepat ueluti fragile, nosq; in ambiguo hanc magis probauimus, non tam Plinij auctoritate, q̄ necessitate & usu eius admoniti, friato em̄ Croco plarumq; in medicinis utimur.

Et sine unguine plenus. &c. Sequitur eam mox uocem alia, quę penitus corrupta est, *ἀνελ-
λυτος*. f. cum *ἀνελ-
λυτος* legi oporteat, id est, qui nullo unguine uuefcat, non cui nihil deficit: idq; meliores gręci adhuc habent. Nec obstat quod Plinius decreuit, optimū ubicunq; quod pinguis-
simum. Crassitudinem enim, non unguem ea uoce significauit.

Et cum malefcit, manus inficiens. Obseruauimus, non eodem modo in cunctis legi *ἐκ-
αν-
ων* in *ἀνελ-
λυτος* τὰς χεῖρας. Sed in aliquibus, ut modo scripsimus, manifesta significatione, infici attritu Croci manus; In aliquibus autem, *ἀνελ-
λυτος*, id est, cum humore diluitur; quod quoniā uerſo Croco cōmune est, minus ideo nobis placuit.

Restituimus idem idem non multo post, uocem quę in cunctis alijs, pręterq; in eo qui mihi omnium codex probatissimus est, perierat, illic. f. ubi hic ait. Qui enim talis non fuerit, &c. Deerat enim, *ἄσπαστος*, quod nos intempestiue lectum diximus, manifesta eius uocis iactura, & necessaria instauratione. Incertus ab hoc loco, nec sequax sermonis cursus est: non tñ intellectum adeo confundit, ut non facile dissimulari, aut ex Plinio in integrum restitui non potuerit.

Et ex Olympo Lyciæ monte afferatur. *ἀνελ-
λυτος* δὲ ὁ ἐν τῇ πρὸς Λυκίαν κορίκι, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ Λυκίαν-
ἰου. Articulus prępositiuus, & Corici in genitiuo casu, illic accurrentes, legitimam sermo-
nis seriem miscent. Ideoq; nos secundę bonitatis, a Coricio, ex Cilicio esse diximus, eum qui ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte afferatur, nullā earum uocem perire nobis utilē patientes. Cum alioqui licuisset ex Plinio, breuius & certius totam absoluere rem. Siquidem ille etiam sic decreuit. Prima nobilitas Cilicio Croco, & ibi in Corico monte, dein Lycio monte Olympo. Sed nos qualē nostra habet ætas, Dioscoridē in terpretamur, nō Pliniū exscribimus.

Grauius in Cyrenaico Croco. A librarijs peccatum est, nihil enim illi redditur. Verum statim ad eos qui in Sicilia nascuntur translatus sermo est, tam incerto intellectu, ut nos hiatum illic reliquerimus, qui a doctioribus aliquando expleatur. Credimusq; nos, uitiū aliquod in Cyrenaico significasse Dioscoridem, quod tamen nunc non legitur, quale Plinius in eo nigredinem damnauit. Mox de Siculis egisse, omniumq; in ea insula nascentium Centuripinū ignauissimum, satiuosq; omnes hos esse, ideoq; ignauiores. Quoniam autore Plinio, optimum siluestre sit. In antiquorib; gręcis aliquot, certissimo sēsu & intellectu hic locus adhuc inuenitur.

Misceatur pręterea, &c. Desyderatur hic certī morbi genus, quod facile conijcitur.

De Crocomagmate. CAP. XXX

Fletia exp̄ssis unguenti crocini odoramētis, qđ Crocomagma uocat. Optimū ē odoratū, modice Myrrhā olēs, graue, nigrū, ligni expers, leue, subamarū, qđ madefactū Croci colorē reddit, gustatūq; uehemētior dētes ac linguā inficit: multis durās añis. Quale ē qđ a Syria deferatur. Habet suas uires ad delēda quę caliginē oculis obuersant. Vrinā cit,

A

Διἀλευν

B

κροκόμαγμα

c. ij

D I O S C O R I D I S

C Calfacit, concoquit, & emollit, Vires Croci proportionem representat, quandoquidem plurimam Croci partem sibi Crocomagma uendicat.

B A R B A R I C O R O L L.
C Rocomagma uerbum ex uerbo fex olei Crocini est. nam feces unguentorum Magnata greci appellant, & confectionem, siue massam quae subacta sit. Ecmagma, quo nomine inquit Galenus, ipsum quoque Crocomagma significamus.

E X M. V E R G. C O M M.
Sunt graecis Magmata, quae expressa materia aliqua, supsunt, crassa, feculenta, & lignosa. Verbi causa. Si tula Platanis folia in usu aliquem manib. aut plo expresserit medicus, quod superest terrestre, lignosumque, id Magma dici posset. Sed quoniam nullus similitum usus est, ideo in nullo huiusmodi id nomen inuenitur: seruatum tamen id est tamen in his, quae et humoris, et expressae substantiae alicuius usus est: ut in Rosacio, aliisque huiusmodi multis. Ex hoc genere Crocomagma est.

Fit autem sic. Oleum primum inspissatur, idque aliquibus aromatis. mox Crocus infunditur. post aliquot dies oleum colatur, expresso oleo. quod superest, Crocomagma dicitur. Vnde fiunt pastilli. Celsus lib. 7. uocat Recrementum. Plinius, Vnguenti fecem.

Et mediocriter myrrhatum est. *μῆρος κατὰ ὁμῶν*, idest, non odore solum, sed tota Myrrhae substantia mediocriter myrrhatum.

De resque lingua ad aliquot horas inficit. Non significat quod statim sequitur, *ἀπὸ μὲν οὐχὺν ὄρε* quod ex Gallia interpres dixit, multis annis perennare Crocomagma. Non enim quas hic *ἔρως* dicit, Poetarum more annos significat, sed de colore eius agit Dioscorides, quae restatur, cum lingua et dentes semel infecerit, alique continuis horis permanere, cum aliquo continua oris pituita dilui deberet.

De Helenio. C A P. X X X I.

Helenium, quod Symphitum alique uocant, alique Persicam, alique Medicam, alique Oreum, alique Nectarium, alique Cleoniam, alique Idem Batum, aut flomum, Latini Terminalium, aut Enulam campanam, Aegyptii Lenem. Folia habet Verbasci, angustioris folii, asperiora, oblonga. Caulis quibusdam in locis non emittit. Radice subalbidam, interdum subruftam, odoratam, acrem, uegetam, magnam, ex qua agnatae appendices Liliorum, aut Ari modo seruntur. Montibus in umbrosis, siccoque solo prouenit. Foditur aestate radix, particulatimque dissecta siccatur. Potum radice decoctum, menses & urinas ciet. Ipsaque in eclegmate ex melle praestitum, orthopnoeae, ruptis, couulsis, inflationibus, et serpentiū morsibus. In summa, exalfaciens. Folia ex uino cocta utiliter ischiadicis illinuntur. Helenium stomacho utile, in passo conditum. siquidem salgamarij paululum siccata radicem, mox decoctam, & frigidam aqua madefactam, in Sapa condiciunt, et ad usum recedunt. Trita, potaque, ad cruentas excretaiones efficax est.

B A R B A R I C O R O L L.
Helenium, Enula, siue Inula, sed duplici natura, folio Serpilli: de qua statim post dicetur. Altera folio Verbasci exilioris, de qua nunc agitur. Breuior haec quam Pastinaca est, sed torosior, amariorque, et nisi tepetur liquore dulci, stomacho inimicissima. Sed pluribus modis austeritate uicta, gratia inuenit. Nam & uis passis, & defruto, & melle subigitur in pollinem tusa: et pinguib. quoque Caryotis, iam Cotoneis, Malis, Sorbis, et Prunis, aliquando Pipere atque Thymo illustrata, maxime lulie augustae quotidiano cibo. Superuacuum eius semen. quoniam, ut Dioscorides meminit, propaginibus feritur, modo quo harundines, magnisque interuallis, neque ullo minus quaternorum pedum: quoniam spaciose fructuat.

E X M. V E R G. C O M M.
Elenion. Siue a lachrymis Helenae, siue ut alique dixerunt, quoniam contra serpentes ex eo primum a muliere illa remedium inuentum est.

Symphyton. Inuenisse id nomen uidetur, ex sobole adnatisque illis, quae in radicibus Liliorum modo

rum modo *συμφύονται*, idest, conuascuntur, & herent.

Sūt q̄ medicā & Nectareā. Scilicet facta a regiōe noiē, et a dulcedine. Sic Persicā, sic Cleonia dicta etiā conijcere licet. Et si in probatissimo mihi codice, non simpliciter *κλειώνιον* legitur, sed *εὐχλωρόν κλειώνιον*, idest, Buglossum Cleonium.

Apuleius etiā Chironion Panacen dicit uocari. Vt in alterutro uicium sit; adiectumque hoc a nobis est, ne quid obseruatum & inuentum haecenus relinqueretur.

Orestium. Causam ignoramus. Nisi forte Orestis & Helenæ propinquitās, cōmūnem eius plantæ laudem & honorem ambobus fecerit.

Sunt qui Rubum Idæum, Verbasum Idæum, ex sola similitudine (ut toto hoc opere infirmis aliæ) factæ sunt. Et quoniam copiosum in mōre Ida nasceretur, ideo loci, & regionis discrimine, a proprie dictis, de Rubo & Verbasco, discretum est.

Terminaliū. Vnde Romani sic dixerint, modo integra ea uox est, nihil cōpertū habemus.

Inulam campanam. Inulam dici antiq̄ omnes testatur, nullibi tamē ex Campania magis, q̄ aliud ab illis laudatur. Suspiciamusq̄ nos, multas in scriptore hoc, nō legitimas esse appellatio- nes, deincepsq̄ p̄ tēpora infertas, aliena & pegrina admiratibus cūctis, eoq̄ magis in Romanegētis fortuna cēmpio, hāc græcis miscere p̄p̄is placuisse, & ex p̄p̄inq̄ urbi regione laudauisse.

Folia habet angustiora folio Verbasco. &c. Id ex Verbasci historia patebit. Qd̄ utinā in cau- le pariter liceret, quoniam hic ait, aliquibus locis in Inula nō proferri, nulla eorū locorū certa in- dicatione, quā merito omnes desiderēt, multoq̄ magis ubi caulescat hoc olus, & caulis, & flo- ris, & semini certam rationem & historiam, quam iuniores aliqui non ex se, sed ab hoc scripto- re acceptā rediderūt. Quod enim in impresso, cunctisq̄ alijs fere græcis nō legitur, in antiquissi- mo & probatissimo mihi codice adhuc seruatur, describiturq̄ in eo caulis appellatione, quod in Inula crescit, his uerbis. Caulem ex se mittit Heleniū crassum, hirsutū, cubitalē, & aliq̄ ma- iorē, angulosumq̄, flores luteos, et in hjs semē Verbasco simile, tactu pruritū faciens. Licetq̄ hæc, ut diximus, tam aperte in Græcorum aliquo legatur, nō ideo tamē ceteros omnino dāna- mus. Obseruauimus enim, diuersitati huic causam dedisse, mediam quandā in Inula crescen- tium naturam, quæ nec in caulium genere, nec fruticum ramulorū cēferi penitus possent. Siquidē caules plerūq̄ in singulis plantis, singulares sunt, nec nisi appetente flore & semine surgūt, ut in Lactucis, ac Betis, alijsq̄ oleribus huiuscemodi sit. Inula autē raro, & a principio statim fruticatu p̄dit. Ramuli cōtra, fruticesue copiosiores & graciliores, q̄ in Inula sūt. quales in Ruta, Serpillo, alijsq̄ multis uidētur. Columella frutices, qd̄ in Inula extollit, dixit lib. 12.

Radice habet intus albescentem, foris rubescentem. Sic ex melioribus græcis legendū est.

Radice habet odoratam, grandē, acrem. Sunt in quibus *ἰνφν*, quod est speciosam & cra- ssam, & in q̄bus *ἰνφν*, quod nos facili lentore mollem reddidimus, *ἰνφν* enim, *τὸ ἰνφν* si- gnificat. Probauimusq̄ hanc ratione magis, quod ad ostendendā eius quantitatē satis erat, qd̄ hic *μεγάλων*, id est, grandem dixerat. Liberum tamen hoc legentibus relinquatur.

Suspectum est nobis, quod in græcis omnibus legitur, cruentis spuris utilem esse Inulam. Non tam quia meliores græci nihil huiusmodi habent, quam quia non legitimo loco, se id o- stendit. Debuerat enim in medicina, nō in extremo capite post eam tractari, a quo loco distra- ctum, additum magis & aduentitium, quam natium & antiquum Dioscoridi uidetur: relin- quimusq̄ peritiōibus de eo censendum.

DE ALTERO HELENIO. CAP. XXXII.

Alterū Heleni genus in AEgypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, Serpilli modo per humum repentibus. Folijs Lenticulæ, sed longioribus, crebrisq̄. Radice pallida, digiti mino- ris crassitudine, p̄ ima tenui, sup̄ne crassa. Cortice nigro. Nasctur in mari- timis, collibusq̄. Radix una in uino epota, cōtra serpētū ictus auxiliatur.

HEX M. VERG. COM M.
Helenium hoc posterius, nostris Inulam appellari posse, non uideo. Theophrastus interm- Velenion, Aristoteles Belenion scripsere: si modo liber eius est, qui de plantis ad autorem Aristotelem refertur. Belenium inquit, delibutorū in Perside uenenum erat, & in AEgy- ptum & Palestinam translaturū, sine periculo mandi cōepit. Hæc commentatio Græcis perie- rat. Habebatur in arabico, demū cōuerfa est in græcum sermonem a quodā, ut ferūt. Maximo.

D I O S C O R I D I S

C propterea quedam in eo libro barbara fruticū & radicū leguntur nomina, ut sunt, *Benteli*, *Nenuphar*, *Opinais*, & aliquot huiusmodi. *Nenuphar* pro *Nymphaea* quidē capitur Arabia: sed *Benteli*, & *Opinais* quid sit, parum liquet. Nisi quis *Opinain* pro *Silphio* intelligat: quoniam succum ex eo manare lentiusculum dicat, quem priuatim uocamus *Opon*. *Bentelos* autem initio spicata esse traditur, mox in arborem grandescere. Sed redeamus ad *Helenium*. *Plinius* exanimatum fleuisset, *Hilaritatem*, *Hippocratis* testimonio facit. *Prædulcis* in eo cremor. *Radix* cōtrita, mures necat. *Cādida* intus est, & dulcis, *Dioscoridi* uero pallida. *Laudatissimū* in *Helena* insula. *Huius* rami *dodrātales* a *Plinio*, *cubitales* a *Dioscoride* feruntur. *Addebatur* in coronamenta folium.

E X M A R. V E R G. C O M M.

C Redimus etiam in *AEgyptia* *Inula* corruptam esse illic uocem, quo loco in extrema totius capitis *coronide*, hic ait, uires illi esse, ut cū uino pota radix eius una, serpētū moribus subueniat. Cur enim una magis, q̄ duabus, tribusue: & si quantitas in ea uoce decernenda fuerat, pondere potius q̄ numero, quod alioquin inæquale est, constitui debuerat. Id nos, una & altera litera mutatis, quod erat *μῖα*, id est, una, *λῖα* quod tritum significat, legendum esse arbitrati, tritam cum uino potam *Inulæ* radicem, remedio esse diximus.

ἐλκιδ
ὀμφάκινον

O De O M P H A C I N O O L E O. C A. XXXIII.

O Leum quod ex immaturis Oliuis exprimitur, ad multos usus recte ualentibus accommodatissimū, *Omphacinum* id appellatur. *Præstat* recens, odoratum, quod non mordeat. *Tale* unguetorū compositionibus idoneū intelligitur. *Stomacho* utile est, q̄ astringat. *Gingiuas* contrahit. *Dentes* firmat, si contineatur in ore. *Sudores* cohibet. Et quo uetustius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et ut reliqua in comune dicatur, omne oleum calfacit. *Emollit* uentrem. *A* perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq̄ promptius ad obeūda munera reddit. *Aluū* leuigat. *Ulcerationū* medicamentū uires permistū hebetat. *Cōtra* uenena datur, assidue potum, redditumq̄ uomitionibus. *Soluit* aluum hemine mēsurā, cum pari *Pisanae* succo, aut aqua potum. *Ad* tormina, calidum simul decocta *Ruta* tribus sextariis in potu datur. *Ventris* animalia pellit. *Idem* maxime *Ilei* intestini morbo laborantibus infunditur. *Verus* magis calfacit, & uehementius discutit. *Oculorū* claritati sublitum cōfert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetus statem representet.

Plin. lib. 15. ca. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. de omni oleo, Gale. 6. simp. pharma. capit. 19. 20. Ad Paternianum. cap. 199.

Galen. 6. sim. cap. 19. 20.

B A R B A R I C O R O L L.

O Leum *Omphacinū* sit duobus modis, *Olea* adhuc alba expressa. *Cādida* deterius ex *Druppa* (ita enim uocatur a græcis, latinisq̄, priusquā tenera esui sit) iam tū luteola, coloremq̄ demutans. Hoc uiride *Cato* appellat, atq̄ utilius est. Est & *Omphacinum* siue *Omphaciū* e uire, de quo post *Galenus* *Oleum* nō *Omphacinū*, sed dulce fieri ex *Druppa* scribit. Alterū uero genus, qd̄ ex immaturis, albisq̄ premittur, & *Omphacinū*, & *Omotribes* appellari tradit, unguētis utilissimum e *Phaulia*, ut *Theophrasto* placet. Simile *Omphacino* sit *Oleum*, si olea rā qualis in *Omphacino* sentitur, dat, ut *Hispaniensis* nominato. *Omphacinum*, ab *Omphace* ducitur, unde acor ex uuis, græce appellatur *Omphacium*, & acerba uua *Omphax*, & acerbum mel *Omphacomeli*, ab eodem omnia uocabulo.

Oleum ex *Druppa* fieri dulcissimum, *Galenus* testis est, utiq̄ si ex maxime *Druppa* fiat, nō si ex *Druppa* tantū. *Olei* probi notæ apud *Galenū* sunt, ut sit q̄ dulcissimū, tenuissimū, purissimū, translucidum, quodq̄ modico eius cuti superfuso plurimū sese fundat, & facile combibatur. Cuiusmodi est, inquit, quod *Sabina* bacca premittur. *Oleū* cum aqua mixtū *Hydreleon* uocatur, & *Chydon*; quanquā posterius hoc *Homero* lustrationem fere significat. In *Bactris*

iuxta

D I O S C O R I D I S

Cio esse, Est enim illic nō πίνος substantiue, id est, Picee arboris, uerū adiectiue πίνος id est, qđ ex arbore aliquid significet. Verbi causa, frondē Resinam, Onicā, aut huiusmodi quippiam. Secus lōge author Pandectarū, qui album dici existimat, quod est uetus, quoniam quo antiquius, eo quoq; albius apparet, quod subinde quoq; lotum a Myrepticis est.

σικυονίου ἔλαιον

De OLEO SICYONIO. CAP. XXXV.
Sicyonij componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati stanno inducū, funditur olei albi, quod crudæ Oliuæ reddiderūt, cōgius unus, aquæ congius semis, leui id igne coquitur, leniter mouēdo. At ubi bis efferbuit, & frustra igne refrixit, innatans oleum concha tollitur. & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quēdam usq; modum uim habet. Febri ac neruorum uitij prodest. Fœminæ, ad commendandum faciei nitorem, eo utuntur.

E X M A R. V E R G. C O M M.

Dealbatum oleū Sicyonium, ideo facere Diosco. docuit, quod medicis & fœminis quondam multus esset usus eius, illis in aliquot malorū curatione, his in lenocinio formæ passim eo utentibus. A Sicyone antiquissima Peloponēsi urbe prope Corinthum, gentile sibi nomē inuenit, incertumq; medici ne prius, an fœminæ eius confectionem docuerint, uoluptas ne, an necessitas. Vtebatur eo passim in aliquot malis antiquitas. Sæpeq; Paulus Aegineta aliquid eo curari præcepit. Et si libro sexto Samium magis, non Sicyonium in usu medicinæ cōmendet.

ῥυπον καθαρὸν
ῥυπον ἐν τῷ πα-
λίστρῳ
ῥυπον γυμνασίου

De Strigmentis balnearum. CAP. XXXVI
Strigmenta a balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt. Ad sedis rimas & condilomata illinuntur. Illa uero quæ ex Palæstris puluerem sibi asciuerunt, in sordis speciem redacta, articulorū nodos imposita adiuuāt. Ischiadicis in fots, aut malagmatis locum, calida commode sufficiuntur. Derasæ Gymnasiorum parietibus, simulacrisq; sordes calfaciunt. Tubercula, quæ ægre ad coctionem perducuntur, dissipant, Desquamatis, & ulceribus senu profunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Strigmenta
balnearū.

Strigmenta, hoc sunt, quod Græci Rhypon, & Gloeon appellant. Id quod ex Celso, Plinio que colligimus. Aurium certe sordeculas, Græci uocāt Cypsellas. Rhypon Iulius Pollux pro cæra quoq; sigillari, acceptum quandoq; tradit ab authoribus. Nisi quis Typon, non Rhypon in Polluce lectiter. Sed & apud Ciceronē in epistolis ad Atticum, Rhypos scriptū est pro cæris, siue formis, unde sigilla fingeantur, fortasse a situ uetustatis, appellatas: ut Plinianum quoq; illud, & expressi cæra uultus, singulis disponebātur armarijs, ut essent imagines quæ comitarētur Gentilicia funera, defuncto em aliquo totus aderat familiæ eius, quinquā fuerat, populus.

Strigmenta
Palæstrarū.

Strigmenta, hoc genus aliud non sunt, q̄ puluis, qui luctantium corporibus inspergitur: et oleo supuenit. Hæc pulueris insperio, a græcis & q̄ dicebatur. puluis ipse, conis. Cū ipso te, inquit Plautus, puluisculo conuerram. Et geometricū est Puluisculus. Palæstris quidem, opticitur, & Patos. Quanquā Patos proprie cœnū est, atq; lutum cœromati permixtū: cui si sudor accesserit, Conifalō uocari, ab ijs qui nimis Attici uideri uolunt, autor est Galenus. Locus in Xystis huic operi dicatus priuatim, Conisterium appellatur Viāruuio.

Strigmenta
Gymnasiorū.

Strigmenta a Parietinis, & a Palæstra significare Plinium existimo, cū ita loquitur. Vsum olei in luxuriam uertere Græci, uitiorū omniū genitores, in gymnasijs publicādo. Notū inq; est magistratus honoris eius octogenis sestertijs Strigmenta olei uendidisse. Item. Quin & sordes inquit, hominis, in magnis fecere remedijs, quæ suorum gymnasia Græcorum: quippe, ea Strigmenta molliunt, calfaciunt, complent sudore & oleo, medicinam facientibus. Item alibi. Et in gymnasijs inquit, oleū cōditur odoribus, sed uilissimis. At Strigmēta statuis gymnasiōrum

florū detracta: in quibus Galeno autore, multū olei cōburebatur: quia puluere inqt carerent. & cum erugine permista colligerentur, acrioris naturæ q̄ strigmenta cætera noscuntur.

EX M. VERG. COMM.

S Trigmēta dicitur, quē oleo illitis capitibus post sudorē, una cū sudore, reliq̄q̄ humani corporis cōcreta, & in balneorū pauimētis relicta, in eos usus quos hic docet Diosc. seruabatur.

De ELAEOMELITE. CAP. XXXVII.

IN Palmyris Syriæ, quod Elgomeli uocant, ex quodā caudice manat, crassius melle, sapore dulci. Bilem, cruditatesq̄ detrahit, sextario cū una aquæ hemina dato. Sed qui sumpserit, torpescunt, & uiribus deficiunt: quod minime uereri oportet, uerum crebro excitare, ne ueterno pressi, somnos capient. Fit & oleum e pinguitudine furculorum Oleæ. Optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur. Lepras, neruorumq̄ dolores, illitum emendat.

BARBARI COROLL.

Elgomeli fluit ex ipsis Oleis in Syria, tenuius Resina, sapore Mellis: unde nomen. Nō sine nausea emollit aluū. Pugnatores certaturi, præsumūt ex eo cyathum. Plinius in maritimis Syriæ nasci prodit, cū tamē Palmyra longe a mari absit. Forte non maritimis, sed Palmyris legendum, nisi quis locum, unde id excerptit, non Palmyris, sed Almyris legisse Plinium existimet: quod in tanto uiro dubitare, nullo modo possum. Elgomeli medicinæ tantum gignitur. sit hoc idem quod & Aeromeli dicitur, quasi mel æthereum ac cœleste, quod sacræ literæ Manna uocent: ut nō plane cōtendo, ita certe, ppenissimus sum, ut credam. Sed ita tamen, ut intelligatur aliquod discrimen esse inter id quod mandī potuerit, & id quod medicinæ tantū nascitur. Decerpi hoc Amyntas scribit, una cū ipsis quibus hēsit frondibus. Et in offas, pastillosue, aut etiā orbiculos conuolui, ut cū usuf postulat, in lignea pocilla, quæ Tabaitas in Asia cognomināt, aliquo humore diluatur. Plane ab exortu sideris cuiusq̄, sed nobilium maxime, ut Plinius existimat, aut cœlestis arcus, si nō sequantur imbres, sed ros tepescat solis radijs, Medicamēta potius q̄ mella gignuntur oculis, ulceribus, internisq̄ uisceribus dona cœlestia. Quod si seruetur inquit hoc, Sirio exoriente, casuq̄ congruat in eundem diem, ut sæpe Veneris, aut Iouis, Mercurij ue exortus, non alia suauitatis usufq̄ uis mortalium malis a morte reuocandis, q̄ diuini neq̄aris fiat: nisi hoc ut alia fraus hominum perniciē corrumpere.

EX M. VERG. COMM.

Non sunt Plinio, & huic de Oleomelle omnia eadē. Plin. in maritimis, hic in Palmyris Syriæ spōte sua manare, nō leui diuersitate, dicit. Nō multi tñ faciēdū id est. Illud grauius, q̄ hic arborē ex qua manet, ignorare uidetur: Plinius Oleas eius regionis esse testatur: et hic spōte sua fluere, & opere humano ex summa arboris parte confici docet, Plinius per se tñ duobus locis manare ait. Nō uidetur hic ipse etiā sibi cōuenire. Primo enim ex quodā trunco fluere, tanquā cuius arboris hic tricus esset ignoraret, mox humano opere cōfici etiā dixit, ἡ τῶν λαλλῶν, quā si olearū furculos indicaret, id em̄ præter cōmunē in plātis nouorū germinū significationē, priuatim ea uox Atheniēsis sibus quondā significauit: auditaq̄ τῶν λαλλῶν uoce, Oleæ ramulos adhuc plerūq̄ intelligimus, & si eius uocis maior sit ambitus, significetq̄, ut diximus, nouas aliarum etiā plātārū germinatiōes. Nō facile ideo est, præsertim in re tēporibus nostris ignota, unde afferat, qd̄q̄ Oleomel hoc sit indicare. Eā ob causā, nō dissimulatis, uerū præteritis quæ a Plinio dicuntur, Dioscoridē latinū fecimus. Et ut primis respōderēt ultima, nō magis Oleæ, q̄ alterius arboris furculos, et germina indicare uoluimus. Verum quęcuncq̄ ea arbor sit in Syria, ex eius etiā furculis Oleū cōfici diximus, eodēq̄ in loco naturā rei magis, q̄ quod legebatur secuti, qd̄ erat λινον, quę uox græcis unguē oī indicat, λινον, una tñ mutata litera, qd̄ corticē significat, mutauius: neq̄, ut credimus ab re. qñ ubi ex trūco arboris humor per se fluit, expressus eiusdem corticibus fluere etiā poterit. Persuasitq̄ id præcipue, q̄ cōficere uerbū, eā hominis operā indicat, quę qd̄ nondū est efficiat. Unguē autē p se propius ad olei naturā & habitū accedit. Nec rōne caret, ut qd̄ in ima arboris pte p se fluit, in sumo lateat, nec nisi ui, et humāo ope extra hie colligi possit: p̄serti ex corticib. q̄ copiosiore q̄ interiores partes in pluribus humore abunde.

Veruntamen quasi Veter- (dant. Nō tamē hoc adeo decernimus, ut illud damnemus. nosi torpent. Est in ea rescindendum, in cæteris scriptoribus, et in communi eius uocis æstimatione, ναρόν καὶ ναρόντιον, tardum, pigrum, hebesque Græcis significare, dicitq̄ ad iter ναρόν

A

Veneris

Plin. libro. 15.
capite. 4.

B

D I O S C O R I D I S

C ad agendum, intelligendum, uigiliam, motumq; omnem alium, somno, pigritia, & languore marcentem. In medicina autem, ad capitis malum, grauemq; & profundiorē somnum cōtracta est eius uocis significatio. Estq; *ινωδρῆτος* quātum in expugnabilis somni genus: quod ex humida materia fit. Nunc satis signasse sit, quos nam hic *ινωδρῆτος* dicit, & nos ueteri torpore diximus.

De Manna.

Melligo.

Non probamus quod aliqui suspicari se dixerunt, esse Oleomel hoc quod antiquiores *gre*ci *ἀερωατὴν*, id est, aerium mel uocauerunt: id scilicet quod ab Hebræorum sacris literis acceptū ueteres Man, nunc uero passim medici Maña appellāt, qđ ex huius scriptoris historia nō facile cōiicitur. Siquidem ab oleo statim de eo agitur, & quasi cōgener oleo subicitur: in censu mellis alioqui constituendum, si mellis magis qđ olei naturam referret. Nec dixisset hic, ex trunco arboris manare. & c. cum aerium illud mel non ex trunco manet, sed in arborum folijs inueniatur. Sunt præterea in medicina, quę aerei mellis euentibus parum conueniant. Nec nobis pro cōperto est, quod antiquioribus quibusdam aerium mel fuit, quod nostra etas Man na appellat, sed Melliginem (sic enim nūc uoco) sub Lucanis temporibus, in arborū folijs cōcretum, rosidum sapore mellis humorem, quem deinde legentes apes, mel in aluearibus suis coaceruant. Nec tamen negamus, quod nunc Manna uocant, ex eadem, uel simili substantia esse, uerum nihil, ut nobis uidetur, ad Oleomel hoc. Aerium omne id mel facit, quod incensū, et nomē mellis sola saporis dulcedine adscitum est, cum tñ præcipua olei uis in eo intelligatur.

ἀλκινον ἔλαιον

C De Cicino Oleo. CAP. XXXVIII.
Icinū oleum hoc modo tēperatur. Maturi Ricini qua uoles quātitate torrido sole flaccescunt, & instrati tantisper insolantur, dū uestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. Postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat de mittitur, subiectoq; igni feruescunt. Et ubi insitū prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innatans oleum concha tollitur, & recōditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longe secus fieri solet. Nam repurgatos Ricinos molæ mandāt, & accurate molitos per sportu lam organo exprimunt. Tū quidem ematuruerunt Ricini, cum continētibz orbiculis exuuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manātia ualet. Prodest inflammationibus, uuluis conuersis atq; præclusis. Item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus. Emplastra efficaciora reddit additum. Potu aquam aluo extrahit. Ventris animalia pellit.

Plinius lib. 15.
cap. 7. li. 23. ca
pite. 4.

OLEUM CICINŪ, e Cici arbore fit, in Aegypto copiosa: ubi sine igni & aqua sale aspersum exprimitur, cibus scđū, luminibus lucernarū, ppter nimīā pinguitudinem, ineptū & obscurū.

EX M. V E R G. C O M M.
Ici quondam fruticem aliqui dixerunt, quem plures græci Crotona, & Romani Ricinū, a figura seminis appellauerunt. Rura autem nostra, & omnis fere Thuscia nunc Romanū Phaselum uocat. Illi a notissimi insectū, nos a leguminis similitudine, eandem rem indicantes. Frutem, altitudine, ut hic in historia eius humilis Fici, Plarani folio, & si Plinius uirgineo, nullo discrimine tamen indicat, quando Platanus uirgineo folio a cunctis describitur. Ricinium Plinius sua ætate uocari dixit, a foedissimi insectū similitudine, quod græci *κρότων* appellant. Sunt q; latini Ricini, & græcis *κρότων* insecta, quæ animalibus alijs, canibusq; præferum inherēt. sine motu, cum semel inheferint, quibus cibi nullus exitus est, colore liuido, nullis discretis mēbris, in globum continue crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies, sponte sua decidant. Ideoq; nos, autore Plinio, fruticem, eiusq; semen, & ex eo confectum oleum, Ricini appellacione indicauimus. Et nisi Plinium libro. 15. sine igne & aqua in Aegypto exprimi Ricinium oleum, suspicaremur, nec sine ratione, non esse hoc loco integrum Dioscoridē, qui in prima illa huius olei confectiōe, auxilio aquæ ideo uteretur, quod ob Ricinorum ariditatem aliter

aliter exprimi nequiret, mox autem in Aegypto confici, sine humore aliquo testaretur. Oportet itaq; duobus, hsdemq; grauissimis authoribus, in eadem re idem testantibus, constituere uuidiores in Aegypto Ricinos quam Italia nasci, eaq; unguinis sui copia, nullo etiam adperso humore exprimi posse.

¶ De Amygdalino oleo. CAP. XXXIX

AMygdalinum oleum, quod aliqui Metopium uocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ quæ ferbuerit sextarius adijciatur. & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius q̃ antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Prescis nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postq̃ ebiberint. idē opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorūdem locorum inflammationes efficax est. Vitijs renū, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisq; proficit. Dolores capitis, grauitatē auditus, sonos incertos, tinitusq; discutit. Maculas tollit in facie, et cutem erugat cum melle, radice Lilij, & cypria Cæra, aut rosaceo Cærato. Et oculorū hebetudines emendat. Vlcera capitis manantia & furfures cum uino abstergit.

BARBARICOROLL.

Oleum ex Amygdalis, Neopum uocari legitur in Plinio. Puto corruptam esse lectionē, & aut Netopum, ut Hippocrates, aut Metopium, ut Dioscorides legendū. Adde, q̃ unguentum Aegypto familiare quod Metopium appellatur: ipsum quoq; de nucibus amaris conditur, ut post liquebit. Paulus Amygdalinum inquit. Metopium quoq; dicitur, ppter Galbanū, quod Metopum in Aegypto nominatur, & in oleum hoc adijcitur. Aetius oleum hoc etiam Halinon uocari tradit, ab amaritudine, ut opinor.

EX M. VERG. COMM.

Metopium qdam dicunt. Siue a Galbano, quod Aegyptij Metopion uocāt, & huic oleo miscebatur: siue ab Aegyptiorū pprio unguento, quod amaris Amygdalis conficiebatur.

Feruentes aquæ heminis duabus. Variant hic antiquiores græci in mensura. In aliquibus em̃. ut nos reddimus, hemine, in alijs, cyathi, leguntur. Fecitq; hoc, ut credimus, notē in utraq; hac mēsurā similitudo. In eo nihil nos decernimus, monemus tñ. qm̃ facilis & lubricus in pōderib. lapsus fuerit, cōiectura, sensusq; etiā uti oportere. Nobis inclinatur aius, modij q̃dratibus, cyathi magis, q̃ hemine mēsurā congruere, etli contra redditus a nobis locus fuerit.

Cypriæq; Cære. Non Cypriam a regione uoluit dicere, sed Ceroma, siue Ceratum, quod Ligustrino unguento maceratum & subactum esset.

¶ De Balanino oleo. CAP. XL.

Simili modo fit Balaninū oleum: quod repurgat maculas, lentigines, suaros, et cicatrices nigras. Aluum soluit. Stomacho aduersatur. Contra aurium dolorem, sonos, & tinitus auxilio est cū anserino adipe instillatum. Similis Sesamini ratio. Fit etiam e nuce Iuglande oleum, quod Caryinum uocant. Eandem uim habet quam Balaninum.

BARBARICOROLL.

Balaninum oleum e glāde fit Aegyptia: quæ Myrobalanus quoq; dicitur. Simplex huius compositio diu fuit. deinde Resina quoq; mixta.

Oleum Sesaminum Indis refertur acceptum, qui e Castaneis quoq; atq; Oryza cōficient. Oleum e iuglandibus iners, & graue corpori est, sapore ingrato. Etenim si quid in nucleo cōputruit, totus modus deperit. Nunc tota fere, Liguria Insubriaq; promiscuum & cibus & lumini, haud magnopere molestum.

A

ἀμυγδαλινόν
ἐλαιον
μετόπιον

Pli. lib. 23. ca.
pice. 4.

B

καλάνινον ἐλαιον

Pli. li. 23. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

EX MAR. VERG. COMM.

C Paandestorum Rhapsodus interpretatur, Balaninū, idest, de Ben: cui id studiū fuisse uide-
ri potest, nō q̄ utile confueret Rhapsodium, sed quam locuples, & ingens.

Videtur & repugnare his quæ dicuntur hic ab Dioscoride. Quæ Theophrasto dicuntur lib.
4. capite. 2. Glans a fructu nomen accepit. Folium ei simile Myrto, oblongius tamen. Illæsa ma-
gnæ arbor est, uerum non recta, sed contorta. Fructus putamine contuso. Vnguentarij uti so-
lent, est enim boni odoris, sed fructus ipse inutilis. Aut igitur in re nunc notissima dicendū est,
conficiendi modum tantum demonstrasse Dioscoridem, aut aliā unguenti ab oleo confectio-
nem fuisse, & in altero corticis, in altero fructus usum fuisse.

De Hyosciamino oleo. CAP. XLI.

Ἑλαιοῦ ὁσκιανῶ
μύρου

H yosciaminum sic fit. Semen candidum, recens ac siccum tundi-
tur. & calida aspergitur aqua, ut in Amygdalino diximus. dum-
q̄ insolatur, siccatae partes madidis permisceantur: hoc autem fieri oportet,
dū nigrescat & grauiter oleat. Mox pressum atq̄ excolatum recondi-
tur. Ad auriū dolores efficax est. Pessis miscetur. Ad emolliendum utile.

De Hyoscia-
mino herba Plin.
lib. 25. cap. 9.

H yosciaminum oleū ex seminibus Apollinaris herbae conficitur, quam Hyosciamon græ-
ci uocant. Cauendum in potu, quoniam cerebri motus faciat.

EX M. VERG. COMM.

D eo oleo illud tacuisse inhumanum & iniustum fuerit, quod potum, cerebri motus fa-
cit, & inter letalia semen eius in cibo sumptum numeratur.

De Oleo e grano Cnidio. CAP. XLII.

F it & e grano Cnidio purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu.

BARBARI COROLL.

Cnidium oleum ex Cnidio grano, idest Cnidio Cocco fingitur.

EX M. VERG. COMM.

D Hamælec, quam Cneoron Theophrastus uocat, granum, Cnidium, semen est. In histo-
ria plantæ lib. 4. plenius de eo agitur.

De Cnicino. CAP. XLIII.

Ἑλαιοῦ κνικίνου

N on secus Cnicinum oleum temperatur. Cui facultas eadem est
quæ facto e Cnidio grano, uerum inualidior.

BARBARI COROLL.

Plinius lib. 25.
capite. 15.

O leum Cnicium, ex Cnico herba, quam celebrant Aegyptij, oleo tantum, non cibo gra-
tam. Italiae ignota Plinij temporibus.

EX M. VERG. COMM.

C arthamum nostræ ætatis medici, Græcorum Cnicon uocant, Rura autem nostra, Cro-
cum Saracenum, De eo plenius libro quarto.

De Raphanino. CAP. XLIII.

Ἑλαιοῦ ῥαφανίνου

R haphaninum e Raphani semine fieri solet cæterorum more.
Phthiriasis mala ualitudine contractas tollit. Scabricias cutis in
facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij.

BARBARI COROLL.

Plin. li. 23. ca. 4.

R aphaninum oleum, ex radice latini appellata, Aegyptij Raphanum maxime cupiebāt
serere, modo licuisset: quia & quæstus maior q̄ e frumento redibat, & minus tributū pendeba-
tur, nullumq̄ copiosius erat oleum.

VERG.

C ontra oēs pediculos Raphanino oleo utitur Paulus. Plinius q̄q̄ addit, Scorpionibus ac
Ceraistis aduersari, posseq̄ impune tractari, si quis uel semine, uel oleo perunctus sit.

DE MELANTHINO. CAP. XLV.

Ἑλαιοῦ μελανθίνου

M elanthinum idem quod Raphaninum potest.

Melanthinum oleum. nomē habet Melanthio, quod est Git, quasi Nigellā uerbum e uerbo dicas. Nam Melantheon, Anthemis est, quam modo Chamæmilon uocari frequentius animaduerto. quā Plinius utrāq; Melanthio appellat, nisi lectio deprauata ē, qđ & crediderim.

Nigella qualis sit, et quo colore et ordine, in purpureis uasculis conspiciatur eius semen, certius in historia ostendetur.

De Sinapino CAP. XLVI.

Tritum Sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diurnos dolores efficax est. Trāsfert humores qui in aliqua parte concreuerunt,

De Sinapi natura & medicinis Plinius libro. 20. cap. uicesimo secūdo, & 19. capite octauo, EX M. VERG. COMM.

Variant antiquiores græci hoc capite. Alij enim calida, alij frigida aqua Sinapim aspergunt. Nos ad molliendam, soluendamq; seminum duriciem, aptiorem calorem existimamus. Plinius in eadem confectione, etiam Dioscoridi idem nō est, & aliter conficit. In medicina etiā pluribus morbis quam hic, mederi dicit, locus est lib. 20. cap. 22.

De Myrteo. CAP. XLVII.

Myrrei faciendi ratio hæc est. E Myrto nigra, siluestri, aut satua, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo pares Omphacini olei portiones adiunguntur. subiectisq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur. Innatans oleum deraditur. Sed longe facilior hæc compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant. Alij prius oleum inspissant Malicorio, Cupresso, Cypiro & lunco odorato. Efficacius est amarū gustu & oleosum, uiride, translucens, & olens Myrtum. Astringit, & indurat. Ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. Prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & pularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores, & ad omnia quæ astrictionem inspissationemq; desyderant.

Myrteum oleum, & hoc e latifolia nigra, siluestriq;. Prestantius, quam Oxymyrsinem, alij Chamæmyrsinam uocant. Aliqui Acoron, a similitudine. Est enim breuis, & fruticosa, minore semine. ut docebimus. Fieri et aliter oleum Myrteum solet. Tunduntur Baccæ aspersæ calida aqua, dein coquuntur. Myrtas Cato baccas huius arboris appellat. Interest, uinū, an oleū facias. Ad uinū Baccæ in ariditate siccant, ad oleū nō siccant. Inest huic oleo uini qđ sapor, si mulq; pinguis liquor, præcipua uī ad corrigenda uina saccis ante perfusis. Retinet qppe siccē, nec præter purum liquore transire patitur: datq; se liquatis cōmendatione mira quali comitē.

De Laurino. CAP. XLVIII.

Laurinum fit hoc modo. Maturæ Lauri baccæ in aqua coquuntur. siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt: quæ manibus expressa, cōcha excipitur. Alij Omphacinum prius oleum Cypiro, lunco odorato, & Calamo inspissant, deinde mollia Lauri folia concoquunt. Alij etiā Baccas, donec oleū odore cōtraxerit. Alij Styracē,

A
Pli. lib. 20. ca.
17. & 22. ca. 21.

ἐλαίου σινάπινον

μυρρὶνόν ἐλαίον

B

Pli. li. 23. ca. 4.
& alias de
Myrto lib. 15.
cap. 29. & 23.
cap. 9.

ἀλάτρινόν ἐλαίον

D I O S C O R I D I S

Cet Myrtū addūt. Optima Laurus ad id latifolia, et mōrana. Oleum Lauri nūtilius q̄ recētius, q̄q̄ uiridius colore, amarissimū, et acre. Vis ei ex calfactoria, emolliens. Venarū spiracula laxat. Lassitudines discutit. Oibus neruorū uitijis, horribis, defūllatiōibus, aurīū doloribus, malis renū frigore contractis, illitū non aliud iuuantius. Attñ potum, nauseam parit.

Plin. lib. 23. ca
pite. 4. de ipsa
arbore lib. 15.
capite. 10.

Oleum Laurinum e Druppis inquit instituitur. Nam Druppa nō olearum modo, sed ali as quoq̄ Baccas uocamus. grēcos imitati, *Δρυπίνας* appellantes. Quidam folium & corticem Baccarum adhibent. Laudatur siluestris & nigra baccis. Ex Delphica uero ad acopum & ce rata utilissimum.

B A R B A R I C O R O L L.

Aliam huius Olei confectionem tradit Palladius lib. 2. Nempe talem. Lauri Baccas quā m plurimas & maturitate turgētes, in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei qd̄ ex se dimiserint, super natantis undam pennis leuiter cogentibus, in uasa transfundes. Sunt aut em Druppē in Olea & Lauro.

E X M. V E R G. C O M M.

Parum deinde sequax sermo est in grācis, ubi nōs diximus, quam manibus in conchulam exprimentes colligunt. Quod enim est illic participium *Διὰ τὸ λατρεῖν*, nullum habet sensum: i bus placere, quousq̄ ex minus corrupto codice, certior confectionis huius ratio cognoscatur. Suspīcamur & illic uitium esse ubi legitur. Miscent aliqui *Styracem*, & *Myrrthum*. Credimusq̄ pro Myrrtho frutice, Myrrham legi oportere. *Styraci* enim *Myrrha* aptius copulatur, quam Myrrthus, & in spissando oleo maiorem uim, & frequentiore usum habet. Facilis ab altera in alteram uocem in grācis lapsus fuit. Et antiquus latinus Dioscorides, Myrrtham adhuc habet, potestq̄ una tñ mutata litera, in hunc sensum trahi. Cuiq̄ tñ suum iudiciū sit, & arbitrium.

De Lentiscino.

C A P. XLIX.

Similis Lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis pri sus spissamentis, ut in Laurino diximus. Hoc scabiem iumentorū, cā numq̄ sanat. Vtilissimum pessis, acopis, et leprarū medicamētis. Sudo res cohibet. Nec secus Terebinthinū fieri solet, qd̄ refrigerat et astringit.

D
χίνον ἑλακίον

χίνον ἑλακίον
Plin. li. 15. ca. 7.
lib. 24. ca. 7. li.
15. cap. 26.

Lentiscinum oleum, e Lentisco fit. Grēci schinon uocant. Nam schœnos luncus est: de qua uicinitate nominum sapiusculē decipimur. Durius hoc paulo q̄ Rosaceum. ceterū eiusdem effectus. Nec mihi plane certum est, an hic Iuncinum potius, q̄ Lentiscinum interpretari debe am. Quandoquidem & Iuncinum Rosaceo simillimū esse p̄dicant. Duobus quoq̄ locis Plinius hac similitudine Rosacei, altero Lentiscinum describit, altero Iuncinum: alioquin falsum, aut lapsum affinitate, autorem illum diligentissimum, qui putem: p̄sertim cum fieri possit, ut Rosaceo sit utrunq̄ natuta proximum. Nam & Therminum, quod ex Lupinis cōstat, proprie ratem Rosaceo sororiam habere Plinius idem testatus est.

E X M. V E R G. C O M M.

Libet hoc loco addere, Lentiscini olei diuersam ex Palladio confectionem lib. 2. his uerbis ab eo traditam. Grana matura Lentisci, quam plurima colliges, & una die ac nocte supra se a ceruata esse patieris. Deinde sportam granis h̄isdem plenam, cuiq̄ uasculo superpones: tunc ex eo humore qui defluerit, supernatans oleum Lentiscinum, sicut Laurinum colligetur. Me mento autem, ne frigore possit adstringi, aquam calidam saepe suffundere.

De Mastichino oleo.

C A P. L.

Mastichinum e trita fit Mastiche, quod contra omnia uulū ma la efficax est. Mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduer sus prominentes stomahi duricias, coeliacorum, dysentericorumque cru ciatus, utile. Faciem emaculat, & colorem nitidum facit. Optimū in Chio

μασίχινον ἑλακίον

insula componitur.

MASTYCHINUM oleum e Mastiche, cuius species multæ suo loco numerabuntur. Resinam Lentiscinam Dioscorides appellat.

EX M. VERG. COMM.

Miscetur idem ceratis, quæ stomacho, celiciacis, & intestinorum torminibus imponuntur. Græce *πρὸς τὰ περὶ τὸν σμάχον ἐπιρριπτόμενα ἐκκρίσματα*. &c. Qui dicendi modus, nec rei, nec scriptori huic legitimus, aut honestus est, non enim stomacho superponuntur duricies. Cum autem decerneret ille stomachi, alui, intestinorum, & iecoris inflammationibus accommodatam esse Mastychen, facile opinati sumus, ex rei & sermonis ductu, quod erat *ἐκκρίσματα*, quæ uox omnium generum duricies, in humano corpore significat, *κρῶματα*, idest, Cerata, siue Ceromata legendum esse: decreuissq; hunc scriptorem subactam Mastychino oleo, ceram partibus illis imponi, contra earum partium mala, ad quæ ex uiribus suis Mastiche faceret. Indicat Paulus Aegineta his uerbis. Mastiche præsertim ex Chio insula, in secundo calefacit, & siccatur: mitas habet uires, adstringit enim simul & mollit: ideoq; stomachi, alui, & intestinorum & iecoris inflammationibus accommodata est. Aegyptia quadam tenuis nigro colore, siccatur magis et discutit, minus autem adstringit, discutiendis strumis ideo accommodata. Quæ longius cōmentarijs his nostris adiecimus, ut ratio mutatæ uocis a nobis intelligatur: obiterq; illud testemur, confirmari ab eo, quod in hoc scriptore suspectum forte uideretur, cum ait, Mastichē adstringere simul & mollire: quod aduerbiū non temere. sed ex melioribus græcis additum illic a nobis, in quibus legebatur *σύφον ὁμοίως καὶ μαλαροῦν*.

De Vnguentorum ratione. CAP. LI.

DE ratione Vnguentorum consequenter tractandum existimaui: mus. quandoquidem ea in nonnullis corporum uitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt. In quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in quibusdam plane obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia. ut in Amaracino, & Crocino, Telino, & plerisq; alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

BARBARI COROLL.

Vnguenta græci myra uocant, a Myrtha, siue quasi mora, ut Chrysippus inquit, q̄ in fatua ti uino & crapula fere uti soleant unguentis. Etenim cum bellarijs & corollis Vnguenta secundis mensis inferebantur. quod & Socrates apud Xenophontem, ut meretricium accusat, ut uestem ita odorem, alium pudicas, alium impudicas decere prædicās. Lacedæmonij certe unguentarios eiciebant urbe, quasi corruptentes Oleum, quemadmodum & infectores: ut qui candorem uellerum accersitis medicamentis inquinare uiderentur. Prohibuit & Solon, ne quis unguenta uenderet. Proinde Sophocles et Callimachus Veneri speculum & unguenta tribuunt, oleum Mineræ, q̄ illa uoluptati, hoc uirtuti natum esset. Primus omnium Archilochus usurpauit unguenti nomen, hoc est, Myron: & si res Homero quoq; nota fuerit, oleum, non myron appellant. Vnguenta sane, quæ non de floribus, sed de aromatis cōfisciebantur, Thyomata uocabant: quod & Homerus nouit: cum Thethyomenon, hoc est, delibutum eo genere Iunoni corpus fuisse cecinit. Dicuntur & Myromata, non myrisomata. Hippocrates odora-menta, hoc est, aromata & suffitus appellauit. Nomen & a patria unguentis est quibusdam: ut Panathenæicon, Athenis factitatum solitum, & Babylone Babylonicū. Quæq; Appollonius auctoritatem & præstantiam unguentorum non locis, aut regionibus, sed peritiæ artificum, & industria acceptam retulit. Nam Ephesina quondam in precio habebantur: nunc exoleuere. Habebantur & Alexandrina, propter duas Reginas, opibus & luxu diffuentes, Berenicem, & Arsinoem. In Cortyna quoq; diu laudatum est Rosaceum, Berenices maioris temporibus, Cōnathinum Adramyti modice cōmendabatur: postea ob Stratonicem, primum Eumenis nomen obtinuit. Syriacis, præsertimq; Telino summa fuit olim autoritas, sicut & Asiaticis e Pergamo. Vnguentarij occasione Libanotion e Thure cōmendantis: quod antea nuscq; fuisset. Vnguen

d iij

A

De Mastiche
Pli lib. 12. ca-
pite. 17.

B

*

†

D I O S C O R I D I S

Cum porro preciosum innatat in fusum uili, contra mel probum, uitioso mellis additum fideri. Nec omnia sane unguenta omnibus placebant. Quin sua singulis fere partibus corporis erant dicata, ut in Baccari monstrauimus. Infames huius luxuriæ Lydi sunt, a quo Sardianum mundum, Poetæ pro unguentis capiunt. In mentione sunt & Brethyon ex Lydio, pro crasso & pro Anthino quoque acceptum. Et Sagda, siue Psagdan: etiam si Nicander in uerbo Sagdanon unguentum, sed homines effeminatos & profligatos moribus intelligit: alij uero suffimenti genus. Hekæi celebrant, ab inuatore dictum Plagoninon. Athenis unguenti hemina quinque prodo argenti uenibat. Aliqui decem produnt. Unguentum frequens, ut inquit Aristoteles, canicem oblinentibus siccitatis uitio conciliat. Icelius, qui de odoribus scripsit, unguentorum duo facit discrimina. Deliciarum, quod & Chrima, siue Chrisma dicitur. Et uulgare ac promiscuum, & fere palestris dicatum, quod Alima cognominatur, et Aloemon, & Epalelima. De quo uerbo Festus quoque apud nos: unde Aliptes, & Exaliptes, quos nostri unctores, & reuñctores uocant. A grecis frequentius Coniatæ chrisiæ, ac Pædotribæ nominantur: ut qui a limo dictum Epalima, ob uilitatem scripserunt, errauerint, etiam si mediastini, non medicorum ipsi medici reungerent. Habentur & quæ sicca unguenta, hoc est, Ceromata dicuntur: ut liquida, quæ Hygromyza, forminari auribus expetita, Sunt & Moschata, quæ alij Moschomyza, Paulus Moschelea uocauit. In quæ sicut in Arabica quoque unguenta, genus illud quod Arnabone Paulus & Aetius appellant, queritur. Sed quid sit Arnabo, nondum compertimus. De Moscho, siue Musco diximus alibi. In multa odoramenta uenit & Camphora: quam Aetius Caphura nominauit: in eo unguento quod Salca dicitur, axillis & auribus forminarum dicato. Nam & suffimentum Moschatum in eodem Aetio legas: in quod & sandala, & Nuces Indicæ desiderantur, comitante orientali succino. Est autem Nux Indica, fructus ut Mauri putant, Palmæ cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi, Sandalorum uero tria genera, candidum, rubrum, luteum. Camphoræ quaternæ: arboris ea gummi est. In quibusdam locis medulla non aliter prouentu magno, quam si terremotus & tonitrua multa fuerint. Initio maculis rubentibus, post uel calore solis tosta, uel ignium candescit. Inuenio & Alua, et Sarua, & Scylmatis folia, siue Scymatis odores suffumigandis domibus idoneos. Primum in eo thymiamate quod Cyriæ Romuli ascribitur. Sequens in eo, quod ad Embolarchum refertur autorem. Tertium in eo, quod Myrepicon uocatur. Scylma certe hoc etiam ad Calliblepharon probatur Aetio. Nominatur inter suffitus & Masucha, siue Masuaphion a Paulo. Sed ea compositio est, non facultas simplex aliqua. Unguenta sane quæ cera, uel resinam, uel aliquid huiusmodi recipiunt, non Myra simpliciter, sed Myracopa dicuntur: quoniam similia sint acopis. Talia sunt Amaracinum, & Decamyron, a decem rebus unde constat appellatum: sic utique Pentamyron.

D

Idem dicitur

De Rosaceo. CAP. LII.

Rosaceum oleum sic fit. Lunci odorati quinque libras et bessum tun-dito, & subactas aqua in duabus olei libris & quincuncem subinde mouendo coquito. Dumque percolaueris, in olei libras uiginti & quincuncem adijcito Rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, sensim premens. Sinito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illitum recondito. Caterum Rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito: eritque secundarium oleum. Quod si tertias usque, quartasue perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uero secundam adiectionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes Rosas nullo humore imbutas insicito. manibus melle præmadefactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto, simili modo exprimens facito. totiesque recetis Rosas detractis unguibus immittito. si et enim

et enim ita oleū multo ualidius. Nā septies oleū Rosarū infusionē admittit, nec amplius. Prælū melle perungatur. Oleū a succo diligenter secerni oportet. nā si minimū quid relinquat, unguentū corrūpet. Alij autem de tractis unguibus, Rosas tantū oleo macerāt in sole hoc modo. Rosæ quæ selibram pōdere æquant, in sextario olei diebus octo madescūt, & usque tertiā perfusionē quadraginta diebus insolanē, & sic oleū recōditur. Alij Calamo, aut Aspalatho prius olei spissamēta faciunt. Alij coloris caussa Anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. Fomētis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluū, Stomachi odorem restinguit. Vlcera caua replet, & mulcet, quæ Cacœæ the uocantur. Vlcibus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur. Caput dolens eo perfunditur. Dētes inter initia doloris colui prodest. Ad genarum duricias illitum efficax est. Ad laceffita interanea & cōcitas uulvas utilissime subijcitur.

BARBARI COROLL.

Vnguentum Rosaceū, id est, Rhodion Phaseli, maxime diu placuit. Commendabatur & Neapolitanū, & quod in Seplasia Caput diuendebatur: ut inquit Apollonius. A quibusdam addi salem, & anchusam, & rosaceum, & Dioscorides & Plinius autores sunt. Disiunctim hoc fortasse capiendum est, cum ea sit unguenti faciendi regula, quibus anchusa adiecta est, sal uti ne addatur. Simplicissima eius mixtura diu fuit, additis Omphacio, flore Rosæ, Crocino, Cinnabari, Calamo, melle, Iunco, salis flore, aut anchusa, uino. Huic cādidus colos erat. Qui macerant in sole Rosas oleo conditas, uitreis uti precipiuntur. Vnguentū Cyrenis, e Rosa preciosissimum Theophrastus predicat: quoniam Rosa ibi odoratissima sit. Inuentum est, & Rhodomeli facere, hoc est mel, Rosaceum: & aquam Hydrosatā appellatam recentioribus grecorū.

Plin. libro. 20.
cap. 4.

EX M. VERG. COMM.

Quod statim in ipsis foribus uictum se nobis obrulit, huiusmodi est, iubet hic in Rosacei confectio ad olei spissamentum sumenda esse, rotundi odorati lunci pōdo quinque, & uncias octo: statimque subijcitur, sumenda pariter olei pondo duo & quincuncem: nec male, incertoue sensu hætenus, si odoratus ille rotundus luncus spissando huic oleo satis esset: & nisi quod sequitur participium *rotundus*, male rei responderet. Et præter hoc alterum illud participium *quincuncem* nulla ratione oleo competere posset. Qui enim tundi oleum, & macerari aqua potest: quod duo illa participia significant. alterū enim in duris & aridis tantum fit, alterum in his solum dicitur, quorum arescit alterum, liquefcit uero alterum. ut cum dicit Tranquillus, lutum sanguine maceratum, & quotidie auditur aqua macerari farinam. Accedit, quod iniusto pondere, & mala rerum inæqualitate, in spissando humore præcipitur, maiori copia sumi quod spillet, minore autem quod spissatur. Spissatur enim oleum, spissant uero aromata, quæ si copia abundant, non spissare dicuntur, sed oleo dilui. Cogerunt postremo nos, non suspicari iam, sed pro comperto uitium hoc loco habere, quæ plura in antiquioribus aliquot grecis in spissando Rosaceo numerantur. Elenium, quam nos Inulam, angulosum odoratum luncum, & odoratum itidem Calamum. Credimusque, quod oleum statim a rotundo odorato Iunco legitur, non oleum, quod greci *ῥοσάκον*, sed *ῥοσάκον* Inulam, antiquam lectionem fuisse, deesseque alia deinceps, quæ prius aqua macerata, in oleo coquenda essent. tum per colum traiecto oleo, uiginti sic spissati olei pondo, & uncis quinque inijciendas esse Rosas numero mille. &c. Quæ omnia coniectura tantum nostra dicuntur, quam alijs etiam relinquentes, nihil mutauimus, suspiciones, suspicionumque causas diligentioribus ostendisse contenti.

Et quia toto hoc opere passim pōderum mētio est, testari semel id uolumus, si quid maius, minusue, pro rei natura & necessitate dici forte uidebitur, non ideo dammandū esse laborē hūc nostrū. Lubricus enim in antiquis ponderū, & mensurarū notis, ad uitiū lapsus est. Multa etiā in antiquis grecis uarietas, & nos codicū fidem, nō experientiam sequimur, quā medicis relinquitur, quibus licebit semper, ex aliorū decretis, aut iterū facto rei periculo, in melius conuer-

d. iij

B

D I O S C O R I D I S

C tere, quod ex hoc scriptore parū appōsite dictum a nobis fuerit.

ἐλάτινον ἔλαιον

De ELATINO. CAP. LIII

FRACTA Elate, tusa, & scarificata in labellum deiicitur. Omphacinū oleū triduo infundit, mox p̄ sportulā exprimit. Verū pares esse debent utriusq; portiones. dein mūdo uase ad usus recōditur. Viribus Rosaceo proportionē respondet. Aluum tamen non mollit.

BARBARI COROLL.

E Latinum e Palma fit Elata: quam nostri Palmam Abietem uocāt. Dicēda per se, in loco. Lachrymam eius in unguentis misceri tradūt, ad oleū domandū, id est, Symmatis uice: huius & furculos, & lachrymam uocauimus. Abietē certe græci arbore ipsam Elatem & Spathen nominant: lachrymam fere Spathen. In Theophrasto nomen huic unguento, Phoenix.

EX M. VERG. COMM.

A Columella Elate lib. xij. Cortex Palmæ appellatur.

ἐλάτινον μέλιον

De MELINO. CAP. LIIII.

MELinum oleū hoc modo temperatur. Olei congius, decē aquæ serati uncia, quæ die uno macerata coquuntur, mox in uas oris patuli oleū excolatur, & indita harūdinacea crate, aut uetusta tegete, Cotonea mala superponuntur, & uestimentis operata tantisper inibi residēt, dum malorum uires ad se oleū alliciat. Aliqui Cotonea, decem dierum spacio operimentis inuoluunt: ut cōtineatur odor, nec euanescat. Postea biduo macerata oleo, exprimūtur, oleumq; reconditur. Id uim refrigeratoriā & astringentem habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præbet. Exulceratis uuluis infunditur. Citatam urinam sistit inditum. Sudores cohibet. Contra cantharidas, buprestin, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxime quod Cotonea mala olet.

Plin. libro. 23. cap. 6.

BARBARI COROLL.

M Elinum prælatum in Co, cotoneis malis, & struteis fit. Quidam genus hoc, tum demū in unguentum trāsire perhibent, admixtis cyprino, sesamino, balsamo, cassia, abrotono. Quæritur, uti ne in humidis nata fiat, quæ in hoc parentur: Ideo utilissima esse quæ in Sicilia nascantur. Minus probari Strutea, quamuis cognata.

οἰνάνθινον ἔλαιον

De Oenanthini compositione. CAP. LV.

OENāthe elabrusca, optime olēs postquā emarcuit, deiecta in Omphacinum oleum mouetur, uoluiturq;: & cum biduo manserit, exprimitur: oleum reconditur. Astringit, proximum Rosaceo effectum præbēs, sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore Oenanthem refert.

Pli. lib. 17. ca. 1. & 23. ca. 4.

BARBARI COROLL.

O Enanthinum in Cypro, deinde in AEGypto, prepositum est ex Adramytto. De Oenanthē in loco agetur. Sit hoc unguentum idem cum Anthino, ab Hippocrate uocato, muliebribus malis utile, an diuersum, & Anethinum potius, non liquet. Alioquin uidetur Anthinum dici posse unguentum omne, quod ex floribus componitur lilio, narcisso: rosa, iride. Cuiusmodi maxime in Boeotica Cheronea fingeantur, cōmēdara Pausaniæ. Vinum potro Anthinē, siue Anthinon, aliud est q̄ uinum Oenanthinum: ut in uua Oenanthē diximus. Vn-
guentum

guentum Oenanthion, etiam Oenantharion dici posse, testis est Paulus, qui nō eo nominatū putat, q̄ accipiat Oenanthem, cum sæpe fiat sinte ea, sed a uino, & floribus Lilij. Vtebantur, inquit, hoc ueteres a balneis, spargebant eō mensas, & nāres linebant, & contra pestilentiam ualere iudicabatur: præsertim Possidonianum, cognomento Mesopotamites.

De Telini componendi ratione. CAP. LVI.

Foenigræci libræ quinque, Calami libra una, Cypiri libræ duæ, olei libris nouem: septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur. Aliqui pro Calamo, Cardamomum substituant, & Cypiri loco, Xilobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato, Fœnum græcum macerantes exprimunt. Hoc Telinū ab scessus emollit, & concoquit. Omnibus uuluarum duricijs magnopere cōuenit. Fœminis difficile parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem cōtraxerūt. Sedis inflammationes lenit. Tenesmo subditum prodest. Vlcerā capitis manantia, fursuresq̄ expurgat. Ambustis & perionibus addita cæra proficit. Vitia cutis in facie emēdat, Pigmentis ad conciliandū faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recens, quod nō uehementer Fœnigræci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato. Tale enim optimum iudicatur.

BARBARI COROLL.

Telinum e Silicula, id est, Fœnogræco nomen rationemq̄ habet. Addebant huic & mel, & feram campanicam, & cypirum, & mellum, & maron, & amaracū. In Telo insula etiam Menandri gate celeberrimum. Quid sit Mellum Plinio, quod & in uina fictitia, & in Susinum addi meminit, haud ita dum inueni. Forte non Mellum, sed mel in his locis scribendum sit. Nam Amellum, de quo & Virgilius, & Columella, frutices fert apibus gratissimos, aureo ac luteo colore: ab imo foliosos: floribus purpureis, aspero gustu: cuius radices succus egroto examini cum Amineo uino dari præcipitur. Dicitur uero Amellum, q̄ pastores cum curua legant, prope flumina Mellæ: is Galliæ amnis est. Quæadmodum a Lemano lacu, Alemani, ut Seruius existimat. Est & Amilla flos apud græcos auctores quosdam, gallico uocabulo: herba ea quæ uocatur Anthenis: siue Chamemilon: ut forte Amilla, uel idem, uel similis sit Amello, nihil asseueramus, sed in medium posuisse nihil officit.

EX M. VERG. COMM.

Id q̄ in extrema Capitis huius coronide est in græcis, *σύνχει τὰς χείρας*, id est, manus absterges, eodē modo in cunctis eius gentis codicibus legitur, nec nisi manus ea uoce intelliguntur. Oborta tamē suspitio nobis est, nō *χείρας*, i. manus, uerū *τρίχας*, i. capillos legi oportere. Suspitionis huius causam nobis fecit, q̄ in Fœnogræci historia, & medicina, quæ secūdo uolumine tractabitur, idē hic scriptor ait, *σύνχει δὲ καὶ τὰς τρίχας καὶ πύματα καὶ ἀχώρας*, quod est, abstergere Fœnogræco decoctū, capillū, fursures & capitis manantia ulcera, omnia eius partis uitia, ideoq̄ deinceps numerata, quibus uerisimile est, nō debuisse misceri manus. Ex eadēq̄ tri credimus, hunc nō manus, sed capillū Fœnogræco unguetō abstergi præcepisse. Nisi quod in unguetō est bene, quod autem in Fœnogræco male legatur, sitq̄ illic, non hic uitium. Nobis capillum legi magis placet. Non enim uidemus, cur, solam manus cutem abstergere hoc possit, reliqui uero corporis consimilem illi nequeat. Suum tamen cuiq̄ iudicium sit.

De SAMPVSCHINO. CAP. LVII.

Serpilli, Casiæ, Abrotoni, florum Sisymbrij, frondium Myrti, Sampsuchi singulæ portiones, quadam pro uiribus singulorum cōiecta tione, una tunduntur. atque is Omphacini olei modus adiicitur, qui ma dentium uires non euincat. Hæc post quadriduum exprimuntur. denuo alia, simili mensura & aequali tempore macerata premuntur. ita enim ualidius

A

τὴν δὲ τὴν

Plin. u. cap. 1.

B

σύνχει τὰς χείρας

Clidius reddi solet. Eligi oportet Sampfuchum colore nigrū, plurimū re-
dolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem.
Aduersus uulvæ præclusiones, conuersionesq; efficax est. Menfes & se-
cundos partus extrahit. Vulvæ strangulatus recreat. Lumborum, ingui-
numq; dolores lenit. Sed cum melle uti eo præstat: quādoquidem uehe-
menti astrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit. in opistho-
nicorum, uulforumq; cataplasmata utilissime additur.

B A R B A R I C O R O L L.

Sampfuchino Calamus accessit. In Cypro, & Mitylenis optimum, ubi plurima Sampfu-
chus. Differt hoc Dioscoridi ab Amaracino: q; aliæ res in Sampfuchinū, aliq; in Amaracinum
quærantur. Dubitationem Pliniana uerba faciunt. E Sampfucho inquit, oleū fit. quod Sam-
pfuchinum uocatur, aut Amaracinum.

VERG.
Pli. 22. cap. 22.
& 111.

Nota omnibus in quotidiano sanitatis usu Amaracus est. Eam cōmuni appellatione græ-
ci Sampfuchū neutro genere uocāt: nec certe differunt, nisi diuersarum gētiū nominibus.
ut in historia eius in tertio uolumine certius patebit.

Eligito Sampfuchū, qui colore nigro in uiridi fit. In cunctis fere græcis legitur. *μαδάχρον*. Nos
meliori codicū fidē secuti, atq; naturam rei & sensum, *μαδάχρον*, qd' nihil significat aliud, q̃
cōiunctos mistosq; simul colores duos. q; a nobis, ut legi, in uiridi nigro colore, redditi sunt.
Et fortis. Adieciimus eadem fide, & fortis. quoniam menfes & secūdas trahere dixit.

De Ocimini compositione. CAP. LVIII.

μαίμινον

Ocimum oleum fit ut Cyprinum. Ocimi folia detrahens libra-
rum undecim & beſſis pondo, die noctuq; uiginti olei libris ma-
cerato, premito, colato. Cumq; exhauseris quallum, rursus parē olei mo-
dum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium, nam tertiæ
perfusionis non est capax. Deinde recens Ocimum æquali pondere, ut
in Rosaceo diximus, maceratur: & cum tanto temporis spacio maduerit,
Dexprimitur, & oleum reconditur. Quod si in animo fuerit, ter, aut quater
madefacere, semper Ocimum recens addes. Potest ex Omphacino con-
fici, sed illo modo melius. Idē qd' Sampfuchinū potest, sed inefficacius.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod hic a principio statim dixit, confici Ociminū oleum Ligustrino, similiter ad spissa-
mentū & odorem olei pertinet, id est, præparationem illā, de qua longius non mul-
to ante egimus, breuitatisq; causa ad alterius unguenti rationem olei spissamentū, in hoc Dio-
scorides reiecit: patetq; id quod nullis in hoc aromatis oleū præparat, quod alioqui cōmune
omnibus fere est. Indicatq; id aperte, qd' in capitū extremo calce additū est, posse & ex acerbo
oleo Ocimum fieri: quali dicat, non posse simplici oleo Ocimum fieri, sed aut spissato Li-
gustrini modo, aut ex maturis oliuis expresso faciendum esse. Qualis autem Ligustrini spissa-
tio & confectio quondam fuerit, certius non multo post patebit.

De Abrotonini compositione. CAP. LIX.

αβροτονινον

Olei Cyprini odorib. imbuti libris nouē et quincūce, foliorū Ab-
rotoni libras octo, die noctuq; madefactas, premito. Quod si in
longum tempus oleū uelis asseruari, eiectis prioribus folijs, noua appo-
nes, & macerata exprimes. Calfacit. Ad uulvæ duricias, præclusionesq;
efficax est. Menstrua & secundas pellit.

De Anethini compositione. CAP. LX.

ανηθινον

Olei libris octo & dodrante, florū Anethi libras undecim & beſ-
sem maceratas, manibus premito, & recondito. Quod si iterum
perfundere

perfundere uelis, recentes Anethi flores consimiliter madefacito. Vulua **A**
rum duricias emollit. Venarum spiracula laxat. Contra rigores febrium
circumitu redeuntes auxiliatur. Calfacit enim, & lassitudines discutit.
Prodest articulorum doloribus.

EX M. VERG. COMM.
Acerbum, in aliquibus græcis in unguento hoc quæri oleum, præcipitur. Sed an cōfectio
nis eius antiqua hæc ratio esset, incertum nobis. Id genus olei certe quōdam laudatissimū fuit,
& inter unguenta facile receptū. Paulus Aegineta utitur eo cōtra uigilias ad somnū. Et in ad-
strieta cute corporis, iubet eo inungi, præsertimq; ex uiridi Anetho confecto.

¶ De Susini compositione. CAP. LXI.
Susinum, quod alijs Lilinum appellant, sic temperatur. Olei librę no-
uem cum quincunce, Calami librę quinque & quadrans, Myrrhæ
uncie quinque, permixto odorifero uino decoquuntur. & colato oleo,
Cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti librę tres & semis macerantur,
premunturque. Tres librę cum semisse spissati olei assumuntur. Mille Li-
lia decerpitis folijs in latum labellum demittuntur. Iniectum oleum, manis
bus melle punctis agitur. die noctuque cōquiescunt, & in pixidem ma-
tutinis exprimuntur. Oleum protinus ab aqua, quæ simul expressa fue-
rat, colo incerni oportet. Non enim ut Rosaceum moram tolerat. Nam
concalfactum feruet, & computrescit. Quare sæpius decapulandum. Va-
sa melle illinenda. Tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis faucis
bus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis, ex quasillo in label-
lum transfusis, rursus olei prius odoribus imbuti, quod primum pon-
dus æquet, & Cardamomi tusi drachmæ decem coniunguntur. Hæc ma-
nibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur. Quod profuit re **B**
purgatur. tertio eadem infunduntur, adiecto Cardamomo & sale, & ma-
nibus melle madefactis. Longe optimum erit quod prius exprimitur.
Proximum quod sequitur. Tertium locum sibi uendicat, quod nouissi-
mum prodijt. Denuo in mille Lilia euulsis folijs, expressum primo ole-
um infunditur. Tum porro prosequendum, eademque facienda ut pri-
us, addito Cardamomo, dein expresso. Et quo frequentius recentia Li-
lia maceraueris, eo ualidius unguentum efficies. Deniq; cum factum ab-
unde uidebitur, singulis compositionibus miscere conuenit Myrrhæ q̄
optimæ duas & septuaginta drachmas, & Croci decem, Cardamomi
quinque & septuaginta. Croci uero & Cinamomi pares portiones tun-
duntur, & cribrate in labellū cū aqua demittuntur. Expressumq; primo un-
guentum infunditur. & paulopost excipiuntur, uasculis siccis Myrrha, aut
gūmi antea perfusis, & Croco, melle & aqua madefactis. Eadē fiunt in al-
tera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex Balanino, alioque oleo, et Li-
lijs componūt. Optimū esse cōstat in Phœnice, mox Aegypto factum.
Sed cū primis laudatur qđ Lilia redolet. Excalfacit. Emollit. Vuluæ præ-
clusiones laxat, & collectiones aperit, Vtilissimum ad muliebria mala.
Vlcera

D I O S C O R I D I S

C Ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, fursuresq; emendat. Vibices, cicatricesq; celerrime ad colorem reducit, ita ut sepe fallant. In summa, extenuat. Potum bilem per aluum extrahit. Vrinam ciet. Sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Plin. lib. 13. ca
pite. 1.

B A R B A R I C O R O L L.

Svinum omnium tenuissimum est. Hoc & Phyllinon, & Lilion, & Liliun & Lirinum, & Lirium (ut Galenus inquit) & Syrium quoq; uocabatur: & Cinnomyron. Vnguinosum erat hoc, & e Lilio quoq; sub diuo, sole, luna, pruina maceratū, fiebat. Ipse quoq; succus floris Lirium dicebatur, atq; mel. Lilia purpurea, oleo faciendo, maxime præferuntur, quæ in Syria & Pifidia Pamphiliæ Dioscorides cōmemorat. Hinc Syrium appellatū crediderim. Nūc omnes fere succi, unde Syrupi uulgo, nam Syrupa Oliuæ condiendæ genus est Columellæ. Sulinum porro dicitur, a Suso, quod Liliun significat. Vnde Susa Persarū regia, ut inquit Athenæus, ob amoenitatem uocata fertur. Theophrastus Liliun Aegineticum, & e Cilicia cōmendat.

E X M. V E R G. C O M M.

Svinum. Testantur Græcorum Lexica, ex Lilijs factum unguentum, Sulinum dici, nullā tamen eius nominis causā & originem docent.

Sunt qui Crininon. Manifestum hoc habet intellectum. Crina enim Lilia uocant. Excolatoq; oleo Cardamomi tusi, &c. Græce, ὡς ἀπὸ κρίνου καὶ καρδάμου: Nos deflexo in certiorē sensum, rerū & uocum ordine reddidimus. Nulla tamē melioris codicis fide adiuti, sed sola usus, necessitasq; in ea coniectura: quæ quam uera sit, peritorum centuræ æstimandum relinquamus. Nobis, ut aliquam rationē harum reddamus, uisum est, bis diuersa spissatione iubere Dioscoridem, ad Liliun unguentum præparari oleū. In prima, odorato Calamo, & Myrrha, quæ uino prius macerata, in oleo coquenda sunt. absolutaque coctura, & excolato ab illis oleo. In secunda Cardamomum injici præcepisse, & cum aliquādiu in illo oleo maduerit, exprimi, &c.

D Post hæc translatis in labrum ex fiscelli expressis aromatis, &c. Non satis certū habet ex uerborum ordine sensum, facilis tamen rei cōiectura est. Iubet enim Dioscorides, iudicio nostro, ut minore sumptu, maior olei copia spissetur, expressis semel aromatis illis superinfundi rursus oleum, sic iterum, tertium, & quartum faciendum esse. Credimnsq; participium quod illic est ἀρωματισμὸς, quod aromatis odoratum significat, abundare, aut pro præterito futurum legendum esse ἀρωματισθῆναι, scilicet, quod odoratum significabit, unaq; hac uoce tantum mutata, facilis sequaxq; totius rei deinceps intellectus erit: quod signasse satis sit.

Reliquimus præterea ab hoc loco statim, quod instaurari, impleriq; a nobis nō potuit, nec debuit. Priuationis enim nulla est mensura, periculosaq; temeritate, quod sic deest expletur, facillimumq; omnibus erit ex græcorum codicum lectione uitium deprehendere. Numero enim plurali inceptū mēbrū, singularis numerus excipit, miscetq; adeo sensum & incerta reddit quæ sequitur, ut nihil nobis eo loco cōmodius uisum fuerit, quā relicto hiatu aliq, legētes uitii monuisse, ut aut cognitū nō fallat, aut instaurādo eo felicius posthac laborare aliquis cogitet.

expirativ

De Narcissini compositione. CAP. LXII.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt. Sex libræ Aspalathi cum sextante tunduntur. Olei eloti libræ septuaginta cū uncis quinque assumuntur. Aspalathus aqua madefactus, in tertia Olei parte coquitur, quo exempto, Calamus quinque libris & besse, cum Myrrhæ gleba contunditur: cribratusq; ac uino ueteri odorato immixtus decoquitur: simul ac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. Refrigeratum Oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, Flores Narcissi q̄ plurimi conijciuntur, qui bidui spacio, utin Sulsino dictum est, permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum. siquidem celerrime putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas uulvæ duricias, præclusionesq;: sed capitis dolores facit.

De Crocini

BARBARI COROLL.

Narcissinum ex Narcissi flore componi, desijt Plinij ætate. Id de unguento eius dictum accipio. Nam de oleo Narcissino medicinas idem Plinius persequitur.

EX M. VERG. COMM.

Variant Græcorum antiquissimi codices, quo loco hic ait, *νόστος καὶ ἐρίσας ὁ δὲ τῷ τρίτῳ τῆς ἰατρικῆς*. Indicant enim alij sensum, qui sit, Aspalathum coquendum esse in tertia olei parte: quod sine causa dictum uidetur. Cur enim, 70. pondo olei hic accipi iussisset, si tertia tantum partis futurus erat usus? Alij concinniores ostendunt sensum, qui sit, ad olei tertias sumendam esse aquam, in aqua Aspalathus maceretur. Quæ lectione rei magis congruentē nos secuti sumus.

Non habet deinde certum pondus, quod nos diximus, Myrrhæ grumum. Intelligenda tamen in eo, ea quantitas est, quæ exigua potius quam grandis sit. Siquidem græci *χρόνους*, dicunt in sale exigua frusta, & quasi quantum fumis contractis in unum digitis capere aliquis possit. Tota res in coniectura unguentarii posita erit.

Credimus præterea deesse olei pondus, quo loco ait. Sumito postremo ex oleo. &c. Non enim decernit quantum olei sumi oporteat. Nisi forte & hoc in eiusdem coniectura relictum fuit. Erant & alia de Narcissi flore dicenda. Sed omnia quarto uolumine in hystoria eius copiosius dicentur.

De Crocini olei compositione. CAP. LXIII.

Cum Crocinum componere uoles, prius olei, ut in Sufino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus & mensuris. cuius olei, libras treis & semissem, Croci unciam unam assumes. identidem in die moto. & sexta die quam hoc assiduo peregeris, oleum a Croco colis incernito. Eidem Croco parem olei modum adijcito. Moue triduo. Dein contusa Myrrhæ atque cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitans recodito. Aliqui parem Cyprini portionem oleo aromatibus ad Crocinum imbutum adijciunt. Optimum est quod abunde Crocum spissat, in medendi usu expetitum. Proximum, quod Myrrham refert. Calidum facit. Somnū allicit. Quare per sæpe phreniticis subuenit, aut perfusum, aut naribus admotum, aut illitum. Pus mouet. Vlcera purgat. Contra uulnæ duricias atque præclusiones, & ulcera quæ cacœthæ uocantur prodest, cum croco, cæra, medulla, duplicato olei pondere. Concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet. Ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem simile est Butyrinum, Onychinum, & Styracinum: quæ & si nominibus distant, uiribus & compositione cognata sunt.

BARBARI COROLL.

Crocinum, in solis Ciliciæ diu laudatum: mox Rhodi. Additū huic & Cinnabari, et Anchusa, & uinum. Theophrastus & ex Aegina commendauit.

EX M. VERG. COMM.

Inclinat antimus nobis, quod in omnibus græcis pariter legitur, eidemque Croco par olei pondus superinfundito, non sic, sed contra legi oportere: mutataque inuicem a libtarijs, aut imperitis Medicis, oleum & Crocum fuisse. nullam enim id causam habet, rationemue, cur sic facient. Si quis autem multo rerum ordine legat, eidemque oleo, par Croci pondus superinfundito, commune alijs confectionibus causam & rationē ostendet, ut geminata scilicet Croci quantitate, maiores continue & efficaciores uires Crocinum acquirat unguentum.

Confidentius non multo post literas mutauimus aliquas, quo loco hic ait, *ἔνιοι δὲ τὸ τρίτον καὶ ἐρίσας*, quod significat, sunt etiam, qui par Cyprinum oleum. &c. Instauratusque a nobis certiore sensu sic locus est, *ἔνιοι δὲ τῷ ἑνὶ καὶ ἐρίσας*. Quod est, sunt etiam qui ad Ligustrinum unguentum aromatis, &c. Neque enim aliter intelligi res potest. Quemadmodum Paulo ante etiam quod erat, *καὶ ἐρίσας* in ὀλίγω χρόνῳ, quod est, in pila, seu mortario misceto, non pilam, mortariumue

A

Pli. 21. cap. 19.

κρόνους

B

D I O S C O R I D I S

C diximus, verum in oleo, quod uerisimile erat, cogitantes, pro *λαιον, ελαιον* factum esse. Qui enim sensus potest esse, & quis rei usus, si quis tusam et excussum cribro myrrham in mortario misceat? Quod enim mortario erat tusum, iam et cribro excussum erat, nec bene sumi, et in mortario secundo mortarii usus est. Miscetur autem oleo bene, quod tusum iam est. Nec aliter, si quis locum bene odoretur, intelligi res poterit. Barbarus in cunctis his comunem lectionem secutus, qualia se illa ostendebant, talia etiam uertit.

Styracinum, id est, ex Styrace.

Butyrium, ex butyro, quod ut apparet olim pro oleo adhibebatur, miscebaturque his quae suppurationes adiuuabant.

Onychinum, ob Onyche in testaceo genere pisce, cuius adeps pro eodem oleo in usu erat. Indicauitque id Plinius lib. 22. cap. 6.

O De Cyprini spissamento & olei compositione. CAP. LXIII
 Olei Omphacini eloti pars una, aquae coelestis dimidium, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis amiscetur. deinde assumptis Aspalathi libris quinque & semisse, Calami libris sex & semisse, Myrrhae libra una, Cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouem & uncijs quinque. Aspalathus tusus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec efferuescat. Myrrha autem uino uetere odorifero subacta, contusaque Calamus digeruntur in offulas, quae exempto Aspalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato aharno, oleum percolatur. Cardamomum tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla dum refrixerit interpellatione. Post haeccolato oleo, in uigintiocto libras olei, floris Ligustri, quod Cyprum uocant, sex et quadraginta librae cum besse instillantur, quae sufficienter madefactae, per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem florum pondus inieciunt simili modo prematur, & iterum, aut tertio si quis uelit madefacere, poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui Cinnamomum addunt, Calfacit. Emollit. Venarum spiracula laxat. Vulgus, neruorumque uitij conuenit. Pleuritidis, fractusque, per se, uel Cerato imistum. Malagmatis imponi solet, quae opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationique inguinum opitulantur. Item acopis.

Pli. li. 15. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.
 Cyprinum, in Cypro commendatissimum: deinde in Aegypto. Huius et Abrotanum quidam adijciunt. Alij Panacem. Optimum postea Phoenicium, & Sidone fuit, mox Aegypto. Si non addatur Sesaminum oleum, durat quadriennio. Excitatur Cynamomo. Viris dicatur Cyprinum & Rosaceum. Colos Cyprino candidus Theophrasto, uiridis Plinio. Precium in libris quinque. E Cypro Canopica, in ripis Nili nata, laudatissimum. Ascalonem, Iudaeae proximum. In Cypro tertium. Ita mutatur saepe autoritas. Unguentum ipsum a Theophrasto, non Cyprinum, sed Cyprus quoque dicitur. Nam Cyperinon, & Cypero, quae Cyclades fuerunt insulae, componitur, Euetricon, a Theophrasto nominatum.

E X M. V E R G. C O M M.
 Desyderatur in hoc capite certum temporis spatium, quo dimittendo in oleo flores illi essent. Idque non minus, quam cetera monuisse oportebat. In antiquo sane Dioscoride latino, notum & diem adhuc legimus, quod tempus, implendis oleo floribus, miscendisque simul uiribus, satis fore uidetur. Sed nescimus, quanta illi fides habenda sit. Qui id agent, sagaci coniectura utantur, obseruantque, ne breuiore tempore, abortiuum fiat unguentum, longiore uero referuant, & uiscentur humentes & succosi flores.

Quod si

Quod si copiosius facere uoueris. &c. Non caret suspitione hic locus. Credimusq; comparatum nomen *πλιν* quod illic est, aut aliud quiddam fuisse, quod non copiam, sed efficaciam, & uires significaret, aut uocē aliquam deesse, quæ illi coniungeretur. Verbi causa, *πλιν*, ut esset sensus, quod si maiores uires illi addere uoueris. &c. Eo enim, non ad copiam pertinent quæ sequuntur, ad quas augendas uires, nō bis tantum, sed ter flores addi etiam iubet: causamq; ipse adfert, efficacius ea ratione fieri dicens. Nihil tamē his quæ passim leguntur addidimus, commentatione hac nostra, quod desiderari potuit, explentes.

De Irini spissamento. CAP. LXV.

Spathæ quam minutissime contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, aëreo uase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit. postea in craterē melle oblitum colato. ex eo aromatibus imbuto oleo, Irinum primo temperatur, macerata Iride, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septuaginta libris & quincunce, Xylobalsami, ut dictū est contusi, libras quinque & sextantem excoquito. Postea detracto Xylobalsamo nouem libras & dextantem adijcito, & Myrrhæ glebam uetere uino odorato perfusam, & in olei odoribus imbuti quatuordecim libris tantum dem tussæ Iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue et uehemēter distringito. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio maceratum exprimito. Longe optimum est, quod solam Irin olet: quale est in Perge, in Pamphilia, & Elide Achaïæ natum. Vim habet calfactoriam, atque emollientem. Crustas adimit. Sordida ulcera & putrida purgat. Confert fœminis uulue affectionibus obnoxijis. Item inflammationibus eiusdem atque præclusionibus. Partus eijcit. Hæmorrhoidas laxat. Contra aurium sonitus ex aceto, Ruta, et amaris nucibus, prodest. Diuturnis destillationibus naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas ozenas uocant, auxiliatur. Aluum purgat cyathus epotus. Facit ad llei cruciatus. Vrinam mouet. Difficileis uomitiones adiuuat, perunctis eo digitis, & immisissis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum induntur. Anginæ etiā illinitur, aut ex aqua mulsa, gargarisatur. Item contra faucium scabritiam. Datur ijs qui Cicutam, Coriandrum, aut uenena Fungorum hauserunt.

BARBARI COROLL.

Irium Corinthi, postea Cyzici placuit ipsa quoq; per se Iris illyrica nobile unguentum facit. Sunt qui unguentum hoc, Catirion quoq; uocent.

Pli. li. 13. ca. 2.

EX. M. VERG. COMM.

Quam hic Achaïæ Elidem dicit, Arcadiæ credimus legendum esse. Illi enim, non Achaïæ, altera a geographis Elis assignatur. Quæ uero Medici uiserunt, græci *ἰχθυή* narrant, relictas ab igne carbonis modo & colore crustas.

Nec sunt paulo post, Ruta & Amygdalæ a nobis instillari dictæ, nisi etiam succo & oleo intelligendæ. Sic em̄ hic docere multa consuevit, medicis necessitatem usus in tractatione cognoscendam, relinquens.

De Gleucini cōpositione. CAP. LXVI.

Gleucinum absolute constat Omphacino, Iunco, Calamo, celtico Nardo, Spatha, Aspalatho, Sertula campana, Costo, & Mu-

πλαστικόν

D I O S C O R I D I S

Csto, circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata uinum & oleum cōceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, cohibet. Rigoribus, & neruorum, uuluaq; uitijs auxiliatur: omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Pli. li. 27. ca. 4.
Colu. lib. 12
cap. 51

B A R B A R I C O R O L L.

Gleucinum dictum est, quia ex musto conditur: ab alijs Mustum incoquitur, uapore lenito. Alij permittunt, sine igne consumatur oleo mustum: alioquin non Sampsuchum tantum admiscant, sed preciosiora quoq; odoramenta.

E X M. V E R G. C O M M.

Alteram, diuersamq; ab hac fuisse quondam Gleucini confectiōem, hic ipse indicat. Et Columella libro. 12. capite. 51. copiosiore eius confectiōem indicat. Postremo Plinius, qui libro 27. capite. 4. de Gleucino agens cōtra Dioscoridis decreta, astringere Gleucinum et refrigerare dixit, aut manifesto errore, quod in re tam manifesta non facile credendum est, aut de altero Gleucino eas uires testatus. Ea nulla haecenus in graecis inuenta a nobis est. Desyderauimus etiam Musci olei, aromatatumq; illorum mensuras & pondera: poterit tamen qui id nouisse cupiat, ex Columella eodem capite uestigia eorum aliqua odorari.

De Amaracino. CAP. LXVII.

in uag. diu. 1707

Amaracinum longe optimum in Cyfico fieri solet ex Omphacino & Balanino, spissamentis e Xylobalsamo, lunco odorato, & Calamo factis, ascitaque suauitate Costi, Amomi, Nardi, Casia, Carpobalsami, & Myrrhae odoribus. Aliqui, quo preciosius fiat, Cinamomum addunt. Mel autem & uinum assumuntur, hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit. Soporem mouet. Venarum spiracula laxat, Emollit. Feruore excitat. Vrinam cit. Putridis ulceribus ac fistulis perquam utile, necnon humētib; hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit. Crustas, & tetra ulcera, quae theriomata uocant, rumpit. Difficili urinae illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur. Haemorrhoidas illitu soluit. Vuluae subditum menstruos curfus euocat. Duricias, ac uuluae tumores, discutit. Vulneratis neruis, lacertisq; confert, leniter astringentibus madefactum & impositum.

Pli. li. 21. ca. 22

B A R B A R I C O R O L L.

Amaracinum duplex, uulgare, & quod priuatim componebatur in Co: cui & nomen peculiare inditum Hedychrum: ideoq; seorsum agitur de utroq; quanq; non distinguat Plinius. Laudabatur & e Melo insula, ut scribit Apollonius. Hedychrum a colore dictum uideri potest, quoniam Theophrastus infici hoc tradidit radice Syria, quā Chroma uocant: unde Chromasius forte color nomen uulgo traxit. Quamuis & alia originem dicemus in Saxifraga. Meminit & herbae cuiusdam Syriae uocatae Aristoteles, quam Theodorus Suriam cōuertit. In Columella radix Syria, genus quoddā, ut nonnulli tradunt, Rhaphani significat. Et in carmine Assyriam radicem uocauit, quam Zythum commendari cum Lupino macerata cecinit. Ipsius quoq; Amaraci Cyzicena succo preciosum unguentum fiebat. Paucarum, ut ait Plinius, accessione specierum, melle, salis flore, omphacio, agni folio, uel ut quidam legunt, agno, polea, panace. Plinius & alij Amaracum hac parte pro Sampsucho uolunt intelligi, ex quo Amaracina unguenta nominentur. Seruius grammaticus, Puer fuit inquit unguentarius Amarcus, qui casu lapsus, maiorem ex confusione odorem creauit: unde optima inquit unguenta dicuntur Amaracina. Alioquin Amaracus proprie Galeno & Paulo, est herba illa quae a Dioscoride Parthenion uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.

VNum idemq; olus Amaracus, & Sampsuchum est; non eadem tamen ubique bonitas, & unguendi

unguenti ex eo confectio. Neq; idem omnibus locis nomen. Omnis fere græcia Samsuchum, Cyziceni, hoc ipso autore in eius historia, Siciliaq; & ut in uicino sit, Sicilia propinqua Italia, Amaracum uocant. In Cyzico & Cypro laudatissimum, probatissimumque nascitur. Et si Plinius Cyprium tantum laudauerit, communiterque tota Græcia, sed minus probatum preciosumq; ut supra traditum.

Quotidianum eius unguenti usum in delicijs fuisse, Lucretius indicat cum canit. Aut Amaracini blandum, Staeteq; liquorem. Et in plebe notissimum prouerbiū. Quid cum Amaracino sui? Multum & ubiq; notum hoc olus est. Rura nostra Persam, reliqua omnis fere Italia Maioranam appellat, quæ appellatio in Græciam aliquando perlata, historiæq; huius scriptoris, pro romano nomine inserta, uera esse ostendit, quæ a principio de appellationibus his dicta a nobis fuerunt. Creuisse scilicet, per tempora earum numerū, adijcientibus continue medicis, herbarijsque codicibus suorum temporum, suæque gentis, & alienas appellationes. Nomen enim Italiae id nomen est, ideoque historiæ Samsuci, non a Dioscoride, sed a posterioribus additum est.

De Megalino. CAP. LXVIII.

Factitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum Amaracino eadem erat, sed Resina exuperabat, excellebatq;. Quare leuiter emolliebat. Resina unguentis, neq; tutelæ, neq; uoluptatis gratia adijciebatur, sed coloris crassamenti q; causa. Ea tantisper coquebatur, dum desineret olere. Cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de Resina differemus.

BARBARI COROLL.

Megalium propter gloriam appellatum ferunt, q; excusserit Telinum, ante se cantatissimum. Alij, ut a Megalio inuatore, qui Siculus, siue Atheniensis fuerit, existimant. In qua sententia & Aristophanes, & Pherecrates, & Stratis, comici Poetæ sunt. Huic nonnulli & Casiam asceiebant. Huius proprietas, ut uentiletur in coquendo, donec olere desinat. Rursus refrigeratum, odorem suū capit. Iulius Pollux & Metallicon, a Metallo Siculo inuatore celebrat. Nisi quis mendose, pro Megalio, scriptum Metallicon existimet.

EX M. VERG. COMM.

Ab honore, qui unguento huic ob feliciorē eius usum a ueteribus datus est, *μεγαλίων* græci uocauerunt. Nec aliud Plinius indicauit dicēs, propter gloriam sic appellatum fuisse. Idem. Excepta, inquit, resina, Amaracino erat quondam primæ bonitatis æstimatum, mox damnatum, meliore, & aptiore Amaracini confectioe iauenta, qualem hic paulo ante duobus capitibus tractauit.

De Hedychroo. CAP. LXIX.

Quod Hedychroon uocāt, in Co fieri solet, eisdem præditum uiribus & misturis, quibus Amaracinum, sed suauius spirat.

BARBARI COROLL.

Hedychrum, & Hedychroon, a coloris hilaritate dictum, ut præfati sumus. Idem uidetur esse cum Amaracino, nisi q; nomen hoc proprie habet in Co, ubi nobilissimum. Hinc prouerbio locus. Nihil cum Amaracino sui, ut est apud Gelium. Inuenio & in Theriacen, requiri Hedychroon: quanquam diuersa eius compositio probatur. Andaracoron, peruerse appellant Arabes. Ingrediuntur in Hedychrum, ut græcos sequamur, asarū, amaracus, aspalathus, carium semē, calamus odoratus, iunci flos, xylobalsamum, opobalsamum, phu ponticum, cinamomum, costum, myrrha troglodytica, feniculum, spica nardi, anomum, mastiche, uinū uetus odoratum.

EX M. VERG. COMM.

Nobilissimum in Co unguentum hoc quondam fiebat. Incertum tamen, quam nam hic

A

μεγαλίων

B

Pli. li. 13. ca. 10.

ἡδύχρον

D I O S C O R I D I S

C Co dicat an Hypocratis patriā, & Cariam quondā, autore Stephano appellatam: an in Aegypto ciuitatem eodem nomine, cuius idem meminit auctor, et quam antiquiores aliquor greci, maluisse uidentur, in quibus adhuc legitur, *οὐκ ἔστιν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ*. Quod sequentis storia hic ait, *οὐκ ἔστιν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ*, quod est, conficitur in Aegypto etiam: cuius tamen nec

A coloris nitore & hilaritate Hedychoon factum huic unguento nomen est, neque in ratio ne nominis dubitandum. Illud potius querendum, an sic uocaretur, quia haberet ipsum, an magis, quia in alijs coloris eam hilaritatem faceret. Si cōfectio eius, & quae id aromata, semina, multa; alia ingrediebantur a grecis tradita, diligentius expendatur, nihil erit quod ab egregia expectari possit. Inclinat ob eam causam animus, quoniam his, qui eo inungerentur, coloris bonitatem & nitorem adderet, sic quondam ueteres id nominasse, rarumque, aut nullū eius in ra est, docuerit ne tam breuiter de eo Dioscorides, an posteriores medici, quia sanādis morbis te his uerbis rem absoluūt in sua l'agoge. Quaecumque autem ad meliorem uultus speciem inungonici lenocinij propria sunt. Quibus manifeste ostenditur, facere in homine, non habere in se coloris hilaritatem Hedychoon.

Capite de oculorum medicamentis.

NATVITIV

De Metopio. CAP. LXX.

F It in Aegypto unguentum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter Galbanū misionem. Nam lignum in quo Galbanū enascitur, Metopion uocant. Cōstat amarīs nucibus, Omphacino oleo, Cardamomo, odorato lunco, Calamo, melle, uino, Myrrha, Balsami semine, Galbano & Refina. Probatum pingue, graui odore, quod magis Cardamomum & Myrrham quā Galbanum resipiat. Calfacit uehementer, & adurit, atque extrahit. Ora uenarum aperit. Vlcerā purgat. Ad praeciosos neruos, & lacertos, ad hernias putri humore contractas, efficax est. Caratis & malagmatis inseritur. Rigoribus, conuulsis, praesertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & rectorum cōtracta est, utile habetur. Sudores ciet. Vuluae spiracula laxat, & eiusdem duricias discutit. In summa, molliendi naturam habet.

D

BARBARI COROLL.

Metopium in Aegypto, praeferebatur quondam Cyprino. abstulit deinde gloriam Phoenice. hoc e uilissimis erat.

EX. M. VERG. COMM.

Non ferulam in Syria nascentem, ex qua Galbanum stillet, Metopium in historia eius hic ait appellari, sed liquorem, siue lachrymam eius. Credimusque ideo, non *ἐν τῷ* hoc loco, quod lignum, & materiam, uerum *ἐν τῷ*, quod liquorem significat, legendum esse. Nisi forte in historia, non hic uitium sit.

Sequitur mox, quod in cunctis grecis legitur, ex amarīs Amygdalis, confici unguentum hoc. Quod non sic intelligendum est, ut Amygdalarum carnem credat aliquis illi misceri, uerum oleo ex illis expresso, confici hunc docere. Indicatque id, quod hic idem, in Amygdalino oleo dixit Metopium dici, quoniam scilicet priuatim in hoc unguento usus eius esset, eamque ob causam, nos certius rem indicantes, ex nucibus illis expresso oleo fieri diximus. Itēque, acerbō oleo, ut alterutrum eligi oporteat.

Non uidetur nobis deinde integer locus, ubi diximus, Emplastris additum, quas greci ab exedendo,

excedendo, septas uocant. Nec uolumus id pro certo legentibus accipi, neque enim sequax rei & sermonis ductus est. Nec accipiendi sunt hoc capite rigores in scapulas, ut non alijs etiam rigoribus hoc ipsum remedium utile sit: alijs enim rigoribus pariter proderit. Nos autem quod in Dioscoride legitur, qua debemus fide reddidimus.

DE MENDESIO. CAP. LXXI.

Mendesium constat Balanino oleo, Myrrha, Casia, & Resina. Alii qui tamen post singulorum pondera, Cinamomi exiguum addunt, nullo compendio. Nam quæ simul contrita non fuere, uim nullam exhibent. Similem Metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

BARBARI COROLL.

Mendesio colos niger: a loco ubi Mendes, hoc est, caper colitur. Veteribus inter laudatissima, & post Deliacum in Aegypto, prælatum quandoque uel Cyprino. Celebratur & Mendesium uinum ex Aegypto. Item Mendæuum, ex Thracia Hippocrati, contra renum uitia.

EX M. VERG. COMM.

In Aegypto fieri cõsueuisse Mendesium unguentum, & in ea Aegypti parte in qua Caper, qui Mendefios genti illi appellatur, coleretur, nomen indicat. Eiusque rei testis Plutarchus est in libro quem scripsit, quod bruta ratione utuntur, Plinius Metopium & Mendesium, propria fuisse Aegyptiorum unguenta ostendit.

Nobis in hoc capite suspectum est, quod hic ait μετὰ τὸν κατασθεμισμὸν, significat enim singulorum per sua pondera adiectionem: cum tamen hic mox dicat, non communicare uires, quæ non fuerint simul decocta. Quibus colligere ratiocinarique facile est, de coctura aromatum in oleo, aliquid egisse Dioscoridem, & quod ponderis illic significationem habet, cocturæ notam & rationem habiturum fuisse.

DE STACTE. CAP. LXXII.

Stacte, uocatur pinguitudo recentis Myrrhæ cum exiguâ aquâ tursæ, & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac preciosa est, atque unguentum per se facit, Stacte nominatum. Maxime probatur, quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim Myrrhæ calidis unguentis correspondentem habet.

BARBARI COROLL.

Stacte dictum, quoniam e stillatitia dūtaxat Myrrha fiat: colore pallido, suauitate mira, sed amaritudine præcipua. Constat & Myrrha unguentum regibus Persicis dictum, quod illi capite, ceu diadematis uice impositum gestabant. Sed addebatur Myrrhæ, Labyzos appellata, quam multo preciosiorem, quæ Myrrham esse, Dinon scribit. Appellatione unguenti Aegyptij, Stacten uenire, autor est Atheneus. Hippocrates, pro eo, quod ex Acanthes uocatur floribus conficitur, & Pæderos ab alijs uocatur. Olei uero Aegyptij uocabulo, idem Hippocrates Citinum significat. Vbi uero adijcitur, candidum Aegyptium, pro Libino capitur, ut Galeno placet.

EX M. VERG. COMM.

Non uidetur Theophrasto, Theophrastumque secutis scriptoribus, & Dioscoridi huic nostro, eadē Stacte esse, nisi forte, quod in Theophrasto legitur τὴν εὐφροσύνην δὲ μὴν σάκτῃ ἢ δὲ πλατῇ, non ad genera eius, sed ad partes & usus referendum sit: diuiseritque Theophrastus, nō Myrrhæ genera, sed docuerit in expressa Myrrha primam destillationem, ad unguentum Stacten, reliquam uero Plasten, quasi ficticiam, eo quod conformaretur, appellari. Hic enim, & hoc capite, & mox in Myrrhæ historia, Stacten indicat, primam cum exprimitur, Myrrhæ destillationē esse, significareque hanc uocem, simplex ex ea factum, qua ratione præmonstratum est unguentum. Neque enim aliter intelligi potest eo loco, qua expressa Stacte excipitur, & mox, quæ etiā multam Stacten dat: omnia, si diligentius res expendatur, non ad Myrrham simpliciter, sed ad bonitatem, usumque eius pertinentia.

A destillando, quod græci σάκτιν dicunt, Stacte dicta est, significarique ea uoce non simpliciter Myrrham, uerū ex expressa Myrrha pinguiissima eius destillationē indicat Lucretius, dicens,

e iij

A

μυρδόν

Plin. lib. 13.
cap. 11.

*

σάκτι

B

C Auf Amaracini blandū Staſteq; liquorem. Odoramento, & unguento eam coniungens. Meminit Columella etiā in carmine ſuo, cum cecinit. Et melior Staſte, ponatur Achaica Myrrha. Quin etiam antiquorum græcorum lexica, non Myrrham, ſed τὸ ἀπὸ τῆς ἐμύρης γινόμενον μύρον, Staſten diffiniunt. Ob quæ inclinatur animus, & in hoc, & alijs ſcriptoribus non Myrrhæ aliquod genus, ſed quod optimū et pinguiſſimum ex ea deſtiller primum, hanc Staſten eſſe, quæ per ſe nullo alio aromate adieſto, unguentum fit. Neq; obſtat quod Plinius ait. Sudat autem ſponte prius, quam incidantur Staſten diſtam. Et paulo poſt, Precia ex occasione emendatū uaria, Staſte a ſex ad quinquaginta. Potuit enim Myrrhæ genus unū, eadem hac uoce a deſtillado facto ſignificari. Quemadmodū idem Plinius lib. 17. cap. 11. de Refina agens ait. Hanc mares dumtaxat ferunt, & eam græci Staſten uocant, odoris grauiffimi. Ex quo facilis cōiecturumq; ex arborum truncis deſtillatū. Quæ autem diſta a nobis hoc capite ſunt, ad unguentum, non ad Myrrhæ genus; ut certius adhuc in Myrrha oſtendemus.

¶ De CINNAMOMINO. CAP. LXXIII.

C Innamominum e Balanino oleo, & Xylobalfami, Calami, Iunci odorati ſpiſſamenti, atq; Cinnamomi, & ſeminis Balfamini ſua uitate, quadruplaq; Myrrhæ ad Cinnamomum portione cōſtat. Mel ad cogēda omnia adiicitur. Laudatur acre, molli odore, plane Myrrham redolens, craſſum, odoratum, guſtu perquam amaro. Id non a Refina, ſed myrrha craſſitudinem obtinuit. Refina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amarā, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit. Calfacit, diſcutit, diſſipat. Humores & ſpiritus attrahit. Caput aggrauat. Contra uulux uitia cum duplo oleo, cæra, & medulla efficax eſt. Ita enim fere acrimonia exoleſcit, & quædam emolliendi uis contrahitur. Alioqui adurit, & præ cæteris unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fiſtulas, & ulcera quæ putredinis uitium ſenſerunt. Item ad hernias humidiores, carbunculos, febrilium rigores, tremores, gangrænaſq; cum Cardamomo. Aduerſus ſerpentium morſus, illinitur. Scorpionum & phalangiorum icſtibus cum tritis groſſis imponitur.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 13. capi. 1.

C Innamominū, quod mel accipit, odoratum ſit, a nōnullis quaeritur. Precia eius prodigioſa a denarijs. 35. ad. 310.

EXM. VERG. COMM.

C Aret certo intellectu, quod in omnibus græcis legitur hoc capite, δύναντι δὲ χεῖροφόδρα διὰ μέλαν καὶ θερμαντικὴν καὶ πικρὰν, a nobis contra communem τοῦ πικροῦ. i. amari ſignificationē his uerbis. Acerrimas habet uires, calefacit, maturatq;. Nec abſurdo, ut nos credimus, in mutatione eius uocis conſilio, & rei ſenſu. Paulo enim ante de amaritudine eius hic egerat. Incontinuumq; eſt, ſi quis dicat, amaras alicuius rei uires eſſe, præſertim, cū de calore, acrimonia, aperiendi diſcutiendiq; ui, & poteſtate agitur, quæ in diuerſo penitus genere a ſaporibus ſunt.

Eam ob cauſſam, ex hiſtoria Cinnamomi πικρὴν δύναντι. i. maturadi uim, pro illo πικρὰν, id eſt, amaram, in hoc caput tranſtulimus: quod q̄ bene, et ex re factum ſit, aliorum cenſuræ reſponſum, quibus licebit ſemper cum libuerit ad amaritudinem redire.

¶ De Nardini unguento. CAP. LXXIII.

καρδύων

R Atio Nardini faciendi euariat. Nam aut Malabathrino folio, aut ſine eo fit. Complurimum autem Balanino oleo, aut Omphacino.

phacino. Iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur, sicuti propter odoris suauitatem Costus, Amomum, Nardum, Myrrha, Balsamū. Laudatur tenue, non acre, Nardi aut Amomi odorē referens. Vis ei extenuans, acris. Expurgat. Excalfacit. Humorem extenuat. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi Resinam recipiat. Fit etiam simplex ex Omphacino oleo, Iunco, Calamo, Costo, & Nardo.

BARBARI COROLL.

Nardinum, Galenus spicatum Romæ dici solitum, & foeminis, præcipue diuitibus familiæ, prodidit. Nardus uero Pistica, siue unguentum, de quo mentionem literæ sacræ faciūt, probam & fidelem, & quæ adulterata nō sit, Nardum significat Hieronymo. Quidam a loco, nomen id fuisse putant. Nardinum e Tarso Ciliciæ commendatissimum. Vnguenti nomen est & Nardus Cyzicena, in quod tamen Nardum quandoq; non queritur, nisi Gallicum. Ingredietur & Arnabo, Iulius Pollux, & Babylonicum Nardum, pro unguento uidetur accepisse.

Galen. lib. 19.
cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Probatur in Nardini unguenti confectione. &c. Græce, ἡ δὲ ἡμετέρα ἡ λιντή. In foeminino genere rem indicauit, quæ ad unguentum, nulla ratione referri potest: oportetq; ad aliquid referri, quod foeminino genere non longe intuentur. Nihil autem aptius nobis uisum est, q̄ ad Nardum, quæ nomen unguento dedit, referre: monuitq; in eo nos omniū probatissimus mihi codex, in quo non λιντή, sed λιντή legitur, quasi ignaua, & uulgaris Nardus, in unguenti confectione probetur. Quam certius adhuc describēs, acrimoniā illi abstulit, & siccæ Nardi, & ob id minus olētis, aut Amomi odore pbauit. Qualia autē hæc fuisse quondā cōncimus, talia etiā docemus, q̄ sepe alias testati sumus, liberā legēbus pbadi, & im pbadi nostra hæc relinquētes.

Quod autem Dioscorides ait, uariam Nardini unguenti confectionem esse, eo pertinet, ut ostendat Nardinum ideo dici, quod non uera Nardo tantū conficeretur, sed alijs etiā, quæ odore Nardo similia essent: quale Malobathrum est, quod Folium quondam dictū fuisse testati sumus: ideoq; factū fuisse, ut Nardinum aliquādo Foliatum diceretur. credereturq; a multis idē esse: cū tamen diuersa materia confectum, alterum ab altero manifesta uarietate differat.

Quod etiā in Euangelio legitur Spicatū, eandē causam habet, ut ex spica Nardi confectū, ab alijs discerneretur. Indicauitq; id Paul. Aegineta, quo loco de aurīū uicij & remedijs agit, inter quæ foliatum & spicatum diuersa numerat unguenta: uerisimileq; est, ex omnibus quæ odore Nardi essent potuisse fieri, ideoq; hunc dixisse, multifariam confici Nardinū unguentū.

B

De Malabathrino.

CAP. LXXV

Malabathrinum spissamenta Nardini habet. Insuper Myrrha additur. qua de causa calfacit, Crocino, aut Amaracino, uiribus correspondens.

Malabathrino

BARBARI COROLL.

Malabathrinum succo folij eius, nullo præterea coniecto, nobile unguentum. precium in libras. 60. Foliatum quoq; appellari diximus. Quamquam dicat aliquis, Nardinum quoq; Foliatum uocari posse: quia folium Malabathri quandoq; accipiat, quod & Dioscorides in Nardino meminit. Paulus quandoq; Foliatum, pro Foliato appellat. Idem Foliatum, Spicatū, Moschaleon, & Commagenum, foeminis ad odorem tantum queri affirmat.

Plin. lib. 25
cap. 4.

EX M. VERG. COMM.

Foliatum proprie unguentum hoc dicitur. Succo enim folij, quod idem Malobathro est, conficitur. Cætera eadem illi, & Nardino sunt.

De IASMINO.

CAP. LXXVI

Apud Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus Violæ, quorum sextans, in italicum sextariū Sesamini olei demittitur, Violis ut in Lilino diximus, uicissim permutatis. Aptud Persas in-

Idem

D I O S C O R I D I S

Cter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, praesertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus quae calfactionem, laxationemque desiderant. Grauius enim spirat, quam ut libenter a plerisque recipiatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Iasme si quis interpretetur, Violaceum significat: quanquam Violaceum illud quod triuiale est Iaton potius appellant graeci. Theophrastus Leucoion, ut ipsam quoque Violam. Aliud hoc quod Regale nominatur, a Persis conditum atque Parthis. huius foetentis animae uirus, multitudine ciborum & ebrietate natum, accersita odorum commendatione summuouet. Vnguentum hoc situm intelligam, quae uulgo Iesiminum uocatur, distinctiones & harundineos parietes in hortis opere topiario conuestiens, flore candido, praecipuae suauitatis, folium in uiridi nigricans, ob longum, fastigiatum, mucrone languido, magnitudine Rosacei, sed angustum. Hoc Violae genus Persicum, & Particum, & omnino peregrinum uocauerim, ab alba Viola, nostrata longo interuallo distans, ueteribus (ut arbitror) incognita, saltem Italiae. Recentiores tria Iasmes siue Iesimi genera constituunt, albam colore, ceruleam, & in Aegypto luteam, qualem & in Venetia nasci modo cernimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Florem quem omnes Iesiminum dicimus, colore candido, Violis figura non dissimilem, Violam antiqui uocabant, ignotum diu Italiae, ut uidetur, nunc autem plerisque hortis etiam gratiore odore commendantem, tam notum omnibus, ut nulla descriptione nostra indigeat. Credimusque nos de eo egisse hunc scriptorem, cum communis Violarum historia tertio uolumine ab eo tractatur. Numeratis enim albis, luteis, seu purpureis Violis, quae communes & notae omnibus sunt, quartum genus colore ceruleo addidit, quae nullae in Violarum genere nunc cognoscuntur, necesseque est ad Iesimini huius florem referri ceruleum colorem illum. Posteriores enim & inter eos Serapion, tria Iesimini, ex colore discrimina, & genera fecerunt, Candidum, Luteum, & Italiae ignotos, nunc omnibus communes: uideturque Italia & habet iam non candidos tantum, sed luteos etiam Iesiminos. Nec in alio Violarum genere Iasme haec, & Iasmini unguentum intelligendum est. Nam quod Palladius Violaceum docet, a graecis λευκον dictum, ex Violis proprie nunc dictis, conficiebatur. Violaeque nos graecorum more dicimus eas, quae primae uerum nunc purpureo, praecipui in medicina usus. Quam enim Theophrastus nigram dicit, in alio genere ab antiquis numerata est, de qua suo loco dicemus. Videntur postremo nobis male sibi inuicem respondere, in Iesimini huius confectio, olei sextarium, & flores unciae duae. Credimusque, in florum pondere uitium esse, nec tam exiguo flore, tanta olei mensuram satis posse odorari.

De MYRRHA. CAP. LXXVII.

MYrrha lachryma est arboris, quae in Arabia gignitur, Aegyptiae spinae non dissimilis. e cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. Alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua Perdiasimos, praepinguis, qua expressa Stacte emittitur. Alia Gabirea, pinguiuscula, laeto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat Stactem. Omnis prima est, quae Troglodytica appellatur, accepto cognomine ab tractu, in quo prouenit, splendens, subuirdis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quaedam, quae Troglodyticae secunda est, Bdelij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia Caucalis cognominatur, scabra praeter modum, nigra, & retorrida. Omnium deterri-
ma, quae Ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad
gummi

μύρρα

πεδιάσιμος
γαβιρεία

τρογυδίμη

gummi imaginem uergens, & uiribus eius proxima. Improbatur Amminea cognomine. Ex his pastilli fiunt, sed e pinguibus pingues, & odorati, e siccioribus haud quaquam pingues, & inodorati. Minus uiribus pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua Myrrha maduerit. Eligenda est recēs, squallore obsita, leuis, undiq; concolor, quæ confracta internatos quasi ungues, cādidos & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. Superuacua & inutilis est grauis, coloris Picei. Calfacit, cohibet. Soporem gignit. Siccat, astringit. Vuluam emollit, & præclusam laxat. Menses & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Lupinorū cremore, uel succo Rutæ admota. Tuberculo fabæ deuorat in uetere tussis, orthopnoea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluuiio, & dysenteria. Rigores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cū pipere & aqua. Subdita linguæ, liquataq; scabriciem arteriæ expolit. Et densam uocem expedit. Ventris tineas enecat. Contra grauem oris haliū manditur. Et aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur. Gingiuas & dentes stabilit, colluto cum uino & oleo oris. Vulnere capitis illitu glutinat. Medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus, inflamatq; cū meconio, castorio, & glaucio. Ad uaros autem cum casia & mel le illiniū. Impetigines ex aceto purgat. Defluētes capillos cum Laudano, & uino myrteo illita, firmat. Diuturnas distillationes lenit, illitis pinna naribus. Oculorum ulcera complet. Albugines tollit. Caliginem discutit. Scabriciem leuigat. Fit e Myrrha perinde atque Thure fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens.

BARBARI COROLL.

MYrrha græce *συμύρα* dicitur, & Zmyrna; ob id & notis duabus, z. z. scribi solet a Medicis. Hanc & Myram uocat Hippocrates. Minor altitudine, sed fruticosior est Thure. Ad. v. tamen cubita crescere arborem Plinius meminit, caudice duro, intortoquē, & crassiore q̄ hominis fura, & ab radice etiam q̄ reliqua sui parte, corticem leuem, proximumque Vnedoni, Andrachnæue. Folium Olusatri, quidam Oliuæ tradunt, uerum crispus, aculeatum, extremitate ut iligneū, Theophrastus Vimeo simile. Nisi quod suspicor, librariorum menda sit, pteleas, pro aleas contrarie scribentium. Scabrum aliq; spinosumq; dixere, cætera similem Terebintho, aut Iunipero, etiā gustatu. Foliū etiamnum rotundius. Veteris odoratioꝝ lachryma est, ut in Vite. Prima eius paritio, ut aliam Stactem, hoc est, stillaticiam, aliam Plasten, hoc est, ficticiam a Theophrasto nominatā sciamus. Permixtam arboribus Thuris nasci tradūt. Alij separatim. Sed & alijs Arabiæ locis proueniunt. E siluis quoq; laudata, quam a Troglodytis Sabæi transitu maris petunt. Satiua siluestri præfertur. Gaudet rastro & ablaqueationibus. Melior, radice nuda, refrigerataq; Falsum est, e Thuris arbore utraq; gigni. Inciditur bis, iisdēq; cū Thure tēporibus, sed a radice usq; ad ramos, qualeāt. Sudat spōte antequā incidat, Stactē uocat: cui nulla præfertur. Post hanc satiua, & in siluestri quoq; melior æstiuā. Regi Gebēnitarū quartas partes Myrrhæ pendent. Deo nō dant, quia & apud alios nascatur. Coemptā passim, ac pluribus locis in folles confarciunt, ipsiq; unguetarij probitates digerūt odoris & pinguitudinis argumētis. Aliter nomina generū tradidit Plinius q̄ Dioscorides, hoc ordine. Prima Stactē, cui precium a. 11. ad. 50. Secunda satiua, cui precium summum ad. 11. Tertia siluestris. Siluestrium genera complura. Primusque inter eas locus Troglodyticæ: cuius nucleo precii ad. 16.

Plin. lib. 12. cap. 15.
Theophrast. lib. 9. cap. 3.

C probatur pinguedine, aspectu aridiusculo, sordida, et plane barbara, acrior cæteris. Proximus Erythrææ, quam intelligi Arabicam uolunt, Mineam uocant alij, preciumq; eius ad. 16. Huius species quatuor, Staetea, Atramitica, Gebenitica, Ausiritis. In quibusdam exemplaribus non habetur Staetea. Tertius Dianitidi. Quartus Collaticia. Quintus Sembracenæ, a ciuitate regni Sabæorum, mari proximæ. Hæc hilaritate insignis est, sed uiribus infirma. Sextus Drusitidi. Est & candida uno tantum loco: quæ in Messalum oppidum confertur. Diuersa sit a prædictis, Odoraria cognomine atq; Sea, quoniã pleriq; sextam in Plinio, nō Seam legunt, haud constat; cui precium redditur ad. 14. In plenum probatio Myrrhæ, glebis exilibus, nec rotundis in concretu, albicantis succi, & tabescentis. Secunda bonitas, intus uaria. Pessima, quæ in nigra. Peius, si sit etiam foris. Adulteratur Lentisci glebis, & Cucumeris succo, amaritudine lentescens. Fallacissime autem Indica Myrrha, quæ ibidem quadam e spina colligitur, multis uero terra, crustosaq; puenit in Arabia. Describitur a Dioscoride, ut inquit Strabo. Argillore atro, retorrida, ὑπερμαρ, conuerti, maturitate insignis. Quemadmodū & exoleta dicimus, quæ græci ὑπερμαρ, & ὑπερμαρ. Quidam corruptum locum putant & ὑπερμαρ legendum arbitratum, hoc est, prædurum atq; scabrum: quod & barbara illa Mauritanij Serapionis interpretatio secuta est. Quanquã & ὑπερμαρ, etiam hilaris, speciosaq; transferri potest: qualem Semis. Seorsum indicabitur & herbæ genus apud nos Myrrhis & Myrrha nominatū. Itemq; apud græcos. Quanquam pro aromate illi quidem proprie non Myrrham, sed Smyrnam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus non multo ante, cum de Staete unguento ageremus, uideri nobis Staeten, pinguiorem, melioremq; expressæ Myrrhæ partem, huic scriptori esse, cum tamē Plinius Staeten, Myrrhæ genus manifeste faciat. Et Theophrastus libro. 9. idem testari credatur: quod tam certum hoc capite nobis sit, ut nō aliter intelligi a quoquam, Staete in medicina possit, q̃ expressæ Myrrhæ prima distillatio, et quasi pinguis slos. Aliter enim, alijsq; appellationibus a Plinio hic Myrrhæ genera numerat, numeratq; duobus, Peliasma scilicet, & Gabirea, quas pinguisimas appellat, ex utraq; expressa, copiosam reddi Staeten dicit. Quo ductu sermonis, quarumq; uocum significatione, nihil certius audiri potest. Nec aliud colligi, quam esse huic Staeten pinguisimam, & primam expressæ Myrrhæ destillationem, cuius in unguentis & medicina, præcipuus & laudatissimus esset usus. Nec obstat quod Plinius ait. Sudat autem sponte, priusquam incidatur, Staeten dictam. Id enim plenius, ut in Resina lib. 7. forte appellauit, a destillando facta appellatione, & quoniam intelligeret, ut in expressa Myrrha Staete reliquis partibus antefertur. Sic in fluxu eius ex arbore, probari magis sponte sua, q̃ inciso arboris corrice destillantem. In multis enim naturæ hic ordo, & quasi lex est, ut quæ prima, & sponte sua fluxerūt, meliora & minus sæculenta excipiantur. Quodq; & Theophrastus ait. τὸ δὲ ἐμπρὸν ἢ μὲν σαυτὴ ἢ διὰ πλάσιν, id est, in Myrrha alia Staete, id est, stillaticia, alia Plaste. i. ficticia, non satis pro comperto nobis est, ad genera ne eius, an ad artificiosam expressionem referendum sit. πλάσιν enim, artificium & opus humanum habet. Siue enim fingere, siue conformare dicas, utrumq; hominis est. Confirmareq; hoc uidetur non multo post Dioscorides cum ait, fieri ex Myrrha expressiones, ex pingui odoratas & pingues. Mox ignauā, & inefficacem esse expressam, quia oleum eius τὴν ἀνάπλασιν, id est, inconfirmationem nō admiserit. Eodem uerbo usus, quo et Theophrastus in diuisione illa usus est. Quæ omnia longius a nobis dicta fuerūt, ut qd̃ Dioscoridi & Plinio idem non est, certius a legentibus agnosceretur: scirentq; omnes, huic scriptori, Staeten primam expressæ Myrrhæ destillationem tantum esse, neq; in medicina uoce illa aliud significari.

Non sunt præterea Plinio & huic eadem generū nomina. Hic in primo ordine Pediasmon, id est, campestem numerat, Theophrastum ut uidetur, secutus, qui de Thure & Myrrha longiorem historiam sic incepit.

Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores, aliæ in monte, aliæ ad radices montis, in priuatis agris. Ideoq; aliæ coluntur, aliæ cultura carent. Feruntq; montis excelsam altitudinem esse, siluestrem habitum, & niuibibus conspergi, ex quo in planiciem profluunt flumina, quæ quoniam a græcis πεδίων dicitur, hic Pediasmon, quasi in campestri solo natam Myrrham appellauit, ut ea appellatione, a montana distingueretur.

Cæteræ generū in Dioscoride appellationes, quæadmodū & suæ, Plinio incertæ nūc sunt. Inreplet

Irrepfit inter hæc genera uitium etiam. Nam quod hic ait, συλλήγεται δὲ τις καὶ λεπτή μετὰ τὴν τραγυδιτικὴν ἀρεθμαίνουσι. &c. non λεπτή, idest, tenuis, uerum, λευκή, idest, candido colore legendum est. Sic quoque nos reddidimus, Plinio & alijs autoribus accedentes. qui inter alia candidum numerant: idque palam testatus est dicens. Est & candido uno tantum loco. Nec nos in eo tantum ueterum autoritas mouit, quam quod tenuitas, parum Myrrhæ conipetere uidebatur, quæ glebosa, & in offas conuoluta, longe ab ea forma abest: & quod frequentissimus toto hoc opere hic error est, ut ubi λευκόν, quod candidum est legi oporteat, illic λεπτόν, quod tenue legatur.

Quod deinde ἐπιφωρεῖς, & nos uertimus, eorum modo quæ exoleuerunt arefcens. Non a deo difficilem habet intellectum, ut dubitandum ratopere, in Corollario suo, de uocis eius significatione Hermolao fuerit, qui maturitate insignem conuertens, parum proprie rem significauit. Inter cætera enim, quæ græcis ὤρα significat, & speciosus habitus est, & quasi ἀκμή dicitur ὤρα, quæ nec citius, nec serius in usum ueniunt. Sic Plinius Horeum mel uocauit, alterum eius genus, quod præcipua tempestate conficeretur.

Variant antiquiores græci in ea quam ergasimon dicunt, quam alij gummi, uiribus & aspectu, alij uiribus & odore referre testantur. Nos quod in pluribus legebatur, illud reddidimus.

Coniungitur huic parti statim quod omnino uitiosum est, & in quo male sequax & incertus sensus occurrit, a neutro in comune genus traiectus. Idque huiusmodi est, καὶ πικρὰ καὶ ἄνταν γίνεται ἀπὸ μὲν τῶν λιπαρῶν ὑδάτων καὶ λιπαρῶν, ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἄλιπῶν καὶ οὐκ ὑδάτων. Quod totum a nobis sic redditum est. Exprimuntur omnes, quodque ex pinguibus expressum fuerit, odoratum pingueque est, quod uero ex squalentibus & aridis, nec pingue, nec odoratum. His tam aperte & tam certo sensu dispositis, nulla foemini generis intercedente uoce, succedunt hæc statim, ἄτονον δὲ καὶ μὴ προσυληφέναι ἔλαιον ἐν τὴν ἀνάπλασιν. Quod si uelit aliquis, ut res habet, latinum facere, non aliud aptius, quam si a masculino, uel foeminino nomine incipiens (comune enim illic genus est) dicat.

Infirmam, quod oleum in conformatione non acceperit, &c. Quæ uoces superioribus coniunctæ, nullum indicat legitimum sensum. Nec suspicari, sed pro comperto habere uitium illic esse, oportet. Videatur autem nobis, potuisse quondam hic sensus & rei series esse, ut quoniam in Myrrha sint crassiores aliquæ partes, doceret hoc loco Dioscorides, faciendam ex omni Myrrha Staeten, idest, exprimendam, adfusa aqua, myrrham, ut in Staete unguento præmonstratum est, seruandumque, & in pastillos conformandum quod expressum destillasset: & quoniam in Myrrha bonitas odoris, & ad sanitatem in morbis uires essent, sic expressam Myrrham alteram odoris. scilicet commendationem & usum amittere, fierique ἄτονον, infirmam & ignauam, non in uiribus ad sanitatem, sed in odore ad uoluptates, & delicias uitæ. Indicatque id, quæ subiecta statim causa est, quod oleo careat, quo, experientia docuit, diutissime seruari odores, & facile citissime perituros, nisi unguine & humore eius contineantur. Testantur id Plinius, Plutarchus, mille alij, ne longiores simus. Ex hac itaque causa, facilis coniectura fuit, de infirmitate odoris agere illic Dioscoridem, neque ἄτονον forte antiquam, ueram fuisse lectionem, ἄνοσμον, idest, sine odore legendum esse, ut una uoce infirmitatem & rem indicaret. Conijcimus tamen hoc, non decernimus.

Quo loco deinde legitur, contra alarum dolores, cum liquido alumine pari utiliter inungitur, iniectus mihi scrupulus, non dolores forte, sed uirosus & hircinum odorem illum qui ea parte sentitur, legendum esse. Suspitioni huic nostræ causam dedit, quod hic ipse in metallis, de omni alumine agens contra ingratos alarum, & uirosos odores inungi eo præcepit, quoniam illi asfringendi, & repurgandi uis sit: nunc autem Myrrha illi adiecta, non tantum uidetur ea præcipere, ut absit malus odor, quam simul etiam nouo & meliore odore qualis in Myrrha est, tetrum & hircinum ille delere.

De Bœotica Myrrha. CAP. LXXVIII.
Bœotica Myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascantis. Melior est quæ Myrrham odore representat. Vis ei calfactoria inest. Emollit, discutitque. Suffimentis commodissime inseritur.

De Syrace. CAP. LXXIX.
Syrax lachryma est arboris malo Coroneæ similis. Præfertur fordescens, flauus, resinofus, albicantibus grumis, quamplurimum in

A

B

Βοιωτικὴ μύρρα

σύραξ

C sua odoris gratia permanens. qui dum mollitur, melleum liquorem reddit: qualis e Castabala urbe, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, surculosus, canoq; situ obductus. Caterum lachryma inuenitur gummi similitudine, perlucida, & Myrrha amula. Verum perpauca manat. Adulteratur ligni Scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & lridis crassamento, & quibusdam alijs. Alij ceram, aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum Styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantque. Styracem hunc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, Scoleciten cognominant, quem tanquam syncerum imperiti approbant: non animaduertentes ad precipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit. Medetur tussi, destillationibus, rauedini, grauedini, & retusae uoci. Vuluae praclusae, duriciae laboranti conuenit. Cit menses potui, appositumque. Alium leuiter mollit, si exiguum cum Resina terebinthina bibatur. Miscetur utiliter discutientibus malagmaris, acopisque Adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo ueluti ex thure fuligo, ad eadem conueniens ad quae thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria Styracinum oleum componitur: quod calfacit uehementer, & emollit. Verum caput dolore afficit, adgrauatq; & soporem adfert.

B A R B A R I C O R O L L.

Phil. li. ii. capi.
libro. 24.
capite. 6.

S Tyracem Syria supra Phoenicem gignit, ad Gabala, siue ut Dioscorides scribit, Catabala & Marathunta, & Cassium Seleucia Pieriae cognominatae montem. Arbor & lachryma eodem nomine est. Haec illi ex austero iucundior. Intus arbori similitudo harundinis, succo praegnans. In eam sere per Canis ortum aduolant pennati uermiculi erodentes, ob id in Scobe sordescit. Laudatur & e Sidone, Cypro, & Creta uero minime. Ex Amano Syriae medicis, sed unguentarijs magis. Placet maxime purus. Improbatur colos cano situ obductus. Adulteratur Cedri Resina, uel gummi, aut amygdalis amaris: omniaq; ea gustu coarguuntur. Exit & in Pamphilia, aut Pissidia prope Selgam Lacedaemoniorum in eo tractu coloniam. Sed acrior, minusque succosus, ut Helianus autor est post Strabonem. Ibi siluam eius ligni fertilem fuisse tradunt, e quo missilia corneis similia conficeretur. Vnde ortum, ut Tonsillae praeparatae, quas graeci alio nomine Vroskos uocant, Styraces appellari consueuerint. Ibi caudicem uermiculus, rametq; congerit ad radicem, deinde fluit humor, & scobi se ad radicem collectae miscent. Pars quae non leprosa modo, sed terrosa quoq; est, odoratio, ut inquit Strabo, est. In Aethiopia quoq; Styracem prouenire scribunt. Precium optimo. Qualitatem eius non unam esse, argumentum sunt cognomina in compositione medicinarum frequentia. Chrymatias. Calamitis. Aspros, hoc est (ut puto) candicans, Chrymatiam Arabes interpretantur eum, qui rarus inuenitur, & gummi similis describitur. Iidem Calamitin, quanquam harundine sua mixtus, ipso nomine significatur. Pro liquido tamen accipiunt, & fastigia Styracis duo faciunt, siccum, & liquidum, confusione magna: quod aliquando liquidum Styracem pro Myrrha stacte sumunt: aliquando ex eadem arbore colligi utrumq; putant, liquidum, atq; siccum. Aiunt Arabes Styracem e Syria petentes, in pellibus hircinis urere, ut odorum suorum Thuris & Myrrhae satietatem acrimonia peregrini ligni redimant. Iidem petunt Elimaeos arborem brutam Cupresso Susae similem, ex albidis ramis, iucundi odoris accensam, & miraculo, ut inquit Plinius, historijs Claudij Caesaris celebratae, cuius Parthi folia potionibus inspergant, odore Cedri. Fumum eius contra ligna alia remedio esse praedicant. Nascitur ultra Phasim, Tigrimq; in finibus oppidi Scinae; in monte Scanthro. Sunt autem Elymaei Assyria gens, Susianae Persiae contermina. Petunt & in Carmanos arborem Strobum, quam uino Palmeo perfusam urunt, suffiuntq; testa. Nidor a lacu naribus

naribus ad solū iocundus reciprocatur, q̄ citra dolorē caput aggrauet, & somnū aegris cōciliet.

Bonitate in eo excellit, qui rufus & pinguis, &c. Non ut in impresso sic in cæteris *ῥυπαρός*, quod pingue significat, quod sordidum est legitur, sed una tantū & altera mutatis literis.

¶ De Bdellio. CAP. LXXX.

Bdellium, alij Bolchon appellant, alij Madelcon. Lachryma est saracenicae arboris. Probatur gustu amarum, translucidum taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum Bdellij genus sordidum, nigrum, in offas conuolutum, Aspalathi odore, ex India aduectum. Desertur etiam a petra oppido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit. Duricias, & turgentia guttura, humidasq; hernias discutit, cū ieiuna salua impositum. Vuluae spiracula laxat appositu & suffitu. Et partus, humiditatesq; omnes extrahit. Calculos potu comminuit. Vrinam mouet. Tussientibus, a serpente percussis utilissime datur. Valet ad rupta, uulsa, intentas laterum membranas, & discursantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duricias & neruorum nodos profunt. Conustum resoluatur affuso uino, aut aqua calida.

BARBARI COROLL.

Bdellium, in nomine est, ut Galenus inquit, Scythicum & Arabicum. Scythicum nigrius, resinofiusq; Arabicum translucidius et siccius. Vbi nos Sambracenice cōuertimus, in Dioscoride, saracenice legebatur. Sed nos Plinium secuti sumus: quanquam de Myrrha commentantem. Cæterum optionem do, utrū probent, qui hæc cognoscunt: ut obiter criticos effugiā.

Antiquæ & communes Plinio Bdellij appellationes, omnes hæ sunt, barbaræ tamen, ideo q̄ nec græcis, nec latinis, ex ui noninis certum aliquid indicantes. Solum adrobolum, a glebarum crassitudine, nominis certam habet in græcis rationem, idemq; est, quod Plinius ait, in offas conuolutum.

Non est deinde scriptori huic legitima uox, Saracenicae arboris lachrymam Bdellium esse. Quo enim tempore, hæc ille commentabatur, nullum erat Saracenorum nomen, nec nisi post multum tempus, mutata appellatione, Lybes ad Aethiopiam Saraceni dicti sunt.

Non placet item, quod Barbarus mutauit Sembracenice. Licet enim inter Myrrhae genera Sembracenam Plinius numerauit, non ideo tamen sola nominis uicinitate mutanda uox erat, sed numerantibus laudantibusq; Scythicum & Arabicum Bdellium Galeno & Paulo Aegine, ex altera duarum regionum, gentile instaurandum illic nomen fuerat, Scythicaeque, aut Arabicae arboris lachrymam dicendum. Quod nos tamen facere ausi non sumus, cōtenti haecenus, legentes monuisse. Inclinat enim animus, utraq; legi oportere, fuisseq; antiquam lectionem, *σκιθικὸν καὶ ἀραβικόν*, coaluisseq; simul librariorum uitio, & medicorum negligentia, ut toto hoc opere multa alia, duarum gentium nomina. Vtorq; ad eam opinionem argumento, quod hic in medicina utriusq; uires, nullo gentium discrimine numerat, quod alij. Aeginetaq; in primis post egerunt. Cuius lib. 6. de Bdellio hæc uerba sunt. Mollendi uires, quæ durata fuerint, habet Scythicum & Arabicum Bdellion, præcipueq; recens, Arabicum hoc amplius, ut urinam pellat, calculos frangat, & concoctiones adiuuet, quorum priora illa duo, ab hoc scriptore pariter docentur.

Quod etiam non multo post corrupte legebatur, *καλαβώσις*, antiquo latino Dioscoride monente, in quo uerae lectionis aliqua uestigia nonnunquamprehenduntur, confidentius mutauimus, diximusque, Aspalathi odore, *ἀσπαραγθώσις*. Sed hoc mihi cum alijs commune sit, tam facile inuentu fuit.

A

C. LXXXV

B

Pli. li. ii. ca. 9.

f ij

C

De Thure.

CAP. LVIII.

T

Hus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primum tenet in eo genere masculum, Stagonias appellatum, suapte natura rotundum. Tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uero fuluescit, & colore liuet. Sed rotundum industria factitant. Nam in quadrangulares formas dissectū dolijs uersant, donec rotunditatem contrahat. Verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smylo nascens, quod aliqui Copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud cui Amymitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum molliitur, Mastiches more digitis cedit. Adulteratur Pini resina & gummi, quod facile deprehendi potest, siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit, Thus uero statim ardet. Idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. Oculorum caliginem discutit. Caua ulcera complet. Et ad cicatricem perducit. Cruenta uulnera glutinat. In frenatque sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membris effluat. Vlceres quæ Cacoethe uocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & lacte linamentum. Formicantes uerrucas inter initia, impetigenesque, ex aceto & pice illitum tollit. Ambusta igni, pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manatia cum Nitro, si infricetur, sanat. Paronychij cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. Ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur. Inflammata a partu mammae cum Cimolia, & Rosaceo magna utilitate perunguntur. Additur ad arteriæ, uiscerumque medicamenta. Prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda ualetudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mundo Thus crematur flagrante glebula succensum a lucerna, donec exuratur. Post perfectam uestionem operire oportet, usque dum restinguitur: sic enim in cineres redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem: ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in furnum indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut uaporem emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est.

T

B A R B A R I C O R O L L.

Huius arboris altitudo, ad quina fere cubita, ramis frequentibus, folio Piri, sed multo minore, coloris herbacei, modo Rute, leui cortice, ut Lauro. Alij foliū Lauri, leueque, pdiderūt. Alij Lētisco similē, etiā fructu, folio subrutilo. Nonnulli proximam Terebintho faciunt. Alij Terebinthū esse. Et hoc uisum Antigono regi, allato frutice. Sūt qui ex eadē arbore Thus, & Myrrhā manare putēt. Diodorus paruā, Aegyptiæ spinæ albæ, similē folio Salicis, flore aureo. Placet Theophrasto & Plinio sententia eorū, qui Lauro similē tradūt. qm̄ talis arbor fuerit Sardibus studio, Regum Alij delubro quodā sara, Iuba Rex contorti esse caudicis, siue ut placet So

Pli. li. ii. ca. 14.

lino, uiminis scribit, ramis Aceris, maxime Ponti: succum Amygdalæ modo emittere, talesq; in Carmania apparere, atq; Aegypto, cura Ptolomeorum regnantium confitas. E uirgis certe ad nos commeatibus, credi potest, matrē quoq; teretem, & enodi fructicare trunco. Thus collectum, & Myrrha quoq; Sabotam camelis conuehitur, porta una ad id patente, in delubrum Solis, quæ Sabin uocant, armatis ibi custodibus, tabella sup̄ struem posita, descripto, quemadmodum attulerint, quantiq; indicent: mercatores tabellis perfectis, precium Thure sublato, deponunt: idq; absentibus dominis fit. Sacerdotes partem pecuniæ tertiam Deo reponunt, reliquum dominis redeuntibus numerant: autore Theophrasto. Thus Spontinum præter Arabiā, nullis, ac ne Arabiæ quidem uniuersæ. Commendatissimum, quod spectat ad Persas, ut Straboni placet. Cæterum in medio fere eius Atramyte sunt pago Sabæorum, qui caput regni est. In Sabota mōte arduo, ab hoc mansionibus octo distat regio eorum thurisera, Sabaq; appellatur. Solum id rubrum, e lacteo traditur. Siluarum longitudo passus. C. millia, siue ut alij passus. V. & L. millia. Terra ibi argillosa, crustacea, raris fontibus ac nitrosis, p̄ Mimeos, proximum pagum euehitur, tramite uel singulis angusto. Hinc & Thus Minieum uocatur. Ius in Thura. 300. esse familiarum dicunt: quæ ob id sacre dicantur: & cum arborem uuluerant, nec foeminarum congressu, nec funerum pollui. Quidam promiscuum ius his populis esse perhibent in siluis. Alij per uices annorum diuidi. Duplex eius uindemia. Prior canis ortu cortice, qui pregnans & tenuissimus tenditur. Laxato, plaga non adempto, quod hæsit in arbore ferro depectitur. Ideo Corticosum. Tāta inter barbaros fides. Saucias arbores nemo custodit. Contra Alexandriæ, ubi Thus rude interpolatur, renouaturq; nihil tutum a fure. Autumno legitur, ex partu æstiuo. Hoc purissimum, & candidum, Carphiatum uocant. Sequens uindemia uerna, incisis per hyemen arboribus. Ruffum hoc exit, nec comparandum priori, Dathiathum appellant. Nouellæ arboris candidius, ueteris odoratius. In insulis melius, in Arabia suauius: quanq; in insulis nasci, negatur a Iuba Rege. Masculum Thus a specie testium uocari, sunt qui credant. Præcipua gratia mamoso, cum hærente lachryma priore consecuta. Alia miscuit se. Singula hæc manum implebant, cum tardius depecteretur. Hoc modo Stagoniam, & Atomum Thus uocabant. Minores guttas Orobiā appellant. Inueniuntur tamen etiamnum guttæ quæ denariorum. 33. pōdus equeunt. Conuehentibus Thura, capitale est digredi uia. Decimas Deo mensura, non pondere sacerdotes Solis accipiunt: nec ante mercari licet. Inde impēsæ publicæ tolerantur. Nam et benigne certo dierum numero, Deus hospites pascit. Euehi nō potest, nisi per Gebanitas. Horum Regi penditur uestigal. Caput eorum Thoma, abest a Gaza, nostri litoris Iudææ oppido. 80. 33. millia passuum, quod diuiditur in mansiones Camelorum. 61. Thure q; conuehant commutant. Si quid in itinere opus est, queri in singulos camelos sumptus. Denarium. 688. ad nostrum litus colligit: precium optimi, siclorum. 6. secundo. 12. tertio. 14. Refina Picæ, nō quacunq; adulteratur. Sed gemma ea quæ interuenit ei, tam similis Thuri, ut mixta uisu discerni non queat, & inde fraus. Laudatur in Thure candor, amplitudo, fragilitas. neudentem recipiat, potiusq; in micæ frangatur. Omnia hæc cum Theophrasti, tum Plinij temporibus. Thus aut a uerbo græco, deos, aut sacrificiū significante, flectitur: aut certe a tulsis glebis, ut tunc latine scribi debeat. Porro cum dicat in fastis Ouidius, Thura nec Euphrates, nec miserat India Costum, uideri potest aliunde, q̄ ex Arabia in urbem comportari solitum. forte quoniam in Carmania quoq; nascebatur, unde ad nos inuehi non poterat: nisi transmissio amne illo: aut certe quia Chara oppidum Arabiæ nundinarium, haud procul Euphrate situm erat sinu Persico.

EX. M. VERG. COMM.

NVillas, qd̄ huiuscemodi est sectiones habet. Græce, ἡ δὲ τοῦτος ἄκμος, manifesta significatione uocis eius, in cunctis quæ secari nequeat, aut nunq; secta fuerint. Estq; Dioscoridi sensus. Thus, qd̄ natuam habet guttæ rotunditatem, carere sectionibus. Dicitq; ob id atomum, et testiculorum figura masculum appellari, primèq; bonitatis esse, qm̄ qd̄ uoluntate, aut, ut Theophrastus ait, sectione in rotunditatem conformatum fuerit, in tāto bonitatis honore nō sit, & alijs ab illo differat notis. Prima em̄ Thuris laus est in eo, qd̄ sponte sua, rupto arboris cortice fluxit, & stillicidij rotunda forma, in arbore pendit. Quapropter & Stagonias. i. stillicidiare dictū est, στυγνὰς enim græci aquarum stillicidia dicunt. Eoq; tota res pertinet, ut ostendat Dioscorides, quod huiuscemodi fuerit Thus, nullo artificio hominis, sed spōte sua ea forma factum uideri. Quod etiam tale non erit, adulterinum habendum.

Vocantq; id Stageron, aut Entomon. &c. ἔκμονος ἢ στάγρονος καλούμενος. Apertum uitium est. Qui em̄ potest hoc loco atomum Thus dici, qd̄ in alio genere paulo ante decretū est. Aut quō
f iij

A

Theoph. lib.
9. cap. 4.

B

D I O S C O R I D I S

C sectionibus conformatum non dicitur: quod hic testatur in quadrangula figura secari, coniectumque in fictile, usque dum rotundetur, uolutari. Videor igitur constituturum posse, non ατομος, sed contraria significatione ἰντομον legendum esse, ut rei conueniat nomen.

Et quoniam hic ait, in quadrangula fragmenta secari, sectionis etiam in nomine significatio sit. Indicauit id nobis Theop. etiam, quod de hac ipsa re agens, eadem uoce usus est, dicens, ὁ περὶ τὴν βούληται ποιῆν ἰντομήν.

Varie praeterea legitur, quae in grecis aliquot huic coniuncta uox est. σίγκρος, in alijs, hisque melioribus, stageros inuenta, habetque prima illa a Syagro Arabiae promontorio, secunda a destillando rationem. Nobis in ancipiti, potior uisa quae a destillando facta est. Videtur enim hic duo Thuris genera contrarijs appellationibus, aut diuersis saltem inter se discreuisse, cum prius illud Stagoniam & Atomum, secundum uero hoc, Entomum & Stageron uocari dixit. Differt autem Atomon, & Entomon, manifesta contrarij habitus significatione. Stagonia uero, a Stagero, quo a stillatio stillicidium. Optionem tamen in Stagero legentibus relinquimus, hoc ne malint, an ab Arabiae promontorio Syagron, ita tamen, ut non Syagron, sed Syagrium gentilis nominis adiectiua forma legendum esse id sciant.

Quod sequitur deinde, in secundo bonitatis ordine. Orobias dictum, a quantitate nomen inuenit, & quod minoribus guttis concresecat erui, semen non excedentibus, sic appellatum est.

Quod autem illi coniunctum est, χρῶς ὁ ἰντομῶ, ut fere in omnibus, siue ut in melioribus, χρῶς μάλιστα legatur, diuersam coloris, aut loci in quo nascitur rationem habet. Nobis inclinatur autem, ut a colore sic dictum fuisse putemus: quando hic statim subijcit, quantitate minimum esse hoc Thus, & κίρροτον, id est, ruffo colore, quarum uocum altera Orobiae, altera melino, id est, luthco colori respondere uidetur, cui idem esse credimus, quod hic melioron.

Quid Copiscus significet, incertum nobis est. Nisi adulterinum ea uoce indicauerit Dioscorides. κοπίων enim grecis φάσμα, id est, mentiri significat.

Contra incipientes formicas, & impetigines cum aceto & pici inungitur. &c. In plerisque grecorum cum Rosaceo inuenitur, tria deinceps numerata sunt, acetum, rosaceum, & pix. Et si Paulus aegineta capite de formicis, his aceto tantum utatur.

D Coacti sumus non multo post, negationem illie restituere, ubi de cremando Thure hic ait. In quo nunc satis admirari alios interpretes possum, qui non senserint, cum precipiat Dioscorides, incensum & ardens operculari, usque dum extinguatur, ideo id iubere, ne cinefiat Thus, sed crematum integrum permaneat: ut in carbonibus ad ignem seruandis, quotidie fieri uidemus, qui igniti terra operiuntur, non enim cinerem, sed crematum Thus querit hic scriptor, cuius consumpta pinguitudine, reliquum medicinae usibus seruiat. Eum etiam sensum probatissimum mihi codex habet, οὕτω γὰρ οὐκ ἔστι φρεῖται, quod est, sic enim non cinefit.

Credimus etiam in extremo capite male legi, ὁρμήται δὲ ἰντομῶς μὴ κατακινεῖται. rei enim non respondet sensus. Non enim facile ob lentorem, & pinguitudinem suam, friatur non crematum Thus, ut indicant uoces illae, sed quod igne omne id unguen amiserit, & coactura ardius factum fuerit, id facillime friatur, & perfectam coacturam Dioscorides hic ostendere uoluit.

Θαλίς διβύς

De Cortice Thuris. CAP. LXXXII.

Praefertur Thuris Cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto Pini, aut nucis eius cortice: sed horum index ignis est. Siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam inciduntur, sed sine odore fumum eructant. Thuris uero cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiaculatur. Thuris modo uritur. Et uis eadem quae Thuri, sed ualidior, astringentiorque. Quare cruentis excreationibus, uuluis fluctione laborantibus, in pesto confert. Ad euaa oculorum ulcera, cicatrices, sordescque efficax est. Tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

BARBARI COROLL.

Cortex Thuris, Plinius medicinas, nec Thuris, nec Myrrhae priuatim exegit: cum tamen Syracis & peregrinarum rerum multarum describat. Credo, quod usus horum uagus & amplior esse uidebatur, quod ut loco uno includi posset. Arbor porro ipsa Libanos, & Dendrolibanos, lachryma uero Libanotos a Galeno dicitur. Interim, confundi usum eum coperias. Sophocles, ut Gase

nus,

nus, Euripides cōtra Libanū pro lachryma, Libanaton p arbores Thuris accipit, a iuvene Assyrio, cui nomē esset Libanos, in hūc fruticē cōuerso, dictā grēci fabulanē, quē, Deos studiosissimē colētē, inuidi occiderit, hinc nihil esse Dīs Thure gratius. In Sabēis, & Larimnū odoris, ut inq̃ Strabo, prēstātissimū genus oritur: nec quale id sit demonstrat: quemadmodū, nec herbā illam in ora littorali eiusdem tractus nascentem, suauissimī odoris, sed qui celerrime uanescat.

EXM. VERG. COMM.

Non male Thuris Corticem, corticosum Thus, dixerit aliquis. Quod enim in eo laudat, & medicinā inseruit Thus est, quo nisi turgat cortex, inutilis erit: non ideo tamen sic intelligēda res, ut ex quacumq; parte arboris corticē hic laudet, sed ex ea tantum, in quam interioris lachrymæ impetus ingruerit, ruptoq; cortice destillauerit: quo loco omne quod in arbore hēsit, ferramentoq; auulsū, corticis aliquam crustam secum detulit, thuris Cortex dictus est, qui multo humore, a Thure non magnopere differt, ideoq; medicinā utilis est. Ea crusta lachrymæ coniuncta, simulq; allata a medicis, in proprios quos hic docet usus, a Thure separabatur, priuatimq; aliquid magis, minusue poterat, quemadmodum eiusdem Thuris manna.

Tria enim hęc simul plerumq; in officinis & earum acerris inueniuntur, Thus, Cortex, & concussu elisæ Thuris micæ, quas latini ueteres aliquando Manna, aliquando Pollinem thuris dixerunt: substantia idem, aut non penitus diuersum, aspectu autem, & rei euentu diuersa.

De Manna Thuris. CAP. LXXXIII.

Manna Thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & Thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata Pini resina, ac Polline, aut cortice Thuris contusi adulterant: sed hęc igne deprehenduntur. Neque enim æque suffitu aërium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum suaue olentia odoris uirus habet.

BARBARI COROLL.

Manna Thuris, est Hypofisma: quod Plinius, micas concussu elisas interpretatus est. Vbi deprauata dictione, Mammæ, non Manna uulgo legitur. Id autem sit, gestarum arterentibus se glebis, ut inquit Aetius. Differt a Thure Manna, q̃ plus astringit, propter corticis fragmenta quæ remanent. Nam quod Thuris Chondros a grēcis dicitur, hos Thuris granum interpretamur, secuti Plautum in Penulo, Qui nullum inquit Thuris granum sacrificant. Est & genus Mannæ recentioribus dictum, & a sacris quoq; literis acceptum. De quo superius in Elæome lite. Manes certe, uasis nomen est, & in Cottabo pars extantior ac prominula: quam Sophocles alieneum caput uocauit. Erat autem Cottabus, siue Cottabis uasarium, iocularis in conuiuio iactus conceptaculum, propositis uictori præmijs, quæ Cottabica uocabant: id quod eiaculabantur, liquida erat materia, hoc est, id quod in poculo reliquum obmanerat, Latagæ, itemq; Latax appellatum. In eo uase pars, quæ sonitum reddebat percussa casu Lataginis, Platinæ nominabatur. Sinistro cubito innixos, dextra molliter, & per gyrum iacere legitimum erat. Cottabi mentionem in Plauto quoq; habes. Medici, Cottabum ex imperitia uocabuli, ut Athenæus inquit, portionem a balneis, siue ut Phocion, uomitionem ante balneas uocabant, nō pridem inuentam, & sanitatis usu detestabilem, & ab Erasistrato uehemēter damnatam.

EXM. VERG. COMM.

Diximus superiore capite, omnem Thuris substantiam, in antiqua medicina trifariam diuidi, in Thus, Corticem Thuris, & eiusdem Māna. Nec aliud est, quod nunc dicimus, quā uoce hac in Thuris puluere tantum ueteres usos fuisse. Satis rem Plinius indicauit, cum ait, esse concussu elisas Thuris micas, quæ attritu glebarum, in acerris subsiderent. A concussu etiā grēci *ὑποψίμα* dixerūt, nihilq; illi simile cōmuneue est cū aërio melle. Quod posteriores a sacris Hebręorū literis accepta similitudine, Mannam dicūt, in alio genere, & diuersa potestatem. Illi enim soluēdi, huic adstringēdi uis est. In quo cauendum, ne similitudine nominis decipiat aliquis, in antiquis, quibus in Thure semper, in aërio autē melle nunquā usus eius uocis fuit.

De Fuligine Thuris. CAP. LXXXIII.

Fuliginem Thuris sic facito. Forcipicula, lucernis accensas singulatim Thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauam imposito,

f. iij

C & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter sordē, obtegito. Aliā admoueto, in altero aut utroq; labro, subiectis quaternū digitorum altitu dine lapillis, quo facilius perspici queat, si urantur. Et qua locus capax fu erit, glebular alias supponito. & antea quam prorsus prior gleba restin guatur, aliam imponito, donec sufficientem fuliginem uidearis aggregaf se. Continuo tamen externæ æramenū partes spongia aqua frigida made facta, abstergantur. Ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhæ rebit. Quæ alioqui per leuitatem decidua, Thuris cineribus admiscetur. Dersa itaq; fuligine, cinis cremati Thuris seorsum substrahendus est. Idem opus quoad satisfactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum inz flammationes mitigat. Fluxiones suspēdit. Vlcera purgat. Caua explet. Carcinomata sistit.

BARBARI COROLL.
F Vlgo Thuris græce Lignys, & Aethalon, & Ethal nominata. Nam Lychnis herbæ coro namentariæ genus est, ut liquebit. Et alio modo scribitur dici Aetalida. Et Rubiginem satorū lego, & Achymistis quoq; uideo Aethalen uocari diuinum laticem, unde philosophicū illud pharmacū, siue lapis cōsistat: a quibusdā Etesios, & Androdamas quoq; dictos, & aurū potu lentū, & alijs nominibus innumeris, ut Mazys, & p diminutionē Mazygion, & Chalcyriō. Ali ogn Maza es ipm iudeis significat. sidē fuligines Hemisomata, hoc est, semi corpora appellat.

EX M. VERG. COMM.
P lutibus, ut obseruasse facile fuit, fumos & hæretes ex eo parietibus & tectis fuligines græ ci appellationibus discreuerūt, καπνὸν αἰθάλων λεγόντες ἁπλῶς αἰθάλων dicentes. Nos fumi, & fuliginis tantum appellationibus, omnia indicamus, eamq; ob causam non licuit alia, quam fuliginis uoce Dioscoridis αἰθάλων uertere. Quæ eo differt ἀπὸ τοῦ καπνοῦ, i. fumo, quod fumus crassior nigriorque, & ex materia nondum fulgente flamma, aut ea desinente surgit: αἰθάλων uero hæc tenuior, leuiorq; nihil aliud est, quam ignis & flammæ imperus, qui quoniā fumū modo ni gra, contactu suo reddit quæcunq; lambit, fumus etiam dicitur, eodem modo & fuligo a no bis dicitur. Tam quæ a græcis αἰθάλων a fumo facta est, quā quæ λεγόντες a flamma alicubi concre scens eo colore materia aliqua. Ideo in græcis etiam, quorū est diuor lingua, promiscue p fu mo, fuligineq; omni, uoces illæ in usu sunt. Apollonius in Argonauticis suis, appellauit καπνὸν fumum, qui ex attritu lignorum inter se fieret.

De Fuliginis compositione. CAP. LXXXV.
S imili modo e Myrrha, Resina, Styrace, reliquisq; lachrymis fuligo excipit, ad eadem conueniens.

BARBARI COROLL.
F Vlgo Myrrhæ, Styrcis, Resinæ lachrymarum omnium.

De Pinu & Picea. CAP. LXXXVI.
P Inus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitat spe cierum distinctionem. Arbores uulgo cognitæ. Quarum cortex astringit. Prodest tritus et illitus intertrigini, ulceribus summū corpus oc cupātibus, ambustisq; cū spuma argēti, & māna. Vlcera delicatulorū acri moniā recusantiū cærato myrtino exceptus, ad cicatricem perducit. Tri tus cū sutorio atramento, serpētia cohibet. Suffitu partus & secūdas ei cit. Potus aluū sistit. Vrinam mouet. Folia eorū trita & illita inflammatio nes leniunt. Vulnura ab inflammatione uindicant. Trita autem & de cocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent. Hepaticis

utilia

utilia sunt, drachmę pōdere in aqua, aut mulsā pota. Pineæ nucis cortex, & folia potu eadem præstant. Teda particulatim secta, si in aceto coquat, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiā fit Spatha acoporū, pessorumq; compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo, ad librarij atramenti confectiōem excipitur. Ea circumlitiō nibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornāt, coloremq; mentuntur, calliblephara græci uocant. Arrofis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum, Piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriā habent, & aliquantum excalfacientem. Tussi, & pectoris uitij auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti.

BARBARI COROLL.

Picea ueteribus est, quam græci *πίτυς* fere uocant. Huius speciem Theophrastus. & Plinius Phthiropæon, hoc est, pediferam, tineosamq; appellant, quia totis paniculis, non prima tantum in parte, ut abietes, nucleos & minores & nigros habeat, sed ipsas quoq; paniculas minores gracilioresq;. Sunt autem Paniculæ, nucamenta quædam, quæ e ramis arborum, Resinam fundentium, callo squammatim compactili dependent in Larice. Negant aliqui florere Piceam, sed uice floris esse nucamenta illa, quæ *κίτρεα* græci uocant, grossis præcidiuis, fici pro portione respondentia. Hæc compressiora maribus sunt, ac minus Resina madet, q; foeminis. Præuenit germinatio huius, florem Abietis. quia paulo ante solsticiū erumpit, diebus fere 15. & ad proportionem fructificat post uergilias. Differt a Pinu Picea, q; pinguior ac tenuior folio est, q; minus alta, minusq; recta, q; Pinus assurgit. Præterea, conū minorē, & magis aligentē, nucleos quoq; Resina p̄fusus, obtinet. Vtriq; foliū capillamenti modo, prætenue, ac breui seta uillosum. Vtraq; crassior, duraq; ceu Cupressus. Materies cādida, et Abieti similior. Pinus uis radicibus, nō repullulat. Picea repullulat, ut in Lesbo accidisse, Theophr. scribit, incēso Pyrræi mōtis nemore, qd Piceis scatebat. In quo scire oportet, Pliniū Larici tribuere, quod fo Theophrastus de *πίτυν*, hoc est, de Pinu prodit. Decacuminatio, quā græci *ἐκακμήν* appellāt, Piceæ, Pino, Abieti, Palmæ, aliqui addūt & Cupressu, & Cedro, perniciem asferre phibetur. Picea nauigijs expetitur. In Cypro præstantior etiā, q; Pinus. Eadem & ad fabricas ceteras, malleos grandiores, scādulas, cupas, & alia secamēta utilis; celerius tamē q; Abtes, cōrumpitur. Vfus & in carbone metallis argenti. Montes amat & frigora. Feralis arbor, & funebri indicio, ad fores posita, ac rogis uirēs. Iam tamē & in domos recepta, tonsili facilitate, rami penestatum ab radice modici, uelut brachia lateribus inhærent. Hæc plurimā Resinam fundit, interueniēte cādida gēma, tam simili Thuri, ut discerni uisu nequeat: & inde Seplastiariorū aduleria, ut in Thure diximus. In Hispaniā & Piceastri sunt, ex qbus Resinā, unde Pix coquat, colligunt. Pinus pro cera est. Hæc uectē sollicitatā, octo cubitis lōgiore effici, Theophr. affirmauit, at ne sic qdem solida radice, sed abrupta. Germinatio cōcepta in Pinu, sicut in robore, Abieteq; intermittitur; ideoq; turget ter, & terna edit germina: quod genus arbores *πριελόπων* appellatur, qui ter inchoatum opus intermissumq; repetāt. Theodorus gaza, ter squamosas, interpretatus est. Credo eum *τρίκλων*, non *πριελόπων* legisse. Germinatio prima Februario ineunte: q; in mōte Ida serius, ac fere idibus. Secūda, mēse Martio, qua & omnis Galla gignitur. Apri li tertia, paucioribus interiectis diebus q; inter primam secūdāq; fuerant. q; tempora hæc ad rationē latinam translata nō cōgruunt, ut in Galla de robore disputauimus. Ceditur uere; ubi cortex tantum detrahēdus est, ad operū rotūda. Nā ad quadrata, ubi germinatio defierit, & si ualidior quærat, etiā ubi fructum excocerit. Sed tū uermiculi quidā sub cortice nascuntur, q; summo tenus caudicem nō erodāt, sed uelut inscribāt, unde quibusdā sigilla. Hoc nō in Pino, uel Larice tantum euenit, sed in omnibus, quæ post fructus maturitatem cedūt. Et illa cōmunis omnibus quæ cēdunt in arte, fabricauē distinctiō, ut aliæ quadrifidos uenarū cursus habeāt, bipartitos aliæ, uel omnino simplices, hoc est, ut Theophrastus inquit *τετραόων*, quæ Gaza meus quadriuiuas, & biniuiuas, & uniuuias conuertit. errore manifesto, q; *τετραόων*, quæ Gaza meus *μονόωον* legisset. Nos in ea re Plinium, & Victruium autores habuimus. Ex Pino nauigiorum rotunda fiunt, & onerarijs carinæ: quanquam nec ex quercu negligunt.

A

καλλιόρα

Plin. lib. 16. capite. 10.
Theophr. li. bro. 3. cap. 10.

Theophr. lib. 5. cap. 2. & lib. 9. cap. 1. 2.

B

*

πριελόπων
... sigilla

D I O S C O R I D I S

C Sed illa triremibus idonea magis est, ut diximus. Aescullos carbonem Pini querno praefere-
runt: non quia uiribus parem, sed quod ad flatum commodius respondeat, nec ut querno marcescat.
Resina huius a germinatu tollitur, detracta prius teda. Ex omnibus resinam ferentibus, secundu
las e Pino firmissimas esse constat, ex ceteris faciles omnino, sed imbecilles. Folium Pino, Pi-
nastroque aculeatum mucrone, praelongum, exile. Pinus fert minimam Resinam, interdum ex ipsis
nucibus, uix ut ascribatur generi. Pinastrum nihil aliud est quam Pinus siluestris, mira altitudine, &
a medio ramosa, sicut Pinus in uertice. Copiosiores dat haec Resinam, Gignitur et in planis eo-
dem modo, Peuce dicta. Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiae, quas Stibulos uoca-
ri Plinius existimat. Ego Strobilos legendum arbitror, e natalium cognatio ne ita dictas: sed graci-
les, subcinctioresque, & enodes. Liburnicarum ad usus pene, sine Resina, cura degenerant. Flo-
rem Abietis, Taxique praueeniunt diebus circiter. 15. ab occasu uergiliarum. Eadem proportionem
fructus suos afferunt. Aliqui genera duo faciunt. In Troade montanum siue Idaeum, recta, celsa,
crassa materie, nucibus oblongis, uiridibus, sero dehiscens, utpote siluestrior, pice copiosa.
Maritimum folio tenuiore, infirmioreque, cortice leuiore, & corijs uulgiore quam Idaei. Nuce rotunda,
breuiusque aperienda, ualida, & robusta materie. Alij, ut Macedones, marem intelligunt sterilem, bre-
uiorem, folio duriore. Foeminam proceram, & folijs pinguius mollioribus, & simplicibus, atque
non rigentibus. Lignum maribus retorridum, praecinctum medulla, durum, & ad fabrorum opera
confortum. Nigrior radix foeminae, mollior, & omnino tractabile securibus. Pinus foeminam ha-
bet, quam graeci uocant aegida, mellei coloris, pictorum tabellis immortalis, nullisque fissilem rimis,
proxima medullae, cor Pinus a Theophrasto nominatur: quae in Abiete Luffon appellatur. Nasci-
tur haec in foemina dumtaxat, ut quae minus tedacea sit quam mas, leuigatior quoque, ac prior cursu
meatum. Ficem uocant Idaei tedarij, cum gradum arborum medullae securis adigitur. Quibus prostra-
tis partes candidae ambientisque computruerint, colore uehementer abiectione, et neruo pretenui. Nam
id quod in Pinu rubidius Peda nascitur, mares potius habet quam foeminam: hoc maribus tantum acci-
dit, & odore grauissimo est: neque tedam redolens, nec ardens, sed ab igni resiliens, Syce, non Sta-
cte dicta, ut in Plinio correximus. Pini morbus est, ut teda fiat, tam parte caudicis externa, quam
corde, id quod abundantia succi, & ubertate larga luxuriantis naturae puenit. Mares hanc tantum se-
runt. In quo noscendum, superiora, quae de Pino Theophrastum secuti diximus, omnia fere ascri-
pta esse Larici a Plinio, ut premonuimus. Nec mirum, quando & perpetua fronde uiuent omnes,
& in Macedonia, & Arcadia. Circa Elin permittunt nomina: nec constat autoribus, quod cuique gene-
ri attribuat. Larici ergo situs idem qui Piceae in montibus, eademque facies. Mareria praestantior lon-
ge, incorrupta uis, emori contumax, rubens, odore acrior: nec ardet, nec carbonem facit, nec alio
modo ignis uel consumitur quam lapides: cum cetera quae pice & resina fundunt, immodice accensa, car-
bonem expuant, cum eruptionis crepitu, eiaculanturque longe. Plusculum huic melleo colore, atque len-
tius generis arbor in Illyrico est, redudantior humore quam reliqua, parior, liquidiorque, quam Picea, flami-
nis, & lumini sacrorum quoque grata. Improprie uero, tedas appellamus, tum clia quoque ligna,
quae flamma olei uel picis illitu concepta, faculae modo luceant, tum piceae satiuae partes imas, qua-
lem in Nucleorum pineorum capite monstrauius. Ex his quae dicta sunt, constat in Europa sex ha-
beri genera cognatarum arborum, quae resinam ferant. Pinum, Pinastrum, Piceam, Abietem, Laricem.
Tedam. Addi potest & septimum, Piceaster in Hispania, Pinum uoco, piceas nuces ferentem:
quam graeci χόρυξ appellant. Pinastrum & Laricem, quam πεύκη, in Troade uisenda, magnitu-
dine. 14. pedum ambitu, altitudine duorum iugerum, praetereaque cubitorum quindecim. Piceam,
quam πίτυς, & poetae blotrem, ut quidam rentur. Tedam porro, quam δάσ & δαδίων. Atque om-
nia haec Plinium sequentibus. Nam Theophrasto, Pinus atque Larix idem, quemadmodum satis
pissime testati sumus. In Palladio corrupte legitur Tinus, pro Pinu. Idem autor Lignum gallicum
uocando, aut Laricem, aut ei simile quid significat, ut multi sentiunt.

Theophr. li. 9.
capite. 1. 2.

Pityda fructum Piceae, Dioscorides uocari scribit, itemque Pini: sed improprie, ut Galenus in-
quit. Plinius e Pinastro nuces ita nominat. Hippocrates Pityda, pro resina e Pinu, siue Picea
potius intelligit, ut eidem Galeno placuit.

E X M. V E R G. C O M M.

Arborum quae mastichem, resinamque, & pices destillant, tanta est in destillando similitudo, &
tam multa in natalibus, earumque appellationibus mistura, ut nihil in Theophrasto, Plinioque, et
alijs incertius legatur, alijs temporibus eiusdem rei, non eiusdem appellationibus utentibus, & inuice
eas commutantibus. Nos diligenti observatione eorum, quae Theophrastus, & post eum Plinius, amboque
pluribus locis tradiderunt, graecam Pityn tuto, & communi omnium in ea uoce consensu. Pi-
ceam

ceam uertimus, & πένκην teda: eo, præter multa alia argumento usi, quod hic ipse scriptor, non multo post hæc de liquida pice dixerit, συνάγεται μὲν ἐκ τῶν λιπαρωτάτων ἑλῶν πύκνης καὶ πί-
 τνος, quod est, collige præcipue picem, ex pinguisimis lignis peuces & pityos. Quod totum Plinius pariter indicauit, copiosiotem resinam, & liquidam Picem fieri ex teda & picea testa-
 tus. Poterat & multis alijs argumētis idē confirmari, sed nos his quæ in Theophrasto, Plinioq; & grecis, latinisq; alijs legi possunt, Cōmentationes has nostras, impudenti alienarū opum co-
 aceratione augere nolumus. Poterunt uolentes lib. 16. cap. 11. Plinium, & Theophrastū, omni-
 bus fere libris, de Plantarum historia uisere, omniaq; cognatarum arborū discrimina, in tam
 grauibz scriptoribus certius cognoscere, & cognita grauius censere.

Quod deinde Dioscorides ait, Piceæ Tedaq; corticem, in teneris corporibus ulcera ad ci-
 catricem perducere, τριφυροχρῶτων, non ad genus uitæ tantum, ut Ruellius uertit, sed ad illud
 & sexum & ætatem referendum etiam est, pueros inquam, & in delicijs et umbra agētes, qua-
 les formæ sunt, eorumq; corpora. Sic enim antiquiores grecorū medici usi ea uoce sunt, ἀπα-
 ρὰ σαρκὸς καὶ ἐκκληροδοσίου, id est, teneræ & duræ carnis, ex ætate sexuq; & delicijs appellantes. Sic
 Paulus Aegineta capite, de uulneratis neruis, uocibus illis usus est.

Diu post hæc nos torfit, qd' in grecis omnibus legitur, σάβη δὲ ἐξ ἀντὶν γίνεται εἰς ἀκόπων
 ἐκινναρίων καὶ πικρῶν ἐπιτίθεται. Et nos uertimus. Quinetiam de asandis in cōfectione acopis, pes-
 sulisq; eadem omnia materia apte utuntur, concinniore sensu, q' si rude, quæ ad subigendum
 liquida, notissimum instrumentum est, ex his arboribus facta, subigi in cōfectione ea dixisse-
 mus: pro quo sensu, non σάβη fœminino genere, sed neutro σάβημα legendum illic erit. Est au-
 tem σάβημα, ut grecorum lexica indicant, πένκνωμα, id est, defatio: factaq; ea uox est, quod quæ
 telarum modo texuntur cultellata, huiuscemodi spathe percutiuntur, percussaq; densantur. ex
 qua similitudine hic ait, harum arborum materia densari acopa & pessulos. Non tamen dāna
 mus aliam illam lectionem. Potuit enim antiquitas, in his quæ ad acopa & pessulos coquere
 tur, rude ex his arboribus facta, uti: sed illa aprior uisa sententia est.

De Pineis nucibus.

CAP. LXXXVII.

NVces Pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut Cu-
 cumeris semine bibuntur, urinam ciēt. Acrimonias in renibus,
 aut uesica hebetant. Stomachi rosiones leniunt, datæ cum Portulacæ suc-
 co. Virium infirmitatem roborant. Corruptorum quoque humorum la-
 bem obtundunt. Pineæ nuces recenter arboribus decerptæ, in passo fran-
 guntur, & decoctæ, uetustæ tussi ac tabitudini conferūt, si quotidie ex eo
 liquore terni cyathi bibantur.

BARBARI COROLL.

NVclei Pinei, græce Strobili dicuntur. Quāquam Strobilos, & tripudij genus est, siue sal-
 tationis, apud Iulium pollucem. Galenus etiam Cocallos uocat, nucleos eos in Hippocrate.
 Sunt qui Cocallos, non pro nucleis Pineis, ut cæteri, sed pro Cocco gnidio accipiāt, ut idem
 Galenus ex alterius Dioscoridis sententia testatur. Arbor ipsa Conos &, quandoq; Strobilos.
 Cū decocti melle sunt in taurinis, Aquiceli nominātur. Dulciarij quoq; genus quoddam ex
 uua passa, Nucleus pineus, ex amygdalis una tostis, Conos, appellatur apud eundem Iulium
 Pollucem. Nuces ergo Pineæ, grandissimæ, altissimæq; a terra suspensæ. Intus exiles nucleos,
 lacunatis toris, ferruginea tunica uestitos, contegunt. Nuclei Pineæ quaterna genera. Durum,
 qd' & uulgare. Tenerū, & putamine digitis fragile. Ideoq; auibz expositi, Tarentinam uoca-
 bant. Tertium Picea satiuæ, nucleorū cute mollissimum, adeo ut simul madatur: qd' autore Pli-
 nio Sapiū uocetur, & Nucleis. quanq; uerbū Nucleis in eo melius fortasse pro nucibus Sapi-
 neis, q' pro arbore ipsa capitur. 16. uolumine. Pliniani certe codices, libro quintodecimo, non
 Sapium, sed Apinum habēt. Nos Apium, & Indicis, & inscriptionis, & exemplariū, quæ ma-
 nu scripta sunt argumento, legimus, & Columellæ, apud quem nux Sapinea legitur. Quidam
 Apinas, a uilitate dictas arbitantes, literam, S, dictioni ueræ derahūt. Imas arboris huius par-
 tes, ut idē inq; Plinius, tedas appellamus. Omninoq; nihil aliud, q' Picea est, feritate paulū mi-
 tigata satu. Nā Sapius, siue Sapinea, Fusternæ pars est Abietis inferior: nō ut Seruius scribit,
 species Abietis apta nauibus. Nā supna eius arboris, a duricia nodorū, Fusternæ simpliciter ap-

A

B

5 p d i d i

Theophr. lib.
 3. cap. 10.
 Plin. li. 13. ca. 9.
 e. lib. 16. ca. 16

C pellatur. Vtriusque meminerunt, & Plin. & ceteri. Mouit hominem gramaticum, Varronis credo auctoritas parum intellecta: qui dixerit in montanis plixiores uenire Abietes, et Sapinos, firmioresque propter frigus. Quantum Pityides: quas proxime descripsimus. E nucibus quoque Pineis non nihil Resinae colligitur.

De LENTISCO. CAP. LXXXVIII.

Lentiscus nota arbor est, cui uis inest astringendi. Semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusque cognatae insunt uires. Liquamentum autem ita fieri solet. Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta sunt, folia abijciuntur. Aqua denique coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis e uulua, & eiusdem, aut sedis procidentia. In totum acacie & hypocyrtidis uice representat. Idem facit succus e tritis folijs. Decoctum fori caua explet. Er fracta ossa ferruminat. Vuluae fluctiones sistit. Nomas arcet. Urinam pellit. Motus dentium collutione stabilit. Virentes furculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit e semine oleum, quod prodest cum quid astringi opus est.

Theophr. lib. 9. cap. 1. 2
Plin. lib. 15. ca. 24

BARBARICOROLL.

Lentiscus, exivor a graecis uocata, Resinam ubique fudat. Mastiche uero dicta in Chio tantum insula. Lentisci fructum, Hippocrates Schinida nominauit etiam, si tamen (librariorum culpa) non Schinides, sed Schoenides legendum esse, sicut & Cechrides pro Cedrides. Lentisci folia, quibus modo pelles excoriarum conficiunt apud nos, iudaico funco, plurima ex Illyrio conuecta, & uulgo Folia dicuntur. Plinius Lentiscum Italicam dicendo, uidetur praeter Chiam alia quoque genera nouisse. Fructus initio rubet, post nigrescit: qui & Sabuci specie, in racemis depedit, folio Pistacii, sed minore, per extremitatem rubente. In summo siliquae Pisorum, sed corniculi modo intortae: in quibus Resina odoris iucundi continetur. Romae demonstratur in ruduerolant frequentes.

EX M. VERG. COMM.

Potior quam nunc sit, quondam Lentiscus fuit. Et si, testante id Plinio, Ciceroni credendum est, rustici plebi necessaria, quae coeli, et in eo syderum imperita, arandi suorum operum auspicia ex propinqua arbore certius cognoscere posset, nihil enim nobis occultum natura, in discipulina raris esse uoluit. Ciceronis uersiculi hii sunt.
Iam uero semper uiridi, semperque grauata
Lentiscus, triplici solita est grandescere foetu,
Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.

Exprimatur succus e radice &c. Non in omnibus legitur refrigeratis, sed obiectis tantum. Nos autem illud adieciimus, in probatissimo omnium codice inuentum, in quo legebatur. μετὰ τὸ ἐφθίνειν καὶ λεγέται τὸν φύλλον σιπτεμένον.

μαστική ρητίνα
exivora

De Resina Lentiscina. CAP. LXXXIX.

Lentiscus resinam gignit, quae Lentiscina cognominatur, & ab aliis quibus Mastiche. Pota utilis est sanguinem reijciētib, & tussi ueteri. Stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia, & ilitiones faciei, ad nitorem cutis conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat. Manducata halitum oris commendat. Gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Praefertur Nitedulae modo resplendescens, & candore Tyrrhennicae Cerae similis, adulta, friabilis,

bilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur A
Thuris, Resinæq; mistura.

BARBARI COROLL.

Resina Lentiscina, in Chio Mastiche est. Importatur & ex India, quadā e spina Mastiche. Item ex Arabia, Lamā uocat. Sed ex Asia et Græcia ueræ q̄ simillima Exixme herba: quā Theodoris, diximus inter herbas. Ex Lentisco Chia, gummi modo nascitur, nigra, & candida. Preciū candidæ in libras. 20. nigræ. 12. Ex Ponto quoq; uenit mastiche, bitumini similior atq; nigra, uino cōdendo. Cæterum laudatissima inter omnes, Chia, candida. Adulteratur ut thura, resina, ut Plinius ait. Sed ut Dioscorides, Thure et Resina. Galenus in duo genera colligit. Nigram, et Candidam. Nigram Aegyptiam, Candidam Chiam, uocari prodens. Ex Aegypto unguentū aut oleum fieri solere negat. Non arbitror quenq; monendum, q̄ longe a uero sint, qui Mastichem a Silphio non separant.

Pli. li. 12. ca. 17.

*

EX M. VERG. COMM.

Rassa, friabilis & odorata. Græce sic, ἀδρα, καὶ πυρά, καὶ ὑδρὺς, καὶ ὑδάτις. Vitiosum nobis uidetur, credimusq; secundam illam uocem πυρά, aut aliam quandam fuisse. Aduersatur enim superioribus, nec potest aliquid simul candidum, quo colore hic Mastichem, & alij oēs laudauerūt, & πυρά, idest, ruffum, coloreq; ignis esse. Quam ob causam nos eā expunximus, non inuenientes, quam similem illi aliam uocem substitueremus: ibidemq; monstrante id re ipsa, in fraude & adulterio Mastiches, resinā Pineam adiecimus, sic in melioribus græcis legentes, disiunximusq; Thus, & Pineam resinam, eadem ueterum codicum fide admoniti: quoniā alterū satis esset, nec omnis resina id præstare possit, sed Pineam tantum, quæ colore candido in concolore Mastiche facilius falleret.

Quam diximus præterea acum harundineam, nihil intelleximus aliud, quam in purgandis a cibo dentibus, acuminatam harundinis festucam, pro qua ex Lentisco facta, uel ueteres sunt, & nostra ætate adhuc elegantioris uitæ homines utuntur. Nam καλαμίσκος græci, proprie dixerunt acus ex harundine factas, quibus mulieres cincinnos & uelamenta capitis firmarēt, quod nunc areis, aut argenteis sit.

B

De Terebintho. CAP. XC.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia et semen & cortex astringunt, & ad eadem ad quæ Lentiscus conueniūt, simili parata modo, sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur. Excalfacit. Vrinam mouet. Venerem excitat. Contra phalāgiorum morsus conuenienter in uino bibitur. Resina eius ex Petra Arabia oppido defertur. Prouenit etiā in Iudæa, Syria, Cipro, Aphrica, et Cicaladibus insulis. Sed præualet candida, perlucida, uitreo colore. & in cæruleum uergente, odorata, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit. proxima Lentiscina, & e Pinu, & Abiete. Has sequitur e Picea & Pineis nuncibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. Vitia pectoris expurgant. Vrinam cient. Cruda concoquunt. Ventrem emolliunt. Palpebras commodissime replicant. Lepras tollunt, cum erugine ac futorio atramento, nitroq;. Auribus saniem emanantibus, item in pruritu genitalium utiles. Malagmatis, acopisq; ammiscentur. Laterum doloribus illicitu, aut appositu auxilio sunt.

BARBARI COROLL.

Terebinthus, τερβινθος græce dicta. Messibus tritici, aut Paulo serius fructificat. Mas sterilis. Feminae distinguuntur. Aliæ fructum protinus rubentem, magnitudine Lentis edunt: qui concoqui non potest. Aliæ uiridem, pallidumue primo, demum rubentem, nouissime cum uia

D I O S C O R I D I S

C matureſcentem & nigreſcentem, qui & odore iucundior, amplitudine fabę. Interim maiorem, & reſinoſum taſtu, ſulphureoſumq;. In Troade, circa Idam, et Macedonia, brevis, et fruticofa, & contorta. Damafco Syrię inſignis, copioſa, decore aſpectu, ubi mons Terebintho, nec alia ſilua ſcatens. Materies admodum lenta, radicibus ualidis, ac ſiſq; in profundum, fidelis ad uerſtatem. Flos racemofus, oliuę modo, ſed rubens. Folium numeroſum, ab eodem pediculo. Figura Lauri, digeſto in uerſus, ut Sorbo. Vnicum ad cacumen exit, & numeroſum parem cõturbat: minus tamẽ angulata ſunt q̃ Sorbo, & ſimiliora per ambitũ Laurinis uidentur. Oleo ſa quoq; ut fructus. Fert & nucumenta quędam caua, ceu folliculos, Vlmĩ exemplo. In quibus animalia quali culices erũpunt. Et reſinoſus lentor, qualis e ligno, unde fit reſina. Fructus q̃diu maturus non eſt, in aqua fere ſupernatat. Niger ſidit. Vulneribus p̃fundis, ut Abies, & quę reſinã tedamq; ingerunt. Fecundior efficitur contra quam cęterę arbores. Materia uehementer nigra, ſpilla, ſplendida. Pręcipue in Syria tantum, ut Hebenum quoq; prouocet. Cul-tellis ex ea capulos, & calices Thericleos detornant, tam feliciter, ut a Figlinis internofci ne-queant. Thericlei porro calices Athenis clari habebantur. Nomen ab inuentore datum, qui Ariſtophanis ætate fuerit: ſiue, ut alij putant, a detornatis in eo beluarum pellibus, ſacrũ Baccho poculum facere. Cęterum falſo quidam extimaauerunt idem eſſe quod Carcheſtum, cum hoc conſtet antiquiſſimum paterę genus fuiſſe. Nam poculum, quod Alcmę lupiter, in ſa-ciem uerſus Amphitrionis eius coniugis dono dediſſe fertur, Carcheſium uocatum perhibet, multis poſt ſeculis Lacedæmone ſeruatum. Terebinthus ad reſinam tollendam poſtq; germi-nauerit, inciditur: id quod in omnibus reſinam fundentibus cuſtodendum eſt.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quia extremę iniuſticię eſt, ſua gloria aliquem defraudare, nec magis in homine lau-dandum conſtantia animi, & reddendi unicuique quod ſuum eſt, non pigebit, Theophraſti manibus & nomini hanc gratiam habentes, ex quo cuncta diuerſis locis de Terebintho ab eo tradita, præterito eius nomine, Barbarus pro ſuis in Corollarij commentationibus edidit, gręcã eius ſcriptoris de Terebintho, mox latinã omnem hiftoriã huic capiti ad-j-cere: ut poſſint uolẽtes (quod teſtati paulo ante ſumus) aperte cognoscere, obiterq; intelligere gręcarum literarum peritiores, in uertendis gręcis, hominis neſcio celeritatem, an negligentiam potius dicam, qui Plinium & Theophraſtum ſimul miſcens, *θυωδιστρον*, ex Plinio iucundiorẽ, ex Theophaſto, ſulphureoſum uertit, non animaduertens ab utroq; idem dici.

In quo parum caute egit, ratus *θυον*, quod gręcis ſulphur ſignificat, idem eſſe quod *θυά*, & *θυάδην* gręci idem dixerunt, quęcunq; ſ. in ſacrificijs et aris ad ſuffitus & uapores incenderent.

Quod tam manifeſte patet, ut probari non oporteat, uideturq; Gazam, Theophraſti inter pretem, in ea re ſecutum eſſe.

Idem etiam, quod erat *ὑπέρπυον*, uertit, qui concoqui non poſſit, cum tamen de coctura ci-bi quę in ſtomacho fit, Theophraſtus eo loco non agat, ſed de maturitate quę calore fit, & ſi milis cocturę ſtomachi eſt: parum memor, *πύπυν* utrũq; ſignificare, & Theophraſto in hijs quę maturantur peculiarem hanc uocem eſſe. Nam & in medicina *πύπιν* etiam dicuntur, quę abſceſſus, & collectiones maturant.

Poſſemus & multa alia hijs ad-j-cere, ſed hæc ſatis nobis eſſe uolumus: ut hoc quali guſtu meminerint legentes, & ubiq; ſciant, nihil non alienũ in eo eſſe. Nec morte præuentum potuiſſe extremam & ſalutarem illam manum his quę conceperat appoſuiſſe, oportereq; eos, qui in-tegram rem nouiſſe uelint, primos eius autores conſulere, nec nouis ſcriptoribus tm defer-re, ut ueterum obliiti, quemadmodum in cantu & muſica fieri Homerus dixit, nouiſſe quę tan-tum amemus & admiremur.

Terebinthum poſteriores grani uiridis arborem dixerunt, faſto illi nomine ab eo eius ge-nere, quod fructus ſuos in uiridi pallidos fert: quod Theophraſtus *χλωρόν* dixit, quali herba-ceum. Ex ea Terebinthina deſtillat reſina, omnibus notiſſima, in quotidiano medicinę uſu, de qua cum ſemel agere Dioſcorides cepiſſet, de reliquis etiam egit, cognata congeneribus ſuis coniungens. Noſq; ut in melioribus gręcis adhuc legitur, continuata hiftoria, uno tm titulo et capite omnia complexi ſumus Reſinę genera, inter quę Larignam ex Larice collectam hic nu-gens, Laricem hijs uerbis commendauit.

Larix uero, qui non eſt notus, niſi in hijs municipalibus, qui ſunt ad ripam fluminis Padĩ, & littora maris Adriatici, folijs eſt Pini ſimilibus, habetq; reſinam liquidam mellis Artici colo-re, quę etiam phliſcis medetur. Credimusq; nos, eam nunc eſſe, quam Venetijs deflexa a La-

D Nos breuitati cõſulẽtes, da-ta opa eũ locũ abbreviaui-mus: ne & in imẽſũ creſce-ret cõmentari-us, & q̃ ne ad eruditionem quoq; nobis aliquid facere uidebatur.

rice appellatione, Larga, officinae & uulgi appellant. Si quis autem uelit totam Laricis historiam naturamque nosse, Vitruium libro illo, & Plinium pluribus locis lib. 16. & 24. Palladiumque in Nouembri mense legat. Sunt enim scriptoribus his, & huic, omnia fere communia.

Quod in coctura Picis passim legitur, *ἢ ὡς ἂν χύμας ὁμαλῆς ὕδατος ἢ καθόλου ὕδατος ἢ ὡς ἄλλοι*, ex meliorum codicum lectione, *ἢ ὡς χαλκῶν*, idest, ahenum uertimus, praesertim ostendente id Plinio, qui libro. 16. hoc modo coqui praecipit. Verba eius sunt. Alij utilius putant, sine aqua coque-
relento igne tota die, utriusque uase aeris albi.

De liquida Resina e Pinu & Picea. CAP. XCI.

Liquida Resina e Pinu & Picea, a Gallia & Hetruria conuehi solet, atque olim a Colophonē petebatur, hinc Colophoniae sibi congnomentum uendicauit. A Galatia quoque Alpibus contermina, quam uernaculo nomine Laricem appellant incolae. Ea in linctu magnopere praestitussi ueteri. Colore inter se distant. Siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut Larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quae ad eadem pollet. Quae uero spissarum generi ascribuntur, quaedam ex Pineis nucibus, aliae Abiete, aliae Picea & Pinu exierunt. Eligi debet longe omnium odoratissima, translucēs, non ruffa, nec humida, quandam cerae faciem praebens, & friabilis. E Picea et Abiete resinae, caeteras antecedunt. odoratae enim sunt, atque Thus odore imitantur. Praestantiores a Pytiusa insula deferuntur, quae secundum Hispaniam sita est. Sed quae e Picea, nucibus Pineis & Cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Verumtamen eorundem gratia ut illae sumi solent. Lentiscina Terebinthinae correspondet. Vritur Resina omnis liquida in uase quadruplae capacitatis ad humorem, qui infunditur. Itaque Resinae congius, in duobus aquae pluuiae coquitur, subiectis leuibus prunis, Resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & stridula reddatur, ac digitis cedat. Caeterum ubi refrigit, infictile non picatum, quod Aconitum uocant, idest, non illitum, recoditur. Fiet etiam eximij candoris, si Resina omnis eliquata praeoletur, quo facilius sordes excernatur. Vritur quoque sine aqua, primum lento igne, & ubi coire ceperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquuntur, usque dum suum odoris uirus exuerint. mox ut dictum est, reponuntur. Spissam unius diei spacio decoxisse satis est. Vtque odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E Resina perinde atque Thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colore mentiantur. Prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisque oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

BARBARI COROLL.

Resina, multis arboribus leguntur, omnibus incisis a germinatu. Sed uarie. De Pinu, tademum detracta, de Abiete, ac Picea, ligno preguustato: de Terebintho, radicibus, ramis & caudice uulneratis. Sed melior, quae defluxit in caudice. Optima Terebinthina est spissitudine, leuitate, odore. Secunda bonitas Abietinae, ac Piceae. Copiosissima, ponderosissima, Picique proxima, e Pinu est. Portatur utribus liquida. Tum sponte crescit, autore Theophrasto. Nam Plinius

C nius, minimum Resinæ de Pinu colligi scribit. Credô, quia Pinus Theophrasto Larix est, ut diximus. Resinam piceam, quæ sicca sit, aridissimam inter omnes prædicat Aetius; eamq; Pitynon Physcema, priuatim dici meminit.

Resinam græci *πίτυν*, *κρ*, *πιτύν* quandoq; Paulus uocauit. Hanc ex Pinu & Picea siccam esse, Plinius intelligit. Dioscorides ex iisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi liquidas uult. Item, liquidas e Terebintho, Larice, Lentisco, Cupresso. Nam & ex serunt in Asia, Syria q;. Falluntur uero, qui eandem esse putant, e Picea atq; Larice. Picea pinguem, & Thuris modo succosam fundit, Larix gracilem, colore mellis Attici, ac mellei etiam liquoris uirus redolentem. Illud notauimus, tam arborem ipsam, q; eius Resinam uocari Laricem. Potest & Larigna ut Illigna dici: nam & castellum in fluminis Padi ripa ex eo ligno conditum, Viétruius Larignum appellauit. Oribasius, atq; Paulus Resinæ genus Italiæ in nascentis, *φυλόδην*, hoc est, lignosam comendant in Dropacem. Fortasse hanc intelligentes quâ Dioscorides Tyrrheniâ, siue Gallicam uocauit, uel Corticatam Columella. Resina laudatur, nationum Cypria, Syriaca. Vtraq; mellis Attici colore. Sed Cypria carnosior sicciorq; antecedens omnes. In sicco genere candida. In omni montana & cæpestri, præfertur Aquilonia. Terebinthi tenuissima est. Cupressi acerrima sapore, crassior Cedri, & faciendis picibus idonea. Arabica alba est, acri odore. difficilis coquenti. Iudaica collosior. In Asia, quæ fiat ex Picea, admodum, ut Plinius inqt, candida Sphagos, siue ut legi maluimus, Epargos, a candore dicitur. Liquida, raro utuntur medicis, et in ouo fere. Nec Pineæ magnopere in usu. Ceteris, non nisi decoctis. Resina oleo dissoluitur: utiq; ad malagmata, usufq; uulnerum. Quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur, in porciones amaris amygdalis. Colophonia, præter cæteras fulua. Si teratur, alba fit, grauior odore: & ob id ab unguentariis neglecta. Abietis resina, ut Larici redâ, uitiu est. Exiguu Abies sudat, aliquando contactu solis. Inuenio & Acernam resinam, hoc est, Zygian, in compositione, cui nomen est Baion. Est em Zygia tertium genus Aceris, rubens, ligno fissili, cortice liuido et scabro: qd alij Carpinum uocare maluerunt, ut Viétruius, a iugis, quæ hœbus ex hac arbore fieri solent.

D Resina Picea, si cum aqua leuius decoquatur, coleturq; lentescit, colore ruffo, Stillaciacq; dicitur. Eliguntur autem in id fere uitia resinæ, corticesq; Picea uase æris albi, Terebinthina in sartagine referuenti coquitur. Est & illa temperies ad crapulam. Flos crudus Resinæ cum multa assula tenui, breuiq; auulsus conciditur, ad cribrum minuta. Deinde referuenti aqua, donec coquatur, perfundit. Huius expressum pingue præcipua Resina sit atq; rara: nec nisi paucis in locis subalpine Italiæ, conueniens medicis Resina: quæ coquenda sit candidissima, requiritur. Porro sciendum est, aliud esse resinam comburi, aliud coqui. Si pprie loquaris, uritur ad fuliginem: coquitur uero, quæ crudæ usus in medicina fere nullus, nec extra q; in ouo, teste Plinio.

De Piceliquida. C A P. XCII.

πίττα, κδxxxv
P ix liquida, quam alij Conum uocant, e pinguiissimis Pini Piceæq; lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, leuis. Contra uenena, phthisin, purulentam excreationem tussim, suspiria, et pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum, & uux inflammationes, anginaq; utiliter perunguntur. Purulentis auribus infunditur cum Rosaceo. Et illinitur cum trito sale serpentium morsibus. Adiecta uero pari cæra, scabros ungues extricat. Tubercula uulux, & duricias sedis, discutit. Cum farinaq; hordeacea, & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. Cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Cæterum cum thuris manna & cærato subductos ulcerum sinus conglutinat. Rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur. Vlcerareplet, & cum melle purgat. Quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginant. Erodentibus medicamentis, quas Septas uocant, probe immiscetur.

B A R B.

Pix, nihil aliud est quæ fluxus combustæ in teda sua Resinæ. De Pinu fere omnis, ut Theophrastus inquit. Quanquam in Syria Terebinthi quoque picem ferunt: quia desint ibi Pinus. E Picea quoque, Cedro, Palma colligitur. Pix hyeme frigida, dererior, minus copiosa, decolor. Vbiq; optima, ex apricis Aquilonis situ. Ex opacis horridior, uirusque præferens. Ex Ideæ & montana Pinu largior, coloratior, dulcior, odore gravior, utiq; cruda: quoniam decocta multum deperdit: propter serum, quod in ea continetur abundanter. E Paralia, hoc est, maritima, flauentior & crassior, quæ diu Resina est, uidelicet quæ diu cruda: sed decoctio ex ea, prius absumit. Ideæ Tedosior, e pari modo tedæ. Imbribus admissis, quæ squaloribus, pix abundantior & liquidiore excipit. Hæc Idæi, priora Macedones. In Ida Pinus aperitur parte solari, ablato per uulnus cortice, binis, ternisue a terra cubitis, cum plurimum, singulis cum minimum. Postea confluit e tota pix, in ulcus, non sine teda, cum manare humor desinit. Simili modo ex alia parte cedit, ac deinde alia & sequenti semper anno teda locum implet. Extenuata per hæc arbor, facillime subuertitur uento: quod cum fit, tota succiditur: & cor. Id est, medulla eius, urit. In qua, & in radice plurimum tedæ semper est. Expletur uero in Pinu caua uulnere, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit, sed resina, seu pice, anno maxime ab incisu proximo, si pinus frugi sit: aut secundo aut tertio, si pessima. Probæ uices multas perferunt. Vitiosæ, nisi quæ modice inaniat, prouentumque dispenset, detractionem quartam non tolerant. Pinus nouellæ, fructificat. Veteres teda, non fructu sunt fertiles. Plinius hæc de Pinu a Theophrasto dicta, transtulit ad Laricem, partim ad Piceam, cuius assulas terræ proximas laudat. Altiores amaritudinem asferre scribit. In Syria Terebintho quoque ad picem, detrahunt cortices, e ramisque etiamnum, ac radice uindemiantur, cum resina tamen damnetur his partibus. In Hispania e Piceastro quoque fit, minime laudata, quoniam resina eius arida, uirosa, & amara sentiat. Pix conficitur hoc modo. Patitur area canali præparato, per quem humor in medium confluat. Tum lignum in hastulas coccifum, locatur struis congerie, uelut in carbonis usu: mox igni succenditur, terra undique circumdata: ne flamma erumpat. perit enim pix, si hoc eueniat. Quod si fumus se parte aliqua extulerit, scailis pinus admotis, locum terra sepiunt, lutoque obstruunt, ne euolet. Canalis subiectus Picem fluentem corriuat in scrobes,

*

Strues ipsa sexagenis, aut quinquagenis cubitis, centenis & octuagenis alta patet per ambitum. Sunt quæ per utrumque mensuræ, cubitos centenos agant. Humor qui fluit, obiter frigescit contactu. Vritur fere biduum. Opus perfecti signum, si rogos decumbat, subsidatque, & quasi latus det. Summa hoc illi diligentia, & religione peragunt, ceu feriantes, & cum appreciatione præsentium solenni, ut Pix ea tum copiosa, tum pba euadat. Ac prius quidam sudor, quæ aquæ modo fluxit in canali, Cedri uocat, utiq; in Syria: ubi Pinus non sunt: quo in Aegypto corpora defunctorum perfusa custodiunt. Sequens liquor, Picem fundit, quæ in cortinas æreas coacta, aceto spissatur, & coagulata, Brutis cognomen accipit, dolique dumtaxat utilis, lentore ab alia pice differens, item colore rutilante, et quod pinguior est. Autore Plinio, Brutiam a brutis dici constat, ubi nascitur, ad oppidum Mamertium feraci nemore, ut Strabo inquit. Nec Brutianam silam, quam obrem uocari eam Picem dicat comperi. Non enim silatum uinum, pro picato significari crediderim, etiam si Plinius quodam loco spissarum utilissimam medicinæ Brutiam, & ad uasa quoque in Italia condendo uino, tradidit, quoniam pinguis & resinosa utraque præberet utilitatem. Hinc ex mascula arbore meliorem esse adiciunt. Id quod intelligi non posse, Plinius existimat. Theophrastus certe, uri Pinum in Macedonia, non omnem, sed marem scripsit, Picis gratia. Nec feminae tamen radices negligi, quæ ea tantum pars in femina tedam habeat, ex qua omnia illa fiunt. In Asia Syri non detrahunt tedam, sed machinamento quodam in arbore ipsa Picem urunt. Fit Pix e resina quoque, sola piceque feruentibus cocta lapidibus in alueis ualidi roboris: aut si aluei non sint, congesta strue, ut in carbonis faciendi ratione. Hæc in uinum additur, farinæ modo tusa, colore nigrior, ut ait Plinius. Vitia Picis acor, aut odor fumidus, aut Picis adustio. Expimentum, si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescat, acore iucundo. Asia picem Indicam maxime probat. Græcia e Macedonia Ptericam, Virgilius Narintiam. condiendis uinis. Columella et Nemeturicam commendat: quæ in Liguria conficitur. Et Allobrogicam, quæ corticata dicitur. Siccata hæc uetustate in puluerem resoluitur, cribaturque. Idem autor Picis quoddam genus crudæ, Tasm uocari tradit, in defrutum Neapolitanum addi solitam. Sunt qui Rheeticam, Palladium Coracinam picem nominat, contra formicas arborum. Sed mendosa lectio est, & Coracinum piscem legendum: id quod ex græcis rei rusticæ scriptoribus elicias.

g. ii.

A

Theoph. li. 9.
capite. 1. 2.
Pli. lib. 14. ca.
20. Item li. 26.
capite. 12.

B

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

CR^Elinis coniunxit natura Pices, ideoq; legitimo hiflorie ordine, post eas Dioscorides de omni Pice docuit. Quod enim ex uiuentibus plantis resinæ nomine destillat, id incensa in furnis eadem materia, appellatione Picis, fuit, simplex a principio, & liquida tantum, mox ea decocta, sicca etiam, non dissimili penitus potestate: & hoc tantum diuersæ, ut testatus est Paulus Aegineta, quod sicca in secundo ordine, deficcet, minusq; quam liquida calefacit: contra uero liquida. Habentq; ambæ, quod purget, maturet, discutiat, & acris sit. Ad omnia tamen liquida efficacior, sicca uero glutinandis uulneribus aptior. Ob quas uires, hic mox dicet, uulnerum remedijs utiliter siccam misceri.

Conon a quibusdam uocari liquidam Picem hic Dioscorides ait, quæ uox, & rei in ea estimatio, q̄ uetusta, & uera sit, non ausim ego affirmare. Id certe pro comperto est, græcis κῶνον dici Pineam nucem, & ab ea forma mathematicis, terræ umbram, Conum dici, & Coni forma describi, & ab eo fructu, Pinum arborem, etiam Conum dictam posterioribus græcis fuisse, posseq; hoc loco, quoniam ex cognatis Pino arboribus Pix fiat eius appellatione censer: alioqui nihil habet ea uox quod ad picem referri possit. Dubitamusque nos, non κῶνον prima producta, sed κόνιν prima correpta, legi quōdam potuisse, & ex usu Pici id nomē accreuisse, quæ scilicet in uindemia, dolia, & in alijs uitæ nostræ usibus ficiilia pice ex interiore parte linirent, ideoq; picata passim dicerentur, & non picata. Qua uoce hic sepius utitur, ut in superiore capite cum ait, in uase non picato seruandam Resinam, &c. Quod totum græci κωνίαν uocant, qd est, illinire: licetq; κόνιν proprie puluerem græci dixerint, nihilominus cinerem, calcem, & quæcunq; alia dicebant, quibus leuigari asperitas, & obstrui raritas posset, quod in dolijs uini, ficiilibusq; alijs, quondam passim fiebat, & nunc uitro etiam fit: ideoq; græci κωνίαν, calce, glutinoq; & maltha aliqua illinire adhuc dicunt, & aconita ficiilia cuncta illa, quæ picata non fuerint, & aliquo huiuscemodi obstruata leuigataq;. Nec nos mouet, q̄ in hac significatione prima producta κωνίαν aliquando, & κόνιν inuenitur. facili enim eiusdem soni litera, ad uitium in scribendo lapsus est.

D Quod deinde impresso codici deerat post λιπρόν ὄνυχας, id est, scabros ungues, instaurauimus, καὶ λιχίνας, id est, impetigines.

Nec multo post dubitauimus qd legitur, φάρμακα τὴν ὀστέον καὶ ἐκχυρίαν δακτύλους διαφεροῦν, quæ uoces si sic legantur, significant, uulnæ abscessus, & sedis duricies discutit, non sic forte legendum esse, sed mutatis locis, aut malis uulnæ duricies, & sedis abscessus legi potius oportere, quando communius malum sedis abscessus quam duricies sit. Non tamen mutare rem ausi sumus, satisq; fore credidimus, signasse locum.

De Picino oleo. CAP. XCIII.

EPice fit quod Pisselaon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat Pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu Pix coquitur supra cortinam uellera madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas Pix liquida, præbet utilitates. Alopecias capillo replet, cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida Pix medetur. lumentorum ulcera, scabiemq; emendat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 4.

Oleum picinum, græci πισσέλαιον uocant, Probatum maxime e Brutia, ut quæ resinofissima, & pinguisima sit. Color oleo fuluus.

E X M. V E R G. C O M M.

Confundit intellectum, quod ultimū foeminini generis participium, in græcis claudit hoc caput, contra quadrupedum ulcera, & scabiem utiliter inuncta. Non enim certum est, Picem ne, an Picinum oleum præstare id Dioscorides decernat: nec nos audemus de ea re censere, cū Picino oleo id Plinius tribuat lib. 23. capite. 4. dicens Picino oleo usum passim esse ad quadrupedum scabiem. Et Columella lib. 8. cap. 5. idem testatur, quo loco liquamen Picis oleum hoc nominat. Maro autem Pici id adsignat, cū in Georgicis suis cecinit, Idæasq; Pices. &c. Et Columella lib. 8. cap. 30. etiam confirmet, bitumen, sulphur, & pleraq; alia, liquida Pici in hunc usum miscenda præcipiens. Nos communem, & fere omnium lectionem secuti, Pici id tribuimus nihil, quod eiusdem uices Pix, & Picis oleum habent, in ea re periculi timentes: potuitq;

Dioscorides

Dioscorides forte, quod in Pice a se relictum fuerat, hoc loco restituere uoluisset.

¶ De Fuligine liquidæ Picis. C A P. XCIII.

F De Fuligineliquida Picis. C A P. XCIII.
 It hoc modo e liquida Pice fuligo. In lucerna noua quæ ellychni-
 um habeat, non nihil Picis incendito, lucernamque fictili uase in
 clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius
 perforato ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito, consumptoque
 liquore nouum infundito, quoad sufficiētem usui fuliginem collegeris.
 Vis ei astringens, acrisq;. V sui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt
 & uenustant, & ad circumlitiones, item ubi glabris genis pilos restitui o-
 portet, ad imbecilles, lachrymososq; oculos. Insuper ad eorundem ulce-
 ra non inutilis est.

FVLGO PICE, cremata Pice fit; quod quidem aliud est, q̄ Picecocta, ut in fuligine resinarum diximus.

E X M. V E R G. C O M M.
Facile est, græci clibani, quem nos furnum uertimus, ex descriptione, picturâq; hac Diosco-
ridis formam non dissimilem his intelligere, quas nostra ætas Campanas dicit, & quibus offi-
cinæ passim utuntur, ex floribus, herbisq; subiecto igne, exsudatum humorem colligentes.

¶ De sicca Pice. CAP. XCV.

Liquida Pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui Palimpis-
sam, quo in genere quædam uisci modo lentescit, Boscas cognominata. Altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrussa, resinosa. Calfactoriam uim habet. Dura emollit. Pus mouet. Tubercula, panoscq; discutit. Ulcera replet. Vulnerarijs medicaminibus commode permiscetur.

P **BARBARI COROLL.**
Alimipissa, nihil aliud est, q̃ cocta his Resina. Nam prima decoctione Pix sit. secunda bis
pix, hoc est, *παλίμπισσα.*

E X M. V E R G. C O M M.

Quod moneamus hoc capite unum tantū ē, adieciſſe nos illi ſcilicet, & inſtauraſſe amiſſas, incuria librariorum uoces illas, **Talis Lycia eſt**, & **Brutia**, cōiuncta ſimul pietis et reli-
næ natura, quæ in aliquot melioribus græcis his uerbis adhuc leguntur, *ταύτην δὲ
ἔστιν ἡ λυκαϊκή χθὲς, βρυτηϊὰ δὲ τοῦ φθίνοντος ἔχονταί τινος ἁμα καὶ ῥήτινος*. Acceſſitq; noſtro huic conſilio
& Plinius libro .24. capite .7. dicens. **Spiffarum** utiliſſima medicina eſt **Brutia**, quoniam pin-
guiſſima, & reſinoſiſſima, utraq; præbet utilitates. Idem ſere Dioſcorides teſtatus.

¶ De Z O P I S S A. CAP. XCVI

De ZOPISSA. CAP. XCVI
ZOpissam aliqui aiunt deraſam nauibus refinam cum cera, quam alij Apochyma appellant. Ea diſſipandi naturam habet, quoniã marino fale macerata ſit. Alij Pineam refinam hoc nomine uocauerunt.

Z **B A R B A R I C O R O L L.**
Opifsa, effiacior omni Resina & Pice traditur. Ad omnia: quibus illæ, profunt, uidelicet
adfecto salis e mari callo. Optima hæc, a tyrocinio nauium.

EX MAR. VERG. COMM.
Quod Zopiffæ adiciens nomen, Apochyma, a Paulo Ægineta Hypochyma aptiore nomi-
 nis cōpositione dicitur; nulla tamen nobis in ea uoce certa rei significatio est.

၁၁၇

λυγνὺς τῆς
ύγρᾱς πίστεως

παλίμπισσα καὶ
ξηρὰ πίσσα καὶ
βοσκάς.

B

ῥῶπισσα
ἀπόχυμα

Plin. lib. 16.
cap. 12.

C De Bitumine. CAP. XCVII.

ἄσφαλτος

Bitumen Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque graue, ac ualidum odorem uibret. Nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur Pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agrigentino Siciliæ, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. Namque liquidi Bituminis genus esse constat.

Pli. li. 35. ca. 15.
Herodotus lib. 1.
Iustinus lib. 1.

B A R B A R I C O R O L L.

Bitumen, græci ἄσφαλτος dicunt. Vnde lacus Iudææ, ubi nascitur, Asphaltites uocatus, quo Iordanis amnis, & Tiberiadē lacu altero profectus, influit lacum Asphaltitem. Galenus in Syria Cœle, salsum, & propterea Mare mortuum uocari prodidit. Viderunt sub Babylone (inquit) lacus amplissima magnitudine, Asphaltides appellatur. Habet supranatans bitumen liquidum, quo Semyramis sit usa, cum Babylonem circumdedit muro. Itē Ioppe. In Syria, Arabiaque lacus, inquit, sunt, immensi magnitudine, qui emittunt Bituminis maximas moles. Ex Iudæa bitumen oritur, certo anni tempore supernatans, nec potest ibi tunc euelli, ad omnem contactum sequax atque lentum, præterquam filo, quod menstruum mulieris infecerit. Bitumen, alibi limus, ut in Iudæa, alibi terra est, ut in Syria, circa Sidonem oppidum marinum. Spissantur hæc, addensanturq;. Liquida sunt Zacynthinum & Babylonium: cui detracto, subest sal: & ad lucernas utuntur. Babylone nigrum & candidum gignitur: ubi & siccum fonte quodam, ut inquit Eratosthenes, Euphrati proximo. Liquidum est, & in Apolloniatarum agro inuentum: etiam si coire in glebas a Dioscoride dicatur. Fortasse defertur hoc a montibus liquidum: post concreuit, Siculum ex Agrigentino lacu pingue, liquorisque oleacei est. Incolæ harundinum paniculis id colligunt, ocyllime ita adhærescens. Bitumen illitur æramenti, munitq; ea contra uim ignis. Statuas ex eo inungi solitas ferunt. Placet in ferarijs fabrorum officinis, tingendo ferro, clauorumque capitibus. Nam calcis usu, cōstructos eo Babylonios muros, nouimus. Bitumen ex fulmine oriri dicitur. Vnde iuxta Babylonem redundat eo lacus, q; frequentia ibi cadant fulmina, ut Seruius grammaticus existimauit. Haud procul, Sufis putum haberi scribit Herodotus, unde Bitumē, sal, & oleum extrahitur: id oleum Persas appellare, Rhadinacem.

Herodatus libro. 6. Erato.

D E X M. V E R G. C O M M.

Viderunt libro octauo architecturæ suæ, cum de medicamentoſis aquis agit, ait, bituminosas aquas interioris corporis uitia potionibus purgādo sanare. Licetq; uitorū certum genus ille non dixerit, ex uiribus ramen & potestate bituminis, conſciendum id est, Iudaicumq; hoc Bitumen ideo a Dioscoride omnibus alijs præferri.

πῖς ἄσφαλτος, id est, Pici bitumen.

N De Pissasphalto. CAP. XCVIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidamnum, quæ Pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuque in littus expuitur, illic coacta in glebas. Mistam bitumini picem redolet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pissasphalton, aliud naturale, ut Apolloniaticum, Babylonium, Zacynthium e quodam lacu: Nam græci omnia ea modo Asphalton, modo Pissasphalton nominant, quandoq; resnam. Naturale optimum. Ex eo, quod cum seruet, innatat. Aliud factitium, mixta Pice bitumini. Hoc genus bituminis in Apolloniatarum agro inuentū, picem fossilem a Theopompo dictam auguro.

D E X M. V E R G. C O M M.

Plinius Pici bitumen hoc, aliquādo Fossilem picem appellat, parum certa rei indicatione, & in qua sibi ipsi parum conuenit, neq; enim potest simul aliqd fossile, & liquidū esse. Quod enim liquidū ex terra in lucem protrahitur, haurit. Testantur autē, Paulus Aegineta, Epyricq; incolæ omnes, & res ipsa, concreta substantia pici bitumen hoc esse, quod nostra ætate adhuc picandis

piscandis nauigijs, illic in usu est, ex quo uestigial ea gens non negligendum sibi fecerit. Nas-
tura autem ad Apolloniam antiquam ciuitatem, quam Strabo Epyroticam nominauit. Ste-
phanus *Ἰλλυρία* dixit esse, κατὰ ἑπιδάμωνα, ut ab alijs, quæ quondam eodem nomine, uigin-
ti quatuor diuersis locis fuerunt, ea regionis nota distingueret. Fuit autem mos antiquis
scriptoribus, homonyma locorum, regionis adiectione certius indicare. Quo fit, ut passim le-
gitur, ἐν ἀπολλωνίᾳ τῇ ἐν ἑπιδάμω, non sic, sed aut, τῇ ἐν ὑπέρω, legendū sit, ut Strabo ait: aut qd
Paulus Aegineta, τῇ πρὸς ἑπιδάμω, aut quod Stephanus τῇ κατὰ ἑπιδάμω, id est, in Apollonia,
quæ est apud Epidamnū, eiusdem Epyri aut Illyrij significatione, in qua & Epidānus ciuitas
antiquissima fuit, de qua Thucydides, Paulus, pluresq; alij longius tradiderunt.

De Naphtha.

CAP. XCIX.

Naphtham uocant Babylonij, bituminis colamen, colore candi-
dum. Inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spa-
cio protinus in eam transfiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines
utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Ab inflammatione tue-
tur. Vuluarum procidentias, strangulationesque, olfactu, suffitu imposi-
tu, emendat. Comittales morbos suffitu deprehendit, Gagatis lapidis
more. Purgationes mulierum cum uino & Castorio potum elicit. Tusa-
sim ueterem, & anhelitum adiuuat. Serpentium moribus, coxedicum,
laterumq; doloribus auxiliatur. Datur coeliacis in cataportio deuorandū.
Cum aceto potum discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum pu-
sana liquatum infunditur. Distillationibus suffitione medetur. Mitiga-
tentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos siccum replicat.
specillo impositum. Concalfactum autem & cum farina hordeacea ni-
tro & cera illitum, podagris, articulorū doloribus, lethargicisq; prodest.
Pissasphaltos eadem quæ Pix & Bitumen, si misceantur, potest.

BARBARI COROLL.

Naphthen, Erathosthenes generi Bituminis liquidū ascribit. Sed ardēs eius uis, ignium na-
turæ cognata. Procul abest ab omni usu. Ita appellatur circa Babyloniam & Susidem & in Au-
stagenis Parthiæ, profluens Bituminis modo liquor. Crema tam ea, pellicem Creontis filiam
a Medea ferunt, ad axas accedentem, corona igne correpta. Etiam si radicis cuiusdam ui, a Cir-
ce doctam, incendium id creasse Diodorus meminerit. Similis est naturæ limus, in Commage-
ne urbe Samosata, stagno emergens, Maltham uocant. Flagrat ea protinus, & cum quid attin-
git solidi, adhæret, & sequitur fugientes. Ita defendere muros suos municipales, oppugnante Lu-
cullo, flagrabat miles armis suis. Aqua magis accenditur, utique nō admodum copiosa: pul-
ueris tantum, & luti iactu restinguitur. Itemq; aceto, uisco, sulphure. Possidonius in Babylone
fontes Naphthæ geminos esse tradit. Alterū candidi, quod & liquidū sulphur sit, ignes in se cō-
trahens. Alterum nigri, quod liquidum sit Bitumen, & olei uice ad lucernas utile. In Mutinensi
si certe agro Italiæ similis Bituminis, seu Naphthæ potius liquor. Nascitur, & candidus, & ruf-
fus: quem circulatorum ad præstigias suas utilem circūferunt. In terra Moena Pannoniæ iuncta,
inquit Solinus, parte qua pontum attingit, herba nascitur, qua cum inficitur oleum, quod uo-
cant medicum: diræ naturæ, aqua enim exardescere, terra extingui.

De CVPRESSO.

CAP. C.

Cvpessus refrigerat & astringit. Cuius folia ex Passo & exigua
Myrrha uesicæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur.
Pilulæ autem ex uino tusæ in dysenteria, alui fluctatione, tussi, & orto-

A

Strabo. lib. 16.

repha

*Ingrato exemp-
scribitur ἐλεγχει
quod est deprehendit
sed uulstichius pu-
tat legendū ἐλεγε-
i. excitat. Vultu.
Comm. In tacitum.*

B

Plinius lib. 2.
cap. 105. & lib.
35. cap. 15.
Idem. lib. 2. ca-
pi. 104.
Plutar. in uita
Alexandri.

Solinus de mi-
rabilib. mūdi.

καπρίσσο

D I O S C O R I D I S

Cpncea, aut si reſciatur ſanguis, conuenientiſſime bibuntur. Earum decoctum eoſdem præbet effectus. Tuſæ cum Fico duricias omolliunt. Nariumque polypo medentur. In aceto coctæ, & cum lupinis detritæ, ſcabros ungues eiſciunt. Hernias inteſtinorum prolapſu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præſtant. Pilulæ cum arboris coma ſuffitæ, cuculices abigere exiſtimantur. Folia trita, & impoſita, uulnera conglutinant. Sanguinem ſupprimunt. Capillum ex aceto tingunt. Illinuntur per ſe, aut cum polenta ignibus ſacris, ulceribus quæ ſerpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus. Admota cum carato, ſtomachum corroborant.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. libro. 16.
cap. 33.

Cupreſſus, longa, ſubreſta caudice attollitur, cætero quidem orbe ſatu, hoc eſt, ſemine ſuo naſcitur. In Creta etiam trunco, præſertim in montuoſis Tiraſenſium, ubi cædua eſt, & cæſa regerminat: modo ab terra, modo a parte media, modo ſumma, raro ab radicibus. Semē ei perexiguū. Non enim galbuli, qui naſcuntur, ut Theophraſtus reſert & Varro mutuatur, tanquam pilæ parū, corice cupreſſini, dictæ Coni, ſed hīs intus primigenia ſemina dedit natura, Laricis proxima, perquam minuta. Hæc pilula dehiſcente, illa cum matureſcit, diſſilantur & euolant. Neque facillime colliguntur, præterquam a peritis. Aduena Italiæ quondam, & natu moroſa, baccis torua, folio amara, odore uiolento, materie rara, ac pene fructicoſi generis. Diti ſacra, funeribus indicandis, ante domos poni ſolita. Sterilis fœmina diu, ſed metæ aſpectu, quæ in faſtigio ei conuoluta eſt, grata, diſtinguendis Pinorum ordinibus, facili ſe conſili culturæ præbens, hitoriales picturas, tenui folio, breuiq; & uirente ſuperueſtiens. **D** Contra mas, ſpargit extra ſe ramos, deputaturque, & accipit uitē. Vterque ſexu, in periticas, aſſereſq; admittitur, amputatione ramorum: qui tertio decimo anno, ſingulis denariis ueneunt. Proinde filiarum dotem Plantaria, ueteres appellauerunt. Tarentinam Cato nominat, quoniam, ut Plinius arbitrat, primum e Creta uenerit Tarentum Cupreſſus. In AEnaria quoque ſuccifa regerminat. In Creta quocunq; loco quis mouerit ſolum, niſi ſeratur alia, hæc ſponte gignitur. In Idæis albiſque montibus etiam non appellata ea, proſilit, ibiq; ſummis iugis, ubi niues nunquam abſunt, plurima. Alibi non niſi in tēpore prouenit, magno alticis faſtidio ac labore. Commendari maxime Cupreſſum Meliſiam inuenio. Fructum Cupreſſi, Galbulos, & Nuces Cupreſſi recte uocaueris. Nam Galbæ, ut ait Suetonius, animalia ſunt exilia, quæ in æſculis naſcuntur. Cupreſſos a partu ramulorum pariliū uocatas græci uolunt ἀπὸ τοῦ παριέου τοῦ ἀπρίμου. Eaſdē & Charites appellari ſolitas, Eteoclis fuiſſe filias adnarrant: quæ dum tripudio Dearum ſubſiliunt, in puteum ceciderint.

Sueton. lib. 7.
in Galba.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ in Cupreſſo pilulæ, autore Plinio, dictæ a nobis fuerunt, Galbuli, nuces, & coni, eiſdem rei appellatione, ab alijs etiam dici poterunt, omnibus in ea arbore noſſi mæ, in quibus exigua ſemina ſunt, dehiſcentibus hīs euolantia magis, q̄ decidētia. His, folijs q̄ cæteri omnes in medicina addiderunt βλαστούς, id eſt, ſumma germina, & ſummos coliculos. Neſcimusq; nos, an deſyderari hoc in Dioſcoride debeat. Paulus certe AEgineta, huius arboris coma in aliquibus utitur, hic tantum in fugandis culicibus uſus eſt, licetque in uniuerſum de totis folijs hoc loco agatur, poſſunt tamen ſummæ illæ parteis, teneritudine ſua diuerſa a folijs natura eſſe: quæ omnia peritioribus cenſenda relinquimus, ut interim quod commentationis huius noſtræ curſum in foribus ipſis remoratum eſt, breuiter ſignemus. Decernit hic pota in paſſo, adiecta exigua Myrrha Cupreſſi folia ſuccurrere, καὶ πρὸς τὴν αὐτὴν καὶ αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ. ſi uerbum de uerbo uertatur, in ueſicam deſtillationibus, & urinæ anguſtijs: quorum ultimū hoc manifeſtam habet ſignificationem, prius illud ex uī græci uerbi, quod eſt πρὸς τὴν αὐτὴν, fluxum mali & noxij alicuius humoris in eam partem ſignificat: quemadmodū in podagris ſit, in q̄bus græci dicūt, articulos πρὸς τὴν αὐτὴν, i. fluxu humoris in eā partē tentari. Quibus ſic ſe habētibus, dubitatū a nobis, ex uiribus Cupreſſi, q̄ adſtringere, & refrigerare hic tm̄. Gale, autē & Pau. præter hæc ſiccare etiā dixerūt, ſi in ueſicā deſtillationib; ſiccādo adſtringēdōe cōferūt, quomodo

quomodo urinæ angustius, quibus contraria ratione succurrendum est, conferre poterunt.

Accedit suspitioni huic nostræ, etiā quod Plini. lib. 24. cap. 5. de his agens ait. Cupressi radicem & folia, uescicæ & stranguriæ pota mederi: quasi, quod hic in uescicæ destillationes dixit, id Plinius ad urinæ stillicidium transfulerit. Non tamen in medicinæ decretis, Plinium anti quis græcorū medicis comparamus, sed in re parū certa, suspitioni nostræ, ex eo autore fidē aliquam adijcere uoluimus.

Autigitur constituendum, in uescicæ destillationes illas, pro uescicæ & urinæ stillicidio intelligendas esse, ut cognata simul urinæ duo mala, hic coniunxerit, stillicidiū scilicet, & difficultatem. Quod nos non probamus. quoniam quod paulo ante diximus, significat græcis *πυμαρίσσειν*, aut angustias illas urinæ, i. *Ανυρίσσειν*, nō pro his quæ uere & ex difficili urina urinæ angustia sunt, sed pro labe, & nōxa aliqua alia, quæ ex destillatione humoris in eam partē urinæ accedat. Quod ex aliorū sententiā erit. Nam & Serapion sic uertit, & Cupressi uiribus magis conuenit, quæ ut diximus, in siccando, adstringendo, refrigerandoq; sunt.

Quo loco etiam legitur, *τρίκας* Cupressi pilulas cum uino potas. &c. in antiquioribus græcis, nōn pilulæ tantū sunt, sed folia etiam, legiturq; pilulæ & folia, & si Plinius pilulis tantum id tribuat. Nos græcos secuti utrunq; diximus.

Dubitauius præterea non procul a rotius capitis sine, coniungendū ne in denigrando capillo, an in sistendo sanguine acetū Cupressi folijs esset, alijs græcorū codicibus id, alijs aliud in dicantibus. Neq; ab re penitus, quoniam sistendo sanguini acetū in usu est. In ambiguo tamē, accedente Plinio, qui eodem libro & capite ait, capillum denigrant ex aceto, ad capilli denigra tionem & nos contraximus.

De lunipero parua.

CAP. CI.

Luniperum parua græci, Arceuthyda, aliqui Mnesitheū, alij Aca talidem, AEgyptij Libium, Galli lupicellum, Romani luniperū uocant. Eius duo genera. Altera maior, altera minor. Vtraq; acris est. Excal facit, & urinam mouet. Accēsa serpētes fugat. Baccarū nōnullæ, nucis in glandis magnitudine nonnūquam grādescere, aliæ nucem ponticā æqua re inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ Archeutidis etiam nomē, id est, luniperi retinuerunt. Modice calfaciunt & astringunt, stomacho utiles. Contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina & serpentium ictus efficacissime bibūtur. Urinam cient. Vnde ruptis, conuulsis, & uulua stranguatui subueniunt. Folia acrimoniam habent. Ideo tam ipsa, q̄ eorum succum ex uino contra uiperarum mor sus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuorata, interficiunt.

BARBARI COROLL.

Luniperi, duo genera quidem constituunt, Vnum, quod floreat. nec fructificet. Alterum qđ fructificet, nec floreat. Solam fere arborum, prorogare fructus suos in biennium, qui ne matu rescant quidem, sed decerpantur, & aliquandiu conditi seruentur. Et si in arbore relinquantur, marcescant. Materia fabricis conueniens, tam futuris sub dio, q̄ terra obruendis. Plinius hac descriptione Cedrum maiorem, non Luniperum demonstrauit, ut indicabimus in Cedro.

EX M. VERG. COMM.

Non leuiter in instaurando hoc capite laboratū nobis est, tam uariē corrupteq; in antiquio ribus græcis totum hoc caput legebatur, alijs in prima parte statim maioris, minorisq; lunipe ri diuisione & appellationes describētib; alijs alterā ab altero separantibus, & quæ ad mino rem pertinerēt in principio, quæ uero ad maiorem in extremo calce docētib; cunctis uero in reliquo capite parū sibi ipsis cōueniētib; . Sed nos meliorem ordinē, latinorumq; autoritatē & fidē secuti, qua nunc legē forma instaurauimus, ita tñ, ut nihil additū, subtractūue a nobis fuerit, nihil ab impresso mutatū, quod non in reliquis omnibus, aut in pluribus salte legere.

A

B

ἀρκευθίδα μινίμα
μυσιθεός
ἀκαταλίδας
λινεόν

Plin. lib. 16. ca
pite. 25.

D I O S C O R I D I S

C Credimusq; in Gallia minoris Iuniperi appellatione, ex obsoletis incertisq; notis, & uestigijs quibusdam, quæ in antiqua lectione adhuc apparent, non Iucipellus, quod caret sensu, sed Iuniperellus legendum esse. Nōtamen hoc multifaciendum.

Illud in Iuniperi fructus historia grauius & diligentius curandum, quod in antiquis ab impresso codice diuerse legitur. Hic enim ait, alterius fructum nucis magnitudine provenire, nullo nucis genere adiecto, quod merito desyderandū est: alterius nucis Ponticæ, i. auellanæ quantitate. At in antiquioribus, hisq; melioribus, in primo nucis Ponticæ legitur, in secundo fabæ: quā lectionem etiam Serapion secutus est. Quo fit, monente id re ipsa, ut etiam primo Ponticæ nucis magnitudinem, secundo fabæ adsignauerimus. Lapsus hic librarij fuit in exscribēdo, in ter *κνισμον* & *κνισόν* errantis.

Pli. li. 24. ca. 9.

Susplicamur & illic uitium esse, quo loco hic ait, Vrinā idem etiam trahit, quapropter conuulsis, ruptis, &c. Non enim uidemus, cur hic inferat, ex eo quod ciende urinæ proffit Iuniperi fructus, ob eam causam conuulsis ruptisq; prodesse debeat, potest quidem omnia illa, autore Plinio, qui hoc ipsum agens, ait urinam ciere, illiniri & oculis in epiphoris, & dari conuulsis, ruptis, uuluis, &c. Verum nos id non damnamus, sed suspectam nobis sermonis seriem dicimus esse, desyderamusq; illic aliquid, a quo certius fieret illud.

Quæ deinde in morbis & medicina pectoris uitia dicta a nobis sunt, a Plinio, Serapioneq; ad dolores eius partis contrahuntur.

ἰνιπερίον μεγάλη
μνησθῆναι
ἀκνισίρα

De Iunipero magna. CAP. CII.

Iuniperus magna, quam aliqui siluestrem Cupressum appellāt, alij Mnesitheum, alij Acateram, Romani Iuniperū, uulgo cognita est. Cupresso assimilis. Asperis, maritimisq; locis plæruncq; nascitur, easdem quas supradicta uires habens.

BARBARI COROLL.

Iunipero uirtute similem, Capidam a Catone dictam inuenio, ad lotium mouendum: nec quid sit, dicere coniectura possum.

D
βράθυον
βάρυτον
βαρόν

De hærba Sabina. CAP. CIII.

Gracis Brathy, alijs Baryton, alijs Baron, Romanis hærba Sabina appellatur. Duorum generum est. Vna folijs Cupresso similis, spinis horridior, grauius olens, acris & feruens. Arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. Huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera Tamaricæ folio similis est. Vtriusq; folia nomas sistunt. Collectiones illitu mitigant. Et cū melle nigricias sordescq; repurgant. Carbunculos cum uino pota rumpunt. Sanguinem per urinam eliciunt. Partus apposita extrahunt. Et suffitu idem præstant. Vnguētis calfacientibus immiscentur, & priuatim gleucino.

Pli. lib. 17. capi
te. 13. & lib. 24.
cap. 11.

BARBARI COROLL.

Herbæ Sabinae, aut etiam Sauinae genus id, quod simile Cupressi folio est, Cupressum Creticam nonnulli uocauerunt. Notum est contra gallinacei generis pituitas remedium, ut cubet in fimo qui ex herba Sabina fiat. Dioscorides hoc loco Baryton uocari eam tradit a nonnullis. Vt fortasse de hac intelligant scriptores, præsertimq; Dioscorus, cum in Arabia nasci dicunt, Boraton, Iuniperū, Cedrumq; quasi Boraton p Baryto, uel cōtra exemplariorū uitio legatur.

N E X M. V E R G. C O M M.

Non est, quod in Sabinae herbæ, tam græcis q̄ latinis appellationibus legentes moneamus, nisi forte, quod a Dioscoro in Arabia nasci dicitur Borathon. Sabina herba est, quā hic Barython, & Barathon uocari a quibusdam dixerit. Quod suspicari penitus ab re non est. cognatæ enim plantæ, & ab hoc deinceps descriptæ Iuniperus & Cedrus illi coniunguntur. Sed non omnino literis Dioscoro, & huic scribuntur: hic Barython, ille Barathon uocant.

Sic

Sic dicta est a regione qua multa nascitur. Et herba dicitur, quoniam non arborefcit, sed in latera caulium modo se explicat.

In curandis morbis, nō bene in græcis legi suspicamur, καὶ ἀνθρακας περιρρῦπτειν οἶνω πο-
 λυτῷ καὶ ἀμα διόφραν ἔχει, quod paucis mutatis uersum a nobis est, carbunculorum crustas ex uino imposita exterunt, & cum urina sanguinem ducunt. ad exterēdas enim carbunculorum crustas, foris magis quam intus remedia afferunt, & ad ducendum cum urina sanguinem, apti us aliquid bibitur.

¶ De Cedro. CAP. CIII.

Cedrus arbor magna est, ex qua Picem colligunt, quæ Cedria uocatur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum Myrti magnitudi-
 ne, rotundas.

BARBARI COROLL.

DE Cedro autores uariant. Theophrastus alteram Phœniciam, alteram Lyciam appellat, similes Iuniperō, nisi q̄ folium Cedro acutū, spinosum & durum, Iuniperō simplicius ac mol-
 lius. Excelsior & hęc quam Cedrus. Alij utranq; Cedrum, inquit, nominant, sed quæ proprie sit Cedrus, acutum Cedrum uocare malunt, idest, Oxycedrum. Nodosæ ambæ, alis frequen-
 tibus, ligno contorto. Sed in Iuniperō, spissiore, putrescenteque. Cedro æterna materies. Vtri q̄ medulla rubens. Sed odorata in Cedro, sicut & fructus: qui & flauus, & magnitudine bac-
 carum Myrti cernitur, esculentus, hilaris, Iuniperō niger, acerbus, ingustabilis, durans añum, prius non decidens q̄ subnascatur alius. Arcades fructus in ea ternos eodem haberi tempore confirmant. Satyrus utranq; sibi allatam sine flore, Cupresso similes, scabriere tantum corti-
 ce. Radices solutę summa cute ambabus hęrent. Saxosa loca & algentia sequuntur. Plinius lō-
 ge aliter: quippe qui notas Iuniperi, Cedriq; confundat. Fortasse uerius, q̄ priores. Cedri sum-
 ma genera duo facit, maius, & minus. Maioris iterum duo: quæ floret, fructum non fert: quæ
 fructifera est, non floret, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius Cupresso
 simile. Quidam Cedrelaten uocant. Ex hac resina laudatissima. Minoris quoq; species binæ,
 Lycia, & Phœnicia, Iuniperi similitudine. Differunt folio. Nam quæ acutum, durum, spino-
 sumq; habet, Oxicedros (inquit) appellatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat:
 Fructum eæ ferunt, Myrti amplitudine, dulcem sapore. Dioscorides fructus Myrti similitudi-
 nē Cedro maiori, ex qua pix fiat, nō minori tribuit. Crassiuscula Cedri resina est: & ad facien-
 das pices comodissima. E Cedro simulacra, Dijs p̄cipue, sicut in Cupresso, Loto, Buxo, atq;
 etiā in oleaginīs radicibus minora. Optima nauigijs, Syriæ, Pyœniciaq;. Nā Syriacę, in mōti-
 bus nata, tanta crassitudo ferit, ut homines terni caudicē amplecti nequeāt. Solēt Cedri humo-
 rē quendā reddere, ut simulacra etiā Deorum quandoq; sudent. Similis in Arcadia est arbor,
 Cedris nomine. Frutex in Phrygia pusillus, frondis æternę, arborescensq; nunq; a Theodoro
 Gaza uocatus Cedrula. Hęc & Cedriā a Theophrasto dici puto, quatenus arbor est, nō quate-
 nus frutex, tunc enim Cedris sit, non Cedria. Cedria Theophrastus inquit, differt a Cedro.
 Arbor folio pungēte mucronibus perinde ut Cedrus. Hippocrates Cedrin ceticam, & Hede-
 ram ceticam foeminarum incommodis auxiliari scribit in uino lacteo, idest, tepido, sic enim
 διονύλια interpretantur nonnulli.

EX M. VERG. COMM.

Excellsa quædam Iuniperus, Cedrus est: ob quam caussam, alternatis quondam nomini-
 bus descriptæ ab aliquibus sunt.

Omitteremus libenter, quæ Plinius diuersis locis miscuit, quæ Iuniperō debebatur Cedro,
 & quæ Cedro Iuniperō tribuens. Omitteremus & quæ ab Theophrasto dicuntur lib. 6. quæ si
 quis diligentius expendat, facile intelliget caussam, quare olim confusæ, mixtæque fuerint hæ
 plantæ.

¶ De Cedria. CAP. CV.

Cedria optima est crassa, perlucida, ualidi odoris, quæ dum effun-
 ditur, guttatim, nō dissipata coit. Cui ea uis inest, ut defuncta cor-
 pora cōseruet, & uiuentia corrumpat. Qua ex causa, mortuorum uitam

A

κιδρος κιδρία

De arboribus
 odoriferis,
 Theophrast.
 lib. 4. cap. 6.
 & de Cedro
 amplius ca. 12
 & lib. 5. ca. 9.

Pli. li. 13. ca. 15.

B

Theoph. li. 3.

κιδρία

D I O S C O R I D I S

C aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Magni ad ocularia medicamenta usus. Quippe illita oculis claritatem affert. Albugines, cicatricesque detergit. Instillata autem cum aceto, uermes aurium necat. Cum Hyssopi decocto infusa, sonitus, sibilosque sedat. Causis dentium indita, eos frangit, & dolores leuat. Quapropter cum aceto colluere eosdem prodest. Peruncto ante coitum genitali, abortiuum fieri constat. Angina ea perunguntur. Tonsillarum inflammationibus auxilio est. Lendes, pediculosque illitu enecat. Cerastræ moribus cum sale imposita subuenit. Contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta auxiliatur. In elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit. Pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. Tineas, & cætera uentris animalia necat. Infusa partus extrahit. Fit & oleum, a Cedria separatum dum coquitur, uelleribus supra halitum eius expassis, ut in Pice. Eiusdem ad omnia usus. Priuatim uehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum. bouumque persanat. Inhaerentes ricinos enecat. Vlcerata quæ ex tonsura accæperunt, ad cicatrices perducit.

BARBARI COROLL.

Cedria modo Cedri Pix, modo Cedri Resina uocatur, e Cedro magna, quæ Cedrelate dicitur, nihilque aliud est, si proprie loquendum sit, quæ cruda Cedri lachryma. Cedrium uero, succus Cedri est, e teda eius, concisa furnis, quæ primus aquæ modo fluxerit in canali. Nā sequens liquor, Pix iam, non Cedrium est. Sed confundunt autores, nunc per Resina, nunc per sudore tedarū, nunc per Pice, Cedriā & Cedriū uocantes. Interim per oleo cedrino, quod Cedreleon, ex malis Cedri, ut ait Plinius, appellat. omnibus enim istis, quancumque diuersis, eadē tamen natura inest. Columella, cedrinū liquore uocauit. Libri Cedrio inuncti, a tinea et carie uindicantur. Damnat usque Plinius, propter accipitque eius proprietate, uiuentia perimendi, perempta custodiendi. Cuius tamen ratio præclare a Galeno redditur: quia tametsi adurat, ita ut ordine quarto calfacientium censeretur meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quæ græci Septica, & Septas cognominant, infirmissima esse constat. Proinde uiuentibus appositum, uitali calore adiuncto sumit uires, & quasi accendit, atque ita iugulat. Sed defunctis additū, putredinem tamen & uitiosos humores exterit & absumit: quibus detractis, incorrupta seruatur. Galenus & Paulus non cedriā, sed Cedream uocabant.

De Cedride. CAP. CVI.

Cedrides Cedri fructus uocantur. Calfactoriam uim habent. Stomacho aduersantur. Auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguariæ. Menses ciunt, ex polline Piperis poti. Contra haustum leporem marinum in uino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. Fuliginem quo modo ex Pice, congeri oportet, quæ eandem quam Picea fuligo uim præbet.

BARBARI COROLL.

Cedrides fructus Cedri sunt: ut Daphnides Lauri. Minus urunt, quæ Cedrus gustantis os: ut mandi quoque possint. Soporifera tamen ui. Si copiosius edantur: caput tentant, inflamantque. Interanea quoque torquent. Galenus auctor.

De Lauro. CAP. CVII.

Laurus quædam tenui folio constat. Altera latiore. Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum

in muliebres infessus additum, uulux & uesicæ uitij conuenit. Virentia folia sensim substringunt. Illita quoque uesparum, apiumque icibus opitulantur. Eadem cum polenta, ut pane illita, inflammationem omnem mitigant. Sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent.

BARBARI COROLL.

Laurus, cortice tenui describitur. Degenerat ut Quercus & Myrtus pertinaciter, adeo, ut in Antandro, fructus e rubro niger eueniat: quod & in Myrto ibi accidit. Fert & uiam suam Laurus, tam fecunda quam sterilis: nec tamen fecunda omnis. Copiosius sterilis, quam marem appellamus. Genera Lauri præter ea quæ in ratione Daphnoidis & Alexandrinæ monstrabimus, Delphica, ex albo uiridior, maximis baccis, atque uiridi rubentibus. Dicta, quæ uictores Delphis coronarentur ea, ut triumphantes Romæ: unde & triumphalem uocabant, ad Cæsaris Augusti tempora, ut mox dicemus. Delphicâ, Helianus e Thessalia translata Delphos, ab ipsis Templescribit: tum cum Pythius Apollo, draconem sagittis interfecit. Hanc Lactantius grammaticus etiâ Tripodem uocari dicit, quoniam radices, inquit, ternas habeat. Apollini dicata, propter uim triplicem diuinationis, prætorum, futurorum, presentium. Cypria folio breui, nigro, per margines imbricato, crispa: quam Laurum siluestre aliqui intelligunt. Nonnulli sui generis arborem, quæ bacca ei cerulea sit, Mustax, folio maximo, albicâte, flaccido appellata, quæ Mustaceis subijcere. Mustacea quid sint, & qua ratione fiant, Catonem consule. Diximus & in Amylo. Regia, quæ & Augusta dici coeperit, amplissima folio, baccis, arbore, gustatu quoque non aspo. Alii ab Augusta Regia discescunt, longioribus folijs, latioribusque, quam angusta. Baccaliam uero dicunt hanc, quæ uulgatissima est, baccisque fertilissima. Sterile earum triumphale, quæ ea putant triumphantes ufos a Cæsare Augusto, reiecta Delphica. Sterilem & Laurum eam esse phibet, quæ missa sit e celo eidem Cæsari, altitudine minima, folio crispo ac breui, rara inuentu. Est & quæ Taxa dicitur, Topiarij generis, excrecente in medio folio, paruula uelut lacinia folij. Habeet & Spadonia opacitatis patientissima. Itaque quantalibet sub umbra solum implet. Extra Herculis columnas, in mari nascitur frutex, folio Laureæ: quæ eiectus, in pumice transfiguratur, in Heroo sinu pare aquis extante lapidea est, similis tamen uiuenti. Magnitudo frutici bipedalis. In mari quoque Rubro uiuere affirmant eam, sed similem Ariæ. Aria siluestris arbor est, hyemis initio fructificans, materie durissima, ut necesse sit, antequam terebretur, macerari eam prius aqua. Quod & in Robore, Carpinoque seruat. Honos ei ad carbonem argentarij officinis, ut Robori, Vne doni, Piceæ, utique ad coctionem primam. Est & Aria, siue Agria, quæ pro Illice aquifolia Diores habet, ut in Fago diximus. Ex ea Lauro quæ in mari rubro nascitur, instrumentum musicum Pandura factum a Troglodytis legimus. In Corsica Laurus diu nulla fuit, nunc ibi satus prouenit. Ramo Laurus feri posse, constat, quod ueteres dubitauerunt. Manu satarum receptarumque in domos, fulmine sola non igitur. Ignes abdicat, salis modo, crepitu. Interaneorum etiam uitia, & neruorum, ligno torquente. Folium eius Lauream uocamus, et Caro Loream. Vna arborum, latina lingua nomen imponitur uiris. Nam Tullius Ciceronis libertus Lauream nominabatur: qui Ciceronianas aquas epigrammate celebravit. Laureolos quosdam ueteribus dictos, Iuuenalis & Martialis poetæ satis indicant. Sunt qui Lora hinc dicta existiment, quæ antiqui Laura nuncupabant, a Laureâ triumphorum: sub qua solerent captiuos uincire, ducendos in pompam. Vri lignum eius, prophanis uisibus: sed ne aras quoque ipsas accendi eo fas erat: ut quidam mirerentur. Vnde Horatius, et Papinius Laurus ipsam, non solum Imperatoribus, sed Varibus dicatâ cecinerint. Cum Hedera Pontificumque domos, militum arma, fasces Impatorum ornare quoddam solita. Pacis ut Olea, sic uictoriarum Laurus semper index. In lauro uetere Spartani libi et bellaria iacentes rodebant post cenam, ob id folia eius, Camatidas ἀπὸ τοῦ κάμνεν, quod est, rodere uocabant, & placentas ipsas Camata, siue Psesta, hoc est, polentâ, oleo conspersam: quarum loco nobilioribus, Epœcla, siue quod idem est, Martye dabant, seu sportule quædam maiores preciosioresque, ut turdi, palumbi, merule, turtures, et anseres, & alia huiusmodi similia. Post obtinuit, ut omne paulo suauius atque lauius edulium, Martya diceretur: siue ab eo uerbo, quod pinere, unde Magides, & Maze quoque sint appellata: siue ab eo, quod mandere significat, unde Mastiche dicat. Hæc quia in postremo cænarum dabantur, ab alijs Epidoripismata, & Epidiphnides appellari solent. Hinc iuris cuiusdam preciosi genera Magis et Capis appellant, in Plauti poetæ Pseudulo. Nam & uasis genus est Magis, quod tamen Varro a magnitudine deducit, ut Capis quoque, non capis legi possit. Fuit enim

A

Plin. li. ii. ca. 30. & alibi passim.
Theoph. li. 3. capite. 12.

B

C
Vide Celium
lib. 3. cap. 7.

hoc moris ueteribus, Iuruleta ipsa nominibus uasorum appellare: ut Paropside, et Tribli. Sed & Tragematis uice Laurum in secundas mentas inferri solita, Callias & Diodes, ut Athenicus ingit, autores sunt. Ramus Lauri, aut etiam Oliuæ, a quibusdam uocatur Arfacus. Quamq; & aucula Erythacus, hoc ipso nomine appellari solet. Est aut Erythacus, a Theodoro dictus, Tubecula. Est & Tubetra quedam uolucris ab eodem, confecto nomine, quam Aristoteles Batin uocauit.

EX M. VERG. COMM.

Primum id legentes monemus, nescire nos, quanta sit eius loci integritas, & fides, ubi in omnibus græcis pariter legitur, πολλὴν δὲ πρᾶν τὸν σῶμαχον καὶ ἡμέτερον κινεῖ, quarum uocum manifestus est sensus. Non tamen antiquiores latini, Serapion scilicet, & antiquus interpret, quicumq; ille fuerit, sic quondam legebant. In omnibus enim est, Stomachum subuertunt, & nauseas, uel uouitiones faciunt, non diuerso tamen, sed contrario penitus sensu, Ex quo orta nobis suspicio est, potuisse quondam illic πρᾶν legi, quod lenire et mitigare est. Non enim quod lenit uouitiones facit, sed aliud similiter definens, aut non ideo dissimile uerbum, qualia sunt πρᾶν, παχύνει, aut ἀνακίει, uel his simile aliquod aliud, quod subuerrendi, miscendi, & exasperandi uim haberet.

Illud etiam ex melioribus uetustioribusq; græcis instaurauimus, quod in impresso multisq; alijs deerat, ob id ex melle, passoue concisæ, &c. Deest enim in pluribus λίσαι, quod est concisæ, & cum melle aut passo subactæ.

Eadem fide etiam aurium duobus malis grauitati scilicet, & dolori tertium addidimus, qd incertos uocum sonos, indiscreta significatione ad aures peruenientes pertinet. ἀταλγίαι enim est, καὶ ἀνοκίαι, καὶ ἡχοι quos ueteres incertos, & indiscreta significatione sonos inter aurium uitia dixerunt, de quibus alibi certius dicemus.

D
Lapvidus

De Baccis Lauri. CAP. CVIII.

LAuri Baccæ magis q̄ folia calfaciunt. Ergo in eclegmate cum melle, uel passo profunt tabi, ortopnceæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex uino bibuntur. Vitiliginis emaculant. Succus Baccarum utilissime aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere & Rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur que neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant, & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit. Partus necat. Hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

B A R B A R I C O R O L L.

Aphnides, & Daphnococci, Baccæ Lauri sunt, Daphnoides uero frutex.

πλάτανος

De Platano. CAP. CIX.

TEnerrima Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluctationes sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ in uino potæ, serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ aut adipe igni ambusta sanant. Incidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures defendit.

B A R B A R I C O R O L L.

Theoph. lib.
4. capite. 7.
Pli. li. 12. ca. 2.
Herodo. li. 7.

Platano in quantam uis altitudinem radicandi se natura, modo nihil obstat, & aquæ suppetat. Qualis in Lycio Athenis fuisse traditur: quæ iuxta aquæductum, nouella adhuc, in dorantes fere centum progressa est. In Creta insula, ad Cortyniam, Platanus stetit dicitur, ad fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub qua Ioui compressam Europen indigenæ fabulantur. Itemque in Cypro una, simili esse natura, uisam aliquando, Platanum in æro ripode nasci credit Theophrastus. Vna hac maxime tolerat securim, & subuersa flatu abradicibus, reponi potest: ut Salix & Populus alba. Ideoq; actionem dabat Labeo arborum furim casarum, contra eos, qui prostratas uel subcidissent, uel asportassent, quoniam nomine arborum

arborum continerentur quæ possent resurgere. Hæc Italiæ aduena, diuq; in ea, Theophrasto etiamnum prodente, rarissima; per mare Ionium, in Diomedis insulam primum inuecta. Communicata quoq; barbaris occidentis, & ad Morinos usq; imperij Romani terminos perducta. In Lycia unius specu, Plinij ætate, octuaginta, atq; unius pedum cauo, prædicata. Huius umbra delectatum Xerxem, in terra Lydia reperio, qui diem integrum cum exercitu consumpsit sub ea; atq; ut capti amore solent, multis donauit arborem muneribus: quodq; ridiculo proximum est, custodem ei tanq; pellici, Meledonium quendam reliquit, autor Helianus. Nutritur mero Platanus infuso radicibus. Commendatio eius summa. Solem æstatibus arcere, per hyemes admittere. Platani saræ, ut Plinius inquit, regenerauere uitium. Sunt & Platani pumilæ, Chamae Platani uocant. Id & genere serendi & recidendi sit. Ratione inuenta, sub Augusto Cæsare, quemadmodum nemora tonderetur. A Platani foliorum amplitudine Platanistos græci uocant, loca spaciøsa, lateq; patentia, ut Photioni credamus. Platanionem uero Hippocrates saxum mari extans leuigatumq;. At Platanos ualis genus est, e quo popana fingebant. Platanum Italia modo rarum habet, Romæ uisum, & in Venetiæ puincia Bassiano agro, in uiculo cui Sogia nomen sit. Theophrastus e Platano Aegyptia unguentum fieri solitum scribit commendatum uestibus, non per se, sed additum in alia, præsertimq; Irinum.

EX M. VERG. COMM.

A Mabilis & expetita omnibus quondam hæc arbor fuit. Peregrina primum Italiæ, mox omnibus in ea locis, & hortis uiuens. Iterum neglecta, paulominus q; ad antiquam gratiam ætate nostra restituta est, uirèq; & in delicijs in Aethiuria etiã habetur, magno ipsorum & hominum argumento, quibus uoluptas & uitæ ocia, aut contra sollicitudo, & utilitas in precio & honore fuerint. De ea qui plura nosse uelit, Plinium consulat lib. 24. cap. 8. nos ea, breuitati consulentes, relinquimus.

De Fraxino. CAP. CX.

Fraxinus arbor nota est, cuius folia cum succo peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ramenta scobemq; potu, perniciem afferre traduntur.

BARBARI COROLL.

Fraxinum, Mileam, & Meliam quoq; græci uocant: Trinodemque cognominant, hoc est, Triozon, quia ramos habeat pregrandes, ordinatos, paresq; numero: quod genus arborum, græci ἀσχιονότατον, hoc est, ut quidam interpretantur, egregias appellant, copiosissima, proceræ, teres. Fructificat ætate. Quancq; in duo genera diducitur. Excelsum, procerumq; ligno candido, molliore, crispiore, neruoso, enodi. Alterum humilius, scabriore, duriore, fusciore, sed folio Laurus, Latifolia acutiore, leuiterq; per ambitione serrato, et ut Theodorus inquit, subfidenti, quia legisset ἐπικασθίσοντι, nos ἱπικανθίσοντι, hoc est, non sine quodam marginis, uel cacuminis aculeo. Ramulum torum, ceu folio singulari credas constare, quoniam ab pediculo uno, folia simul cuncta erumpunt, & per ampla uersuum interualla, tanq; per genicula continenter, ordineq; pendent, perinde ut in Sorbo, unde Pennata dicitur a Plinio. Internodia latiora candida, coniugationeq; plures, & folia longiuscula. & magis angusta, coloris herbarum. Cortex leuis, spissus & tenuis, rubro colore. Radices crebrae, sublimes & crassæ. Carere hanc flore ac fructu, in Troadis Ida, credunt falso. Etenim fructum fert minutum in siliquis, nucosum, qualem Amygdalæ, gustu subsalsum. Fert & Lauri modo Fraxinus muscū, & alia quædam asstrictiora gustu, circinnataq; ut pilulæ Platani. Hæc partim cum fructu emergunt, partim multo post nascuntur ei, et quæ Plecta, hoc est, plicameta, siue, inuolucra dicuntur. Leuis exire amat cauis, madentibusq; locis, scabra sitiētib; & saxosis. In Macedonia Bumeliam appellant, raro corpore, minusq; crispo, amplissimam & lentissimā. Fraxinus, Pirus, Pirafter solæ in planis, & materia & fructu commendantur. Oportuna cedi autumnō est. Materies ad plurima utilis. In Ida Troadis, intantū similis Cedro, cortice ablato, ut Plinius, Taxo, Theophrastus ementes uti fallat. Quidam situ diuisere Fraxinum. Campeftrem crispam, Montanā spissam. Folia earum iumentis mortifera. Cæteris ruminantium innocua, idque in Græcia. Nihil iumentis nocent in Italia. Et hoc de Taxo, Theophrastus interpretatur, nō de Fraxino. Fortasse nominum uicinitas fefellerit prodentes, Græcis Fraxinum Mileam, Taxum Milon uocantibus. Matutinas occidentesque umbras eius, quæ sint longissimæ, nulla serpens attingit. Expertum se Plinius dicit, Si fronde ea, gyro claudat ignis, et serpens, in igne potius, q; in Fraxino.

A

Meminit &
Celsus lib. 13.
cap. 31.

B

Plin. li. 16. ca.
13. lib. 24. ca. 8.

Cxinum fugere serpentem. Fraxinus, anteq̃ serpentes prodeant, floret, nec ante conditas folia dimittit. A Fraxini foliorū similitudine, Fraxinula, siue Fraxinago herba dicit̃, ueteribus nusquam dicta, quod equidem sciam. Mauritania, uel hanc, uel similem Fraxinulę, Secaculim appellat; in compositiones ad uenerem excitandam quęstas, adhibitam, radice candida, & nodosa, flore uiolaceo, fere inter candidum & ceruleum, semine rotundo, ut Iuniperi. Folio inter Pisum, atq̃ Fraxinum. Non desunt tamen qui Secaculim, ex India tantum inuehi putent, notis quas modo exposui, quandoquidem Fraxinago, hæc, quę in nostris habetur manibus, inefficax & infirma sentiatur ad medicinam.

De Populo alba. CAP. CXI.

Potus albę Populi cortex uncia unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. Pilulę quę primo foliorum partu exiliunt, illitę cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albę Populi particulatim caesum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 9.
Theoph. lib.
1. cap. 14.
Columel. lib.
1. cap. 15.

Populus duplex, alba, & nigra. Alba λευκή, nigra, ἄγριος gręcis appellata. Vtriusq̃ folia ut Crotonis, in iuuenta circinata rotunditatis sunt, uetustiora in angulos exeunt. Ecotario, Hederę angulosa rotundantur. Propterea meminit Theophrastus, putare quosdam, mutari candidam, ut Croton & Helix, in Hederam uetustate, quemadmodum & Pirus in Pirastrum. Habet candida cum quibusdam perpauca proprietatem illam, ut ab æstiuo solstitio circumagatur, hoc est, partes supinas foliorum conuertat, sicut Olea, Salix, Ulmus, & Tilia. quod quidem sideris confecti, rusticis argumentum est. Vtrunq̃ genus erectum, sed nigra procerior & leuior. Folium simile ligno. Intus utriq̃ par candor. Neutra uidetur florere. Populorum folijs grandissima lanugo, gręci χυβύ appellat̃. Euolat candida, ut Iulus. Nostri tria genera Populi fecerūt. Albę: quę uuas, Bryon uocatas, ferat unguentis, folio numerosiore, bicolore, superne candido, inferiore parte uiridi. Nigrę: quam Arcades sterilem putauere. Sed in Creta fructificat in ipso Ideę specus aditu, & ad fontem quoq̃ Sauri, duodecim ab eo loco stadijs. In Cindrio quoq̃, proximo ab Ida monte, & circa Tirasiam, parte montuosa. Tertium genus Libycę, folio minimo ac nigerrimę, fungisq̃ enascētibz laudatissimę. Populi ferunt in folijs guttam, ex qua apes ppolim suam faciunt. Inter nigras efficacissima Populus est, quę in Creta nascit̃. Aristoteles autor est, Acheron uocari nigram Populum. Pausanias, candidam ita nominatam, q̃ Hercules in descensu ab inferis, apud Acherontem uidisset eam, ramumq̃ extulisset. Proindeq̃ non alio ligno, cremari uictimas in Elide, Ioui olympio. Aristoteles omne satum siluofum, arborosumq̃, Acherusion dici, prodidit. Ad quod forte alludens poeta festiuissimus, Ulmorum Acherontem dixerit in Amphitrione. Resina Populo exigua est, humore cauis huius effluit, medicinę utilis. Oleum fit & e Populo nigra, semine. Populeū uulgo, AEgironon, a gręcis appellatum. Verno id conficitur, cum plurimum grauis est, prægnansq̃ resina. Nam unguentum Populeum ex uua Populi, quę Bryon est, conficitur.

EX M. VERG. COMM.

Exposita omnibus in Theophrasto, Plinioq̃, & plerisq̃ alijs, utriusq̃ Populi albę scilicet, & nigrę, de qua mox dicemus, omnis historia est. Poteruntq̃ uolentes ab illis certiora & plura audire, q̃ excerpta ex eis, et exscripta ab aliquibus nostra fuerint.

De Macere. CAP. CXII.

Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perq̃ astringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluctiones bibitur.

M A B R B A R I C O R O L L.

Macir, græce Macer, & Xylomacer, cortex est rubēs, radice magnæ, nomine arboris suæ. Conuehitur ex India. Gustu acerbo, & cum quadam acrimonia, iocunde odorato, ut Galenus inquit. Qualis ea sit, incertum habet Plinius. Recentiores, non radice, sed nucis odoratæ corticem, ac folliculum esse affirmant: idque uero propius est, & plane ita modo cernitur. Hanc nucem græci modo Carion myrsicon appellant, hoc est, nucem unguentariam: quæ sane diuersa est a glande unguentaria, ut post constabit.

E X M A R. V E R G. C O M M.

Multa sunt, quæ inuentum hoc loco Macer, peregrinitatis in hoc scriptore, & alienæ elocutionis arguant. Siquidem, quod in aromatum cœtu, & ordine est, nasciturque in India procul a nostro orbe, inter uiliiores, & nostræ orbis arbores, tractari non debuit, nec certam habet generis historiam, si quod in India nascitur, apud Barbaros nasci dicatur. Græcis enim Germani etiam Barbari sunt, quibus in frigido cœlo nihil huiusmodi nascitur. Neque Dioscoridis grate consueuerant ad orientem, & meridiem mundi partes Barbariam nominare. Quo sit, ut credamus, a proprijs sedibus, quæ illi inter aromata erant, in alienum locum temere translatum fuisse Macer hoc, & quod legitur in *ris Cap. Cap.*, in *ris indiano* legendum, aut intelligendum saltem esse. De ligni cortice Galenus multa, & post eum Paulus Aegineta, pluresque alij.

Nostra ætas ex India aduectum aromatis appellatione nouit, non ligni corticem, sed odoratæ nucis, corticosum operimentum, et quasi uillosum folliculum, qualis in Ponticis nondum pernitur maturis nucibus uidetur. Qui si idem cum hoc, & eo quod Galenus Xylomacer uocat, sit, peritiorum iudicio relinquimus. Nobis, ut a primo diximus, in scriptore hoc, suspecta omnia facit, loci breuitas, incōcinnitas elocutio, & quod in pbatissimo mihi codice, nusquam Macer hoc legitur. Ceteri tamen omnes de eo tradiderunt. Nosque eorum fidem & autoritatem secuti, hactenus de eo egimus.

De V L M O. C A P. CXIII.

Vlmi & folia, & cortex, & rami uim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur. Vulnere glutinant, sed multo magis corticis Tilia, si fasciæ loco intorqueatur. Nam lori more flecti potest. Crassior cortex in uino aut aqua unciatum potus, pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum corticis aut radice foueantur. Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorē inducit, faciemque splendidiorem præstat. Qui dum siccat, in animalia abit, quæ cili cum formam gerunt. Folia cum tenerescunt, olerum more ad obsonia usurpantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vlmi *ῥαλιν* græci uocant, utique campestem, quæ & fruticosior. Alterum genus montanæ, Oripeteam nominant. Folium indiuisum, leuiter per oram serratum, oblongius quam Piro, scabrum. Arbor grandis & celsa, irriguis amica, ligno flauo, neruoso, robusto, ut quæ tota consistit. Virtus eo ad fores lautiores, ad cardines, assamenta portarum, & torcularia, fonitum caueas, & ad carpentarium quandoque opus. Viridis facile ceditur, sicca difficile. Sterilis habetur arbor. Cratæ Vlmo, ut Fico, Robori, Platanoque gignuntur. Vuam fert, & in petiolis lachrymæ modo gummi, & bestiolas culicibus caprifici similes, in folliculis & autumno Cacheres uocatas, coplures, minutas, atque nigras, ut Theophr. scribit. Italiæ quatuor Vlmi sunt genera. Nostrates densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore, Gallicum. Siluestre. Quartum Attinias uocant. Excelsissimas, & in his Sicanas illis præferunt: quæ non sunt riguæ. Steriles Attiniae. Ideo plantis seruntur, autumno uitibus, & Maritis appellamus. Reliquæ proueniunt. Samara, siue Amara, ut Columellæ placet (ita nominat Vlmi semen) colligitur circa martias Kalendas, cum flauescere incipit, priusque folio uestiantur Vlmi. Columella Vlmore duo tantum genera putauit. Gallicum, & Vernaculum: illud Attiniam, hoc Nostratem uocari: qui & Tremellum scropham reprehendit, quod Attiniam Vlmi non ferentem Amaram falso sit opinatus. Nam rariorem, inquit, sine dubio creat: & idcirco plerisque sterilis uidetur, seminibus inter frondem primæ germinationis latentibus. Itaque nemo inserit ex Amara, sed ex sobolibus. Est autem

A
Plin. lib. 12. ca
pite. 3.
Galen. lib. 7.
simplicium far.
capite. 39.

ῥαλιν

B

*

Theophr. lib.
3. cap. 14.
Plin. lib. 24. ca
pi. 8. & lib. 17.
cap. 11.
Columella li-
bro. 5. cap. 5.

h. iij

D I O S C O R I D I S

Ctem Attinia lōge lētor & procerior nostrate, frōdemq; iucūdiorem bubus præbet. Amarā, ut dixi, dicit semen eius latīna uoce. Nā græce, ἀμάρᾱ nō hoc significat, sed riulū & incile rigan-
dis hortis. ita dictū, quia marcescere phibeat: sed & aurīū cavernæ, dicuntur a græcis Amaræ.

T E X M. V E R G. C O M M.

Theophrastus & Plinius longissime de hac arbore tractauerūt, ideoq; nec a nobis desyde-
randa. Illud tātum monemus, uoluisse nos Tiliam corticis illic dicere, quo loco legitur, Cor-
tex pro uinculo & fasciola uulneri, &c. Quā rei descriptione Plinius antea usus fuerat, ne Ti-
liā arborem Vlmo miscuisse nos aliquis dubitaret. Scimus enim & nos, a Tilia arbore, cuius
materia lenta & tractabilis est, quōdam Lēiscos, fasciolasq; in coronis ex ea arbore pendētes.

Nōn omitemus præterea, in deicienda aluo, Plinium frīgida aqua tantū uti, nec pituitā so-
lum, sed etiā aquā deijcere: quæ nescio an Dioscoridi deesse possint, & abundare uinū, quo hic
in eadem purgatione uitur.

Et cum nihil osseum in Dioscoride illic legeretur, ubi dictum a nobis est, solidescunt celerī
mē ossa succedente cicatrice, &c. non sine causa ad fracta ossa contrahendam esse rem cogita-
uimus: cum illic πωρῶ uerbum esset, quod id tantum significat, ut paulo ante testati sumus, &
præter id κατάγμα, quod in fractis tantum ossibus, ab antiquis medicis receptum est.

Quas deinde bestiolas culicibus similes in Vlmi folliculis nasci Dioscorides ait, a Theo-
phrasto Chnipes dicūtur, quēadmodum ex Caprificis euolātes. Similes his, alię bestię Psenes
ab eodem uocantur.

De Lignorum marcore,

C A P. CXIII.

ἀπὸ τῶν παλαι-
ῶν καὶ πρῶτων
σαπρῶν.

Incidens caudicibus lignisque ueteribus caries congeritur, quæ fari
næ modo illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Serpētia co-
hibet, si cum pari aniso & uino subacta, linteisque imposita, illinatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cariem lignorum, σαπρότητα græci uocant, & Embion poeta.

E X M. V E R G. C O M M.

DRedidissē ego facile, de Vlmi carie tantū a Dioscoride agi hoc loco, nisi Paulus AEgi-
neta his uerbis subscripsisset. Lignorum caries, corūq; præcipue, quæ mediocrem adstringen-
di uim habent, qualis Vlmius est, humentia purgat ulcera, & explet.

De Populo nigra.

C A P. CXV

συγγίη

Populi nigrae folia cum aceto illita, magna utilitate podagricis do-
loribus illinūtur. Resinam Populus fundit, quæ in malagmata ad-
ditur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam comme-
morant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinū, quod
Electrum uocant, ali; Chrysophoron. Id attritu iucundum odorem spi-
rat, & aurum colore imitatur. Tritum, potumq; stomachi uentrisque flu-
ctiōnes sistit.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophra-
li. li. 3. cap. 14.

Populus nigra, qualis ea sit, indicatum est in candida. De ipso autem Electro, sunt qui tria
eius genera constituent. Ex arborum succo primum, quod inde Succinum dicatur: ut non
hoc sit quod Homerus nouerit. Secundum naturale, quinta parte argenti, ut in canaliensi au-
ro. Tertium cura fit, ex tribus auri partibus, & una argenti: quanquam quod quintam par-
tem argenti excedit, incudibus nōn resistat. Errare Plinius existimat, qui melius esse putant
naturale. Cuius probatio, ut ueneno accepto, & fridorem emittat, & uarios quasi arcus coe-
lestis in dissimilitudinem reddat colores. Narratur & hæc ad lucernarum lumina clarius ar-
gento splendere. Electrum inquit Strabo, purgamentum ipsum auri est, coctura prima qd ex
sulphureosæ cuiusdā cretæ comitatu fit. Argentū aurūq; in se cōplexū, chymistæ Phaetontem
uocant. Diuersum ab hoc uidet genus esse qd Ambra, siue Ampar caninū dicit. Aetius Agri-
bar, nōs Succinum oriētale primi nominauimus: incōpeatum ueteribus ut arbitror, multis lo-
cis scatūriens, bituminis & sulphuris modo. Discrimen eius triplex, Ruffum, & pingue præfe-
runt.

runt. Selachiticū, a municipio quodam Indiæ uocatum, ubi nascitur. Subalbidū ex Arabia feli-
lici. Minus probatur e maritimo quodā oppido, cui Sechra nomen est. Deterrimū nigrescit,
quod pisces deuorauere. De hoc tamen alij aliter. Nos græcam fidem sequimur.

EX M. VERG. COM M.

V Erisimile est, debuisse in scriptore hoc etiam coniungi Populū albam, & nigram, & neu-
tram absq; altera tractari. Nos tamē, quoniā locis omnibus in antiquissimis græcis reperiun-
tur, eas relinimus, nō ausi mutare, qd' antiquorū omniū codicū fide immutabile esse debuit.

De Succino, quod Electrū ueteres, nostri Ambram dicunt, qui nosse uelit plura, apud Pli-
nium legat libro ultimo, cap. 7. & 4.

Nos etiā illud adijcimus, credere nos, nō ex utraq; Populo succinū fluere, sed ex nigra tan-
tum: ideoq; non ἑκ ἀντὶν numero multitudinis, sed ἑκ ἀντὶν numero singulari legēdum esse lo-
cum. Nihil tamē testantibus omnibus græcis, mutatū a nobis est, cognoscendumq; id diligen-
tioribus relinquimus.

De Harundine.

CAP. CXVI.

I N Harundinum genere quædam Nastos uocatur, ex qua sagittæ fa-
ctitari solent. Alia foemina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia quod
fistulis addicta sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cincta geni-
culis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua,
apud amnes nascens, quæ a quibusdam Cypria, ab alijs Donax appella-
tur. Alia Phragmites, seu Valltoria, gracilis, candicans, uulgo cognita:
cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpo-
re extrahit. Luxata, lumborumq; dolores, cum aceto mulcet. Virentia fo-
lia tusa, & imposita ignibus sacris medetur, & ceteris inflammationibus.
Corticis cinere peructe cū aceto alopecie sanant, Paniculæ lanugo si aures
intrauerit, exfurdatur. Eundē effectū implet Harūdo quæ Cypria dicitur.

BARBARI COROLL.

H Arundo ἄλσος a græcis dicitur, a Phœnicibus Gingros, ob Adonin, quem Gingrem uo-
cant, & lugent. Radices eius uiuaces, geniculatæ, ac fere in solæ, similes ἡς partibus, quæ supra
terrā eminet. Huius duo summa genera. Tibiariū. i. Auleticon. Vulgare posterius. Hoc in Cha-
raciam, hoc est, Vallarem, crassam & ualidā, quæ Græcica quoq; uulgo dicitur, & a Vitruuio
Cerdone græca. Et in Plotiā, siue Plocimon, diducitur, hoc est, flutam, uel nexilem, graciliore
& imbecilliorē priore, utraq; Orchomeniū circa lacū. Superior, in ripis expansiōis stagni, et in
Comitibus (sic enim Harundinetū prædensum & farctū appellat) sequens subtilis, in insulis flui-
tantibus, quas græci Ploadas uocāt, in immensum prælatis ἡς, quos Cephissus amnis abluisset,
ut cecinit Pindarus. Interim cū Auletico nascit Characias, sed longior cæteris, & uermibus ob-
noxia. Tibialem hyeme legūt, uere tunicas eximūt, æstate per internodia cædunt. Optima fieri
armamēta e medio geniculo, mollissima e superioribus, durissima ex imis asserunt. Persuasum
erat, & ligulā ex sua quanq; tantū harūdinis parte cōgruere: & eam: quæ radicem antecesserit,
leuo Tibiariū lateri cōuenire, quæ cacumē, dextero cæteri internodio, in duas partes dissecto,
utriusq; ligulæ os incisuræ cōmittebat: alias negatur congruere: Theophrastus autor. Plinius
magno nominū ambitu, Calamos numerat: Ægyptios chartis seruatos; probatores tamen
Gnidios; & qui in Asia circa Aneticū amnē nascantur. Nostratibus fungosior natura, bibulos,
cauo intus corpore, tenui superne ligno fissiles, præacuta semper acie geniculatos. Gracilitas
nodis distincta, leui fastigio tenuat in cacumina, crassiore paniculæ coma, qua pro pluma im-
plentur frata cauponarum. Et hæc ad nauium commissuras in Belgis, glutino quocunque fi-
delior rimis explendis. Bononienses e Rheno amne, quibus plurima inest medulla, pondus-
que uolucres. Contra flatus quoque peruicax libra, ut nullus sagittis aptior sit calamus. Post
hos Cretici & Belgici laudantur. Creticus carnosissimus, lōgissimus internodijs, lentissimus
fiscalis, Toxicus, id est, sagittarius, ob excellentem eius usum, a Theophra. dictus. Nunc scri-
ptorius, ex ea insula præcipuus, nec aliūdē fere expetit. Omnibus præferunt Indi, ut q; hastarū
quoq; uicē præparati, hoc ē, cuspidibus additis, præbeāt, his amplitudo arborea est: nec dubitat.

Theophrast.
lib. 4. cap. 11.
Plin. lib. 16. ca-
pit. 36. Lib. 24.
ca. 11. lib. 17. ca-
pit. 20. & 28.

C E quarū radicibus, ut Solino placet, succus exprimitur ad suauitatem mellis, quasi Saccarum interpretari possis. Longitudo subrectarū, 30. fere passus, humi uero serpentū, 50. crassitudo cubito rū ternū, interim senū: quæ tamē Strabo nō credidit. Diodorus in australi quadā insula, ægno Æiali plaga scribit harūdines haberi plurimas, fructū candidum, Eruo similē ferētes, e quo sua uissimus panis cōfici. AEque fabulosum atq; illud, q; in eadē insula, duas nasci tradit herbas, supra quas iacētes, placidissimo somno moriant. In Æthiopia certe populi, radicibus Harundinum in farina tritis, uictitant, & ob id Rhizophagi nominantur. Spissius marī corpus Indī tradūt, Fœminæ capaciū. Nauigiorū etiā loco, singulis eorū internodijs circa Acelinē maxime amnem, ternos homines capiēte alueo. Syringias, totus concauus, ita dictus, quia fistulis utilissimus, quoniam nihil sit ei carulaginis atq; carnis, ut Plinius existimat. Dioscorides crassa eum carne descripsit. Tibialis, Orchomenius, idēq; Auleticus, cōtinuo foramine paruius est. Fruticosissimus Donax, nō nisi in aquaticis natus, latine Canna, q̄q; Canna apud nos, ut inq; Columella, gracilē & degenerē significat harundinē. Apud gr̄cos fuscē genus Cāna dicit, ut est apud Pollucē. Præfert aquaticis, ficcus. Laconicis foliū uariū, & ab ima parte densius, tunicis longioribus: quales circa stagna, dissimiles amnicis. Est & obliqua Harūdo, nō excellē, sed iuxta terrā fruticis modo se spargēs. Suauissima in teneritate, pecori. Ab aliquibus uocatur Elegia. Zeugitæ, calami dicunt, Armamentarios Theodorus interpretatur, cū in amplitudinē aucupatoriā adolescūt. Auleti, lacu Orchomenio, influente Cephiso amne, pmanenteq; anno, celerius autē recedēte, Graciliores, Bombycinæ appellabantur. Horū generū fœminæ, Spadones et Eunuchiæ uocari solit, folio latiore, candidiore, nulla, uel modica lanugine. hinc erāt armamēta ad cātus inclusos, quē gr̄ci Iugamēta, siue Paria, hoc ē Zeuge, ad dexterā & sinistrā tibiā utilia uocabāt; qd̄ ita essent cōiunctæ, ut altera eiusdē carminis incentiua, altera succētua foret, ad Bacteriā a Theoph. (nisi fallor) appellatos. De Bacteria meminit & Plutar. & Pollux, gestamēq; id theatriū psonarū demonstrant esse, ut Scipionē Plautus, rectū insignibus, curū ignobilibus. In sacris certe literis Bacteria dicitur inuocatio ea, quæ post preceptum nem addi solet. Quid si q; in Theophrasto, nō ad βακτηρίαν, sed ἰακτικήν legendū putet: Erat autem hoc & loci nomē, ut inq; Pollux, & theatralis cuiusdā opere cātionisue genus, statariū, & citra saltationē, ac tripudiū: quo Lacedæmonios & Arcades uti solitos incinēte modulos & frequentamēta quædā simplicia tibicine Atheneus cōmemorat; qd̄ & Enoplion uocauerint: etiā Embasim, hoc est, ingressionē incessionēq; ut ē apud Gellū. Ob id inclusos cātus a Plinio dictos inrelligo, qbus antiquitas in teatro cōtēta erat, simplici adhuc musica, hoc est, ut Theophrastus inq; Aplasto, cōprimētibus se tibiārū ligulis, quia tempestiue caderēt, ideoq; ad uarietates, flexusq; sonorū inutilibus, ad hoc exēpli, πικρὴν κηδέριον uocabāt: cuius inuētor Aristonicus fuisse dicitur, ut Atheneus meminit. Illos autē, quibus operosa ratio canēdi placuit, Camptaulos, a uocū inflexione appellauerūt; quod nomē in Carini Cæsaris uita deprauatum, correximus. Correxit hoc luxuria, & per solsticia cēdi placuit, ut in trimatu demū utiles fierēt apertioribus earū ligulis, ad flecēdos sonos. Armamēta sane, Plinio est, ubi p Iugamētis uine arū, Pedamētisue accepit. Tibicines gr̄ci, et Monaulos, & Calamaulas, et Rhaphaulas quoq; dicūt. Habet & illa distinctio, Tibiārū aliæ uirginales & puellares. Aliæ uiriles: quas & pfectas & plusq; pfectas cognomināt. Sūt & citharisticæ quædā Tibiæ: item quæ Daclilicæ uocātur, & quæ Lyfiodicæ, & Tragice. Lyfiodi uero dicebātur, q mimos qsdā sub psonis muliebribus agebant, ut uirilibus Magodi. Nā Elimi tibiæ apud Sophoclē in Niobe, nihil aliud uident esse, q; Phrygiæ: quas & Scytaleas, ob crassitudinē appellāt, et obliquas, ut inq; Varro, siue impares, quæadmodū Serranas, quæ pares essent & æqualibus cauernis. cū in Phrygijs dextera unū haberet foramē, sinistra duo: quarū inuētor Midas. Nominant & Diopī, hoc est, biforæ, qbus & nos utimur, sed e buxo, aliaue materia. hæ corniculorū tubarūq; sunt, & semp fuere comites. Hebebatū olim & Hemiopti, hoc est, semiforæ: quas & minores, & impfectas, & puellares uocabant, atq; terrenas, hoc est Moluculas, epulis adhiberi solitas. Vt hoc uideat Plautus intellexisse, cū semifonarios artifices quosdā nominat. Itē Mesocope, & Hypotretæ, qd̄ alterē in medio forat, alterē ad imū ptusæ forēt. Tityrina quoq; tibiā eadē est quæ harūdinea. Nā Magadis & Palæomagadis ea est, quæ acutū grauēq; sonū reddit, genus citharisticæ tibiæ: q̄q; Magadis & Pfalteriū nomē est idē cū Sābua & Pectide, ut multis placet, nec tñ omnibus. Alias quoq; Tibias in arbore Loto diximus. Singularē tibiā Monocalamō, & Monaulū uocāt: sicut multi plicē Polycalamō. Priorē Marsias Celanis, aut Mercurius inuenit. Alij Seuthen, & Rhonacen Medos homines inuenisse quidē, sed Marsia uinxisse cera putāt. Alteas Silenus, siue Marsias, quorū Poetæ gr̄ci, tibiā plærūq; Lebyn uocāt, ab inuētoris patria, ut Duris scriptū reliq; Varro Præcentiūas

Vide Celiū li
bro, 5. cap. 26.

ro Præcētus & Succētus cōnumerat: quarū sit usus ad puluinaia præcinendi subcinēdiq; a quo & Præcētores & Subcētores appellant. Item Vascas, foraminibus q; præcētus pluri bus. Lydias porro, eadēq; Turarias uocabant, q; inter Tura adhiberentur. Gingrinæ, tenui orem sonū edebāt, q; Vascæ. Clarissimū Aegyptiæ, Garrulū Arabicæ. Ob id græci nugacem hominem, Arabicū tonariū, proterbio facto nomināt. Acutissimæ Gingrinæ habebantur & Corinthiæ, ut inquit Solinus. Gingrinas, ab anserina uoce dictas putāt. Nam & græci, *χινδύ* pro eo quod est, tibia sonare, dicunt. Ego a Ginge, qui sit Adonis, ut huius capitis initio mon strauimus. Erant & suæ funerū tibias, siue tubæ, ut inquit Gellius, quarū peritos, Sitticinas uo cabāt, non quasi siccinistas, a genere tripudi, sed q; ad sitos, hoc est, uita functos, & terra cōdi tos sonarent. Erant & Tonaria, quibus uti Gracchus solebat, ad cōponendā in cōcione uocē eburneis. Nota est historia, Est & in Italia nascēs, ex qua sit Adarcha nomine, de qua post dice mus. Aucupatoria sane harundo, a Panormo laudatissima legīt, & Panoritō, Piscatoria abari tana ex Africa. Musicæ harūdines, ex insula Siciliæ, Thermitano agro sita laudātur, ut Solinus ait. Sunt & aliæ sine nominibus harūdines, proceritate, breuitate, crassitudine, exilitate simili busq; distinctæ: adeo, ut, 29. earū genera demonstrasse Plinius se dixerit. Harūdo omnis, ex una stirpe numerosa, atq; etiā recisa, deusta q; fecūdiōr. Folia Indici tantū breuia. Omnibus a no do cōplexus initū est membranā per ambitum tenuibus, raroq; non a medio genu procum bentibus. Latera in rotunditatem bina, sup nodos alterno semper inguine, hoc a dextra, illo ab leua, superiore per uices. Inde exeunt aliquādo rami, qui sunt calami tenues. Mira huius & Fi lici discordia. Viriūsq; radix cōtrita & imposita, stipem alterius enīcit infixū corpori. Ad hūc usum, ex Harundinis radice medicamentū Hippocrates, Epipastron Orchomeniū, uidet qui busdā appellasse. Magna cū altero genere concordia, siquidē ut Cato præcipit, optime corru da feritur, ubi sint harūdines. Harūdinebus septentrio, domos suas operit: duratq; ita in altitu dine regulū earum. In reliquo orbe cameras leuissimē suspendunt. Harundinis Italiæ usus ad uineas quoq; ut Arpino agro, Paniculæ florē illū, auribus infestū, Anthem græci appellāt.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vos cum radice Harūdinis bulbos diximus, oculos eius intelligimus, quo nomine etiā ueteres in radice Harūdinis eā partē dixerūt, unde noua eius soboles quotānis nascit.

De PAPYRO.

CAP. CXVII.

Papyrus, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medici na utilitatis ad laxandas fistulas. Madefacta lino inuoluitur usque dum inaruerit. Constricta enim atque immissa in hiatus completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expu unt. Ipsis radicibus pro ligno utuntur. Crematæ Papyri cinis depascen tia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime cohibent. Verum me lius id combusta Charta præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Papyrus, et Papyrū, latine dicit. In palustribus Aegypti, aut qescentibus Nili aquis nascit: quæ regio, Delta, & inferior pars uocat. Item Syriæ, circa quæ odoratus ille Calamus lætū nasci tur, & in Euphrate circa Babylonē. In Aegypto, nō excedēte bina cubita gurgitū altitudine, uolari hominis robusti, brachialiq; radicis crassitudine. Obliqua hæc, atq; densa, nō amplius q; cubitorū decē longitudinis. Triagulis Papyrorū lateribus, qui a terra multis partibus tollun tur, pedibus, ut inquit Strabo, decem, uel ut aliq, cubitis quaternis. In gracilitate fastigiat, susti nentes comata, ac Thyrsi modo cacumē includentes exile. Ad nihil utile, præterea nullo semi ne, aut usu eius alio, q; floris ad Deos coronādos. Radicibus incolē utunt, nec ignis tñ gratia, sed ad alia quoq; utensilia uasorū: ut q; pba & alta materie sint. Ex ipso quidē Papyro nauigia te xunt. E libro uela, tegetesq; necnō & uestis genus, & stragula & fuses. Madunt crudū elixū, succo deuorato, corpus expuentes. Scitur & usus ex eo ad chartas ueteribus. Nūc alia earum officinis inuēta ratio est. Habet & in Aethiopia & Italia Papyrus uel pmiscue, Ciminiō lacu plurimum, sed alterius forte generis, nec ad chartas utile, quandoquidem Aegypto propria tribuitur, & Biblos appellatur. Alioquin Strabo, in India quoque nasci Biblum scribit. Idem autor, in parte Nili, quæ dicitur inferior, abundare tradit eam; quoniam ibi præcipue colatur.

A

Arabicus ro narius. Pro uerbium. Gell. li. 10. ca pite. 2.

B

πᾶντος

Plinius. lib. 12. cap. 11. 12.

C & duorum esse generum: deteriorem, & meliorem: quæ Hieratica dicatur: unde & nomē Char-
tæ Plinio, Herodotus ueteri consuetudine pelles quoq; hircinas, & ouillas, Biblos uocari tra-
dit, q̄ ijs in penuria chartarum uteretur uice.

De MYRYCA. CAP. CXVIII.

MYrica, seu Tamarix arbor, uulgo cognita est, cum apud pigras
& stagnâtes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens com-
page muscosum. AEGYPTUS, Syriaque alteram gignunt mitiorem, silue-
stri cætera similem. Fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter, aspe-
rum gustu, quo conuenienter utimur uice Gallæ in medicaminibus ocu-
lorum orisque. Datur cruentæ excreationi in potu, & coeliacis, & con-
tra profluuiâ foeminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus.
Illitus tumores inhibet, Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum so-
liorum cum uino potum, lienem absumit. Ad dolorem dentium in collu-
tionibus salutare, & mulieribus fluctioni uulua oportuni in deflectioni-
bus. Phthiriasi, lendibusque circumfusum prodest. Abundantiam foe-
minarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices e caudice lienosis
moliuntur, quo datus in his potus proficiat.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 13.
cap. 11.

MYricen, Tamaricem uocant Corinthi. Et in Achaia quoq; est, & Bria dicitur: & cum
plus iusto adoleuit, Promala utique poetis, siluestris, & sterilis forte, quia fructus ei bryodes,
hoc est, muscosus. Nam satiuæ similis Gallæ provenit: quæ in Syria, & in AEGYPTO copiosa
etiam est. Hanc & Amaricem nonnulli appellant: similem scopis amerinis prodescentes. Neq; ta-
men omnibus eandem esse Tamaricem & Amaricem placet. Myrices certe infelicia ligna uul-
go nominantur: quoniam nihil ferat præter flosculum, de quo diximus, muscosum: nec ferat
unquam. Huius cum uno uiscerum liene tanta dissidentia est, ut affirmet, a Democrito fumen-
tes, si ex ea alueis canalibusue factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini splenetico,
cibū potumq; dant in uasis ex ea fabricatis. Illud obiter indicandum est Columellæ studiosis,
ut locum in octauo eius libro corrigant, ita scriptum. Succurritur, inquit, si fabricentur Cana-
les Tamaricis & Rusco. Legendum est, Tamaricis e trunco, author Dioscorides. Nec illud nō
docendum, qui uitro soluendo firmandoq; accurrat, ex hac arbore potissimum igni suo escā
ministrat. Cuius radicem officinæ Casiam uocare solent: & quæ palam imperitiâ medicorū est,
pro Casia odorata utuntur. Folium Miricæ sunt qui Sabinæ herbæ nō nihil simile pnūciant.

EX M. VERG. COMM.

QUam cæteri græcorum appellatione Myricen, potius q̄ Tamaricen dixerūt, nos autho-
re Columella, plantarum & Romani sermonis grauissimo teste, Tamaricen libere &
intrepide diximus. Is enim de suillo pecore, eiusq; morbis lib. octauo agens, Solere ait sues ui-
tiosi splenis dolore infestari, accidereq; id malum magnis siccitatibus, quo tempore fratis pas-
sim sub arbore pomis, sues dulcedinē pabuli cōsectantes, splenis incremento laborāt: succurriq;
huic malo dixit, si e trunco Tamaricis fabricentur canales, impleanturq; aqua, deinde sitiendi
bus admoueantur. Quippe ligni succus medicabilis epotus, intestinum lienis tumorem com-
pescit. Quo uno testimonio satis fore nobis credidimus, ut quæ græcis μυρική est, latinis Tama-
rix quondam fuerit, & adhuc sit, eodem in duobus autoribus eiusdem mali conueniēte reme-
dio. Sterilem Tamaricen in Theriacis suis Nicander esse testatus est, speciosumq; eius fructicē
ideo μάστιγιν, i. uatem uocari, quoniam iusserit Apollo uates Tamaricis ramulū, manutenen-
tes uaticinari. Versiculi eius sunt.

καὶ μυρικήν λάττω νῖον πανακέρπεια θάμνον,
μάστιγιν τὴν ῥώοισιν χειρᾶσμιον ἢ ἐν ἀπόλλωνι,
μαντοσύνασιν κερυπαῖος ἰθὺκατο καὶ θεμνὶ ἀνδρῶν.

Quæ sic facile uertat aliquis. Sumito præterea Myrices fruticem, uatem inter uiuentes ho-
noratum. In qua Apollo Corypæus uaticinia posuit, & iura mortalium. Ob quam caussam,
ex historia

ut ex historia collegimus, Magi & Scythæ ad uaticinia sua Myrice utebantur. Quod genus diuinationis ab alijs gentibus etiam seruatum est. Herodorus siquidem sepe in diuersis gentibus Myricis ramulis uaticinia fieri testatur. Ob quam causam & Apollo Myriceus quondam dictus est. Quoniam ex eadem arbore in pompa Iouis coronari solitos in Aegypto sacerdotes, & in Media Magos, ex antiquioribus scriptoribus plures retulerunt.

De Erica. CAP. CXIX.

Erica fruticosa arbor Myrice similis, longe minor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Tam flos, quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

BARBARI COROLL.

Ericem, colore tradunt Roris marini, ac pene folio. Propterea Theophrastus uberrimam Libanotide Ericem nasci refert. Mel quod e flore huius, apes faciunt, Ericum uocatur, simile arenoso, siluestre, improbumque. Conuehitur post primos autumnii imbres, cum Erica. Sola floret in siluis. Asiae, Græciæque fruticibus ascribitur. Athenienses hanc, ut ait Plinius, Tetradicem, Eubœa Sifaram, siue ut Varro Sifaram, unde liquidum mel fiat, putantque apibus esse gratissimam. Fortassis, quia tunc nulla alia sit copia. Theophrastus, Tetralicem, non Tetradicem, nisi mendosus codex est, appellat, in genere fruticum aculeatam, & germinantem æstate. De hac Ericem intelligat, nec ne, haud scio. Quia tamen bis anno floret Ericem, prima uidelicet & ultima siluestrium, nec inter aculeatas ponitur, fieri potest, ut alia sit Tetraxis sua Theophrasto, alia quæ pro Ericem Athenis capitur: nisi quis hanc Tetradicem, illam Tetralicem uocari malit. Meminit & Tetraxoniam uocare Theophrastus, sed inter arbores quæ tardissime germinat, ut Thyia, Taxusque. Theodorus Quadratoriam interpretatus est, melius si Quadrangulam. Columella Ericem intelligit, cum amaricum, siue amaricem, & amaricinos flores commemorat. Quamquam ibi lectio corrupta in eo fertur. Nam & amaranthini, pro amaricinis, & tamaricem pro amarice, scriptum fere inuenias. Cum sit Tamarice, non Erica, sed Myrica. Confundit hoc Palladius: qui tertiam mellationem, Tamarisci floribus (ita enim uocat ipse Tamaricem) constat re tradidit: cum Ericem, id est, Amaricis ea, non Tamaricis pabulo fiat, autore Plinio. Nisi quis Tamaricis appellatione, ueteres & Ericem, & Myricem significare uoluisset dixerit. Plinius Ericem illic similem descripsit. Oredo Myricem, non Illicem legendum, cum Dioscoridis autoritate, tum quod ita modo cernitur in Parauinis montibus: non quidem folio, quod ei Roris marini simile tribuitur, sed musco, quem floris uice habet, ut Myrica. Quod autem Ericem uideatur etiam uocata Siderites, libro Plinij undecimo, nos eum locum in castigatione Pliniana, deprauatum ostendimus.

EX M. VERG. COMM.

Vitilibus plerisque. Qualis Salices, Vitex & Genistæ sunt: ueluti congenerem illis plantam libro uicesimo quarto Plinius Ericem adnumerat. Omnes Tamarici similem tradiderunt, floreque eius, qui solus extremo autumnio ab apibus inueniatur, ultimam mellis uindemiam fieri.

Theophrastus Libanotidi, quam Rosmarinij Romani dicunt, similem fecisse uidetur. Ex quibus omnibus, non fuerit difficile notas has omnes diligenter obseruantibus, quæ nam ea nunc sit ostendere. Nobis inclinatur animus, in Genistarum genere, siluestrem a nobis dictam Ericem hanc esse. Vidimus enim aliquando septembri & octobri mense, utriusque Genistæ flores. Non tamen quotannis, & ubique apud nos eo tempore florent. Quod coeli maiore beneficio alijs potest competere locis.

Ericem in Aegypto quondam fuit, grata Isidi arbor, quæ tempestate eiecitur Osyridem excepisset, subitoque in cremo intra se clausum operuisse, testis et autor Plutarchus libro de Iside et Osyride. Paulus Aegineta dicit discutiendi uires sine erosione habere, foliaque & flores in usu præcipue esse.

De Acacalide. CAP. CXX.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis Myrice quadam tenuis similis, cuius aqua in qua maduerit ad collyria ad-

A

Pli. li. ii. ca. 16.

B

Acacalide

C datur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

B A R B A R I C O R O L L.
Acacalin, Paulus Atallida nominat. Galenus ubi meminerit, nondum comperi. Nomen frutici, a nymphea datum crediderim Acacali, quæ ab Apolline compressa, Phylacidæ & Phylandrum ediderit in Creta, miraculo ab Elyreis insulæ populis conficito: nutritos a capra eos fuisse: cuius rei monumentum in Apollinis quoque delphici delubro monstrabatur. autor Paulus sanias. Apollonius poeta, in Argonautico, Acacalin Minois regis filiam, ab Apolline quidem uitiatam cecinit: sed quæ in Aphricam relegata, filium ediderit nomine Amphithoon, qui & Garamas quoque uocaretur, Nasamonis & Caphauri pater, ex nymphea Tritonide.

Edm.

De Rhamno. CAP. CXXI.
Rhamnum alij Persephonion uocant, alij Leucacantham, Romani Spinam albam, aut Cerualem, Aphri Atadim. Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusque folijs constat, & quadam tenuis rubentibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, infirmioribus horrentes spinis, innocentioribusque. Fructum ædit latum, candidum, tenuem ueluti folliculum, Hastulæ regiæ similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. Fama est, ramos huius ualuis, fenestrisue impositos, ueneficia depellere.

Pli. li. 24. ca. 14.
 Theoph. lib.
 9. cap. 17.

D B A R B A R I C O R O L L.
Rhamnum, igniarijs utilem ferunt, presertim conceptaculo et craticulæ. In duo genera diuiditur, nigrum, & candidum. Vtriq; fructus parentum colore. Nigrum folliculos fert, siluestreque habetur. Huius radice decocta in aqua, fit medicamentum, quod uocatur Lycium. Rhamnos inter Ruborum genera describitur. Hæc Theophrastum Pliniumque secuti, diximus. Aliter a Dioscoride monstratur. Phorion Rhamnum, a quibusdam Agnon, a uirtutis similitudine uocatam scribit, quæ uenerem coerceat, ut Vitex. Rhamnum Dioscorides, a nostris Spinam cerualæ dicit appellari. Quo argumento uideri potest, haud dissimile huic genus esse quod hodieque uulgo Spinam ceruinam uocamus, fructu Myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id uel ad colorem cum pingentibus idoneo. Cortex arbori subniger, & nitidus, quasi Ceraso, intus uires, post luteus, lignum extra candidum, interior medulla rubet.

E X M. V E R G. C O M M.
Spinam antiquiores græci Rhamnum, posteriores alterius spinæ nomine, ob candoris similitudinem, Leucoacantham, Romani modo hæc, modo illa appellatione indicarunt, quæ alterius erant, alteri etiam tribuentes. Quod Plinius, ut nobis uideatur, fecit: qui amuletum contra ueneficia Rhamno fuit a græcis adsignatum, Aquifoliæ spinosæ pariter arbori adsignauit, libro suæ historiæ. 24. testatus, Aquifoliam arborem in domo, aut uilla satam, ueneficia arcere. Nisi forte eadem uis Aquifoliæ quondam inesse etiam credita fuerit. Naso certo in Fastis suis, græcam fidem secutus, spinam albam Rhamnum dixit: ex re ipsa, & altera in græcis Rubi huius appellatione rem ostendens. Locus non longe a principio sexti libri est.

Edm.

De Halimo. CAP. CXXII.
Halimum alij Damasonium uocant, alij Erymon, alij Brettanicam, alij Rhabdion, alij Basilion, Magi Mercurij basim, aut Olyridis diadema, alij Elystephanon, aut sacrum caulæ, Pythagoras Anthenoron, Aegyptij Asontiri, alij Asphen, alij Ascaluri, alij Asariphen, Latini Albutium, aut Ampeluciam. Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno, sine spinis, folijs Oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix con-

uulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota. **A**
Eadem lactis ubertatem facit.

BARBARI COROLL.

Halimon, nostri, ut ait Plinius, Aureonem uocāt. Conuoluit se ut Hedera. Locis falsis nascitur, falsilaginemq; præfert. Sic hæc, de qua Dioscorides, & Plinius, a quibusdam Asphodelon, siue Albucum existimatam perhibent, an alia, mihi parum constat. Reperio autem in autoribus, modo afflatā, modo nude scriptam primam literam. Placet aspiratio, quoniam maritimum olus credatur, & Almytis etiam a falsilagine dicatur ab Actio. Asphodelon appellari Halimon ab Hesiodo, quidam falso interpretantur: qui tamen error a græcis ortus, peruenit & ad latinos. De Halimo discrepant sententiæ. Alij fruticem esse uolunt, densum, candidū, sine spina, folijs Oleæ mollioribus, latoribus, quæ cibo coquantur. Addunt in maritimis nātum. Alij separant, maritimum olus dicentes Halimon, & falsum: unde nomen folijs, in rotunditatem longis, quod & mandatur, condianturq;. Duorum præterea generum, siluestre, & mitius. Folium siluestri tenuius, maioris effectus. Crateias tertium genus facit, longioribus folijs, & pilosioribus, odore Cupressi, nascens sub Hedera. Galenus Halimum in Cilicia prouenire copiosam, ibique folia recentis in cibos recipi, & in usum condita seruari, scribit. Soli nus Alimon in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectu: quod aduersa ea, fames interdiu nulla sentiatur, ut nomen inde impositum ei sit, quasi famem arceat, propterea q; nec aspirationem prima litera recipiat.

Pli. li. 22. ca. 22

EX M. VERG. COMM.

Nasci maritimis locis Halimū, quem Plinius Aureonem nominat, hic ipse testatur. Salsū autem sapore esse, & inter olera quondam in usu fuisse, præter Dioscoridem idem Plinius indicauit, falsum olus a quibusdam dici affirmans, & Plinio, Dioscoridique subscribens Paulus Aegineta libro primo. Theophrastus libro quarto de historia, & libro quinto de causis, encandipinquis, & adnatas plantas uim illi assignauit: quales multæ in natura sunt, quæ sub tracto alimento, alias perimant arbores. quales Hedera, & Cytisus est.

B

Fecit in sanitatis usu, & medicina Halimi quondam usus, ut in multo ambitu nominum et appellationū, antiquis græcis fuerit hæc planta: quæ omnes appellationes, aut superstitiosæ, aut ab illis excogitatæ sunt, aut a similibus factæ.

Credimus nos (quod Plinius 22. ait) existimasse quosdam Asphodelon ab Hesiodo Halimon uocari: ideo factum esse, quod in sepibus nasceretur: et Hesiodus in cibis etiam Asphodelum laudauerit, cum ait, nescire iniuste agētes, quanta in Asphodelo & Malua utilitas sit. Quæ opinione semel illata, facile factum est, ut Halimus non aliter, q̃ Asphodelus Albucus diceretur. Albucum enim, si Plinio credimus, antiqui Asphodeli radicem dixerunt.

Quod deinde passim & in cunctis Ampeluciā dici etiam Halimon, ab alba uite, quam græci in sepibus nascentem uitam albam nominant, factum fuisse credimus. Quæ tamen omnia coniecturam, non decreta uolumus esse.

DE PALIVRO. CAP. CXXIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur. Vesicæ calculos comminuit. Serpentiū ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam uim habent. Quorum decoctum potu aluum sistit. Vrinam trahit. Contra uenena & serpentiū morsus auxiliatur. Radix recentia tumbercula, tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

παλιύρος

BARBARI COROLL.

Paliurus, ut in fruticum genere collocetur, in magnitudinem arboris assurgit. Ab occasu uergiliarum fructificat. Fert in siliquis terna & quaterna semina, lentorem quandam pinguem emittentia, ut lini semen contusa. Amat nasci aridis, quemadmodum & Rubi, nec minus dilutis. Folium exciduum sicut Rhamno. Cyrenis laudatissima: ubi Lo to quoq; præferunt, eodem folio, sed fructu diuerso, ut qui non latus, sed rotundus, ruberque sit nucleō, qui non simul mādatur, ut in Punicis. Magnitudo ei quæ fructibus Cedri, pauloue amplior. Nominatur ab Afris Zura, iocundus per se, atq; suauior etiā uino affusus: contra quoq; uina succo suo com-

Pli. li. 24. ca. 14
Theoph. li.
bro. 3. cap. 17.
& lib. 4. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

C mendans. Paliurus, spinosa ramis, ut Rubus. Agathocles Paliurum ab Alexandrinis Connarum uocari tradit, enatam scribens isto fulmine sepulchro. Vlmi atq; Pinus amplitudine, ramis frequentibus, prelongis, subaculeatis. Folio uiridi, rotundo, molli. Biferam. Nam & uere & autumno fructum parit Oliuæ, Phauliæ uocatæ magnitudine: cui & nucleo & carne similis est, sapore uincens. Crudus uirensque manditur. Vbi exoleuit, farinam ex eo fieri, atq; ita essitari, nec subactam, nec conspersam aqua. Ichthyophagi, piscium carnes semine Paliuri conditam inueterant. Troglodytæ, succo Paliuri pro uino utuntur uulgo. Nam proceres florem quandam exprimunt, cuius liquor nostrati Musto similis aspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Paliuro nulla certa est nota, propter multiplicem eius crescentiam. Nam in aliquibus locis arborescit, in aliquibus fruticis naturam non excedit. Ideo diuersa eius historia legitur. Numerassem et ego aliquas eius notas, nisi copiose ab alijs de eo collecta et tradita omnia fuissent. Illud tantum adijcimus, nostratam Paliurum, non ideo dissimilem Canis sentibus esse, quos greci Cynosbaros dicunt, cognatasque et ueluti congeneres plantas esse Rhamnum, Paliurum, Oxycanthum, & Canis sentem: ideoque a Dioscoride deinceps tractatas, aculeatas omnes & muniendis sepibus aptas, & ob id tantum priuatim descriptas, quoniam proprie singularum notæ aliquæ essent; quod in Oxycantho mox etiam dicemus.

De Acuta spina. CAP. CXXIII.

ἡ ἀκὺν ἄνθος
πυρίαν
πυρίαν

Acuta spina, quam Pyrinam, aut Pityanthen aliqui uocant, arbor est Piraastro similis, spinosa, & minor. Baccas profert Myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum. Radicem multifidam, alte descendentem. Huius baccæ potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam sceminarum sistunt. Radix illita, aculeos & spicula extrahit. Abortum fieri tradunt, si ter radice uenter, aut sensim feriat, aut perungatur.

B A R B A R I C O R O L L.

D De spinarum generibus plura Theophrast. lib. 4. cap. 3.

Oxycanthos quæ sit, in Plinio non comperi. Medicinas certe, quas Dioscorides ei tribuit, Paliuro Plinius dicitur. Dicitur hæc et Oxycantha, Olympo monte plurima, siluestrium arborum, frondis æternæ, ab occasu uergiliarum, fructifera, flore coronario, fructu Cedri atque Myrti. Rura modo hanc Crispinam, quasi acrem spinam uocant, ut multis placet: ex cuius acinis uinum etiam conficitur, Crispinum uocatum, eodem fere usu quo uinum ex malo Punico. Singulares in acinis quibusque nuclei sunt. Acini oblongi, & racemosi, congesti, folia quoque oblonga. Diuersum genus est quod uiam fert, Crispinam uulgo dictam, ueteribus præterita, acinis candidis, & in maturitate dulcibus, aculeato fructu, folio apij fere, in hortis frequens. Habetur & alter frutex, æque spinis horridus, sed topiarius magis, & uitis pusillæ, folio rubentis uuæ fertilis: nec in Italia modo, sed in Germania quoque mihi uisus.

E X M. V E R G. C O M M.

Facilis cognita & inuentu Oxycantha hæc, tam certæ eius notæ sunt, & tam multis locis nascitur. Ab agresti Piro diminuta appellatione rura uosra eam uocant. Florem fert muscosum, & post florem racemosum fructum, non dissimilem Ligustro. Non fuit latinis cura, quod hæc inuenierim, illi nomen dare, nec Plinius, quod meminerim, sub hac uoce eius meminisse. Græci a spinarum acuminatis cuspidibus, Oxycantham dixerunt: meminitque eius pluribus locis Theophrastus, aculeatis spinis infestam, & post uergiliarum occasum, hyeme fructus suos maturantem.

Quæ mox adiectæ illi sunt appellationes Pyrine, & Pyrianthe, a græca, aut a latina appellatione fieri potuerunt. Si a latina, a Piro id erit: ut quemadmodum nos Pirastrum agrestem Pium dicimus aliquando, sic græci etiam latinam uocem more suo diminuunt, πυρίαν dixerint. Si a græca, tunc a nucleis, quos plures intra se fructus claudit, nominis ratio erit. In Pomis enim græci πυρίαν dixerunt nucleos omnes, quibus exterior et ambiens caro substat: ut in Cerasis, & Prunis.

Quod legebatur deinde in impresso, pluribusque alijs, καὶ ἀκανθώδης ἄνθος, ex melioribus mutuatum a nobis est, in ἀκανθώδης ἄνθος. Neque ab re, quando hic ait, agresti Piro similem Oxycantham, minorem tantum & spinosiorum.

Quo loco etiam in græcis legitur, *Αἰσχροίαν ἴσμεν καὶ πόον γυναικῶν*, in aliquibus, non tamen melioribus hoc amplius inueniebatur; *ὅσα τε αἰνὴ καὶ θανάσιμος καὶ θυγιάδιοντος ὀνόματι*, idest, uirnam etiam trahit, uenenisq; & uenenatorum moribus succurrit: ea nos facile negleximus, ad stringendi uires Oxyacantham habere inuenientes. Et quod Paulus ægineta agresti similem, si gura & uiribus exequauit, quam nihil eorum posse, neq; ille, neq; hic testati sunt.

De Rubo canis. CAP. CXXV.

Rutex est arboris instar. Rubo longe maior. Folia fert multo latiora Myrto. firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo Oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit. Feruefacti enim in uino, mox poti, arteriam infestant.

BARBARI COROLL.

Cynosbatos, Caninus uulgo rubus. A Theodoro, Canirubus. Columella Sætem canis. fructu malo granato simili, subrubido, media inter arborē, fruticemq; natura, & proxima Punicæ. Folium Salicis amerinæ, Theophrasto Agni. Quancū legendum puto in *ἰνῶ*, hoc est, ut uestigio humano simile dicatur, q; Plinius ita uertit. Et sane uisam a se Rubum, quidam testantur, in siluis, hac specie, ut quasi solea esse uideretur. Flatu auerso fructum huius legēdum præcipiunt, alioquin periclitantur oculi. Plinius hanc ab alijs Cynosbaton, ab alijs Neurospastum uocari scribit. Yuam fert nigram; in cuius acino neruus sit: unde Neruus passus, dicat. Idem sit hoc, nec ne cum eo quod Dioscorides, itemq; Theophrastus deliniant, considerandū peritioribus existimo. Rubus certe, qui similitudinem Rosæ fert, et Castanæ similem pilulam, Cynosbatos a Plinio dicta est. Alia uidetur esse Cynorhodon, de qua diximus inter Rosas. Nec illud constat, nunquid Rubi huius sit Rosa, quæ Coroneola uocatur, maunus autumnī, odore iucundo, sed exili, an potius Cynorhodi appellatæ. Nec illud omittre constitui, Cynorhodon a Cynosbato, non flore roseo, quem fert utrumq; sed spongiolis distinguī, quas Cynorhodon habent, Cynosbatos non habent. Parit & uiam nigram Cynosbatos, ut prædiximus ex Plinij sententia. Quod quidem nemo, præter eum (q; sciam) confirmat. Hoc si error est, fortasse natus inde sit, quoniam Hedera Cilicia, hoc est, Similax aspera, Labruscæ modo ferēs uuas, Cynosbatos a quibusdā uocari soleat, ut Dioscorides testatur.

EX M. V. E. R. G. C. O. M. M.

Satis docuit Columella libro duodecimo qualis Cynosbatos hic esset uastissimis spinis, Paluro, Rubisq; eam coniungens, cum in conferenda sepe præciperet, semina uastissimarum spinarum solo credenda esse: cuius generis etiam sunt Cynosbati, quos sua ætas Sentem canis appellauit.

Idem Cynorhoda, idest, Canis rosa quondam dictus est, quoniam flos eius roseus sit, & rabidi canis moribus medeatur, si Plinio credimus, quod sua ætate admonente Deo inuentum sit. Rura nostra passim eum nouerūt, maximum inter Rubos omnes, & qualem in cunctis hic descripsit.

De Ligustro. CAP. CXXVI.

Ligustrum arbor est Oliuæ, folijs circum ramos latioribus, mollioribus, & uirentioribus. Flore candido, muscoso, odorato, semine Sambuci, nigro. Optimū nascitur in Canope et Ascalone. Folia astrictioriam uim habent. Quare commanducata ulceribus oris medentur. Illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Capillum ruffant trita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinū oleum, quod ex eo fit, excalfacit, emollitque neruos: quoniam mista quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

BARBARI COROLL.

Cyprum, quidam, ut Plinius inquit, esse dicunt arborē, quæ in Italia Ligustrū uocat, semina iij

A

Cynosbatos

Pli. li. 17. ca. 29.
Theoph. lib. 3.
ca. 17. & 18.

*

*

B

Ligustro

Cne Coriandri, folio Ziziphi. Prefertur Canopica, post Afcalonica, ultimus locus Cypriae. Seruius grammaticus, Ligustrum florem scribit esse candidissimum, ac uilissimum. Fortasse hunc intelligens, qui e Conuoluolo herba nascitur, nam & hic barbare, ac uulgo dicitur Ligustru, ut in Clematide secunda monui. Cyprus & Hemicyprus, uasis & mensurae genus est, coquis, ut placet Iulio Polluci, cognitum.

EX M. VERG. COMM.

QVes Maro cecinit, a pastoribus negligi, & inutiliter perire Ligustri flores, medicinae, & unguentariarum officinae libenter exceperunt: quanquam tamen nostra aetate, nulla eius, aut exigua ratio est, cum alioqui uulgaris, & ubique paratus frutex hic sit. Notum omnibus Ligustrum, Cisalpina Gallia omnis adhuc sic uocat. Aethruria autem corrupta, deflexaque penitus ab antiqua appellatione Ruuisticum dicit, sine labore cognoscendum in sepibus maio mense, cum floret, autumno autem, cum maturis baccis nigrescit. Paulus Aegineta, ultra ea quae a Plinio traduntur, dicit etiam lieni plurimum conferre.

DE TILIA. CAP. CXXVII.

Tilia arbor est Ligustri magnitudine. Folijs Oleae, nigrioribus & latioribus. Fructu Lentisci, nigro, subdulci, racematim cohaerente. Asperis nascitur. Huius folia astringunt. Ad eadem utilia ad quae Oleaster, cum astrictione est opus: maxime ad infantium ulcera in ore, commanducata, aut si decocto colluantur. Pota urinam ac menses cient.

BARBARI COROLL.

Tiliam, graeci Phelyream, nostri quoque Phelyream, & Philyram. Sed tunicas ex ea tenuissimas appellant. coronarum lemniscis celebres ueteribus, inter corticem & lignum membrana multiplici contentas, e quibus uincula Tilię uocantur. Materies mari senticosa, dura, nodo sa, ruffior & odorator. Cortex crassior, ac detractus statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Crassior foeminae arbor, & materies candida est, atque precellens, e qua Tilia, Philyreaque uirtutes: quas diximus. Arbor haec ferotina, folijs dulcibus, esculentisque pecori, sed fructu animalibus omnibus ingustabili. Teredinem non sentit, proceritate perquam modica, uerum utilis, & operibus intestinis uel obedientissima: etiam si Abies, ut Theophrastus inquit, pulcherrima defenditur. E cortice, foeminarum & cunae sunt, atque cistae, nauium longarum alseres, & arculae, mensurarumque nonnulla genera e ligno. Probatur & igniarijs. Medulla exigua est, nec magnopere cetero corpore mollior. Est enim materia eius tota mollis, ut inter carnosas mollissima, calidissimaque dicatur. quoniam citissime retundat ascias, tincturam earum, caloris sui ui resoluens. Caeditur autumno. Cinesias poeta flagitiosissimus, in quem Lyfiae oratoris plena conuictio & stomachi legitur oratio, tam gracilis fuisse dicitur, ut Tinaceis asseribus corpori circumdatis, imbecillitatem suam fulciret, ut Philetas alter poeta, plumbeis orbiculis circum pedes adalligatis, ne uento subuerti posset. Theophrastus quandoque nominat & Philycam. Siluestris, inquit, arbor est Philyca, fronde perpetua, Olympo monte, fructum suum ab occasu uergiliarum edit, Celastri modo candida. Theodorus Philycam hanc a Tilia, siue Philyra differre censuit. Vtranque tamen & candidam, & alendo pecori utilem demonstratam. Legebat & ferotinam. Celester porro siluestris arbor perpetuo uiuens. Fructum sero perficit, atque hyemis superuentu perdit, ut quidam putant. Cacuminibus montium gelidissimis nascitur: cura deterior efficitur. Vfus ad baculos senibus. Plinius odoratiorem Tilię mari corticem quam foeminam, Theophrastus contra, foeminam quam mari tribuit. Flos caliculaceus, pediculo quisque suo annexus, uiridi, quod diu Alabastro includitur. Dehiscentes ipsi flauescunt. Flores pariter cum micibus & urbanis. Fructus oblongus, & ad fabae magnitudinem rotundus, similis acino Hederæ, maiusculus, angulis quinque, seu nervis quibusdam in acutum depressis extuberat. Partitionem hanc exilior indigesta: & omnino confusiores habet, maior si scabitur. Semina emittit pusilla & pretenuia, ut uideri possint Atriplicis. Folium Hederæ, nisi quod se in acutiorem angulum rotundat, incuruum. Qua pediculo innectitur e medio sui prodeit in acumen, crispum per orbem molliter ac serratum. Laurentius Valla in Herodoto, conuertit Tiliam falso, quod autor ille Iteam uocauit, quae Salix est, non Tilia.

EX M. VERG. COMM.

Quae in Corollario Barbari Tiliae adiunguntur, ex Plinio, Theophrastoque ipsidem uerbis

Plin. lib. 19. 29.
lib. 16. ca. 14.
lib. 11. cap. 8.
Theoph. li. 3.
cap. 4.

D

K

exscripta, nihil præter compendium laboris habent. multa sane, sed tam noua, & affectata elo-
cutione a græcis uersa, ut græcarum literarum imperiti non facile intelligant, quid sibi in-
ta ferri eo loco sit; quasi Plinius, quem ille tantum amauit, ut totum iterum in Corollario suo
exscriperet, non temperaturam ut celaturam dixerit, & quia græci *βερβιν* dicant, ideo tincturā
dicere nos oporteat, plurisq; faciendum sit quomodo aliquid fiat, quā quod & quale fuerit fa-
ctum dixisse. Illud ego magis ostendi operosum, sit ne nostri Tiliæ, antiqua illa eadem. Dico
autem nostratē, quæ in Æthiopia nunc ab omnibus Tilia nominatur, ex qua secandis co-
ris eius paratam ubiq; tabulam habent, in nullam partem rectis pectinibus, sed quacūq; par-
te ferramentum agatur, sequacem & cedētem. Ideoq; Tiliam, ut credimus, dictam, q̄ quæ pro-
priè quondam Tilia dicebatur, per longitudinē rectis pectinibus, tractabilis & fissilis sit, & ob
id, ut inquit Theophrastus, texendis cistis & corbibus idonea. Plura Theophrastus lib. 7.

De CISTO. CAP. CXXVIII

Cistus, quem aliqui Citharon, aut Cissaron uocāt, ramosus frutex
est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens. Folijs rotun-
dis, acerbis, hirsutis. Flos masculo ut mali punici, fœminæ albet. Vis a-
stringens. Vnde flores in uino austero bis in die poti, profunt dysentericis.
Et nomas illiti cohibent. Vetustati ulcerum, & igni ambustis cum
cerato medentur.

BARBARI COROLL.

Cistos, & Cissaros, a Cisso differt, q̄ Cissus Hædera tantum est, Cistos sui generis frutex.
Quæ uicinitas, nisi quis aduertat, facile confunder intellectum. Describitur maior Thymo, fo-
lijs Ocimi. Et sane inter Hederas mentio eius a Plinio habita est. Præterea Hæderæ speciem ut-
duntur auctores existimasse, qui Ladanum capris depecti tradant: quæ florem Hæderæ pau-
runt, cum constet ex Dioscoride fruticem, unde id fiat, Ciston uocari, speciem alteram Cisti
huius, de quo nūc agimus, ut in cōmentatione post Hypocistidem proxima explicabitur.

EX M. VERG. COMM.

Certatū olim doctis, uiri Nicolaus Leoniceus, & Herm. Barb. de Cisto, qd̄ tādē esset. Ve-
rū extat de ea re inscriptū de erroribus medicorū opusculū, unde nos plura dicere omittimus.

Quod uero in textu legitur, sed in fœminino, colore cādido, hoc membrum sequaci sermo-
nis serie certo carebit sensu. Nisi intelligatur, Ciston diuissile antea Dioscoridem in marem &
fœminam, mariq; alium, fœminæ uero aliū adsignasse floris colorem, desiderariq; in omni-
bus græcis, totam eā diuisionē, cuius ultima tantū pars seruata sit, quod iam necessario, ex his
quæ sequuntur, constituendum legentibus est: ut tantū non ego eam restituerim diuisionem.
præsertim indicāte Plinio lib. 24. cap. 10. Cuius hæc uerba sunt. Ciston appellāt fruticem maio-
rē Thymo, folijs. Ocimi. Duo eius genera, flos masculo rosaceus, fœminæ albet. Quasi ex hoc
scriptore uerterit, *ἡ μὲν τοῦ θύμυρος λευκὰ*, quod debuerant alij interpretes, hiātu saltem aliquo il-
lic relicto legentibus indicare, ne credētes integrū esse locū, inuuliter in eo laborarent.

De Hypocistide. CAP. CXXIX.

Hypocistis Robethron, aut Cytinus a nonnullis cognominata,
iuxta Cisti radices nascitur, floris Punici similitudine. Quædam
flaua. Altera uirens. Tertia candida. Liquatur Acaciæ modo. Aliqui ta-
men exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in Lycio
prosequuntur. Vires Acaciæ habet. Verum aliquanto magis siccatur, & a-
stringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Fœmi-
narum profluuiū & pota & indita.

BARBARI COROLL.

Hypocistis, & Hypocisto, triplex huius ratio a Dioscoride proditur. Alij ruffa & candida
sunt contenti, ut Plinius. In montibus Patauinis Hypocistin uidere licet, et Ciston, sub qua na-
scitur Ocimi folio, ut prædiximus. Florē candido quasi Rosæ siluestris. Radice lignosa & præ-
dura: cuius fere medio Hypocistibis uelut infixæ pullulat.

A

κίσος
κισσάρων
κισσάρων

Plin. lib. 24. ca-
pite. 10.

B

ὑποκυστίς
ῥόβηθρον
κύτινος

D I O S C O R I D I S

E X M A R. V E R G. C O M M.

C Quid Cisto adnascitur Cyrtinos, aut veluti Cyrtinos, Paulus aegineta appellauit, Hypocistidem uero ex his expressum succum. Hic contra Hypocistidem, quod adnascitur, et Cyrtinos etiam uocari dixit. Hic natuiam rem, ille humano opere ex eadem expressum in medicina usum remedium appellans: non multifacienda diuersitate, si quis utriusque consilium et propositum diligentius animaduertat. Quid autem grecis, & in natura Cyrtini sint, in Punica certius cognoscetur.

Non praetereundum & hoc, quod dicit hic eius genera esse, rufum, uiride, & candidum, Plinius uero rufum, & candidum colorem illi tantum tribuit. Quo fit, ut aut in alijs uiridis ille color desit, aut in hoc abuderet: & quam Orobothrum hic ait appellari, nescimus nos, an corrupta uox sit, & Erythranum, ut in Plinio legitur, uocari eam oporteat.

E De LADANO. CAP. CXXX
St & alterum Cisti genus, Ledo a nonnullis appellatum, frutex si-
mili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quae uerno
tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, atque
effectus Cisti praebens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur. Siquidem cum
Cisti frondes pascuntur caprae, hircique, pinguitudinem conspicue bar-
ba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhaerescens reportat: qua
depeccantes incolae, colantesque, cogunt in ossas, & ita recondunt. Alij
uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, con-
glomerantque in Ladanum. Maxime probatur odoratum, sub uiride, fa-
cile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum
est, resinosum: quale in Cypro gignit, Arabicum uero, Lybicumque uili-
us. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi. Laxat ora uenarum. Ca-
pillum fluentem continet, addito uino myrrha, aut myrteo oleo. Cica-
tricibus decorem reddit cum uino illitum. Medetur aurium doloribus
cum hydromelite, aut rosaceo infusum. Suffitu secundas efficit. Pessis im-
mistum, uuluae duriciem sanat. In medicamenta quae dolorem tussimque
finiunt et malagmata utiliter inseritur. Aluum sistit cum uino uetere po-
tum. Et urinam ciet.

Pli. li. 12. ca. 17.
& lib. 26. ca. 8.

B A R B A R I C O R O L L.
Cisthos, siue Ledon, & Lada, sed Ladanum in Arabia Nabathaeis tantum nascitur, qui sunt
contermini Syriae. Iniuria illa qua diximus caprarum: sed non e Lada herba, uerum ex omni
silua. Hoc genus Strobos uocari placuit. Est & genus aliud in Syria & Africa, Toxicon dictum:
quia neruos in arcu lana circumdatos trahunt per siluas, adhaerescens roscida lanugine. Sed ue-
rum Ladanum Cypri in insula sit, quod Celsyphum, hircorum in pascendo genubus atque bar-
bis hestit, haederæ, ut Plinius inquit, flore derafo, pastibus matutinis cum est roruleta Cyprus,
siue funibus tractis, quo dictum est modo. Non omittendum, Hederam quidem putari Cist-
thon a Plinio, de cuius flore colligatur Ladanum. Non quod Cisthos aliud non sit quam Hedera, quae
Cissos a grecis appellata, sed quod species eius una etiam sit, a nostrate multum diuersa. Quan-
doquidem & Paulus Aegineta scribit Ladanum ex Hedera Ladone cognominata fieri. Et Dio-
scorides Cisthon a quibusdam, Cissaron quoque dici tradit: quasi Hederaculam interpreteris,
aut Hederaginem. In Carmania & super Aegyptum fruticem esse narrat, per Ptolomeos trans-
latis platis, ex qua Ladanum fiat. Sunt qui Ladanum gummi modo ex arbore laxati corticis uulnere, ut
Tura colligi, & caprinis pellibus excipi commemorant. Adulterant Myrti Baccis, & animalium sordibus.
Sinceri odor debet esse ferus, & solitudine redolens, ipsum accessum fulgere, odorque iucundum
reddere. Myrtata in igne crepitant. Placet, cui e rupibus calculi portius, quam puluis inhe-
rat. Precia laudatissimo in libras, asses. 40. Aetius Cisthon, e qua Ladanum sit, eandem esse cum Ci-
stho nostrate, sub qua Hypocisthis nascitur, affirmat: sed calidioris naturae, ob qualitate foli.

E X M.

Totam colligendi **Ladani** historiam, omnesq; eius in medicina vires, breuissime comple-
xus est **Paulus Aegineta**, testatus ex **Cistho** Cyprio frutice fieri, quem **Ladona** dicitur, quem
caprae pascentes, barbis femoribusque suis, quod pingue & lentori simile in eo est, secum au-
ferunt, idq; collectum **Ladanum** esse.

Nec, ut in **Corollario** suo **Barbarus** retulit, ex **Hedera Ladone** **Ladanum** fieri is dixit, sed ex
Cistho Cyprio frutice, qui **Ladon** uocetur. Verba eius libro sexto hec sunt, *λάδανον ἀπὸ κισθοῦ
λάδονος λεγομένη γίνεται ἐστὶ δὲ ἡ κήρυς*. Quod nescio ego, an **Plinio** fauēs, sic uertere magis ille a-
mauerit, an quæ **Plinium** **Hederam** & **Cisthum** simul miscere coegerat uocum similitudo in
eo, quoniam ille **Aegineta** forte habuit, pro **Cistho** **Cisson** fecerit. **Lubrico** ab altera in alte-
ram uocem lapsu, præsertim in imperitis & parum diligentibus librarijs, qui incognitam, neq;
ubiq; nascentem **Cisthum**, una tantum mutata litera ad **Hederam** transfulerint, quæ **Cisson**
græci passim dicunt. Nec esse **Cisthon** **Hederam** notæ, omnisque eius historia satis ostendunt.
Cypriamq; hanc a priore illa diuersam **Dioscorides** descripsit foliorum longitudine, nigredi-
ne, & pingui lentore: quoniam folia eius priuatim sibi inhaerent, ad **Ladani** confirmationem per-
uer ostendant. Fecitq; coloris nigredo, quæ folijs huius a **Dioscoride** tribuitur, ut in priore il-
la, quod erat *σπορὰ μέλαινα* dixerimus, testantibus id aliquot ex antiquioribus græcis, in qui-
bus *μέλαινα*, i. nigra, non *σπορὰ*, i. acerbi saporis adhuc legitur. Et quod hic ait, in altera hac **Ci-
stho**, longiora, & nigriora folia esse: quam comparandi uim & rationem si quis diligentius anim-
aduertit, facile intelliget, cōgenera esse oportere, quæ inuicē cōparant nigro colore folia esse.

Addidimus præterea, mellis modo per colum liquant. Sic in antiquioribus græcis legētes,
ἐν ἀφαιρούντις ὅς μέλι διυλίσσεται, non ob aliam ut nos credimus causam, nisi ut qui caprarum &
hircorum pili in **Ladano** erant secernerentur.

Quomodo autem per se **Saligneum** qualum castratis alueis liquetur, purgeturq; mel, un-
decimo libro satis **Columella** ostendit, & ab eo liquandi purgandiq; **Ladani** similis ratio pote-
rit cognosci. Quam deinde adstringendi uim, **Ladano** **Dioscorides** tribuit, **Paulus Aegineta**
ad capilli defluuia tantum contrahit.

De Hebeno.

CAP. CXXXI.

Hebenus optima habetur **Ethiopica**, & nigra, nullos habens uer-
narū discursus, factitij **Cornus** leuitate. Cum frangitur, deſa ap-
paret, mordens gustu, atque astringens. Suffitur iucūdo odore supra car-
bones sine fumi tedio. Recens autem ad ignem prolata ob pinguitudi-
nem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est **Indica** internatis se-
gmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. Cæ-
terum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam **sesamina**, aut **spinea** li-
gna **Hebeni** uice ueneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt,
& in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec re-
dolentiae in suffitu præferentia. Caliginem oculorum abstergit. Ad uete-
res distillationes, pustulasque mirum in modum pollet. Si quisquam fa-
cta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medi-
camenta efficax est, si scobes, ramentaue uino **Chio** die noctuque mace-
rata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ramenta excolant, reli-
quaque eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vri-
tur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi modo,
& ita siccis lippitudinibus conducit.

BARBARI

COROLL.

Ebenus, siue **Ebenum**, spissitudine ligni & pondere, in aqua non innatat, sed mergitur tan-
tum, non tota ut **Buxus**, cui similis esse dicitur, sed pars eius medullacea. Decorticato summa nā

C gricies. Ebenus cæsa durefcit in lapidē, ut iam uideat hodie quoq; partū faxū, partū lignū, ceu inchoato opere, non perfectō. Duo genera eius. Rarū id, quod melius, arboreum, trunco enodi. Alterum fruticosum, Cytisi modo, tota India disperfum. Ebenus Ethiopica, nō alia, q̃ Palmarum generis esse traditur. Lignū Ebeni, Galenus, si quis aqua infusa terat, in succū inquit resoluitur, ut nonnulli quoq; lapides. Magnus Pompeius in triūphum Mithridatico bello duxit Ebum. Pausanias a Cyprio quodam medico accepisse tradit, Ebenū radicem tantum esse terra conditam, nec folia, nec fructus ullos edere, propterea nec omnibus inuentu facilem, sed in Ethiopia quosdam esse huius operis artifices, hoc est, Ebeni scrutandi gnaros.

M E X M A R. V E R G. C O M M.

Maro Indiam tantum ferre eā arborē cecinit. Vnus Pausanias in Atticis nec folia, nec fructus ferre prodidit, neq; a sole conspici, sed sub terra tantum radices esse, quas fodiant Ethiopes, sintq; in ea gente eruscandæ Ebeni peritissimi aliqui.

Hanc Theophrastus, arborem cortice Buxo similem testatus est, decorticatā deinde nigro colore fieri.

Interim legentes monebimus, suspicari nos, nec leui argumento in cunctis græcis uitū illic, ubi nos uertimus, pro Ebena uendi a quibusdam, Spinæ Indicæ, & mori materiam. Quo loco, Spinæ Indicæ addidimus, & pro Sefamino ligno, mori mutauimus. Spinæ enim nihil adiectum legebatur, nec legentibus licebat ex tam multis spinis, quæ diuersæ toto orbe nascunt, quam hic diceret intelligere. Idq; autore Plinio fecimus lib. 12. dicente ibi. Et Spinæ similis est, sed deprehensa uel lucernis igne protinus transiliente, quod uera Ebena fieri hic apte testat.

Præterea quod erat, *συσάμινος*, a Sefamo in frugum genera adiectiuo nomine *συσάμινος* legendum esse arbitrati, mori materiā uertimus. Quid em̃ frugi simile cū arbore? aut qd potest Sefamum lignū intelligi? Fuit autē facilis in tanta uocū similitudine ab altera in alterum lapsus.

De ROSA. CAP. CXXXII.

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus folijs exprimitur, defectis forfice unguibus, sic appellantur cādidæ foliorum partes, reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumliciones recondi. Siccantur etiā annuum folia Rosarum, continuo uersata, ne muceant, ueue sitis in ijs in fideat, Aridis Rosis & in uino decoctis, expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac uulua, pīna illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi uitijs, igni sacro illini prodest. Siccis ac tritis semina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atq; compositionibus quas Antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in medijs Rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluctationibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluū, & cruentas reiectiones sistunt.

R O S A. B A R B A R I C O R O L L.

Rosam, græci Rhodon, & Poetæ Brhodon, sed plantam eius Rhodoniam, ut nos Rosariū appellant. Est & condimentū preciosi genus Rhodonia, quam & Rhoduntiam Patellam uocāt, ex cerebellis auiū & porcorū, in multa Rosa coctis, infuso garo, oleo, uino, pipere, ouorum luteis, Differta Patella Rhodūtia, quæ Rhodiaca olla dicitur. Figlinæ genus hoc. Permixtis, ut inquit Aristot. myrha, iunci florē, croco, balsamo, cinamomo, amomo, coquit ad arcendā ebrietatem, si excafactis ijs uinum infundatur. Origo huius e Copto prima, ut inquit Athenæus: unde Coptica fidelia. Sed redeo ad propositum. Rosam, Timachidas, qui de cœnis scripsit, in Arcadia Eumphalon, ab odoris præstantia uocari tradidit. Ergo Rosam aculeatam ramus nemo ignorat. Folia interna, quæ admodum exigua sunt. Item ex maioribus, externa minus odorata. Inter amplas odore præstant, quibus ima pars scabra & corticia est. Vista recisa, translata fit melior. Siluestres ex toto asperiores, odore, colore, magnitudine superantur, Rosa ut nouissima erumpit inter omnes flores, ita prima definit. Satiua excepta, Rosæ uita

Plin. li. 21. capit. 4.
Theophr. lib. 6. cap. 6. & 7.

uita quinquenniu, non incisæ, nec adustæ. Illo enim modo iuuenescit. Flos senescētis deterior. Capita foliorum eius, partesq; candidæ. Ungues uocant. In flore aliud Semē, aliud Capillus. In capite, aliud Cortex, aliud Calix. Coronas e Rosa, quæ paucilibus & futilibus succellerūt. Rosalia dixere ueteres. Nec erat ijs gratia, nisi folio solo nexis. Recens a longinquo olet. Sicca propius. Serenis diebus lecta odoratiō. Itē siccis, ruderatis, gracilibus. Omnis Rosa germinat granoso primū in clauo cortice: quo mox intumescēte, & in uirides alabastrōs figurato, sensim ad rubescit & panditur. In medio calicis lutea stamina, sub quibus semen insidet. quæ proprie flores dicuntur. Desitum est feri semine, cum alioquin p̄silit. quoniam sero ita nascatur. Genera eius prope nimia. Celeberrimum Prænestinæ, quæ nouissime deficit. Campanæ, quæ præquox est. Milestæ, cuius color ardentissimus. Serotinæ, duodecim folia nō excedentis. Proximam fecere Trachiniam minus rubentem. Mox Alabandicam uiliore, albicantibus folijs. Viliissimam pluribus, sed minutissimis, Spermoniam. Malo Pliniū sic legi, q̄ spinolam, aut spinosam. Ita enim, siue q̄ in uiliissimo folio, siue q̄ uiliissima sit omniū, rectissime uidet appellata. Sunt qui Sycioniam legendū putent. Nulli folia quinque pauciora. Campaniæ Cētifolia tribuitur. Et Philippis in græcia, a Pangeo monte uicino translaticia, numerosis folijs ac paruis. Nec tamen talis odoratissima, nec cui latissimū, maximūq; folium. Ideo nec coronas in trā Centifolia, nisi extremos uelut ad margines. De Lichny Quinquēfolia, quæ in ter Rosas quoq; numerari solet, & græca, seu græcula uocatis, suo loco dicet Quinquēfolia. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorū paniculis, nec dehiscens, nisi manu coacta, semperq; nascenti similis, latissimo folio. Alia funditur e caule Maluaceo, folia oleacea habens. Musceton (est ubi acetron legatur, & Mosceuton, a propagine, Viuiradiceue, quā græci Mosceumia dicūt) uocata. Atque inter has media magnitudine, aut finalis Rosa, quā Coroneolam uocamus, in Rubo natā, iocundi odoris, sed angustū, ut in Cynosbato monstrauimus. Reliquæ sine odore, hoc est, Maluacea, et duæ græculæ. Semen Rosæ in ipso cortice est sub flore, optum lanugine. Precox Rosa emergit, si pedali serobe ab radice facta, calidam infuderis. germinare incipiente calice. In Hispania Chartagini, præcox Rosa, hyeme tota uisitur. Vnū genus inferitur pallidæ, spinosæ, longissimis furculis Quinquēfoliæ, quæ Græcula altera est. Nili quis hoc quoq; loco, spermonie, nō spinosæ legerit in Plinio. Satis ambigo, Coroneola sit Cynosbati, an Cynorhodi flos. Quamquam Cynosbati magis puto. Cynorhoda porro, siluestres Rosæ sunt, spongiolis penicillistis inter medias eius spinas nascentibus, unico aduersus expauescentes aquā, a morfu canū, remedio, nec fere ante Plinium comperio: unde nouatū ei nomen crediderim. Quamquā Aristoteles hanc uidetur appellasse Cynacanthē, hoc est, Caninam senticem, Cantaridū feracē, ut dicitur secundo libro, in mentione Cantaridum. Est & Cynorhodos alia, sed Liliū, ut monstrabimus. Nil dubito, Cynorhodon aliud esse, q̄ Rhododaphnē. Esse aliquos flores, Rosæ colore similes, arboribus in externo mari natis, autor est Theophr. Columella punicā Rosam uocando, aut rubentē, aut ex Africa translatā significat. Rosam triplex comitatur fabula. Nō nisi candidā per initia fuisse. Mox uulnerato Veneris pede, dū Adonidi, quē Mars zelotypus, interfecerat, opē latura, p̄cipiti cursu per dumeta rapit, adrubuisse. Alij sanguine Cupidinis, ut Ausonius, aliq; necare affuso, ala Cupidinis, in Deorū conuiuio lasciuiens, illisa poculis.

EX M. VERG. COMM.

Genera Rosarū multa Theophrasto primū, mox Plinio fuerūt, ex foliorū numero p̄cipue discreta. Post quē nō male aliq; forte credat, alia etiā extitisse, et nostra ætate adhuc quoq; esse: tantopere diuersis locis per se, & humano ope coacta, uariat natura suas opes.

In cūctis fere græcis a principio statim deerat, ῥόδον φύχει καὶ σφύρι, τὰ δὲ ξηρὰ μᾶλλον σφύρι, cū tū ex melioribus legi oporteret, νάρδα φύχει καὶ σφύρι, ut sit sensus. In rosas refrigerare, & adstringere recētes: siccas uero amissa refrigerandi potestate solū & efficacius adstringere. Indicat id, præ antiquorū fidē, res ipsa, & sermonis ordo, in q̄ altera pars p̄ contrariā diuisionē illata, cōtrariā sibi alterā exigit: cūq; in posteriore de siccis ageret, oportebat in priore de recētibus actū fuisse.

Sequitur deinde non multo post, quod penitus corruptum sit, sc̄tilem cōiecturam habet. Docet enim Dioscorides, defectis foliorum Rosæ ungibus, terendum in mortariō reliquum corpus, exprimendumque, & in umbra habendum succum donec densetur. Sed non potest, ex his quæ nunc leguntur hic sensus colligi. Nos quoniā illic, mortarium, & umbra est, & do nec densetur, eo sensu qui legitur, Serapionis ope reddidimus. Quod donec certius aliquid ab alijs inueniatur, a legentibus accipi uolumus.

Quod deinde erat, ξηρὰ δὲ λεία παρὰ μύρον προσάσεται, nullo sensu ex antiquorum & meliorum codicum fide instauratum est, παρατρίμματι μύρων, id est, femorū intertriginibus.

De Rhofeis

C
ῥοδιδες

De Roseis pastillis.

CAP. CXXXIII.

Pastilli quos Rhodides uocāt, hac ratioe cōficiūtur. Rosarū uiridiū, quē nullo antea humore madefactū exaruerit, drachmē. xxx. Indicē Nardi drachmē. x. Myrrhē drachmē. vi. tritē digerūt in pastillos, quobolorū pondus æquent. Siccatiq; in umbra, in fictili non picato, atq; obturato reconduntur. Alij adijciunt Costi drachmas duas, Iridis illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium loco usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus. Tritis etiam utuntur ad illitiones, & diapasmata quæ fiunt ad sudores coercendos, ita ut a balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Similem, non tamē eandē Dioscoridi Rhodiorū confectiōē Pau. Aegin. lib. 6. docet, neq; eodē genere eā appellat: hic fœminino Rhodias, ille neutro ῥοδιδες uocat, iubetque recētibus Rosis et eodē pōdere ipse etiā cōfici. Latini, qd̄ egdē inuenerim, de his nihil tradiderūt, Romana grauitate blāditias amorum, & uoluptatū illecebras docuisse, indignum existimantes.

De LYCIO.

CAP. CXXXIIII.

Λύκειον
πυξάνθηον

Lycium, quod aliqui Pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs Buxi, densis, fructu Piperis, nigro, leui, amaro, densiq; cortice pallido, non dissimili Lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nasct̄ plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Coquuntur rami cum radiculis tusi, & ante per aliquot dies macerati, tū abiectis lignis denū liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lycium adiecta decoctioni Amurca, aut Absinthij succo, aut felle bubulo. In natans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamētis additur. Reliquo ad alia utitur. Simili modo fit Lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum freris ruffis, ingustabile, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius. Lycium astringit. Caliginem oculorum discutit. Genarum scabiem, pruritus, ueteresq; fluctiones sanat. Facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum. Coeliacis, dysentericis, potum inditumq; conuenit. Datur sanguinem excreantibus, & tussi ex aqua. Contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos. Paronychijs, ulceribus quæ serpunt aut putrent, medetur. Fœminarum profluuiā appositum sistit. Rabiosorum ictibus ex melle potum, aut uice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex fructu Lōchitide appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maioresue, Rubo crassiores a radice numerosos. Fructus cortex rubescit. Folia Oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus, & regio morbo mederi. Et fœminarum

Λύκειον

feminarum purgationes elicere. Assueverant etiam crudam in potu, eodem effectus præstare. Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare. Venenis quoque auxilio esse.

BARBARI COROLL.

Lycij, tum spina ipsa, tum succus ex ea, dicitur Pyxacanthos. Chironias in Græcia uocatur. Frutex, unde Lycium fit, adulteratur asphodeli radice. Item spina, in Pelio monte nata. Medicinæ aptissimum intelligitur, quod est spumosum. Indi Camelorum, aut Rhinocerotum (hi boues Aegyptij sunt) ut Festus inquit, utribus condunt, Lycium foris nigrum, intus rufum, cito nigrescens cum frigeris, optimum ex indico frutice. Aliter Dioscoridis Lycium, ex radicibus quoque sylvestris Rhamni coctis conficitur. Nomen Lycio inuentum puto, quoniam e Lycia inueheretur, præcipuum urbe Patara, quam quæ Indicum omnibus præfertur.

EX M. VERG. COMM.

Quæ a Plinio lib. 12. & 24. longius dicta sunt, parata & exposita omnibus relinquimus. Lycium ideo dictum est, quod probatissimum, & quotidie ex Lycia ad alios importaretur.

Quod in impresso legebatur, *πλάσσει δὲ πολλὰς πλαγίας*, radices numerosas & obliquas, unatantum mutata litera, *πλατύνει*, id est, latas uertimus.

Expunximus deinde aliqua, bis enim idem importune repetebatur, in quo iterum contrarabidi canis morsus sumi Lycium Dioscorides iubet. Et quoniam in uetustioribus aliquibus, pro melle eo loco lac legebatur. Ex Plinio remedium aliud illic instaurauimus, dicentes sistere Lycium foeminarum profluuium appositum, aut cum lacte potum. Locus est libro uicesimo quarto, cap. 14.

Suspiciamus præterea ab eo loco quo ait, fertur Indicum fieri Lycium, sequentia parum esse legitima, qui cum semel in India nasci buxam spinam dixisset, idque pro comperto docuisset, ad famam & aliorum fidem transferre rem non debuerat, nec quod semel a se decretum fuerat, ex aliorum dictis infringere. Suspicionem nostram auget, quod plures illic uoces sunt parum propriæ, & huic scriptori insolitæ, potuitque ab antiquiore aliquo medico ex alicuius historia, omnis ea pars Dioscoridi accreuisse, et paulatim in unum corpus coaluisse.

De Acacia.

CAP. CXXXV.

Acaria in Aegypto nascitur instar arboris, frutice spinoso, non se in rectum attollente. Florem habet candidum, & semen Lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modice rufus & odoratus. Aliqui folia cum semine exprimunt. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis utilis. Valet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, et oris ulcera. Procidentes oculos reprimat. Mensium abundantiam sistit. Prociduam uuluam cohibet. Citam aluum suppressit, aut potus, aut inditus. Capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. Et ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in fictili nouo fornacibus, torreturque in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & uetri modo perluceat, ligni expers. Proximum est candidum. Sordidum uero ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit. Et medicamento rum quibus ammiscetur, acrimoniam hebetat. Ambustis ex ouo illitum pustulas non patitur erumpere.

A

Plini. lib. 24.
cap. 14.

B

ακακία

C **Pl. li. 24. ca. 12** **AC**aciam fundentem, idem uideo accepisse autores, cum spina ægyptia, Testis Oribasius, & Aetius. Nisi q̄ acacia, etiam aliubi q̄ in Aegypto nascitur. Hæc & syria quoq̄ spina dicitur. In Aegypto, alba, nigra, & uiridi arbore conspicitur. Arbor tota horret aculeis, excepto caudice. Præterdit eos & germinibus & folijs, ligno in duodena sæpe cubita procero. Cedit testis & nigra, nauium costis, in corrupta, etiam in aquis ui. Candida facile putrescit. Semen in Siligs ad coria perficienda, Gallæ usui. Flos & coronis addi blandus, & medicamentis petitus. Manat & gummi ex ea, cum sponte, tum plaga, non e cortice, sed e uase. Præcipua utilitas, q̄ cæsa, anno tertio resurgit. Numerosa omnino arbor: ingenti sylua eius Thebaica præfectura: ubi & olea, & quercus, & textilis persica. Prouenit & in Galatia, teneritudinis summæ, spinosior arbore. Colligitur autumnis semen: quoniam collectum maturius, nimis uehemens. Spissatur succus ex folliculis, aqua pluuiæ, maceratis mox in pila tulsis exprimitur. Tum densatur in sole mortarijs in pastillos. Acacia uocatur, arboris uidelicet suæ nomine. Fit & e folijs per se, minus efficax. Galaticæ Acaciæ nigerrimus improbat. Itē qui ualde ruffus. Placet purpura, aut leucophea, & quæ facillime diluitur. Nunc Acaciam ex syluestri Pruno colligit officinarū desideria. Illud meminerimus, semē ægyptiæ, a Dioscoride lupino simile reddi ponticæ, seu quod idē puto, galaticæ lenticulæ. Plinius nihil distinguit, sed utrunq̄ semen, lenticulæ par existimatur, minore tantum grano & folliculo. Demetrius adserit in Aegypto spinā, quæ sit arbor, ramos coronarum specie natia effundere, in quibus semen rotundum sit, flore subobscurō. Ex hac Tindicæ, & Abylæas coronas in ægypto fieri, docuimus in Myrto. Spinam porro ægyptiam, sunt qui & arabicam uocant, ut Dioscorides & Galenus. Non est superfluum, ut spinarum hoc loco genera subiiciam, quæ nominis cōmunionē græci, legentibus dubitationem afferunt. Acanthos, siue q̄d idem est, spina uulgaris, ut quidam coniectantur, acantha, pyxacantha, oxyacanthos, leucacanthos, acanthaleuce, tragacantha, acantha arabica, uel ægyptia, acantha indica, acantha ariana, acantha babylonica siue regia. Adduntur a latinis, spina sitiens, spina pennata in ægypto, spina appendix, spina bunia. Diuersa omnia, decem & septem numero. Accedat ijs Galatica, siue Pontica, siue Cappadocica: de qua proximo capite disseritur. nam syluestris quæcunq̄ spina, Calabrix uidetur esse nominata.

D **Coniunximus** in Acacia, ueterum græcorum fidem secuti, quæ male in duas secesserant parteis, unoq̄ capite, ut res ipsa etiam exigebat, fecimus de omni Acacia a Dioscoride doceri. De qua non eodem modo, Oribasius, Aetius, Pliniusq̄ & alij docuerunt, sed non facilis nostra ætate commentatio est.

A **Alterum** Acaciæ genus in Cappadocia, Pontocq̄ prouenit, ægyptiæ spinæ similitudine, longe minor, tenerior, humilis. Aculeorum uallo munitur, folia habens Rutæ. Semen lenticula minus fert autumnis, in loculis ternum quaternumq̄ seminum capacibus. Succus eius adstringit, uiribus inferior. & ocularibus medicamentis inutilis.

Pl. li. 24. ca. 12

ACACIA hæc, a Plinio Galatiæ tribuitur.

ἀμύργα

A **Murca** expressæ Oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis, adstringit, cæteros præbens Lycij effectus. Insuper dentium dolori, & uulneribus, cum aceto, uino aut mulso, commode illinitur. Additur in medicamenta ocularia, & meatus obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, & uulvæ exulcerationi. Si uero cum omphacio recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. Iumentorum scabiem cū decocto lupini & chameleonte illita sanat. Cruda & recenti amurca po-

dagras, articulariosq; dolores foueri utilissimum. Peruncta in uillosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

BARBARI COROLL.

Inter innumeras Amurcæ laudes, agricolarum usibus a Catone prædicatas, illa maxime memorabilis, q; ligna macerata liquore eo, nullius fumi tedio ardent. Græci ἀμόργην uocant, etiā fecem quadoq; uini. Item genus herbæ purpureæ, qua uestes tingantur, Amorginæ a græcis appellata. Sed & tenuissima pars harundinæ paniculæ, dicitur Amorgis, autorem habere Photionem grammaticum.

EX M. VERG. COMM.

CocTuram Amurcæ, certius primo rusticarum rerum libro docuit Mar. Varro, quam condi in domesticos usus iussit. Si quis præterea Amurcæ laudes alias, & multiplices usus nouisse uelit, poterit autoribus Mar. Catone, & Plinio diuersis locis quod cupit inuenisse; eritq; illud homini saltem laboris huius opere precium, ut naturam discat, nihil tam sordidum esse, & ingratum genuisse, quod in hominis usum beneficio aliquo non instruxerit.

De Vitice.

CAP. CXXXVIII.

Agnon aliqui Agynon, alij Lygon uocant, alij Amictomiænon, alij Tridactylon, magi Semnon, alij Hæma ideos. Aegyptij Sū, Romani Salicem marinam, alij Piper agreste, alij Lecristicū. Vitex, seu castus frutex est, in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, aspersisq; locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit prælongos, fractu peruicaces, folia Oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. Vna harum album florē mittit cum purpureo, altera tantum purpureum, et semen ut piper. Excalfactorias uires habet, & astrictorias. Semen eius potū, uenenatis ictibus, aquæ quæ cutē subiit, lienosisq; auxiliatur. Lac euocat. Menses ciet, draçhmæ pondere in uino potum. Genituram exoluit. Caput tentat, & soporem affert. Decoctū hærbæ & seminis in defensione, mulieribus uulua malo oportunis opitulatur. Item inflammationibus. Purgationes mouet semen cum Pulegio potum, etiā suffitu, uel appositu. Capitis dolorem dissoluit illitum. Instillatur cū aceto & oleo capiti in letargo & phrenitide. Folia suffitu, aut substratu fugant uenenata. Illita quoq; serpentium moribus auxiliatur. Testium duricias cum butyro et folijs uitium emolliunt. Rimæ sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs medet luxatis, uulneribusq;. Virgā qui manu teneat dū iter facit, negat intertriginē sentire. Agnū, quasi dicas purū, uocāt Græci. qm̄ matronæ in thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs cubitus sibi sternunt, et Lygon, quasi uimen, propter inuictā fere ramorum flexilitatem.

BARBARI COROLL.

Agnos, siue ut Hippocrates appellat, Agne, dicitur latine Vitex. Non habeo tñ plane compertū, an salix amerina, idem qd Agnos Vitexq; sit, & si Dioscorides hoc affirmat. Et ipse ita censo, Vitex, non multum a Salice uulgarī distat, usu uinculorum, foliorum q; aspectu, nisi odore gravior esset. Semen potum, uini quendā saporem habet. Duo genera eius. Maior in arbore Salicis mō assurgit, flore candido, unde Candida quoq; dicitur. Minor ramosa, folijs albiorebus, lanuginosis, purpureo flore, Nigra nuncupata. Nascuntur in palustribus cāpis. Semen uiticis, Galenus mandī cum bellarijs solere scribit, usu tragematis. Ita tñ minus officere capiti. Lygon, Lygeanq; græci uocāt & arborem, & quoddam herbæ genus, qd, ut inquit Athenæus, in nidos suos parituri cygni ferant. Nec tñ satis habeo compertū, hanc, quam cygni perant herbam, aliud genus oportere intelligi q; uiticem. Inuenio & scopas amerinas, spartias

A

Pli. li. 15. ca. 9.

ἀγνος ἄγνος
ἀγνος
ἀμικτομίανον
τριδάκτυλος
σεμνός
ἡμα ἰδιω

B

D I O S C O R I D I S

C similes describi, folio tamen minore, sed lenticia uirgularum maiore, quas, sunt qui genistilla amerinam uocent, hoc tempore. Corolla e Lygo usos esse ueteres, Anacreonti poetę credimus: cuius originem Sami, Caretq; dederint, diuersis causis. Nam & Lacedæmones arundine factitari solitas Athenis: quas & diosciris, hoc est, Castori et Polluci dicatas fuisse cō fiat, ut frugales atq; simplices. Lygō & Aegylīn qñq; dici lego. Itē Mosyn, & Oesyan, et Oesō, et Oesocarpon, ut Polluci & Phorioni uidef. Vñ Gerra oesyma, hoc est, quadrata quēdā tugiola ex huius salicis uiminibus: quę Ligella qñq; nominant a Plauto in Aulularia, forte a Lygo, i. uiticę, aut a ligādo. Adijciendū illud uidef, q; hic a Dioscoride scriptū ē, Viticē a qbusdā Lecriscum uocari, putare me in eo uerbo mendā esse. Nec lecriscū, sed a similitudine saporis & acrimonię Ligusticū legendum. Nam & piper agreffe dici uiticem, idem autor affirmat.

E X M. V E R G. C O M M.

Vocatur Agonos, non alia ratione, quam quod semen genitale diminuit.

In Amictomiæ uoce, & si non sint integra omnia, antiquæ tamen integritatis, et significationis aliqua adhuc supersunt uestigia, ex quibus facile coniectura est, fuisse eius uocis compositionem, quæ ad uenerem misceri cum mare prohiberet.

Lygos quoq; i. flexilis, *ἀπό τοῦ λυγίσιν*. A rubore uirgarū sanguis dictus est. Itē Semnos, id est, uenerandus, qd in continentia arcet. Ligusticum, a similitudine saporis. Piper agreffe, qd piperis naturam explet.

Amerinam salicem a Romanis græcorum Agnum dici, aperte Dioscorides testat. Sed uerum id sit, in Plinij & Columellæ lectione diligentiores facile cognoscent. Nobis inclinat animus, ut negemus græcorum *ἄγρον*, Romanorum salicem esse, suspicamurq; adiectam ab imperitis latinorum rerum græcorum medicis eam Dioscoridi appellationem accreuisse. Tam enī Viticis, quam Amerinæ salicis uocem nouisse quōdam Dioscoridem, uerisimile est: & ex quo Plinius aperte docet, Viticem latinis esse, quæ græcis Lygos & Agnos, nec multum a salice utilitū usu distare, non credendum, in ea appellatione deceptum diligentissimum alioquin & ex professo hæc agentem hominem.

Theophrastus, quod Oleæ folia habet, composito nomine *ἰανθῶρον* uocauit.

De Salice. C A P. CXXXIX.

Salix uulgo nota est, cuius semē, folia, cortex, & succus spissandi uim habent. Trita folia cum exiguo Pipere & uino pota, ileosis subueniunt. Sumpta cum aqua, præstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen, in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eosdē præbet effectus. Corticis cinis admisto aceto illitus, clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice succus, cum rosaceo in calice punici calfactus, aurīū dolorib. auxiliat. Decocto eorū podagras foueri utilissimum. Furfures purgat in corpore. Excipit succus q; manat ex ea cū floret, exciso cortice. In plaga enim cōcretus humor inuenit, q; ad purgāda quę obstat oculis, suā uim præbet.

B A R B A R I C O R O L L.

Breuifere & cōorto caudice arbor, & ut nouimus, aquatica, *ἰλιά* gręci uocāt. Asia tribus generibus hæc diuidit. Prima nigro cortice, aut puniceo, nigra nominatur. Secunda candido, candida uocata. Tertiam coactę breuitatis, & sponte nature, pumilā, fœcundo, ut qdā putat fructu, Helicē appellāt Arcades. Virgas ad nexus, e nigra comodiores & pulchriores, e cādida spissiores, & agricolarū utēlibus aptiores esse. Plinius apud nos quoq; tria Salicis esse nomina commemorat. Viminalē, eandēq; purpureā. Vitellinā, a colore luteo, graciliore priore. Gallicā, quę sit tenuissima. L. Columella Grēcā, Gallicā, Sabināq; reddit: gręcā flauī coloris: gallicā obsoleti, purpurei, tenuissimiq; uiminis: sabinā gracilibus uirgis atq; rutilis, quā pluri mi uocāt, inqt, amerinā. Plinius gręcā rubentē, amerinā candidiorem asserit. Porro quam dixi * Vitellinā, in exēplaribus nicellinā, & itellinā corrupte legimus. Inuenit & alia distinctio. Proce re, uineis iugādīs pticales uocare, balteo corticis uincula pbenes. Alię ptenues, a uiminibus, appellatę uiminales. Alię uirgas, sequacis ad uinctum lenticę ferētes. Alię corbibus et supellectili uillicę firmiores cādidioresq; detracto cortice, leuiq; tractatu: mollioribus inde uasis, q;

Pli. li. 24. ca. 9.
li. 17. ca. 20. li.
16. cap. 37.

q̄ corio & cathedarum delictis ap̄issima. Fructum Salix fert, abeuntem in araneam, anteq̄ om̄ino maturitatem sentiat. Ob id, ant̄ maturitatem colligitur, dicta Homero ὀλισίκαρπος hoc est, frugi perda. Vna tm̄ prodit, ad maturitatem proferre solita, in Creta insula, ip̄o descensu Iouis speluncę, toruum ligneumq̄, magnitudine ciceris. Succus Salici triplex. Vnum arbor ipsa, gummi modo sudat. Alter cortice triū digitorū magnitudine ablato manat. Tertius detruncatiōe ramorū, a falce distillans. Salix fertilior & densior recisiōe fit, ac tonsura ex breui pugno, uerius q̄ ramo, puentu certissimo. Tertium locum in æstimatione ruris, Cato ei tribuit. Salictum non hoc tantum Seruio grammatico significat q̄d oliuetum, arbustum, uine tum, sed & uirgulti quoddam genus, dictum ita, q̄ saliat surgatq̄ cito: ut Lupum fortasse salictarium intelligat, de quo suis locis egimus.

EX M. VERG. COMM.

Gravissimā huic arbori inuidiā Homerus, p̄modū fecit, q̄d ὀλισίκαρπον hęc uocauit, frugi perdam. De hac, omniq̄ eius medicinę usu aliter magis q̄ alia Plin. lib. 24. plerāq̄ tradit, quę in medio posita omnibus relinquimus.

De Syluestri Olea. CAP. CXL.

Syluestris Olea, quam aliqui Oleastrum appellāt, aliȳ æthiopicam Oliuam. Folia adstringūt. Trita autē & imposita ignem sacrum, ulcera quę serpunt, epinyctidas, carbunculos, paronychia, nomasq̄ cohibent. Crustas emarginant cū melle illita. Quinetiā sordida repurgant. Inflammationes, panolq̄, cū melle imposita discutunt. Cutē a capite uulsam conglutinant. Oris ulceribus commanducata medentur. Succus & decoctum, eosdem habent effectus. Sanguinis eruptiones, ac muliebre profluuium, admotus succus inhibet. Vuę oculorum, pustulisque prodest. Ulcera, & ueteres defluctiones sistit. Quapropter in collyria addit, ad genarū erosiones perq̄ utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso uino ex aqua, siccatusq̄ sole in pastillos digeritur. Sed longe ualidior ad recensendū succus habetur, qui cum uino q̄ cum aqua expressus est. Auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, ut spodiȳ uicem cinis præstet. In cruda olla oblito ore luto, usq̄ dum figlinum percoquatur, restinctaq̄ uino, & rursus subacta, eodem modo uruntur. Postremo cerusę modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. Sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuę olea eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior. Vnde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, & ulceribus quę depascunt uorantque. Quod autem intra nucleum est ex adipe & farina, scabros ungues excutit.

BARBARI COROLL.

Oleaster, gręce κότινος appellatur. Syluestris Olea fecundior satiuā, q̄ fere syluestres habent, cui cura fertilitatē minuere. Mansuere hanc tractatu, decisis circa tales, aut omnino translatione mitem fieri, uix potest adduci Theophrastus, ut credat. Sola hęc arborū cū Olea, terebinthem sentire nō dicat. Ex Oleastro marculos breuiiores, & terebris uaginas, sicut ex buxo, ulmo, fraxino, aquifolia, factitas produnt. Est & in Appennino frutex, uocatus Cortinos, ad liniamenta modo conchiliȳ colore insignis. Sed hoc ego nō Oleastrū esse puto, sed Ole

A

ad hoc. n. μακρά
+ αἰγυροὶ καὶ
ἵπποι ὀλισί-
καρποι

αἰγυροὶ καὶ

B

Plin. li. 17. ca. 12.
Lib. 12. ca. 17.
Li. 15. cap. 1

D I O S C O R I D I S

Castellum, & Oleam cilibracam, a Columella nominatam: cuius & ipse Dioscorides in Cham-
lea meminit; Photion, Oleastrum quandoq; dici Phauliam existimat. Certe Phaulia Oliu-
genus est Columellæ, Plinio, græcis omnibus.

Plin. li. 15. ca.

8. 4. 5.

Oleæ medulla tam incerta, ut non in medio haberi, sed p totum lignum sparsa videat, radi-
ce parua, uelut lacinia ex medio tendente, cæteris grandibus & cancrorū similitudine contor-
tis. Proprium ei malum Congros, etiamsi deriuatur in alias quoq; id nomen. Sunt q affectum
tū Premnō, Crotonē aliq cognominent. Supina foliorum huius contra q; ceterarum, candi-
cant magis q; prona, minusq; sunt leuia: qd & cum hedera cōmune est oleū. In Syria, & aliubi,
cōgestum quasi uuæ modo fructum ferunt, ubertate soli. Oleam utiliter & probe defloruisse
dicimus, cum flores eius caduci, uelut perforati reperiuntur. Nascitur modis omnibus extra,
q; surculo. Ex huius nucleis, quos Sanfas uocamus, syluestrem oleam prouenire Theophra-
stus scriptum reliquit. Sanfam, sunt qui & Naucum dici uelint. Vnde uerbum nauē facere.
Quandoquidem & fullones, ob uilitatem artis, Nacæ dicebantur, ut nunc mesitas et proxene-
tas, sanfarios & ossarios uocamus. Quidam pro nugis, naucum. Alij omnia fere opera ex la-
na, græce *uauas* dici uolunt. Ipsum quoq; nucis, sed & omnium rerum putamē. Alij nucleum
malunt iuglandis. Alij mediū illud uelut dissepimentū. Glossematorū scriptores fabæ gran-
i, q; hæretū fabulo. Quidā ex græco leuē hominē in eo uerbo significare putauere. In mari rubro
uiuit Olea, quæ uocatur arabica, baccis fere nostratibus, fungos, cum largi ceciderunt, imbres
educans, qui tacti sole in pumicem durant. Ex qua manat lachryma, inhibendo uulnere san-
guinē expetita medicis. In sinu heroo lapidis specie, ut thynum & laurus, cubitorū trium ma-
gnitudine. Ignē olea, quamuis optime subditum excipiat, q; spissa & pitigui natura sit, igniari
is tū ineptissima est. Vna maxime omniū Olea regerminat in opere. Vitam oleæ Theophrast.
200. aſos longissimā esse tradidit. Si olea consitū in confinio quercetū habuerit, nō solū nō fe-
ret, sed etiam fugiet, introrsumq; se in fundum abijciat. Ut cradē fico, ita thalæa tribuantur hu-
ic arbori, utiq; apud nos. Græci, ut ingt Pollux, Thalos non oleagineos solum, sed uitigineos
quoq; ramos nomināt interdum. Precidunt, Varro ingt, eam de tenero ramo æquabiliter, ex
utraq; parte circiter pedalem. Sunt qui sclauolas nominent. Eresionē porro Athenis, siue Ires-
ionem uocabant, plantam oleagineā, uelleribus & corollis inuolutā. Vnde & nomen cōtra pe-
stilentiam foribus imponi solitū, ut est apud Aristophanē. Hanc & Corythalion dicebant.
Etiam si pro laureo quidā ramo capiunt, in eundem lustrationis usum. Credo huius quoq; ri-
tus apud Romanos uestigium fuisse, cum ita legamus apud Festum. Planta oleaginea uirga, in-
quit, foliata est ex olea deplātata. Nam & februa quoq; lanæ sunt & arborū ramī apud nos
quibus redimiti sacerdotes expiabant domos. Quod deinde nomen ad oīa purgamina transla-
tum est. Autor Ouidius. Morbus & ille proprius, præter uermiculationem, Elos uocatus, hoc
est, clauus. Ab alijs Mices, atq; Lopas, hoc est, fungus & patella: ceu quædam solis inuasio.
Quanc; Patella in ficu morbum significat, qui nimios propter imbres radici contrahitur in o-
lea. Et Arachnion uocatur affectio, hoc est, aranea, fructus absfumens uermis: sub corio pro-
uentū adimit, in uicemq; adiuuat, si nascatur ad nucleum. Nulla post ficum arbor uredini ma-
gis obnoxia est. Carpe appellant in oleis uermiculi, flatib. austrinis creati, ut *in* in uitibus. Est
et impetigo, peculiaris ei morbus, ut scabies fico, & uitib. fluor. Olea græci, *λατὴν* uocāt: nostri
q; q; Termite. Quanc; ita & ligni uermes dñr. Optia erat Olea ueterib. licinia, siue liciniana. Pau-
sania. 2. oleo. Efec, orchas. Varro, grādis ingt, Olea uocat orchitis, a similitudine, ut credo, testis:
antiquus archemora. Minus ijs græte sunt regiē, et radij uocatē. Sūt et alia earū gñā, quæ ambis-
osū fit, pseq, cū et. 6. uolumine Colum. et Plin. 15. naturalis historie, nihil fere indictū relinquāt.
Hæc arborē nōnulli existimāt ultra. 60. a mari, aut nō uiuere, aut nō esse feracē. Sed in qbusdā
locis recte puenit. Olea Mineræ sacrā, ut Aristoph. & Iulius Pollux ingt, græci Moria uoca-
bāt, in academia sacrā, ut in Olympia nascētē Oleastrū calistephanō: qd olympiē uictores ea co-
ronarent, ut ait Pausanias. Nā Secos, fructiferā oleā in poetis significat Photioni. Dicit & Callie-
lea, quā nos satia, ut ab oleastro differat, quā uocat Agrielgā. Celebrat & cognominata Stre-
pte, ab intorta specie. Sed ea loci nomen ē, circa Epidaurū, adiecta fabula, euenisse ita ei circūa-
ctu manus, Hercule illac meante. Nā & clauā eius ex oleastro uolūt reuerso ex Hyphoreis fuis-
se, ignoto prius græci: quæ mox spōte refluuit apud Troezenios, aut certe ad Alphēū amnē:
si Pausaniæ credendū est, hōi qdē satis docto, sed superstitioso, diu Adriani & Antonini, ut
usq; tēpibus. In eadē gēte Streptos, Rhachos uocat, locū oleastris frequentē, uersus mare: q;
eorum consuetudinē, quicquid ex olea relinquitur inutile, Rhachos appellabatur. In Arcadia
spectari solitam, Pausanias affirmat arborem, e cuius radice una, Ilex & Olea nasceretur in

quoddam fano. Syracusis, ut Diodorus auctor est, in frondibus olearum scriptis optimatum nominibus, discessione facta, irrogabatur quinquennale ciuibus exilium: de quo argumento, genus id multæ, Petalifmus appellabatur, ut Athenis Ostracifmus.

EX M. VERG. COMM.

Fuit uniuersæ Græciæ quondam in maiore honore Oleaster quam Olea. Hanc ipsam arborē Cotinon Dioscorides uocari ait, communi & recepto ab omnibus græcis nomine. Oleastrum enim græci Cotini appellatione intelligunt, & ex similitudine æthiopieam Oleam, quæ propriæ generis in ea regione arbor, nullum inuenit ob similitudinem aptius cui compararetur in Græcia nomen & genus. Maro noster folijs amaris Oleastrum esse dixit. Nec falso, si sensui & uiribus eius in medicina credendum sit.

De Colymbadibus Oliuæ. CAP. CXLI.

Colymbades trita, & ambustis illita, pustulas gigni prohibent. Sordida ulcera purgant. Muria succus collutas gingiuas contrahit. Et motus dentium firmat. Oliua flaua & recens, stomacho utilior est, uentri difficilis. Nigra autem & matura, corruptioni oportuna est, stomacho aduersatur. Oculis non conuenit. Capitis dolorem mouet. Arefacta illitu depascentia ulcera fistit. Et carbunculos emarginat.

BARBARI COROLL.

Oliuæ, Colymbades ideo uocantur, quoniam oleo suo puræ, hoc est, sine accersita cōmendatione innatant, & quasi urinabundæ fluitant. Halmades autem dicuntur, quæ muria seruuntur, etiam si quidam Græci confudere nomina. Sunt & Netrindes appellatæ, quia narent, apud Iulium Pollucem. Idem auctor & Cotinadas nominat, quas & Phaulias, & Trambelos dici tradit. Medicinæ, quæ a Dioscoride subruissis redduntur, tributæ candidis a Plinio uidentur. Castigandi sunt in auctoribus loci, Colymbares, pro eo, quod Colymbades, imperitia librariorum scribentes. Genus alterum oliuæ cibariæ, Græci Thiaftas, & Pyrenas, & Pityrum, siue Pityridas, hoc est, nucleos, & frefas, & fursuraceas appellant. In hunc usum stringunturante quæ prematuræ sint. Epityra falso dicta, cum sit Epityrum, ut Varro inquit, siculum edulium: de quo dictum est alibi plenissime.

Fuit quondam multiplex Oliuarum conditura, accersitaque aliorum saporum cōmendatione placebat, quod aliqui ingrati habuissent in cibis usum. Inter eas Colymbades a Græcis dictæ fuerunt, quæ cōmuniore & certiore uocabulo Halmades itidem dicebantur. Hæc nomen a sale inuenerant. Halas enim Græci, sale dicunt. Illæ ab eo, quod in conditura sua natarent sic appellatæ fuerunt. *κολυμβάει* enim urinare est. Dico autem urinare, in natando sub aqua esse, si quis rem uelut exactius nosse, facile illi erit ex Plinio lib. 15. cap. 3. Palladio lib. 13. cap. 10. Columella, præterea lib. 13. cap. 47. infinitas pene Oliuarum discere condituras.

De Oleo syluestris Oliuæ. CAP. CXLI.

Oleum syluestris oliuæ humidis gingiuarum uitij colluitur. Dentium mobilitates stabilis. Calfacti fatus, gingiuis fluctatione laborantibus utilis est. Lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

BARBARI COROLL.

De oleo syluestris oleæ dictum est superius.

EX M. VERG. COMM.

Paulus affirmat spissandi simul & adstringendi uim habere, aridiisque & squallidius omni alio oleo esse. Locus est eo capite, in quo de erosionibus gingiuarum, earumque excrecentijs & pladis agit. Sic enim ille uocat, quæ hic *ὀλῆα πλῆδισα* dicit. Quod uictum facile, & quale sit intelligitur, si nouerimus quid in alijs *πλῆδισα* græcis significet, non humens simpliciter, sed quod cum humore flaccidit: quale erit, quod natura sua durans rigensque admissio humore lauit, & paulominus quam dilabatur, oportetque in τὸ πλῆδισα duo hæc intelligere, humorem, & ex humore infirmitatem, idque est, quod hic ait, gingiuas *πλῆδισα*, & nos uertimus flaccidas, & cum infirmitate humentes.

A

κολυμβάει

Plin. li. 23. ca. 36

B

VERG.

Plin. ut supra
de oleis.

C De Lachryma Aethiopicæ Oleæ. CAP. CXLIII.

Λακρυον τῆς αἰ-
θιοπικῆς ὀλεῖας

Lachryma, quam Aethiopica Olea stillat, Scamoniæ similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates Oleæ, Oleastricq; similem lachrymam sudant, quæ cōmode ad oculorum habetudines illinitur. Cicatrices, albuginesq; illitu emendat. Vrinam & menses ciet. Causis dentium impressa, ad dolores efficax est. Inter uenena scribitur. Partus pellit. Lepras & impetiginas sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis Olea.

B A R B A R I C O R O L L.

Oleæ Aethiopicæ lachryma in precio est. Sit hæc Arabica, quæ & ipsa dotatur lachryma, nondum constat mihi. Quancq; puto eandem esse, quoniā in Arabici sinus desertis, tribus insulis, ut inquit Strabo, nascitur. Vt cumq; in Arabia stillat eam olea, qua medicamentū conficitur, Enhæmon appellatū, singulari effectu contrahendis uulnere cicatricibus. Sunt qui hoc esse putent gummi genus, illud quod recentiores Elemi, quasi Enhæmi appellant, ad ossa etiā fracta caluæ conglutinanda cantatissimum. Porro uerbum Enhæmoni, non huic modo rationi conuenit, sed emplastris omnibus, quæ cruentis protinus iniiciuntur uulneribus, ad reprimendas inflammationes, & inhibendum sanguinem: quod genus & Alipenon, & Caragmaricon, & Collecticon uocatur, quoniā medicamentis minime pinguibus constar. Oleæ autē hæc in Arabia nascuntur, in maritimis, & fluctibus, æstuq; operiuntur rubro mari, ut in olea demonstratum est. Nec baccae nocetur, cum confet & in folijs salem relinqui, Oleastrum quoq; ipm, ueteres Oleam uocabant Aethiopicam, testis est Dioscorides.

E X M. V E R G. C O M M.

EX Aethiopia usq; ut Comicus ait, Aethiopicæ oleæ lachryma quondam Græciæ importabatur. Neq; a nobis igitur desyderabit quispiam, quæ in tam longinquo, & inaccessibili orbe nascuntia cognosci ætate nostra non possunt.

D

Ἀγρὸς

C De Quercu. CAP. CXLIIII.

Omnis Quercus adstrictoriam uim habet, præsertim liber, qui cortici, & ligno intercedit. Quinetiā tunica putamini glâdis subiecta. Decoctū ex ijs datur dysentericis, celiacis, sanguinē excreantibus. Trita in pefso, sceminis fluctione uulua laborantibus subijcitur.

B A R B A R I C O R O L L.

De glâdiferis
arboribus &
glandibus, &
gallis. tude Plin-
ium lib. 16.
ca. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Plinius glândiferas arbores, una uoce comprehendi posse negat latino sermone, quemadmodum græco potest Ἀγρὸς, & antiqua uoce Saronos, a qua Saroniacus sinus, & Saron, in Arcadia nemus, trans Ladonem fluuium. Quibusdam, ut Theodoro gazæ, Roboris appellatione cōtineri posse omnia ea genera uidentur. Sane Græci Dryos uocabulo, etiā omne lignum significant. Vnde Gerandryon, pro ueteri & ambusta quacūq; arbore accipitur, quasi uetus ramale. Persius. Ergo roboris quaterna genera, Quercus, Robur, Aesculus, Cerrus: quæ Græcis illis respondent: Hemeridi, Aegylopi, Haliphloe, Platyphyllo: ut sit quercus Hemeris, Platyphyllos Aesculus, Aegylops Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos robur significet, non habeo compertū. Theophrastus certe Agriamdryn appellat, quā nostri robur interpretatur, ut in Galla disseruimus. Nec minor hic, q̄ in pinu difficultas, quæ quibus græcis latine congruat. Nos utroq; loco tantū laborauimus, quātū uix ipsi qui p̄didere. Quidā quatuor su prædictis duas addidere spēs, Phagū, & Illicē. Sed toto gñe distat, ut cognatæ potius, q̄ congeneres hñdæ sint. Hemeris, sane Homero, non quercū, sed uitē significat, ut Photion testatū esse uoluit. Sibari, qui nūc Sibari thuri dicunt, quercus fuisse tradit, in oppidi cōspectu, fronde p̄petua, Varrōis & Theophrasti testimonio, q̄ nec germinare cū alijs, sed ab ortu canicula solita sit. Rarū est, qn̄ sata quercus deterior eueniat. Dulcissima glās Hemeridi post Phagū. In orbem hæc comat, torqueturq; in alas, crebro ramorum sinu caua, materies ualida. Macedones, quæ glândem dulcem perducit, ἑρμιόφυον, hoc est, quasi ueri quercum appellant. Nasci Quer-

cus in rubro mari glandiferas tradūt. Nasci & in nostro, propiores terræ, super lapides atq; testas, sine radicibus, sed patellarū modo adhærescentes, folio carnosō, crasso, atq; oblongo, myricæ simili, accedētis ad purpurā coloris. Magnitudo arboris tota, paulo amplior sesquipede. Hac tingi mulieribus lanæ. Ramis earū adhærent conchæ quædam, & caulibus parte ima, ubi & bestiolæ populantur. Naufragis & urinātib; comperta hæc. In Lusitania profundo mari Quercus glandiferas innasci, unde Thūni uescātur, auctor est Polybius. Ob id Thūnos, qui dicuntur carmarinos esse porcos, minime discesserit a uero: ut inquit Athenæus. Carinas nauibus quercus subijci præcipiūt, maxime triremibus. Abieti, aut pino larici uocatæ, ferruminari quercus nō potest. Infociabili natura, q̄ hæc spissa corpore sit, illæ textu raro. In septentrione haud pculcaucis, circa duos p̄cipue lacus, littora ipsa obinēt quercus, tāta magnitudine, ut suffossæ fluitibus, aut flatibus propulsæ, uastas cōplexu radicū insulas asserāt. Itaq; libramētō eo stantes, nauigāt. Ramorum ingentiū armamētis sæpe territa Romanorū classe, noctu & prælio contra arbores quoq; inuito. De Herciniæ syluæ miraculis, nihil attinet dicere, nisi q̄ magnitudine insigni robora ibi crescere concupiūt. E glandiferis ciuicas coronas neci mos erat: quæ omnibus anteferrentur. Ciuica iligna primo fuit. Postea placuit ex æsculo Ioui sacra. Variatūq; & hoc cum quercu est, ac data quæ ubiq; fuerat. Non puto prætereundū Alexandri Macedonis inuētū, seruandæ niuis, in scrobes ubi ea sit, coniectis e quercu ramis. Saronicus in Peloponeso, Plinius inquit, siuus est, olim querno nemore redimitus: unde ei nomē, ita Græcia antiqua appellante quercū. Pausanias ab Sarone, qui post Althipū regnauit, sinū eum dici uoluit.

EX M. VERG. COMM.

Coniunximus, unoq; & eodē clausimus capite, quæ natura primū in eodem genere, mox in historia hic scriptor, postremo meliores græcorū codices coniuncta esse uoluerunt.

Emēdauius præterea, addidimusq; pauciora quædam, quæ græca cum nostris conferentibus nouisse facile erit, præsertim in communi & nota omnibus re. Nullibi enim non nascitur Quercus aliqua, Fagus, Ilex, Castaneaq; quam hic Sardianam glandem, a Sardibus appellat: quemadmodū a Castano Magnesiæ oppido, uel ut Stephanus docuit, in Apulia non procul a Tarēto, Castaneam Latini & Græci appellauerunt, glandiū generi ab hoc scriptore, & ab alijs assignatā, & Iouis glandē dictam. Et si posteriores regijs nucibus eum honorē tribuerint.

Eandem legimus in ueterum Græcorum lexicis Lopimam, & Euboicam dictam fuisse: hanc a regione, illam a cortice, quod λῆπος Græci dicunt, & λῆπιν decorticare.

Laudauit contra uenena quædam præcipue Nicander, Castaneam, Nucemq; ut postea Maro fecit, appellauit. Versiculus eius est. κασανὸν καρὶὸν παχυφύλλοισι κάλυμμα. Ex populo post, ἀσπληνὸν καρὶὸν τὸ κασανὸν ἔτρεφεν αἶα. Quod non parū miretur aliquis, cum manifeste inter glandes, potius q̄ inter nuces, Castanea numeranda sit. Magnis autoribus defendi utrunq; potest, nec nos aliud in ea re monemus, quam fuisse quondam in ea glandis & nucis nomen, latiusq; glandis, quam nucis claruisse.

De Glande.

CAP. CXLV.

Glandes eodē effectus exhibent. Vrinam ciunt. Capitis dolor, & flatus in cibum sumptæ pariunt. Resistunt esitæ uenentorum ic̄tibus. Decoctum corticis, cum lacte uaccino potum, prodest contra toxica. Intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt. Ad duricias, quas cacoethæ uocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conueniunt. Iligneæ glandes uiribus quernas præstant.

BARBARI COROLL.

Glands græce βάλανος, ut Varronī placet. Præfertur omnibus Hiberica, fago dulcissima, post Hemeridi. Tum Platyphylo, deinde Haliphloeō. πλατύφυλλος, hoc est, latifolia, post cerum excelssissima & rectissima. Sed post haliphloeon, usu ædificiorū deterrima, nec utilis carbone. Macedones latifoliam intelligunt amaræ glandis: quam Aesculum quidā interpretantur. Aesculū porro ab esu dictā miremur, cum diphtongum æ requirat. In qua uermiculi nascentes, priuatim albæ nominantur. Ab æsculo æsculetum, ut a quercu querquetū. Vtrunq; locus Romæ fuit. Vnde Querquetulana quoq; porta, q̄ a uiminali, & caularia nō discrepat. Etia si ab auibus Querquedula, quas M. Varro & Columella, Cercidas uocari græce dicūt.

C uideri potest appellata. Haliphloeos falsicortex a Theodoro dicta. Potest & recticortex, quia nonnulli apud Græcos, euthyphloeon eā uocent. Crassissimus huius codex, & plerūq; fungosus & cauus. Pellima carboni, & materiae. Nec putrescit alia etiā cum uiuit. Quin & fulmine ictus sepiissime, tamen altitudine nō excellat. Ideo lignū eius, ne ad sacrificia quidē uri fas erat apud Aeoles. Sphagnon, siue Splachnon, siue Phascon appellant, itemq; Bryon, pannū quendam mucosum, pendentē ex ea quasi uillos, ut in Cerro, sed nigriorē breuioremq;. Vtūtur arbore Macedones, ad axes, & id genus utensilia. Glans eius rara & ingustabilis animalibus, præterq; suillo generi, ut Plinius existimat, ac ne sui quidē, si pabulū aliud habuerit. Quod quidē Theophrastus Aspridi, hoc est, Macedonicæ cerro tribuit. Est autē Aspris, rara & improba glande sterilis, quæ caput tenet mandentiū, ut iligna, Cerrus, ἀγρία a Græcis uocat, glande omnium amarissima. Rarissime nascitur in cultis. Pannū quem dixi phascon, longitudine cubitali, brachiarū similitudine, mucosum, uillosumq; ferens. Nascitur e cortice, non e furculo, unde glās, nec ex gēma, sed e supernis nodorū si a latere. Lignum rectissimū, excellissimum, leuissimum, per longitudinemq; robustissimū. Aedificijs ineptū aspridis, si dedoletur. Ideoq; rudi duntaxat utuntur. Damnatum & carbone, quoniā exiliat, scintillaq; edat. Aerariorum tantū officinis compendit; quia flatu desinente, protinus emoriens, saepenumero uratur.

De Fago & Illice.

CAP. CXLVI.

F agus & Ilex, quercus generi assignantur, & consimile munus ob eunt. Iligna radicis cortex cum aqua coctus, dum eliquescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatus. Folia oīum tusa et trita, tumoribus pſunt. Et imbecillas mēbrorū partes corroborat.

BARBARI COROLL.

F agus ea, ut quidam scripserunt, quæ in tenuissimas secatur laminas, glandifera non est. Id eoque duo genera, siue nomina Fagi sunt glandem ferentis. Materie scabra, quam Græci φάγον appellant, ut fructū quoq; Hippocrates. Et alterius quam Græci Oxyam, Lydi, Myson, Olympeorum eorum monte copiosam. Vnde Myli populi, ut Strabo inquit, & Eustathius. Nostri Scissimam appellant, secūtilem in laminas, similemq; abieti. Syluestrem, nuncq; ut Macedones arbitrantur, florentem, erectam, leuem, enodem, ligno colorato, robusto, neruoso, folio crasso, bifido, longiore q; piri, extremitate aculeato, radicibus nec multis, nec altis. Fructus glandis effigie leuis. Includit cauliculo echinato quidē, sed blādo, nec hispido, ut in castanea, cui tñ similis est dulcedine ac succo. Nascitur eadē candida, sed in montibus. Vtilis ad carpenta, lectos, subsellia, mensas, nauigia. Campestris nigra, & ad hęc minus petita. Fructus utriq; similis. In aqua durat æuis, ut robur, atq; ita firmior quoq; redditur. Humidissima hæc, & fraxinus. Quāobrem e duabus his lectuli, qui fierent, incuruant cedentes ponderi. Minoribus Scissima nauibus commendat ad carinas. Itē ad testudinem plaustrorū quoq; uectabulorūq; uilem fabricā, specie uisenda prouenire in agro latino solita, auctor est Theophrastus, tanta longitudine, ut nauibus Etruscis, pro carina satifaceret. Sunt qui Oxyam interpretant Ornū. Ilex uero, Prinos græce dicta, post occasum uergiliarū fructificat, & anno proficit, ut putāt Arcades. Simul em̄ antecedentē fructum, nouus occupat, proptereaq; a nonnullis inter biferas descripta. Radix Ilici multiplex, & ut syluestri altissima, folio roboris minore, aculeato, leuiore cortice. Arbor de amplissimis, ut robur, materie spissa & robusta, sed quæ frangat ac dissiliat sponte sua. Ob id Pericles Beocios Ilicibus dixit esse similes, ut est apud Aristotelē, qm̄ ipsi se conficerēt intestinis discorchijs. Glās exigua, & pter glandē puniceum granū sunt hæc. Hyphear, & uiscū in ramis, ut aliena sustinet, a septētrione uiscū, a meridie hyphear. Hanc & Aquifoliā, uel Aquifoliū uocari putato, siue paulo ab ea differentē. Theodorus Aquifoliā appellat, quā Theophrastus Ariā, siue Agriā, siue Narycan syluestre, & cui folia nunq; decidāt. Ita em̄ Dore uocat, inq; quā Arcades Phellodryn, sempiternæ frondis arborē, mediāq; inter Robur & Ilicē. Sunt qui Phellodryn aliud negent esse q; Ilicem foeminā: ut Ilex ubi desit, utant hac in carpentarijs præcipue fabricis, quod & Lacedæmone faciūt & Elide. Lignū intusq; Ilici candidius, sed fuluius q; robori. Materia quoq; durior, sed q; Ilici solutior in opere: foliū simile, sed iligno maius, & querno minus. Speciosior medulla q; Ilicis: fructus minimis glandibus. Aequalis Acylon uocatur, quēadmodum & iligneus. Nam Balanos, siue glans robori propria tribuit. Acylon certe Lydi gentile ipm̄ uocant: quēadmodū & Balanos, pro glande Colis dicitur: Plinius contra q; Theophrastus, Phellodryn uidetur eadem existimasse cum subere, quod & Phellos dicatur, in foeminariū

φάγον ὄξος πρίνος

Plini. lib. 16.
cap. 6. n. 19.
lib. 24. cap. 5.
Theophrast.
lib. 3. cap. 9.

D

☞

calcarius utilem hyberno tempore, ob id mulieres, facete a grecis, arborum cortices uocari. Est autem Suber, arbor procera, sine multis ramis, ligno robusto, cortice præcrasso & aspero in se-
nectute; qui ut in Picea rūpatur, sed maioribus fragmentis, folio Fraxini crassiore longioreq;
ac perpetuo. Glans Aquifoliae. Corticem detrahare oportet, ne deterior fiat arbor: qui trienio
post subnascit. Simulachra e Subere dijs factitata. Sed successit in eius locū palma. Hæc Theo-
phrastus. At Plinius hæc, Suber inquit est arbor, glans pessima, rara, cortex tantū in fructu præ-
crassus, ac renascēs, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus. Vfus eius anchoralibus ma-
xime nauū piscantiumq; tragulis, & cadorū obturamentis. Familiaris hæc arbor Theophrasti
temporibus Pyrenicæ. Nec in Italia tota nascitur, aut in Gallia omnino. Sed & illinc nascitur
confusio, q; Smilacē uocari legimus, quæ dicatur Illex in Italia, & in prouincijs Aquifolia: cum
Smilacem Sestius eādem esse cum Taxo prodiderit. Recentiores sunt qui Smilacem cum Phel-
lodrye faciunt eandem; haud ferendo errore: etiam si Smilax Illici describitur a Theophrasto si-
milis. Dictū est de Aquifolia & in Cræcogono. Vt cumq; sit, Illicis inquit Plinius, duo genera,
ex ijs in Italia folio non multū ab oleis distantes, a quibusdam grecis Smilaces dicūtur, in pro-
uincijs Aquifoliae; masculas Illices negāt ferre. Illici honos, ad axes in plaustris simplicibus, hoc
est, monostrophis. Item ad iuga lyrarum, psalteriorumq;. Igniaria quoq;. Ciuiam ex Illice pri-
mam fuisse diximus: cui ex æsculo successerit, dicata Ioui. Lignum ex Aquifolia contractum
ac discissum, Tedæ modo uritur, & a grecis in hoc usu Garbion uocari solet. Hoc & e quercu
fit, & alio nomine Panos & Phanos appellatur, uulgo quoq;, quemadmodum e iutigineo li-
bro, factæ lampades, Lophiæ dicuntur, & ex arundinibus Elanæ.

De Castaneis.

CAP. CXLVII.

Sardianæ glandes, quas aliqui Castaneas, aut Lopima, aut Glandes
Iouis appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent. Præfertur
tunica, quæ carnem & corticem media intercurfat. Caro his qui epheme-
rum biberunt conueniens est.

BARBARI COROLL.

Castanea, uergiliarū obitu fructificat. græcæ *λίον βάλανος*, hoc est, Iouis glans, uocat. Cum
tamen luglandis appellatio, nucibus tantū Regijs dicata sit a nostris. Nuces uocamus & Ca-
staneas, quanq; propiores glandium generi. Ideo apud Græcos appellantur balani sardianæ:
quoniam sardibus prouenire primū. Euboidas quoq; a Græcis dici, quas nos Castaneas uo-
camus, lego. Sed & Castaneas primo dictas scribit Phocion, q; ab oppido Magnesiæ, quod
Castanon dicatur, aduectæ sint. Vt forte Diodorus, nukes Castanaicas inde nominari. Quid
si a castitate, cum Plinius ieiunijs fere dicatas eas innuat? Ex ijs, Græci Pogonias appellāt, quæ
barbulas quasdam habent; nisi quis lanatas earum intelligat. Sunt enim aliquæ pilis hirsutæ.
Tiberius Cæsar, balanum nomen imposuit satius, cura multo excellentioribus. Plura earum
genera. Tarentinæ faciles, nec operoso cibo, figura planæ. Balanitides rotundiores, purgabiles
maxime, ac sponte profluentes. Salarianæ, puræ ac planæ. Nam Tarentinæ, minus ijs tractabi-
les sunt, & Corellianæ laudatior, & Meteranæ ex Corellianis factæ, rubenti cortice. Trian-
gulæ, & populares nigrae: quæ uocantur costiæ, minima laude, patriæ commēdatissimæ Ta-
rentum, & in Campania Neapolis. Cæteræ suum pabulo nascuntur, scrupulosæ corticis. In-
tra nucleos quoq; ruminatiore. Armatum Castaneis echinato calice munimentum, quod in-
choatum glandibus, trini quibusdam partus ex uno calice. Cortex lentus. Proxima corpori
membrana, & in ijs, & in nucibus, saporem, ni detrahatur, infestat. Torrere has in cibis grati-
us. Mollitura etiam præstant, ieiunio foeminarum, ut ait Plinius, quandam imaginem panis, &
ubicunq; fruges aliæ deficiunt, ut in Bergomatis, Agrimontanis.

De Galla.

CAP. CXLVIII.

Galla fructus est Quercus. Aliqua Omphacitis appellatur, par-
ua quidem, sed torosa, solida, nullo foramine peruia. Altera
plana leuis, perforata. Eligi debet Omphacitis, quæ efficacior est. V-
triusq; uis uehementer adstringere. Tritæ excrescentia in carne, fluctio-
nes gingiuarum & uuæ, atq; oris ulcerationem cohibent. Nucleus, den-

A

σαρδιανὰ
βάλανοι
λόπιμα ἢ
καστανά
λίον βάλανος

B

Plin. lib. 17.
cap. 20. & lib.
15, cap. 23.

νήκισ ὀμφακίτις

C tium cauernis inditus dolorem sedat. Crematae carbonibus, donec igne flagrent & uino aut aceto, aut acida muria extinctae, sanguinem suppriment. Decoctum quibus insidere expedit efficax est. Et contra uuluas procidentes, fluctionesq;. Capillos denigrant aceto, aut aqua macerata, Dysentericis coeliacisq; cum uino aut aqua tritae, conuenienter illinuntur, aut bibuntur. Obsonijs addi debent, aut integrae in aqua praecoqui, in qua non nihil excoquendum est, quod ipsis conferat. In summa, his utendum ad adstringenda quae opus sunt.

Plini. libro 16.
capi. 7. Theo-
phrast. lib. 3.
cap. 6. s. 9.

GALLAE, a graecis *καυαί* dicuntur, ad coria utiles. Hemeridis, Cerri, Platyphyllicae, hoc est, laeufoliae, nullius fere usus. Quanquam similes hemeridi, tantum leuiiores. Genera faciunt, medicinae utilia, solidam, perforatam, albam, nigram, maiorem, minorem. Galenus Onocicidas, hoc est, quasi asininas, a rusticis uocari Gallas eas scribit: quae fungosae, flauae, atq; magnae sint, minus efficaces. Vis omnium similis. Optima comagena. Nascitur autem Galla, sole de geminis exeunte, erumpens noctu super uniuersa. Crescit uno die candidior, & si excepta est aestu, arefcit protinus: neq; ad iustum modum grandescit, hoc est, ut nucleo magnitudinem fabae impleat. Nigra, eademq; resinacea, diutius uiuet, interdum mali amplitudine. Deterima ex robore. Signum eius, quod cauernae translucent. Galla nigra, sine oleo flagrat. Robur Gallam fert minorem: & alteram, ut dixi, resinosam atq; nigram. Quae glandem ferunt, omnes & Galla. Hemeris, id est, quercus, optimae, & corijs, ut dixi, perficiendis aptissimae. Fert & nigram, tingendis utiliore. De Robore, quam Theophrastus, agriamdryn appellat, discrepant sententiae, Alijs semine, Alijs etiam radice, quamq; sero, Alijs trunco nasci contendentibus. Item alij florere eam putant, alij negant, sed muscum floris loco edi credunt. Fructificat post Autumnum, circa occidentes uergilias. Ramos habet inconditos, crassum corticem, atq; scabrum, in senecta maxime. Ac reliquae quidem arbores, ut caepere, continenter germinant, solae Robur, Abies atq; Larix, germinatione terna parturiunt, corticemq; inter squamas spargunt, ac deinde rumpunt. Ob id Trislepri, siue Trislipe uocatae, ut in Pinu diximus, hoc est, intermissariae, aut trisquamiae. Robori & Cachrys dicta, quam nonnulli Amentum appellant, innascitur, durans hyeme, de qua in Abiete monstrauius. Tardissime Robur caeditur, hyeme ineunte. Ante computrescit. Tempestiue casum, durat eius spissatum, ut cornu. Non desunt tamen, qui tempestiuum putent uere, cum amentum, hoc est, cachryn suam gerit. Medullam huius inter spissa commemorant, Melandryon uocatam. Aeterna in aquis materia, sed dulcibus. Mari putrescit: contraq; magna pars arborum. Hoc tamen & mari utile. Sed nauibus & aedificijs quoq; ceteris, quae terra utunturq; anteferantur, ex aria, arbuto, picea, praesertim metallis argenti.

E X M. V E R G. C O M M.

Primus lib. 1. de plantis Theophrastus multa eius genera tradidit, quem secutus Plinius eisdem uerbis omnia latinis reddidit, Quae omnia ad duo tantum genera a Dioscoride contracta sunt. Credimusq; nos, quam hic *καυαί* uocat, & nos articulorum in digitis magnitudine uertimus, eam esse, quam ille dixit magnitudinem fabae habere, quoniam ad iustam magnitudinem non creuisset.

Dicendum breuiter, hoc loco etiam, quam nos diminuta a columna uoce oris Columellam diximus, eam, quam graeci *καυαί* etiam, latini uero uuum dixerunt, ea crassior facta & inflammata remedijs huiusmodi indiget.

Quam deinde nos exhalmeni diximus, Plinius aliquando, ut credimus falsum acetum dixit. Sed maluimus nunc graeca uoce uti: quoniam de ea Plinius cum de exhalme ex professo egit, usus est. Interim satis sit ex nominis compositione, quoniam aceto & muria constaret, sic graecis dictam intellexisse.

De Rhoe.

CAP. CXLIX.

ῥοή ἰσχυρὰ

RHUS, quae obsonijs aspergitur, ab aliquibus Erythros appellata, semen est coriarij fruticis. Ita uocari solet, quoniam coriorum in

fectores ea utantur ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascēs, bi-
num cubitorum altitudine, folijs oblongis, rubicātibus, in ambitu serra-
tis, acino uuarum gracilium, denso, magnitudine Therebinthi, quadam-
tenus lato. Cuius corticosa tunica perq̃ utilis est. Folia uini habēt ad strin-
gendi, & Acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat. Dysen-
tericis infunditur, & in potus eorum in seculisq̃ adijcitur. Instillatur auri-
bus purulentis. Gangrænas & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle
illita. Liquamētum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua de-
coctis, ad eadem ut Lycium conueniens. Semē eorūdem effectus exhibet.
Coeliacorum, dysentericorumq̃ obsonijs inspergitur. Fracta, desquamā-
ta, liuida q̃ illitum ex aqua, ab inflammatiōe uindicant. Linguae asperita-
tes cum melle abstergit. Candida sceminarum profluuiā sistit. Hæmor-
rhoidas sanat, cum quærno carbone intrito admotum. Latex in quo se-
men maduit decoctus, cogitur, coitq̃, efficacior ipso semine. Gummi de-
fert quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

BARBARI COROLL.

RHUS, siue ut Hippocrates, Roon, a Theodoro, fluida uocatur. Sterilis scemina est. Mas-
fructificat. Virgas, ut inquit Theophrastus atq̃ Plinius, fundit Rhus, breues & graciles, folio
Vlmi, longiore paulo, subhirsutoq̃, disposito per uersus, ita, ut in nouellis ramorum, contra-
rijs in se pediculis, germina respondeat. Iis candidas pelles conficiunt. Flos in racemis albus,
a quo semē collectum, lentis & rerrebinthi similitudinē, rubescēs, cum uua, qd uocatur Rhus:
medicamenti necessarium, in eoq̃ osseum. Radix simplex pro summa cespitum cohærens, ut
facile possit uniuersa flecti. Nascitur ubiq̃, sed argillosis potissimum, utiq̃ in Syria. quanq̃ ha-
beo unde mihi hoc Rhus syriacum, siue ut Columella & Palladius appellant Ros Syriacus, pa-
rum distare uideatur ab hoc nostrate, qui frutex coriarius, & rhus erythros, a colore subrutilo
uocatur, Dioscoridi & Plinio: quem Columella rorem futorium semel dixerit, qm Rhus scy-
todeplicos & brisodeplicos dicatur, cuius aridis folijs pelles, ut malicorio perficiantur, crassi-
tudine digitali, altitudine bicubitali. Quanq̃ Plinius, nisi librariorum ea sit incuria, cubitali p-
didit. Duo faciunt omnino græci genera. Magiricon, quod additur in obsonia, idest, cum Sy-
riaco, ut opinor. Alterum quod *βυροδεπνόν*, idest, excoriarium. quandoquidem utrunq̃ in
passillum, ex carnibus ceruinis compositum, & in pantolmium quoq̃ dictum requirunt, di-
uersis ponderibus, contra dysentericos & cruenta reiiciētes. Habetur & syluestris herba, folijs
myrti, colliculis breuib;: quæ tinea & uenena pellit, Rhus uocata, porro specie, quam The-
ophrastus supra reddidit. Contemplati sumus Rhum ex Umbria perlatum.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam huic frutici in Græcia duplex honor, & quod coquing, conficiendisque pelli-
bus inserviret. Duplex etiam nominis indicatio. Latini, qui sale potius in obsonijs quam semē
ne eius uti uoluerunt, ab altera utilitate nomen illi tantum fecerunt, futorium Rhum dicentes.
Posterior medicina, quæ barbaris uocibus plærumq̃ utitur, Sumach appellat, quæ uox co-
rijs cōmunis etiam in aliquibus locis est, non aliunde, ut credimus, quam quia folijs fruticis
huius cōfecta fuerint, uocantq̃ eā passim coriario rum officinæ Sumach. Theophrastus in fru-
tioso genere, et a spina alba paliuroq̃ & rubo statim eam descripsit.

De Palma. CAP. CL

PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio autumnū uigore decer-
pi solet, arabici Myrobalani similis, Pomatis cognomie, colore ui-
ridi, & odore mali cotonei: quod si ematurescens sole percoquatur, Phœ-
nicobalanus fiet. Palma acerba est, & adstringens. Contra alui scemina-
rumq̃ profluuiā, in uino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit. Vulnere-

A

Theoph. li. 3.
Col. li. 10. ca.
13. Pl. li. 13.
ca. 6. li. 24. ca-
pite. 11.

B

φόνιξ πάλμα
φονικὸν βάλανον

C glutinat illitu. Phoenico balani plus siccis adstringunt. Capitis dolorem afferunt. Copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo. Illinuntur cum cotoneo & cerato cenanthino uelicae uitij. Cariorae praesertim faucium asperitati esu medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pl. li. 2. ca. 5.
Lib. 13. cap. 4.
Theoph. li. 1.
ca. 2. li. 3. ca. 5.

Palmę teneritas, processu lignescit. Vita in sicco aequae ut in humore. Sabulosis salisq; gaudet, adeo ut in Syria Coele, tribus dumtaxat locis, ubi arene sint, pueniat. Alibi computrescit, etiam si recentes earum palmulae suaves gustu sint, nouelle fructu nullo intus ligno edunt potesta cum ligno. Paucos fere Palma ramos habet, scabro cortice, precipue cum senescit. Medulla omnino nulla. Mari tantum flores, feminis statim fructus. E semine suo nascitur, ut consere omnes, praeterq; Babylone, ubi & uirga seritur. Tanto ibi unius eius usu, ut extare carmina scribant, quę utilitates ex ipsa numero dierum anni pares esse praedicant. Simulacra ex hac fieri solita ueteribus, sed prius tamen e subere, ut diximus aliubi. Palma uictorie symbolu est, quod ut Aristoteles & Plutarchus inquit, non cedit oneri qualibet ingenti. Nec intra flectit panditurue, sed contra podus resurgit. Ideoq; in coronarijs certaminibus fere aliud praemium q; Palma non dabatur, ut inquit Pausanias. Etia si Graecia quatuor tantum locis, oleastro, pinu, lauro, & apio coronare uictores mallet. Palma fumo infestat cremata, de quo & Cheremonis poetę uersum Theophrastus praetextuit. Parit arborum sola fructu ceu in spica: qd ei siccitatis causa, & proprietate quadam naturae contingit. Fit & in alto Palma, fruticum generis, fronde cor-
Dtibus, continentis serie aliqui tñ interrupta. Color toti plantę puniceus. Surculi eius natura fo-
liorum acanthinorum, qualia soncus, & cetera id genus. Sed recti tñ sunt hi, nō ut illis recurui. Palma porro aegyptia, quam Dioscorides hic describit, Myrobalanon appellata fert, nullo in-
tus ligno: quę & Adipsos, & Poma nominat. Phoenicobalanus niger est, quia maturefcere per-
mittit Myrobalanus uiridis. Habetur & Myrobalanus unguentaria cognominata, sed ge-
neris alterius, suo loco indicanda. Quid autem sit Chrysobalanus apud Asclepiadem, ad ardo-
res stomachi singultusq; adhibita, non comperi. Aegyptia uero, ut Solinus inquit, sitim sedat,
utiq; ante maturitatē decerpta. Matura sensum, gressum, linguam retardat & inebriat. Phoenix
appellat graece Palma, unde fructus dependent Spathę. Palmulas e mari Plenes, e semina Ba-
lanos appellat, ut Iulius Pollux tradit: qui sumpsit ab Herodoto. Est & Phoenix herba, ut post
constabit. Itęq; musicu instrumentu, ab inuentore ita dictu: siue, ut alijs placet, quia primu ex
Deliaca palma cubiti eius facti fuerint. Ipsos palmaru cu fructu termites, Baia & Spadices grae-
ci, praesertim Dorici, appellat: a q & color egno generi, spadix, aut spadiceus & phoeniceus, hoc
est, palmeus: unde uulgo q; Baius, aliq; Phoeniceus, pprie is ē, q uermiculus et puniceus uo-
cat, ab Eusebio siue Hieronymo in chronicis: nomē hñs a Phoenice illo, q literas inuenerit. Re-
perio & Parium & Balias colores equis attributos. Sed pro uario apud Euripidem, est Bali-
us. Scio & Achillis equum Balias uocatum, & equos Balias, pro celeribus quoq; acceptos
a Poetis. Nam murinus color, a mure dictus in equino genere, is est quę graeci psaron, quasi a
sturno appellat. Cerebru palmę Galenus Encephalo, Dioscorides Encardiō, hoc est, medulla
uocant, quod & esculentum est. Palmarum plantam Cephalonem uocari, Palladius autor est.

Lib. 13. cap. 4.

P A L M V L A E Caryotę, celebrantur cibo. Sed & succus earum uberrimus est, ex
quibus praecipua Orienti uina, capiti iniqua, unde Pomo nomen. Ex his & acetum & mella
fiunt, & farina Babylone. Nuclei pro carbone sunt. Et pabulo quoq; iumentorum aqua ma-
cerati. Laudatissimę in Iudaea: nec tota, sed Iericunte maxime. Quanquam & Archelaidę in
praecio & Phaselidę, & Lybiadę, gentis eiusdem conuallibus. Dos his praecipua, succo pingui
lactentibus: quodamq; uini gustu, in melle praedulecibus. Tria Caryotidum, siue Caryotarum
genera. Nicolai, sicciores, amplitudinis uasq; ut quę cubitoru quaternum longitudinem co-
pleant: ab Augusto ita primo nominata, in honorem Nicolai peripatetici Philosophi, cre-
bro eas ad se militantis, ut inquit Athenęus. Alterum genus minus speciosę, sed sapore Cary-
otarum proximo sorores, unde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum, rumpente
se poma in parente ipsa quoq; calcato simile, ob id Pateron appellatum. Aristoteles in libro de
stirpibus, Eunuchos appellari scribit, quoddam genus Palmule, quod ali; Enorchos uocent,
quasi testiculares ac spadontas.

EX M. VERG. COMM.

E *ἡ ἀφ' ἧδ' ἡ παλαιότης*. &c. nullo sensu, si sic legatur apparebit. Neq̃ em̃ de coctura Palmis hoc loco agitur, sed quod Plinius uertit, Quod relinquitur Phœnicobalanus uocatur: ideo q̃ nos diximus, eadē si usq̃ ad maturitatem in arbore relicta fuerit, mutato colore & nomine Phœnicobalanus dicit̃. &c. quasi non *ἀφ' ἧδ' ἡ παλαιότης* legendum sit. sensus enim est, Aegyptiā palmulam ante totam maturitatem lectā, uiridi colore esse, & appellari *πῶμα*. Si uero in arbore relicta, penitus maturuerit, tunc mutato colore Phœnicobalanum, idest, puniceam palmulam dici, monet res ipsa: quia nullus erat sensus, si *ἀφ' ἧδ' ἡ παλαιότης*, idest, decocta fuerit, legeretur.

De Thebaicis Palmis.

CAP. CLI

T Hebaicarum decoctum potu, æstuationem sedat. Vires recreat cum hydromelite ueteri sumptum. Cibo idem faciunt. Fit ex eis uinum ad eadem conueniēs. Decoctum potu & gargarisatione magno p̃pere adstringit, & cohibet. Nuclei Palmarum cæterorum more cremati in crudo fictili, et uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt. Misceturq̃ in calliblephara. Quod si non iustam uersionem accaperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obstruunt. Contra oculorum uuam, & pustulas, palpebrarum defluuia, cum Nardo effectum præbent. Corporis excrescentias reprimunt. Vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex Palmis humilibus aegyptiæ.

BARBARI COROLL.

P Almulæ thebaides, in totum ærentes sunt, quemadmodum & arabicæ, macro corpore, exiles & torridæ, crusta obductæ uerius q̃ cute iudaicis, ut inquit Strabo, suauiores, etiam si dures, nec alio tractu Aegypto tota nobiles. In ipsa quidem Aethiopia friatur hæc, tanta est siccitas, & farinæ modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice, ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore q̃ mali amplitudine, Cyces uocant. Triennio maturescunt. Semperq̃ fructu pomum adest, subnascente alio. Hanc palmam Chamezelon uocatam a Dioscoride, quam nos pumilam interpretati sumus. Aliud ab ea genus est, quam Theophrastus Chæeriphem appellat, hoc est, abiectam & repentem humi palmam, folio latiore atq̃ molli, ad uicilia utilissimo, de qua in Taxo dictum est, copiosam in Creta, sed magis in Sicilia. Thebaidis fructus extemplo in cados conditur: ni ita fiat exanimatur, marcescitq̃ non recto stus fur-nis. Ebenus Aethiopica palmarum generibus fere ascribitur, ut diximus. Syluestris Palmæ fructus existimantur a recentioribus, quos officinæ Tamārindos modo nominant: & qdam a saporis acrimonia, Oxypheñicas, algentis naturæ contra bilem flauam pollentis. Sunt qui folia ei salicis deseribant similia. Non inuenio e ueteribus, qui de hoc genere quicq̃ prodiderit.

De Palma Elate.

CAP. CLII.

P Alma, quam aliqui Elaten, aut Spatham appellant, fructus Palmarum adhuc florentium, tegumētum est, calyxq̃, quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, grauis, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria. Sistit ulcera quæ depascunt. Laxatos artus committit. Trita miscetur cataplasmatibus & malagmatibus. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat. Datur bibendum congrue renum uesicæ, & uiscerum uitijis. Vuluæ ac uentris fluctiones sistit. Scabiem cum resina & cæra sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Fructus quem suo amplexu fouet, Elate etiam uocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit, & Spathæ effectus præ-

A

Φόνιξ ἡν Γαῖαν

Pli. li. ij. ca. 4.

B

Φόνιξ ἡν Γαῖαν
αὐτὴν

C stat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit.

Pli. li. 15. ca. 28

PALMA Elate laudatur, Hammoniaca maxime. Tum Aegyptia, demū Syriaca, dumtaxat in locis siccentibus, odorata, pingui lachryma: quæ in unguenta additur. Elatem, Galenus tenellum palmæ germen intelligit. Dioscorides ipsum fructus integumentum. Alibi genus est, ut in unguento Elatino diximus. Non ignorauit hoc Secundus noster, cum inquit, palmam Elatem conferre medicinæ, germina, folia, corticem. Caro Palmam hanc intelligere mihi uisus est, cum dixit, odoratum uinum fieri e Palma: quam habent Vnguentarij. Abies ergo duplex est. Vnguentaria, & materiaria, uulgo nota: unde abiegnæ trabes dicuntur, & Abietarij negotiatores, atq; fabri, pro eo qd est lignarij. Abies quia in cælum abeat, a proceritate uidetur appellata.

VEX M. VERG. COMM. Idetur Plinius lib. 23. cap. 6. Elatem, siue Spathem hanc, de qua Dioscorides hoc loco ait, in censu, & historia Palmarum, proprium habere genus credidisse, quæ medicinæ conferret, germina, folia, & corticem: cum tamen ceteri omnes non palmam, sed palmæ partem indicent, & multifariam appellent. Verum de hoc alias.

M De Malo punico. CAP. CLIII. Alum punicum omne boni succi est, stomacho utile, nullum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur. Sed aliquantulum in eo calorem gignunt. Inflationes pariunt. Vnde in febrili abdicantur. Acida adstringunt. Aestuant stomacho auxiliantur. Et multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora, gingiuasq; lædunt. Vinosa uero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachum qd sistunt. Coelesti aqua madescunt, bibunturq; comode sanguinem excreantibus. Ad desessus dysentericorum, foeminarumq; fluctione uulug laborantium utiles sunt. Expressus nuclei succus coquitur cum melle ad oris, uirilitalis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium uitia, præsertim acidi.

Pli. li. 9. ca. 19. lib. 17. cap. 17.

PUNICA, contorto & breui trunco, flore contra qd reliquis arborum puniceo. Excipiunt amygdalarum quoddam genus, quæ subrubicundum florem sustineat. De acidæ planta uel semine, uinolenta dulcisq; in Aegypto exit in Cilicia, circa Solos, ad Pinarum amnem, ubi contra Darium pugnatum est, ut Theophrastus inquit. Omnes sine nucleo proueniunt. Sola hæc, & Vitis, & Ficus, & Malus, caudice fisso non emoritur. Aculeos gerit in ramis, ut Paliurus & Rubi. Punicum malum Chartagine laudatissimum, indeq; cognomen, Malum punicum. Et Romæ locus erat in regione sexta, ut inquit Suetonius, quæ alta quoq; semita dicebatur, ut est apud Martialem poetam, ubi nunc uidelicet Dioclitiani thermæ sunt. Genera summa duo. Alteri nucleus adest lignosus, Sclerococcon ob id uocatum. Alteri nō adest, aut certe minimus, quod ex argumento Apyrenon dicitur, penultima producta, licet correpta Martiali. Archestratus certe anguillā, ut spinis & ossibus carētē, solā piscium Apyrenō esse cecinit hoc uersu.

Quæ autem sit Paulo æginetæ radix Apyrani, ex qua recenti discussorum cataplasma diapyranu, contra collectiones fingitur, ignoro. Natura sunt candidiore Apyrena, & blandioribus acinis, qui minus amari sint, distinctiq; membranis. Est & alia structura eorum communis, tanq; in fauo nucleos habentium, quinque species, dulcia, acrida, mixta, acida, uinosa. Samia & aegyptia. Distinguunt erythrocomis, & leucocomis. Ita nouæ genera colligunt omnium. Dulcia sæpe intelliguntur, cū apyrena dicimus. Vinolenta nucleū fere paruum habet. Vnam in hæc ac ne mustum quidem, sed uinum protinus aperuit natura, Apyrenis & uinosis, cortex asperi-

or. Ex acerbo fit medicamentum Stomatice uocatum. Sicut ex Mori quoque succo, Panchristos cognominata. Acinos, granatis totidem esse numero in singulis affirmant, etiam si magnitudo uariet, modo ex eadem arbore legantur. Satam primum in Cypro Malum punicam a Venere, testantur fabule grecorum. Bœcij, malum punicam ibidem, ut est apud Callimachum, & Sidem Hippocrates, alia grecia Rhoan & Rhœan, pomum quoque Rhoas & Rhœidia & Rhœdia uocare solent. Iuuenio & Rhœadriom uocari a Paulo in quodam cataplasmate, cui nomen Aphroditario est. In quod & rus, & amyllum, & squama æris, & cerussa queritur. Nam Aloida rion ex aloë medicina est. Sidem porro & Boetia terra dicitur: a qua et arbori nomen datum. Quo argumento Athenienses ab Epaminunda in Sidē regionis quæstione uicti memorantur. Legitur & Theophrasto Side frutex quidam, ut Achenus interpretatur, punice malo similis. Orchomeno lactu nascentis. Theodorus gaza non punice, sed papaueris similitudine describit, quia Rhoas, & punicam, & papaueris genus unum significet. Quamque discrimen illud, quod pro arbore primæ declinationis nomen est, & rhœa, non rhœas dicitur, pro papauere in tertiam refertur, Rhoas, Rhœdis. Theophrastus certe non Rhœadi similem, sed Rhœa dixit. Vt cum sit de Sida, Theodorus ex Theophrasto ita scribit, Sida papaueris, inquit, habet similitudinem, capite ad portionem maiore, ut quid magnitudinem mali referat, nec nudum id est, sed membranarum candidis obducitur, superque eas folia rose cum suis continentur caliculis quaternarum herbacea, de hiscens uero grana rubra, exigua, orbiculata ostendit: nec magnopere maiora quam miliū, sapore tritici diluto, crassescit æstate paruo pediculo: flos callicibus rosarum similis, quamque duplo fere grandior; hunc & folium super aquas manere, sed ubi defloruit, inclinari magis in uadum: do nec attingat terram, atque ita fructum fundere: folia pecudibus, germina suillo generi, semen hominibus mandu. Cognominem huic haberi & in Nilo scribit idem Theophrastus herbam, sed radicibus carentem. In tumulo Menœcei, Creontis filij, ad Boetias Thebas punica nasci traditur Pausaniæ, cuius poma intus sanguineum colorem præferant.

NOTIOR QVAM ut tractari longius a nobis debeat, Punicorum omnium historia & usus est. Illud tantum animaduertendum, quod uno excepto, in cunctis legitur grecis, τὴν δὲ ὀφθαλμὸν τοῦ πυρρὸν ἐκπαύειν ἐν ὕδατι. &c. & a nobis contra communem significationem conuersum est: Acidorum uero acini in sole siccari, πυρρὸν enim greci nucleos pomorum, quales in cerasis, prunis, & uuis sunt appellant, κοκκὸν uero acinos: nihilominus tamen πυρρὸν acinos, non nucleos uertimus. Primum, quod in probatiss. non πυρρὸν erat, sed ὀφθαλμὸς, quod liquorem significat, quasi ad cohibendam aluum, & in stomachum destillationes, non acinis, nec nucleis hic uti iuberet, sed ex acinis expresso liquore, eoque in sole siccato, quod sensus forte ablimilis uero non est.

Certius quod sequitur idem ostendit, ὡχρῶν δὲ τὸ ἀποδύμειν τὰν πυρρῶν, quod est utilissimum, & quod ex nucleis expressum fuerit, decoctum & melle mixtum.

Quod enim exprimitur, uuida acinorum caro est, non duri & arentes nuclei: idque Plinius libro. 24. cap. 7. quoque confirmat.

De Cytino, idest, flore Punici. CAP. CLIIII.

HVIUS FLORES Cytni uocantur, qui adstringunt, siccant, cohibent. Sanguinolenta glutinant. Quas Punicum præstant utilitates. Humida gingiuarum uitia, mobilescque dentes decocto coluuntur. Herniam pro lapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. Memoriam tradunt, qui tres quæminimos Cytnos deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidis exemplo.

BARBARI COROLL.

CYTNUS aliter ab alijs exponitur. Dioscorides & Galenus florem satiuæ punice ita uocant, Balauistum syluestris. Plinius pomum ipsum innaturum, & primum partum eius florere incipientis, Cytnum appellat. Flores ipsi Balauistia, in ipso erumpentes Cytno uestibus tingendis: quarum color nomen inde acceperit. Cytnum Dioscorides cognominat ipsum quoque Apollinaris herbe florem. Ceterum non proprie, sed per translationem. At Cicum, M. Varioni dicit membranula præteritis, in malo punico discrimen. Vnde Cicures animantes, quæ non sunt feræ, atque agrestes. A quo Veturij quoque nobiles cognominati Cicurij. Etenim Sisen

Cna Terabitē, p syluestri arbusio posuit. Partim ingt Terabite, partim Lauro atq; Pinu abundat.

¶ De Malicorio. CAP. CLV.

Malicorium asperum est, mali Punici putamen, quod aliqui Sidion appellant. Id spissandi uim habet, & quos Cytini, præbet usus. Decoctum radice potu latus uentris tineas pellit. Et easdem euocat.

BARBARI COROLL.

Malicorium, græci Sidion appellant, ex acerbis prælatum, ad perficienda coria. Nam & arbor ipsa, ut prædixi, a Boetis Sida uocabatur.

¶ De Balaustio. CAP. CLVI.

Balaustium syluestris Punici flos est, Cytino similis. Cuius com-
plura genera reperiuntur, candidum, fuluum, rosaceum. Lique-
mentum ex eo fit, hypocistidis modo. Cui adstrictoria uis inest, eadem
faciens hypocistis & cytinus.

BARBARI COROLL.

Balaustium, græce quid esset, dictum est in Cytino. Quidam caducum appellare modo uo-
lunt, a græco detorquentes. Mihi appellatio antiqua perplacet, Nec tantum græca fastidio, ut
latina deteriora probem. Aufonius Baulaustum, siue Balaustum, non Balaustium in carmi-
ne pronunciat. Item Columella. EX M. VERG. COMM.

De Balaustiorū nominis causa & origine, nihil pro cōperto nobis est. De uiribus hoc bre-
uissime Aegineta tradit, efficacissima in adstringēdo esse, sicca frigidāq; naturā habere.

¶ De Myrto. CAP. CLVII.

Myrus satiuā, nigra, utilior est medicinæ q̃ cādida. Sed hac mul-
to magis mōtana. Semen tñ imbecillius parit. Vis & Myrti & se-
minis adstringit. Semen uiride aut aridum in cibo datur sanguinē excreā-
tibus, & uesicę erosioib. Succus uirentibus baccis exp̃ssus, eosdē effectus
exhibet. Stomacho utilis. Vrinā cit. Prodest cōtra phalāgij morsum, &
scorpionis ictus in mero. Seminis decoctū capillū tingit, lus decoctū in uis-
no ulcera ī extremitatib. sanat. Oculorū inflāmatioes illitū cū polline po-
lēte, lenit. Cōtra ægilopas illinīt. Crapulā arcet p̃sumptū uinū, qđ fertuē fa-
ctio semine exprimat: alias enim acorem contraheret. Præstat uinū semi-
nis effectus. Vile procidentia uuluarum in defessionibus, sedis uitij, &
foeminis fluctione uulue laborantibus. Purgat surfures, ulcera capitis ma-
nantia, atq; eruptiones papularum. Fluentes capillos continet. Additur
quoq; in medicamento qđ liparas uocant, uti oleū qđ ex folijs eius factū
est. Decoctū foliorū ad defessiones balnearū cōuenit. Et cōtra laxatos ar-
tus, & male solidescētes. Eo fracta ferruminatiōi repugnātia utilissime for-
uentur. Vitiliginē emēdat. Purulētis auribus infundit. Et capillos deni-
grat. Succus eadē efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulcerib. &
mēbris omnib. fluctiōe laborantib. coeliacisq; p̃sūt. Et admisto omphaci-
no oleo, aut exiguo rosaceo cū uino ad ulcera serpētia, ignē sacrū, testū in
flāmatioes, epinyctidas, & cōdylomata. Arētū foliorū farina utilitē in spar-
git paronychij, pterygijs, & cōtra alarū feminūq; p̃fusiōes. Cardiacorū
sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cū cgrato, abustis, paronychij,

pterygiscq̃ medentē. Exprimūt folijs succus adfuso uetere uino aut aqua celesti, cuius recētis usus ē. Nā exiccatus plane carīe sētīt, & uires amittit.

MYRTUS, græce *μυρτιν* dicitur. Item Myrsinos, & Myrsine. Item Philaleos, ab Antipha-
ne. Sed & Myrton, ab Archilochō. Degenerat in fruticē, nisi crebro repurget. Vita ei ut
quibuldā animalibus ambigua, hoc est, terra & aqua. Præcipuus odor Myrtis Aegypti: ubi cæ-
tera omnia hebescunt. Semen apud Menandrum Synaristusi manditur. Myrtum & Myrta di-
citur a Catone, masculino & foemino sexu, græcorū (ut arbitror) imitatione. Item Murta
Varroni, unde Muratū, siue Muratullū, genus farciminis, q̃ ea large farciret intestinū crassius.
Vfus haccæ antiq̃s p̃libo fuit, ante q̃ piper haberet. Gōsum inde obsoniū, cognomine Myr-
ratū. Cōmēdant Myrtis, & iura, p̃sertim aprorū. Peregrina Italiæ arbor, atq̃ etiā Europæ quon-
dam. Pacifera Romæ habita, uice cuius uerbena nūc, laurus & olea prætendi inter armatos hō-
stes quietis indicīū fuerit. Purificatōibus quoq̃, suffimētisq̃ adhibita. Ob id & in coronis ute-
bant ea thesmothecæ Athenis. Præest Venus arbori, quippe q̃ littoribus maxime pueniat. Ve-
nus autē mari dicī orta. Hinc & arbor sacra coniugio. Græci arborē Mineræ, ut Oleā dicant,
cōmenti fabulā, q̃ Myrsine Atheniensis puella fuerit, pulchritudine ac robore insignis, amica
Palladi, quā iuuenis, ab ea cursu & palæstra superatus, interemerit. Catonis fastigia sunt candi-
di, nigri, coniuguli. Alia distīctō est, satiuæ, ac syluestris: & in utraq̃ latifolia. De syluestri age-
tur in Oxymyrline. Satiuarū gñā topiarij faciunt. Tarentinā, folio minuto: nostratē, parulo:
forensē, hoc est, exotica, p̃denso, uersibus foliorū senis. Hæc non est in usu. Vtraq̃ alia ramo-
sa. Coniugulā, quæ & Coniugalis uocat, nostratē dici existimāt. Ouantes myrtea corona ufos
quādoq̃ tradunt, ut triūphantes Lauro. Celebris est Hippolyti & Phædræ amoribus Troeze-
ni, cuius folia, ut ingit Pausanias, prope Veneris delubri satæ p̃forata nascebantur, iniuriā ui-
delicet ferentia seuientis ungibus, & calamistris foemina. Myrtæ sunt, ipsæ Myrti bacculæ.
Controuersum fuit apud Græcos, quod nam coronæ genus esset Anacreonti, Naucratis ap-
pellata. Et pluribus uisum est, non aliud esse, q̃ ex Myrto, rosis comitantibus. Alij papyri co-
ronariā: quam Aegyptij Biblon Stephanotrida cognomināt, interpretantur Alij e sampfuchō
serum, q̃ in Aegypto copiosissima sit sampfuchus.

Quia porro de coronis incidit sermo, inutile nō arbitror quædā huc transferre, q̃ alio a nō
his opere dicenda seruabatur. Ergo Lesbij, ut ingit Athenæus, Myrti ramulos Hypothymidas
uocat. Iis se coronat implexis floribus. Alij pectorales coronas: quibus & ceruices quoq̃ redi-
mibāt, Hypothymidas, Hypothymidasq̃ dicebāt. Habet & Hypoglotis, ex Hypoglossolier
ba, quæ post dicei. Item Isthmion, quā plariq̃ Isthimiacā appellant. Pyleones uero ferta sunt,
quæ Iunoni circundabatur, utiq̃ apud Spartanos. Sicyonij celebrāt Iachachas, ex Iacha flore
quodā odoris cōmendatissimi. E Myrto constat & Hællotides uocatæ ambitus ingentis, cubi
torū uicentū: ab Europa dictæ, quā Ellorida Corinthij appellāt, q̃ eius ossa in Myrto condita fe-
rātur. Quidā Elorida & Mineruā dictā uolunt. E Palma P̃siliimi sunt, quas Lacedæmonij Thy-
reaticos uocat, a loco ubi castra hostiū cœpere. E ferta Campanica Melilotini, quanc̃q̃ ex omni
gñe coronamēta muliebria in eo uocabulo Græci fere intelligūt. E Loto Aegyptia sit Antinoi-
os, utiq̃ non omni, sed ex ea quæ colore rosæ nascit. Ex ea uero quæ ceruleū eum habet, Loti-
nos tantū dici. E rosā cylistis maxie, quas & Ecclystias cognomināt. E Struthio Struthiū. E
Potho, Pothos. Est autē Pothos duplex. Alterū genus Hyacinthi flore. Alterū sine colore can-
didū, quo sepulchra coronabāt, a quo & nomē quasi desyderatis esset dicatū. Theodorus desy-
deriū cōuertit. Floret æstate. Diurnus est candidū. Habet & Aegydon coronæ genus Eubu-
lo, aut ex Anaglide, ut arbitror, quā nōnulli Aegylin uocabāt. Aut e Lygo, nā Lygos Aegy-
lis a quibusdā uocat. E Lygo autē coronas fieri solitas antiq̃s, in Viticē docuimus. Aut grami-
ne, quippe q̃d ab aliquibus Aegron uocet. Nam Fauni arundine ferulaq̃ uinciebatur. A tilia
Phyllirinos. Synthematicos, Aristophanes cū dixit, coronas uidet promptuarias & parabiles
intellexisse, nō multū a triualibus & promiscuis diuersas, quæ a Græcis Chydeæ, quali confu-
sanæ uocātur. Choronos, Appion grāmaticus, apud Philetam, a choro dictos putauit. Vnde
apud nos coronæ sint uocatæ. Sūt & Acinij, corollæ genus ex Acide, ita dici flos & satū quod
dam, ut Athenæus & Plinius scribunt. Sunt & Elicti ex Helice, familiares Alexandriæ, nec
non alijs quoque floribus plicatiles. Nam Tindiaei, Abydæi, ab oppidis Aegypti, ex spina
sunt Aegyptia, nemore ibi sacro Apollinis semper florente, multis comitatæ fabulis, quas re-
ferre, ut non piget, ita certe parū interest. De ijs & in Aegypto spina diximus, ex Demetrii sen-
tentia. Coronamēti nomen uidet, & cuius mentionē fecit Cratinus, Cosmofandallos uocatū.

I iij

A

B A R B:
Plin. 15. ca. 29.
lib. 23. cap. 9.

Coronarum
genera.
B

D I O S C O R I D I S

Culus inuentores Lacedæmonios fuisse Clearchus auctor est. Ariadnes coronā e flore Thēseō dicto perhibent fuisse. Id factū radice describit amara, ut Theophrasto placeret, de quo Timachidas poeta græcus cecinit. Inuenias & Apraginosyn uocatur, coronariū quoddā satum, apud Aristophanem poetā, ut grāmaticus Aristophanes interpretatur, Athenis in academia nasci solitū. Anethinis quoq; fertis uisus ueteres, & Alcæus, & Sappho testes sunt. Coronas in Græcia factitatas, a Stephano primo dicunt, ob id & nomen fertis datū, ut Stephani uocarentur. Auctorem & inuentorem coronæ Ianum biforem fuisse græci affirmant. Hybernas corollas non carpas. Dictum est & in Vitice de coronis alijs. Itemq; in Elichryso.

MYRTUS differt a Rusco, quod mitior & quod Græci dicunt *μυρτος*. Ruscus uero cuspidatis folijs, uulneris magis quā pungens, asperior & indomita est. Qualis aut sit Ruscus, cum de Nigram Myrtū ueteres dixerunt, quæ candida comparata nigresceret, & candidam quæ nigre comparata albesceret. Præfertur in omnibus in medicina nigra, teste Columella lib. 11. cap. 38.

De Myrtidano. **CAP. CLVIII.**
MYRTIDANUM dicitur incrementum inæquabile, uerrucosum & concolor. Quod perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Magis quā Myrtus adstringit. Tusum addito austero uino reponitur, coactumq; in pastillos siccatur in umbra, multo efficacius, & folio & semine, carato, pessis, in sessionibus, cataplasmatibus admistum, ubi adstringendum aliquid est.

De Myrtidano. **CAP. CLVIII.**
MYRTIDANUM, a Galeno Myrtada nominatur, uirgultum & soboles Myrti: qualis fortasse in Ficu quoq; fructicat, exiens ab radice, Myrtidanium certe Plinius pro uino accipit, quod ex syluestris Myrti bacis sit conditum, libra in tribus musti congijs deferuefacta, donec duo superflint. Hippocrates Martidanum uidetur appellasse hunc fruticem. Myrtidanū uero ipsum piper, ut post dicemus.

De Cerasijs. **CAP. CLIX.**
CERASIA uentri utilia sunt, si uiridia sumantur. Eadem siccata aluum sistunt. Gummi quod Cerasi resudarunt, cum uino diluto tussi uetustæ medetur, Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex uino potum calculosis auxilio est.

De Cerasijs. **CAP. CLIX.**
CERASUS, in quatuor & uiginti saepe cubita erigit, crassa, dodrantibus quatuor ab radice. Folij Mespili durij, & latius corticis leuore, colore, crassitudine. Similis Tilia, ob id apta cistis, ut Tilia. Hæc meatu flexo, nec giru complente, abducit arbori ab infernis sursum uersus in angustias colligendo sese, qualis in fronde ipsa quoq; descriptio est. In eundem modū, & desquamata folij detrahitis, nec arbor emoritur, quæ si totū deglubas, qui reliquus sit, tunc humor elabit. Tunica porro exteriore adempta, nigricat. Interior pituita quadā muccosa, & uice illius secundo anno tenuior, altera subnascitur. Nerui ligno contorti conuolutiq; in anfractus, ut qui ab imo sunt, alij cōtinue crescunt, ut supni. Prorsus arbor de rāosis nō est, minus etiā aliquāto quā Populus. Radix multijuga, & summa telluris cute nec crassa. Contortio eadē radicis & corticis, radice tegētis, flore albo, piri uel mespili, e racemis fauaceo. Fructus ruber diospyri figura, magnitudine fabæ. Quæ acinus diospyro p̄durus, ceraso mollis, ut Theophrastus inquit: apud quē diospyros, hoc significat, quod lithospermon Dioscoridi & Plinio, ut arbitror. Nec Theodorū satis p̄bo: quod diospyron, Iouis flāmam interpretatus est: cū Iouis triticū interpretari debuisset: quādo & uulgaris quoq; sermo granū solis appellare consueuit. Nascitur Cerasus ubi amnes & tigna, oīnoq; ubi Tilia. Italix Cerasum Lucullus intulit, Nunc trans Oceanū, & in Britanniam quoq; uecta. In Aegypto

nulla cura euasit, ut prouenire posset. Genera nominantur Aproniana, quæ maxime rubeant. Actia nigerrima, rotunda Ceciliania, Iunianis gratus sapor tantum, sub arbore adeo teneris, ut gestatu marcescant. Principatus Duracinis, quæ Campania Pliniana appellat. In Belgica Lusitanis. In ripis etiam Rheni. Tertius istis colos e nigro ac rubenti, uiridique, similisque maturescentibus semper. Sunt & laurea Cerasa in Lauro primū insita, non ingrata amaritudinis. Hinc Amarasia dicitur uulgo, quasi amara Cerasa. Et enim pomum ipsum non cerasum, sed Cerasum uocari, Seruius precipit: cuius & illa quoque uerba sunt. Cerasum inquit, & antequam Ceraso urbe Lucillus adueheret, erat in Italia, sed durum, & cornu appellabatur: quod postea mixto nomine Cornocerasum est uocatum. Sint autem Cornocerasia idem cum Duracinis genus, an uero Seruio credendum, qui Cornu in Italia Cerasum fuisse prodari, cum alia res sit Cornus, alia Cerasus omnino, satis ambigimus. Cerasiorum porro discrimen alterum, quod Romæ Visulum appellant, frequentissimum in Germania, & Gallia. Sed in Scythia fere supra modum, ubi & Viscina Barbari cognominant, ut Pomponius Lætus, qui ea loca modo inuisit, constanter affirmat. Sunt Macedonia, parue arboris, raroque tria cubita excedentis, Chamæcerasi uocata. Pomum hoc, primæ colono fere gratiam uertentis anni refert. Primo candidum, mox rubescit, deinde nigret septemtrione frigidisque gaudens, siccatur sole, conditurque ut Oliua cadis. Medium Cerasis genus, inter acinos atque baccas, sine osse. Quemadmodum nascantur, Græci & Latini monstrare. Fatigatur canicularum aestu Cerasus. Defendit hoc incommodum, ut inquit Palladius, herba Symphoniacæ, trunco arboris eius circumdata: nec qualis herba ea sit, ostendit. Quemadmodum neque Græci Polypremnon appellatam, cuius succo ægrotas arbores oblinere præcipiunt. Nisi quis Apuleio credat, Symphoniacæ tradenti, eadem esse cum Hyoscyamo. Plinius Symphoniacæ herbam describit alternis uiridibus, roseisque per caulem folijs, in posca sanguine reicientibus mederi. Hanc aliqui Crempheon scribunt, aliqui Symphonæ, alij Comphenæ, aut Somphenam. Quod si pro Hyoscyamo sumi posset: non folijs alternis uiridibus, roseisque, sed floribus legendum erit. Quandoquidē Dioscorides ita dicat, *παρά δὲ τὸν καὶ τὸν ἰσχυρὸν περὶ τὴν ἀνθράκωσιν γίνεσθαι*. Accedit, quod ad eruptiones sanguinis Hyoscyamus quoque laudatur.

EX M. VERG. COMM.

Aliter de Cerasijs docet lib. 6. Paulus Aegineta. Sapor enim tribuit, quod hic ex siccitate, contrariisque habitu eorum decernit. Siquidem monet, quod dulcia sunt, citissime dilabi, austera stomacho utiliora esse. Acida uero, ob incidendi uim, habent pituitosis, & excrementosis stomachis. Seruabitur a nobis id posthac multa fide, ut ubi *ὑποδαίων* sit, bonam (chis prodesse. aluum semper, ubi *λίαν*, solutam, ubi *μαλάτην*, mollem, ubi *ἰσχυρὴν*, deiectam, aut soluere, mollireue aut deicere dicamus.

De Siliquis.

CAP. CLX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur. Aluum soluunt. Eadem siccatæ sistunt, stomachoque utiliores fiunt. Vrinam ciunt, sed precipue quæ uinaceis condiuntur.

BARBARI COROLL.

Siliqua arborem Ficū Aegyptiā uocari, & in Ionia Ceroniā, Theophrastus auctor est, quæ & Ceratia dicat. Galenus arborem Ceratoniā, fructum Cratia nominari scribit, a corniculi similitudine. Lucius Columella, Siliqua græcā, credo, ut a fœno græco distingueret, quod absolute siliqua rusticis cognominant. Recentiores Græci Xylocerata. Sed alia est Ficus Aegyptia omnino, ut Plinius notauit, & nos paulopost monstrabimus. Quandoquidē in Aegypto nulla nascitur. Sed in Syria, Ioniaque, & circa Gnidum, atque Rhodum, folijs semper comatibus, flore candido, cum uehementia odoris: pomum siliquæ, & ob id nomen: radice sublimi, sed non multum, plantigeræ, imis partibus, superficie flauescens inarescensque, succum auferente sobole. Pomo antecessoris anni detracto, post canis ortum, statim concipit, uterique præfert, & mollem quandam uix modo informem indiscretamque primo edit: quæ postquam adoleuit, per arcturum & æquinoctium florem emittit, Hyeme factus enutrient, qui usque ad canis ortum in parente durat, ut prædicimus. Tum metitur. Non puto quenquam nescire, Siliquas prædulces esse, earumque manducae corticem, digitorum hominis longitudine, interim falcata pollicari latitudine. Seritur & hæc apud nos semine, sed parum feliciter. Quandoquidē nec fructum fert, & breui emoritur. Galenus usum eius cibo dānam, ut mali succi, & lignosi, nec facile conficiendi. Posteritas commendat ad stomachum fulciendum, utique post cornu, & ad uentris profluuium, si quis præsumpserit. Subter hanc arborem flammæ-

A

B

uigat

Plin. 15. capit.
29. 23. 11. 17. ca.
8. lib. 23. ca. 5.

Gellius lib. 9.
cap. 15.

Cnis Dialis capillū, & unguis p̄fectos terra operiri mos & religio erat, ut est apud Gellū. Quāq̄ non Siliqua, sed filica mendose in eo legit. Nisi quis non siliquā, aut ilicem, aut salicem putet legendum. Ego ut ingenua ueritatis homo, quid sequendū in eo potissimū sit, non diffitebor ne scire. In mediū, ut pleraq̄ alia relinquo. Est & nomen herbæ Plinio Ceratīa, uno folio, radice nodosa & magna, coeliacis & dysentericis in cibo danti. Idem auctor confūgit huic Peraticā septem ei caules reddendo, qui uelut rosæ capita sustineant. Quāq̄ in codicibus quibusdam non Peratica, sed Statica scriptum legas, quoniā listat aluum.

E X M. V E R G. C O M M.

EAdem Græcis & Latinis in hac arbore fructuq̄ eius ratio nominis est. Illi κεράτιον, quæ uoce in frugibus & leguminibus aliquot longiores Siliquas dicunt, factō a cornu nomine appellauerunt. Latini cōmuni, & alijs Siliquis appellatione indicauerunt, & ut ab alijs distingueretur, aliquid quod rem ad proprium genus contraheret, adiecerunt, nunc dulcem, nunc grā Siliquā appellantes. Nota satis arbor, notus & fructus, felici descriptione a Plinio lib. 15. indicatus. Quorū arborem, paulo a Ceratīs deflexa uoce, Paulus ægineta Ceratoniā uocat. Græci ei aliquot iudem factō ex lignosa soliditate cornuq̄ longitudine, & flexura nomine, Xylocera rata appellauerunt. Damnauit in cibo Siliquæ huius usum Galenus.

Carere quoq̄ intellectu nobis uidetur quod dicit, μάλα δὲ τὰ ἐν τῶν σιμύλλων συντιθίμην. quæ sic uerbum de uerbo uertat aliquis. Maximeq̄ ea quæ ex uinaceis componuntur. Nulla eum superioribus serie & rei sensu. Quid enim Siliquis his cum uinaceis? Corruptus nobis omino locus uidetur. Suspiciamurq̄, ex quo σιμύλλων duplici λ legitur, contra q̄ id in uinaceis scribatur id nomen, potuisse aliquid de folijs arboris eo loco decerni. Quod uetustissimus, qui apud nos est, Longabardus, literis scriptus latinis Dioscorides indicat, in quo legitur, maxime quæ ex folijs componūtur. Aut si uinaceorū illis futurū nomen est, de conditura aliqua Siliquarū, quæ uuarū modo in uinaceis seruarentur. Sed obstat huic sententiæ præpositio ἡ. Non enim ex uinaceis, sed in uinaceis seruantur, quemadmodū priori illi σιμύλλων uox.

Potuit forte etiā Dioscorides, corticem huius σιμύλλον dicere, quemadmodū in uuis Græci appellant, docereq̄ urinam præcipue ciere, quæ ex Siliquarū huiusmodi corticibus confecta essent, confectionis genus aliquod indicans ea ætate notum, sed nobis incognitum.

D

αὐλῶν

De Malo.

CAP. CLXI.

Folia, flores, & germina cum omnis Mali, tum maxime Cotonæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest. Maturis uero longe secus. Ex ijs uerna bilem gignunt. Neros lædunt. Inflationes pariunt.

Pli. li. 15. ca. 14.
li. 12. ca. 3. lib.
16. cap. 27.

BARBARI COROLL.

Malus corticis leuore niter. Peculiares habet nodos, belluata facie, ut Theophrastus scribit, sed prægrandi uno, alijs circa eum pusillis compluribus. Fructificat primis frigoribus. Varena intelliguntur mala, quæ adulto uere maturefcunt. Inter Mala tuberes correpta priore syllaba dicuntur, baccis similiores q̄ Malis. Post Armeniaca, & omnino inter primas florent arbores. Inferi solent Cydonio, piro, pruno, & calabrici, & malis omnibus, ut inquit Palladius, quamq̄ Plinius syluestrem spinam, calabricem uocari dixit. Genera duo Tuberum, candidum, & a colore, Sericum uocatū. Papinius Tuberes, & Zizipha, hæc ex Africa, illa & Syria nouissimis Augusti temporibus inuexit, in castris fata, & aggeribus præcipue decora. Græci quemadmodū ipsas Tuberes appellant, haud possum conñcere. Nisi quis Syrica, siue, ut in quibusdā exemplaribus habetur, Serica eas uocare putet, parui fucci poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia, ut inquit Paulus, Oribasius, Aetius. Præferuntur e Ziziphis Aedestina uocata, ut quidam putauere, q̄ grandissima, calore, ac humore tēperata, medicis monstrantibus. Columella duplex Ziziphi genus habet, rutilū, & candidū. Inuenio apud Græcos, qui Dinzipha pro Ziziphis appellitent. Pene uero Tubera peregrina sunt in uno Italiæ agro Vero nensi nascentia, quæ peculiari noīe lanata Plinius apparī dicit, obducta lanugine, ut Struthis & Persicis fere plurimis, nulla tamen alia cōmendatione insignia, ab inuentoribus nuncupantur. Matiana ex uico Aquileiensi sub ipsas Alpes, quibus similitudine respondeant Gangeris Paphlagonæ urbe nascentia, nunc Hispaniæ uernaculo uocabulo Matiana in commune sunt mala oīa. Sunt & a Manlio Manliana. Claudianis color rubens, Appianis odor & magnitudo.

do cotoneorū, insito cotoneo. Sceptiana rotunditate insignia. Caro addijcit Quiriana, & Con-
 ditua, quæ dolij condantur. Et Scantiana, Scandianaq. In nomine sunt & Gestiana, siue Se-
 xana, siue, ut Græci scribunt, Castiana: quoniam & Cestomela uocantur ab Actio. Quan-
 tū ridicule a cesto, id est, loro dicta quidam interpretes existimant, cui similia sunt cortice.
 Hæc ipsa & Pezomela uulgo dicunt, & austera prædicant. Austera e dulci sunt Aphratomela:
 odorata hæc, & pulpam habent asperam, & squalentem, ut cidonia. Sunt & parua quædā, sa-
 poris gratissimi Peulia. Habetur & Pelusiana, & Proliua, & Veriana, siue Tiburneriana & Si-
 rutia. Sunt & Phaulia, & quæ Delphica Græci uocant, & Platania, & Mordiana orbiculatis si-
 milia, ex Apolloniæ agro, qui Mordius cognominabatur, & Camerina, siue ut Columella uo-
 luit, Amerina, & Græcula. Itē Gemella, nunq̃ in sortu singula. Sicut Belgemela, siue Melgeme-
 la, q̃ folium unū aliquādo geminū erumpit latere medio. A colore Serica, ut nesciā Tuberum
 hæc generis, an diuersi putē. Agentilitate Melappia, a celeritate mitescendi Mustea: de quibus
 in Melimelis loco suo dicitur. A mamarum effigie Orthomastica. A conditione castrati semi-
 nis, Spadonia. A corrugationis celeritate Panucea. Ab importuno & stolido tumore, Pulmo-
 nea. Sunt quibus color sanguineus, origine ex mori insitu tracta. Sunt & parua grati saporis,
 atq; etiā acutiora, odore syluestria peculiari, acerbiora, improbitatisq; cōiutio, de quibus proxi-
 me differemus. Itē Dacia, ferme uillissima, Quanq̃ aduētū prima: decerpitq; properantia. Græci
 Corinthiaca, e Sidunte uico celebrat. Nominatur & Laconica, & Herina, a uere dicta, sicut a la-
 nugine Chnodia, Lanatis supra dictis fortasse nō plane dissimilia. Seruant poma tabulatis, lo-
 co frigido, septentrionalibus fenestris, quæ sereno die lucē accipiāt patētes. Austri specularibus
 arcendi, Aquilonis afflatu marcescunt in rugas. Colligunt post æquinoctiū autumnī, nec ante
 sextamdecimā lunam, neq; ante primā lunam. Cadiua separanda. Minimū Melimela durant.
 Plurimū Camerina: quæ ut Scantiana quoq; serotina sunt, & gelu maturescunt, ad hyemē usq;
 pendētia in parente. Vini Malo, pprietas æque ut Piro. Malū a Græcis Melon, arbor Melea di-
 citur. At Pomī nomen generalius est, ut complectat quicqd apud Græcos Opora continet, in
 quo significatu est, cum dicitur a medicis, omne Pomū refrigerandi & humificandi uim habe-
 re, parū alere, malī succi esse, autumnio plus officere. Inde Oporotheca, ubi custodiunt. Pomū
 Varro dictū autumat, quia potu siccitatibus indigeat. Differt tamen Opora ab ijs, quæ Acro-
 drya Græci uocāt. Qz Opora est, quicquid nihil habet exterius lignosum, Acrodrya uero ton-
 tra, ut malū puniū, pistacia, castanæ, nuces, similiaq. Vtrūq; genus Salgami nomine cōple-
 ctunt Latini: a quo Salgamanus. Dubitatū est, & in iure apud Celsiū, an nux pinea pomū es-
 set, quia Nuces essent quicqd foris duro tegitur, Malū quicquid id quod elus est foris habet,
 Pomo utrunq; contineretur: quod fere probamus. Seruio Nuces sunt omnia corio duriore te-
 sta, molliore uero Poma. Feruntur & alia Mali genera, suis mentionibus prodenda. Galenus
 omnia inquit Mala breui fugiunt, atq; acescunt, utpote frigida, & excrementitio succo redun-
 dantia: ideoq; nisi melle condita seruando, seruari non possunt. Excipiuntur Cotonea inquit,
 & Struthea. Malorum enim appellatione ueniunt & Cotonea, & Granata, & Persica, & Puri
 genus, unum Librale nuncupatū, ab amplitudine ac pondere.

De Cotoneo malo.

CAP. CLXII.

Cotonea stomacho utilia. Urinam cient. Verum tosta accommo-
 datiora habetur. Profsunt coeliacis, dysentericis, purulenta extus-
 sionibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor, commodē in
 stomachi, aut uentris fluctuationibus potui datur. Succus crudorum assum-
 ptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur uulua, & sedes si pro-
 cidant. Cotonea quæ melle condiuntur, urinam mouent. Mel autem si
 bi constringentem illam uim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle
 coquantur, stomacho atq; ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Crū-
 da cataplasmatibus adijciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus
 aestuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes,
 præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis tuis, expressisq;
 Sed quo perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur.

C alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod Melinum uocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, rotunda, parua, & odorata. Quæ uero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & siccus cataplasmatibus imponitur, ijs conueniens quæ adstrictionem desiderant. Inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis, contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur.

Pli. li. 15. ca. 11.
27. li. 23. cap. 6.

C Otoneis, ut primus Carus nominauit, amplitudo Pinearum nucum. Interim maioribus incuruatos trahunt ramos, prohibentque parentem crescere. Cydonea Græci appellant, quoniam ex Creta primum illata fuerint. Genera eorum, Chrysomela, hoc est, aurea mala, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Nostratia candidiora, odoris præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere minora, odore uibrantia, prouentu ferotino, quæ Struthia nuncupentur, sicut quæ celeriter mitescunt & præcocia sunt Mustea. Actius Struthia inquit dicuntur, quæ magna sunt, & suauiora, minusque acerbæ. Cotoneo Struthis insito, muluiana cognominantur, quæ sola ex ijs, uel cruda uescendo sunt. Habentur & syluestria parua, e Struthis odoratissima, in sepibus nata: Omniaque iam & uirorum salutarioris cubilibus inclusa, simulachrisque noctium consocijs imposita, ut Plinius queritur, insigni taxatione sæculi muliebriter mollis. Cotoneum, & Codymalon, siue Cydomalon uocari quidam scripserunt: uerum Polemon, floris genus esse id existimat. Cotonei genus præter hæc inuenio, Phaulion uocatum. Quo nomine, Mali quoque genus unum dici meminimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Q uod in græcis dicitur, *ἰμνὸν*, quæ uox purulentas excreationes significat, in antiquioribus & melioribus græcis, non *ἰμνὸν*, uerum *ἰμνὸν*, id est, sanguinem expunctiones antecedit, si Hippocrati credimus. Ideoque nos malum dicere, sanguinem expundum, auctore, & confirmante id Plinio lib. 23. cap. 7. de Coroneis malis, cuius uerba sunt, Matura inquit, profunt sanguinem excreantibus, &c.

Non uideo, cur relicta hic uoce græca Barbarus uerterit, aetlima, quasi ex hoc nomine priuatim aliquod genus indicaret. Nullibi enim inuentum id a nobis est, nec ipse inuenisse se testatur. Nos uera reddidimus. Nec aliud inter Coronea uera, & Struthia discrimen hic esse ostendit, quam ex forma, magnitudine, & odore.

De Malis dulcibus. CAP. CLXIII.

M elimela uentrem molliunt, & animalia expellunt. Stomacho negocium exhibent. Aestuosæ. Ea a multis, dulcia mala uocantur.

B A R B A R I C O R O L L.

M elimela dicitur a sapore melleo. Eadem & a celeritate mitescendi, Mustea, ut inquit Varro, uocabantur. Minime durat hæc, ut inter Mala diximus. Mustea sane ueteres appellabant id quod nos præcocia. Vnde Coronea quoque certo genere Mustea dici solita reddidimus. Item Pira, quod recens est, Mustum, & Musteum dici solet. Athenis Melimella nominabatur, malo in syluestrem Pirum, Cydoniumue insito, ut scribit Diophanes.

E X M. V E R G. C O M M.

ἰμνὸν interuallum, uidetur non carere mendo, tamen & nos quoque reddiderimus, uentris animalia pellit. Dulcia enim hæc mala sunt, mellisque sapore, a quo nomen inuenerunt, non uidentur posse uentris animalia facile pellere: nisi forte deiectam hoc cibo aluum, ea etiam sequuntur, & quæ alioquin hæssissent, impetu excrementorum, quasi in torrente pisces, qui largiore per aestatē imbre abundauerit rapiuntur, aut propria naturæ suæ potestate, qualia multa passim uident, id ea mala possint. Habet quidem parum certam, non tamē absurdā id rationem.

De Orbiculatis Malis. CAP. CLXIII.

E pirotica mala, quæ latine Orbiculata dicuntur, stomacho utilia. Si sunt aluum. Urinas euocant. Malis tamen Cotoneis inualidiora.

Epirotica, ex

BARBARI COROLL.
Epirotica, ex Epiro inuecta primum. Argumento est cognomen. Orbiculata nostri appellant, ex figura orbis in totunditatem circumacti.

EX M. VERG. COMM.
Facile nobis indicatur, posse hæc mala esse quæ rura nostra a colore rosea appellant, Mala rotunda & orbiculata, quæ toto anno feruari possunt.

De Syluestribus Malis. CAP. CLXV.
Syluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt. Sane in hunc uernum immatura opus sunt.

BARBARI COROLL.
Syluestria, odore acutiora, sed improba & acerba: ob id & conuitio dicata. Iis tanta uis, ut aciem gladiorum perstringant. Aliud genus sunt, quæ Poma syluestria dicuntur, a rei rusticæ scriptoribus, ut albæ spinæ, græcæ filiquæ, iuniperus, lotos, pampinus, cornus, arbutus, prunus, & paliurus, atq; sacchades piri. Quid porro sit in Columella (sunt enim hæc Columellæ uerba) Papius, & an corrupta fide lectio, pro eo quod est Carpinus, aut Pinus, relinquo discutendum peritis.

EX M. VERG. COMM.
Syluestria sunt, quæ Theocritus in Bucolicis suis ὀρειμαχίδας, idest, montana appellat. In quibus illud animaduertendum, nō de his tantum præcipere Dioscoridæ, ad adstringendum imaturis opus esse, quod ex Plinio Barbarus uertit, sed in uniuersum omnibus acerbis in adstringendo uti oportere.

Verba eius hæc sunt. *ἂν δὲ πρὸς τὰ σύμψαχρα ἀπορίτοις ἀπαιεῖ χρῆσθαι*. Id est, Oportet autem ad ea quæ ad adstringenda sunt, interpestiuiis, idest, immaturis omnibus uti. Omnibus id tribuitur, non priuatim syluestribus.

De Persicis Malis. CAP. CLXVI.
Persica poma matura, tam stomacho, quæ uentri utilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius. Decoctum e siccis, alui stomachique fluctiones sistit.

BARBARI COROLL.
Persica, ex Perside aduecta, ut ipso nomine apparet, Theophrasti temporibus in Aegypto tantum, & uicinis locis ferebat. In Rhodo ad florem usque perueniens: quod primum ab Aegypto uenienti hospitium fuit. Inde Rhodacina fortasse uernaculo græcorum sermone dicta. Nisi quis inuersum nomen putet, quasi Doracina. sic enim Persica ipsa nominantur a græcis recentioribus, Paulo, & Aetio, quasi Duracina: de quibus post agetur. Notant autores, nusquam minus odoris pomis, plus succi, qui tamen sitim stimulet. Falsum est, uenenata cum cruciatu in Perside nasci, & poenarum causa a Regibus translata in Aegyptum, ubi coelo, proprietatem mutauerint. Id enim de Persea diligentiores tradunt. quam nos in suum locum differimus. Persicorum palma Duracinis. Nationum habent nomen Gallica, & Asiatica. Post Autumni maturescunt, sicut æstate Præcocia: quæ Plinius intra .10. annos inuenta prodente se testatur, & primo denarijs singula uenundata. Supernatia e Sabinis sunt. Popularia ubique. Pomum innocuum uel ægris. Precium singulis triceniquondā fuere nūmi, nullius maiore quod miremur: quia non aliud fugacius. longissima namque decempro bidui mora est, cogitque se uenundari. Persica in prouentum alium Autumno condiuntur, ut uuae cadis. Molluscum nucem sunt qui Persicum interpretati falso fuerint, ut in Iuglande comonebimus. Persica sine suis ossibus, & inscripta quem admodum nascantur, docebit Palladius. Idem tria genera enumerat, Armenia, Duracina, Persica. Sicut hæc Armenia, quæ Prunorum generis esse quidam uolunt, an diuersa, studiosi salgarum diiudicent: mihi eadem uideri placet.

EX M. VERG. COMM.
Notum Persicorum genus omne & forma, nondum tamen in antiquioribus satis patet, an huius pomi arbor ea sit, quæ paulo post hic, pluresque alij Persea dicunt, in Aethiopia letalæ, in Aegypto autem salubres, de qua in Hortulo nouissimos uersus cecinit Columella, an quæ malus Persica ubique nunc nascitur. Sed eandem esse Persicam malum, & Persea, ex Nicandri commentatore probabimus. Eius uerba sunt eo loci quo de Phalangis ait. Sciendum est, Socrate in Commentario de

A

αγρίοι μάλια

περσικά

B

Pli. lib. 15. ca. 9
lib. 23. cap. 7.

m

C reptilibus & serpentibus, testari Perseam, quam Rhodacineam dicunt. Hac uoce autem greci Persica nunc etiam appellant. Ex Aegypto in Aethiopia translata fuisse testat, et Rhodus Democritus in commentario de his quae ἀντιπαθῶν, & συμπαθῶν dicuntur, Persas ait lactealem arborem habentes, in Aegyptum misisse, credentes perituros ab ea multos. Sed utilem contrario euentu illis profuisse, protulisseque suauissima poma, qualia nunc uidentur. Et haec interpret eo loco.

Ex quibus manifeste patet, quam alij *περσίων* arborem dicunt poetice, a Nicandro, interpretque eius *περσίων* uocari. Quod a Barbaro relictum, addere placuit. In hanc enim partem inclinat animus. Et si Plinius id negauerit, & aliorum multorum autoritas obstat.

De Præcocius.

CAP. CLXVII.

ἐρμηνεύει

A Armeniaca, quae a latinis Præcokia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

BARBARI COROLL.

A Armeniaca, siue Armenia, Prunorum generis sunt, peregrina & ipsa, ut ex nomine cognoscitur. Sola e Prunis odore commendatur. Armeniaca uocari desita, & Præcokia, siue præcoccia, sed Berioccia fere pronunciant.

μυθολογία

De Medico Malo, seu Citreo. CAP. CLXVIII.

M Edica mala, aut Cedromela, quae latini Citrea uocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet Pyri. Id in uino potum uenenis resistit. Aluum mouet. Oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus. Vestitijs impositum, ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

D
ἀντιπαθῶν

BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 1.
Theoph. li. 4.
Athen. 1. di-
pno sophistæ.

M Alus medica, flores duobus modis procreat. Alios qui uelut erectam in medio colli habeant, fecundiores existimati. Alios qui careant ea, infecundos. Sunt qui & Assyria, & Persicam malum uocent. Item Citrum, Citream. Greci & Hesperida, & malum eius Hespericum, autore Iuba, qui ab Hercule translatum id in Graeciam, & aureum malum uocatum scripsit. ut Virgilius de his intellexisse uideatur, cum dixit, Aurea mala decem Nuptiale pomum intelligi hoc uolunt, qui ædium a tellure fabulantur, nunciato Iouis & Iunonis conubio. Foliis ei Adrachnes, Vnedonisque, spinis intercurrentibus, ut in pyro & oxyacantha, sed quibus infestis mucrone, ualidis. Non mandebat pomum Theophrasti ætate, sed ne Plinij quoque (ut arbitror) magnopere, tamen odore commendato. Plutarchi certe auorum memoria, gustabat nemo, ut Athenæus inquit. Nunc a Palladij fere temporibus promiscuum, expetimus cœnis. qui & medullas eius acres, dulcibus mutare docuit. Quamquam Apuleius negauit eandem esse malum assyriam, siue medicam, quae Citrus: quod Citrus exiguum esset genus arboris, Medica uero, ut Maro scribit, ingens. Pamphylus Citrum, Critum a Romanis eam dici, parum peritus homo scripsit. Vt cumque arbor hæc scribitur, uere partibus cultissimis semine quarto die aut quinto rigatur. Maiuscula transferretur etiam uere in solum molle, uelut quæ, nec admodum gracile. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est, alijs ruentibus, alijs subnascentibus, alijs maturescantibus. Serit & scitilibus, dato radicum eius solum id quod in colo quadam e medio prorumpit, fecundum existimatur a Theophrasto. Sed hæc olim fuisse. Nunc traslatitia & triualis fere arbor, ut pluribus generibus Citrea Ligurie, Campanie, Beneaculo, Italia fere tota germinant feliciter, quamcumque libeat imaginem reddentia. Hæc ex insitione Mali quoties proueniunt, Citromela proprie dicuntur ab aliquibus. Quamquam uero Medica malus dicatur, ipsum tamen pomum Galenus malum medicum uocari negat, sed Citrinum dumtaxat. Theophrastus etiam malum Medicum & Persicum est ubi appelleret, cum huius fere unius mali semen imperpicuum esse dixit, secundo uolumine de stirpibus, ut Athenæus interpretatur. Diphylus autor est, Citria, quandoque Pruna persica uocari solita. Aristophanes grammaticus, a Lacædemonijs Oxymala persica nuncupari pro-

didit, quibus & Deos coronent. Menses illas ueteribus & Plinio decantatas, præsertimq; Ciceronianam, non ex hac fuisse Citro, sed ex alio citri genere conijcio, pluribus argumentis: sed illo potissimum, qd arbores ex quibus fierent, Cupresso femine syluestri similes folio, odore, cau dice, a Plinio produntur, Anchorano monte, citerioris Mauritanie, sed iam tum exhaustio, Ite Atlante, cuius imas radices densis altisq; repletas syluis, incognito genere arborum Suetoni- us Paulinus, a Plinio citatus, asserit spectabili proceritate, enodi nitore, frondibus Cupressi, p- terq; grauitate odoris, has tenui lanugine obduci, quibus addita arte possint quales bombice uestes confici. Idem autor paulo superius, efficacissima inquit luxurie uis sentitur, cum Ebori Cedroq; syluæ exquirantur. Preterea quis potest negare, arborē ex qua tam celebres menses cō- stent, Trogetem, & Thyian, & Thyon a Theophrasto & Strabone dictam esse? Idq; Plinius ex- ploratissimum nobis fecit: de Thya uero Theophrastus, Perpetuo, inquit, utret, arbor proce- ra, inter syluestres serotina, ut nulla fere tardius germinet, argentissimis locis, & cacuminibus montium gaudens, circa Hammonis delubrum præcipua nascens, & in inferiore Cyrenaicæ par- te, atq; ubi ipsa tunc esset, ramis, caudice, frondibus, syluestri Cupresso similis, ex ea ueterum temporum contignationes fuisse, immortali post Cupressum in tecta materie. Nihil radice cris- pius, nec aliunde preciosiora fuisse, immortali post Cupressum in tecta materie. Nihil radice cris- pium, nec ullo modo uehementius. Homero quoq; notam fuisse, inter odores uri solita a Cir- ce, magno errore eorum, qui odoramenta in eo uocabulo accipiunt. Cum præsertim eodē uer- su, Cedrum & Laricem nominet, ut manifestum sit de arboribus tantum loquutum. Nam & Calypsus, & Helene thalamos, & Thya cōditos, idē poeta cecinit. Quid habet Citrus nostras cōmune cum Cupresso, frondis Cupresso, Iuniperi sabine, Cedri, Citro, Lauri, Adrachnes, Arbuti? Quid tam diuersum, qd Galbulus, & Citreum? Omitto alias notas. Quibus perspicuo liquere potest uolentibus, decipi grammaticos, quicunq; menses citreas ex hac citro, quæ nunc habetur, factitatas arbitrantur. Dion certe historicus, Neronis uita, non citreas, sed cedrinas menses appellauit, siue cedro potius qd citro similes esse uiderentur arbores, siue qd in exempla ri uicium est. Erit ergo Thya, siue quod idem est, Trogetes, et Citrus duorum omnino generū, ut constat. Vnum Cedri eius, ex qua menses dolabantur. Alterum Citri eius, ex qua malum medicum, Plinius, alia inquit est arbor eodem nomine malum ferens execratum, aliquibus o- dore & amaritudine, alijs expetitur, domos etiam decorans. Quod & sensisse Macrobius ui- detur. Hodieq; Mauritanii malum medicam, & pomum eius Atrogi uocant, a Trogete uoca- bulo parum deflexo. Alioquin Trogetem, non quia mandiposset, sed cataniphrasin, qd man- di non possit, appellatam censuerim: quandoquidem, ut dixi, ueteribus esculentū non erat. In summa, non nego Malum quoq; Medicam in Mauritania fuisse, cum plena sint Poetarum omnia fere uolumina, sed ex qua mense ille celebres existerent, malum medicam fuisse, hoc ne- go, & pernego, Nec dissimulandum tamen est, Phaniam Eressū quinto uolumine de plātis ce- drum appellasse, ac malum cedrium, pro eo quod nos citrū & citrium uocamus, & Dioscori- dem secuti Cedromelon, Varro quoq; libycam Citrum nominat.

EX M. VERG. COMM.

De Medicis, quæ Persica etiam hic uocari ait, quoniam nostro orbi, & Græcia diu peregrinæ fuerint, & ex Perside in nostrum orbem transferint, illud primum testabimur, in appellatio- nibus eorum, non Cedromela forte, sed Citromala, quasi Citria mala legendam esse uocem. Nihil enim Citro cum Cedro, & a Romanis Citria hæc uocari iam pridem receptum est. Nih- il tamen mutamus, in cunctis enim græcis pariter legitur.

Quæ autem in Barbari Corollario longius narrantur, omnia ex quarto Theophrasti uolu- mine, & Athenæi dipernosophistæ excerpta sunt. Qui etiam quod uno aduerbio ab hoc uo- cabulo dictum est, pluribus conuertit. Nobis una superfætationis uoce indicare id placuit.

Sequitur deinde quod anceps in hoc scriptore sit, quo loco statim a descriptione seminis le- git, διὐναμι δὲ ἔχει ποδὲν ἐν ὕψος ἀντιπροσέτι δακτύλῳ, tribuendū ne id sit semini, an pomō, utriq; em neutri generis. Sed qd ad pomū ptinet lōgius in sermonis textura abest; qd uero ad semen, ppius, et quasi cōtiguū. Plinius et semini, et pomō id tribuit, uerba eius hæc sūt. Citria cōtra ue- nena in uino bibunt, uel ipsa, uel semē. Ceteri, inē quos Theoph. pomō eā uim tm assignarūt.

P De Pyro. CAP. CLXIX.
Pyrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt. Addun- tur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum e siccis,

A

Theo. li. 4. &
s. cap. 5.

*

B

Macrobius li
bro. 3. cap. 19.

C & cruda ipsa aluum sistunt. Ieiunos esitata ledunt.

Pli. li. 17. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Pirum, græci edomitam, siue urbanam Apion & Adipion appellant, de quorū prouentu, Peloponnesus quocq; ipsa quandoq; dicebatur Apia. Licet quidā ab Apia Phoronei filia, terram eam ita nominatam putent. Poetæ sunt, qui Pirum Ochnen uocent, syluestrem Achrada, ut mox dicemus. Apios & Rhaphani genus est. Turbinata Pirus omnibus figura, multis generibus. Alia parua ocyslimaq; & odoratissima, nominant Superba: in his ci usumina, quæ gratissima, & ex parte rubent. Et proxima his Talerna, ceu largo succo habundantia: hæc Lactea uocantur. In hisq; alia colore nigro donant Syriæ. Post hæc Decumiana, & ex his tracta origine Pseudodecumiana. Dolobelliana longitudine pedali. Pomponiana, cognomine mañosa. Liceriana seueriana, & quæ ex his nata sunt, Tyraniāna petioli longitudine distantia. Fauoniana rubra, paulo Supbis maiora. Lateriana, siue laterisiana, ut Columella uocāt et Macrobius. Arianā. Colorantur hæc magis sole, grandescuntq;: alioquin eadem essent quæ Liceriana. Accedunt his Neuiāna, Turaniānaq;. Atq; hæc auctorum suorum nomen habent, præter Supbia, & Phalerna. Patrias nobilitauere quæ sequuntur. Serissima omnium Amerina, Piacetina, Numanina, Alexandrina, Numidianā, Græcula, & his Tarentina. Signina, quæ alij a colore Testacea Laureā. Ordearia, siue ordeacea, a comitatu frugis eius. Acolo Anpullacea & Coroliana, & brute gentilitatis Cucurbitiana. Acidula a succo, a melle Mulsā. Incertā omnium ratio. Barbaricis & Venerijs, quæ colorata nuncupant. Itē Regijs, quæ minimo pediculo quasi sessilia sunt. Itā patricijs uocantq; uiridibus & oblongis. Dixit & Volema Virgilius a Catone supra. Volemiū, uocat Macrobius, qui & ceritium, & ceruissū, & calculosū, & lollianum, & Lauiniū, & Milesiū & Myrteum, & Orbiculanū, & Precianū, & Rubile, Tulianū, Ticiantūq; itē Mespilaceum, et Valerianū indicauit. Cloatiū secutus. Idē Cato & Semetina, & Mustea quocq; nominat. Ampullacea, græca, Laureā, ad hyemē usq; in parente pēdent. Serotina, et gelu maturescētia. Nam quæ Aristoteles Apē, Bloadas nomināt, in his generis intelligunt. Vini proprietates & Piro. Cōdunt hæc totidē qbus uua modis, non aliē, q; in cados. Vino & aqua coquant in escā agris, daturq; pulmetarij uice, quod nō alia præterq; Corōnea. In conuiuijs græcorū Pira sectis mensis inferebant aqua mersa, ut mitissima, quæq; legi possent. Pira sunt & quæ Libralia uocantur. Sed sola tamen e Pirus Mala dici consueuerunt. Liquamen de Pirus fieri solitum, ad ieiunia fœminarum. Inuenio quod Cassimoniale dicebatur. Liquamen de Pirus fieri solitum, ad ieiunibus integro sale calcatis & resolutis, atq; ita fistilibus picatis cuppis ue conditis.

Macrobius li. 3. cap. 19.

D

VERG.

Pirorum infinita pene genera, quæ ab antiquioribus rei Rusticæ scriptoribus tradita sunt. Quod solū desyderari in hoc capite poterat, longissime in Corollario suo Barbarus profectus est: nos ideo nihil ultra de his agemus.

xypho

De Pyrastro. CAP. CLXX.

Achras Pyrastri genus est, quod tardissime maturescit. Vim Pyro adstringentiorem habet. Et ad eadem conuenit. Stringūt etiā eius folia. Ligni Pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strāgulāt. Aiūt fungos si syluestria Pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

B A R B A R I C O R O L L.

Achudō Pirum syluaticam, hoc est, Achrada, & apud quosdā, ut apud nos, et Pirastrū, feriliorem urbana predicant, Hyeme fructificat fere, Autumno tñ genus eius unū, ut Theophrastus inquit, materia ei apprimē dura. Ideoque discos, tabellāsque futorias, e Piro syluestri faciunt. qm ut in molli retundit, ita in duro ferrū acuitur. Aculeatos hæc habet ramos, ut Punica, non comperi. Nisi quis nō Achyradas, sed Achradas, hoc est, Pira syluestria in eo legat. Nam dem Arcades, Indi Arundinem, Carmani palmulas, Miliū Sarmate, Terebinthum nasturtiūq; Perse. Achyra certe paleam significat; nec uideo, q; sit uerisimile paleis quemq; uelci porre glandis fagine usum a Pelago traditum; uicissatē creditur.

Vitus antiq; frugaliss.

De Mespilis. CAP. CLXXI.

Mespilus, quæ a nonnullis Aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutæ spinæ. Fert pomum suaue, exiguum, tribus intus ossiculis. Quæ ex causa id nonnulli Tricoccon appellauere. Tarde maturefcit. Esu adstringit. Stomacho gratum est. Aluumq; supprimit.

BARBARI COROLL.

Mespilorum tria genera, Setanium, Anthobon & Antehoboides, quam et Gallicā intelligunt. Setanio fructus grandior, candidior, solutior, Acini molliore ligno, reliquis minor, sed pstantior odore, & alstringitior gustu. Quo fit, ut diutius q; durēt. Lignū his flāmius, & spissius. Flores oibus Amygdalæ, nō tñ rubētes, sed pmodū herbacei. Arbor int̄ amplissimas, comosa in girū, folio scisso, extremitateq; Apio simili, sed maiorib; diuisuris, pmissio, rigētī, neruoso, tenuiore & longiore q; Apiū, lōgo & gracili pediculo. Radice alta, numerosaq; lōgeua ē arbor, a terrāq; inextricabilis. Lignū densū, incorruptū, solidū. Semine et auulsioe serit. Foliū anteq; decidat, uehement̄ adrubescit. Infestat et hęc uermibus in senecta, q; pgrādes ei dūuerfi q; ceteris cōtingūt. Nō fuit hęc arbor in Italia Carōis æuo. Hęc Theoph. & Plin. Verū alia hęc Mespili distinctio ē, q; a Dioscoride rep̄setata ē. Et sane dubitari solet, an Mespilū ueteres cū Sorbi arbore cōfuderint. Quādoq; dē altissimis cōnumerat, q; certe Sorbo q; Mespilo nūc uocatē, magis cōueniūt. Nisi q; nostratū Mespilū, nō tā Mespilū, q; Chatemespilū appellandā fortasse cēseat, quæ nascitur, ut inq; Dioscorides, Italiq; uocata Epimelis, de qua sequenti capite differitur. Certe Iulius Pollux, Mespila inquit, & Sorba quoque appellantur.

Quam genere neutro Mespilū arborem fecit, Theophrast. lib. 3. foeminino gñe descripsit. Longius idem de tota hac arbore pomūq; eius eodem loco egit, quæ omnia a Barbaro in Corollarium suum translata a nobis relinquuntur.

Illud tñ notādū, ubi de semine huius pomi agit, nō dicere Theophrastū claudere in se hoc pomū acinos molliore ligno, ut Barbarus uertit, sed πυρνας μαλακώτερας, quod est, nucleos habere molliores. Toto enim genere differunt inter se acini, & nucleī. Et si in antiquioribus idem utriusq; fuerit nomen, ut in Punica non multo ante dictum est.

Sciendū & illud, quam primū hic describit Mespili arborem peregrinam & incognitam Italiæ nobis uideri, & sui generis arbore spinosā, & ut hic ait, Trigraniam, quæ nostrates Mespili non habent, quinq; intus nucleis fartē, & nullis spinis armatē. Nostratem uero Epimelidem ideo, ut nos credimus, a græcis dici, quod felicissime in Malo inseritur, & quasi ἐπὶ τῷ μάλῳ, id est, in malo adoptata creuerit, foeminino genere & diuturna forma, ἐπιμελὶς dicta a græcis est.

Quod aut̄ diximus, esse nostratē Mespilū latiore umbilico, quodq; Barbarus, fundo in latitudinem resimo, nō facile intelligit aliq; nescio qd in pomis πρῶτον, i. si uerbū de uerbo uertas, fundus, significet, qua uoce ueteres græci, qd in fumo pomo umbilici descendit iudicauerunt, p̄sertim in malis, piris, sorbis, mespilis, alijsq; pene infinitis, in qbus cauum, & ueluti lacuna descendens, lanugines in ea, floccosq; & floris postquā defloruit inutiles reliqas ostēdit.

Et quoniam descendit, & quasi in doliolo fundum facit, id est, πρῶτον, & quod humani umbilici modo cauum est ὑπαλόν etiam græci uocauerunt, nos umbilicum igitur uertimus.

Quod aut̄ a Barbaro dictū est Resimo, in Diosc. nō legit, etsi ea est umbilici i Mespilo figura.

De Setanijs. CAP. CLXXII.

Alterū Mespili genus in Italia nascit̄, qd aliq; Setaniū, aliq; Epimelida uocat. Arbor folijs Mali, sed minoribus. Pomū fert rotundū, esui aptum, imā parte latius. Quod adstringit, seroq; maturefcit.

Mespilum Setaniū a Theophrasto nominatam. Dioscorides Epimelida uocari scribit. Hipoc. Amamelida. Galenus Mespilum, cōmuni uocabulo Tricoccon, quasi Triossum, aut Trigraniam ab aliquibus appellatum meminit: quoniam tria intus grana, siue ligna, fructus habeat loco seminis. Quid autem sit Epimelis Galeno, differendum putauimus in Arbuto.

De Loto arbore, seu Faba græca. CAP. CLXXIII.

Lotus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorē rem, dulcem, graui odore, stomacho facilem. Aluum sistit baccis.

m ij

A

μίσσις

Theo. li. 3. ca. 12. Plin. li. 15. ca. 20, li. 23, c. 7

VERG.

B

BARB.

λωτός

D I O S C O R I D I S

C Rametorum ligni decoctum, siue potu, siue infusione dyfentericis, ac foeminis fluctione uulug laborantibus, auxilio est. Ruffat capillos. Citam aluum cohibet.

Theo. lib. 4.
cap. 10. Plin.
lib. 16. cap. 31.

Homerus Odyss. 1.
Strab. lib. 17.

BARBARI COROLL.

Lotus arbor (nam & herbae sunt hoc nomine complures) in latino Celtis uocatur, itemque faba graeca. Seruius Fabam Syriacam. Nympha in arborem sui nominis conuersa, quam Priapus fugientem comprimere quaesisset. Anacabeam uulgo apud graecos dici, autor est Aetius, ut fructum eius Anacabon, licet quidam peruerse, Alicabon scripsere graeci, Piri magnitudine, aut paulo infra. Incisurae folio crebriores, alioquin Ilcis uiderentur: spissa, nigra, enodi materie. Differentiae generum plures, etque maxime fructibus constant. Amplitudo Fabae pomo. Color Croci, sed ante maturitatem ut in uuis alius atque alius. Nascitur in ramis densum myrti modo inter sese aduersum, non ut in Italia Cerasij. Manditur inter Lotophagos in nocua dulcedine, suauitateque: nec uentris sentire morbum ferunt qui uescantur. Lucundus meliusque sine interiore nucleo, qui in alterutro genere osseus uidetur. Vinum exprimitur huic simile mulso: quod ultra denos dies negat durare Polybius. Sunt qui biduo triduoque aclescere id scribant. Baccas eius contusas cum nucleo & callo suo, dolis ad cibos condunt. Vnde uulgo Romae, puls Tyriaca uocat arbor illa modo. Nam Padi accolae, baccam syriacam appellant. Tanta uero fructus & arboris copia narratur, ut exercitum Ophelli, Carthaginem petentis, in comituum defectu pauperit. Numerosa in Pharide insula Lotophagorum. Plurima et in Aphrica nos spectante. Familiaris & Italiae: sed natura coeli terraeque mutata, & succos oblita priores. Praecipua est circa Syrtes, atque Nasamones. Sunt qui breuem tradant arborem, ut Polybius, qui & uidisse se testatur spinis asperam, folio uirenti, quale rhamno, tantum profundiore latioreque, fructu myrti candida per initia, processu puniceo, magnitudine oliuae, sed rotundo: eum cibo familiae tundi cum nucleo, qui perexiguus ei est, seruari conditum. Eundem nucleum herilibus mensis eximi. Saporem fici & phoenicobani esse pomo, sed praestare odore. Vinum & acetum inde fieri. Lignum cerae ad tibiarum cantus expetitur, e radice cultellis capulos & subscudes, ac breues alios usus excogitant. Hesperidum Lotos, ab ea quae Lotophagis nascitur distat: ut qua ligni uice utantur ad urendum. Non desunt, qui fructum eius post putamen esse, nec carnosum foris, sed cuticulaceum prodiderint, nec tam cibo dulcem, quam gustu alias iucundum: ut hinc fortasse Dioscorides maiorem Pipere descripserit. Ac fructus quidem lotophagis dulcissimus, sed materia Cyrenaica praefertur. Radici nigricia maior quam ligno: sed densitas minor, quam in Loto post Buxum & Hebenum summa redditur. Vtilitas quoque radici latior. Particulatim Lotus fructificat, non ab utroque sui germine: quod & in bulbi & tithymali quodam genere notatum est. Ludicerae Tibiae fieri coepae sunt e Loto, quas Alexandrini Phoringas appellant. Sicut ex alininis quoque ossibus, & argento ebur quoque ceptum peritundi. Vnde Tibiae elephantinae dicantur, relictis propter nimiam difficultatem harundinibus. Propterea Cenomani, Lotum arborem hodieque appellant Calamum. Spectatur Patavij antiqua Lotos, in quadam Anoniani templi xyfio. Est quando Hippocrates Luron pro Luto nominat. Circa Memphim, nemus a Theophrasto describitur, fuisse tam uastis arboribus, ut excederent trium hominum amplexum, utiles operibus, colore densitateque persimiles Loro, nam Faba, siue arbor pontica, genus diuersum est a Faba graeca, idest, Loto, magnitudinem Fici, fructu fabae, succo uestibus expresso, quem Achy uocant, niger autem crassusque est. Aut per se lugentes, aut mixto lecta uictitant. Nascitur in Scythia.

E X M. V E R G. C O M M.

VAgum est per herbas & arbores aliquot Loti nomen, ut libro. 4. docebimus: ob eam causam, nos capituli huius titulo arborem adiecimus. Monente id scriptore hoc, qui Loton arborem ait, planam esse, &c.

Multiplex, longaque est arboris huius in Theophrasto & Plinio historia. Nos eam relinquimus in scriptoribus illis, & Corollario Barbari uolentibus legendam.

ῥαβδὶς δὲ τοῦ ῥπίχου, ruffat capillum, ut nos reddidimus, cum tamen uetus lectio aliud habeat, si ex eo caput lauetur, capillorum casum prohibere: nec ego detulissem huic lectioni aliquid, nisi Plinius lib. uicesimo quarto, cap. 2. idem his uerbis docuisset, Ramenta ligni decocta, &c. cohibent & capillum. Suspiciamus itaque uerbum esse in uerbo illo, ῥαβδὶς, Communi tamen lectionem secuti, nihil mutauimus.

De Corno.

CAP. CLXXIII.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primū uirent, dein per maturitatē rubescunt, aut cæræ colorē re presentant. In cibo adstringūt. Profluuiū alui, atq; dysenteriaē salutare, si ue in edulio, siue in cibis exhibeantur. Muria ut oliuæ condiunt. Sanies quā uirentia folia torrendo resudarūt, impetigini cōuenienter illinitur.

BARBARI COROLL.

Cornus Crania a Theophrasto dicit. Sexus in ea duplex. Fœminā, Græci Thelycrania uocant. Fructus syluestris maturiores, suauioresq; q̄ urbanæ: quod in hac & Sorbo peculiare fere est. Cornus altera præcox, solstitio fructificans: altera post autumnū, cui & fructus ingustabilis, lignum infirmū, hiansq; ac fungosum, quæ fœmina intelligitur. Contra masculæ firmissimum. Fœmina uiticulas paruās a lateribus emittit, amerinae modo Salicis, in totūq; fructicosior est, mollis & medullacea, uenabulis damnata. Materies masculæ robusta, solida, excorsq; tota, hoc est, sine medulla, & cornu instar, prædensa & ossea. Nodos Cornus ois habet per interualla geminos, & inuicē respondētes, ut in Vitice. Foliū Amygdalæ, sed pinguius & crassius, cortice neruoso ac tenui, caudice nō admodū crasso. Mas duodecim fere cubita excedit: quā altitudinē Sarissæ Macedonū amplissimæ habent. In Ida mas sterilis, fœmina fructifera. Fructū apud Macedones ambæ ferūt, sed fœminæ (ut diximus) qui mandi nō possit. Radices ut Amerina, firmas & contumaces emori. Humidis locis auulsione, semineq; prouenit. Est & in India arbor, ferens fructus similes Cornis, quæ merito Cornus Indica nominari possit.

Diximus fortem & speciosam arborem Cornum esse: sic certius indicantes, quod in Græcis ἡ δὲ πὺν est, quibus ea uox τοῦ πυρραφίου, id est, pingue & feliciter nutritum, ex eoq; cum decore ualidum & forte, qualis Corni materia, & ob id uenabulis apta.

De Sorbis.

CAP. CLXXV.

Sorba colorem malorū referentia, priusq; maturescāt, dissecta, & sole siccata manduntur, ut aluū sistant. Eadem est functio molitorū farinae, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctū eorū in potu præstat.

BARBARI COROLL.

Sorbo syluaticæ, præstior q̄ urbanæ fructus, qd in hac & Corno præcipuū Theophrastus notauit. Arborē Græci Oen, & Oeien, fructus Oa & Va uocāt. Fœmina fructificat sola. Discrimen in fructu, q̄ aliæ figura orbis, aliæ oui ferunt. Itē in succo. Aliæ odoratiore dulciorēq; ut orbiculati fere oēs. Aliæ acidū peiusq; olentē, ut ouales. Vtriq; folia pediculo singulari prolixo, neruaceo, condita in uersus, alæ modo a lateribus emicantia, tanq; ex oibus unū fiant, lacinijis pennatim, ut in filice, ad neruū usq; diductis, ampliusculoq; diuisis interuallo. Atq; hæc non paulatim ut cæteris, sed uniuersa collabunt. Omnibus ramulis in extremo pediculi foliū prominet, cuius accessione impar numerus efficit. Figura his lauri, tenui folio, præterq; q̄ ferrata per ambitū, breuioraq; sunt, neq; cacuminibus mucronatis, sed in rotunditatē retulsi. Flos racematim coactus ex pluribus candidis ac minutis, petiolo unico dependet. Fructus cum large pueniūt, uix modo, facti congestiq; uisunt, ex uno petiolo faui spēm p̄bentes. Exest eos uermiculus etiānum crudos acerbissimosq;. Ipsa quoq; arbor in senectā uermibus obnoxia, rufis, hirsutis, sui gñis. A trimatu fert. Autūno folijs subinde amissis Cachryn suā fundit, eduratū hyeme: ut in Robore. Aculeos Sorbus non habet, ut mespilus. Nouella, cortice leui, pinguiusculo. Flauet e candido, añosa scabro, atroq;. Arbor ipsa de grandibus & subrectis, coma concinna: & nisi qd impediāt, uerticē nucis P̄neq; representās. Materies solida, colorata, firma, cōpactilis: radicibus neq; multis, neq; in altū defixis, ualidis tamen & crassis, auellicq; difficillimis. Nascitur semine, radice, auulsione, solo aliofo, humecto, interimq; montibus. Condunt sapa Catonis p̄cepto. Nostri differentias in Sorbo quatuor nouere: alijs rotunditatē malī reddūt: alijs turbinē piri, utriq; sapore uini gñosissimū, cui circa pediculos folia: alijs ouata specie, odore acri, nec pinde iucūda suauitate. Quartū genus Forminale appellāt, ualens cōtra tormina: hoc assiduū prouenit est, minimūq; pomo, arbore dissimili, folijs fere platani.

Longa est arboris huius & pomi in Theophrasto historia. Nec breuiter Plinius de eadem legit. Res etiam ipsa de quotidiano spectaculo satis nota est.

A

xpxviii

Plin. lib. 15. ca.

26. 28. 48.

Theoph. lib.

3. cap. 12.

VERG.

B

vra

Theophrast.

lib. 1. cap. 12.

Plin. lib. 15. ca. 119

VERG.

C Quo fit, ut magis Barbarū demiremur, tā incerta de pomo, arboreq; hac in Corollario suo docente. Optandū profecto hoc loco erat, græca nouisse oēs, ut collatis cū Theophrasto ab eo dictis, imperfectā hoīs interpretationē cognoscerent: in qua nescio, credendū ne magis sit, qd obiter ea uerterit, an potius, q morte præuētus, sartā tectāq; rem ostendere nō potuerit.

De Prunis.

CAP. CLXXVI.

πικρὴ καὶ ὀξυή

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur. Sed stomachum male habet. Aluum mollit. Syriaca Pruna, & præcipue quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. Aluum adstringunt. Folia Pruni in uino decocta, gargarizatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluctione laboranteis reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum bacca, post maturitatem exiccata. Cum sapa uero decocta stomacho utiliores redduntur. Aluumq; magis adstringunt. Gummi Prunorum agglutinat. Potum in uino calculos comminuit. Ex aceto quoq; illitum, impetigines infantium sanat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 17. ca. 13.
lib. 13. capi. 5.
Theoph. li. 3.
cap. 16.

Prunus, Cocomelia, & Cocomelos græce dicta. Pomū ipm neutro gñe. Arborē masculino media comœdia pnunciat. Folio Arbuti describit, si Theodorus audiat. Et inter paruas, ut peculiare in ea Theophrastus reddiderit, fructū in lanuginē solui, quæ dicat Pappus: qd nulli alij arbori eueniat. Sed hoc Plinius, Theophrastū secutus, non pruno, sed coggigryæ uocatæ tribuit. Decepit hominē uel corrupta lectio, uel nominū affinitas: forte qā cocconeliā, non cocomeleam scribendū erat. nā & Vnedo, cui similis est Coggigrya, neliā nomē apud Theophrastū habet. Prunū syluestre Virgilius Spinū uocauit, eo uersu. Spinosa Pruna ferētes. Genera Pruni, ppe inexplicabilia. Versicoloria, nigra, candida: quæ a cōitatu frugis eius hordeacia dicuntur. Alia eodē colore, seriora, maioraq; Asinina cognōiata ob uilitatē. Sūt & Onychina Columellæ, nigris laudatiora. Sūt Cerina, siue Cereola, atq; Purpurea, necnō Armeniaca, de quibus dictū. Habent & insita Nucipruna, q in facie parentis succū adoptionis pferunt, Nuciprunaq; uocant. Hæc & Cerina & syluestria ubiq; nata, ut uia autūno cadis usq; ad alia nascentia conduūt. Reliquorū uelocitas transuolat cito marcescentiū. Non pridē, ingt Plinius, in Betica malina appellari cœperūt malis insita, & Amygdalis, intus in ligno nucleus amygdalæ, nec aliud pomū ingeniosius germinatū est. Damascena, e Damasco Syriæ, iā pridē ante etatē Plinii, in Italia nascebatur, grandiore q; ligno, & carne exiliore: nec unq; in rugas siccata, quādo soles sui defunt. Populares ijs Myxæ, de quibus in Aegypto & uina fiunt. Familiæ & ipsæ Italiæ, uel Sorbis insitæ. Amariora prunis Myxa, uel similia Paulus existimat. Nā myxa Græci uocāt, nos tonē in Italia cœpisse manifestū est. In syluestribus, satiusq; Prunis limus est arborū quæ Lichena Græci uocāt. Est & sua Prunus Aegypto, magnitudine insigni, nō dissimilis Spinæ Syriæ, pmo mespili, ligno intus grādi ac rotūdo, Florere incipit mēse fere Iulio: maturefcit bruma, nec folia dimittit. Corpus ipsum pomi natura, copiatq; pro messibus est incolis. Siccātū purgatq; na sicca aluū sistere, pdiderit, cū perspicuo soluāt. Qz q minus ingt, q; Hiberica uocata: qm prius Brabya uocauit, quæ & Madrya, & Badrya dicunt Athenæo. Prunus syluestris, ut idem auctor est Galenus, in Asia Prumnon dicitur, & nos ea uulgarī uoce Prumnulā uocamus.

EX M. V. E. R. G. C. O. M. M.

Certiora, & ex re magis de Prunorū uiribus post Dioscoridem alij tradiderūt: demiraturq; hunc Galenus lib. 2. de simplici medicina, dicentem siccatis Damascenis Prunis compefci aluū, cū manifeste & hæc deiciant, sed minus q; alia. Vnde nō male suspicabitur aliquis, quod in cunctis græcis legitur, τὸ δὲ ὀξυήμα τῶν φάλλων. &c. quod est, foliorum decoctū potuisse quondam aliter legi. Nā præter aliorū decreta, qui fructui hoc tribuerūt, res ipsa id exigere uidetur. Nihil tamē in cōmuni omnīū codicum lectioe & fide mutatū a nobis est, & quā forte hic locus exigebat castigationē, ad ea q statim sequunt manifeste trāstulimus. Quod em in hoc scriptore passim legit τὸ δὲ ὀξυήμα τῶν φάλλων ἢ ὀξυήμα ἐκ τῶν φάλλων, non ἐκ τῶν φάλλων, i. pparatū, qd nullā habet

hoc loco significationem, sed *Λιανκορύμνον*, quod colluere significat, legendum est: id omnium probatiss. mihi codex habet. Et Paulus Aegineta. de his ipsis libro 6. agens, ait, τὸ δὲ ἄριστον ἐν τούτῳ τὰς κατὰ γάργαρα δυνάμεις φλυμνιάδ' ἔχει τὰς Λιανκορύμνον. quod est, Prunorum decocto gutturis inflammationes collui. ut sit in Dioscoride sensus, collui & gargarizari decocto illo facium mala ab ea multa deinceps numerata.

De Arbuto.

CAP. CLXXVII.

Arbutus, siue Vnedo, arbor est Coroneæ malo non dissimilis, tenui folio. Cuius fructus Pruni magnitudinē implet, nullo intus nucleo. Huic Apomacolæ cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus. Stomacho aduersatur. Capitisq; dolorem mouet.

BARBARI COROLL.

Arbutus græce, Comaros dicta, cortice deciduo, tenui, similitudine tamaricis, folio interlicem atq; Lauri. Arbor ampla non est. Flores Iulio mensē, ab uno pediculo cacuminibus racematim dependent, similes bacis longioribus myrti, neq; foliosi, sed concavi, ceu ouū pertusio uertice. Cum deflorescunt, parte qua sunt annexi perforantur, relabendoq; in pediculū, speciem uerticilli fuso inieci præbent. Fructus anno perficit, cibo idoneus, ut pariter floreant subnascens, & prior coquat. Carbones officinæ argentariæ cōmendant coctione prima, ut Ariā. Pomum hoc, & Comaron, & Memecylon Græci fere uocant. Latini pomū & arborem quoq; ipsam Vnedonem, & Arbutū appellant. Sunt qui duo genera constituant, Theophrastū, ut arbitror, secuti. Comaron, id est, Arbutū: & Mimecylon, id est, Vnedonem, a Theophrasto Neolian uocatū, defluo & hoc cortice, folijs quoq; sed ima tantū parte deciduis, uirente perpetuo coma. Mas sit, an femina sterilis, nō constat. Arbor ipsa fruticosa. Pomū inhonorū: ut cui nomen ex argumento sit unū dumtaxat edendi: uel fortasse, quia solū hoc pomorū simile fructui terræ gignit, hoc est, fragis terrestribus e quinq; folio frutice nascētibus: quæ & Mora terrestria dicunt a Seruio grāmatico. Nec satis scio, an recte. Ideoq; mōtana Fraga nominant a poetis, ut a terrestribus distinguerent. Galenus & Paulus Arbutū comaron, Synedonē uero, siue ut ipse lego, Vnedonē a rusticis Italiæ uocari scribūt, quā Epimelon, & Epimelida Græci nunciant. Syluestris mali genus, copiosum in Calabria, fructu acerbo, & infesto capiti & stomacho. Sed siue aliud hoc sit ab eo, quod Dioscorides inter mespila connumerat, & Epimelida meminit uocari, siue idem, certe Palladius Epimelides, siue Hypomelides inquit, sunt poma Sorbo similia, mediocri arbore nascentia, flore candidulo, sapore ex acri dulci. Pamphylus Apimelida Piri genus arbitrat, quod alij uocant Amamelida. Quidam Homomelida: frequentē in Ionia, & biseram, fructu Piri, sed sui generis. Omnino, ut Athenæus inquit, prædulci & sine nucleis, ac prælato piri. Alij Omōmalidas uocant, ut Asclepiades, non pira, sed mala syluestria & montana: quæ Theophrastus Oromalidas appellauerit, cū sicu maturescant. Amamelides, inquit Galenus apud Hippocratem, mespili genus est nascentis in Italia. Ex quo facile colligit, Amamelidas ei esse, quæ sunt Epimelides Dioscoridi. Mirū, qd eius usu, mulieribus lac cieri tradidit Hippocrates. Autores sunt, quinquagenū cubitorū altitudine, in Arabia esse Arbutos. Similis Comaro est & Adrachne, quā oēs fere Græci, Portulacæ noīe interpretant falso: cū illa sit herba, & Adrachne uocet, unius literæ diuersitatē. Theodorus, apud nos arborē Portulacæ uocauit, ut a Portulaca herba distingueret, eruditius, qd felicius. Ceterū Adrachne est syluestris arbor, neq; in planis nascens, similis Vnedoni, fructu & folio tantū minore, & nunq; decidere, præterq; ab imo. Cortex exciduius, & scaber quidē, sed qui circumgelatus uideri possit, tā tristis aspectu est. Qd in Theophrasto, nō περιπρηγνυμένον, hoc est, circumgelatū, sed περιπρηγνυμένον, hoc est, rumpentē se per ambitū legat. quod & Theodorus quoq; sequit. Alibi quoq; Theophrastus, φλοισπρία, hoc est, corticis abscessus, Platano & Adrachnæ cōe inquit est. Sed lectionē Plinij uerriorem puto: quia corticē excidere huic arbori propriū nō est, sed ad alia quoq; plura pertinet. Liberū tamen sit æstimantibus hæc iudiciū. Corticem quoq; candidū, Theodorus ei reddidit, quia leucon, ut arbitror, legebat. Ego lepron, id est, squarosum, scabrūq; lego, Pliniū secutus. In Helicone arbore hanc Pausanias enasci tradit frequentē. Etiam si Adrachnū uocari creditur. Magnitudo arbori nō præcipua. Illud cum Subere habet peculiare, detracto in orbē cortice, nō emori: quod ueteres latini, cingere arbore uocabant: actione instituta cōtra eos, qui ita de glabrescent, & balteū exemissent, Arborū furtim cæsarū, eadē causa, qua legis aquiliæ. Germinare cūm Urbana Theophrastus eā scribit: Nec de urbana qualis esset inuenio, nisi quod mi-

A

κόμαρος

Pli. li. 15. c. 14.

B

C nime uerū puto, herbā intellexit Portulacā. Inter biferas hæc arbor, priorē fructū, incipiente pū
hefcere uua, peragit. Posteriorē, hyemis initio, siue ut Theophrastus inquit, priorem cū dulce
fcit uua, posteriorem cū floret. Adrachne usū foeminis, ad opus telarū. Similis huic Apharca.
Plinius Aparachem uocat, e syluestri gñe arborū, æterna fronde, olympo monte frequens, nec
nisi montibus nascens. Habetur & urbana. Vtrūq; genus simul germinat, & ut Adrachne bife
rum, septis uallisc; utile, sed urendo quoq; prædicat. Differt Connaros a Comaro, ut in Paliuri
mentioe diximus. Testandū est & illud, grāmaticos græcos esse, qui fructū Arbuti, Acylon uo
cari credant falso, cum Memecylon eum dici constet: Acylon uero ligna glans sit.

αμυγδαλι

De Amygdalis.

C A P. CLXXVIII.

A Mygdalæ amaræ radicū decoctū, uitia cutis in facie corrigit. Illa
litæ nuces idem munus præstant. Menses admotæ ciunt. Capiti
tis dolori auxiliatur, illitæ fronti, aut temporibus cum aceto, uel rosaceo.
Epinyctidas sanant ex uino. Item putrescentia ulcera, & quæ serpunt, &
morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur. Aluum
emolliunt. Somnium faciunt. Vrinam ciunt. Contra sanguinis reiectio
nes cum amylo assumuntur. Renum uitij, et pulmonum inflammationi
bus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. Cal
culosis, difficilic; urinæ in passo auxiliantur. Et illinctu cum melle & lac
te hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis Auellanae magnitudine.
Quinis, septenisue præsumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes,
si cum quauis esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit et ad
stringit. Rescientibus sanguinem, potum auxilio est. Impetigines quæ
summum corpus occuparūt, illitum cum aceto tollit. Tussi uetustæ cum
diluto uino potum medetur. Calculosis cum passo bibere prodest. E nuc
cibus græcis dulces cibo idoneæ, sed multo minus ualent in remedijs q̃
amaræ. Attamen extenuant. Vrinam ciunt. Recentium esu cum suo pur
tamine humida stomachi uitia recreantur.

Pli. lib. 16. ca.
25. li. 17. ca. 18.

B A R B A R I C O R O L L.

A Mygdalæ flos, anteq; folia (quod fere soli propriū inter arbores tribuitur) manat e trun
co. Lachryma ad nihil utilis. Proximū corpori operimentū, item summū, simile Iuglandiū, sed
tenuius, nucleo dissimili, lato, callosioreq;. Mori uulpes earum pastu ferunt, utiq; si non con
tingat e uicino aquā lambere. Nihil æquæ degenerat, q̃ Amygdalus. Ideoq; aut plantā sapi
us transferri, aut adultā inseri præcipiunt. In remedio est, & paxillum adigere, & lachrymā de
fluentem extergere, reliquo cultu omni perinde adhibito. Ex Amygdalo cinerem & lixiuiam
probāt, ut acerrimā. Ad fornaces, artesq; aliquas non incōmodo quoq; ligno. Amygdalā ean
dem esse cum græca & Thasiā, Cloatius putabat. Alijs græca uidetur esse Iuglans. Columella
tria facit genera libro sexto, Græcæ, Iuglandis, Amygdalæ. Amygdalus dulcis, si a pecore
fit erosa, dicitur amarescere. Quemadmodū Amygdala nasci scripta possint, rei rusticæ libri do
cent, origine a Græcis orta: quod & ad alios quoq; fructus feliciter conuersum est.

*
Pli. li. 13. ca. 9.

E X M. V E R G. C O M M.

S I huic, & Galeno, quorum decreta pro oraculo antiquis medicis fuerunt, credendum de
uiribus Amygdalæ est, primam capitis huius partem, parum feliciter latinis Barbarus reddi
dit, dicens, amaræ Amygdalæ radicū tritarum decoctum, cutem in facie corrigere. Neq; enim
hic, si uerba eius omnia diligentius estimentur, illud decernit, sed quod Galenus lib. 6. de sim
pli. Si accipiantur Amygdalæ radices, coquanturq;, ephelides foris impositas auferre; iubetq;
non decocto Amygdalæ radicū foueri ea labe hominis faciem, sed decoctam radicis materiā
uitio illi imponi. Quod primo lib. etiā Paulus Aegineta confirmat.

Alternat præterea, si melioribus græcis habenda est fides, Dioscorides, acetum, & rosa

ceum, quo loco iubet in dolore capitis utroque uti, non simul, sed alterutro. 'i enim, quod uel, non ^{non}, quod &, significat intercedit.

Reliquit & Barbarus, quod alioquin Plinius monebat, & post Plinium Serapion contra sanguinis reiectionem, ultra amyllum cum mentha sumendas Amygdalas esse. Siquidem Plinius libro 23. cap. 9. his uerbis rem indicat, Et sanguinem sistunt, cum amylo & mentha: fuisseque hanc lectionem Serapionis ætate commentaria eius indicant. Et nos plures ex melioribus Græcis uidimus, in quibus ^{μετὰ ἀμύλον καὶ ἡλιότρομον} manifeste adhuc legitur.

De Pistacijs.

CAP. CLXXIX.

Pistacia quæ in Syria gignuntur, Pincis nucibus similia sunt, & stomacho facilia. Trita cum uino contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.

BARBARI COROLL.

Pistacea in nucis genere habentur. L. Vitellius, qui censor fuit, & hæc in Italiâ primus intulit in Syria, cum legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris temporibus. Mox & in Hispaniâ, qui cum eo militauerat Flaccus Pompeius eques Romanus. Venetijs hæc, Iudaico uico, satum seminis enata uidimus, folio maiore quam Lentisci. Marem in hoc genere accipiunt, cui sub corio uelut ossei longi uidentur latere testiculi. Nicander Colophonius Pistacia uocauit. Et alius Nicander Pistacia. Sunt qui Pistacia, ut Possidonius. Inuenio & Astacia scriptum in poetis. Athenæus auctor est, Terminus, siue Terebinthos credi solita a nonnullis, quæ nunc Syri Pistacea uulgo appellant, foliorum similitudine, ut arbitror fallente.

EX M. VERG. COMM.

Male in omnibus græcis, præterquam in probatis. mihi codice legebatur, ^{πισάκια τὰ μὲν γυνόδια καὶ τὰ σπέρματι}. Hic enim dicendi modus alterum sibi membrum & Pistaciorum genus exigebat. Quando, ut græcorum grammatici docent, semper τὸ μὲν, reddunt, τὸ δὲ est, non aliter quam si in latinis dicas, hic quidem, ille autem, semperque proposita altera expectanda, & querenda altera pars est, quæ aliud, aut diuersum a priore illa aliquid ostendat: quod nullibi in hoc capite inueniri poterat. Fuitque, ut uidere licuit, uera & antiqua huius capitis lectio ^{πισάκια τὰ μὲν σπέρματι γυνόδια}, facili in una tantum syllaba ad uitium lapsu. Idque etiam Plinius lib. 13. indicat.

De Nuce iuglandæ.

CAP. CLXXX.

Nuces iuglandes sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, bilio sæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & uomitus ris ieiunis in cibo aptæ. Cum Ruta uero, & Ficis præsumptæ, uenenis resistunt. Nec minus si a ueneni haustu comedantur. Largius esitatur teneas latas pellunt. Illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatiscum mellis exiguo & ruta. Cum cepa autem, sale & melle, canis, hominiscum morsui proficiunt. Tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum, tritumque in oleo & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum. Alopecias repleret. Sistunt menses nucleis usti, si triti ex uino admoueantur. Idem e ueteribus illiti carbunculis, gangrænis, & ægylopijs medentur. Alopecijs commanducati & ini positi præsentis sunt remedio. Nucibus tuis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, & suauiores. Itaque allio mistæ eximunt acrimoniam. Liuios in corpore illiti tollunt.

BARBARI COROLL.

Caryon basilicon, id est, Regia nux uocata, fructificat autumnino. Arbor Careæ græce dicitur. Notum in ea est, calliculacea tegumenta totidem, quot flores fuere, contrahi pediculo, singulisque his singulas includi nuces, duplici munimento protectas, puluinato primū calice, mox ligneo putamine, quot modis & fortis in parente, hoc est, utriculo atque uentre. Propterea Fesce

A

πισάκια

Pl. li. 23. ca. 8.

B

καρύκη βασιλική

Pl. li. 16. ca. 22.
28. Macrobi.
lib. 3. cap. 18.

Cinæ locutionis comites, & religiosas nuptiis, uerisimiliusq; hoc, q̄ cadendo tripudium faciant, elidendo uirginū puellarum clamore. Germinat hæc non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus impulsio priore pululo. Qua forma & caudex totus, & prægrandes rami crescunt. Hoc & Auellana faciunt, & quibus germina in folium unū procumbunt uidelicet: quia desit initium unde germen erumpat. Medulla nucis quæ in ligno ipso continetur, Isca dicitur Actio. Forte ut alia quoq; multa, deprauate à latinis id acceptum, quasi esca, quoniā pro igniario & cauterio quoq; sit medicis. Mutari hanc in quercum senio, nonnulli produnt. Transdine, propter olacitatem uocatā, nemo dubitat. Et enim arborū ipsarum, foliorūq; uires, in cerebrū penetrant, hocq; in cibis nuclei earū, minori momēto faciunt. Tinguunt cortice earū lanq; & capillus ruffatur. Primū prodeuntibus nucleis, id compertū, insecūs tractatu manibus, pinguescunt uerustate. Sola differentia generū in putamine duro, fragili, tenui, crasso, multiloco rinæ, nucleorūq; illis quadripartita distinctio, lignea intercurfante mēbrana. Hæc arbor an fue seruāt. Sunt & Galbæ, siue Caluæ. Itē Prænestina, ab eodē Catone dictæ: quas maxie laudat. Et Tarentinarū duo gñæ, fragili putamine, & duro, quæ sunt amplissimæ & minime rotundæ: quas a frangēdi mora Moracias, & Moracillas sunt qui uocent. Præterea Molluscæ, putamen rūpētes. Macrobius, qui Persicū uulgo dictū Molluscā nucē esse putat, aperte hallucinatus est, cū is nō de Persico, sed de nuce regiæ & Iuglādē q̄ sit e Perside cōuecta primū ad nos, Molluscā intelligat. Nā a quibusdā Nucē persicā uocari tradit, Suetiū hoīs doctissimi testimonio fretus. Thasiā quoq; nucē, atq; Græcā, Amygdalarū esse gñis, Cloatius existimat. Prænestinā Macrobius eandē esse cū Auellana, Varronis & Neuij auctoritate meminit. Iuglans a iuuādō & glāde Theophrastū uocasse Cloatius auctor est. Sed certe Diosbalanos Castaneā Dioscoridi signifi cat. Proinde nō parcius errauerit Nonius Marcellus, qui Iuglādē prō syluestri nuce interpre tatus est. Biferas Iuglādes, Siluaciano patauini agri uiculo provenire satis constat. Fomites ex hac nuce Mnestor optimos fieri cum dixit, de Iuglande uidetur intellexisse.

E X M. V E R G. C O M M.

CVr Persicas, & Regias Græci, Romani uero Iuglandes in genere nucum eas dixerint, quas nunc priuatim Ethruria gentesq; aliæ multæ nuces nominant, satis Plinius lib. 15. cap. 22. decla rauit, quare nos ea de re supersedebeamus.

Barbari tamen supersticiosam interpretationē non probamus, qui quod hic *ἀλανεῖται* dixit, nihil aliud significās, quā quod ægre in stomacho concoquitur, & quod Plinius difficiles concoctū ait, resides in corpore, & difficile transire dixerit, longiore q̄ decuit uerborū ductu, nec satis apto uerborū intellectu. Quando aliud iudicio nostro est, ægre concoqui aliquid, & aliter dici residere aliquid in corpore, nec facile transire. Nec obstat, qd & Varro usus hac uoce est, sed tamē quod aptius & certius in Dioscoride ad medicinā dici debuerat, desideramus.

De Nucibus Auellanis, C A P. CLXXXI.

NVces Auellanae, quas & Leptocarya uocant, stomacho in se medentur. Tostæ, & cum exiguo piperis potæ distillationem conco quunt. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe ursi perunctus, alo pecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli, usta earum putamina, & in ci neris speciem redacta cum oleo, cæsiolorum oculorum pupillas infantib; bus denigrare, persufuso sincipite.

B A R B A R I C O R O L L.

NVx Auellana, quā Græci Heracleoticā appellant, nostri Prænestinā, & Abellinā patriæ uocabulo. In Asiā Græciāq; uenit e Ponto, propterea nunc Ponticæ, nunc Heracleoticæ di cūtur. Quo nomine Macrobius, Castaneas intelligi falso putat, Oppiū secutus. Ponticas, sunt qui & Alareas nuces cognominent. Inuenio & Alariā uocari, arborem unde iacula & hastæ fa citari sole

udgva novitix

Pli. lib. 15. ca.
22. Macrobi.
lib. 3. cap. 18.

etari soleant. Auellanae sunt ex arbore, quae Corylus dicitur. Has mollis quidem tegit barba, sed putamini nucleisque solida. Rotunditas contra, quam luglandibus. Umbilicus Auellanis, et in uentre medio. Torrentur eae cibis. Corylus neglecta comeat in fruticem; quam si quis eam minus subluet, fructum meliorem & copiosorem ferre traditur: ut quae naturae suae proprietate fructuosa sit. Tonderi tamen, reserarique precipiunt: ita fructuosam reddi. Alioquin si arbore scere patiatur aliquis in corpulentiam & magnitudinem, alimentum omne sumptit. Florere negant hanc aliquid, sed floris uice quosdam in ea uillos erumpere. Huic simul fructus dedit, uue mo callus innascitur, magnitudine uermis grandiusculi pinguis, singulo pediculo copatilis: sulum uocant. Dehiscit uere ac defluit, cum folia emergunt, simili omnino sorte qua Caphrys in robore, abiete, ceterisque amentiferis. Syluestris prius natura: quam hyemis patetissima, & montibus magna parte prouenit. Nec urbanae fructus magnopere quam indomitae praestantior, folium urbanae maius. Seratumque ambitu utique. Alno simile, tamen latius. Coryli, aliae nucem rotundam, aliae oblongam ferunt. Candidior est urbanae, meliorem in aquaticis. Translatu miscunt syluestres. Cortex sumus, tenuis, pinguis, & maculis albis uariis, materies lenta, praegraciles eius uirgaes desquamantur, crassiores derafae interpolantur. Medulla tenuis fusilaua, quae dematur.

EX M. VERG. COMM.
 Επὶ τῇ ἐκείνῃ τοῦ ἐρῆματος, parum recte persulso capite transtulit Barbarus. Neque enim ἐρῆμα caput graecis est, sed anterior tantum capillata pars, si Galeno in anatomia credendum est.

De Moro. CAP. CLXXXII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit. Stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat Mori succus. Decoctus autem aereo uase, atque insolutus adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito melis exiguo. Sed inolescitur eius adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha, item myricae semine, iri, & thure. Immatura Mori poma siccantur, tulaque acinorum rhois uice obsonijs miscuntur, ut coeliacos iuuat. Radicis cortex decoctus in aqua, et potus aluum resoluit. Latas uentris tineas excutit. His quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia ex aceto illita, ambustis igni medentur. Tinguntque capillum, uitium & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis, & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu serobe, succum emittit, qui potestridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tuberacula discutit. Et aluum purgat.

MORUS BARBARI COROLL.
 Moro succus in carne uinosus. Trini colores. Candidus, mox rubes, maturo niger. In nouissimis floret. Inter prima maturefcit & transuolat. Tingunt manus succo. Matura eluunt, acerba pilum corijs folia eius in urina madefacta detrahunt. Minimam in hac arbore ingenia profecerunt, nec nominibus, nec inscriptionibus, nec alio modo quam pomi magnitudine. Mora differebant Hostiensia, & Tusculana Romae. Autores graeci, Morum inserunt castaneae, phago, terebintho, piris syluestribus, malo, ulmo, populo, quae sit alba: unde candida nascantur Mora. Nascuntur & in rubis, multum differente callo: quae Maratha nominantur ab Hippocrate. Quamquam corrupta fortasse lectio est, nec μάραθα ἀπὸ βαρύ, sed μόρα τὰ ἀπὸ βαρύ scribere oportuit. E pomo arboris Mori Panchrestos stomatice, eadem Arteriacae appellata, pluribus modis fit. Neque est aliud oratio expulsius pomo, multum saporis quam obsoniorum confert, ab Hippocrate. Rhodum quoque dictus. Mora germinatione priusquam in folia exeant, sinistra manu decerpi iubetur. Futura poma Ricinos, siue ut quidam legunt, cyrtinos graeci uocant. Si terra si non attigere, sanguinem sistunt alligati, quacumque parte fluat.

A

μωρα ἢ πυκνὰ
 μωρα.

B

Pli. li. 15. ca. 24
 The. li. 4. ca. 2

D I O S C O R I D I S

C Ad hoc seruant repositi. Materia utilis operibus, quæ flexu tōstet. Ideo furculas ex ea circosq; faciūt, ut ex caprifico q̄q; Itē nauibus tornacula, ut ex fraxino, ulmo, platano. Quāq; e Platanō celerit putrescūt. Itē auriculas liburnicis, & testudines atq; firmamēta. Mora in Aegypto & Cypro sui generis habent, ut mox dicemus. E ficu Aegyptia et Cypria, Sycaminō greci pomū ipsum uocant, Sycamineā, & Sycean, & Sycen q̄q; ipsam arborē Hippoc. Nā Aegyptia & Cypria Sycomoros, & Sycomorea dici fere solent. Media Comœdia, Sycaminō uocat et pomum & arborem, sed pomū neutro, arborē masculino gñe, ut apud Iuliu Pollucē notatū legi. Hippocrates Morum arborem, est quando Sycen, & Moreon quoq; dicat: ubi uidelicet radicem Syces, primo de fœminarum incōmodis uolumine requirit, ut Galenus interpretat. Inuenio & Modon scriptum in Hippocrate, pro Moro, nisi fallor, culpa librariorum.

De Sycomoro. CAP. CLXXXIII.

SYcomorum aliqui etiam Sycaminum, idest, Morum uocant, cuius fructus Sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs Mori. Pomum ter aut quater in anno fert, non ramis ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus. Quod nō maturescit, nisi ungue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus, ubi prouentu fecundo iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum alio utile est, sed nullam præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus tēnere arbore antequam fructum ferat eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato. Si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia, aut uellere lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta reponitur. Vis succi emollit. Vulnere conglutinat. Discutit collectiones coctioni repugnantes. Bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & horrores. Celerrime pomum tēredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quod Vlmus esse uideatur, folijs Sycomori, fructu Pruni crassitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

BARBARI COROLL.

Ficus Aegyptia, siue Morus, quam, ut Celsus ait, & Morosyon appellant. Fructum hanc nō caudice, sed ramis fere qdam falso tradunt: cum ueriores sint, qui utroq; nasci prodāt. Magnitudo, aspectusq; pomo fici, succo tñ & sapore caprifisci. Sed dulcedo copiosior sine granis interioribus, scalpēdo tñ ferreis unguibus, nec aliē maturescit. Quod cū factum est, quarto die de cerpitur, alio subinde atq; alio subnascēte terno, ita ut etiam septeno numerosa partu p singulas æstates, multo lacte abundante. Subnascit etia si non scalpāt, quater æstate, priorē impellendo fœtū, q sit inaturus. Arbor nostrati Moro similis folio, magnitudine, cōspectu. Materies inē paucas utilissima. Cæsa statim uiuet. Siccatur mersa incilibus atq; stagnis. Cū fluitare cœperit, tempestiua opibus intelligit, ablato ita pondere, ac soluta. Id probe inueteratē signū habent: uidelicet alienus humor, alium eius omnē rigando suggit. Huic similis est, quæ uocat cypria Ficus, in Creta. Nam & ipsa trunco pomū fert, & ramis, cū in crassitudine adoleuere. Distat a superiore: quod germina emittit, sine ullis folijs, radicūq; similia, cui fructus quasi cuspidis accessu præpilatur. Caudex magnus, & Populo albē proximus. Foliū ulmēū quater gignit, quater suas ficos maturat. Sed grossus in ea nūq; excoq̄tur, nisi emissō incitura lacte. Sicutas pomo Fici, sed interna. Similitudinem caprifisci habent. Magnitudo Pruni, uel Sorbi.

De Ficu Cypria iam dictum est in Aegypto.

EX M. VERG. COMM.

CRediderunt Theoph. & Plinius, in Aegypto tñ nasci Sycomorum hanc. Alter eū ubiq;

Macrob. li. 3.
ca. 20. Pl. li. 13.
capite. 17.

Humor hu-
morem siccatur

The. li. 4. ca. 2.

nō eius meminit, q̄ ut dicat, τὴν ἐν αἰγύπτῳ συκάμινον, αὐτὴ αἰγύπτιαν συκάμινον. Alter lib. 13. ca. 2. his uerbis de ea tradit. Et in Aegypto multa arborum gēa, quę nō alibi. Ante oīa Ficus ob id Aegyptia cognominata. Arbor Moro similis. Gręci ex utroq; Sycomorū, quasi ficū simul & morum, uel Sycaminon, idest, Morum tantum dixerunt. Ab illa nomen ex pomo, ab hoc & ab alijs ex arborum aspectu nomen factum est. Celsus aliquando Sycaminon, aliquando Sycomorum, interdum etiam Morosycon appellat, nisi uicium etiam in eo sit.

Illud etiā nō immerito querit, cur nā arboris huius pomū ob ignauū & inertē sapore Sycomorū uocet. Sic em̄ ait, καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπὸ αὐτῆς καρπὸς συκάμινον, ἀλλὰ τὸ ἄτονον τῆς γίνεσθαι, ex quibus aperte indicatur, non quia similis Moro arbor hęc sit, sed quod lāgido & inertī sapore leniatur. Et si id hoc sensu simpliciter accipiat, nō ab re suspicari aliquis poterit, non συκάμινον, sed una tñ mutata litera, συκόμινον, quasi fatuū et stolidi arboris ficū appellandū sycomori fructum esse. Id enim prima producta μάργον, gręcis significat. Nos tamen id nō probamus, credimusq; quod hic ait, ἀλλὰ τὸ ἄτονον τῆς γίνεσθαι, ad proprium eius saporem referendum esse, qui in eo sit, ut ait Plinius p̄dulcis, & sine interioribus frumentis, seu granis.

De Ficis.

CAP. CLXXXIII.

Fici maturę, recentes, stomachum lædunt. Aluum soluunt. Sed facile contracta ab eis fluctio sistitur. Sudorem euocant, papulasq; sitim sedant. Calorem restinguunt. Siccis, natura excalfaciēdi. Vires alunt. Sed sitim magis stimulant. Aluo utiles, Rheumatismis uentris & stomachi contrarię. Gutturī autem, arterię, renibus, uesicę, & ijs quos longa ualetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus ap̄tissimę. Feruefactę cum hysso, & potę, pectus purgant. Tussi ueteri, diuturnisq; pulmonum uitijs conueniunt. Aluum molliunt, tussę cū nitro & croco, dein manducatę. Decoctum arterię, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasma timiscunt. Et in muliebres fatus, cum foeno gręco & ptisana. Ceterum cum ruta coctę, torminibus infunduntur. Coctę, illitęq; duricias discutunt. Parotidas, ac panos emolliunt. Furunculos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce addita. Crudę si cum antedictis tundantur, eadem efficiūt. Cum malicorio, pterygię purgant. Cum atramento sutorio, deploratis fere tibiarum fluctionibus, & cacœthicis ulceribus medentur. Quin & cum uino decoctę, addito absinthio & hordeacea farina, utilissime hydropicis illinuntur. Crematę cum cærato sanant perniōnes, pruriginēs. Sonitusq; si crudę terantur, & synapi liquido exceptę auribus instillantur. Tam syluestri, q̄ satiuę Fici lacteus succus, coaguli modo lac contrahit, concretumq; dissoluit ut acetum. Exulcerat corpora. Venarum spiracula laxat. Soluit aluum. Vuluam aperit cum detrita nuce gręca potus. Menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut thyrrhenicacæra. Podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnogręci & aceto utilis. Lepras, lichenas, uutiligines, uitia cutis in facie, p̄foras, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. Instillatum plagę percussis a scorpione, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Prodest dentium dolori lana exceptus, & in cauis eorum additus. Verrucarum infirmicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem

C præstat succus e teneris ramis syluestris Fici, qui lacte prægnantes, silent adhuc oculo tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bulbis carnibus ramuli ficulnei, facilem afferunt decoctionem. Lac efficitur quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo stirculo spathæ loco moueatur.

The. li. 4. ca. 5.
Pli. li. 17. ca. 7.
li. 12. ca. 5. li. 15.
ca. 28. 19.

F I C O circa Elephantium agri folia non defluunt. Græci pomum Syca, & Palathen quicquid uocant. Arborem uero Sycen, & Sycada. Quancumque Sycada nouellam ficum fere intelligunt. ut Iulius Pollux inquit. Nam Ischades, aride fici sunt, aut caricæ interdum. Inuenias apud græcos Ischadas, recentes et ueteres quoque dici. Comœdia et Iscada, captum pro sicca, uidetur appellasse. Quancumque & Ischada Sophocles, pro anchora est ubi acceperit. Fici pomum Hegeteriam, ab Atheniensibus uocatum, quasi ante alias fruges inuentum, autor est Athenus, etiam quibusdam festis præferre pompæ solitum in ossis. Naxy, ficum ipsam Melichen appellant, a quo & Liberti patrem Melchion, seu inuentore eius uocant. Ut Lacedæmonij Syctæ. Quidam gigantem nomine Syceam, Ioue persequente, in Ficum a tellure conuersum fabulantur: unde in Cilicia ubi nomen sit inditum Syceæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxylis, ex Amadryade filiam, ut alias quoque arbores fuisse memorent. Pausanias in Attica primum editas putari tradit, Cereis munere, in memoriam hospitij Phytalo donatas: quod & in monumento eius testatum est uersibus hexametris. Ficus omnis, breui fere, nec procero caudice. Quancumque amplissime quædam inueniuntur, uel pæris æmula magnitudine. Cortex ei leuis, laciniosa folia, & cruciformia, hoc est, ut Theophrastus inquit, οὐλοποδία, nisi quis κεραιωποδία magis legendum putet. Nam Hippocrates, uere inquit, folia sunt Fico, pedibus cornicis similia. Ex interiore pomi huius semine, id est, minutis in eo granis, quæ græci κεραιωποδία uocant, etiam caprificus nasci dicitur a Theophrasto. Germinat sub arcturum, post uer: quod tempus comune omnibus est, præsertim edomitis, ac præcipue in Fico, uite punica. Ficus in Hircania dulciores multo, fertilioresque, ut modios, 270, singula ferant. Externæ sunt in Italia Chalcidicæ: quarum genera plura. Item Lydiæ, quæ sunt purpureæ, & māmillanæ, similitudinem māmaram habent. Calistritiæ, parum sapore præstantiores, sed græcorum iudicio prælatæ cæteris. Has & Ficus & Passarias uocari, Calipolitus autor est in Clodio albino, Ficorum omnium frigidissima. Inuenio Psycalia uocari quoddam earum genus, ab algore. Nisi quis malit ab Atticæ regis insula Psycalia. Sed an Calistritiæ sint, quia frigidissima dicantur, mihi parum constat. Nonnulli sunt, qui Psycalia intelligant, quæ recentes non sint quidem, non tamen siccæ. Africanæ ab aliquibus præferuntur, cunctis celebratæ Carthaginis excidio. Et aliæ ab Africanis Libycæ. Habentur & Sulcæ, & Topiæ quæ dicantur. Patriæ nomen obtinent etiam Alexandrinæ, post dicendæ. Candicat Serina, cognomine delicata. Nigra est & Rhodia, & Tiburtina, præcoquæ. Sunt & Liutianæ, siue ut alij uocant, Liutæ pompæ, in usus annuos arefactæ folibus, apuissime cum mariscis. Et quas harundinei folij macula uariare dicunt, Harundineas ob id uocatas, a quibusdam Alfulas. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia alba, pediculo minimo latissima. Cloacius & Asinastræ, Atram, Paluscam, Augustam, Biferam, Cucurbitanam, Leptolydiam, Marficam, Numidicam, Pullam, Pompeianam adijcit in nomine. Sunt apud græcos Atticæ, delatoribus inde nuncupatis, præsertim Aegilides. Sunt & Laconicæ, item Phrygiæ. Item Phibalæ Hippocrati, Androton Leucerineon adiungit, quas nostri Albiceratas uocant, albas Ficos ferentem. Addit et Oporobasilidas, & Celuron, & Phormynon, & Megaricam. Et alijs Toxaliæ sunt, & ex insula Paro Aemoniæ uocant, nihil a Lydijs distantes, colore sanguineo. Sunt & Amadei, et Coracei, & Nicoiei, & Basilicæ, quas & Basilidas uocant. Hybernæ Ficos, Cydoneas græci appellant. Probabantur & e Zacyntho, quod & Plauti confirmat autoritas in Mercatore. Item Cimoliæ. Primo autem prouenit Porphiritis, longissimo pediculo. Comitatur eam e minimis & uilissimis appellata Popularis. Contra nouissima sub hyeme maturatur Chelidonia, hæc rubens est e nigro. Quæ porro nigra Ficus est, Barbachytia dicitur a græcis. Iulius Pollux, Chelidonia dicendo, Atticas inquit intelligimus, quas Lacedæmone Chelidonias appellabant. Sunt præterea eadē serotinæ, & præcoques, bifere, alba & nigra cum messe maturescentes, atque uindemia. Serotinæ, a corio appellatæ duro, hoc est, ut Macrobius, Duricoriæ, ex Chalcidicis trifero quærundam prouentu. Tarenti tantum prædulces nascuntur, quas uocant Onas. Sunt & Sagun-

ting. Telsanq. Quibusdam provincijs & Hibernæ, sicuti Moesiæ; non natura, sed ingenio. In Ficorum genere, Caricas peculiari arbore fert Syria, & minores, eius generis quæ Coitana appellant. Habentur & Caunæ ominales, Marco crasso in Parthos mouenti. Caunæ porro sunt, tam ex Carie oppidulo, unde nomen Caricis apud nos, ut consilio, aperte ut multa, quæ ex Aëolica urbe Cauno cōmendabiles. Antiochenæ uero Caricæ, quas & Triphyllos uocat, uenquit Strabo, ab Antiochia Phrygiæ Meandro apposita nomen habent. Omnia hæc L. V. tellus in Italiam Tiberij principatu transtulit. Ficus unum genus, pomum super folij dorsum ferentis, circa Idam ostenditur, & ob id Opisthocarpion uocatum, Idæi cognomine. Ramosa hæc, neq; cella, cubitali crassitudine, ligno ualido, cōtorto, lento, sine lacte. Pars quæ a terra est, leuis, enodisq; Superior comosa in orbem. Colos folio & corticiliuens, ac uiridis. Folium Tiliæ per omnia, sed molle, Flos mespilaceus, & cum Mespilo erumpens. Ficus rubra, magnitudine Oliuæ, rotundior, sapore Mespili. Radice crassa, ut Ficus quoq; cætera. Item lenta materies, incorrupta, corde folido, neq; medullaceo siue molli. Alexandrinam hanc ibi uocant. Nascitur & in mari ficus sine folijs, parua, rubro cortice. Quædam Ficum & Grossos ita ferunt in Cypro, Cilicia Hellade, ut ficum aduerso folio, grossos auerso sustineant; cum reliquæ arbores sub folio pomum, ut protegatur, habeant. Laconicum genus uocatur, præcoces eas habens: quas Athenis Prōdromos, hoc est, præcoquas atq; præcurrentes uocant. Eiusdem feracitatis est, & quæ a Theophrasto Leucomphalios nominata est. Idem autor & Charition, & Aration ficum nominat. Ficus maturas greci, Colythra, ut Philemon scribit, uocant. Seleucus Proteorien fici genus uocari tradit, primitiuas eas ferentis. Habentur & alia Ficorum nomina, Cirocoelaidæ, Picridiæ, Hiladiæ, Sarcelaphiæ, Lapyriæ, Dracontia, Leucophiæ, Melanophiæ, Crenæ, Myleæ, Afcalonæ, Trallianæ, Rhodijs simillimæ, Bringidaridas. Quamq; barbaræ, tñ cum Atticis fere certantes. Prosenidas Pamphilus, Tithrasias Theopompus, generosas Plato in legibus, & ficus & uites quasdam cōmemorat, quasi nobiles: etiam si nobile a generoso, ut inquit Aristoteles, diuersum est. Fortasse illa genera intelligens, quæ dicuntur Aegilides, inter ficos, & racemos, Nicostraticos inter uuas: quæ duo Athenis maxime cōmendabantur. Vt racemus Hipponius, in Rhodo insula, Thracelinas, ad Lienam probari, apud Aetium inuenio. Morbus fici peculiaris, uermiculatio. Bestiolas eas uocant cerasas, stridulum animal, Itē patella: sed aliter q̄ in olea: quoties uidelicet radices imbrum superuentur, quasi deglabrantur. Item crados, scabies, & cocleæ. Crados intelligitur, cum marcescunt rami, quos priuatim cradas in Ficu uocant. Attici ficum ipsam Cradem nominant. Nam & machina, quæ in comædia Bellorophontas, & Perseos, & deorum imagines in aere presentabat, crada appellabatur: quia species ea ficum imitaretur arborem. Inter morbos est & uredo, idest, *ακρίθμος*, & tabes quæ dicatur *ἰκταρία*, quasi quidam stupor, rigorq; Frigore hic & gelu, alsiotis annis contrahitur. Cōmunis hæc & alijs, quemadmodum & radicatio syderatioq; *ἀσπερδοσμός* uocata, folliculus Fici, ut frumenti, a Varrone gluma dicitur. Ficaria quoq; grana, Plinius frumenta nominat: quas nos a grecis Cenchramydas uocari diximus, succus maturescitibus lactis, percoctis melle. Tactus omnibus mollis. Maturis frumenta intus. Lactē fatiuarum coagulat lac, syluestrium nequaquam. Aut minus probe fructus, ut in uite alba. Eo melior futurus intelligitur, quō lētius germen antecesserit, contra quam cæteris arboribus. Ficus sola, ex omnibus arboribus non floret. Lactis inquit Macrobius, proprie ficorum dicitur ficus. Tanq̄ non pomum fecerit a pomis apud idoneos autores, Afranium Ciceronemq; reperiatis. Fico fumus accerrimus, caprisicoq; Item, cuiuscunq; lacteus cremor redundat, atq; ipsa hæc tamen fluuiata de tracto cortice, mox siccata, minime omniū tedio illo infestant. Quin & flāmam quoq; mollissimam reddunt. Lixiuum quoq; cinere uehementer asperum. Quamq; ex Amygdalis asperum ignem excipere, optimas ficum & olea, contrarię causę faciunt. Ficum, lenta fungosaq; materies, oleam pinguis & densa. Senescunt ficus in arbore, anusq; distillant gummi modo lachrymā, ob id Athenienses, *γπαιος* uocant earum folliculos, ut nostri glumas, quemadmodū prædiximus. Siccantur, feruantur in capsis. Ebuso insula præstantissimæ amplissimęq; mox in Marrucinis, plurimę in Asia, Ruspinaq; Africæ urbe. Panis uicem & obsonij habent, siccata, ac recentes quoq; Athletæ hoc cibo uires aluere, priusq; Pythagoras exercitator eos transferret ad carnes. Sale inueteratis, & casei quoq; loco uesti excogitatum est. Decoctū, inquit Paulus, Ficorum, plariq; Siræum appellauerit: quod & defruto quoq; nomen est, Hippocrates Sycion. Studiosos uocis, abstinere Ficu greci iubent, Aegesianactis Alexandrini exemplo moti, quod is tragædiarum actor optimus euaserit, quia, is annos a ficu temperasset. Produntur & de hac arbore prouerbia. Ficum post piscem. Legumina post carnem. Gallinaceos amantibus, ficum

C ne ferito. Assentari nescio, ficū ficū, panē panē dico. Sacra ficus Athenis uocabat, uia quē dicit ad Eleusinem. Erat & Sicelensis Romę uia, quā Nomentum ducebat, & Nomentana quoque dicebatur, ex Viminali porta. Ceterum non a ficu, etiam si Plautus locum innuit, sed a figlinis appellata, quasi figulensis: quod ibi foderetur figlinum, ut ad Auentinum quoque montem. Ficum atram, infelicem pontifices putabant, felicem albam. Quę autem felicia sint ligna, contraue, Macrobius libri tertij calce docuit, acrifolium inter ea numerans: quod quidem quale genus sit, haud facile reddiderim. Nec enim puto aquifolium posse legi, quod Aquifolium sit Ilex, quā felicibus annumerant. Recentiores certe, Agrifolium pro Faba gręca, siue quod idem est, pro arbore Loto capiunt. Sed Lotus felix erat arbor, ut idem Macrobius testis est. Scio Peucedanum quoque Agryophyllon dici a gręcis. Inter arbores infaustas, & Alternus, & Sanguis, siue quod idem est, Sanguen, ab eodem autore collocantur.

Pli. li. 13. ca. 274
25. li. 27. cap. 7.

Caprificus, Erinos a gręcis uocata, quod in Erineo Thessalię oppido primum apparuerit, ut Photioni placet. Longe ualidior est quod ficus, nullis fere uitij obnoxia, ut etiam fico insita grossos suas tueri credat. Interdū tñ inuadit eam scabies. Frequentissima in ficu, quoties post uergi las admissi sunt imbres, utique parui (nam largis causa omnis eluitur) flexilis materia. Nunquam maturefcit in ea pomum. Additur Ficetis, ut culices alimento in ea fraudari, euolantes in ficos ferant: aperiantque ora earum: atque ita sole imisso & lacte absumpto, maturitati præparent. Eos culices ficarios, Aristoteles Psenas, ionica uoce appellat. Etiam si legat corrupte pferas. Dicunt autem Psenes, quasi galbe. nā & Psenes poetę cū dicunt, caluos & glabros intelligunt, ut est apud poetā Simonidem. Nos tñ Galbas, æsculi uermiculos uocamus, ut prædictū est. Sūt in fico & Centrinæ dicti culices, fucis apum ignauia maliciaque similes. Interimendo enim utiles, & ueros culices utique ipsi comoriunt. Caprificatio a nostris hoc uocatur, a gręcis erinasimos, & lycasmos. Interim non arbor ipsa ferit, sed grossi ex ea pertusi, uelut ferta suspenduntur ad eundem usum. Theophrastus autor est, meliores quodā loco nasci ficus, sine ulla Caprifici ope: quas Anerinasta prædicari uendentium uoce scribat. Caprificus, tauros quamlibet indomitos collo eorum circumdata, cicures & immobiles præstare dicitur. Habetur & Ficus indica, cuius germina per ambitum radicari tradunt, neque caudicem contingere, arbor magnitudine insigni, ut sub quibus tres turmas equitum condici assident. Caudici crassitudo sexaginta passus. Ramorum umbra bina operiunt. Folijs amazonicę peltę amplitudo, formaque, ut Solinus inquit. In Hircania tam fecunda est Ficus, ut medimnos. 60. singulę ferant. Est autem *medimnos* modij sex ita-lici, utique atticus. Nam ptolemaicus maior est, ut qui sesquiplus sit attico, sed exiguo pomob. Caprificus in Co insula, non bifera modo, sed trifera quoque habet. In Gallia transalpina, Strabo similem Fico nasci tradit arborem, fructu capitulum corinthiæ columnę referens: cuius lacte mortifero, sagittas suas illinant, infami alias temperandi uenena, celo non pridem aboleri cœpta: eius rei nota Gallijs, ut hoc forte Virgilius intenderet, cum de Cimbri. Tullio, qui frateem ueneno sustulit, in senario locutus est, de quo inter odoramenta diximus.

D

[De Grossis. CAP. CLXXXV.]

ἀγρίε στυκή

GR O S S I, quę Erinei nonnullis uocantur, coctę, illitę & strumas nodosque omneis emolliunt. Crudę, formicantes uerrucas, & thymos nitro farinaque additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto, ulcera in capite manantia, epinyctidas, & fufures sanant. Iis ficosę extuberationes, & genarum scabricię perfricantur. Nigrę ficus folijs cauliculisque, candidę uiliginis perunguntur. Faciunt ad canum morfus & ulcera, quę Ceria, idest, fauos uocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs, ossa extrahunt. Furunculos cum cæra discutiunt. Contra muris aranei morsus, & scolopendrę uenena, cum eruo & uino illitę au xiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris quę satiuę lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere. Siquidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest, namque expurgat & consumit quę excrescunt. Quo utendum ita est. Spongia assidue hoc

lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & infuſiones uetustas, & ſinus cuniculatim exedentes, magnosq; inſtillari conueniet. Et enim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non ſecus atq; emplaſtra quæ cruentis uulneribus inſciuntur, Enhæma uocant. Bibitur ad diſcutiendum ſanguinem concretū, & contra præcipitationes, rupta, conuulſa, cum cyatho aquæ recenter colatū, addito olei exiguo. Cœliacis, dysentericis per ſe cyathus datus prodeſt. Neruorū uitijſ, conuulſionibus cōmode illinitur ex oleo, ut pote quod ſudores moueat. Aduerſus gypſi potum, & phalangiorum morſus bibitur. Hæc eadem præſtant reliqua lixiuia, præſertim quernum. Omnia tamen adſtringunt.

BARBARI COROLL.

Groſſulos, atq; Groſſos, Græci Olynthos, & Erineos uocant, de quibus in fico & capſico abundanter egimus. Sed Groſſi proprie Olynthi ſunt, hoc eſt, primitiue ficus. Apud Macrobiū, Groſſos legas ficos eſſe, quæ nunc matureſcunt. Alij ſic diſtinguunt, ut ficus primo ſit Olynthos, deinde Pheix, poſtea Sycon, poſtremo Iſchas. Frondes ficus, Græci priuatim uocāt Thuria. Nicander & papaueris folia ſic appellat. Eſt & edulij genus Thrion, ut aliubi notauimus.

Cinerem lixiuium, Conian Græci appellant: de quo dictum in Ficu a nobis eſt, aſperitate inſignem, ex eo ligno eſſe, aſperiores ex Amygdalo.

De Perſea.

CAP. CLXXXVI.

Perſea arbor eſt, in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, ſtomacho utilem, in quo Phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præſertim in Thebaide. Arida folia illitu ſanguinis eruptiones ſiſtunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perſide exitioſam eſſe, tranſlatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

BARBARI COROLL.

Perſeam arborem, Aethyopia & Aegyptus habent ſolæ. Perſicum Aegypti Plinſus, appellare quodā loco maluit, hilarem intuitu, piro ſimilem per omnia. Semper autem folia habet, & poma, ſubnaſcentibus alijs. Maturitas per Eſeſias. Alio tempore crudiuſcula decerpunt, ac reponunt. Magnitudo longioris piri. Amygdalæ putamine includitur, & corio, coloris herbidū nucem intus habet, ut prunū, ſed minorē multo mollioremq; ſuauiſſam carni prædulcis, & in nocua etiā largiorem mandentibus. Concoctu & deiectu facilem. Radice prægrandi. Materies longitudine, craſſitudine, copia, inter cōmodiſſimas bonitate, firmitudine. Nigritia quoq; nihil differens a Loto ea, quā Fabam græcā uocamus. Simulacra ex hac, & leſtulos, & cubilia faſtitauere, non tam decoro ligno q̃ ſideli, ut quod magna ex parte ſit contortū. Proindeq; nauale tantū eſſe cœpit. Hanc aliqui ruſcentibus Myxis fecere ſimilem. Perſeam hanc, non Perſicum, ut diximus, e Perſide in Aegyptum tranſlatā a regibus tradunt, propter ſupplicia: quoniam uenenata ibi eſſet, quod eruditiores tamen conſtāt negant: ſed a Perſeo Memphi ſatā fatent, & ob id Alexādrū illa coronari uiſtores iſtituiſſe in honorē Atrai ſui. Forſaſſe Theophrastus hanc intelligit, cum textilem Perſicā in Aegypto plurimā nemore Thebaico fuiſſe ſcribit. In quo & Aegyptia Spina, & olea, & quercus habeant, ut textilem a coronæ uſu dixerit. Quidam pro cūci capiūt Palmæ ſimili, cuius folijs ad nexus & textilia utant, & Perſicā textilem uocatā putant: quia Perſis in magno honore fuerit. Aliā a Perſea, de qua Dioſcorides præſenti mentione loquitur. De Perſea porro hac Columellæ uerſus illi forſaſſe fuerint.

Quin etiam eiſdem gentis de nomine dicta,

Exiguo properant miſcere Perſica malo.

Plutarchus auctor grauiſſimus, Perſeam arborem inter omnes iſidi gratiſſimā, & in Aegypto maxime celebrari tradit: quia fructum ferat cordi ſimilem, folium uero linguæ.

C
i6p18

¶ De Iberide.

CAP. CLXXXVII.

Iberis, siue Cardamantica, folia habet Nasturtij, uere uirentia, caulē cubitalem, aut minorem. In incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes, & adurentes. Ipsae enim ischiadicis cum salsa axungia emplastro utiles, quaternis horis alligatae, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

Pli. lib. 25. ca.
8. 12. & lib. 26.
cap. 8.

Hiberida, siue Hiberiada, & Hiberiden herbam comperit Seruilius Democrates, assignato etiam inuentioni eius senario. Nascitur maxime circa uetera monumenta, parietinasque, & inculta itinerum. Semine tam paruo, ut aspici uix possit. Radici odor nasturtij: de quo Cardamantina, & Cardamantice, & Apollonio Cardamen, & Hiberidis appellata est. Vfus aestate melior, & recenti tantum. Tunditur difficulter. Galenus Hiberida eandem esse cum Lepidio uocata conijcit. Carmen quoque Democratis ipsius praetextuit, ex eius libro qui Clinicus inscribitur. Multa de hac Archigenes, in epistola ad Aristonem: eamque Lepidion & Agriocardamon, id est, syluestre Nasturtium uocauit. Vidimus hanc Venetijs, specie qua describitur a Dioscoride ac Plinio. Illud adijcimus, folia ei pusilla esse, qualia Nasturtio. Semen quoque in siliquis admodum pusillis, tam exiguum, ut cernere non liceat. Flos item pusillus, & lactei candoris. Differt Hesperis ab Hiberide. Nomen uero Hesperis inuenit, non ab Hiberia, sed ab re: quoniam ut Theophrastus inquit, nocte plus oleat quam interdiu, contra quam herbarum plurimae.

D

ἡλικακάβο

¶ De Halicacabo.

CAP. CLXXXVIII.

Halicacabum aliqui Dircaeon, alij Strychnon, alij quod infanrentur, appellauere, Rhomani Apollinarem minorem, aut Vlticanam herbam. Alij Opsaginem, Daci Cocalidam, Aphri Cancabon. Frutex est multos habens ramos, fractu peruioces, furculosos. Folia plurima, pingua, Cotoneae malo similia. Florem rubrum. Acinum in folliculis paruis croceum, ciceris magnitudine. Semina quina, senuae Erui modo rotunda. Nascitur in petris non procul a mari. Huius succus cum uino potus drachmae pondere somnum conciliat, ut papaueris opium. Semen urinam cit. Dantur hydropicis duodecim corymbi. Plures autem potum mentis alienationem creant. Remedio est aqua multa copiosa potui data. Succus & cortex miscentur pastillis, qui doloris sensum auferunt. Decoctum in uino si in ore contineatur, dentium dolorem mitigat. Radicis succum melle illitus, oculorum hebetudines discutit.

DE Alicacabo una Strychni, hoc est, Solani specie, quarto uolumine differt: ibi quae hic in Dioscoride leguntur repetita sunt ad uerbum fere: quod libro quarto pro secunda Solani specie, primo pro tertia uidetur accepisse: nec Alicacabum ibi hanc appellat, sed quod uerius est, Hynoricon. Alicacabus enim uera est, quae quarto uolumine describitur.

¶ Finis LIB. Primi.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Secundus,

IO. RVELLIO interprete.



PRIORE, charissime Ari, libro, quem de Medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguētis, arboribus, & nascentibus in eis succis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc autē secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frumentis, atq; oleribus explicabimus, subnexis herbarum quæ acri prædita sunt facultate: utpote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint. Qualia Allium, Cepa, Synapi intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse uideamur.

De aquatili Echino. CAP. I.

Marinus Echinus stomacho uentriq; utilis est. Vrinam cit. Huius testa recens inassata, commode medicamentis ammiscetur, quæ psoras abstergunt. Crematæ uero cinis, sordida ulcera expurgat. Luxuriantem carnem reprimat.



HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ
Corollariorū LIB. Secundus.

ERINACEVS marinus, quem Græci Echinos thalassion appellant, alius piscis est ab eo, qui Echneis, hoc est, Remora, siue Remeligo dicitur, adhærens nauibus, & medio mari cursus earum impediens, palmari crassitudine, pedali, semipedaliue amplitudine, magnæ Limaci similis, Odynolyon appellatus a quibusdam, quia partus grauidis adalligatus, resoluat inueteratus sale. Alij & muricis genus quoddam hoc nomine, potentiaq; accipiunt. At Echinos, id est, Erinaceo, spinæ pro pedibus sunt, quibus uoluit in orbem, nec aliter ingredi. Itaq; detritis sæpe aculeis inueniunt. Ex hoc genere appellamus Echinosmetras, & Iulius Pollux, Metras: quibus spinæ longissimæ calicesq; minimi. Neq; omnibus idem color utitur. Circa Toronem candidi capiuntur, spina parua. Oua omniū amara, quina numero, nec nisi per hyemem, atq; plenilunij. Ora in medio corpore in terrâ uersa. Tradunt sæuitiā maris prælagire eos, quoties correptis operiuntur lapillis. Echinos aliqui & Patangas nominant. Sed Aristoteles tria eius genera dinumerat, Ouarios, qui & mandatur, Patangas, & Bryssos. Haberi & fluuiatiles Echinos, Paulus Aegineta prodidit.



MARCELLI VERGILII

in Dioscoridē ANNOTATIONES abbreviatæ.

Maria hæc una Echini appellatione Græci indicauerunt. In mari, & in testaceo genere piscis, cui natura est, spinis quasi pedibus, & earū in orbem uoluntatiē ingredi. Mox in arida, & in quadrupedum genere, quod nouerunt rura omnia, animal aculeato omni corpore, præterq; ore, pedibus, & ex inferiore parte, infestis & ad titulus semper paratis spinis, quibus salutem uitamq; suam, a canibus & uenatoribus tueri posse se credit: cui natura sit, in periculo in globum circumagi, nec nisi spinas ostendere & porrigere. Quam ob causam Acanthon etiam Græci id uocant. Postremo Castaneorum, a consimili

C spinarum figura & noxa, summum illud operimentum, quod pauloante descripsimus: de quo satis dicta hæc sunt. Quod enim ad terrestrem pertinet, a marino statim dicitur: cum pleræque legentes in eo monuerimus, quorum id primum erit. Non probati ab Aristotele libro. 4. de animalium historia, ad sciendam urinam marinos Echinos omnes, sed ex multis quæ ab eo illic numerantur unum tantum genus, quod in exiguo corpore longissimas & durissimas spinas habet, nec nisi in altis gurgitibus inuenitur. Verba eius hæc sunt, πρόσ δὲ τοῦ τοῦ ἁλλοτρίου μέρους ἀναγκαῖον ἔχειν μεγάλας καὶ σκληρὰς γίνεσθαι δὲ ἐν τῇ θαλάττῃ ἐν πολλοῖς ὄρῳαῖς ὡς χράνται πρόσ τὰς τραχηλίας τινος. Estque eorum sensus qui antea dictus a nobis est. Legentes monemus, etiā uideri nobis nō esse integrū, quod in omnibus græcis passim legitur, ὅτι τὸ ὄσρακον ὡρὸν μίγνεται χρεῖματι ὁ πῦρ ἐν τοῖς πρὶ τὰς δάρας σμικρὰς. Si enim quale id membrū est uertatur, non aliū fieri sensus quæ cruda marini Echini testa misceri utiliter tostā his, quæ ad extirpandas scabies cōficiunt. Ac qui possunt, nulla intercedente copula, aut dictiōe alia, simul præcipi & doceri, cruda, & tostā. Necesse itaque omnino est, aut copulā intermiscere, quod nos fecimus: aut disunctionē, quod forte fuit, aut (quod nos magis credimus) suspicari aliquot deesse illic uoces, quibus in cruda Echini testa utis, usus, aut remediū aliquod doceretur: cui deinde de tostā & cremata subiiceretur, quod ad læuigandas cutis asperitates pertineret. Id enim cineres, præsertimque marinariū testatū maxime possunt, ut in Purpuriis mox patebit. A qua potestate longius cruda abesse uidentur. Neque in huiuscemodi remediōrū rationem facile admittuntur.

χρεῖματι ἔχουσιν

καὶ χύματι

T Errestris Herinacei corium combustum, alopecij cum pice litum quida aptissime illinitur. Afficcatur corpus, & cum aceto mulso potum, renum uitij auxilio est. Item aquæ quæ cutem subiit, conuulsionibus, elephantia, & male habitis, quos cachectos uocant. Viscerum fluctiones exiccat. Eiusdem iecur testa insolata arefactum, ad eodē usus utilissime reconditur.

Pli. li. 31. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Erinaceus terrestris, id est, Echinos chersæos, & Acanthion epigios, uallatus est aculeis extra quæ ore, pedibusque, ac parte inferiore, quæ rara tantū, & innocua lanugo operit. Vbi uenantem sensere, conuoluuntur in pilā, ne quid apprehendi possit præter aculeos. In desperatione urinā reddunt tabificā, spinis, & tergori propter quod petuntur. Ideoque artis est, uenari eos exinanito prius lotio. Capti, aquæ calidæ aspersu resoluuntur, & suspensi posteriorū pedum altero, enecantur inedia. Hac cute uestes expoliuntur. Cibos sibi præparat in tempus. Etenim uolutatus supra poma iacentia spinis affixa, unū non amplius tenens portat in cauas arbores. Idem mutationes aquilonis in austrū prænuñciat, condens se cubili. Echinus, Græcis uas æreum significat, in quod testimonia coniecta signabatur. Sed & foeni partem, & ollæ genus. Item muliebribus ornamentis non dissimile omnino brachialibus, & armillis. Pollux auctor. Dicuntur & in casaneis Echini. Eos tamen latine qui Erinaceos uocant, non inuenio.

E X M. V E R G. C O M M.
Credidit quondam antiquitas, homini ut pleræque alia animalia inuidere etiā terrestrem Erinaceum. Testatusque id Theophrastus est in eo quod reliquit commentariolo de his animalibus quæ homini inuidere dicuntur, quæ ille multa numerauit, Stellionem, Ceruum, Equum, Phocam, Lynxem, & pleræque alia. Quorum Stellio exutam uere tuniculam, anguim modo deuorat, statim comitialibus utilem: cuius rei & Plinius testis est libro trigésimo, capite tertio. In locis fenestrarum, aut sepulchrorum cameris frequens hoc animal inueniri ostendens. Solereque, qui eorum membranas has uenantur, incipiente uere, ex fissis harūdinibus textas, illis ueluti casās opponere: quarum angustij id animal gaudet: eoque facilius circundatū torporem exiit, quo inter harundines eas relicto non possint remeare. Nec ultra Plinius quicquam dixit, quod nullum animal fraudulentius inuidere traditum esse, cogitandum legentibus quod nos dicimus relinquens. Ceruus dextrum cornu terra obruit, contra rubetarum uenena necessarium. Equus pulli sui hippomanes præcipit, ad amoris ueneficia quæsitum. Phoca coagulum euomit, eiusdem comitialibus opatum. Et Lynx urinā suam celat, multi in medicina usus, & in delictis uitæ ad anulos expetitā. Sed omnia falso inuidere homini creduntur. Nullus enim brutis inuidiæ contra hominem sensus est: merumque perturbata, aut aliter affecta id agunt anima-

lia hæc. Verisimileq; est Phocā, cū capi & teneri se sentiat, metu, doloreq; id pati. Sigdē in eodē affectu, idē aliquando hoies animo pturbati patiunt. Et Stellionē tuniculā suam, & equū pulli hippomanes eodē, aut nō dissimili naturæ affectu deuorare, q; canes & sues a partu statim secū das suas etiā deuorare dicuntur. Lynceq; & Ceruos ignotā nobis habere eius qd agunt aliquā eām. Multa em̄ huiuscemodi bruta agunt, quorū reddi rō a nobis nō potest. Ex hoc animalū homini inuidentū gñe, terrestris Erinaceus antiq; esse creditus est. Is em̄ teneri se sentiens, metu, affectuue alio pturbatus, in globū se circūagit, circumactūq; noxiā spinis & cuti suæ urinā remittit: cuius cōtagio corruptæ, nec multo post deciduæ spinæ; desinūt in artibus habere usū, & in medicina corū inutile fit. Eius cinerē ad Alopecias nō hic tm̄, sed uetēres Græcorū medici, & Plinius p̄cipue utunt, ob egregiā siccādi, discutiendiq; uim quā habet. Quia etiā potestate in ueterata eius caro hydropi, quē Græci, Anasarca, uel Hypofarca uocāt, mederi a Dios. dicta ē.

De Hippocampo.

CAP. III.

Hippocampus marinum animal est, exiguum, cuius cremati cinis cum liquida pice, aut axungia, seu amaracino unguento illitus, alopecias replet.

B X M. VERG. COMM.

Credimus olerū & plantarū erucas, quas Græci Campas dicunt, marino pisci a similitudine nomen dedisse. In locustarū enim genere Hippocāpus a ueteribus numeratur. Breuem, paruumq; hunc piscem scriptor hic ait esse, & nihilominus magnitudinis nota illi coniuncta est. Quod enim Græci hippo, multis in natura adiiciunt, grande significat, ut in Hipposelino, & Hippomarathro, aut Hippolapatho indicabimus. Sed id sic intelligendum est, ut comparatū hoc animal, olerū, aut arborū erucis, grande sit: marinis uero beluis & piscibus, breue & paruum. Nec aliud hic intelligi uoluit dicens, paruum esse marinum animal.

De Purpura.

CAP. IIII.

Purpura usta exiccat. Dentes abstergit. Excrecentias in carne cohibet. Vlcerā purgat. Et ad cicatricem perducit.

B A R B A R I C O R O L L.

Purpura, a Græcis Porphyra nuncupantur. Hinc ipsas quoq; uestes Purpuras uocamus, auctor est Theopompus, tū quondā prech fuisse, ut æquali argento penderentur. Nemo ignorat, Ostreorū quoddā genus esse purpurā: idq; sanies eius, quē testis detractis colligere, Ostreū, ut Vitruius inquit, appellata est. Ostrea porro inquit Galenus, penultima correpta, & producta differunt. Producta genus est Aristoreli, ad oīa testacea, ut per diphthongum u scribantur, uidelicet. Correpta uero species est eius una. Quibus respondere apud nos quidā uolunt, conchā, per. x. & Conchā per. c. Sed auctores ipsi sunt, nec præter ipsos alius. Athenæus, ueteres per u diphthongū proferre solitos affirmat, nec aliter locutos Cratinū, & Archilochū, Platonē correpta. Sed placet Galeni ex Aristorelis auctoritate distinctio. Porphyrides ex auiū sunt gñe, a Porphyrioribus diuersæ: sicut ab utroq; Lathiporphyrides, siue Adiporphyrides, & lathiporphyra. Illud obiter notauerim, Porphyriones a nobis uisos esse in agro Patauino, allatos ex Hispania, quos ibi Telamones uocāt: siue quia statuæ uiriles, quibus mutuli & coruæ sustinent, ita nominātur: siue quasi thalamorū & pudicitie custodes. Etenim scribit Athenæus, uolucrem hanc sensum adulterij habere, ac significare id patrifamilias, in cuius domo alitur, nō uocē quidem, aut omnino aliter q; suspensio. Nisi quis Telamones, quasi nutriculas esse dictos putet. Ita enim Græci Altrices uocāt. Porphyriori similis est Tetrax appellatus, ut Athenæo placet, Gallōs gallinaceos uincens magnitudine. Vox grauis. Caro si mādatur, strutionis sapore. Pendunt ei ex auribus utrinq; cartilagines, atq; cristæ, ut in Gallo Gallinaceo. Epicharmus, & Alexander certe myndius, qui aues scripsit, pusillā uolucrem hoc nomine intelligunt. Tetrax inquit auicula est, a uoce dicta, quā oua pariens emittit. Plumis color macularum sorde uariis, perpetuisq; lineis. Magnitudine Spermologi eius, quā nos Spicilegam, siue Frugilegā uocare possumus. Quæ Frugilega nomen generis est, ita uictū quærentis apud Aristorelem. Rura ipsum passerculū uocant Spicilegā, detrita modo priore syllaba. Ab eodem auctore Scolopax, atagenis colore tradit, Gallinaceo generi persimilis, quā Theodorus Gallinaginem, uernaculā uocem secutus (ita enim uulgo nominatur) interpretatus est.

A

πρὸς αὐτὸν

πρὸς αὐτὸν

B

Plin. 9. ca. 36.
37. 38. 39. 40.

C
hēpvaio

¶ De Butcinis.

CAP. V.

Pli, li. 9. ca. 36.

EAdem præstant concremata Buccina, sed uehementius urunt. Si quis salis plena, fîcili crudo adurat, dentifricio conueniunt. Am-
bustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamētum non oportet. Nam
posteaq; uulnus cicatricē duxerit, ipsum in testæ modū indurātū, sponte
sua decidet. Fit etiā calx e Buccinis, ut in eius mentiōe demonstrabimus.

BARBARI COROLL.

Buccina, a Græcis Ceryces dicitur. Muricū nomen gñalius esse uideo, q̃ Buccini, ut pote
quod & Purpurā quoq; cōprehendat. Illud notare libet, Cerycas a nostris uerbū ex uerbo Buc-
cina cōuerso esse, q̃ Ceryx idē sit quod Præco: q̃q; & a cera, quā mucō similē attritu mutuo
saluant, cognominari posse uideantur: quod Græci *μυρία* dicunt. Muricum generis sunt, in-
quit Plinius, & quæ uocant Græci Colycia, Alij Corycia, turbinata æque, sed minora multo,
efficaciora etiā, & oris halitū custodientia, Athenæus hæc non muricū, sed chamarū generi-
bus contribuit: easq; in Macedonia *καρυκός* dici, Athenis *χρύα*. In cætera Græcia, Tracheas,
hoc est, asperas, uocari prodit: quod & Plinius fere aliubi secutus uidetur.

EX M. VERG. COMM.

Non parua naturalis historiæ partem, mare & maritima faciunt, nec parum in homine lau-
danda eorū cognitio: tam late uis utriusq; rei patet, totq; modis ad uoluptatem, necessitatemq;
humanā instruunt uitā: & tanta est in mari nascentiū uarietas, quæ si quis numerare, & ex his
quas habent notas secernere conet, quod pene impossibile sit incœperit, & huic scriptori inui-
lem laborē inierit: qui ex tā multis pisciū, & testarū quæ toto mari nascunt generibus, pauciora
quædā ad hominis morbos & medicinæ usum elegit. Poterūt uolentes ex Aristotele, Plinio, &
plurimq; alijs reliqua longius & certius cognoscere, & qd ad Purpurarū Buccinorūq; sapores,
& in medicina uires aliquas priuatim ptinet, nō contemnendā ab Athenæo historiā, quo loco
de Ostreis agit, audire: Nos eā ganæ multū, medicinæ uero parū necessariā relinquimus.

D

¶ De Ionijs.

CAP. VI.

iovia

Ionia uocantur Purpuratum Buccinorumq; media, qua parte te-
stæ uolumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maio-
rem Purpuris Buccinisq; facultatem urendi consequuntur, ut pote cum
ea parte eorum natura prematur. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, &
stomacho utiles. Sed aluum non molliunt.

BARBARI COROLL.

Ionia, sunt qui florē esse credāt eum, quē Purpuræ, ut Aristoteles scribit habent, & Buccina,
& qui a Democrito Anthos porphyrios dicat. Alia nigrū, alia qd rarius est rubentē, mediū in-
ter Papauerculū & Ceruiculā, ut Athenæus testatur. Est aut Papauerculū in Buccino pars eius
ima esculentaq;: q̃q; ois callus pinnae & conchilij interior Papauer quoq; dicit, ut idē auctor
cet, quæ supra uentrē eius folliculi specie conspicit, liquore plenus, non atro ut in sepia, sed ru-
bente. Ego in Dioscoride nō Ionia, sed Cionia, hoc est, uerbū e uerbo, Columellā lego: ita scri-
ptū in exēplaribus aliquot inuenias. Est & uasculi genus Cionion, siue Cion: quo noie in ho-
diernū usq; diē utunt Caupong, hoc colūnas, a nostris ex interpretatione Greca uocitatū putes.
Vnde apud iuris pitos Colūnariū: q̃q; non colūnariū, sed colūbariū fortasse pñunciandū sit.
Instrumenti genus ita nominatur Vitruuio, ad aquā hauriendam, per tympana. Etiam si a col-
bis, sed a græco uerbo, quasi colymbarium uenisse: quando Græci *κολυμβάριον*, & colymbistas uo-
cant, quod nos urinare, & urinatores dicimus. Vrinatorium ergo uas, quō uidelicet aut Vi-
num promitur, aut aqua, Columbarium a ueteribus dictum existimare possumus. Alioquin
& columbæ ab hoc ipso uerbi Græci significatu appellantur. Quid si Columbarium apud Lu-
M. Varro. Altera inquit, uinaria mensa erat lapidea, quadrata, oblonga una Columella, uo-
cabatur Cartibulum, in qua uasa ponerentur ænea.

De Myacibus.

De Myacibus. CAP. VII.

MYaces laudatissimi in Ponto. Cremati eundem Buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamenti cum melle utiles habentur. Genarum crassitudines absumunt. Albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus utilissime imponuntur.

A R R B A R I C O O L B L.

MYtuli, Græci Myas, & Myacas appellant, Hippocrates Scaphidas. In harenosis sponte natura proueniunt. Quidam prius his genus faciunt eorum, qui proprie Myes dicantur: quorum proprietates sit, congregari muricum modo, & uiuere in algolis. Si mutuo attritu, lentore cuiusdam ceræ, Melicram uocatum, saluant. Gratissimi autumnis sunt, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari. Ob id in Aegypto cõmendatissimi. Procedente hyeme amaritudinem, coloremque rubrũ contrahunt. Degenerant, ut Athenus & Plinius testant, in duas species. In Myias, idest, muscas, & Mytulos. Mytuli sale, uirumque recipiunt. Muscæ, siue ut in exemplaribus quibusdã Plinianis legit, Myiscæ, differunt rotunditate, minores aliquanto, atque hirtæ, tenuioribus testis, carne duriores. Laudantur apud Græcos Ephesij. Est & piscis Muscæ, Ponto cõmendatus, ex Atheno. Plautus in Rudẽ, nominat quẽdam Musculos. Captamus inquit Echinos, Lapadas, Ofstreas, Balanos, Vrticam marinam, Musculos. De Mytulis intelligat, an de pisce Mure, iudicent legentes. In Aristotele Mystocetus piscis, a Theodoro Musculus conuertitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ sequuntur Tellinas, non Myacas, Mitulos a Romanis dici testatus Athenæus est. Nos tamen aliorum in ea re obseruationem secuti, Myacas, nõ Tellinas Mitulos uocauimus. Similitudo, & idem fere eorum natales, nominum uagam & incertam hanc rationem faciunt. Quod in multis fieri quotidie uidemus, deficientibus in tanta rerum naturæ uarietate & copia, proprijs earum appellationibus. Est in Mitulis his, ubi nos legerimus mederi eorum cinerem palpebrarum asperitati, non crassitudini. Idque Paulus Aegineta lib. 6. etiam cõfirmat, nisi uicium in eo sit. Nos tamen cõmunem lectionem secuti sumus, confirmante eã Plinio, qui lib. 32. cap. 5. de mitulis hæc ait. Lauantur quoque plumbi modo ad genarum crassitudines, & oculorum albugines. Persuasit & illud etiam, nihil in his mutare: quod facillimus lapsus est in græcis ab asperitate, in crassitudinem: siquidem una tantum mutata litera, τριχῆ, quod asperum, τριχῆ quod crassum est fit: multisque locis occurrit in hoc scriptore huiusmodi uicium. Crassitudo autem genarum, quam nos crassas palpebras uertimus, Galenus in Iliacis sua fieri dixit, cum inuersæ a nativo habitu palpebræ, duriores, carnosioresque fiunt.

De Tellinis. CAP. VIII.

REcentes Tellinæ aluo utiles, sed maxime ius earum. Salitæ uruntur, tritaque in cinerem, & cum cedria instillatæ, auulsos pilos resanari non patiuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Qui Tellinas interpretatur in Martiali poeta Mytulos, improprie locutos arbitror. Cũ aliud genus esse Mytulos, aliud Tellinas Dioscoridis autoritate cõstet, Athenus certe Mytulos a romanis uocari, eas uidet existimasse. Suntque Tellinas, & Crenia, idest, Pectuncullos, idẽ esse iudicant, a celeritate crescendi nominatas, ὅτι τὰχιστα γίνονται τινῆται, hoc est, ocylissime p̄ficiunt. Quod Aristoteles, tã Pectunculis, quã Purpuris tribuit eodẽ. Anõ em̃ magnitudinẽ totã implẽt. Plinius certe medicinas quæ hic de Tellinis reddũt, ad uerbũ fere Pectunculis adscripsit. Tellinas ad Canopũ in ægypto frequẽtes esse narrat: quarũ tenuiores, exiliioresque, Basilicas, hoc est, regias appellat: his dulciores esse fluuiatiles e Nilo. Romę circũferunt pusillę quẽdã cõchule, quas quendũt, Tellinas predicat. Hę uulgaribus conchis minores, & leuiore sunt, & cadidę, nec striatę: quas Veneti piscatores, a capparis similitudine, Capparoculas appellant.

E X M. V E R G. C O M M.

Nullibi, quod hæcenus legerim, Plinius Tellinas appellauit: et nescio, an cõmune hoc multis in mari nomen sit quę celerrime in integram ætatem absoluuntur, Nouit nostra ætas Tellinas

A

μύακισ

Pli. li. 32. cã. 11.

B

tellinas

D I O S C O R I D I S

C In mari ubiq; nascentes, quotidiani in cibis usus. Nihil illis Paulus Aegineta tribuit quod non a Dioscoride illis tributum fuerit, priuatim primo sub Tellinarum titulo, mox iterum ubi de omni esculento iure agit, quo loco Tellinarum aluum maxime deicere ait.

Χημαί

De Chamis. CAP. IX.

Pli. li. 32. ca. 11.

C Hamarum, Conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. Id cum uino assumitur.

BARBARI COROLL.

C Hamæ, a Græcis χημαί, species sunt Cōcharum. Aliud in mari uidetur piscis esse genus Chamæ, quas Hiaticulas quidam interpretantur, habentes uuluam. sicut & qui Erythini, hoc est, Rubelliones dicuntur. Nisi quis ita distinguendum putet, quod & Aristotelis præferunt codices, ut Chamæ hiaticulæ interpretetur: Chamas autem concharum speciem agnoscat. Chamarum duo redduntur genera. Tracheæ, hoc est, asperæ, mali succi, quas & Ostrea cognominant, & in Macedonia Corycos, & Athenis Crios, ut in Murice diximus. Alterum læues, multo meliores, & crassiores, ob id & Pelorides, & Pelorinæ a quibusdam, & Basilicæ uocantur, & ab Helio spartiano Liofrea. Etiam si lithofrea mendose legeretur. Eset hic de Conchis, siue quod idem est, Ostreis, & Conchylis tractandi locus, sed copia deterreor. Sufficiat primatum gulæ huic generi datum esse, adagio inde nato. Conchylia uiduarum cupediæ, ut est apud Sophronem mimographum, & Phalerum Demetrium. Nec illud prætermisero, Conchæ genus, ex qua margaritæ, unioesq; uellantur, Berberion, & Berberi ab incolis uocati esse, Pinæ, aut Pectunculi effigie, nisi q; nec aurículas habet ut Pectunculus, nec operculum exterius, sculpturis ullis asperum, sed læue. Coloris quoq; nomen Conchylum, & chliaro conchylum, & cōcha ægyptia Paralios cognomine, quam & Pninā uocat Democritus. Idem Chrysocōchylū fieri docet, sed fictitium, & metallicum, sicut & Chrysocorallium, quod item & geminæ est nomen.

EX M. VERG. COMM.

D Longa est in Athenæi ostreis Chamarum historia: q; forte sic dictas quondam fuisse ait, παρὰ τὸν χημῆναι, id est, q; aperto ore, & hiantes, contra q; alia in hoc genere semper sunt. Ex qua causa latinorum aliqui Hiaticulas eas appellauerunt, nominis rationem, & animalis naturam secuti. In genere minimorum ostreorum Chamæ sunt, tanta cū alijs affinitate, ut facile in antiquis scriptoribus cōfundat earū historia. Nihil difficilius in tota huiusmodi rerū cōmēratione est, q; in appellationibus his cōcordem ueterū historiā ostendere: ob id nos eam peritioribus relinquimus, contenti ab hoc scriptore didicisse, omnium huiusmodi conchularum in soluenda aluo eandē uim & naturam esse. Fuisseq; in deicienda aluo antiquis morem, conchulis his uti, indicauit M. Caro centesimo & quinquagesimo octauo sui de re rustica operis capite, inter cætera Mytilis tribus ad eam rem utens.

ὄνυξ

De Onyche. CAP. X.

O N Y X conchylj tegumentum est, ei simile quo purpura intergitur. Quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod Conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Coligitur posteaq; stagnantes aquæ æstiuis squalloribus inartuerunt. Laudatissimus qui a rubro mari deferitur candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atq; minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. Sed aliquatenus castoreū olent. Idem suffitu excitant fœminas uuluæ strangulatu oppressas, comitialesq;. Poti uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit quæ Purpura & Buccinum.

Pli. li. 32. ca. 11.

BARBARI COROLL.

O Nyx græce dicitur, quod nos Vnguem odoratum uocamus, Ostracium nonnulli appellant, siue Ostracon. Galenus Pomā, hoc est, cayū, siue quod idē est, Opculū, etiā in purpuris. Onycē uero Paulus testam uocari dicit conchylj diutaxat Indici, quod & Cōdyliō appellat. Condylōs certe Ostrei genus est, eidem Paulo, ut alios præteream. Vngues uocant & quos Solenas Græci dicūt. Eos deniq; Donacas, & Aulos, Theodorus modo Vngues, mō Digtos ap

pellat, in utroq; Plinium secutus, Hinc & piscatores Ostrearum Solinistæ nominabantur, ut Athenæo placuit. Et ampulla unguenti Onyx quandoq; dicitur, Porphyrio grammatico.

EX M. VERG. COMM.

Plinius Ostracum cōmuni omniū testaceorum appellatione uocari Onychen hunc dixit. Posteriores Blata bizantium dixerūt. Hic Onychem generis nomine etiā appellat: quando ubiq; nascentes testæ, in quibus leuor sit & candor, eodem hoc nomine censentur, quod ab ungue humano factum sit, & ad gemmas marmorisq; certum genus translatum etiā fuerit. Ex eodem enim humano ungue, quem græci *onyx* dicunt, Onyx: & Sardonyx gemma, & Onychite marmor ab antiquis dicta sunt. Ex eodē plura alia etiā, quæ in græcis & latinis passim leguntur. Variam naturā omnes has in mari testas, uoluitq; eas coloribus, figuris, & quantitate differre: ut nominibus etiā distinguerentur. Onychesq; priuatum dicti sunt, in quorum testis nulli margines, nullæ rugæ, nullæ concauitates, nullæ asperitates essent, sed toto corpore leuor & candor, quales in humano ungue sunt. Ex hoc genere indicus Onyx est. Dico autem Indicū: quoniam ut ab alijs seceratur, gentis nota illa nomini adijcienda est. Sic enim Paulus Aegineta eum appellat. Sic etiā græcorum ueteres aliqui codices adhuc habent. Sentiri in eo Nardi odorem Diosc. ait: q; in palustribus Indiæ Nardum ferētib; inueniatur, uescaturq; ea. Non satis certa re, quo modo in palustribus Nardus uiuat, cui in arida uita est: aut si iuxta paludes illas Nardus nascitur, quo nam modo ostreum, cui natura est scopulis in mari herere, extra aquam uesci in arida possit. Barbarus ut alterum scopulum uitaret, in alterum incidit, adiecitq; quod alioquin in Diosc. non legitur. Neq; em̄ ille ait, in paludibus Indiæ nasci Onychem, ubi regio eius nardifera est, sed inueniri in Indiæ paludibus Nardum ferentibus: nec alia præter hæc in eo sunt. Credimusq; nos respondere quæ in hoc capite leguntur, his quæ in Malobathro a Dioscoride & a nobis dicta fuerunt, plura. s. odoris similitudine in censum & nomen Nardi uenisse, quæ multa tunc numerata ab hoc fuerunt: & inter ea quod Malobathrum antiquitas uocabat, folium tantum quod in paludibus Indiæ fluitans inueniretur odore Nardi, leuorq; ad multos usus seruaretur. Nec tñ inclināt animus nobis, quas hic modo Indiæ nardiferas paludes dicit, easdem illis esse in quibus Malobathrum inueniri & colligi antea tradidit, sed pro comperto rem habere uidentur. Sigdem utrobq; ait sicari paludes illas æstare. Cūq; in eis Malobathrum inueniatur, odore Nardi foliū, & ob eum odorem in Nardi nomen a multis adscitū, nihil impedit, ne constituamus hoc loco, ex cōmuni omniū opinione, qui Malobathrum cū Nardo miscerent, Nardiferas hunc dixisse paludes, quæ re uera non Nardum, sed Malobathrum ferrent. Constitutoq; hoc, facile & sequax est quod sequitur, pasci Nardo in paludibus his indicos Onyches, parato & ubiq; exposito sibi cibo, & quem extra aquas contra naturæ suæ leges querere non cogerent. Nunq; enim legisse me memini, in ostreorū genere esse quæ ambigua sint, & quæ, qualia pleraq; alia quotidie uident, in aqua parit & arida agere possint.

De Cochleis. CAP. XI.

TERRESTRES Cochleæ, stomacho utiles sunt, & non facile corrumpuntur. Optimæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, Chio, & Liguria alpibus gignuntur, Pomatizæ, idest, operculares cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet. Quæ uero uepribus, frutetisq; glutinata coheret, quam uocant nonnulli Cefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omniū testæ, excalfaciendi & urendi naturam sortiuntur. Purgant lepras, uirilignes, dentesque. Emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si ustæ tritæque ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt. Sed non ante soluantur, quam omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt. Impactos corpori aculeos illitæ euocant. Menses tritæ & admortæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia,

A

B

κοχλίασ χερσαίος

Cum maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. Tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infranant. Viuæ corpus, & præsertim Aphricanæ cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. Trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, uesciæque cruciatus sanat. Terrestres, pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lentore, pilum attingat.

Pli. li. 9. ca. 56.
& 72. li. 32. ca.
11. li. 30. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.

Cochleam, & Limacem Græci Cochlian, & Cochlion appellant. Nam Cochlos, & Cochlos, marinos calculos significat. Est & Cochlos apud Aristotelem, animal testaceum, & aliud Limaces, a Theodoro dictum Umbilicus. Hoc & Cochlian est, ubi Aristoteles appeller, sicut Limacem quoque Cochlion. Nobilitas precipua Solitanis. A patria item Balearicis: quas in speculuncis nascetes, Cauaticas nominant. Aphricanis duplex genus. Nudarum, testarumque: quibus magna fecunditas. Sicut Illyricis amplitudo. Nam Siculæ commendantur quæ diu parue sunt: quia magnitudo duras facit, aufertque succum. Laudantur & Caprearum insulis. Præterea sunt quæ albae, siue albulæ dicuntur, in Reatino agro. Itemque acerratæ lateque, multifariam nascentes. Itæ minutæ. Iam aliæ in usu sunt, licet cibis damnatæ. Cochlearum uiuaria nepotibus priscis fuisse, sapientia, & farre, aliisque rebus alendo eas, tanto successu, ut singularum calix quadrantes, seu capereret. In Aegypti Nilo grandissimæ feruntur, uocales ululatum expressa similitudine. Saliua Cochlearum, quæ punctis, acu, uel stilo carnibus manat, a Græcis, ut Galenus inquit, Myxa dicitur, hoc est, mucosus lentor, siue mucor, mucosus. Limacem Teucer ad exemplum quæstionis ludier, ita finit, Animal sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, crustatum, oculos nunc exerens, nunc retrahens. Cicero, terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguinecassam. Inuenio Limacis genus Cocaliam ab Aristotele uocari, & aliud Abrotonem. Quamque sunt qui locustam putent, Item qui apem, Alij qui piratam in eo uocabulo intelligant. Strabo Cocleas prædicat Linusias, ab agro, cui nomen Lino est, iuxta Pityntem, medio inter Parianam coloniam, & Priapum spacio.

Libro. 13.

E X M. V E R G. C O M M.

Domiportam Cicero, græcorum more, qui *ψιλον* inter cetera nomina eam uocant, Cochleam dixit. Nec male una hac ratione laudata est necessario homini exemplo, ut sua omnia fecum ipse etiam ferat, & Prienæ sapientis modo eas domi suæ opes coaceruet, quas nec hostis ferat, nec populetur bellum. Idem Sanguinecassam appellauit: propterea, quod illi salua & mucosus lentor pro sanguine sit, quo in oculorum medicina, ut hic docuit, ueteres utebantur. Quibus, quod hactenus inuenerim, nullus fuit usus exsudati igne ex Cochleis humoris, quo nostræ ætatis medicina, præsentis remedio utitur in his, quorum corpora ad rabem lubrica sunt, & macie conficiuntur. Silicej operimenti cinere, carnibus, & crudis totis Cochleis contra aliorum hominis mala antiquitas tantum usa est.

uoxphvoo

De Cancris. C A P. XII.

CANCROrum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto consimili radices gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere prodest canis rabiosi moribus. Rimas pedum, sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiusque ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure elitati, ipsi profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauriunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.

Pli. li. 9. ca. 31.

A R R B A R I C O O L B L.

Cancer græce Carcinus, mirabile contra morsum canis rabidi remedium: præsertim ut Aethion parabat, qui popularis, & præceptor Galeno fuit, urens eos æstate in patella uiuos sub canis ortum, cum sol in Leonem transisset, non nisi, is, luna. Pelops medicus, idemque Gale-

ni doctor, qui rerum omnium causas, & effectus scire profitebatur, hanc Cancrorum uim in Canis morsu, qualitati corporis, ac materię non proprietati naturę tribuebat. Nec fere quisq̃ est, qui eum sequatur.

T De terrestri Scorpione. CAP. XIII.
Terrestis Scorpio tritus & impositus, suę plagę remedium est. σκόρπιος χιρ-
σαίος
Quin inuenitur affatus ad eadem prodesse.

BARBARI COROLL.
Scorpionum duo summa genera fere traduntur, Terrestres, & Marini. Sed Pausanias uisse prodit & uolucres, pinnatosq̃, ut locustę sunt, e Phrygia in Ioniam translatos.

M De marino Scorpione. CAP. XIII.
MARINI Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, σκόρπιος θαλάτ-
τιος
albugines, & hebetudines.

BARBARI COROLL.
Scorpionum, alij Pelagi sunt, atq̃ alto mari capiuntur: alij Palustres, ac cœnosi potius. Pręferuntur sapore pelagij, quos & rufos colore prædicant, cum alteri sint subatri. Aristoteles & Scorpilas nominat. Nec constat, pro diuerso, an pro eodem genere acceperit. Scorpiana certe, ut Athenæo placet, euidenter a Scorpione differt.

D De Dracone marino. CAP. XV.
Raco marinus replicatus atque impositus, ictus spinę suę qua ferit, medela est. δράκων θαλάτ-
τιος

BARBARI COROLL.
A dictum est huic Draconum generi Marinum, ut a terrestribus Aethiopis distingueret: Pli. li. 8. ca. 13.
qui, ut inquit Aetius, non ueneno, sed dentibus, quos similes aprugnis habent, opprimunt: colore enim uno, sed alij ruffo, alij cinereo, alij nigro. Pręterea iubarum umbra tecta, prominentibus e mento barbulis, ore uasto, lingua præpeti.

EX M. VERG. COMM.
Non ab re fuerit quesisse, ut in Scorpione dictum est, an eundem illum Draconem qui uulnerauit, medicinam uulneri a se facto, facere dicat: an ex eodem genere quem potuerit aliquis habere. Nobis in priorem illam partem animus inclinat.

S De Scolopendra. CAP. XVI.
SCOLOPENDRA in oleo decocta, si illinat, auellit capillos. σκολόπενδρα
Sed contactu pruritus facit.

BARBARI COROLL.
Scolopendra Marina dicitur, quoniam et terrestris sit, ut post liquebit. Dioscorides Ophioctenam quoq̃ nominat, aut Scolopendram, aut uermē scolopendrę similem accipiens, libro huius opis extremo. Emorsis inqt a Scolopēdra, siue Ophioctēna, locus ambitu colliuiscit.

EX M. VERG. COMM.
Vales terrę Scolopendrę, siue Centipedes sunt, tales & marinę, longiores, tereti corpore, & infinitis pene pedibus ingredientibus, notissimum omnibus insectum, & ex quo rustici futurę pluuię præfagia aliquando accipiant.

M De Torpedine pisce. CAP. XVII.
MARINA Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet. Eadem apposita, conuersam sedē, νάρκη θαλάσσια
prociduamq̃ coerct.

BARBARI COROLL.
Torpedo, a Gręcis dicta Narce, nomen utraq̃ lingua ex argumento inuenit, quod etiā e longinquo, aut si hasta, uirgaue attingatur, quamuis præualidos lacertos torpescere, q̃libet ueloces ad cursum pedes, alligari faciat. Est & Turpæna piscis maritimus, a quo Cerati quoddā genus, ad duricias emolliendas appellatum est a medicis, ut est apud Paulum.

C E X M. V E R G. C O M M.

AB euentu græci suam Narcem, Romani suam Torpedinem dixerunt. Vtriusq; enim in sua appellatione eadē piscis nota & uis indicatur: quæ tanta esse traditur, ut hamo capta, per ferrū, le tam, harūdinemq; in piscatorē torporis sui naturā & uim Narce trāserat, & limo obruta, adnatantes pisciculos eodē torpore imobiles corripiat. Ignauī ingenij piscis, & qui, quā alij manū festam & generosam uenationem faciunt, clandestinis dolis, & quasi ueneno quodam hæc sibi acquirat: quasi Maronis illud ad uitam magis laudauerit, Dolus, an uirtus quis in hoste requiratur: Hanc Paulus Aegineta uiuentem, ad arcendos capitis dolores capiti imponi iussit: idq; eodem illo torpore facere, quo membra omnia hominis contactu eius torpere creduntur. Viuentem præterea in oleo coqui, oleoq; illo utiliter inungi articulorum dolores: & præter hæc, quod hic de procidente & inuersa sede ait. In cuius mali significatione, non placet quod Barbarus ait, procidentis interanei, aut euerſi morbum coeret. Latius enim interaneum patet, & hic sedem tantum dicit: & inuersam, non euerſam eam partem appellat.

Exolusio pagæ

De Viperinis carnibus. CAP. XVIII.

VIperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt. Nervorum uitijs auxiliantur. Increſcentes strumas reprimunt. De tracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne uacant, amputari debent. Quippe commenticium est, quod præcipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. Reliquum uero corpus elotum, dissectumq; discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui Viperas esitent pediculos procreari, quod plane a ueritate abhorret. Adijciunt alii qui, longam senectutem agere, qui eo cibo uestuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem Vipera in fictile nouū demittitur: adijciuntur salis, caricarumq; tritarum singulatim quinque sextarii, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur: qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plarumq; quo stomacho gravior fiat, immiscetur Nardi spica, aut folium, aut Malabathri momentum.

Pli. li. 10. ca. 62

B A R B A R I C O R O L L.

VIpa Echis, & Echidne a Græcis uocata. Sed prior mas, sequens femina est. Hæc colore sufflato, multis maculata capillamentis cernit. magnitudine cubitali, aliquā etiā palmorū ternū, utiq; si nō sit Indica. quippe quā cubitorū. s. & dodratis a se uisā Nearchus, & Strabo prædicat. Cauda Vipere nō paulatim gracileſcente, sed uniuersim, & prius Vipæ, & sine carne. Oculi subrubet, caput latiusculū, ceruix angustior. Alnus pminula, meatus ad extrema caudæ. Incessus gæti proximus, dentes canini quatuor. Contra mari, angustius caput, ceruix crassior, corpus uniuersū tenuius & perierius, meatu superiore uetris præ festinatius. Dentes canini duo, totidēq; uulnera. Horis septē, sumū die. i. cōficiūt Vipæ. Sūt q; Dipsadas a Vipæ nō distinguat: nisi q; Dipsades falsa loca incolūt: unde fiat, ut caro earū falsa q; sentiat, alienaq; sit medicina, uehementissimā sitinā ferēs utētib; et inde nomē: quales in Africa plurimæ nascant. Nullæ in Italia, ppter cæli, soli q; mollici. Hoc se Gal. Romæ ab ijs, q; serpentes uenant, Marſiq; dicant, accepisse scribit: nec tamen omnino credere. Cubitales esse phibent crassitudine, in gracilitatē se minuēte, nigris & rufis tibus in pūctis maculis, angustiore q; Viparū capite. Diosco. etiā Presteras uocari eas uoluit. Solinus distinguit. Percussus inqt distendit, & corpulētia enormi diffilit. De Vipæ, ut cōstat, Theriaci pastilli sūt, q; quæadmodū cōficiāt, alio loco indicabimus. Vipera Italia mō aut nō habet, aut nō agnoscit. Quæq; sūt q; Marſos Angues, ut inqt Eustathius, & ut uulguſ ipsū mō uocat Marasos, p Vipis accipiāt: ita passim uocant. Hispanis, ex qbus q sūt minus atri, Aspides rubris dicunt. Aspidū uero tria gēna. Chelidoniæ, ab hirundinū colore, iuxta ripas amniū, sed Nili præcipue uersant, paulo cubitalibus maiores. Secundū genus Cherſæ, hoc est, trerese, sub uiridi fere, aut cineris colore, cubitorū quinū. Maiores ijs sunt Ptyades, qbus idem color, sed & auro quoq; proximus. Intra horas oēs cōficiūt; celerius Chelidoniæ, tardius Ptyades. Mas

binos ictus, femina quaternos relinquit. Pyradem fuisse, quam Cleopatra sibi admoovit, Galenus auctor. Hæc ceruicē exporrigens, metū ex interuallo quē feriat, Solinus Hypnalem dicit appellari, necantē somno, qua uitā sibi Cleopatra inuiderit. Aspidas in Aegypto, Nicædæ ait, sunt qui ferūt alias dodrantes, quæ citius interimāt, alias etiā passum iustū longas.

EX M. VERG. COM M.

Negabant quondā Marſi, gens quæ in Italia impune serpentes uenaret, & tractaret, Viperas in nostro orbe nasci, ob cœli temperiem, & molliorem soli naturā. Id tamen non credere se Galenus ait. Omnes contra Aphricæ, peculiare hoc naturæ malū potius, q̃ animal esse testati sunt. Idem non satis certe genus & formā Viperæ descripserunt; alijs Dipladem; alijs Præstetrem; alijs aliud genus & nomen Viperæ assignantibus; alijs hac forma, alijs illa describentibus. Longum sit, si Strabonis, Galeni, eiusdem scriptoris huius, multorumq; aliorum dicta hoc loco congesserimus, & præter longitudinē superuacuum etiā: cum ante nos plura ex his Barbarus in Corollario suo retulerit, quæ poterunt uolentes ab eo intelligere. Nos propositū nostrum agentes, ex ueterum Græcorū decretis primū monebimus, calido siccoq; palam temperamento esse Viperinas carnes, totumq; corpus per cutem purgare: ideoq; ab elephantijs suis, solo hoc cibo, multos ad sanitatē restitutos fuisse, testatus libro sexto Paulus Aegineta est. Nec minus libro 4. quo loco de mali illius curatione agens, Viperinis carnibus uti iubet: & si sit earū copia, nihil æque in cibo prodelle testatur. Iubet præterea, cōfecto uiperinis carnibus sale illo, de quo paulo ante dictum est, pariter uti, nec minus prodelle. Quem ille Theriacū ideo uocat, q̃ in τῷ θύριον, id est, uenenato, & serpente hoc animali confectus fuerit. Idem contra strumas eodem Dioscoridi, aut non dissimili remedio pugnat. Hic Viperæ carnibus strumarum incrementa sisti ait: Ille non uiperam, sed quem Græci θρίν uocant, iubet in fictile gypso circumlitum conijci, & in fornace cremari: tum addito sæno græco, melle subigi: eaq; ratione uti. θρίν autem intelligere oportet, quē nos Anguem dicimus omnibus notū. Vtitur medicamentū etiā ex aspidibus cōfecto. Ex quibus cogitatū a nobis aliquādo est, nō adeo differre Viperas ab Aspidibus, & nostrates Angues nō dissimiles penitus uires habere posse: quodq; in Africanis laudatur, & alijs antefert siccitate regionis, & cœli temperamēto fieri. Iubet deinde in præparadis ad cocturā Viperis, detrahi primū pellem, mox caput & caudā amputari: quia minus, aut nihil carnis hæ partes habent. In qua amputatione dānat, fabulosumq; esse dicit, quod quidā præceperunt, certa aliqua mensura auferendās Viperæ partes illas esse. Quod tamē antiqui oēs testati sunt, eamq; digitorū quatuor fore decreuerūt. Plinius lib. 19. cap. 5. cuius hæc uerba sunt: Quatuor digitorū mensura uerinq; præcisa. Paulus Aegineta primū quartū uoluminis capite in Viperæ coctura, προποκοπεῖν πρότερον τῶντε κηλῶν αὐτῶν καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπὸ λακτύλων τῶν τῶν. Quod est, amputatis antea caputibus & caudis quatuor fere digitorū mensura. Id ipsum & pleriq; alij testant. Nec dānat, negatq; Dioscori, earum partiū amputationē, sed quā uulgus amputationis cām opinat, quia, scilicet uenenā sedes in his partibus sit: fabulosamq; huiuscemodi historici testatur, & q̃ certa mensura amputandæ illę partes sint. Causa em̃ amputationis est, nulla in his partibus caro, & ob id inutilitas, cōiecturāq; satis ad mensurā est: ideoq; & Paulus Aegineta quatuor fere digitorū dixit, qui per latitudinē, & ut in manu se contingūt intelligendi sunt. Cōiunctū huic est, quod nos uitiosum oīno suspicāmur, & ex similitudine uocis alterū ex altero participio factū esse, τὸ δὲ λατὶνὸν πλύναντας καὶ τεμαχίσαντας, &c. Quod si uerbū de uerbo uertas significat, postremo autē lotā, & in frustra dissectā Viperā, &c. Lauare em̃ πλύνειν est. Et si sic legat, dubitandū non est, quin lauare ante cocturā Viperā oporteat. At nō sic in omnibus græcis legi. Vidimus em̃ nec spernendæ fidei cōdices, in quibus non πλύναντας, id est, cum lauauerimus, sed πλατύναντας, id est, cū aperuerimus, & quasi diffusa inferiore parte diuarcauerimus, tunc in frustra dissectā coqui oportere: nullo alio sensu, q̃ ut significetur, oportere Viperā euiscerari, detrahisq; interaneis omnibus tūc coquendā esse. Persuademurq; in eo facile, q̃ hic sensus a rei necessitate non abhorret, q̃q; integra adhuc lectio in aliquibus hæc est, & q̃ Plinius eodem loco ait, exemptis interaneis discoqui in aqua, aut oleo, &c. & præter Pliniū Paulus Aegineta eodē loco. Cuius hæc uerba sunt: ἀραιθεῖντων δὲ τῶν ἑντὸς, &c. Quod est, ablatis interaneis, quorū nulla fieri detractio, nisi aperta & dilatata inferiore parte poterat. Ideoq; nos, restā lotura, exemptis interaneis coqui Viperā diximus. Addiderūt huic cocturæ aliqui, q̃ a Dioscori, non dicunt, rutā, & porrū. Neq; ab re fuerit, suspicari in tot rerū censu, potuisse librarium incuria perire, aut ambo hæc, aut eorū alterū. Dubitandū illis etiā, quo loco Dioscori, atq; credi, pediculos gignere qui uiperinis carnibus, aut earū iure uescant, fieri nē id, an cōtra nō fieri pediculos Dioscori, dixerit his qui ea uescuntur. Multa enim in utrāq; partem afferri pos-

C sunt. Galenus, Paulusq; Aegineta, quod haecenus legerim, nihil de pediculis his docuerunt, sed alter quod ad hanc rem faciat tantum dixit, per cutem totum uiperinarum carniū cibo purgari corpus: potuitq; comuni purgationis appellatione illa, pediculos etiam intelligere, qui, ut in pediculosis a longa ualitudine fit, pellente corruptos humores natura, toto corpore aliquando gignuntur. Alter certius, longiusq; descripta eadem uiperinarum carniū potestate, ampliore adhuc uoce usus, ait gigni in cute uiperarum carnibus uescentium cuncta illa, quae corrupti intra hominem humores gignere solent: numerauitq; scabies, lepras, labesq; alias, in quibus extrema uariatur cutis, nulla pediculorum priuatim habita mentione. Quodq; in his sit propria earum carniū potestate, fieri & in alijs poterit, quae quod crassum terrestreq; in humore nostro est, in exteriori partem pellunt: in quo genere potuit & pediculorum labes illa etiam censeri. Plinius tantum pediculorum eodem libro his uerbis meminit. Ius, praeter supradicta pediculos e toto corpore expellit. Quo uerbo usus, negare uidetur, quod Dioscorides, & si falsum mox dicit id esse, confirmat: nisi in expulsiōis uerbo, non fuga & euectio intelligenda sit, sed ut in auibis, quae pullos suos post incubitum excludere dicuntur, generatio, & quasi ex occulto & priuatione in lucem & uitam protractio, nec aliud expellere uerbum, q̄ ad generationem excludere Plinio illic significet. Quae omnia longius dicta a nobis sunt: quoniam non desunt in graecis, in quibus contrario sensu *μὴ γινῆναι*, quod est, non gignere legat. Nos in ambiguo communem lectionem secuti sumus, praesertim negare id fieri Dioscoride. Variant in extremo capite non multo post antiqui Graecorum codices, suntq; in quibus *πρὸς ὑσσωμῶν*, quod nos, ut suauius ori sapiat, uertimus: & in quibus *πρὸς ὑσσωμῶν*, id est, ad stomachi utilitatem legatur. Habetq; utraq; lectio quo nisi possit. In priore illa, & ratio, & communis lectio est: in posteriore, ratio, & Plinii auctoritas, qui eodem libro & capite ait, Exurit cum sale in olla, quem lingendo claritatem oculorum consequuntur, & stomachi totiusq; corporis festiuitates.

ὑπὸ πρὸς ὀφθαλμοῖς

De senecta Anguium.

CAP. XIX.

Senectus Anguium in uino decocta, dolori aurium infusus, & dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed praecipue uiperinam.

Plin. 20. cap. 23. & 20.

BARBARI COROLL.

Senectus Anguina, graece Geras opheos, a Catone Pellis Anguina dicitur, Corium anguis a Palladio, Leberis ab Hippocrate. Inuitat me Serpentiū natura, ut praeter supradictas de generibus earum reliquis, quatenus ad Dioscoridis extremum uolumen attinet, breuissime attingam. Haemorrhus, & Haemorrhoidis, a sanguinis effectu nominatur, qui toto corpore percussus effluit. Ille mas, haec foemina est. Vtriq; colos arenaceus. Magnitudo palmorum trium. Crassitudine paulatim, in tenuitatem descendere. Incessu tardo, & directo serpunt, ruffis, ut quidam scribunt, pedibus. Maculae per totas, multae, partim atrae, partim candidae, squamis asperae. Ob id ingredientibus, strepitu sese produnt. Foemina in aluum iacet serpendo, meatumq; uersus caudam inferiore situ continet. Mas autem uersus aluum habet, ceruicemq; serpendo porrigit. Foemina perniciosior, ut ex cuius ictu dentes gingivae, unguesq; decidunt. Colore sabuli uisum & Hammoditae, maxillis Viperae latioribus, cui & similis est, nisi q̄ uiperae color suffuluit. Hos & Cenchrias nominat Aetius, cubitales eos describens, nigris maculis, cauda superiore parte scissa, & praedura: unde nomen inquit, Cenchriae, ut cenchriam potius, q̄ cenchriam putem legendum. Nam Cenchrites, siue Cenchrinus, siue Cancros, aliud serpentis genus est, quod & Acontion, & acontitem, & acontiam aspidem, hoc est, iaculum uocant aliqui: ut ident uoluit Aetius, longitudine cubitorum binum in exilitatem fastigiatum, uiride praesertim sub aluum, ut milio, cum recens eius seges est, uideatur persimile robustum. Praeterea se iaculi specie proripiens, infestumq; salui. Erasistratus epar, colon, uesciam affici eorum scribit, quos Cenchrinus peremerit. Arenae colore, & cerastae magnitudo, cubiti unius, summumq; duorum, squarrofa cauda, binis in capite corniculis, siue quadragenis, ut Solino placuit, squamis uero in uersum quendam sub aluo conditis: eo fieri, ut crepitum sibilo non dissimilem serpendo edant. Incessu obliquo. Nono die interficit. Dryini a quercubus dicuntur, q̄ in radicibus earum, ut Galenus inquit, uiuant, in Hellesponto copiosi, odore tetro, qui & eos prodit, si quis aggrediatur eos perimere. Olfactu multantur, nec alterius rei odorem praeterea sentire perhibent. Qui uero supergrediuntur imprudens, crura tumescere, cutem pedibus abscedere, manus quoque ipsas curantium eodem modo periclitari, Amplitudo bicubitalis, Praepingue corpus, muni-

tum, loricatorum squamis durissimis, in quibus Aserpentes muscae latitant, quae ipsum animal conficiunt. Amphibæna similis est Scytalæ tereti, & æquali corpore, uti ne caput utra parte sit cognosci possit. Amphibæna etiā biceps est, ut inquit Galenus, & utraq; parte ingreditur. Vnde nomen. Cæterū nec Amphibæna, ut Aetius existimat, interficit, nec Scytale, præterquam chalcidica, eandem afferens quam uipera perniciem. Scytale tanta uarietate fulget tergoris, ut notarum gratia moretur obuios. Prima ponit exuuias. Hydros, siue Natrix primū in terra uiuit, & Chersydros appellatur. Deinde in aqua. Similis est aspidi pusillæ, præterquam quod ceruicem latam non habet ut aspides. Nominatur ab Aetio & Parous, in Syria proueniens, modo æris colore, modo nigricans. Item Spathiueros apud Chalcidem, ex crassitudine in exilitatem procumbens, lato capite. Sed neutrum genus inferre mortem. Ab eodem auctore Pelias, & Elaps produntur, sed quia noti sunt, descriptione, inquit, non indigent. Elaps & a Solino dicitur. Fit & Chamedraconū mentio. Sed omniū sine dubio pestilentissimū est animal, quod a triplici frontis apice, quasi alba mitrula, & plane regio insigni Basiliscus appellatur, palmorum ternum longitudine, sufflatus, exacuto capite, cuius uel sibilum animantes nullæ perferunt, præter Mustellam, a qua uincitur. Auditus, conspectusque, momento perimit. Quicquid morsu eius occiditur, ipsum etiam extinctum, iacentemque, nullum attingit animal. Vultus ab eo factū, ut inquit Erasistratus, aureo colore obducitur. Ex his quas dixi pestibus, alias esse furdas, alias haberi cæcas, quæ propterea Typhlini, hoc est, Cæciliæ uocantur. Prouidentia naturæ factū esse dicerem, nisi facile responderi posset ab imperitis, melius consulturam fuisse, omnino non peperisse, quam si captas oculis, & auribus peperisset. Ita enim leges naturæ dicimus eadem facilitate, qua contemnimus. Atque utinā accusare mala satis esset. Odimus & bona. Visu certe comperi, haud temere alios naturæ taxatores esse, quam quibus uitia ipsa placent, impunitatem conuestione redimentibus. Sed hæc alterius curæ sunt. Illud obiter admonendi sunt leuiores, ea quæ de serpentibus a neotericis dicuntur, præsertimque Arabibus, & eorum Principe (ita enim modo scholæ uocant, & Galeno quoque præferunt, si Dīs placet) usque adeo negligenter & sordide mandata esse literis, ita mendacis haberi plena, ut non dico infantissimi, sed plane omnium rerum usu uacui fuisse uideantur.

EX M. VERG. COMM.

Quam hic contra dentium dolores Anguium senectū in uino, Paulus Aeginetā in aceto decoquit, & quā hic *ἔχιν*, id est, Viperā dicit, ille Dipsaden uocat, non negligendo reuoluit quondā in Græcis uiperarū nomen fuisse, unaque hac appellatione plures huiusce modi species nunc etiā intelligi posse. Nihil senectū anguis, siue anguina uernatio hæc aliud est, quam quod hyemalem torporem exuentes, appetente uere Angues, spoliū relinquunt, & quā lubrica serpens exiit in spinis uestem, ut Lucretius cecinit, Græci *ῥέπας*, id est, senectutem eam dixerunt. Plinius quod uere id fiat, Vernationem appellauit.

De Lepore marino.

CAP. XX.

Lepus marinus Lolligini parua similis est, qui per sese tritus, aut cum urtica illitus, capillos euellit.

BARBARI COROLL.

Lepus marinus, græce Lagoos thalassios, animal pusillum, odore retro. Inter Lolligines ferre uersatur, quibus & similis esse dicitur. Venenū id est, alijs cibo, alijs potu, alijs contuitu. Si quidem grauidæ, si feminā ex eo genere aspexerint, confestim nausea, & redundatione stomachi uitium latentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio esse mare tradunt, induratum sale, ut in brachialibus eū habeant. Eadē pestis, in alto, uel tactu solo nocet. Vescit eo unū tantū animal, ut non intreat, Mulus piscis, & tenerescit. Inde ingrator, uiliorque fit. Hoies quibus in pastu fuerit, pisces olent, moriunturque toridis diebus, quot Lepus uixerit. Oīno incerti temporis ueneficiū id affirmat. In India uiuentē capi negat, inuicēque illi hominē pro ueneno esse, ac digito quoque in mari tactū emori. Esse autē ampliorē multo, quemadmodū reliqua orbis eius animalia.

EX M. VERG. COMM.

No uerū terrestrem Leporem in continenti agentes oēs, Marinū piscatores, & qui ad mare habitant, informē magis offam quam piscem: cuius formā ex ueteribus plures descriperunt, inter uenenata ab hoc ipso scriptore in sexto uolumine numeratū, de quo tunc copiosius & certius ex Nicandro & alijs ageat. Hunc non satis certo intellectu, cum urtica simpliciter depilare cæteri interpretes dixerūt, cōm græcorū lectionem secuti, cui deest quod in melioribus adhuc in-

A

Basiliscus.

Auicennā, Rafis, & Serapion taxantur.

B

*αγυος θαλάσσιος*Pli. li. 9. ca. 43.
li. 32. ca. 5, & 116

Cuenit, quodq; a Paulo Aegineta in sexto uolumine tradit. Quorū fidem & auctoritatē nos secuti, quod Dioscoridi deerat adiecimus, cū marina urtica illitū leporem marinū depilare uer-
 tentes. Paulus em̄ his uerbis rem explet λαγώς θαλάσσιος λίος καταχρησθεὶς καὶ ἑαυτὴν καὶ μετ' ἀκαλὸν
 φασ θαλασσίαν τρίχας φιλοῖ. Quod est, Marinus lepus concisus, inunctusq; per se, & cū marina ur-
 tica pilos aufert. Idipsum & meliores Græci habent. Esse aut̄ in mari urticas, & homini medici
 nā facere, testatur Plinius pluribus locis est, qui lib. 9. cap. 45. totā earū naturā & in medicina
 uires pluribus locis descripsit. Testati & alij sunt, quos breuitatis causa relinquimus.

λαγὼς χερσαίος

De Lepore terrestri. CAP. XXI.

Terrestris Leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tre-
 moribus, qui ualitudine contracti sunt. Affricū, aut cibo facie-
 lem infantibus dentitionem præstat. Exustum caput, & cum adipe ur-
 sino, aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum
 coagulum, post triduum a concubitu potum, conceptum adimere, par-
 tusq; spem intercipere proditur. Vuluæ & alui fluorem sistit. Comitiales
 iuuat. Contra uenena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum
 lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, uitia cutis in
 facie, uutiliginem, lentiginescq; sanat.

BARBARI COROLL.

Lepus terrestris, græce Lagos, & Lagoos chersæos, & a stupore atq; metu, Prox, & ab dor-
 miendi habitu Derceumenos, Nicādro, Lagides quoq; Strabo eos uocauit: dictus, ut Varro
 putat, non quasi lenipes, sed q̄ Eloes Boetij leporem uocarent ita. Genus Leporum triplex.
 Italicum, Gallicum, siue Alpinū: qui toti sunt candidi. niuem esitant algoribus, qua liqueſcen-
 te, rutilescunt, raroq; Romam perferuntur. Adapis nomine Hispanum, quos, ut Polybius est
 auctor, appellamus Cuniculos. Quorū foetus, uentre exsecos, aut ab uberibus ablatos, gra-
 tissimo cibo Lautices appellant. Strabo Leberidas a quibusdam appellari tradit ipsos Cuni-
 culos: qui ab effectu Lepores Gæorychia, hoc est, fossiles ab ipso cognominantur. Aristoteles
 & Iulius Pollux Leporem etiam Dasypoden uocari tradunt. Alij distinguūt Dasypoden a Le-
 pore. Inuenio & Chelidoniam cognominatum genus quoddam leporis a Diphilo. Sunt qui
 Plinium accusent, q̄ Leporem alium a Dasypode uideatur habuisse. Nec intelligunt, genus
 quidem unum ambobus esse, sed discriminis tamen aliquid inter eos notari posse. Nam illud,
 quod a Plinio dictum uidetur esse Lepori coagulum, inutile. Dasypodi præcipuum. Lectio-
 nem arbitror corruptam, ut in Annotationibus libri undecimi docuimus. Nec illud tamen
 inficias eundum est, confundi sæpe nomina, ut & Leporem pro Dasypode, & contra pro
 Lepore Dasypodem Lepores appellasse uideam. Dioscorides certe Leporem, nec aliter uoca-
 re solet, opere toto. Apud nos certe Lepores montani, differunt a campestribus, in Triden-
 tinis & Vicentinis alpiibus frequentes, nigritia, magnitudine, ferocia, denſiore pilo, a cere-
 ris distincti. De Lepore prouerbiū dictum est, *λαγὼν κρεῖων ἰπιθυμῖ*, Leporis carnes concu-
 piscis, usurpatum a Terentio in Eunūcho.

τρύγων

De Pastinaca. CAP. XXII.

Marinæ Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squama-
 mis reflectitur, dentiū dolorē mitigat. Nā eos frangit & euocat.

Plin. 32. cap. 22.
 11. lib. 9. ca. 20.

BARBARI COROLL.

Pastinaca piscis, græce Trygon, Turturis appellatione dicitur. Hæc quæ momorderit, si
 figatur in arbore, querna maxime, liberari qui sit percussus, arborem siccescere, auctores sunt.
 Vt meminit Aetius. Pastinaca dicitur, & insecti genus, quod ab Aristotele, Staphlinus ap-
 pellatur, uerticilli magnitudine.

EX M. VERG. COMM.

Radium, quē nos aculeum in maris Pastinacæ diximus, Plinius appellat, nulla rei, sed sola
 nominis diuersitate. Hanc Græci Trygona, Turturi æquiuoca appellatione, uocāt. Nec nobis
 ex antiquo scriptore aliquo causa satis pater, quod sæpe desiderauimus: quemadmodū desy-

derare nunc etiā cogimur, quis nam in sedando dentium dolore usus aculei eius sit: neque enim hic docet, inspergendus ne, an imponendus dentibus sit: an percussisse, conuulsisseue eo dentes oporteat. Poterunt diligentiores nouisse id, & nescientes docere.

¶ De Sepia.

CAP. XXIII.

Sepiæ coctæ comelum atramentum ægre concoquitur. Aluum molit. Collyrijs e testa factis conuenienter genarum scabriciæ perfriantur. Vstum in sua testa, donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum, expurgat uittilignes, furfures, dentes, & uitiā cutis in facie. Blotum in medicamenta oculorum addi solet. Contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspuitur. Pterygia oculorum absumit, cum sale tritum & iniectum.

BARBARI COROLL.

Sepias Græci *οὐνίας* uocant, & Lolligines Theutidas, de quibus Matro græcus poeta cecinit. Solos pisciū cognoscere, quid atrū, quid album sit. Differunt Lolligines a Sepijs, toto genere, quæ & amicitia & similitudine conueniunt. Est & Teuthios, magnitudine insignis, quā sola fere differt a Teuthide, ut Theuthos Lolligo, Teuthis Lolliguncula dici iure possit. Atramentum Lolligini suppallidum, nigrum Sepiæ. Inuenio & libi genus Teuthida, hoc est, Lolligunculam a Græcis uocatum, Thebani ridetur a Comicijs, qui Sepiam opitolicam, gallum galinaceum orthalicon, ficos tyca, hirundines coriladas nominent.

EX M. VERG. COMM.

In uocibus uitium, & male sequax earum ductus est. Nam quod ad rem pertinet, facile est, quod hic docet intellexisse. Duo enim in Sepia. Primum sunt, quod duriore testa intra eam clauditur: & quæ foris claudit, id testa. Rursus in exteriori testa duplex rei substantia. Quod intus pumicosum, & tenerius quæ pumex: & quod foris siliceum, durius, crustaceum, & in quo cum asperitate aliqua leuor est. Ex his in duobus tantū medicas uires aliquas esse Dioscorid. docuit: in eo quod testa clauditur, uentrem mollire: & in eo quod claudit, asperitatem palpebrarum leuigare, uittilignesque & alias his similes corporis lates extirpare: non tamen simpliciter, sed cinerem eius. Quam ob causam addidit, crematā in propria testa Sepiæ testam, &c. obscure quidem, sed necessario rei intellectu, ex eo quod sequitur, donec quod crustaceum in eis est abscesserit. Crustaceum enim hic dicit, extimū illud operimentū, quale nos paulo ante descripsimus. Estque sensus, crematā Sepiæ testam, donec extima illa pars, quam hic crustaceam dicit, ui ignis coacta, a reliquo pumicoso corpore separata ceciderit: integræ enim cocturæ indicium id erit. Post quā hic iubet, friatam in puluerem corpori inspergi. Nosque rei necessitatem, & Paulum Aeginetā secuti, ut legitur uertimus: qui de eadem hac re libro primo agens, *καυαυίον οὐνίας ὀσπασιν* dixit, id est, crematam Sepiæ testam. Idem etiā nobis auctor fuit, ut in extremo capite sali fossili adijceremus: quod in aliquibus græcorum adhuc legitur, & ab eo in exterendis oculorum unguibus manifeste præcipitur.

¶ De Mulo pisce.

CAP. XXIII.

Mulorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini Draconis, Aranei, ac Scorpionis moribus medetur, si crudus atque dissectus admoueat.

BARBARI COROLL.

Mulum, Græci Tryglen, goneatida, hoc est, barbatum uocant: dictum ita, quoniam ter anno pariat. Præfertur ex Ionia. Est ab hoc diuersus, qui Trigolas appellatur. Item qui Myllos, de quo inter falsamenta, in Omotario disserui. Mulum piscem Proserpinæ, item Dianæ sacrum fecere Græci: ut Citharon Apollini, Mercurio Bocas, Libero patri Cittulum, Apuam Veneri, Neptuno Pompilum.

EX M. VERG. COMM.

Nouerit gulæ præceter, Mullū piscem Græcorum uocabulo, nunc etiā Tryglen ab omnibus dictū, lautoribusque coenis cum seruari, quæ de eo iactatur ubique uox indicat, non comedi

A

enid

Plin. lib. 9. capit. 29. & 51.

B

τρίγλα

Plin. lib. 7. capit. 13. 51.

Ca piscatore Tryglen. Fuit huic cibo omnibus sæculis gratia, nec uile pretiū: in quo singulis sex tertijs singulæ rependerent librae, si Iuuenali credimus, dicenti, Mullū sex millibus emit, æquātem sane paribus sextertia libris. Hunc uenenatorū multorū moribus non recentē, ut Barbarus uertit, sed crudū imponi Dioscori. iubet, ὁ μὴ enim in eo est, quæ uox Græcis erudum tantum significat. Nescioq; ego, cur recentē potius, q̄ crudū uertere ille uoluerit, cōmunemq; græcarū uocū æstimationē mutare, non leui sane in medicina periculo, si crudum, & recens promiscua significatione misceant. Multa enim in tota natura sunt, quæ cruda uetustatem habent, & quæ cocta recentia dici possunt. Libet hoc loco gratias Plinio habere, qui ea quæ angustius a Dioscoride dicta fuerant, latius explicauit. Hic enim marini Draconis, & simpliciter Scorpij, Aranearumq; moribus imponi Mullum iubet, nullo inter terrestrem, & marinū scorpionem, & araneas, & Phalangia discrimine. Plinius uero libro 32. capite 4. de hoc ipso pisce agens, his uerbis rem docuit. Item contra Scorpiones terrestres, marinosq; & Phalagia illius, &c. Quæ Phalangiorū uoce in eo remedio usus, aliud & uenenatus araneorum genus q̄ Dioscori. intellexisse uidetur. Hic enim non Phalangium, sed ἀράχνη ait: eam intelligens, quæ in trabibus, parietibusq; suas telas suspendit. Quod totum peritiorum censuræ relinquimus, cōtenti quæ debemus & possumus fide scriptoris huius uoces uerisse.

ἄρχισ ἱπποτάμης

Plin. lib. 9. capit. 25, 26.

H De testibus Hippopotami. CAP. XXV.
I P P O P O T A M I testes exiccati, ac triti, contra serpentium morsus bibuntur.

E B A R B A R I C O R O L L.
Quum fluuiatilem Hippotamon Græci appellant, Sanguine utuntur pictores. Geminus, ut Crocodilo uictus, super Saiticam præfecturā, in Aegypto plurimus, in India quoq; ut Onelicitus est auctor, amne Indo. Celebratur inuentione sanguinis trahendi.

D E X M. V E R G. C O M M.
Peregrinū Italiae fluuiatilis hic equus semper animal fuit, Romanæ tamen urbis & Cæsaris fortuna suæ genti sæpe id palā ostendit. Viditq; Ro. Po. in Aegypti Nilo ad Saiticam præfecturam genitū ambiguum, & cui æque in arida ac in flumine uita sit animal, binis & quales in bubus sunt ungibus, dorso, iuba, & hinnitū equi: a quibus & flumine cōposito nomine, fluuiatilis equus dictus est. Rostro præterea resimo, cauda torta, dentibus aprorū aduncis, sed minus noxijs. Depasci cum segetes, testis Nicander est. Qui in Theriacis suis de eo sic cecinit.

Ἴππον τὸν νῆλος ἐπὶ σάιν ἀιθαλόσαν
Βόσκῃ, ἀρόρειαι δὲ κακὴν ἐπιβάλλεται ἄρπην.
Ὅς καὶ ἐν ποταμοῖο λίπὼν ῥέλον ἰδνόντα,
Χιλοὶ ὅτι χλοάουσιόν δ' ἀπὸ χεύατο ποῖν,
Τέσων ἐπισείσαν λείπει βύθον ἀάτιον περ.
Ἐν νίμειται γένεσιν παλαιοῦτον ὄγκον ἰλαυνόν.

Quorū uersiculorū ea sentētia est. Aut equi quæ Nilus supra nigricantē Saim pascit, aruiscq; cū noxiā immitit falcē. Hic ex flumine egressus, relictis cœnosis fluctibus, cū frumēta flauerit, & uirentē amiserunt frondē, quātū a flumine ingreditur per arua, p̄greditur, tantū dentibus depascitur, retrogrado incessu iter faciens. Quod Plinius felicissime descripsit his uerbis. Depascitur segetes destinatione, ut ferunt, antea determinatas in diem: & ex agro ferentibus uersiculis, ne quæ reuertenti insidiæ comparentur. Plures, nec paruifaciendas in medicina uires ei Plinius q̄ hic tribuit, quas licebit uolentibus multis locis in eo scriptore inuenisse, præsertimq; libro 29. capite. 9. Quorum hic unum tantum probauit, quod ille scilicet ait. Testiculi drachma ex aqua, contra serpentes bibitur.

καταφασ ἄρχισ

F De Fibrinis testibus. CAP. XXVI.
Libet ancipitis uitæ animal, plæruncq; cum piscibus & cancris ex aqua uictum capescit. Huius testes serpentium uenenis aduersantur. Sternutamenta mouent. Et in uniuersum uarios obtinent usus. Si quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti. Secundas quoq; eijciunt. Contra inflationes, tormina, singultus, uenena,

ixiamq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & utcumq; ueterno obdormi-
scientes excitant infusi. Cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris sus-
fitu, idem faciunt. Poti & illiti profunt tremulis, contuisionibus, et omni-
bus neruorum uitijs. In summa, calfactoriam uim habent. Eligi debent
Testes qui ex uno ortu connexi sunt. Fieri enim non potest, ut gemini
folliculi in una membrana coniuncti reperiuntur. Liquore intus ueluti
mellis cerosi, odoris grauis, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus
tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, conijcentes in fol-
lem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita
exiccantes. Vanum est quod traditur, Testes ab ipsis euelli, et a sese abij-
ci, quum uenatu urgentur. Siquidem tangi nequeunt, ita ut in sue suffri-
ctu. Operæ autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eue-
stiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

BARBARI COROLL.

Fiber, quem Græci Castora uocant, ab extrema ora, ut Varroni placet uocatus, quoniam de-
stra & sinistra fluminis maxime uideri soleat. Et antiqui Fibrum, inquit dicebant, extremum.
Vnde sagis fibræ, & fibræ in auribus & iecore. Differt a Lutra Fiber sola cauda, cætero pilus
utriq; pluma mollior. Dicta uero Lutra est, q; se in aquis luter. Ob id græci eam *λυτρον* uiden-
tur appellasse Theodoro: qui tamen lutrin, non lutram conuertit. Plinius Enhydrinda serpen-
tis nomen esse maluit, ut aquatilis colubri. Varro quoq; non lutram aluendo, sed Lytram tra-
dit: quoniam succidat, dissoluatq; in ripis arborum radices. Cæterum testes Lutre comitialibus
prodesse docet experimenta, ut appareat cum Fibro cõmunem Lutre proprietatem esse. Plini-
us e genere inquit, Fibrorum Lutris, sed nuscq; mari accepimus mergi. Archigenes iustū uolu-
men de Castorū utilitatibus conscripsit. Plurimus hic in Ponto, morsuq; hominē, nō prius di-
mittit, q; ossa fracta cõcrepēt, ut Solinus inq; Nascunt & in Hispaniæ fluminibus Castores, ut
inq; Strabo, cæterū nō inest uis illa medica, ut in pōticis. Castorē porro dictum, q; sese castrēt,
eale corporis parte redimētes, ppter quā expētunt: & ponticū esse canem, Seruius honora-
tus pdidit. Nam qui Canis marinus dicit, piscis est, & longe a Cane Pontico diuersus. Est autē
marinus canis, etiā carmine Homeri celebris: cuius frustra Romē, thuriani pulmētū nomine uē-
debātur tribus obolis in libras, Rutili Ruffi gr̃ate; qui res gestas populi Romani scripsit. Hoc et
a Plinio, Tomos Thurianus, ut ego quidem primus cōperisse suspicor, appellatus est. forte a
Thurijs oppido Italię, q; primū e Sicilia sit cōuectus. Athengus & Thurionē, siue Thurionē
dici obsoniū hoc latina lingua solitū affirmat. Suauissimūq; id ac lautissimū fuisse. Strabo Gale-
otē hūc, & Xiphia uocari tradit, & quemadmodū capiat ostēdit. Dictū & Scyllā, & Lamia, &
Carcharia quoq; arbitror a nōnullis. Vnde cōiectari liceat, aut eū esse Thurionē, quē nos uul-
go Sturionē appellamus: aut quod uerius existimandū est, ab eo quasi delicato & cupediario
piscē nomē accepisse. Notādū, Aristoteli aliud quodāmodo, sed affine tū genus uideri Scyllā,
& Canē marinū. Nā Scillaros apud eum pro Squilla parua sumitur. Nec illud omittēdū, Pho-
cenā apud eū dici, q; latine Tursio uertat a Theodoro gaza, siue Tursio, aut Torsio, ut Plinius.
Delphino similis, paulo tristior, & rostris canicularum similitudine maleficus. Hūc putō esse,
quē ab Athengō mō Thurionem, mō Thurionē, mō Thurianū pulmētū uocari diximus, a
Strabone Galeotem & Xiphiam, ab alijs Canem marinum, aut si nō idem omnino sunt pis-
ces, quod & ratio nōnulla suadet, certe similes fateri eos necesse est. Sunt qui gr̃ace Hyscam, si-
ue Hyccam, hoc est, porculum pro sturione capiant. Mentionem Hyccę penes eundem Athe-
neum legas & Callimachum, qui eum piscem Sacrum uocauit. Aliud uidetur genus esse ab
Hycca, id quod Hyn, idest, suem uocant, qui sit, ut Athengō placet, idem cū apro, siue capro,
ut Archestrato, diuersum, qui suem marinam Plamitū, alij Plammatida cognominant. Nam
oppidulum Sicilię quod Hyccara uocatur, ab Hyccarū multitudine cognominatū putant.
Cyrenæi certe hunc non Hyccam, sed Erythrinum, hoc est, quasi Rubellionem appellabant.
Sunt tamen qui & pisces Iulidas uocatos, Hyccas nominent, & Philetæ uersum
Οὐδὲν γὰρ ἴσμεν ἰχθυόωντος.

A

Pli. li. 8. ca. 30.

Lib. 30. ca. 3.

B

Strabo lib. 3.

C sic interpretentur, quia difficile sit eos capere. Propterea & uermes, quos Intestina terre dicimus, & Græci Gesentera, & Iulos a nostris, uulgari uoce Porcelliones appellantur. Numenius & Hyænam piscem connumerat, qui an idem sit cum aliquo ex prædictis, in interto est mihi. Est & terrestre quadrupes Hyæna, ut constat. Inter pisces & Syagris, a sue dicta potest uideri: quanquā inuenio quandoque scriptum Synagris. Diphilus & Capriscum dici quendam signifi- cat, qui & Mys uocetur. Nisi quis non Myn, idest murem, sed Hyn, idest, suem legendum po- tius existimet. Sunt enim & mures in piscibus, quemadmodum & inter ofirea.

E X M I S C E L L A N E A C O M M.

Contra multa hominis mala, uisa quondam antiquitas est, & nostra ætas adhuc utitur Ca- storeo, præsertimque contra uenena aliqua. Quæ uerisimile est a Dioscoride illuc numerata fuisse: sed ea librariorum incuria excepto uno perierunt, idque Ixias est, quod Barbarus Viscum, ex Plinio interpretatur ubique: non satis certam nunc rem notissima Visci appellatio indicans, uo- cumque similitudine Ixiæ, & Ixon simul miscens; cum tamen alterum in ramis arborum inue- niatur, aucupio inseruiat, & in medicina non penitus inutile sit: alterum ad Chamæleonis ac- tiuatæ herbe radices nascatur, omni careat usu, & inter uenena ab hoc ipso, & a Paulo Aegineta- numere: quemadmodum in Chamæleone herba, & in uenenis longius ab hoc scriptore, et a no- bis dicet. Nec animus modo nobis est, Plinium, & Plinium secutos inscitie, aut incurie arguere. Fecit enim ante nos id Leoniceus, oī doctrinarum genere clarus homo. Sed quod ad nos pertinet, leges mo- nemus, quoniam nihil Visco & Ixiæ idem sit, non declinatio, non genus, non uisus, non rei substantia, maluisse nos græca uoce in altero quam latina uti, & Ixiæ uenenū dicere, Viscū uero quod in ramis arborum nascitur, multos habet in re nostra usus: ne uisci audita uoce, crederent leges, homini ut- auius mortem uiscum esse, abstinentesque eo, quas habet utilitates amitterent. Certius de tota hac re in utroque Chamæleone, & uenenis patebit legentibus, & a nobis dicitur.

De uulgari Mustella. C A P. XXVII.

Mustella, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum ui- no pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio. Toxico, simili sumpta modo resistit. Eius uenterculus coriandro factus, inueteratusque, percussis a serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cre- mata in ficili, podragicis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine perun- ctæ, strumæ iuuantur. Comitialibus etiam prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 29. ca. 4.

Mustella uulgaris quam Græci *βάρυ*, Cato Ecidion appellant.

De Ranis. C A P. XXVIII.

Contra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt Ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum itidem sorbea- tur. Contra inueteratos tendonum rigores pollent. Illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit. Explendis alopeciarum inanitati- bus ex liquida pice illinitur. Viridium Ranarum cruor, auulsos genis- pilos renasci prohibet, in uestigia euulsorum instillatus. Decoctæ in a- ceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 9. ca. 42.
su. li. 32. cap. 5.

Ranam Græci & fluuiatilis, & marinā prædicant, etiam nūquam pisce, Batrachō, & poetica uoce Batrachon uocant, ut Iones: quod & apud Aristophanem & Xenophanem poetas legitur. Batrachio & Chymistæ suū habent, excellentis in auri confectioe miraculi, ex putrilagine diuini laticis nas- centem, specie Ranunculi, uenenū præsentissimū, quod uel solo halitu minus prudentes opprimat. Hoc ab effectu Chrysocolle quod dicitur. Est & morhi genus Batrachos, tumētibus sub lingua ue- nenis, cui simile fortasse Plinius, uoluminis initio monstrauit, rubentis sub lingua duriciæ. Inter Ranas est & quæ Phrynos græce dicitur, hoc est Rubeta, quæ in uepribus uiuat, quāquam prius in

aquis, postea fit terrestris. Perniciosa hæc, ut Chersidros, Grandissima cunctarū. Magnitudo testudinis paræ, geminis quandoq; ueluti corniculis, ut inquit Plinius, dorsum exasperat: in flaccq; se irata, tam proterue audax, ut insiliat quoq; proximum: quanq; suspitio se frequētius, q̄ morsu uindicans. Buffo inde, ut arbitror, a Virgilio & uulgo dicta, ueneficiorum plena, precipue ossiculis duobus: quorum in sinistro latere inuentum, Apocynon uocāt, quia Canum impetus cohibeat. Recētiore lapidem in capite huius Ranæ haberi tradunt, ad dolores illū gestatu probant, sed quā uia ea sit exemptus: quales uulgo magna etiam copia ferūtur anulis: quanq; hunc elici potius, q̄ eximi uiuentibus constat, puniceo in panno, cuius plurimum colore delectantur, ita dum ipse feriendo relaxant se, capitis onus deponunt: id mox in subiectam cistam e medio foramine collabitur: alioquin ea est illi inuidissima natura, ut lapidem eum, nisi tolleret, reorbeat. Huic aliquando & cauda ab initio est, quam post amittit: ob id in stagnis, cū adhuc pusillæ sunt, Muti ruribus uocantur. Alterum genus, & hoc exitiale, Calamites dicitur, quando arūdinetis frutetisq; roris linctu uictitans, sine uoce, omniūq; minima & uiridissima: quæ si forte a bubus hauriatur, distendit eas. Hanc et Dryopetem uocari credimus a Plinio, quia inter frutices & arbores uisatur. Est & genus uocalis paræ, scandentis arbores. Inuenio & palustrem mutā inter uenena, hoc est, Eliobatrachon, diuersam a Phryno: qm̄ & signa, & medicinæ uariant, p̄sertim Aetio. Aristoteles Ranas cōes, Telmatæos, aut Lynæos, hoc est, lucarias & lacustres nominat. Varro luridā Ranā dicendo, p̄ Calamite uidet accepisse: qm̄ Psilothrū sit, ut Plinius, idēq; Varro affirmant, illud efficacissimum: quāq; & epitheton Ranarū omniū putant id poetæ. Miror quāobrem Diosc. Phrynō, hoc est, rubetā lion, qd̄ est leuis, cognominari dixerit. Nisi q̄ Rubetæ duo g̃na constituat. Læuis, & sine cornibus, ex qua delibutorū uenenū, sicut ex palustri quoq; Muta cōdit: & Aspera cornutaq; que proprie sit Buffo: cuius dorsū paulo antescabrū esse diximus ex Aetij sententiā. Habetur & Batrachos halica, hoc est, piscatrix rana, sed inter pisces Aristoteli, Ciceroni, Plinio.

EX M. VERG. COMM.

Non est Ranis omnibus unum genus, nec idem color, aut similis uita & mores. Nascuntur aliæ per se, conuersis tantum æstiuo imbre, littorum & itinerum puluerulentis harenis: quarum breuis uita, & nullus usus est. Habent alię legitimo naturæ ordine in aq̄s suos natales, nec mare tantum, sed profluentes omnes & palustres aquas incolunt. Sunt & quæ in sicco agunt: quales Rubetæ, & quæ in harundinetis inueniuntur, Calamitæ ob id appellatæ, inutiles, & ob uenenum suum letales. Sunt & in fluuiatilibus & palustribus, quæ uiridi, & quæ liuido colore sunt: quæ itidem tutius, & quæ non sine periculo comedi possunt. Ex toto hoc genere serpentes aduersari intelligendæ sunt, in profluentibus, aut stantibus aquis agentes, & in cibis utiles. Et quas hic uirides, nouum in palpebris pilorum incrementum prohibere dixit, in aquatiliū illarum genere eo colore cognoscendæ erunt.

De Fele. CAP. XXIX.

Recens Felis in cibo nutrit, & facilem præbet alium. Sale uero conditus, non suppeditat alimentum. Arteriam expurgat. Et uocem expedit. Illita saliti caro, aculeos extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium fots adijciatur. Fluctiones siquidem ad summa cutis elicit. Ischiadicis infusa medetur.

BARBARI COROLL.

Silurus, piscis est fluuiatilis, q̄ & alibi q̄ in Nilo nascitur. Aedus, Silluarion, ut puto, uocatur hunc, cuius felle suffusos oculos inungi cum attico melle præcipit bobus. Aristoteles uidetur Silurum intelligere Theodoro, cum Glanim piscem nominat.

EX M. VERG. COMM.

Thynos præcipue magnitudinis in mari pisces, æquant in fluminibus aliquot nascentes Siluri, priuatimq; in Aegypti Nilo. Vnde maxima eis ad ganeam laus in poetis & gloria. Feroces q̄dem uti in piscium genere, & qui non aliter q̄ hostes in aqua latrocinentur, obuia quæcunq; appetentes, & qd̄ in ferocioribus rarum est, multo proliis amore. Aedita a foeminis oua, mares in hoc genere ne pereant custodiunt, tantopere sibi seruandisq; rerum generibus natura consulit. Crediderunt iuniores aliqui, Siluros esse quos nostra ætas Sturiones uocat, sed falso. Thynnis enim similiores Siluri sunt, & eorum magnitudinem æquantes.

A

B

ἀλλὰ ποσὶ νεαρόν

Pli. li. 9. c. 19. § 1.

C
σκαρίε

De Cerro pisce. CAP. XXX.

Cerri saliti caput exustum, excrecentes ulcerum oras, puluilloſq; reprimit. Nomas cohibet. Thymos, clauosq; absumit. Caro nō secus atq; fassamentū pdest a scorpione pcussis, aut a cane demorsis.

B A R B A R I C O R O L L.

V E R G.

DE Smaride, siue qd idē est, Maride, in sequenti mentione dicit. Illud in transcurso nō silebit, Maruda genus etiā mēsurę dici apud Aristote. quę ut inq̃t Iulius Pollux, heminas. 6. capit. **M**AEnis cōgeneres, de quibus mox dicei, Smarides sunt, tā similibus inter se notis, tamq; mixtis natalibus, ut mutatis iam pridē appellationibus, nō facile nūc sit alterū genus ab altero discernere. Id ego non ausim quod alias dixi, procul a mari natus homo. Poteram & ipse hoc loco quā Plinius, Athenæus, pluresq; alij de utroq; hoc genere longius tradiderunt, in unum collecta coaceruare, sed nihilo magis res patuisset.

De Mænis. CAP. XXXI.

μαίνις

MAEnarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garrum corporis putredines collutione sedat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 32. ca. 11.

MAenas græci Mænidas appellant, laudatissimas e Lipara, uulgo Mænulas. Aleculam quasi ex Plauto Theodorus interpretatur. Ego Aleculæ uocabulum generale credo, idem apud nos significans quod apud græcos Anthracides, ut in Halme demonstrabimus. In Pano nia pisciculum quem Menapij & Belgæ cæteri copiosissime uenantur & inueterant, Arengam nocantes, ipsi Alecem hodie quoq; nominant. Similes inter se uult Speusippus esse Mænas Boacas, et Smaridas. Candidiores nēpe Mænas. Sunt qui Boacas, siue Boecas appellant, hoc est, Leucomænidas. Smarides uero, siue Marides, sunt quas nōnulli uocant Cynosseuma, ut inq̃t Athenæus. Aristophanes byzantius, solus non Bocas, sed Boopas uocandos existimabat, quia parui essent, & magnos oculos haberent. Miror unde Theodorus Cerros interpretetur, quas græci Smaridas appellant. Sūt quidē Gerres, Plinio, Martiali q̃q; inter uiles, ut illo ueris, Fuisse Gerres, aut inutiles Mænas, Odor impudicus urcei fatebatur. sed diuersos a Smaridibus, ut in Castigatione Pliniana diximus. 32. libro.

V E R G.

Non cinere Mænarum in medicina tantum Plinius utitur, sed carnibus etiā: quibus impositis, docet uerendorum pustulas sanari.

γώγιος

De Gobio. CAP. XXXII.

B A R B.
Pli. li. 9. ca. 57.

V E R G.

Gobius recens in fuillum uentrem coniectus, si contusa rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo supersint decoquatur, & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deſcitur. Illitus cōtra serpentium canumq; morsus auxilio est.

Gobius, & Gobio uocat & græce Cobios. Plinius quoq; p. c. scribit, nō per. g. secūdo & 30. Guolumine. Præferi nigro cādidus. Deterimus omniū est, q̃ uiridis appellat, etiā grandis simus, quem Diphilus Caulinem dici testis est. Gobios saxatiles, sunt qui Cothonas dici possunt. Siculi certe Gobium, nō aliter q̃ Cothonem uocabāt. Sunt & fluuiatiles q̃dam Gobij. **I**n mortario tufum antea iubet ad deſciendā aluū Paulus Aegineta decoqui in aqua Gobij. **P**iscis e uilissimis est. Ob quam causā in Satyra Iuuenalis ait. Nec nullū cupias, cum sit tibi Gobio tū In loculis. Laudauit contra Martialis in xenijs dicēs. In Venetis sint lauta licet cōtū uia terris, Principiū cœnę Gobius esse solet. Plinius paulominus q̃ in eo genere Gobium nūmerauit, in quo terrēni pisces censentur: quoniam palustris, & quasi incola terrę sit contra aliorum piscium naturam. Declinauerunt ueteres latini in secunda & tertia declinatione eundem significantes, ut ex paulo ante citatis exemplis aperte patet.

θυστάρης

De Thunno. CAP. XXXIII.

Conditanei Thunni caro, quā Omotharicō uocat, sumpta, ijs auxiliant, quos uipa noīe Prester, momorderit: sed oportet uinū q̃ plurimū subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Cōtra

acrimonias escitatorum maxime ualet. Canum moribus utilissime illinit.

A

O Motarichos e Thynno, salsa caro dicitur, Thynnina uulgo. Paulus Tarichon, siue Tarichos, hoc est, salsamentum. Differt autem a Salsamēto Salgama, ut ex Columella facile colligitur. Salsamenta Græci duorum generum fecere, Horæa, & Thūnia. In Horæo, quod a tempestiuitate uidetur appellatum, macra pinguibus, in altero macris pinguiā præferri: quæ Cybia dicuntur. Inter macra sunt, ut inter pinguiā Cordylæ. Horæa ex Pelamydē, id est, Lutaria minore fieri. Thūnnia ex maioribus: quas aliqui Synodontidas appellant. Aliud genus uidetur, q. Synodontes uocantur, & a nostris Dentices. Similis est Pelamydibus & qui Triton, siue Chelidontias uocatur, nam Chelidon, aliud genus est, Polypo, ut inq. Diphilus, simile. Ad huiusmodi obiter & prouerbum, quod fertur. Salsamentum putre cunilam bubulam desiderat. Item & illud. Salsamenta simul ignem uidere, cocta esse. Crates salsamentum celebrat Elephā rhinon a se uocatum; cuius & Aristophanes meminerit, sicut Omotarichon Alexis. Inuentio & Hemitarichon: & quod ab hoc plane differt Hemineron. Vtrumq. Salsamēti genus est. Sed Hemineron e Coracino: quem Alexandrini Hemineron appellant. Dicitur & Pelses, & Saperda Coracius, & a nonnullis Aeolias Meotide stagno cōmendatissimus: quanq. alius piscis est Aeolias Epicharmo. Nam & Saperdam Phorion p. Apua inueterata & arundinibus infixa capit. Item pro Succidia, & Larido, quod Paphlagōes, inquit, Ionden quoq. appellant. Laudantur in salsamētis Delcani, a Delcano amne dicti, quos aliqui Leptinios, & Lebianos cognominant. Item Mylli, quos & Platistacos, & Plastacos nominant, utiq. maiusculos, sed cum parui sunt, Gnoridia, sicut media ætate Myllos. Sunt tamen qui Platistacos, & Plataces eosdem esse cum Coracinis putant. Inter Salsamenta preciosa, est & quod Spondylos uocatur. Athenæus certe id, quod in capite Mugilum Echinata specie conspicitur, Spondylum dici meminit. Item est ubi & ipsum Horæi salsamēti Spondylum cōmendari scribat. Sexitana, siue Gaditana, ex Orcyno, quæ Clides & Clidia, hoc est, ex eo Iuguli dicuntur. Quemadmodū ex Antaceis uocatis maxilla, palataq. Antaceis nomen uidetur amnis dedisse, in Meotim lacum asiatica parte influens. Magnitudine sunt Delphinis pares, & ipso Cimerij Bosphoro gelu fodiuntur plerumq. nullis ossibus spinisq. ut Herodoto placet. In Borysthenē copiosi, carne prædulci, ut ait Plinius. Ex Orcyno sunt & Melandryæ. Sed et pubes eius tota sale accipit, admodumq. pinguis est. Pamphilus Melandryn, genus Thynni grandissimū esse statuit. Diphilus pisces quosdā salsamentarios uocauit Costas. Ætate nostra Græci piscem Hyscā, de quo supra dixi, tribus nominibus inueterant. Rhachin partē eius Doruariam & Spinalem uocantes. Quam nostrū uulgus, schinalem corrupte appellat. Pleuram, id est, costas & latera. Hypocotliō, id est, aluum eius atq. pubem. Hunc piscem, ut testati sumus, Italia Sturionem modo uocat.

B

EX M. VERG. COMM.

Quem composito ex crudis Thynnorum carnibus et salsura nomine Omotarichō hic nominat, ceteri oēs simplici plerūq. Tarichon dicūt. Salsamentū qd pisciū carnibus & sale constat, non simplex, aut unū, sed quot fere sunt in Thynnis ætates, corporis partes, habitus, loca, & piscationis tempora, tot etiam nominibus ab antiquioribus græcis discretum, nec Thynnorum tantum, sed aliorum etiam piscium quorundam carnibus confectū. Eius rei longiorem historiam Athenæus libro primo Dipnosophistæ sui profecutus est, quæ græcarum literarum peritis in eo legenda relinquimus. Eius autem linguæ ignaris in Barbaro, qui licet breuius q. oportebat ex scriptore illo plerūq. collegerit, plura tamen q. in latinis inueniri possint exscripta ab eo in Corollario suo fuerunt.

De Garro. CAP. XXXIII.

Garrū omne quod ex piscibus, carnibusq. sale maceratis liquatur. Men est, illitum, depascentia ulcera sistit. Morbis a cane medetur. Dysentericis, atq. ischiadicis infunditur. Nonnullis ut exulcerata adurat. Alijs autem ad laceffanda, quæ ulcera non senserunt.

γάρρον

BARBARI COROLL.

Garus, & Garū dicitur, a Garo pifice, ex quo olim conficiebat. Postea ex Scombro pifice. Laudatissimum in finibus Carthaginis spartariæ Cætaris, quod Garū fociorū appellabat, singulis millibus numum pmutantibus, congios pene binos. Nec liquor fere ullus, præter unguenta, maiore in precio erat. Scombri quidē Mauritania, Beticaq. & Carteia ex Oceano in-

Pli. li. 31. ca. 70

p. iij

C trantes capiebantur, ad nihil aliud utiles. Græci optimum Gari genus putant, quod Hermati-
on, hoc est, Sanguiculum appellat, ex intestinis Thynni, cum brachijs, sanie, ac cruore. Garū
& Clazomenem, & Pompeios, & Leptin nobilitauit. Vitium huius est Alex imperfecta, nec
collata fex, neutro dumtaxat genere, ut Plinius atq; Flaccus, & primus omnium Plautus effe-
runt. Si quidem & græci liquamen uocant id, quod purissimum ex eo fluxit, id autem quod se-
cis instar in cophino (ita enim uocant) obmansit, Alex. Vnde liquiminarij dicantur. Quod etiā
pro liquore accipitur, promiscui gregarijque piscitij: ut iam ad Ostrea Echinos. Vtricas, Cāma-
ros, Mulorum iocinora pertineat. Cāmari sunt, quos græci quoque Camaros appellant: itemque
Astacos. Est ubi Alecem uero Galeculam feminino genere ueteres appellant, minutum, uilem
que pisciculum, ut est apud Catonem, atq; Plautū. Columella riualet nominat Aleculam, in-
ter pisciculos, & incrementi parui fluuiorum animalia. De hac uoce quid sentiremus, in Men-
& Halme diximus. Cœpit uero Garum & priuatim ex inutili pisciculo, minimoque cōfici. Apu-
am nostri, Aphyen græci uocant: quia non alio principio fere, quæ ex pluuia nascat, quasi Dypspy-
es: ob id Apulas Theodorus, nunc Apuas cōuertit. Eundē Aphrūda quoque nominat, & Gonō-
thalassion: quoniam ex spuma tū marina coalescat. quanquā Aphyarū multa gēna notant. Sed Aphri-
tis omnium pstantissima est. Quā & Aphrō, & Aphryan quoque uocāt. Quæ uero in hæc alba ē, Ci-
boris appellat. Meretriculas Athenis fuisse quasdam legimus Aphyas cognominatas, quæ gra-
ciles & cādidæ magnos haberēt oculos. Græci Phalericas maxime pbabāt Aphyas. Foroiulien-
ses, ex pisce quē Lupū uocāt, ipsi Garū faciūt. Creuerunt deinde ad infinitū gēna. Nā et ad colo-
rē nulli ueteris fiebat, tādilutē suauitatis, ut bibi posset. Aliud uero, ad castimoniarū supstitio-
nē etiā sacris ludicis dicatū, ex piscib. squama carētib. Garus latinū nō habet nomē, ut Aufoni-
us poeta autor ē, quæ & liquorē Sociorū uocauit. Nec scio cū gbusdā, quæ Aufoniū poetā id uelut
dicere quod nō dicit, quasi sociorū Garū appellauerit antiquas: ut Græcū nomē Garū, latini nomi-
nis, hoc ē, sociorū accessiōe mollesceret, ita ut quasi græci uideri defineret. Nō hoc Aufonius
intelligit, sed illud. Malle se ingt uocare Muriā, cū sciētissimi ueterū, & uocabula græca fastidien-
tes, latinū in Gari appellatiōe nō habeant. Sed quicquid ingt nomine liquor iste sociorū uocetur,
Iam patinas implebo meas, ut parcior ille Maiorū mensis Apuarum succus inundet.
Mendosus erat locus. Nam & pro in gari appellatiōe, legebat ignari. Et pro apuarum, apala-
ria. Vtrūque lectioni ueræ legitimeque restitui. Differt porro Garum a Muriā, & Alece: quæ Garū
ex extis Sombri, & quondam Gari piscis fiebat. Muriā ex Thynno fere Antipoli thuriarum: in-
de uero & Dalmatiā nobilitans. Quanquā Muriā, siue Muries Catoni, Palladio, Columellæ nō
liquamē ex piscibus, sed salilaginé facticiam ad caseos cōdiendos, uinaque significat. Erat & sua
uestalium Muries, ut ingt apud Festū Verrius, certis præscriptisque rebus condita: ut quæ ritua-
lis esset, & ad religionis quesita ceremonias. De Alece supra dictum est. Habetur & Halme di-
cta, latine Salsugo, & Salsilago, apud Dioscoridem & Plinium. Quanquā in medendi usu Salsu-
go hæc, a Muriā nihil distat. Habetur & Halos achne, hoc est, ramentum quoddā salis atque spu-
ma, cuius mentionē apud latinos in Plinio tū cōperi. Habet & Oxalme appellata, quæ ex aceto
& sale fiat. Nā Gari genus acidi Oxigarū appellatū, ipso nomine significat. Columella Oxiga-
rū Moreti genus facit, & Oxiporū quoque dici posse uult: rationē eius cōdendi totius opis sine red-
dit. Videt id nominis habere, quia cum usus exigit, aceto Garoque diluit. Sunt & sua medicis
Oxypora, sicut & Hydrogara, & Oenogara, & Eleogara. Alioqui Eleogaron & ferculi genus
erat delicati, quod Sibariticum, missum in cœnis appellabāt: quoniam Sibarite quo aſo id ganeæ in-
uenissent, perissent, autore Spartiano. Inuenio & Oxiliparō genus esse iuris, in quo Raia, ac
ceteri eius nature pisces madi soleāt. Isicia quid sint, nemo ignorat, sed e piscibus inuenisse pri-
mus traditur Heliogabalus, inter ganeones potius quam Romanos principes dicendus.

E X M. V E R G. C O M M.

Satis in Garo nobis fore credimus, si quæ corrupta in hoc capite sūt, in antiquā & uerā lecti-
onē instaurata fuerint. Quod fiet, cum breuiter dixerimus, esse Dioscoridi Garū, nō ut alijs, quod
feculentū carnosūque in eo subsedit, sed quod liquidū, & aquæ mō fluens supnatat: neque in piscibus
tū, sed in animalium carnibus Garū etiam dici, quod ex earū salura exsudatū, siue ut Columella
ait, exsaniatum fluxerit. Et quoniam liquidum sit, ideo in medicinæ usu, non illicitum dicendum, ut
ceteri interpretes uerterunt, impressi tantum codicis lectionem secuti, in quo καταλαβόμενον
quod illitum significat legitur: sed ut nos diximus, meliorū fidem secuti, si eo foueantur. κα-
ταλούμενον enim, est quod uerbum certam in græcis habet significationem, cum liquore ali-
quo quidpiam fouemus. Quod totum rei necessitas exigit. Fouemur enim liquidis, & insper-
gimur, non illinimur. Postquam usus in strumis, & canum moribus rationem aliam docere

aggressus, non *uirs* aduerbio, quod interim, & aliquando significat Dioscorides ait, intesti-
norū tormina & coxēdices sanari, sed uerbo *uirs* usus, iniici & infundi Garū oportere dixit:
leuis in una tāū litera lapsus, sed qui usum Gari in his malis, & oēm huius scriptoris hac parte
intellectū confundat. Quod aniaduertere alij interpretes debuerāt, nec tam incerto sensu.

De lure piscium.

CAP. XXXV.

Recentium piscium Ius, modo per se, modo ex uino potum, al-
uum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur e gobijs, &
scorpionibus, & iulide, e percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus
recipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

BARBARI COROLL.

Saxatiles Græci uocant Petreos, quos saxosum mare nutrit, ut Merule, Turdi, Elephetides,
Menaluriæ. Tria enim sunt piscij marini genera, siue littoralis. Limosa regio planum piscem
educat, ut Soleam, Rumbum, Passerem. Hærentiōsi gurgites pelagium, ut Auratam & Denti-
cem. Saxosum litus, Saxatilem. Inter quos principatus gulæ Scarō. Deinde Turdo, ac Meru-
læ. Post hos Iulides, Phycides, & Percides, hoc est, Percæ laudantur ab Aetio. Iulidas Theodo-
rus in Aristotele conuertit Iuliam, Diphilus Phycidas, & Phycenas, quasi genera duo, sed uici-
na tamen inter Saxatiles enumerat. Porro contrarij Saxatilibus uidentur, quos Hippocrates
Planetas, & Cymatophlegas, hoc est, Errones & fluctuāgos appellat.

EX M. VERG. COMM.

Saxatiles, qui a Diosco. numerantur hoc capite, cuncti pisces sunt: non ideo tamē, quod Bar-
barus fecit, mutandus capitis titulus erat. Neq; enim de carne eorū agitur hoc loco, sed de escu-
lento iure, quod coctis piscibus his sit, quo deijci posse aluū hic scriptor ait. Sunt autem Aristo-
teli, Plinio, multisq; alijs Saxatiles pisces, quos saxosum litus nutrit, in agrotantium cibis a
Paulo Aegineta sepe laudati. Eorū iure hic deijci aluum iubet, sic tamen, ut simpliciter, id
est, nullo addito condimento, aut sapore alio, in aqua præter ab eo numerata, oleum & ane-
thum coxisse eos oporteat. Nos salem ex ueterum codicum lectione, & Paulo Aegineta adie-
cimus. Quod & antiqua Dioscorid. interpretatio habet. Cuius licuit mihi uidere antiquissi-
mum, & Longobardis literis scriptum codicem, incorruptæ antiquitatis, multa adhuc uesti-
gia seruantem, in quo etiam sal oleo, anethoq; additur.

De Cimicibus lectularijs.

CAP. XXXVI.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante
febriū significationes septeni deuorētur, quartanis auxilio sunt.
Et citra fabas illiti, percussis ab aspide profunt. Vuluarum exanimatiōes
olfactu reuocant. Poti cum uino, aut aceto, adherentes sanguifugas abi-
gunt. Triti, & urinariæ fistulæ impositi, stranguriam leuant.

BARBARI COROLL.

Cimices lectarios, græci Cores Clinicos appellant, ad differentiā syluestriū, in maluaq; na-
scentiū, ut arbitror. Aduersant aspidibus Cimices, adeo, ut gallinas quo die hoc animal ededit,
interfici ab illis negent. Contra Cimicibus Scolopendra, ut quæ suffitu necet eos.

EX M. VERG. COMM.

Foedissimum sanē animal, dictu quoq; fastidiendum Cimex: ob quem non male descensu-
rus ad inferos Bacchus, in lepidissimo græcorum Comico, iter illud ostendit sibi precabatur,
& eas dari cauponas, in quibus paucissimi Cimices essent. Nihilominus concordia illa re-
rum, & repugnantia, quæ totam duce natura explet medicinam, quod homini prodesset,
aliquid in eis esse uoluit, non omnibus. nam in lectis inueniuntur Cimices: inueniuntur, &
in oleribus aliquot; præsertimq; in Malua, quos Plinius Agrestes nominat. Sed his tantū
qui circa nos nati contra quartanas a Dioscori. numero septem cauis fabarum inclusi deuor-
ari iubentur. Quod remediū genus falsum, nec referendū Plinius dixit, damnauitq; agresti-
bus tantum Cimicibus id tribuens: & præter fabas, ouo, ceraue includi ostendens. Quod mi-
retur aliquis in eo, qui noua, superstitiosaq; hæc in medicina remedia magnopere amaret.
Nos in plæbe & agro uidimus aliquādo id fieri, dariq; in cunctis febribus sorbendos, tritos in

A

σομορ ἐκ τῶν τῶν
ῥῶν ἰχθυῶν

B

κόρις

Pli. l. 29. c. 4.

C puluerem Cimices. Contra aspides prodesse eosdem testis itidem Plinius. Sed quod nouisse in Dioscoride oporteat, non *καταπλαστῖτας*, id est, illitos, ut fere Græci omnes habent, sed ut in melioribus adhuc legitur, *καταποθίντας*, quod est, deuoratos.

κενταρίδι

M De Millepeda. **C A P. XXXVII.**
Millepedæ, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu, contrahunt in orbem. Hæ ex uino potæ, difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis utilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Plin. lib. 29. ca. 6. li. 30. ca. 5.

B A R B A R I C O R O L L.
O Nos, latine Millepeda, Centipeda, Multipedaq; dicit: Græci & Oniscon, & Tilon quoq; uocant: Galenus & Cyamon, a fabæ similitudine, fulcum colore. Photion & Iulus dici credit. Sed Iulus Vermis terreus est potius, quem Lumbrici uocamus. Athenæum sequor. Pilosa hæc, & arcuatim repens. Aliud genus Multipedæ habetur, quæ non arcuatur, Seps uocata, & Scolopendra minor: quæ perniciosa quoq; est. De hac paulo post tractabitur. Illud meminisse oportet, Onon & Millepedam uocari & quoddam locustæ genus, ut dicitur. Oniscos & piscis est, quem nos Asellū dicimus, duos in capite lapillos, & cor in uentre habens solus omnium; hunc Græci etiam Banchon, & Chellaren, siue Gallarian appellant. Est & Mugilis genus unum cognomento Banchos, id uidelicet, quod ab Aristotele Chelones dicuntur, omnium minimi. Porro non desunt, qui inter pisces Onon ab Onisco dirimant, Onon & Gadon uocantes, Oniscon uero Gallarian, siue Galleridan, atq; Maxinon. Nam Onias Scari genus est. Sunt enim Scari alij Oniæ, alij Aeoli cognominati. Oniscos porro Hippocrati uulnerarium instrumentum est, ad luxata corporum, Aetius Oniscon marinum, ad uitia interaneorū commendat. Piscem intelligat, an uermem, non satis scio.

D

E X M. V E R G. C O M M.
N Otæ omnibus Multipedæ hæc, nullibi non in humidis & aquosis nascentes: Græci a liuido colore *ὄνους*, quasi Afinos eas uocauerunt. Antiquiores Romani a numero pedum, nostra ætas & gens a totius corporis specie Porculos uocauit. Eas nos in aquosis & humidis agere potius, q̃ sub situlis diximus, Paulum Aeginetā, & rem ipsam secuti. Frequentiores enim in humidis, q̃ sub aquarijs uasculis inueniuntur: & ille non *ὅπου τὰς ὑδρίας*, quod est, sub hydrijs, sed *ὅπου τὰς ὑδρίας*, quod est, ubi hauritur & tractatur aqua, inueniri & agere Multipedas has dixit. Meminit earum lib. 7. de animalijū historia Aristoteles, quo loco de pediculis animalium agit, quos in piscibus similes Multipedis his esse dixit, præterq̃ in cauda, quā illi latiore habent. Vocauitq; *ὄνους ποδῖπδιας*, id est, Multipedes asellos, quoniam *ὄνους*, id est, aselli nomen hoc commune uagumq; per multa animalia in græcis fit: nam & in quadrupedum genere, piscium, & locustarum aselli nomine aliquid indicatur: quam ob causam Multipedes ille adiecit, idq; animaduertentes latini ueteres, a pedum numero Multipedas eas uocauerunt.

σίλφην ἐν τοῖς ἀρτοκοποιῖσι

Pli. li. 29. ca. 6.

B De Blatta pistrinaria. **C A P. XXXVIII.**
Blattæ eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

B A R B A R I C O R O L L.
B Lattas, Græci dicunt Silphas: ridendo cuiusdā errore, qui Silphiophoron Cyrenis agrū, hoc est, ut Catullus inquit, Laferpitiferū, a Blattis cognominatū, ratus Blattiferū, conuertit in Strabone. In his pinguitudo quadā est, capite auulso, quæ celerrime trāsit in uermiculū. Plura earū genera: Molliū, & q̃d Myllæcon appellauere, quoniam circū molas fere uisat, fortasse quā Mylacrida noīnat Aristophanes. Tertijū genus odoris tēdio inuisū, & exacuta clune fastidiedū.

E X M. V E R G. C O M M.
L Onge breuior, q̃ Plinius in Blattarū remedijs Dioscorides est. Ille longiore historia Blattarum genera omnia, & singulorū priuatim remedium aliquod profecutus est: hic in uno genere unum tantū remedium docuit. Causam peritiores conijcient. Nobis ad suspicionem inclinatus animus: facitq; in aliorū abundantia tanta capitis huius paupertas & breuitas, ut suspicemur non esse integrum hoc caput, neq; ex antiquioribus, & melioribus Græcis, quæ id ostendant,

coniecturæ defunt. Sed male sola suspitione de re aliqua censetur, ob id consulto eas relinquitur. Est autem in Plinio locus libro uigesimo nono capite quinto.

¶ De Pulmone marino. CAP. XXXIX.

PODAGRAS, pernionesq; emendat Pulmo marinus recens, tritus & illitus.

B A R B A R I C O R O L L.

Marinus pulmo, Pneumon thalassios a Græcis uocat. Pulmo etiā Pleumon dicitur Atticè.

E X M. V E R G. C O M M.

Quaes in mari Pulmones sunt, nouerūt qui ad mare habitant, fruticum natura magis q̄ pisciū; & in eorū censu & ordine, quæ a ueteribus Græcis *ωόπυρα*, mediū inter plantas & animalia habitu dicta sunt. Nomen illis similitudo fecit. Plurimū dierum in pelago hyemē Pulmones marini portendunt; & in sanandis hominū aliquot morbis egregias habent uires.

¶ De Suillo pulmone. CAP. XL.

SVillus, & Agnus, Vrsinusq; pulmo impositu, intertrigines ab aquis contractas, ab inflammatione tuetur.

¶ De Vulpino pulmone. CAP. XLI.

Pulmo Vulpis si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoq; liquefactus, infususq; auri dolore finit.

Pulmones Equini, Suilli, & Vrsini, ceterorūq; animantium, ex Dioscoridis instituto referēdi erāt. In his quādo nihil erat scitu admodū dignū, ad diuerticula multę lectionis uenimus, q̄ nec inuitalia, nec iniucūda futura sint lectoribus. Suen igit Græci Hyem uocāt, & Sin, & Hyn. Aliquādo Thytem, q̄ a suillo pecore antiqui principitū imolandi sumpsērunt lactentē porcellum, qui & Sub grumus est. Græci Orthragoriscōn uocāt, quia matutinis uenales essent. Sed cōmuniōri uoce Galathenon, Agnū Amnon, & Arna, & Arnon, & Rhena Hippocrates. Agnam Amnada, & Amnida, Hircū tragon, & Aegyptia uoce Murem. Vrsūm Arcton, Arcon ue. Arietē Veruecemue Crion & Cūlon, præcipue sectariū. Vulpem Lampurim & Alopeca. Est & uolucres animal, & piscis hoc nomine. Græci certe Alopecis uocabulo, in medicina quādoq; intelligit carunculas musculares eas, quę utrinq; lumbos anialis quasi uestiūt: quas Hippocrates Psyas, Aristoteles pro lūbis ipsis Psoas, & Psoas, Hieronymus Psyas pro renibus accepit. Alij Neurometras uocāt. Earū porro caua, inanitatesq; partiū, Cibos nomināt, & Lagonas, nos Iliā: unde Lagonoponos, qui sit dolor Iliū, alius q̄ qui laterū dolor appellat, hoc est, Pleuritis. Vulgus eā parē græca uoce, sed luxata inuersaq; significat, non lagonē dicendo, sed Galonē. Dicta uero Iliā existimo a tenuitate, q̄ ea pars imbecilla, sublesta, ianis, & flaccida sit. Ob id & Ceneōnes itē Lagonēs uocatos, Athenus auctor diligentissimus affirmat. Nam & Lagana, & Artolagana hinc nomē habuere, quasi lagara. Porro Iliā, & Iliā gracilis est pellicula, ut Festus prodidit: unde Iliā crediderim fuisse noiata. Quādoquidē tenuiora quoq; intestina, q̄ in homine, atq; oue Lactes proprie uocant, ut Plinio placet, Iliā ueteres appellauere. Theodorus certe Gaza, Lactes interpretat, pro eo quod Græci Mesenterion appellat: nec quē sit auctorem in ea re secutus uideo. Illos certe morbi genus est, ita Græce dictus: nec arbitror, aut Iliā, aut Iliā hinc esse deriuata. Iliā quidem Græcis & neruum, & uini significat. Dicitur Sus a Græcis etiā Choeros, hoc est, porcus. Nam Porceta est, quæ semel peperit, Scrophā quæ sæpius. Mulieres inquit Varro nostræ, nutritrices maxie, naturā quæ foeminae sunt, appellant Porcū, & Græci eadē significatione, Choeron, siue ut Athenæus inqt, Delphaca: unde qui fratres sunt Adelphi nominant, hoc est, uterini. Porro Delphax porcus est adultus, atq; masculus, ut grāmaticus Aristophanes existimat, Choeros uero dunt adhuc tener est. Alij cōtra uolūt. Hippocrates usum carnis e Choero dānat, cum e Sue, hoc est, uis cōmender. Certe Delphax, & pro foemina Sue capiti quādoq; a poetis, sicut & Chioeros quoq; apud Ionēs. Opimas Sues Græci quidam sunt qui Petalidas, & Larinas cognominēt. Alterū nomē a uitis deriuatū est, quos illi Petalos appellat: ubi patula habere cornua corpere. Alterū a bubus, quos ē pastoris nomine Larinos uocabāt, siue a larina Epiri uicula, siue a græco uerbo saginā significat. Dicitur Sus & Verres, & cū exectus est, Maialis: ut in gallis gallinaceis Capi, & in equino genere Cantherij: quia feminis usu careant. Nam Canthelios Græci pro segnis accipiunt atq; tardis: ab

A

πνεύμων θαλάσσιος

χοίριος καὶ ἄρνις καὶ ὄρνις πνεύμων

ἀλώπηκος πνεύμων

B A R B. Arist. de partib. animalium lib. 3. cap. 6.

B

D I O S C O R I D I S

C asinorū similitudine, quos Canthonas appellant, a clitellis, quas Cantheleos uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Spirandi officina Pulmo est, attrahens ac reddēs animā, idcirco spongiosus ac fistulis inani-
bus cauus, quibus aperiens se excipiat, contrahens uero aerem reddat: eamq; ob causam ope-
ratione folliis in fabrica, figura autē bubulæ ungulæ similis est. Preciosum uitę instrumentū,
& quod nō ratione hac tantū eam a morte distinguat, sed ex bestijs, quadrupedibusq; aliquot
homini medicinā faciat. Quā nos certius docere cupientes, quod in impresso codice legebatur
ιδάτων, quod aquarū significat, υποδαμάτων, id est, calceorū necessario mutauimus. Obseruau-
mus etiā in Vulpino pulmone monere Paulum Aeginetā, non simpliciter (πραγδιντα, quod est
siccatum, sed σικκιδιντα, id est, sale inueteratū suspiriosis prodesse. Quod adijcere his placu-
it, ut siccandi eius extī certiore rationē legentes haberent.

¶ De Asinino iocinere.

C A P. XLII.

ἰππερ ὄνου

A sini iecur inassatum, esu comitialibus prodest. Verūtamen iec-
uini edendum præcipitur.

A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 32. ca. 11.

H Aberi & piscem ferunt, qui a iecore dicatur Hepar, & Hepatus, qui felle careat, in capite
lapillos duos habēs, ostrei colore, sed rumbi forma. Hinc Eubulus, Rebaris, inquit, carere bili
me, nec mecum aliter q̃ cum Hepato pisce loquebaris. Hunc Phagro, & Rubellioni similem
Speusippus facit, Archetrato, Lebias uocatur. Inter saxatiles a Diocle ponitur. Color ei ni-
ger ab Aristotele tribuitur, oculi maiores, q̃ pro corpore, cor triangulum atq; candidum. Et
hæc dixisse in transcurso nihil officit.

E X M. V E R G. C O M M.

C ontinuata historia in uetustioribus & melioribus græcis de aliquot animalū iecore agi-
tur: neq; ab re. Male enim a toto partes, & a genere species alterius rei intercessione separan-
tur. Eorū nos fidem & rei rationē secuti, de omni in scriptore hoc iecore deinceps egimus: nihil
D Dioscoridi nociturā ab impresso codice mutationem hanc nostrā opinati: præsertim ut dixi-
mus, meliorū uetustiorumq; fide & rei necessitate confirmatā, neq; ex his quę reliqua in anima-
libus mox dicēda erunt quidpiā auferētes. Multū, longeq; plus q̃ cordi, iecori detulerunt anti-
qui aruspices: caput extorū in eo constituentes, & eius notas omnes ad futuram fortunā dili-
gentius obseruantes. Plato etiā, excepta iracūdia, affectionū aliarum omniū nostrarum sede in
eo constituta, multas et graues quæ in exto illo fiunt labe, ut nos credimus, contemplatus est:
pro quarū multiplici curatione, ut aliquā naturæ gratiam idem referret, medicinę se miscuit, &
ex diuersis animalibus diuersa curauit, & adhuc curat mala.

¶ De Genitali Cerui maris.

C A P. XLIII.

ἀνδρῶν ἄρρενος
ἰδιόθεν

G Enitale masculi Cerui tritum, & in uino potum, a uipera demor-
sis auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

G Enitale Cerui, Aedæon Elaphu, Græci appellant. Lydi genitale ipsum Acylon uocāt, ut
in Fago diximus. Est & piscis nomē Aedæon, qd & nos Genitale nūcupamus marini, a non
nullis Halefuron græce dictū: q̃q; Halefuron sunt qui pro Callionymo pisce capiant.

E X M. V E R G. C O M M.

C ertius libro sexto remedium hoc Paulus Aegineta docuit. sicari enim prius: tum reni,
sicq; cum uino bibi Genitale id Cerui iussit, addiditq; misceri remedijs, quæ ad Viperarum
morsus componuntur.

¶ De Ungula Asini.

C A P. XLIII.

ὄνου ὄνου

V Ngularum asini cinis, per dies multos binis coclearibus potus,
proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subactę, strumas dis-
cutiunt. Et illitæ pernionibus medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

V Ngues Græci Onychas, & Oplas uocant.

Desiderabunt non sine causa, frustra tamen legentes, quo humore dilutus Asininae ungu-
lae cinis comitialibus bibendus sit: nihil enim aliud in scriptore hoc legitur, & nos ex alijs scri-
ptoribus nihil habemus, quod in ea re moneamus, iudicio id medicorum seruabitur, qui ma-
lo illi noxios humores omnes uitabunt: quale in primis uinum est.

De Lichenibus equorum. CAP. XLV.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli,
qui triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

BARBARI COROLL.

In equo Lichen, & Hippomanes haberi solent. Lichen os est, dentibus caninis similis, in
genibus & super ungulas animalis eius agnascens. Hippomani uero tantæ in ueneficia uires
sunt, ut affusum aeris mixturæ, equæ Olympiæ, ad motos mares equos, ad rabiem coitus insti-
mulet. Est & herbae genus Hippomanes Hesiodo, quod & Seruius testatur. Nomen hoc &
Dioscorides duabus herbis tribuit, ut post constabit. Sunt & Limi arborum Lichenes appellati.
Est & herba Lichen uocata. Græci & Impetiginem Lichenas uocant. Hippon Græci equum,
Celæ, qui Breño duce Græciam inuasere, Marcam uocant, auctore Pausania.

EX M. VERG. COMM.

Cvis utiū & aspredo græcis Lichen est, latini Impetiginem id malū dixerūt. Eius natura
est, quoniam ex salia pituita, flauaq; bile fit, ut quales ex fistilibus crustosæ squamæ decidūt, cum
salugo in eis aliquādiu fuerit, sic ex hominis cute squamulæ etiam decidant. Hæ cum diutius
in cute hæserunt callosam contrahūt duriciem, & ab harū similitudine in genibus & unguibus
equorū excrecentes callos, Lichenas Græci dixerunt, quibus ad medicinā usa est antiquitas.
Meminit earū Plin. li. 28. capite decimo, meminit & Paulus Aegineta: qui præterq; comitialibus
omniū uenenatorum moribus mederi etiā ait. Facile est in equis id uitium obseruare. Plinius
adnatū in his equi partibus os esse dixit. Hic non magis os, q̃ quo uoluerit aliquis nomine ap-
pellare. Non esse autē os, indicat quod hic ait, ἡ τιτυλαμίνου, quod est, in callum duratos: sic
riq; κατ' ἰππράφην, non κατ' ἰππυράφην. Nihil enim hoc significat: illud autem ἀπὸ τοῦ γνάμψιν,
quod est, flectere in flexu genu, & unguis fieri, & durari ait.

De Ungula capræ. CAP. XLVI.

VNGULARVM caprinarum cinere perunctæ ex aceto, alopec-
ciæ sanantur.

BARBARI COROLL.

Capra græce uocatur Aex: quarū syluestres, atq; feras in Samothrace nasci Varro scribit,
Platycerotas uocatas. Quem locū in auctore illo deprauatū omnibus exemplaribus corrigendū
monemus. Non enī Platycerotas, sed latine Rotas legūt, ubiq; sæculis cōiuentibus. Capras a
carpendo dictas, idē Varro scripsit. Has & Chimaras Græci uocant, & Chimaron, & Enor-
cha Theocritus, qui sic caper: q̃q; idem Vatro Caprū dici propriē uult; qui sit excastratus.

De Caprino iocinere. CAP. XLVII.

Capræ inassati iocineris decidua sanie, inungi lusciosos prodest.
Et dum coquit, apertos oculos uaporari. Carnes assas uesti per
q̃ utile. Tradunt Hircini iocinoris cibo comitiales deprehendi.

De Apri iocinere. CAP. XLVIII.

Ecur Apri recens si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpen-
tium, uolucrumq; morsus auxilio est.

BARBARI COROLL.

Caprinū, & Aprugnū latine dici posse uideo. Aprum Græci, Capron uocant & Syagron.
Siculi Aschedoron, ut est apud Aeschylum. Poëtæ item Clunim, ut in Truculento Plauti clu-
num pecus, legendū censam, chlunimū. Nam & Aristoteles suem ferum Chlunim uocat. Suil-
lum præfertur omnibus Actio, si quis, inquit, animal id arida fico pauerit. Quod genus Græ-
ci Sycton appellant. Unde ortū puto, ut imperitū uulgus omnia iocinora uocare Ficata coe-

A

Λιχηνες ἵππων

De qua Plin.
lib. 26, cap. 4.Lichenes
Λιχηνες

B

δυσὶν ὀνυχίσ

ἄπασιν ὀφθαλμοῖς

καὶ ὄφρον ὀφθαλμοῖς

C perit. Sane, ut meminit Aristoteles, suum præcipue alunt, & opimant ficus, & cicer.

ἄπαρ κυνὸς
ἀναστίντες

De Cane rabioso.

CAP. XLIX.

I Ecur Canis qui rabie exagitur, ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquæ pauciores dente eo, qui Caninus dicitur. Hunc a cane qui momordit exemptum, & folliculo inditum, pro amulero brachio adnectunt.

BARBARI COROLL.
Canem græci Cyna uocant. Poëta Acamythion, rabiosum, Lysonta.

καπνιστῶν πα-
λαιὰ δίσματα

De Soleis ueteramentarijs.

CAP. L.

V Eteris Soleæ crematæ illitus cinis ambusta igni, interriginis, necnon calciamentorum attritus fanat.

BARBARI COROLL.

C Orium e calceo, græci Cattyma, & Cassyma uocant. Nostri Veteramentū, & Veteramentarios artifices appellant, quos Græci Palæurgos. Sicut Veteramenta quoque ipsa Palimpega, & Palindoria. Hinc & Veteratores fortasse dicti, a consuendis fraudibus. Nam & apud Græcos Cattyma, sutelam, dolumque significat. Nam Alutarij sunt, qui ex aluta, hoc est, concito nato corio pellicium opus faciunt; unde Alutamentum, ut Veteramentum. Pelliones quoque ab ijs differunt. Sed hæc instituti huius non sunt. Corium certe pecudis, fuscillata ut prædicant. Ut propterea utilissimū sit ad eos, qui uirgis cæsi fuerint. Pellis certe Calcedonia, in Hippocrate habenam mollem, Cornelio significat.

EX M. VERG. COMM.

D

Siccatur cremati corij cinis, ideoque exulcerationibus medetur. In quem usum non satis integro sensu illini hic iubet. Desyderatur enim, ex quo liquore, aut unguine illinendus sit. Barbarus ex Lini oleo fieri id ait, cum tamen in scriptore hoc, quod hætenus legerim, nihil huiusmodi inueniatur. Nos illud monemus, non esse herbarij, & eius qui medicam materiam tantum doceat, usum eius docere. Priuatim enim a medicis instituendus, & tractandus hic est: ideoque non esse certam eius rei disciplinam, sed oportere medicum his uti, & in usu ea addere, quæ utiliora & aptiora fore ille coniecerit.

αἰθίης ἡπαρ

De Mergi iocinere.

CAP. LI.

Siccatum Mergi iecur, & ex Hydromelite binis coclearibus possum, secundas expellit.

BARBARI COROLL.

Mergum Aethyiam Græci uocant. Et poëta Dypten. Alioquin nihil aliud est Dypten, uerbum ex uerbo, quod Mergus. Poëta Græci etiam Poigas, & Bungas dicunt aues eas. Phorion auctor.

ἀλκυονίδος ἀ-
νασχισθῆναι

De Gallina.

CAP. LII.

Difsectæ Gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium morsibus auxiliantur. Sed identidem alias sufficere oportet.

ἀλκυονίδος ἐκ-
κίφαλος

De Gallinaceo cerebello.

CAP. LIII.

Gallinarum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus. Sanguinem a cerebri membrana profluentem sistit. Subdita autem uentriculo Galli membrana, cornu non absumilis, cuius pellis in decoctionibus detrahi solet, siccatur, tritaque in uino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius e uetere Gallinaceo, aluum soluit. Abiectis itaque interaneis, salem coniici oportet, & consuto uentre, decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad treis heminas redigantur. Tota

id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinū, mercurialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem & strigmenta elicit. Prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi. Eorum uenter sale conditus, & in umbra siccat, cōtra eximias uacuationes medicamentorum trium drachmarum pondere, presenti est auxilio. Quandoquidem prōtinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

BARBARI COROLL.

GAllos gallinaceos Alectryonas, & Alecторыs Græci uocāt, quia nos a lecto excitāt. Gallinas uero Alecторidas, & Ornithias. Aristophanes Alecторыs qui mares sint, Alecтриenas quæ foeminae. Alecтриenas utrumq; continere, ludens in comœdiā monstrauit. Inuenias et pro mari bus Alecторidas acceptos, ut inquit Athenæus. Alexarchus Callandri Macedonum Regis fratris, is qui Vranopolim condidit, Gallum Gallinaceum Orithoëam uocabat, confecto nomine in quo uel ambrosiosissimus fuisse dicitur. Athenæus pullos Gallinaceos a Græcis Hippos, hoc est, quasi equulos uocari scribit: credo, quia pulli propriè sunt equorum. Dicitur & Pullastra. Sed & iubar & capillum Græci Alecторidas appellant. Persæ etiā coruos hoc nomine significauit, lute Gallinaceorum perunctos, Pantheræ Leonēsq; non attingunt, præcipue si & alium fuerit incoctum. Si Gallinarum membra auro liquefcenti misceantur, consumunt illud in se: ita hoc uenenum auri est. Intestina Gallinarum, cum rebus alijs incocta, ueteres Gigleria uocabant. Gallinarum tria genera, Cortalles & Villaticæ, siue quod idem est, Cortalis: de quibus medicinæ hoc loco habentur. Item Rusticulæ mansuetæ, ac feræ non dissimiles, Villaticis aucupio quæsitæ. Varro Africanis similes aspectu, ac facie incontaminata scripsit, a quibus productionem uocabuli Gallinaria insula uocatur, in mari Tusco Ligusticoue, contra Internum & Albingaunum. Gallinæ Africanæ sunt grandes, uariæ, gilberæ, Meleagrides appellatæ a Græcis, ut Varro putat. Columella Numidicas easdem quibusdam esse cum Africanis tradidit. Africanas uero non Meleagrides, sed ijs similes, nisi q̄ rutilam cristam capite gerunt, quorum utrumq; sit in Meleagride cetruleum. Clytus Aristotelis discipulus, Meleagrides Gallinæ describit nostratis magnitudine, paruo capite, ad portionem corporis, & glabro, crista carnea, sed rotunda, & prædura, quæ paxilli modo promineat, colore ligni, ab ore ad malas carunculam pro mento esse, sed rubriorem q̄ Gallinaceo generi. Etenim mentum uocari car-nem, quam Gallinæ in rostro habeant: hoc Meleagrides carere. Rostrum acutius, & maius q̄ Gallinæ, ceruix breuior & crassior, atq; nigra. Corpus uarium, maculis in nigro candidis, frequentibus, per interualla maioribus lenticula, solæ figura, uel orbiculis ut alæ, serrata specie, digestis in quendam uersum maculis lucentibus. Crura sine calcaribus, cætero similia Gallinacels. Mares a foeminis internosci agere possunt: tam est in specie geritinitas. Pullos suos uelut perose negligunt. Nam Medicæ, a Media, quasi Medicæ generi uillatico ascriptæ sunt: propter magnitudinem in Italiam translatæ: cuiusmodi Patavinæ modo sunt. Puluerariæ cognominatæ, a uico, ubi grandissimæ, ac spectabiles maxime nascuntur. Quas Turcarum Rex is, qui Constantinopolim ætate nostra cepit, ui muneris magni loco, a senatu missas habuit. Ad Pugillatum atq; prælia Græci e Boetia Tanagricas, itē Rhodias, ut Athenus & Columella, Martialisq; apud nos, nec minus Chalcidicas & Melicas probauere. Quidam Alexandrinæ ex Aegyptio. Pausanias Boeticarum duo genera describit, alterum præliare, alterum Cossyphos, quæ si Merulas appellans. Magnas inquit, alit Lydia, sed colore coracino, calcaria & apex Anemobus floris macula modo rubent. In rostro summo, & in cauda item summa candidæ. Ex omnibus generibus Cortales, foeminae propriè appellantur Gallinæ, Mares Galli seminares, qui Capri hoc nomine uocantur, cum sunt castrati. Gallinas Græci quandoq; uocant in comœdiā Myladraticas Gallinas, Chrysippus exiguas intelligit, easq; ab Atheniensibus expetitas commemorat. Aristoteles quoq; paruo eas corpore, sed feroces, & quæ pullos plerumq; suos opprimit. Gallinas primi feruntur habuisse Persæ, ut Meleagrides Aetoli, & Pauos, siue quod idem est, Pauones Samos insula: quos Græci quoque Taos, & Taonas bifariam, ut nos appellant. Et Antiphon orator, aues uarias. Attici Taos, circumflectēs & inspirantes ultimæ pronunciant, ut Athenæo placet.

A

Pli. li. 17. ca. 10
lib. 11. capit. 71
lib. 19. cap. 141

B

C
 οὐν δ' ἀπαλόν

¶ De Ouorum natura. CAP. LIIII.

Ouum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. Inassatum, sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo. Et condylomatis cum meliloto. Cum uua autem fruticis eius quem Rhoea dicunt, & Galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat. Per se etiam offerri solet.

κενόν τοῦ ὀφθαλμοῦ

¶ De Candido oui. CAP. LV.

Candidum Oui crudum, refrigerat. Spiramenta cutis obstruit, inflammationes oculorum infusum lenit. Ambusta si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt. Faciem a solis adustione tuetur. Fronti impositum cum thure, fluxiones arcet, aueritque. Inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo melle, & uino, mitigat. Vtiliter contra hemorrhoidum morsus crudum sorbetur. Summe tepidum prodest uesticæ rosionibus, renū exulcerationibus, faucium scabrie, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis reumatismis.

BARBARI COROLL.

D

Ouum græci Oon uocant, cognominis distinguitur: tenerum, siue liquidum, siue ut Cornelius, molle. Apalon Græci uocant: quod recentiores Elixum, & semicoctum interpretantur. Scleron, hoc est, durum, quod ita sit coctum ut indurescat. Sorbilia dicuntur, id est, Ropheta, quæcumque tantum incaluerunt. Quæ uero plus coquuntur, appellant Ephtha. Sunt & quæ Trometa, hoc est Tremula dicuntur, optime alentia, etiam si facilius transeunt sorbilia. Sed hæc alii aliter cognominant. Et quantum conijcio, tenera & tremula sunt eadem, sicut & Sclera, & Ephtha. Habentur & quæ Teganiſta, a patellis, & sartagine dicuntur, succi deterrimi. Mala sunt, & Optethenta, hoc est, toſia cinere. Ideoque ipsæ anteponuntur quæ Græci Exaphtha, siue Pniſta nominant, hoc est, quæ in aquam calidam mittuntur, immergunturque cum garo, uino, & oleo coquenda lento igni, ac modice coagulanda, ut inquit Paulus. Nam & quoddam obſonande carnis genus, Pniſton ipsi uocant: quod equidem haud reor multum distare ab eo, quod Anabrafton appellant. Sunt & quæ uulgo dici solent Oorarcha, id est, oua salſa, in ueterataque, abdicandi usus. Nunc oua piscium salita in offas, aut in pasillos durata, inclusaque membrana, ut Paulus inquit, ac fere Galenus. Item ex Phasianis, Perdices. Pessima dicunt anserina: quanquam proprietate illa comedentur, quasi promptum ingenium faciant, si quis crebro utatur eum butyro, & melle. Schista quoque oua, Plinius appellat tota lutea, quæ triduo incubata tolluntur. Causa nominis, ut arbitror, quia diuidantur, & discedat uitellus a candido. Firmitas putaminis tanta est ouo, ut recta, nec ui, nec pondere ullo frangatur, nec nisi paululum inflexa rotunditate. Putamen in aceto maceratorum molliſ. Candidum ex his, siue ut Columella inquit, albus liquor, siue ut Palladius, albus oui, admixtum calci uſu, glutinat uitri fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum ouo non ardeat, ac ne uestis quidem coacta aduratur. Luteum & Vitellus oui dicitur, quem Græci modo Lecytho, modo Chryſon uocant. Hippocrates etiam Chloron. Oua quæ non sint recentia, ueteres appellabant regeta. Est et uasculi genus Ouum, ab ouali specie. Sicut & quod Oofcyphion Græci uocant. Sed & ipsum cælum a ueteribus Ouum dici solitum, & hominem quoque ceu quandam cæli paruam imaginem comperias.

VERG.

Monebimus legetes, mollis, forbilis, durique oui discrimina in nutriendo solam facere coctura: quantumque Ouom cocturæ accesserit, tantum in nutriendo uirum illi accrescere. Et hoc est quod hic ait, magis quæ forbile nutrire tenerum Ouom: quod nos, excelsio molle uertimus. Rursusque magis quæ tenerum, siue molle, quod igne duratum fuerit. Et ut tota res certius pateat, forbile hic Ouom uocat, quod in coctura concepto tantum calore, uix densari incœperit, & liquidum adhuc caleat, potiusque coctum sit. Tenerum deinde, siue molle, quod ulteriore coctura densatum quidem, non tamen duratum penitus fuerit. Durum postremo, siue igne duratum, quod extrema coctura ad eam duriciem peruenierit, ut comanducari & teri dentibus opus sit. In quo ordine primū

illud & forbile, ab usu & sumendi ratione sic appellatum, exiguas, aut mediocres in nutriendo vires habet. Secundum mox quod tenerum, siue molle, duri comparatione, a nobis dictum est, ampliore costura densatum, maiores in nutriendo vires acquirit. Durum postremo, quod nos igne duratum etiam diximus, maximae in nutriendo potestatis est. Et hic in ouorum usu gratus & quasi census nutriendi ab hoc scriptore traditur: cui addiderunt multa & certiora postiores, medicis notissima, & a nobis ob eam causam relinquenda.

¶ De Cicadis. CAP. LVII.

Cicadae quae inassatae manduntur, uesciae doloribus profunt.

BARBARI COROLL.

Cicadae Tettigēs a Graecis dicunt: quo nomine coci quoque & absurdi, & imperiti dicebant. Sicut elegantes, & urbani Masones: a quo facetias & sales, & quae scommata graeci uocant, Megasthenia cognominantur. De Masone Athenus, Chrysippus inquit, existimasse falso, a uerbo graeco deriuari nomen id, manducum & helluonem significante. Ceterum Megarensis homo quidam Mason fuit, comediarum actor: qui & seruorum, & cocorum personas, & eam primus comperit quae Mason appellatur: a quo dicta inquit falsa Masonica uocari consueuerunt. Cicadae genus quoddam Acanthion, et Acantha uocant: quod mutum interpretantur nonnulli: quoniam in Acantho urbe Aetoliae non canat: ut prouerbi quoque loco sit, *ἀκανθῶν τῆλός*.

EX M. VERG. COMM.

Idem uerbis remedium & Paulus Aegineta docuit.

¶ De Locustis. CAP. LVIII.

Locustae odoris suffitu, urinae difficultates adiuuant, praesertim quae foeminas male habent. Earum carnes nullo sunt usui. Est & quoddam genus Locustae quae Asiracos, aut Onos dicitur, sine pennis, praelongis membris. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptim incolunt.

BARBARI COROLL.

Locustarum, quas Graeci nominant Acridas, una species Onos appellatur, & Apteros a Paulo, quia penes caret: quae & Bruchon uocari putant, rodentem sata, & Attaco in sacris literis appellatur. Licet in Dioscoride Asiraco, siue Asiraco legamus corrupte, ut arbitror. Nicander Mastae appellatur, pro Bruchon. Aristoteles Atelabon, Clitarchus in Ambracia Locustas omnes Mastaeas dici uoluit: ut Molurim, quae frumenta depopulat. Ionia Locustas a numero penarum Tetrapelyridas nominat. Oete Cornopas, alij Parnopas, & Pornopas: unde cognomen Herculi, & Apollini quoque in Aetolia, quod Locustas abigat. Ridendus uero Strabonis interpres apud nos, quod culicem, non locustam uertit in Parnote, quod & Millepede genus unum est: quod uocat Onos. In sacris certe literis sunt, quibus Locustae mandari solite, non animal insectum, sed herba hoc nomine significant. In qua sententia magnus autor Chrysostomus, & prior eo Athanasius fuisse credunt: quasi pro animali acceptae, uescendo non essent. Cum tamen in Africa, ut Dioscorides commemorat, ad Leptim, cibo etiam frequenter commendat: hodie quoque uulgo eas comedunt Aegyptij. Plinius & Indorum gentem quadae, & Aethiopum quoque partem Locustis tamen uiuere, fumo & sale duratis, in annua alimeta, praedidit post Dioscorum, Strabonemque: ut ob id Acridophagi nomen habeant. Locustam igitur, siue Pedem Locustae, pro herba sumpta interpretatur, quae uulgo Repunculum, siue Napunculum uocamus, folio angusto, desinente in mucronem cauliculis, uertice torulos habentibus, ut in asparago et salictario lupo cernit. Itemque multi lateris. Ex quibus minores alij alterno semper inguine produunt. Radicula uel diuina, laetiorque mens petita. Rapisti quidem sapore, non tamen ad ructus illiberali, ac saturus omnino gustus, sed cum aceto, & sale non iniocundus. Semen ei tam exiguum, ut discerni fere aliter non possit, quam grana sabuli. Alij Pedem Locustae pro Blito, aut ualde simili herba capiunt in Arabicis scriptoribus. Sunt qui uocabulo Acridis, non herba unam aliquam, sed summa herbarum omnium, quibus utitur homo sanctus in solitudine, accipiant. Quod si esset, perperam uertisset Hieronymus Locustas. Alioquin certum est, Locustas Iudeis inter animalia, quae non sunt interdicta cibo, numerari. Dioscorides certe paniculas auenae dependentes, ut in Bromo diximus, Locustas, Plinius Lobas appellauit.

A

r. 7. 110

Pli. li. ii. ca. 26.

Aegidius

B

Pli. li. ii. ca. 26.

Aristot. de natura animalium, li. 3, ca. 17.

C

C V E X M. V E R G. C O M M.

¶ Tplura sunt in natura gña, sic etiā pene infinita ueterib. earū nomina fuerūt. Nihilq; mō difficilius, q̃ attelabos, parnōpas, mastacas, molurides, tetrapelyridas, cornopas, & alia in gr̃cis earū nomina digito signari, & dicier, hæc sunt: generatim excepta Asiraco, quā et Afellū dicit. Ob eā, ut nos credimus, causā, Dio. de Locustis egit. Nec priuatim strāgurns, i. ueslice silicidīo, sed *duroplacit* i. urīnē angustijs mederi ait. Quo magis Barbarum demior: q̃ ad delectationem certas gr̃corum & latinorum in morbis & remedijs uoces tantopere uariauerit.

Pli. li. 30. ca. 7.

V De Ossifrago. CAP. LVIII.
Enter eius auis quam latini Ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 30. ca. 7.

Ossifragus, siue Phinis, & ut Aristor. appellat Phine, alienos fortis cū suis alit: q̃s Agle nū triēdi tedio eiecerint. Quidā nō generare Ossifragū scripsere, ut Aristor. Plinius ex Haliceto nasci Ossifragos, ex Ossifragis Vultures minores, & ex minoribus maiores, q̃ omnino nō generēt. Differt Ossifragus, ab Ossifraga, etiā si cōfundat aliq; q̃ Ossifraga septimū est Agle genus, quē Barbata dicit, & Sanqualis. Ossifragus uero qualē indicaui, laudatus ad colū uitia, qm̃ in se finitū unū habeat, mirabili natura, oīa deuorata cōficiendi. Nescio quāob̃re Ambrosius Fulcā accipiat, quā Gr̃ci Phinū uocant: cum sit apud Maronem Fulica, ut q̃busdā placet Herodius, ex Arato, quē Poeta noster ea parte uidet imitatus, ubi prognostica tēpestatū carmini suo inseruit. Idē Ambrosius Herodiū, alio loco Sturnū interpretatus est: cū Sturnos gr̃ci Paras nominent. Hieronymus Herodiū Gr̃co nomine appellat. Seruius Herodios accepit, quas nos Diomedas aues uocamus. Pausanias Herodiorū genus maximū, & pulcherrimum, & augurijs quoq; proditū uocari tradit Oenon. Theodorus Fulcam, quā Aristotele Cepphos, siue Cemphos dicitur, intelligit. Ossifragus parum ualeat oculis, nubecula etiamnum suffulsi.

E X M. V E R G. C O M M.

Avis postremi in Aglas generis Ossifragus est. Nominis manifesta oibus eā. Longissime in Aglarū cēsu Aristoteles & Plin. de eo egerunt, & q̃d facile uolētibus inuenisse sit: nihil non ab illis dictū, a Barbaro in Corollario suo repetitū est. Nō parua laboris, & p̃cij mercede querenda auis hec erit, si q̃d de ea ferit, ueslicæ calculos per urīnā pellit. Sed q̃ uerū id sit, nō est restatus Diosc. *isoplicor* q̃d est, tradi, & ferri id dicēs, sapient q̃dē & caute, in aliorum fidem & famam reñciens, quā testari ipse non posset. Cuius morē & exemplū nos etiā secuti, nihil ultra citraue mensurā & significationem uocū eius tradidimus: legentesq; in eo *isoplicor*, quod est narratur & fertur, ferri & nos uertimus: ne si p̃cipi, ut Barbarus fecit, dixissemus, ueterum p̃cepto confirmari & probari crederetur, quod hic non sua, sed aliorū fide credi tantū uoluerit.

κερυδαλιδος

B A R B.
Pli. li. 10. ca. 49

G De Galerita. CAP. LIX.
Alerita auicula est parua, apicem in uertice pauonis modo gestans, quæ assa & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

Cappellat. Itē Corydalida. Oēs a Galero, siue Galea. Nā & Epitymbiditō Theocritus, quæ tymbō, hoc est, sepulchrū patris in capite gerat. Cuzulā gr̃cū uulgus nominat. Nota est apud Aristophanem comicū poetā fabula, primā uolucrū fuisse Galeritā: priorē q̃q; terra de funditū ei patrē, cū humari non posset, nōdū enata humo cōditum in uertice. Corydalis est herba Capnos appellata: qm̃ & ipsa doloribus coli medeatur, ut auis ipsa. Galeritā nemo fere ignorat, auem pusillā, & plerumq; ob iter nobis obuiam, ingenio ad cantus docili, Passerculis, ut inquit Galenus, qui Pyrgitæ ac Troglytæ nominant, in oppidorū muris, ac turribus frequentes adsimilem, extra q̃ galero, quo illæ carent. Nam Corydylis, salsamentarius piscis est, quem nos Cordyllam uocamus, Gr̃ci etiam Cordylida, & Dorylum. At Cordila tumores in capite significat: & Mitellam quoq; Cyprijs: eam quam Persē Cidarīn, Athenienses Crobylon appellant. Porro similis est Alaudæ, Zerraneola uocata: nisi q̃ apice in terra nidificans: unde minor, aliquanto subtrus candida, cetero Pauoni similis, & crista quoq;.

E X M. V E R G. C O M M.

Variant in Alaudē remedijs latini scriptores, & gr̃ci, Paulus Ægineta simpliciter elixam

(dico autem simpliciter, in aqua tantum) sumi diu iubet: hic assam præcipit. Plinius non assam tantum sumi, sed cinerem eius etiam in aqua bibi. Adhucque, quod suæ ætatis testimonio & experientia confirmat, idem homini præstare cor eius femini adalligatum, & recens, tepensque ad huc deuoratum: pluraque alia quæ lib. 20. cap. 3. uolentes nouisse in eo poterunt.

De Hirundinibus. CAP. LX.

DISSECTIS crescente luna pullis Hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendens: e quibus duos, unum uersicolore, alterum purum eximes. Si priusquam terram attigerint, in iuuentæ corio, aut ceruina pelle, lacerto, aut collo adalligati, comitalibus proderunt. Et sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti Ficedulæ in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. Tam pullorum quæ matrum cinis, cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. Anginæ eo commode perunguntur. Vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo conflitantur.

BARBARI COROLL.

Hirundines, græce Chelidones, lapillum dicuntur pullo excluso dare. Tria earum græcia. ut Banarum, syluestrium: quæ nidorum figura deprehenduntur. Ripariarum: quæ ita uocantur, quoniam in riparum cauis nidificant. Fit hoc capite Ficedularum quoque mentio, Græci eas modo Sicalidas, modo Ampelidas, modo Ampelionas uocant: autor Pollux, ut ceteros præteream.

EX M. VERG. COMM.

Chelidones ab Hirundinibus, quas græci Chelidonas dicunt, Plinius lapillos eos appellat, qui in earum uentriculis inueniri feruntur, fabulososque existimat, & magicis artibus in medicinam illatos. Quod magis credendum in eo facit Paulus Aegineta, qui sexto sui operis libro de Simplicibus his agens, crematarum Hirundinum cinere tantum in medicina utitur, anginisque & ad oculorum claritatem ex melle inungi præcipit. Recepit tantum antiquitas omnis quæ de eis in scriptore hoc leguntur: eamque ob causam qualia in græcis, latinisque omnibus adhuc leguntur, talia a nobis etiam reddita fuerunt: cætera omnibus eadem sunt.

De Ebone. CAP. LXI.

EBoris scobe illito paronychia sanantur. Vi adstringendi ebur obtinet.

BARBARI COROLL.

Ebur a Græcis appellatur Elephas, eodem quo animal ipsum nomine. Quanquam animal Elephantus quoque dicitur. Ebur uero alij cornu, alij dentem Elephantum nuncupant. Est & ualis potiorij genus Elephas.

QUæ nos Eboris ramenta diximus, Plinius Scobem appellauit eadem significatione: et si Ramentorum amplior quam Scobis ambitus sit. Rameta enim ueteres latini dixerunt omnia quæ radendo, secando, incidendo ex materia aliqua, quasi inutiles reliqua supersunt. Scobe uero priuati, quæ lima, aut ferra detrita cadunt. Estque Rametorum uox cunctis his cõis, et quasi generis appellatio: illa autem unius, aut alterius rei tantum nota et significatio Dioscoridibus dixit scobina, detritum ex Ebone puluerem indicans. Quam rationem secutus Plinius li. 23. ait, Scobe paronychia tollunt. Nos cõiorē & ampliorē rationē secuti, Rameta diximus, quicquid ferramento detritum ex Ebone puluerem significantes: fecimusque id autoribus alijs græcorum medicis. Paulus Aegineta non ex dentibus tantum Elephantis, quod solum Ebur est, sed ex unguium, aliorumque ossium ramentis remedium hoc conficit.

De Suillo talo. CAP. LXII.

SVis talus comburitur, dum e nigro albescat: qui tritus & potus, inflammationibus coli, longisque torminibus medetur.

BARBARI COROLL.

Alus Astragalos Græce dicitur in sue: cuius uicē in homine, Malleolus appellatus implet.

EX M. VERG. COMM.

Non omni malo coli mederi cinerem suilli Tali hic scriptor ait, sed ex tribus eius generibus.

A

χελιδόνες

Pli. li. 10. ca. 374

B

ἐλεφαντίνον
ὀδόντος ῥίνισμα
Pli. li. 8. cap. 30

VERG.

ἀσφράγαλος

Cbus illi tantum, quod cessante, nec transeunte crasso, & qualis peditu efflari solet spiritu, in eo intestino sit. Habet enim plures id malum causas. Fitque aliquando, cum inter eius membranas crassus, pituitosusque humor subsederit. Nonnunquam cessante, nec transeunte illi hac spiritu: quale paulo ante descripsimus. Sepe ex eiusdem intestini inflammatione, aut ob acres erodentesque humores dolorem acrimonia erosionemque sua excitantes. Ex his secundum illud genus *ἰμπεριστασις*, id est, inflationis uoce indicasse uidetur.

¶ De Ceruino cornu. CAP. LXIII.

ἰλαφὸς κίραρ

Ceruini cornu cinis elotus, binis cochlearibus epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coeliacis, regio morbo, & uetericis doloribus cum tragacantha. Fœminis fluctione uulua laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cotusum, crudo fistili luto circumlito, & in furnum indito uritur, donec albescat. Id cadmię modo elotum, ulceribus oculorum & defluctionibus salutare est. Infusum dentes expurgat. Crudi cornu suffumidore serpentes fugantur. Feruefactum in aceto, si eo gingiua colluantur, maxillarum a dentitione dolorem adimit.

BARBARI COROLL.

Ceruini Græci Elaphon appellant, ut prædiximus, & Bredon poetæ. Alii caput ipsius Cerui Bredon uocant. Inulum, siue Inuleum eius, Nebron, et Cemada. Quanquam Cemad nondum prægreditur in pascua. Damia uero Græci Proca dicunt. Aristoteles, et idonei fere omnes, et Dionysius a Ceruo non distinguit. Philetas, primogenios Ceruos Procas dici uoluit. Ab hoc animali Proconesos appellata est. Nam Ophion, quod Sardinia quondam ferebat, & interisse creditur, Ceruus non erat, sed animal pilo, ac dente simili, Ceruo minus. Genus uero Ceruorum prægrandæ, Græci Echæineas, ab oppido uocant. Aristoteles Achænas cognominat. Inulū, Varro & ex equo & asina uocari scribit; quos & Bardones aliqui appellant, sicut ex asino, et equa Mulum: quanquam uetusti codices, tum Varronis, tum Columellæ Innum habent, non Inulū, quod ab equo patre nomen traxerit. Sed & Aristoteles quoque Innum græce dicit, quod ex mulo & equa nascitur, seu paruum mulus. Proinde Nonius marcellus, Hinnas inquit, & Hinnos, sub quo nomine accipere debeamus Varro signat. Ait enim, ex equis & mulis quæ nascantur, Hinnos uocari. Ut terra uerit, & distinctiōis studio cōfinxit, Hinnulos ceruini generis esse pullos, equi uero Inulos uocari. Quia si mutare oportet, uerius sit Inulos per simplex, n, & sine statu ceruinos pullos accipi: Hinnos autem & Hinnulos per duplex, n, & cum aspiratione, ex asina conceptos equi coitu, sed utique si sint maiores, ut Plinius adiecit: quod Nonius marcellus aliter, ut præmonui, Porro Inis, etiā infantem & paruulum Græcis significat. At Ginni per, g, ab Aristotele appellantur equi pumili, non alia ratione quam maris & ueteris uitis, Gygenios a Strabone dictos arbitror, in Liguria montanis, ubi & Mulorum genus uocat hoc nomine. Non placet quorundam distinctio inter Dorcem, & Dorcadem: quasi Dorcas ceruinus pulus sit, Dorx animal diuersum, cum Dorcas Aristoteli non Ceruum, sed Capream significet. Certe Dioscorides in coaguli mentione, Dorcadem a Dorco separauit. An, ut eo distet Dorcus a Dorcade, quo Ceruus ab Inuleo, & in Strabone Zorces, pro eo quod sunt Dorces. Nisi titium sit in exemplari legas. Ipsum cornu Ceras uocant: quod & poculi genere per suum est, Rhyton, in Poeta eminentissimo idem sit quod Cornu.

EX M. VERG. COMM.

Non placet quod in extremo capite dictum a nobis, & ab alijs est, collum ceruini Cornu de cocto utiliter molarium dentitione factos dolores. Cur enim molarium magis quam primorum, & caninorum: Omnium enim eadem ex inflammatione doloris causa, et ratio est. Nec sic canibus, qualis hic cinis est, sed natiuo unguine mollioribus remedijs, ad adiuuandas in pueris dentitiones, ut antiquiores præceperunt: qualia sunt gallinaceorum adeps, & leporis cerebrum: at in dentibus *γομφίον* molares tantum græci appellant. Fatemur id quidem: & ab his *γομφίον* facta uox nihil nisi molarium dentitionem significare potest, concedimus id etiam, sed hac conditione, dum certius aliquid & ad hanc rem aptius inueniatur. Inclinat enim animus, nobis significari et uoce aliud in cunctis dentibus malum, Nec leuibus argumentis ob-

orta nobis hæc suspitio est, non ob eas quas paulo ante diximus causas, sed quoniam Galentis usum ceruini Cornu esse ait ad restringendā gingiuam, & confirmandos dentes. Quod & Paulus Aegineta etiā, cum de omni Cornu lib. 6. agit, his uerbis testatus est. τὸ δὲ τῷ ἰατρῷ, καὶ μὴ τῷ δοντὶ, ὡς περιπλασμένον ὀδόντας ἵσται συζυγίον. Quod est, Cerui autem cornu tritum, uinoq; maceratū, mox circumlitū mobiles sistit dentes. Et paulo ante, ὅπλα πλασθέντα, id est, humentes & diffuentes gingiuas compescere idem Cornu dixerat. Plinius etiā lib. 23. ca. 10. dentes mobiles confirmare ceruini Cornu cinerem testatur: doloresq; eorū mitigare, siue insciscuntur, siue colluantur. Addiditq; statim, arbitrari quosdam ad omnes eosdem usus efficaciorē crudi cornu farinā esse, & dentificia utroq; modo fieri. Quæ omnia eodum pertinent, ut dentibus, non dentitionibus mederi ceruinum Cornu uideatur.

De Eruca.

CAP. LXIII.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum olco peruncti, a uenenatis bestijs feriri negantur.

BARBARI COROLL.

ERUCÆ, pro animali acceptæ, a Græcis Campæ nominantur. Hippocrates in herba tithymalo nascentes, aculeatas esse prodit, utiles ad conceptus. Campa dicebatur & genus illud bestie, quam Liber pater in Libya fuisse dicitur, ad Zambirram oppidum, tumulo in monumentum eius facti condito. Vt Diodorus meminit.

EX M. VERG. COMM.

HORTORUM, satorumq; omnium pestis calamitasq; Erucæ sunt, dirum animal, lento & humido tempore, auditoribus Theophrasto, & alijs nascens: multiplex hoc malum, & quod in uitibus & arboribus natum, frondem omnem & florem erodat, turpiq; facie depastam arborem relinquit. Nihil in carmine suo, & ultimo duodecimi libri capite Columella pro hori, annona diligentius curauit. Si cetera defecerint naturæ & artis auxilia, ad superstitionē translata re, in qua non ueritus est, auctore Democrito, docere quæ saluo pudore dici & audiri non possunt, sed ut ille testatur, tam presenti contra hoc malum remedio, & ope, ut non aliter q̃ cum decussa pluit arbore nimbus, vel teretis mali, uel testæ cortice glandis, Voluit ad terrā distorto corpore campe. Qualia autem ea sunt, poterunt uolentes ab eo audire. Nobis em̃ in scriptore hoc aliud consiliū est, nec in Erucis eius aliud q̃d moneamus habemus, q̃ ideo in oleribus nascentes Erucas eum appellasse, ut a picearū, aliarumq; arborū Erucis, quæ ueneni maleficium habent, separaret. Nostri ætas & gens totum hoc genus quacumq; forma sit, & ubicumq; nascatur, una appellatione Brucos nominat: cum tamen Locustarum genus quoddam priuatim Brucum Græci appellant.

De Cantharidibus.

CAP. LXV.

FRVMENTIS congestæ Cantharides, ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili uase, non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso, suspenduntur super aceti feruentis q̃ acerrimi halitum, donec æstu examinentur. Postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore, crassæ, ac blattarum modo præpingues. Sed inertes ac imbecilles, quæ tuius sunt coloris.

BARBARI COROLL.

NOMINE Cantharidū e nostris aliqui etiā Scarabeos, maxime pilularios accipiunt qui & Canthari dicantur. Et ab Hippocrate Copriones. Plinius, est inquit & Cantharis dictus Scarabeus paruus, fruteta erodens. Porro Cantharus & nauigh, & pocilli nomen est, & ornamentum quoq; muliebris, ut Athenæo placet. Ipsarum Cantharidum uenientū, in qua parte sit, non conuenit. Alij in pedibus, & capite existimant esse. Alij negant. Inter omnes constat pennas earum auxiliari, in quacumq; parte sit uenenum. Ipsæ nascuntur ex uermiculo in spongia maxime cynorhodi, quæ sit in caule, sed fecundissime in fraxino. Cæteræq; in alba rosa, minus efficaces. Improbantur duo earum genera. Minutæ, latæ, pilosæ. Item macræ, unicolores.

EX M. VERG. COMM.

MUTA sunt, quæ Scarabeis congeneres Cantharidas faciunt: sed nihil æque cognationem eorum ostendit, q̃ uaginis clausæ utriusq; animalis pennæ. Ob quam similitudinem, diminuti-

A

πλῆθος

Plin. lib. 19. ca.
pit. 6. lib. 11. ca.
pi. 23.

B

καὶ θάρδιος

Pli. li. ii. ca. 22.

Cta a Scarabeo, quem Cantharon Græci nominant appellatione, Cantharida illi simile, sed minore corporis mole animal hoc dixerunt, pueris etiam notissimum: sed quod præfenti, & infamabili ueneno hominē perimat: quemadmodū inter uenena hic ipse in extremo opere docebit. Habent ueneni par maleficiū Buprestides, & picearū Erucae. Hæ cæteris Erucis similes, & congeneres, discrimen ab arbore in qua nascuntur nomine ipso ostendit, Pytiocapæ a Græcis dicitur. Illæ bōū acerbā pestis, in eadē gente a maleficio suo nome inueniunt. Describit Buprestim Plinius lib. 30. cap. 1. his uerbis. Rarū in Italia animal Buprestis est, longipedi Scarabeo simillimū. Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nomen inuenit: deuoratumq; tacto felle ira inflammat, ut rumpat. Nouerunt nunc etiā rura hoc mālum. Vidimusq; nos, peremptum aliquādo eo ueneno bouem. Non satis tamen ostendunt rustici eius animalis formam, diuersisq; appellationibus, diuersis locis, & diuersa forma describitur & appellatur. Copiosius inter uenena de his omnibus iterum agetur. Nunc satis sit hominū causam & rationem reddidisse.

De Bupreste.

CAP. LXVI.

βουπρεστις

Simili modo reconduntur Buprestes, genera quædam Cantharidū, & pinorum erucae, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere. Qua de causa ammiscentur medicamentis quæ lepras, ferrosq; lichenas, & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui Cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxilium prodiderunt. Argumēto, q̄ urinā moueant. Alij pennas, pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 30. ca. 4.

Ptyocampæ a nostris Erucae picearum, aut pinorum uocantur. Buprestis & animal, & herba est. Ex his Erucis uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis euolant: quemadmodum & in ficu, & cynorhodo, siue canina sentice.

D

σαλαμάνδρα

De Salamandra.

CAP. LXVII.

Salamandra lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est, ignibus non urī. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur ut Cantaris in medicamenta, quorum uis est exesse, & lepras abolere. Similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo, pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruatur ad eundē usum.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 10. ca. 67.

Salamandra animal lacerti figura, stellatū, nunq̄ nisi magnis imbribus proueniens, & secuta serenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignē tactū extinguat non alio modo, q̄ glacies. Quod quidā tamen negant. Aetius per ignem inquit, cadentibus flāmis ambulat, eumq; non solum frigoris ui, sed etiā pondere corrumpit, quasi obruens. Theophrastus & frigori & humortribuit, qui ex ipsa lentus profluat. Si diutius tamen in igni mansit, comburitur. Cassiodorus, Salamandra subtile, & paruū inquit est animal, lumbricis associū, flauo colore uestitum. Salua eius, quæ lactea ore uomitur, quacunq; parte corporis humani contacta, uel pede imo respersa, toti decidit pili, & colorem in uiriliginē mutat. Si arbori irreperit, omnia poma in sicu ueneno. Ita populos sæpe totos necando frigida ui, nihil aconito distans. Quinimo, si contacto ab ea ligno, uel pede crusta panis incoquatur, idem ueneficium est, uel si in puteum cadat. Manditur tamē a suis innocenter. Similis Aescalabotæ Salamandra est Aetio. Lacerta uenena, hoc est, Pharmacitide uelocior. Aescalabotem Græci, & Colloton, & Galeotē quandoq; appellant. Nostri Stellionē. Horum transmarini pleni lentigine, stridoris acerbī, qui & uescuntur, intantū scorpionibus aduersi, ut uisis protinus torporē afferat frigidi sudoris. Tales in Italia non sunt. Viuit enim rore, ut chamaeleontes, præterea & araneis. Qui aut Stelliones appellantur, ut Marcellinus inquit, in nouis domibus cernunt, forte h̄ quos Romanū uulgus Tarantulas uocat, albas, innocuas, & pusillis lacertis similes. Sunt & Apulorum Tarantulae in agris.

Phalangiorū fortasse generis, ueneni presentanei, cōmoto statim eius mente, quē percusserint. Auxiliari cantu eis, & omnino musica ratione, cōsuetudo regionis est. A Strellione fraudulenti-
tissimo animali, stellionatus crimen, & stellatura. Spartianus in Pesennij Nigri uita, quos inqt
constiterit accepisse stellaturā. Et alibi. Tribunos, qui stellaturas inquit militibus tulissent, capi
tali poena affectos. Inuidentiū hoc animal intelligit, quoniā senectutis suae membranā de-
uoret, gnarum propter Comitiales morbos impeti eam. Hinc stellare uerbū, pro inuidere. Cū
bilia stellionis, in locis ostiorum, fenestrarūq; sunt, aut cameris, sepulchrisue.

Sunt nobis & alijs de Salamandra eadem fere omnia. Quod inter nos non cōuenit, unum
tm, & illic est ubi legitur, *ἡ δὲ τριχὴσ ταύισα μετ' ἰλαίον*. Quā lectionem illi secuti, liquefactam
in oleo Salamandrā depilare dixerunt. Nec male: id enim participiū illud plerunq; significat.
Nos autem non liquefactā, sed crematā cinerem facere id diximus: in antiquissimis, hīdemq;
probatissimae fidei græcorū codicibus, non *ταύισα*, sed *καύισα*, quod est, cremata legentes. Con-
firmauitq; nobis eam lectionem Paulus Aegineta, qui crematā Salamandræ cinerē nū ad hos
usus utitur. Verba eius hæc sunt, *σαλαμάνδρας δὲ καυθίσαντες τὴν τριχάν ἡμῶι μίγνυνται*, &c. quod est,
crematæ autem Salamandræ cinerem aliqui miscēt.

C De Araneo.

CRP. LXVIII.

Araneus, quem Holcum, alij Lycium uocant, subactus cum sple-
nio, & linteo illitus, prolatusq; utriusq; temporibus, aut fronti,
tertianos circūitus perfanat. Tela eius imposita sanguinem sistit. Vulne-
ra quæ summā cutem occuparunt, ab inflammationis iniuriā uindictat.
Est & alterum Aranei genus, qui candidam, tenuē, densamq; telam ordi-
tur, quem in loculo ligatum, & lacerto appensum, quartanis circūitibus
mideri narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus au-
xiliatur.

BARBARI COROLL.

Aranēū Græci Arachnen uocāt, Araneorū, Phalangiorūue multa gñā. Innōxiū lupi nōmi-
ne post dicendū. Noxiōrū duæ species ab Aristotele tradunt. Vni corpus exigū, uarium, acu-
minatū, assulūm ingreditur; ob id Pulex uocatus. Alteri maius & nigricans, prioribus cruri-
bus longissimis: tardū hoc & imbellē, nec saliens, æque Phalangitū. Præter hæc a Plinio uocatū
genus Aranei lanuginosum, grandissimo capite, quo dissecto, inueniant intus uermiculi duo,
qui adalligati, ceruina pelle ante solis ortū, dicunt mulieribus p̄stare ne cōcipiāt. Vm̄q; illā du-
rare anno, unde Arocion q̄q; dicūt. Est & Rhagion uocatus, q̄ acino uuæ nigro similis est, ore
mimo, sub alui pedibus curtissimis, & tanq; inchoatis. Dolor a morfu eius, qualis a scorpione.
Vrina textis Aranei p̄similis. Quintū genus Astrocion, uel Astertion, ex manu scriptis codici-
bus, aut Astorgion, q̄si discordiale & inamabile significent. Sed in picto Diosco. *ἀστέρων*, i. aste-
ritū, uirgulis albis, a proximo distinguit, cuius istū genua labefactantur. Sextū ceruleus, utroq;
perniciōsior, lanugine nigra, caliginē morfu cōcitans, & uomitus araneosus. Septimū a cra-
brone penna tantū differens, deterius etiamnum ceruleo: propterea macie quoq; conficit a se
perculsos. Octauū Myrmecion, quia formicæ similis, sed multo maior, ruffo capite, aluo & re-
liqua parte corporis nigra, guttis resperfus albis interstinguentibus, acerbiorē q̄ uespārū do-
lore torquens. Vniū maxime circa furnos, & molas. Fuliginosum describitur Actio, stellatū,
præsertimq; dorso. Nonū Terragnathus, sed duobus fastigijs. Alterius mediū caput, linea can-
dida & trasuersum. Itē altera distinguit, qui & peior, tumorēq; oris molitur. Alter cinereus, po-
steriori parte candidas inerior. Actius Terragnathon modicelato, & subalbo corpore descri-
bit, pedibus asperis, duabus incisuris in capite, recta una, per obliquū alterā, ut quaternas buc-
cas habere uideat: unde nomen. In Aethiopia tam frequētes, ut regionē in ea quandā prope Sil-
los, Acridophagosq; deferi cōgerint. Idem auctor & Cranocolap̄tē, & Scoleton, & Scleroce-
phalon enumerat. Vt primū genus longis cruribus, subuiride, aculeo circa ceruicē infesto pro-
dat: ita dictū, quia caput maxime percutiat. Secundū squalet maculis, præsertim capite, longis
pedibus. Tertiū caput duriciā silicem. Lineamēta toto corpore similia bestiis, quæ lucernas
circūuolant. Hæc fortasse uel eadē sunt, uel parū diuersa plinianis. Præcipue uero Cranocola-

A

ἀράχνη δαλόνι
λύκειον

B

Pli. li. ii. ca. 246

Cptes idem genus uidetur illud esse, qd nos Sextū haberi diximus, ceruleū, & caliginē morfu concitans, caputq; tentās, Habet & cinerei genus quoddā minime noxiū, telas mulcis in parietibus facillime pandentis: qui & Muscarius uocat, inter lupos, ut arbitror locandus. Comperio & Araneum candidū, longissimis, tenuissimisque pedibus. Item aliud genus crassissimū, textū condentis in contignationibus: quorū uterq; in dictas, aut dicendas forte species recidit. Est & discrimen Araneorū, quos Aristoteles appellauit Lupos: quorū minimi non texant, maiores in terra cauernarū uilia, & exigua uestibula præpandant. Mediū genus lautiores, crassioresq; telas orditur uel operosissime, ob id Eruditissimū ab eodem Aristotele uocatū, cuius duas quoque species reddit. Maiorem subitus pēdere, degrauatū mole corporis. Minorem, in sublime e quibusdam telæ suæ latebris obseruantem excubare, Græci qui de uenenatis ictibus scripsere, Lupum uenari muscas demonstrāt rotundū, cælata, sculptaq; ceruicula, tribus in ore, quod elatiusculum est, lineamentis. Aranei Lacertarum catulos irretiunt, utraq; labia mordicus apprehensa, telas suas altius tollendo. Incrementa amniū futura præfagiunt. Sereno non texunt, sed nubilo. Fœminā textrinae, marem uenationi operā dare arbitrantur, idq; sole oriente, occidenteque, bestiolis tum maxime infestis. Aranei clunibus in uenere conueniunt. Vermiculos similes ouis pariunt, in telas expansos: quia saliendo excludit: Phalangio excepto, qui specu in ipso cubat, magno numero, triginta fere: sed ubi emerit, matrem consumit sepius, & patrem. In cubant triduo. Cæteris generibus oua pauciora. Consumant Aranei, quater septenis diebus. Simul porro editi sunt, fila sua mittūt, siue de suo qd foris habent, ceu uellere corticeo, ut Aristoteli usum est: siue ut Democrito, excrementi cuiusdā modo, uelut corrupta intus alui natura, statuto tempore: siue ut alij dixere, quia intus sit quædā lanigera fœcunditas. Ouidius. Cætera sunt uentus, de quo tamen illa remittit Stamen, & antiquas exercet Aranea telas.

DNon habet Creta insula maleficū animal, præter Phalangium, alioquin Italiæ ignotū. Hoc ceru percussit, caneros edendo sibi medent. Nominat & Mus araneus: de quo priuatim agendū nobis est. Araneorū telæ, priuatim Vesce, hoc est, sicce, ac tenere uocari solent. Ipsum animal Araneus uocat, græce Arachnes. Tela uero Aranea, ut græce Arachne. Quæ interim & pro animalis poetæ capiūt Araneū. Phalangia uero, & quod idem est Aristoteli, Phalangas, & Phalangios arbitror esse dictos: & Phalanx internodiū significat, qualis pars ea digiti, q̄ rigida manet, nec flectit, ut Aristoteli placet. Omnibus em̄ Phalangijs internodia terna in cruribus. Ob id & fustes nodis rigentes, ut Plinius testat, Phalangas uocabāt. Vnde baiulos Vitruius, quia Phalangis uti soleant, Phalangarios appellat. In Albania Phalangium haberi traditur Straboni, Helianoque, a quo siqui feriuntur, aut ridendo, aut flendo moriant de syderio suorū.

E X M. V E R G. C O M M.

Longa est Plinio, Nicandro, Aristoteliq; animalis huius historia: fecitq; id multiplex eius genus, diuersiq; in tam exiguo corpore ad uitam & mortem hominū euentus, & quæ artificio se modo exercent, modo insidiosè ubiq; animalia hæc agunt. Prima & maxima omniū, id est, noxios, & innoxios, diuisio est: hos Græci ἀράχνης, nos Araneos, illos ambo Phalangia diximus. Rursus Phalangiorū plura sunt genera, priuatim ab antiquioribus latinis & græcis suis nominibus appellata. Araneorū itidem, sed pauciora: quæ Dioscorides hoc capite numerat. Qui primū Arachnes nomine usus indicauit, non de omni Araneo, sed de innoxio tantū agere, qui in parietibus & trabibus telas suas ad aliorum insectorū uenationem suspendit. Nonnulli mus omnibus hic est, in uetustis & rimosis parietibus habitas. Hunc Holcon, & Lycon, id est, lupum uocari hic ait: facta, ut nos credimus, a uenatione & insidijs eius appellatione: & quoniam muscas rapiat, trahat, & enecet, ideo lupum, & Holcon a trahendo dictum fuisse. Lupos Aristoteles totum hoc genus etiam appellauit.

De Lacerta.

CAP. LXIX.

σαύρας ἢ κεφαλὰ

Lacertæ caput intritū, & appositum, aculeos & omnia corpori infixæ extrahit. Varos, formicantes uerrucas, & pensiles, quas acrochordonas uocant, tollit. lecur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueat, ictus a scorpione leuamentum præstat.

Pli. li. 8, ca. 39.

B A R B A R I C O R O L L
Lacertam Græci Saurā. Huius una species Chalcidice uocatur, atq; Seps seorsum reddenda, Lacertum, & Lacertam idem genus esse conspicio, ut est apud Græcos quoque, Sauros, atq;

Saura. Est & piscis hoc nomine. Lacerta uidetur & uasis genus esse apud Iuris peritos. Sicut & apud Græcos Saura, cuius in palmā meminit Hippocrates. Est & Herbae nomen Saura, Plinio in sacra, ut Nicander poeta docuit illo uersu. *εὐδυνία*

εὐδυνία πλάτανη σίπος ὑπερίδιον

Fortasseq; in eo uerbo aut Anagallidem intelligit: quippe quam Dioscorides Sauritā a nonnullis dici prodit: & propheta Nycteritā, quasi nocturno & subterraneo dicatam numini: aut ipsum Sinapi, quod, ut Plinio placet, ab Atheniēsis Saurion uocatur: aut Nasturtiū, quod ab Hippocrate Sauridion quoq; dicitur. Lacertarū pedes Græci Blæfos uocant, hoc est, quorum pars extrorsum, pars introrsum spectet.

EX M. VERG. COMM.

Troq; genere Lacertū, & Lacertā idem hoc animal antiquiores Latini dixerūt, tam certū, tanq; ubiq; nascens, ut nihil dicendū aliud de eo sit. Nec fuisset nobis in cōmentatione eius alius labor, nisi quod fere in cunctis legisset, pellere, siue malueris dicere, tollere impositū Lacertæ caput *ῥέπον*, id est, uaros: nō sic, sed *ῥίλον*, id est, clauos legi oporteret: quod nos antiquissimorum codicum fide instaurauimus: persuasitq; id audere Paulus Aegineta, qui clauos hoc re medio curat: & præter hæc res ipsa etiā, & cōgeneres morbi uerrucæ & formicæ, quibus rectius clauū, q̄ uari confūgebant. Quinetiā uerbum *ἄρπετ*, quo hic usus est, & tollere significat, clauis aptius q̄ uaris competit, qui extenuantur leuiganturq; potius q̄ tolluntur.

De Sepe.

CAP. LXX.

Sepe, quam aliqui Lacertam calchidicam uocarunt, in uino pota, morfus suos sanat.

BARBARI COROLL.

Sepe, nunc Lacerti genus est, nunc ut diximus Millepedæ. Cum Lacertam significari uolumus, Chalcidicæ cognomento utimur. Sed an idem sit cum ea, quam Aristoteles Chalcida, & Zygnaia nuncupat, Theodorus more suo Dignydā conuertit, lacerto paruo similem, æstimabant legentes. Ipse in diuersam partem moueōr Plinij uerbis, qui quodam loco ait, Peculiariter inquit, a Chalcide Ceraſte differt. Est & turberculi maioris ac pestilentis nomen Sepe apud Hippocratem, ab erodendo impositum. Actius, Sepe inquit, serpens est cubitorum binum, crassitudine in exilitatem, ut alia quoq; genera serpentium, descendente: ingressu tardo, rectoq; lato capite, ore acuto, maculis corpore toto candidis: triduo, uel quadriduo interficit. Pausanias quoq; Aegyptum inquit, Arcadiæ quondam Regem in uenatione occupatum, & imprudentem Sepe oppressit. Viperæ similis est inquit, minime, cineris colore, maculis ex interuallo uariis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi cancer: quod & Ceraſtæ inquit, serpenti proprium est. Chalcidicem Helianus, si quis inquit, habeat in tritico, fore ut incorruptum seruetur. De serpente intelligat, an de pisce Chalcidico, qui & Chalcis dicitur, non constat. De Sepe pro Multipeda, Plinius uigesimo uolumine. Multipedem inquit, Sepa Græci uocant, oblongam, pilosis pedibus, pecori præcipue nocuam. Castigatus est in ea parte locus, propterea q̄ non Sepa, sed Ipa legebatur. Nam Ips genus uermis aliud, ut in pumice docebimus.

EX M. VERG. COMM.

Ab exedendo Sepe lacerta hæc dicta est. *σῆπες* enim, id est, exest quæ ueneno suo contigit. Lacertæ similem omnes describunt: præsertimq; in Theriacis suis Nicander dicens, *σῆπες ὅλην*. Dico autē humiles, quas ille *πιδανόες*, id est, per terrā serpentes dixit. Fuit hoc illi ab euentu nomen, quemadmodū a corporis maculosis lineis, quas in tergo habet colore æris: quod Græci Chalcon dicunt. A Chalcis, siue Calcidica dicta eadem est. Nos enim eādem credimus: fuisse antiquam & uerā eius appellationem Chalcida, quasi æneā, ob eam quā diximus causam: & ex eo deinde nomine, cuius rationem non nouissent omnes, ad adiectiui gentis, & loci nomen translata eius appellationem fuisse, dictamq; Chalcidicam, quasi in Chalcide Euboicæ plurima inueniretur. Quod falsum est: cum in Libya & Cypro nasci præcipue dicatur, & inter petras illic uiuere. Factū ob id etiā est, ut in antiquis scriptoribus modo Chalcis, modo Chalcidica lacerta inueniatur: eorūq; auctoritate diuersum, non idem creditū hoc animal fuerit. Nobis in hanc partem inclinat animus: habemusq; opinionis huius auctorem antiquissimū Nicandri interpretem. Nec eo secius liberum legentibus arbitrium relinquimus.

C De Scinco. CAP. LXXI.

σκίνος

SCincus aut Aegypti, aut Indiae, aut rubri maris alumnus: Quis inueniatur in Lydia Mauritaniae. Est autem terrestris Crocodilus sui generis, qui salus affertur in nasturcio. Aiunt carnes quae renes amplexantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmae pondere bibantur, uenerem accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut semine lactucae cum aqua potio, ueneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

Pli. li. 2. ca. 8.

B A R B A R I C O R O L L.
SCincus a Crocodilo cute distinguitur, candidiore, tenuioreque, sed praecipue seta squamarum, quae a cauda ei ad caput uersa est. Maximus Indicus. Post Arabicus. Asferuntur in ueterati sale. In Nilo natus, Ichneumone minor est, tanto inferior Crocodilo. In Libya duos cubitos excedere, Pausanias existimat. Venales Scincos ex Aegypto licet uidere, lacerti magnitudine. Sunt & Vincentino agro sui quidam Scinci, minores multo ueris, etiam si pro Aegyptijs officinae subijciunt. In Bithynia Chalcedonis agro fere, Crocodilos minutos quodam fonte nasci, qui a Zaritia dicatur, Strabo meminit: fortasseque pro Scincis accipit, quoniam paruos esse tradat. Crocodili Champsae apud Aegyptios uocantur. Iones uero Crocodilos primi uidentur appellasse, ut inquit Herodotus, sumpto nomine ab illo Crocodilorum genere, qui apud ipsos in sepibus, macerisque nascuntur.

γῆς ὑπερ

De Terrenis uermibus. CAP. LXXII.
TErreni uermes impositi, praecisos neruos glutinant. Tertianas discutiunt, decocti cum anserino adipe. Infusi, affectus auribus medentur. Cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus praestant auxilium. Poti ex passo, urinam ciunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Vermes terrenos, quidam Blininthas, alij Gensentera, hoc est, Lumbricos, & Intestina terrae uocant. Iulos aliqui, ut Dorion. Gaphagae a Syracusanis uocantur, quasi limo & terra utantur. De his non nihil & in Fibro diximus. Est Iulus & Polypus & Cantilenae genus, quae lanities siue purpurarij utuntur. Hoc nomine uocantur hymni quoque Cereris, ac Proserpinae. Sed & fruges ipsae. Propterea, quod singulares manipulos farris hordeacei, amalas Graeci uocant: ipsas uero metas, & fasciculos, qui ex multis manipulis praeligati sunt, Vlos, & Iulos nominant, ut Athenaeus inquit, meliusque Photion Vlos interpretatus, panes holoceros, hoc est, quibus nihil detractum sit. Nec satis scio, de autopyro pane, an de holopyro Photionis enarratio intelligenda sit: de quorum utroque in tritici mentione disertabitur. Terreni uermes, cum e cauenis suis prodeunt, tempestates, imbresque praenunciant.

μυγαλῆς

De Mure araneo. CAP. LXXIII.
MUS ARANEVS dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

Pli. li. 29. ca. 4.

B A R B A R I C O R O L L O.
MVrem araneum Mygalen, & Myogalen Graeci appellant. Negant transiri orbitam ab eo, naturae quodam torpore: & si transierit, moritur. Inde contra morsum eius, terram ex orbita sumendam praecipunt. In Italia uenenatus eorum ictus. Eosdem ulterior Appennina regio non habet. Monendi sumus in Theodori praefatione de animalium historia, non Mygalen pro mustella, sed Galen scribendum ab impressoribus fuisse. Mus araneus ideo Mygale dicitur a Graecis, ut placuit Aetio, quia muris magnitudine sit, & mustellina specie. Os ei oblongum, cauda gracilis, dentes quadruplici uersu tenues: quod & uulnus indicat. Ex eo purus statim sanguis effluit, mox saniosus, tum pustulae insurgunt, sunt quibus caro seculenta. Ipsum animal maxime testiculos aggreditur. Pustulae, si praegnant percusserit, nec aliter rumpuntur, ut Dioscorides & Aetius scripsere. Plinius, non pustulas, sed ipsum Murem araneum si praegnant ferisset, dissilire protinus existimant.

EX. M. VERG. COMM.

Descripserunt ex ueteribus plures araneū Murem, præsertimq; Aetius: q; ideo a græcis Mygalem, facto ex mure & mustela nomine, appellari ait, qm̄ muris magnitudine, & eadē illi caude gracilitate, et rictus longitudine, reliquo autem corpore mustelina specie sit. Amyntas tñ, antiquissimus græcorū scriptor, ideo Mygalem uocari ait, q; adulterino coitu ex mure & mustela nasceretur. Quod nec uerum, nec uerisimile est. Qui enim ad generationem coibunt mus & mustela: quibus non solum dissimilis penitus natura, sed quales multæ aliæ inter animalia uidentur natiuæ & exitiales inimicitia sunt. Meminit aranei Muris Nicander in Theriacis suis, cecumq; appellauit, homini exitialem, in orbitis rotarum pereuntem.

De Muribus. CAP. LXXIII.

Mures, qui in domibus oberrant, concisos, scorpionum plagis utilissime imponi in confesso est. Si inassatos infantes ederint, oris saluam exicari promittunt.

B. BAR. I. COROLL.

Muris nomen ut Mustellæ, animalibus multis cōmune. Alpini, quos aliqui Marmotas uulgo dictos intelligunt, magnis oculis prominēbus, media magnitudine, pabulum hyemī præparant, anteq; condantur. Alterni, ut aiunt, mas, & foemina, complexo herbarum fasce, supinos cauda mordicus apprehensa, inuicem detrahunt ad specus, proindeq; tunc temporis detrito uideri dorso. Pares hīs Aegyptij, similiter residunt in clunem, & in binis pedibus grauiuntur, prioribus manuum uice utentes. Sunt & Pontici, uitiū coloris, & uarij. Ex hoc gñe creduntur esse pelles, quibus muniiri uestes contra frigora cōpere, candidos eorū Armillos, sordidum uulgu nominat. Nam uarij, parte tātum prona, candicāt. Venetis in dorso color, a quo Dossuariæ Pelles uocantur: quandoq; ferrugineus, deterior priore. Instruxit & ex Muri bus luxuriā suam uita, alios magnis frigoribus, alios medio anni tempore a septentrionibus pēredo. Armaniū corpora, debellamus animos. Condunt mures hyeme dumtaxat albi, quorū palatum in gustu sagacissimum esse referunt. Murem Græci Myn appellant, Cretenses Smythion, siue Smynthea, unde Appollini cognomen, ut Photioni uidetur post Strabonem.

EX. M. VERG. COMM.

Pura sunt Murum ueteribus genera. Alpini, Pontici, Glyres. Et in his generibus diuerso colore & forma, sunt & in domibus nostris latentes: quos adiecta hac nota ad medicinam Dioscorides ab alijs secreuit.

De Vsu lactis. CAP. LXXV.

Lac generatim omne boni succi est. Corpus alit. Aluum emollit. Stomachum & intestina inflatione uexat. Venum tamē dilutius æstiuo habetur. E uiridi pabulo aluum magis læuigat. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum. Quoniam adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, magna ex parte uescuntur. Inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, asperum, & præpingue, non usq; adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, uentri magis idonea. Sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora scamoniam, ueratrum, lematipem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem & stomachum subuertit. Quale in Iustinis montibus esse, a nobis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nāuseant creat, & stomachum in uomitiones effundit. Adstringentius omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exuctum. In summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis,

C interancorum, uesicæ, & renum. Foris uero contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos. Recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque seruicfactum. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerofas uentris fluctiones adiuuat.

Pli. li. 28. ca. 9.
Lib. 11. ca. 41.
Aristot. de naturis animalium. lib. 7.
cap. 5. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

Lac Græce Gala. Camelinum, ab hominis lacte, dulcissimum: præcipue si ad unam mensuram tres aquæ addantur. Bos ante partum non lactescit, Asina protinus. Pullo eius ubi pingue pabulum est, biduo a partu maternum lac pressisse mortiferum. Genusque morbi uocatur Colostratio, & infantes Colostrati, densato lacte in casei speciem. Ex proximo semper a partu Colostræ fiunt, quæ nisi admisceatur aqua, durecant in pumicem. Est autem Colostrea, siue ut Plinius Colostrum, prima a partu spongiosa densitas lactis. Theodorus pro coitu lactis quocunque Colostrum plarumque accipit. Itemque pro eo quod ab Aristotele Trophalides appellantur. De Colostro & Martialis poeta meminit, & Lucilius, & Plautus in Penulo. Mea inquit Colustrea, meum cor, meus molliculus caseus. Inter opera uero ganææ preciosissimum ex lacte Caput uocatum: quod Britanni atque Belgæ Cremorem lactis hodieque nominant. conficitur & quæ Spuma lactis dicitur. Insubriæ supra memorati, Cremoris æmula, quam græci Aphrogala, ut inquit Aetius, appellant, Vtrinque dentatorum lac non coit. Tenuissimum camelis. Mox equabus. Crassissimum asinæ, ut coaguli uicem impleat. Omne Lac igne spissatur, si goretur. Spissatum igni, Pyriathes, & Pyriephton uocari a græcis, autor est Aetius. Meminit & Iulius Pollux, sicut spissatum coagulo Pyctes, quod rustici nostri Lac luncatum a luncæ & carice, aut quibus alijs seges tribus inuoluitur, appellant. Athenæus uero primum lac Pyriephton, & Pyriephton tradit uocari. Photion primum Lac a græcis etiam Pyos, & Pyon dici uoluit. Alioqui Pyos & sanguis concretus est: quod & Pus dicitur. Pultem ex ouo & lacte Oogala medici cognominant. Lacticia, qui uocantur ex Lacte quoquo modo cibum, etiam si quidam in sacris literis id usurpant, non probo. Lactarium opus dixerim potius, autore Spartiano. Coenas inquit Heliogabalum exhibuisse alia die de oleribus, alia de pomis, alia de dulciarijs, alia de opere lactario.

D

ὑπὸ τοῦ γάλακτος

De Sero lactis. CAP. LXXVI.

Lac quodcunque Serum continet implicitum. Quod ubi discessit a lacte, multo potentissimum ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri: ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis.

Strabo lib. 3:

B A R B A R I C O R O L L.

Serum iam multo potentissimum quidam ad tertias decoquunt, & sub diuo refrigerant. Græci Orron uocant. Hoc quemadmodum a lacte separetur, Dioscorides mox indicat. In Erythia iuxta Gades, insula unius stadij, patente freto, lac sine Sero premi tradunt, ut Strabo relulit: tanta pinguitudine, ut in caseo conficiendo, aqua diluatur.

ὑπὸ τοῦ

De Schisto, ceu scissili lacte. CAP. LXXVII.

Ex omni lacte fit quod Schistum appellant. Lac autem fictili nouo aut ter efferbuerit, totidem acetum mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis. Ita enim ferescens, liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, festariumque argenteum frigida aquæ plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens efficax

est contra rosiones ustionesq; ab exitiabilibus medicamentis factas, uti a cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscya-
mo, dorycnio, aconito, aut ephemero. Præsertim bubulum ad id eximie
confert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum
peculiariter collutos dentes, gingiuasq; stabilit. Fluxiones alui, si ulcera
sentiantur, tenesmosq;, ouillum, bubulum, aut caprinum cum marinis la-
pillis decoctum, sistit. Per se autem, & cum hordeacea prisana, aut halica-
ceo cremore infusum, magnopere intestinorum rosiones mitigat. Exul-
ceratæ uulvæ immittitur.

B A R B A R I C O R O L L.
Lac Schistæ uocatur, quasi scissile, ac dimidium, quoties uidelicet concretam eius partem,
quæ Casealis dici potest, ab serosa, ut Galeno placet, separamus. Improprie tamen Schiston in-
quit lac nonnulli appellant, id in quo aut littorales calculi, aut ferrum ardens restinctum sit.

¶ De Muliebri lacte. CAP. LXXVIII.
Humanum lac dulcissimum est. Et maxime alit. Mammas autem
lexuctum, prodest tibi, & stomachi rosionibus. Contra haustu-
leporum marinum præsidio est. Oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris
polline instillatur. Podagricis utile est, cum meconio, & cærato illitum.
Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, &
neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus. Nisi si
quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, Schistum præbeat. Pri-
mipera canis lacte perunctos narrant glabrescere. Potum contra uenena
antidoti uicem obtinet. Abortus mortuos expellit.

B A R B A R I C O R O L L.
Lac mulieris ante septimum mensem inutile, insalubreq;. In omni usu præfertur eius, quæ
geminis enixa fuerit, tum eius quæ marem fere. Inefficax eius quæ sequiorem sexum edidit.
Eius quæ marem peperit, lacte gustato, Canes rabiosos fieri negant.

¶ De Caseo. CAP. LXXIX.
Caseus recens, sine sale, sumptus alit. Stomacho utilis est, & facile
in membra delegatur. Corpus auget. Aluū modice emollit. Ali-
us tamen alio præstantior, pro natura lactis a quo conficitur. Decoctus
autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit. Illitus, oculorum inflā-
mationibus & sugillatis prodest. Qui uero recens salitus est, minus ali-
menti præbet. Corpus apte minuit. Stomacho aduersatur. Negociū uē-
tri, interaneisq; exhibet. Vetusiore sistitur aluus. Sero quod a caseo ma-
nauit, q̄ optime canes aluntur.

B A R B A R I C O R O L L.
Caseus non fit ex utrinq; dentatis, ut diximus. Bubulum, Caseo fertilius q̄ caprinum, ex
eadē mensura, ut Aristoteles tradit, pene altero tanto. Quæ plures quaternis mammas habent,
Caseo inutilia, & meliora quæ binas. Caseus infumatus laudabatur a ueteribus; nec hodie cō-
temnitur. Omnis porro Caseus, senectute fit salsus: sed in iocundū tamē acorem solitos lac co-
mo maceratus. Barbaros Caseo non ufos tradunt, sed in iocundū tamē acorem solitos lac co-
gere, quod & Oxygala uocatur sit; cuius rationē aliam Columella postremo sui operis libro
tradidit. Casei genus Saptum, quasi putrē dicas, Faciunt utilem celiacis. In Plinio legendū sit
epityron, an caprarum, in mentione Casei lib. ii. controuersum diu fuit. Ipse nō epityrum, sed
r ij

γυναικὸς γάλα

Pli. li. 28. ca. 9.

τυρὸς νιγρόσ

Caprarum lego, non quia Epityrum oliuæ fractæ genus sit, ut quidam putant: quandoquidem oliuæ genus illud pityrum & pityrida, non epityrum appellari constat: sed illa ratione potius, quod nisi caprarum gregibus sua laus est, in recenti maxime eam augente fumo gratiam, & reliqua legamus, uix stabit sensus, nisi plane quis extorqueat. Præterea, cum de bubulo, & ouillo Caseo disseruisset auctor, maxime sequens erat, ut de caprino quoque loqueretur, ne quia sit omnium fere deterrimus, improbari omnino iudicaretur. Adde, quod infumari, non alius magno fere Caseus, quam caprinus assolet. Nec fere placet, nisi musceus, atque recens. Athenæus latina uoce usus, fumosos Caseos appellat. Laus Caseo Nemaufensi, Lesuræ, Gabalicique pagis. Alpino duobus generibus. Docleati, ex Dalmatia. Vatusico, ex Ceutronia. Cebano & Liguria & Apennino, maxime lactis ouium. Auximati, ex Umbria. Item Lunensi magnitudine conspicuo, singulis quoadque milibus pondo. Item Vestino, Crustuminoque, ac Coditio campo. Nam Siculum Iulius Pollux meminit, & Aristoteles, qui & Phrygium quoque nominat: sed Siculum ex ouillo & caprino mixtum lacte, Phrygium ex equino asininoque fieri solitum commemorat. Siculum Athenæus præferri putat omnibus, utique post Achaicum, ex oppido Tromilia, unde Tromilistis dicatur, & a Simonide Stromilium, ex caprino lacte. Epityrum uero caseus non est omnino, sed ut Varro inquit, edulium, Siciliae quam Italiae frequentius: cuius uocis in Plauto mentionem haberi sciunt omnes. Vnum inquit epityrum edam, Pollux uidetur hoc Xeriantyron uocasse, siculum edulium id esse affirmans. Athenæus Hypotyrida placenta genus facit, fortasse idem cum Epityro. Nam Catatyron condimenti nomen est e caseo, apud eundem autorem. Trans maria Bithynius fere in gloria erat, Salonites ab oppido appellatus. Gallici fa por medicamenti uim obtinet. Nunc a Cisalpina Gallia comendantur, Placentini maxime. Formaginem Theodorus pro Caseo cur dixerit, aut quem autorem secutus ita uerterit, quod Aristoteles Trophalida scripsit, nisi quod in Columela forte legit, coctum lac in fiscellas, aut in calathos, uel formas transferri solitum, non uideo. Aliubi Theodorus idem, Trophalida colostrum interpretatur, ut prædiximus. Neutrum satis probo. Caseum Græci Tyron uocant. Eius discrimina pulcherrime Antiphanes poeta reddidit, Chloron, hoc est, recente atque molle: qualis in fiscella fertur, ob id Fiscellis uocatis: quia inde caseum abliguriunt: Xeron, hoc est, aridum, atque ut Iulius Pollux interpretatur, macilentum. Copton, hoc est, prædurum. Nam & Coptorhodia, & Copra ficus hinc nomen tulere. Xyston, hoc est, consilem atque rasilem. Nam & horum sic dicuntur. Tmeton, hoc est, scissilem. Pecton, hoc est, coagulum, colostratumque: nam est qui accrescere incipiat & lacte ficulneo coierit, Opian uocant. In Creta Caseos quibus lata forma est, sed gracilis, Thelias, id est, quasi feminas appellant.

De Hippace. CAP. LXXX.

ἵππας

Quod Hippacen uocant, Caseus est equinus. Ea uirus redolet. Magnopere alit. Bubuloque proportionem correspondet. Nec desunt qui Hippacen, equinum coagulum appellarint.

BARBARI COROLL.

Hippace differt ab Hippice: quod Hippace caseus atque coagulum est, Hippice uero herba, Scythica equestris, a Theodoro dicta. Phrygiū caseum, Aristoteles ex equino & asinino lacte confici solitum scribit, ut in caseo notauimus. Hippocrates inuentum scribit Scytharum Hippace. Ex equino lacte, in ligna, inquit caua infundunt id. Deinde obturbant, in natantem spumam, Butyrum uocant: id quod fidat, Hippacem: id quod in medio subsistit, Serum. Vires exiguo cibo sustentat Hippace, quemadmodum & Hippice.

βούτυρον

De Butyro, & eius fuligine. CAP. LXXXI.

Elacte pinguisimo probatum fit Butyrum, quale bubulū est. Fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue discedat. Butyrū natura oleosum est, & emolliens. Vnde largius epotum, uentrem resoluunt. Prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle, si infusetur, dentitiones adiuuat. Gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris, capaciōra alimentorū facit corpora. Et ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes, et durie

cius uulua, quod nec uirus respicit, nec uetustatem sentit. Butyrum efficac-
est. Dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicamēta ad-
di solet, quæ pus mouent. Vtile præsertim cum nerui, aut cerebri mem-
branæ, uelica, aut ceruix uulnera acciperit. Id autē purgat. Replet. Car-
nem creat. Ab aspidē percussis utilissime imponitur. Recens obsonijs ad-
ditum, olei uicem pensat. & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ
ex eo Fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernam nouam ingestum ac-
cenditur, fictiliq; operculato, quod superne in siphunculū desinat, & sub
pedibus cuniculos clybani modo habeat, crematur. & subinde aliud in
absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur Fuliginis modus, quem fa-
cere institueris. Penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medi-
camentis oculorum, exiccare & adstringere. Fluctiones cohibet. Et ulce-
ra celeriter ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Butyrum spuma Lactis est, cōcretiusq; q̄ quod Serum uocatur. Hic & Butyrus dicitur, &
Butyrum, & ab Hippoc. Picerion. Laudatissimus Barbaris cibus, & q̄ diuites a plebe distin-
guat. Butyrum a boue nominatur, q̄a e bubulo lacte fiat: ut miretur Dioscoridem Galenus,
q̄ ex caprino, & ouillo cōfici lacte dixerit. Ex caprino tamē fieri solere, testis est Plinius. Quod
quidem cū fit, hyeme calefacto eo, æstate uero dumtaxat expresso utuntur, crebro lactatu, in
longis uasis, angusto foramine, additur paulum aquæ, uti acefeat. Quod est maxime coactū,
in summo fuit. Id exemptum addito sale, Oxygala, hoc est, acre Lac appellant. Reliqua deco-
quant in ollis. Ibi quod supernat, Butyrum est. Quod magis uirus respuit, hoc præstantius.
Oxygala fit & alio modo, lacte acido in recens addito. Casei genus a Galeno Oxygalactinon
uocari Asia, Pergameno præsertim agro dicitur.

Pli. li. 28. ca. 9.

EX. M. VERG. COMM.

EX lacte Butyrū fit, spuma eius dū coquit cōcretior q̄ Serū: & qm plurimū e bubulo fit, a
boue nomē inuenit. Alioq; ex omni lacte fieri posse, & hic, & Plinius testati sunt: qd antiquiores
aliqui negauerunt, nomen magis, q̄ rei naturam contemplati. Oleosum natura Butyrum esse,
Diosc. ait, & p̄ter hoc non μαλκτικὸς διναμωσ, quod fere in omnibus græcis legitur, quod molli-
endo aptum significat, sed ut in uetustioribus, & ut res ipsa exigit, γαλακτικὸς, i. lactuosæ natu-
ræ. Barbarus ex priorē illa lectione, molliens id uertit. Nos ex posteriore, oleosum natura Bu-
tyrum esse, & lactis naturam sequi diximus: non tam ueterum codicum fide & auctoritate per-
suasi, q̄ passiuū eius uerbi ἔχειται significationē admoniti, quæ apte id indicabat.

B

De medicina Lanarum. CAP. LXXVII.

Secidē Lang molles, e collo, feminibusq; laudatissime habent. Sub
ueniūt in initia uulnerib. pcussis, desquāmatib. liuidis, ossib. fractis,
aceto, oleo aut uino imbutę. Siquidem capaces sunt liquidorum, quibus
oblesæ partes fouentur. Et ob pecudum sordem, sic enim Oesypum uo-
cant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cū ace-
to & rosaceo efficaciter imponuntur.

ἔρια τῶν πηρῶ
τὰ ἀπαλά

De Lanis usis. CAP. LXXXIII.

Rematarū Lanarū cinis crustas obducit. Excrecentias in carne
cohibet. Et ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & car-
p̄æ in fictili crudo cæterorum more uruntur. Nec secus purpurarum to-
menta cremari solent. Aliqui cum sordibus Lanæ carpūt, & melle irri-
gant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris paruli, uerucula inter se di-

κακαυμένα ἔρια

Cstantia componunt, & conceptas lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tædæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interfractis, leuiter succendunt, & uistas tollūt. Quod si e tæda pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis aqua addita manibus confricant, & confidere patiuntur. Idq; sapius, mutant aqua donec linguam adstringat, nec mordeat.

Pli. li. 9. ca. 48.
Lib. 29. cap. 2.

Suppliciu ad
ulteriorum a-
pud Cretenses
olim.

B A R B A R I C O R O L L.

Lanam, Græci Erión uocant. Ad medicinam laudatissima est Gaïatica, Tarentina, Attica, Milefia. Lanæ quibusdam locis non tondentur, sed euelluntur. Ob id cum dempta est, atq; cōglobata, quidam Vellera, alij Velumia appellant. Mirum quod tradunt, mederi Lanæ pecori, cibos fastidienti, si cauda cōartissime præligata, indidem uellantur: statim enim uelci pecus incipere, & quod extra nodum sit, præmori. Lanam succidam Græci Rhyparam, Ionîa Siny-pen, alij Oesypiram, hoc est, sordidam, & cum Oesypo suo, de quo pãulopost dicturi sumus, nominant. Galenus autor. Succidam, a sudore dictam Varro existimat: quia oues cum inceperint sudare, tondentur. Nam Succidia, non a sudore, sed a sue nominatur, cuius caro est. Lanarum sunt & a coloribus, quos bibunt, discrimina. Cymatiles a fluctibus, Geranochores a gruibus, iam ab Amethysto, ab serenitate, a Croco, a Rosa, a Myrto, a Glandibus, ab Amygdalis. A Cera, a Coruo Coraxicæ, a Purpura Colossinæ. Et hæc partim ex Plauto, partim ex Ouidio in Artibus, & Strabone. Adulteros, ut Aelianus tradit, in Gortyna Cretæ deprehensos, Lana coronabant, mollicia probro: atque ita per ciuitatem, ad Magistratus traducere moris erat.

E X M. V E R G. C O M M.

Quales fuerint ueteribus, & unde nomen inuenerint succidæ Lanæ, satis docuit Varro rerum rusticarum secundi uoluminis ultimo capite, cuius uerba hæc sunt. Tonsuræ tempus inter æquinoctiu uernum & solstitiu, cum sudare inceperint oues, a quo sudore recens Lana tonsa, succida est appellata. Hic præter tonsuræ tempus, quod succidarum appellatione signatum ab eo est, ex qua etiã pecoris parte tondendæ essent, ad medicinã docuit: ex collo scilicet, & femoribus, unde molliores, & copiosiore sudore sordidiores tondent: quorum alterum molle, alterum adspergines felicius cōbibit. Dicimus autem adspergines quæ Græci iucpiuata, & iucpiuata in sua medicina passim dicunt, quæcūq; humida & liquida corpori inspergunt: quæ quoniam cito dilabunt, linteolis, stuppis, alijsq; huiusmodi inspersa imponunt: & in hunc usum apollimas esse pecoris lanas Diofco. ait Nec aliud in Satyra Aquinas poeta indicauit dicens. Vinu, qd succida nollit Lana pati. Eo em, alijsq; humoribus ad medicinã quotidie inspergunt.

bisvntis

O De Oesypo, pecudum sorde. CAP. LXXXIII.
Oesypum uocant græci, succidarum lanarum pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles radícula curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris amplius coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu cocleari uti respumet agitur, aut lignea rude ualidiuscule cōturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit. Deinde marina respergitur. Et confidente pingui quod super natabat, collectoq; in fictili uase, denuo aqua in labellu fusa agitur. Spuma mari perfunditur, & demum eximit. Hoc tantisper fieri solet, dū consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum Oesypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia, cōfestim demitur. Exclusaq; sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ Oesypum, adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidūq; spectet. Tū in fictili uase condit. Verū omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus

non secus atq; cæratum foeminae, confricant. Ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in aeneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua ut diximus lauant, colatumq; in fictilem ollam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat. Et si manu in concha fricetur cum aqua frigida albescat, nihil in se duri, aut concreti habens. Veluti quod cærato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulua, cū meliloto & butyro. In uellere appositum, menses & partus euocat. Vlcerà non aurium modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. Contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pingui tudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligit, uti demonstrauius. Quæ in oculorum medicamenta commode addi solet.

B A R B A R I C O R O L L.

Oesypum, & Oesypus, utroq; modo effertur, ab eo quod Oes, hoc est, ouis. Græci masculino sere utuntur, Latini frequentius neutro. Laudatissimum a sudore alarum & seminum, sicut in Atticis ouibus genitum: quod & notauerit Ouidius, Oesypa quid redolent, quis mittantur Athenis. Hippocrates, Caprinā e clunibus sordem uocauit Oespen, ouillam Oesypiden: quo quidē nomine, Lanam quoq; succidam significat quibusdam. Quidā hoc a Galeno Hysopū dici putant, errore uulgi, & quidem a Græcis orto, qui non Oesypum quādoq; sed Hysopum scribant: ut siue prudentes, siue imprudentes, non Oesypum simpliciter, Hysophon Hygron, & Hysopum pharmacum sapissime cognominent: quasi ab Hysopo herba distinguere uoluerint, ut Paulus in compositione, quam a Ruta *παραγύριον* appellant, utilem pleureticis.

Pli. li. 29. ca. 23

B

De Coagulo.

CAP. LXXXV.

Leporis Coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum morfibus, coeliacis, dysentericis, & foeminis fluctione uulua laborantibus, ac reiectionibus a pectore, auxiliatur. Sanguinem concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulua cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant. Potū uero partus enecat. Et post excretiones, pariendi spem adimit. Equi Coagulum, quam Hippacen aliqui uocant, priuatim coeliacis, dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ, apri, cerui, uituli, bubaliq; Coagula similes naturas fortiuntur. Contra aconiti potū in uino, & concretū lac in aceto, cōuenienter assumuntur. Hinnuli Coagulum triduo a purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini Coagulum castorei uires representat. Comitibus, strangulatis uuluis potu conferre existimatur. Sed syncæri hoc experimentū est. Aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animalis, tū præcipue agni Coagulū, maduerit. Quod si uerū est, statim lique-

πρωτα δαγδον

Cfcit in aquam. Sin minus, confimile permanet. Excipitur autem catu-
lis qui nondum natate possunt. In summa, Coagulum omne dissipata
cogit, & coacta dissoluit.

B A R B A R I C O R O L L.

Coagulū Pitya, & Pitya græce dicit, & Tamisos poetis. Plinius ex hædo laudat. Aristote-
les ex Inulo. Præcipuū tamen Dasypodis: quod & profluuiū alui medeat, unius utrinq; denta-
torū. A Pitya Pitynā uulgo dici, concretū igni serum, & quod in caseum coire non potuit exili-
mo. Est & apud Græcos id quod appellant auctores noui, Melcen, imbutū uase aceto, atq; ita
excalfacto, mox lacte infuso, ac nocte tota quiescere citra ignem permisso. Quæq; & alij plarig;
modi sunt. Sed hic & compendarius, & facilis. Sunt quibus Melce uideat esse, quod Oxygala
uocauimus. Tamen butyrū quoq; rustici non aliter fere appellant, q̃ Melcen.

E X M. V E R G. C O M M.

Nota oībus res Coagulū est. Et nihilominus qui in græcis literis se tantū profecisse iactant,
ut singulis diebus aliquid cōponere se posse dicant, & depromere, quicq; sacrarū literarū antiq; in-
terp̃tes nouis æditionibus castigare ausi sunt, in Plutarchi cōmentariolo, cuius titulus est, quo
modo quis ab inimicis utilitatē inueniat, pro coagulo lac uerterūt: non intelligētes, quantū ab
altero alterū differat, & q̃d in ea re scriptori illi propolitū & consiliū fuerit. Licetq; auctore Ari-
stotele lib. 1. de historia animalū, Coagulum lactis substantia sit, non tamē illi idem est: & utre
ipsa differunt, lac, & Coagulū, sic etiā diuersis a græcis & latinis appellationibus indicant. Mul-
ta de animalū Coagulis in utraq; gente uetustissimi scriptores docuerūt. Sed in græcis omnū
copiosissima historiam eodem libro & loco Aristoteles, & inter latinos Plinius.

De Adipis ratione. C A P. LXXXVI.

AD E P S A N S E R I N V S, aut gallinaceus, recens, & sine sale
conditus, ad uulua uitia proficit. Sale inueteratus, & qui tem-
poris spacio acrimoniam concepit, uulua inimicus est. Recens ex
emptis membranīs in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere ca-
paciō sit, quantus sit modus Adipis quem curare institueris, obstru-
cto diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. Eliquefcens inde hu-
mor in fictile alterum excolatur, donec Adeps omnis absumatur: mox
loco uehementer frigidus reconditur, & ad usus digeritur. Alij fictile ful-
ciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ
solis uicem penset. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranīs teri-
tur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento. Mox
lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ
lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps, & Vrsinus hoc curan-
tur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-
giore aqua coelesti & q̃ frigidissima, exemptis tunicis, diligentissime ma-
nibus confricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua aqua
abluitur. Cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergi-
tur. Et subditis leuibus prunis, spatha mouetur. Eliquatusq; colo tran-
sfunditur in aquam. Vbi uero refrixit, & guttatim aquam omnem ex-
cluit, in prælotum fictile demittitur. Et infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quo facilius faculentum uirus pessum eat. Postea
in pilam spongia madefactam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens
in imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; fictile

li bene operculato, perq̃ frigidis locis reponitur. Hircinū seuum, ouillū, ceruinūq̃ ita curato. Elotum ex his quodcūq̃, tunicis ut in suilli mentione dictū est exemptis, pilā emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam conijcito, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, atq̃ in aquam colato. Cumq̃ refrixerit, iterum in loto fictili eliquato. Et quæ ante diximus facito. Tercio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato. Refrigeratūq̃, ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus maxime detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendū est. Mox in pila tundendū diligenter, affusa maris aqua. Cum uero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendū, & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendū. Decoquendum, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui attas casminas, quaternis tyrrhenicæ cæræ drachmis. Excolatumq̃, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum, opertumq̃ soli interdū credendum, ut ad candorem reducatur, & uirus euanescat. Priuatim taurorū pinguiā sic curari debent. Renibus euulsum pingue, profluente amnis aqua abluito, detractisq̃ tunicis fictili nouo postq̃ exiguū salem insperferis, liquefacito. Dein in nitentem aquam excolato: & ubi concrefcere ccepit, manibus iterum confricando uehementer lauatū, aqua sapius infusa, refusaq̃, donec q̃ optime elotum uideatur. Rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquito. Et cum iterū efferbuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. Postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitū, uino odorato perfundatur. Eadem quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur, & sine sale, præsertim affectionum earum caussa, quibus sal aduersari solet. Sed ita paratum, non magnopere albescit. Eodem modo pardorum, ac leonum pinguiā curari oportet. Taurorum autem & uitulorum pinguiā, necnon ceruorum medullæ, odoramentis imbuuntur hac ratione. Pingue quod odoratum reddi debet, demptis quo diximus modo membranis, elotum, & uino q̃ odoratissimo nulla maris aqua diluto feruefactum, pernoctare sinitur. Alterum id genus uinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisite colatur. Nouemq̃ eius heminis, iunci Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casia modis adduntur. Et xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi singulæ uncia. Omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter effervescent, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. Postridie uinum effunditur. Aliudq̃ generis eiusdem adijcitur.

- C** Ter simili modo conferuescat. Matutinis uinum effundatur. Et abluto uase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. Postremo eliquatum pingue, & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbutur, quod antea curatum est. Verum ante dicta prius inspissari solent, quo facilius sibi odoramentorum uires adfiscant. Itaque assumens quod uoles cum uino feruescit, impositis una myrti ramulis, serpylo, cypetro, item aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen pro usu, uno dumtaxat horum contenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exemptum leniter & linteocolatum, aromatis uti expositum est imbutur. Adipibus spissamenta sic fiunt. Syncærus, & sanguinis expers adeps, reliqua habens quæ sapere tulimus, in ollam nouam demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet: lento igni feruescat, dum uernaculus odor aboleatur, planeque uinum redoleat. At ubi deposito uase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarii, & seminis loti, eius inquam cuius e ligno ludicræ tibie faciuntur, tulinæ quatuor adijciuntur. Lento igni subinde miscendo decoquuntur. Cumque odoris uirus euauerit, excolatusque adeps refrixerit, una contusi aspalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntque. Postridie in fictilem ollam tricongiam ea omnia cum adipe iniecta, additis sextariis tribus uini, una feruescunt, quousque & uini & odorem spissamentorum ipse cocontraxerit: qui eliquescent colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quæ pinguius myrrhæ uino maceratae, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus, asferinusque sic odoribus imbui solent. Cuiusuis eorum percurati sextarii duo fictili olla excipiuntur, erysceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami plane contusi singulorum fescuncia admiscetur. Vini lesbii ueteris cyathus unus adijcitur. Ea ter efferuescunt prunis. Mox uase sublato ab igne, die noctuque refrigerantur. Postridie liquata per linteum mundum in uas excolatur. Vbi uero adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto, perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet. Aestate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui tyrrhenicæ ceræ momentū adijciant, quo facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps, & urfinus, ceterique id genus, odoramentis imbuuntur. Verum Sanfuci odorem adeps ipse representabit hoc modo. Curati quæ optimi adipis, præsertim taurini mina una, tempestiuque sanfuci exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insparso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperto nocte quiescunt. Matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua coquuntur. Dumque suus adeps odorem exuerit, defæcatus, ac bene opertus, nocte tota permanet. Postero die deversa forde quæ pessum ierat, sanfuci, ut dictum est, contusi iterum sesquimi

na priori pastillo adijcitur. Eodemque modo in offas cogitur. Alijs quæ diximus peractis, decoquitur, & colatur. Quod si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut uitulinum, a putredine tueri uelit, ita faciendum est. Quamuis Adipem diligenter elotam, & siccata in umbra, super cribrum per linthea munda manibus uehementer exprimat, hincque confutâ umbroso in loco suspendat. Et post multos dies noua charta inuolutam, frigido loco recondat. Pinguia autem, indito melle, uindictantur a putredinis uitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, odorem ciere. Taurinus adeps, bubulus, & uitulinus aliquantum adstringunt. Earundem uirum compos leoninus. Nam resistere eum aiunt ijs qui insidias moluntur. Ceruino, elephantinoque perunctos, serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus. Qua ex causa decoctus cum polenta, rhoe & caseo, dysentericis datur, & cum pisanæ succo infunditur. Ius decocti phthysicis in sorbitionibus prodest. Datur quoque utiliter his qui cantharidum uenena hauserunt. Hircinus, ut qui ualidissime discutiat, podagricis auxiliatur cum fimo capræ & croco impositus. Huic proportionem respondet ouillus. Suillus uero contra uulua & sedis uitia idoneus est. Ambustis igni medetur. E sue uetustissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit. Elotus uino pleuriticis prodest. Cinere, aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt, cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusque conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Ursinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere. Pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluuiatiliu piscium pinguia perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli ammisceantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudines, suffusionesque efficax est, addita cedria, melle attico, & pari oleo uetere. Pilos alis euulsos, perunctis radicibus obliterat.

BARBARI COROLL.

Adipem, atque Seuum, item pingue, medici fere confundunt, cum ueteres, tum noui. Sed differunt: quæ ruminantia Seuum habent, Adipem cætera. Vel ut Aristoteles tradit, cornigera, non utrinque dentata, & quorum in pedibus tali sunt. Pinguescunt Seuo bisulca, scillisque in digitos in pedibus adipe. Adeps atque Seuum semper in fine carnis sunt, pingue uero inter carnem, cunctumque succo liquidum. Adeps atque Seuum concreta sunt, ac gelascunt, fragiliaque si refrixerint, & cum refrigit fragilis: appellatione Adipis, etiam Seuum complexus. Lupino Adipi apud ueteres palma fuit: adeo, ut nouæ nuptæ intrantes, solene haberent postes eo inungere: ne quid malæ medicamentum inferretur. Seuum Græci Stear uocant. Nam Staes massa est farina, quæ & Conspersionem, & Balthæum, atque Tracta dicimus, Adipem uero & pingue Pimelæ appellat. Item Pion, atque Lipos: a quo genus carnis Alipaston uocatur, hoc est, sine pingui, quæ Strabo comicus, seruatis apponit. Dicitur & Grassos Adeps ipse a Græcis, & Grasson, sed ouillis maxime uidetur. Archigenes sudorem fordesque corporis, Grassoniam uocauit. Pollux Grasson, & Cinauram. Quædam non pinguescunt, ut lepus, atque perdix. Steriliora pinguia in utroque sexu, cele-

A

B

Plin., 29, ca. 9.

Crius senescunt omnibus animalibus. Est quoddam & in oculis pingue. Adeps sine sensu est ois, nec arterias habens, nec uenas. Pingue animalium, plerisque sine sensu. Quia ob causam sues spiritus, a muribus erosae perhibentur. Adipes homini derahunt, & uiuit, leuatus onere. Habent & arbores suos Adipes, quos Alburna Plinius appellat: quos amputare, & adimere, Exalburnare dicimus. A colore nomen sumptum: cum ligni pars est deterrima, & teredinem breui sentiens. Vnde robur exalburnatum, quod a Theophrasto Melandryon est dictum: quia sit ei color nigricans. A cuius similitudine falsameti genus quoddam Melandryon fortasse uidetur appellatum. Quid autem sit Aruina, Suetonius in eo libro, qui de uitijs corporalibus inscribitur, explicuit, durum esse dicens pingue, quod est inter cutem atque uiscus. Non solum autem pinguitudo, sed etiam pinguedo latine dicitur: quicquid Seruio grammatico uisum fuerit, qui aliqui mihi parum uidetur Plinium multis partibus legisse.

ADEPS SVILLVS, ET AGNINVS.
Adeps Suillus Vnguen, ut inquit Palladius, & Axungia latine dicitur: & Graeci quoque usurpant. Sed Oxyngon fere appellant, tracta origine ab axibus currum perungendis. Quamquam est, ubi Plinius aceti fecem, Oxyngion interpretatus esse uideatur. Et nos fortasse quibusdam locis, auctoritatem summi uiri nostro iudicio praetulimus. Alioquin Paulus Aegineus Oxyngion pro Axungia clarissime uidetur intellexisse, in emplastro cui Phoenicite nomen est. Laudatissima ex apris. Tanta porro uis, ut genibus etiam adalligata, redeat ad os sapor, eamque expuere uideantur. Neque occulta ratio, quoniam hoc animal radicibus herharum uestitur, ideoque innumeri e fimo quoque usus. Axungiae nomen ad alia quoque pinguis translatum: sed raro comperi. Laridum uero salita est animalis eius caro, quasi large aridum, ut Macrobio placet. Sunt qui Suillum pingue, Laridum uocatum putent.

ADEPS BVBLVS.
Bouem Graeci Boa, & Bun uocant, itemque Taurum, & quandoque Italon, unde dicta sit Italia. Nam steriles uaccas nostri Tauras uocabant: sicut praegnantem Hordas, atque Sordas. Vnde Hordicalia Romae festa, quo die Hordae boues imolabantur. Ephesij pincernas ipsos appellare Tauros solebant. Nam Portis, & Portax pro iuuenia dicitur a Graecis. Item Damale, siue Damalis, ut Dores solent *δαμαλ*, quam nos lunicem uocamus. Damales uero ipsum iuuentum significat: quae in Alexandri Caesaris uita Lampridius Damalionem uocauit. uterque sexus in Moscho continetur. Photion Damalin uocari omne animal existimat in iuuenta.

ADIPES ODORATI, E VITVLO, TAVRO, CERVO, ITEM MEDVLLA CERVI.
Vitulū Graeci Moschon, unde Moscheuma in Agriculturae usu dictum existimant. Qui Vitulamen in literis sacris interpretati sunt: cum latine dici posset, Viuiradix. Moschos & pediculus significat, quo frondes & fructus ramis annexi pendet: qui & Peciulus, & a Palladio Tenax uocatur. Viuiradix & Auulsio parum distant, sicut Moscheuma, & Paraspades apud Graecos. Dicitur & Moschos, siue quod idem est Oschos Pampinus, & Capreolus, & Clauicula, quae Graeci Helicas, & Ligna, & Clemata, & Amphidas quoque appellant, ut Galenus inquit.

ADIPES GALLINACEORVM ET ANSERVM.
Anseres, & Ocae siue Aucae, a Graecis Chenes appellantur. Vnde Chenoboscion, locus ubi alunt. Nam cheniz in uerbis, ad muscos pertinet, quasi tibiari sonum praesentans. Herba in Varro pabulo Anserum feri solitam, non herin, ut habent exemplaria, sed Serin scribendum monemus, auctore Columella. Ferunt eam, cum est aqua tacta, etiam cum est arida, quasi renouellari, uiridemque fieri. Laudant Anseres sicuti, hoc est, altilis ueteribus, & ex his iocinora.

ADIPVM MEDICINAE.
Caprinum Adipem astrictiorem esse quam Suillum, Galenus falso creditum a Dioscoride commouit: nisi quis astrictiorem, pro eo quod est acriorem, accipiendum putet: quandoquidem homo inquit, alias peritus, sed barbarus, proprietatem graecae linguae minus tenuerit.

De Medullarum ratione. CAP. LXXVIII.
Laudatissima est ceruina. Mox uitulina. Post hanc taurina. Dein caprina, & ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cum appetit autumnus. Quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. Nec facile cognosci potest, nisi quis eam

ossibus extrahat, & recondat. Omnes Medullæ molliunt, sedant, rarefaciunt. Vlcera explent. Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes aquæ resparsum mollitæ, selectisq; ossibus elotæ, donec aqua syncera emanet, & deterfa sorde pinna, si qua innatet, liquatæ per duplicatū lintheum in pilam exprimuntur. Et ubi coiere, omni facie quæ ad ima sedit de rasa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauius.

MEDULLARUM BARBARI COROLL.
Medullam, quam Græci Myelon uocant, uituli, Galenus post ceruinam præfert omnibus: eamq; priuatim a medicis appellari Moschion scripsit. Medulla proprie, inquit, Galenus est, quæ ossibus includitur. Improprie uero etiam e spina dorsali. Notæos, hoc est, dorsago, ut ita dicam, nominata, quæ sit reliqua medulla durior ac ficior. Nam ea quæ spondylis, hoc est, articulis uertebriq; continetur, spondyliionis habet nomen, ut inquit Pollux.

Pli. li. 29. ca. 92
Gale. lib. 1. de
aliment. & ad
Paternianū. 82

EX M. VERG. COMM.
Adiecerunt posteriores Medullarum disciplinæ ex animalium partibus discrimina aliqua. Tradideruntq; pinguioribus, & ad molliendum maiore ui & potestate Medullas esse, quæ ex animalium anteriorū, posteriorūq; crurū ossibus erutæ fuissent: squalidiores uero & duriores, quæ ex spina, & dorso: præcipuamq; habere uim cōtra corporis duricies, quæ græci sciromata uocant, de quibus alibi certius & expresso dicei. Nunc qd nouisse legētes inutile penitus nō erit, monebimus, qd Barbarus dupodiariū uas appellauit, maluisse nos in re non satis certa, græcorum uoce uti. Credidit em ille ut uidet *διπλωμα* a græcis ideo dictū id uas fuisse, qd duplicē careret mensurā aliquā, & ex nominis ratione rem auguratus est: cum tñ nullam habeat Medullarum curatio mensuræ in uasculo necessitatem. Et Paulus Aegineta libro primo, quo capite de ouis & eorum diuersis cocturis agit, nihil aliud *διπλωμα* esse ostendit, q̃ fictile, aut æneum uas, in quo ad ignem denfarentur oua, quæ ille *πικτά*, quod est, præfocata appellat: facilis intellectu res, ignota tamen nostra ætate uasis forma, & nominis ratio.

B

De Felle. CAP. LXXXVIII.

Fel omne curatur hoc modo. Recēs præligato ore folliculi lino, de missum in feruentem aquam, spacio quo quis stadia tria percursum: mox exemptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamentā adijci solet, ligatum lino in uitreum uas, quod mel habeat, immittitur, circūuoluto ad os uasis lini principio, & operto uase reconditur. Est enim uis omnium acris, & excalfaciens. Intensis tamen, & remissis uiribus differunt. Siquidem præstantius in effectū esse uidetur fel marini scorpionis, & piscis qui Callionius appellatur, marinæ testudinis, hyenæq; Item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ. Quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, albuginesq; & genarū scabrias. Ouillo, suillo, hircino, atq; ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum sedi subijciat. Priuatim taurino anginae cum melle perungunt. Sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usq; perducit. Idem auribus fractis, & purulentis, cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur. Et sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit uulnerarijs emplastris, & circumlinationibus quæ contra uenenata parantur. Phagedænicis ulceribus, co

x^oad

Clis, & scroti doloribus ex melle prodest. Lepras, furfures cū nitro, & terra cimolia ꝑoptime purgat. Ouillum et ursinum contra eadem pollut. Verum inefficacius hæc præstant. Ursinum eclegmate comitiales adiut. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest. Naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum Felle peculiariter peruncti, lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus. Thymia abolet. Et luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autē contra aurium ulcera, reliquaꝗ omnia, magno usu assumitur.

Pli. li. ii. ca. 37.

B A R B A R I C O R O L L.

Fel, siue Bilis, Cholea Græcis dicitur. Minorum animalium subtilius. Equinum tantum damnatur, inter uenena. Ideo flamini sacrum, equum tangere non licebat Romæ: cū tamen publicis quoꝗ sacris imolaretur equus. Taurino Felle aureus color ducitur, æramentis atque pellibus, qualia Græci cholobaphina cognominant. Bilis duplex, Atra, & Flaua: Sed cū simpliciter pronunciat, Flaua inquit Galenus, intelligitur. Flauæ duo fere genera. Luteæ, quam Græci Ochran uocant; & Russæ, siue fuluæ, quam Xanthē dicunt, uehementiorem & calidiorem priore. Sūt & alia cholorum discrimina. Virentis, quam Ioden; ceruleæ, quam Cyaneam; & subnigræ, quam Phæon, Itatidis modo fuscæ, Callionymum piscem, cuius mentem nem habet hoc loco Dioscorides. Sunt qui Callichthyn, & Anthiam quoꝗ appellent. Ite Hellopa, hoc est, Accipenserem, & Castum, Sacrumꝗ piscem. Aliqui etiam Lycon. Sed differre eos inter se, cum ex Aristotele, tum ex alijs autoribus, aperte constat. Sacer certe piscis est proprie, quem Pompilon uocamus. Dixi Hellopa eundem qui Accipenser dicitur. Ceterum Archestratus, eum qui uocetur inquit a Romanis Accipenser, Galeon a Græcis appellari existimauit, perspicuo errore, ut aliubi monstrabitur. Fit & de Perdice sermo hac parte. In quo scindum, Perdices, & Cacabidas, & Cacabos etiam uocari, a sono quem edunt canentes. Theophrastus autor est, non omnes eum sonum reddere, sed Dittybizin aliquas. Perdicum porro multa genera: sed præstantissimum, cui rostrum purpureum. Nam Italicæ, inquit Athenæus, præparuæ sunt, nec rostrum rubens habent. Idem autor Phasianum, siue Phasianicum, aliquando Tatyrim, aliquando Tetarton, & Tettaron uocatū scribit. His adiecit Attagas, non attagenas dicendo, etiamli Varro, & Gellius ita nominent. Attagenus certe piscis e numero est.

De Sanguine.

CAP. LXXXIX.

Sanguis anseris, agni, & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palum ubi autē, turturis & columbæ, necnon perdices, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum uulneribus, lusciosisꝗ illinuntur. Peculiariter colubæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & leporis sanguis patinis inassatus, dysenterias, & coeliacorum profluvia sistit. In uino potus contra toxica effiac est. Leporinus sanguis, ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginēsꝗ emaculat. Caninus comode ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit. Contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotū tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum uino & leporis coagulo, cuminoꝗ, contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duricias discutit, emollitꝗ. Sanguis equarum quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur quæ erodunt. Septica uocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc idem uiridium ranarum sanguine præstat. Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu conceptio-

nem inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur. **A**
 Leuat podagras muliebres, & ignem sacrum, illitus.

BARBARI COROLL.

Sanguis Græce uocatur Hæma. Distat a Sanguiculo, q̄ is proprie sanguis ædi est in cibū, igni coctus, Nigrum lus, ut Iulius Pollux arbitrat, uocatus. Hoc a Græcis Hypotrimma, & Aemateia, & Aemation, & specialius Hyposphagma dici putant: sed ex omni tamē quadrupede, adiecto melle, aut fapa, sale, aceto, lacte, caseo, cumino, laserpitio. Inuentum Lacedæmonē putant. Vulgo id nos lus Dulce nominamus. De alio Sanguiculi significatu diximus in Galieno. Non dissimile uidetur, quod Græci Creocaccabon appellant, hoc est, carnem minutatim concisam cum sanguine, & adipe, iussulentoq̄, ac dulciario liquore. Nam quod Myma uocant, mihi quædā uidetur miscella Creocaccabi, & Hyposphagmatis fuisse: nisi q̄ paulo plura sunt, quæ in Myma requiruntur a quibusdam, autore Athenæo. Iuris & illa sunt genera, quorum in Pseudulo festiuis poeta meminit, Cicilendrum, Hypolindrum, Cicimandrum, Parophsis, Capris, Mæcis, siue Magis, ut conijcio. Equæ uirginis sanguini uim inesse negant, quæ maribus foeminisq̄, non uirginibus. Taurinum ubiq̄ inter uenena collocant. Excepta Egyra, ubi descēsurā in specum sacerdos uaticinij causa, tauri sanguinem præsumit. Caprinum hibernibus, palor accidit. Hircorum sanguine ferramēta acuntur, indurata subtilitate, & scabricia expolita, uehementius etiamnum, q̄ scobina fabri. Adamantis natura inuicissima, & duarum rerum uiolentissimarum, contemptrix ignis, & ferri, non alia rumpitur ui, q̄ hircino sanguine macerata recent, & calido. Etiam si hoc gemmarij nostri falsum & ridiculum existimant. Anatem, de qua mentio hic habetur, Græci Nectas, & Nectā uocant. Quamq̄ Nectā magis est, ut septa anatribus sunt, sed maiores, quæ Glaucia Græci uocant, ab oculoꝝ colore. Sunt & Boscades, et quas ab urinandi uoluptate Colymbos, & Colymbidas nominant. Inter omnes eas minimæ, ari ac fordini coloris, acuto rostro. Soli earum spectantur oculi, cætero merguntur. Habentur & Chenalopeces appellatæ, sed anseri contribuuntur. Inuenitur & Boscadis unum genus, maius Anate, sed minus Chenalopece. Huc & Phalcades pertinent, paulo grandiores quàm Colymbi, cætero similes Anatibus. Est & Vria dicta, non multo minor Anate, rostro longiore, ac tenui, colore fordini figlinæ. Angustum & Phalaris uocata, rostrum obtinet, caput rotundius, uentrē subcinereo colore, tergus nigricatus. Nominantur hic & Columbæ. Græci eas modo Peristeras, & masculino genere Peristeros, ut Artici, & neutro Peristeria, modo Pelias, et Pelias uocant, ut Dorici. Quamq̄ Aristoteles distinctum genus facit, qui & alia dinumerat. Quo fit, ut in pocillo Nestoris, pleriq̄ non Columbas, sed Pleiadas cœlestis fidus intelligendas arbitrentur in Homero. Columbæ porro Siculæ præferuntur omnibus. Laudantur & Cypriæ, luteo colore. In India Columbas esse græci affirmant. Cæterum Columbarum quas diximus Peristeras a Græcis esse dictas, duo genera constituunt, ut Galenus est autor, Catoceidion, hoc est, domesticum, & Nomadicum, hoc est, pascuum & syluestre.

E. X. M. VERG. COMM.

Quod ad medicinā pertineat, de Sanguine satis nouisse illud sit, nullū frigere Sanguinē. Omnibus enim ingentis & necessarius calor est. Differunt solum, q̄ alter altero minus, magisue calet. Fuitq̄ hic quondā in Sanguinibus uirium & naturæ census, ut suillus humidiior, minusq̄ calidus cæteris sit, temperamento suo hominum Sanguini maxime similis. Columbarum uero, palumbis & turturis æquali inter se temperamento, oculorum medicinæ calidus inferuiat: instillatusq̄ crassiori cerebri tuniculæ, in his quorum calua perforata esset, in inflammationes arceat. Noctūq̄ cum uino, aut aqua, contra spiritus angustias utiliter bibatur. Vespertilionum, ranarum, chamæleonis, ricinorumq̄, qui in canibus hærentes inueniuntur, mammarum incrementa in uirginibus compescat, & quæ eo inungantur alia depilet. Negauit tamen, facti periculo, Galenus uera hæc esse. Inuenimus etiam, caprinum ob siccitatem suam, contra curem subeuntes aquas cum melle utiliter bibi, & renum calculos frangere. Agninum comitialibus prodesse. Hædinum nuper coagulatum, cum aceto bibi contra cruentas pectoris excretaiones. Vrsorum, siluestrium caprarum, hircorum, & taurorum abscessus maturare. Ecterestris crocodili oculorum claritatē facere. Quæ omnia a Galenō, Plinio, Pauloq̄ Aegina, & ab alijs longius dicta sunt. Poteruntque uolentes plura his etiam in antiquis medicinæ autoribus inuenire, consulto a nobis relicta: satis fore credentibus, si communiora aliqua dicta fuerint.

Pli. ii. 28. ca. 14
& alias sæpe.

B

C

De Fimo. CAP. XC.

Armentarij bouis Fimum si recens admoueat, uulnere in flammationes mitigat. Folij autem inuoluitur, & calfactū cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus tali imposito compescit. Illitum ex aceto duricias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu Fimi, quod a masculo boue redditum est, procidentes uulua reprimuntur. Accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, praesertim quae in montibus errant, potum in uino, regium morbum emendat. Menses citum odoramentis haustum. Et partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, foeminarum profluuiā sistit. Caeterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecij exustum, & cum aceto mulso illitum. Cum axungia uero impositum, his qui podagra tentantur auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribus quae serpunt, igni sacro, et parotidibus. Vilem ischiadici uisionem hunc in modum accipiunt. In interstitio pollicis, qua parte brachio committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur: deinde sigillatim feruentes, stercoris caprini pilulae imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolore mitigare. Adustio id genus Arabica appellatur. Fimum pecudum ex aceto illitum, sanat epinyctidas, clauos, pensiles uerrucas, thymos, & ambusta, igni rosaceo caerato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. Vetus tum lateris dolorem mulcet. Adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. Luxatis cum caerato rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum Fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij qui herba pascitur siccum Fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius excalefacit, & urit cum hordeacea farina mixtum. Strumas ex aceto discutit. Carbunculos emarginat, tritum cum lini semine & oleo. Ambustis igni medetur. Gallinaceum uero omnia eadem, sed inefficacius praestat. Priuatim tamen contra uenena fungorum, & coli cruciatus ex aceto, aut uino bibitur. Ciconiae Fimum si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesset credunt. Vulturini Fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecij medetur. Cum thure & mulso, calculos expellit. Subdite infantibus muscerdae, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera inflammationem minantia intumescere non patitur. Sed ea statim glutinat. Sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili Fimum Crocodileam uocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est tenuissima

et friabilis, amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquesces, quæ cum teritur, fermenti acorem quadamtenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt: ipsumque non dissimile uendunt. Alij Amylum, aut Cimoliam miscunt, & adscito colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem. Qui siccati pro Crocodilea uaneunt. Inter omnes conuenire inuenio humanum sterces, caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

FIMUM BARBARI COROLLE.
Fimū Græci multis nominibus, Apopatema, & Apopaton, & Bolbitō, & Hippomacroboliton, & Scatos, & Apofceuen, & Aphodon, & Eumarean ionice appellant, & Scor: quæque hominis hoc proprie: ut asini, Onida, & Onthon: equi, Copron: pecudis, Oespoten, uel Oipoten Aristophani, & Synpen: Iones suis Hypeleuton: murum Myocopron, & Misclerdā, nos Mulcerdam: ut suillum Sucerdam. Liquidius quod est, nostri Soria cognominant. Vnde Solorioli, quibus solutuscula est aluus. Et cōsorire uerbum, pro eo quod est inquinare fimo: quod Plautus concacare dixit. Et Soria locus in publico, ut latrinæ in priuato. Fimos porro etiam luforias tabellas, hoc est, alueolos dixit Horatius. Asinini certe pulli Fimum, quod primū edit, Polion uocari tradit Aristoteles. Plinius Polean priuatim & caprinum, Spyrathos, & Spyradas, & Spyrdana, quas Palladius Caprinas baccas uocauit.

Pli. li. 17. ca. 9.

CROCODILEA.
Crocodileam Cerusæ modo cui præcipiunt. Est & Crocodilea, siue Crocodilina, & Crocodilitis uocata questio Sophistarum ludicra, ut Prion & Ceratina, sed alienæ omnes ab hoc opere. Crocodileam Plinius etiam intestina ipsa terrestris Crocodili appellat: ob id diligenter exquisita, quoniam iocundissimo nidore fragrant. Viuit enim odoratissimis animal id floribus, simile Crocodilo ei cui uita in terra, aquaque communis, sed multum infra magnitudinem eius, & in terra tantum.

De Vrina. CAP. XCI.

Humanam Vrinam suam cuique bibere, contra uiperæ morsus ac uenena, incipientemque aquam intercutē proderit. Marini scorpiōnis, uiperæ, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina, ad perfundendos canis morsus idonea est. Pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed uetus ulcera capitis manantia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. Nomas, & præcipue genitalium cohibet. Auribus infusa manans pus supprimit. Decoctaque in calice malipunici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur. Decocta in aëreo uase cum melle, emendat cicatrices, argema, caliginisque. Ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Lutum quod in Vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat. Feruefactum cum cyprino, inditumque, uulue dolores mulcet. Strangulatus leuat. Genas deterget. Oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est. Priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Ad aquam quæ cutem subijcit, cum nardi spica cotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum extrahit. Aurium doloribus instillata medetur. Asinina, traditur renum uicij mederi. Lyncis urinam, quam Lyncurium appellat, simulac excernitur, glaciari, coireue in calculi duriciam, uulgo creditum

C est. Quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod a nonnullis uocatur succinum pterygophorō. Id potum ex aqua, stomacho, aluoq; fluctione laboranti conuenit. Asininae urinae potum uicia sanari traduntur.

V **B A R B A R I C O R O L L.**

Rina, siue Lotion, Graece Vron uocatur. Vrina struthionis aramenti lituras abluat. Fuliones pedum uitrijs carere affirmant Vrinae beneficio. Magi praecipunt, ne quis contra solem, lunam uel nudetur Vrinae caussat neue umbram alicuius respingat. Hesiodus contra obstantia reddendam, ne Deorum aliquem nudatio ea offendar. Non desunt qui Amuletum esse dicant, suam cuiq; matutinis omnibus instillatam in pedem.

Pli. li. 9. ca. 39.

D E L Y N C U R I O **L Y N C V R I V M.**

DE Lyncurio non constat autoribus, an sit, aut unde sit. Qui electrum id esse negant, gemmam tamen fatentur, ex urina Lyncis omnino, sed quam animal id statim redditam, aggregata pedibus terra obruat inuidia, cui gnarum peti eam ab homine: celerius ita concrefcere in gemmas similes carbunculis, igneo colore fulgentes, atq; frigidas, quae & scalpant. Quamq; distinguunt e maribus, praecipueq; feris & fuluas & igneas, e foeminis, praesertim cicuribus, candidas atq; languidas exsistere, nec frondes & acus modo rapere, sed aeris quoq; ferriq; bracteolas, ut Diocles & Theophrastus referunt. Alij dixere Langurium, & esse in Italia circa Padum Langurias, quae ab aliquibus Langae nominentur. Falsa haec omnia Plinius existimat, nec uisam aeo suo gemmam appellatione tali scribit. De Lyncurio lapide non hoc, sed alio inter fungos, mirum quidem, sed uerum dicturi sumus. Succinum Dioscorides hoc loco Pterygophoron cognominat, q; stramenta, floccos atq; fimbrias in se trahat: aliubi Chrysophoron, ut Plinius Chryselectron. Lynces clarissime omnium quadrupedum cernunt.

D **H A B E T V R I N A** **E X M. V E R G. C O M M.**

Habet Vrina in animalibus, quae per renes, & quos urinae meatus dicunt, ex sanguine in uessicam non aliter q; per colum fluit, quod commune omnibus sit, calorem. f. & acrimoniam. Priuatim omnium aliorum animalium, exceptis eunuchis, humana infirmior est. In nutrimento non paruas habet Vrina uires: ideoq; in fame pota Vrina seruati aliqui sunt. Sanat praeter ea quae a Diosc. dicta sunt, pedum attritus, sed nondum inflammatos, ex calceis factos. Caprarum & Chamelorum urina aluum deiecit: ideoq; contra cutem subeuntes aquas, utiliter bibitur. Ex homine omnium efficacissima impubis pueri est. Auguria ualitudinis ex ea a medicis praecipue accipiuntur. Suntq; tam multi eius colores, tam diuersi habitus & odores, ut nihil aequae in medicina difficilius & utilius nouisse sit. Nisi forte aliquis Romani Caesaris exemplo, ad rigandas, stercoreandasq; simul arbores ex ea uestigal in gente sua excogitauerit. Ea pruritui foueri utilissimum Dioscorid. ait: κνησμενος graeci id malum uocant, in senibus non adeo curabile. In reliquis aetatibus haud difficilis curationis, si deprehensa mali causa fuerit: quae plerumq; est corruptus, & (ut aptius loquamur) putris, pituitosus, aut biliosus humor. Contra quem Vrinae acrimonia & calore inter cetera pugnandum est. Exigebat post omnia hic locus, ut de Lyncurio, siue geina, siue succinum id sit, aliquid diceremus. Sed tanta est ueterum in historia eius uarietas, ut nihil censere de eo audeamus. Sunt enim qui negent Lyncurion esse. Sunt qui esse quidem dicant, sed unde, aut quid sit, affirmare non audent. Plinius diuersis locis multa, sed quae omnia de gemma intelligantur. Quae possunt uolentes facillime ab eo audire.

[De Melle.] **C A P. X C I I.**

μέλι
εὐμετόν
εὐμετόν

P Rincipem locum obtinet Mel, quod Atticae regionis est, praecipue ex Hymeto, mox Cycladibus insulis, & e Sicilia, cognomine Simblion. Maxime probatur dulcius, & acre, odoratum, sufflauum, nec humectum graue, & minime fluxum, qd ob sequacem lenticia non facile abrumpit, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergendi uim habet. Ora uenarum a se perit. Humores euocat. Qua ratione in sordida ulcera, sinusq; commodissime infunditur. Decoctum, atq; impositum, abscedentem carnem glutinat.

A Medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. Item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale tepido instillatum. Lendes, & foeda capitis animalia illitum necat. Nudam glandem recutitis operit, praesertim quae circumcissione aperta non est, si melle coles a balineo triginta diebus emolliatur. Oculorum caliginem discutit. Faucibus, tonsillis, anginae illitum gargarisatumue medetur. Vrinam ciet. Auxiliatur tussi, & a serpente percussis. Contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. Aduersus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. Crudum tamen aluum inflat. Tussim laceffit. Et ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in Mellis genere uerum, deinde aestiuum. Hybernium uero, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur. Siccas eruptiones excitat. Quod in Sardonia gignitur Mel, amarum est. Quoniam apes inibi absinthio uescantur, quo uicia cutis in facie & maculae aptissime perunguntur. Heracliae in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote Mel conficitur, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt esitata ruta, & fassamenta, aut epotum mulsum, resumpta quoties uomitione reiiciuntur. Acre autem est. Et olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, foeminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti Mellis genus, quod Saccharon nominatur. In India uero & felici Arabia in arundinibus inuenitur. Salis modo coactum est, dentibus ut sal fragile. Aluo idoneum, & stomacho utile. Si aqua dilutum bibatur, uexatae uesicae, renibusque auxiliatur. Illitum ea discutit, quae tenebras oculorum pupillis offundunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Mel a Graecis Meli. Natum in Carina Cretae monte Mel, muscae non attingunt, propterea medicamentis eligitur. Varro Siculum praefert omnibus; quod ibi Thymum bonum frequensque sit, quo ad mellificium nihil est praestantius. Strabo e Cycladibus, & inter Cycladas Calyminum anteponit omnibus. Natura Mellis ea est, ut uicia coerceat, ne serpere ultra patiatur. Quam ob causam, uel exanimum corpus hominis, per annos plurimos innoxium conseruat. Est & suus in Melle, ac mulso flosculus, si recta est apud Columellam, in oliuae conditura lectio. Sunt enim qui uasculum Mellis, non flosculum ibi legant. Sed certe in omni re purissima & tenuissima quaeque pars, floris appellatione demonstratur. Est & in pomo flosculus, qui & Vmbilicus dicitur. Nam & in fico pomo fundus, graece Omphalos dicitur, hoc est, extremitas altera, quae petiolo annectitur. De coelesti Melle dictum est superius in Elaeomelite. Hircanum Mel, ex ipsis quoque fluit arboribus, sine cura mortalium, examinibus inibi se cogentibus atque mellificantibus, ut inquit Strabo. E petris quoque, ut Diodorus. Sed minores apibus sunt, Anthredones appellatae. Meminit bestiolae huius & Aristoteles, inter crabrones uentis. Etiam si corrupte legitur in ipso, Tentredon, pro Anthredo, nam crabrones Anthredones a Graecis dicuntur. Hoc ipsum fere in Media, & Armenia quibusdam locis uisitur. Diodorus, & Quintus Curtius, arbores in Hircania, quarum folia multo Melle tinguntur, faciem quercus habere tradunt; ac nisi solis ortum incolae praeuorterint, fore, ut uel modico tempore is succus extinguatur. Mellis inuentione, Plinius & Diodorus Aristeo Atheniensi, uel Arcadiae regi, ut Trogus, sicut medicina ex eo, Gelius Oceani filio Soli assignat. Trogus colligendi Mellis usum monstrasse Gargorin scribit, uetustissimum Regem in Hispania Curetum, qui saltus Tharte florum incoluere; in quibus Titanes bellum cum Dijs gessisse perhibentur.

Pli. li. ii. ca. 14.
Aristot. lib. 8.
cap. 21. de animalibus.

D I O S C O R I D I S

C MEL SARDOV M.

Cum Mel in Sardinia progenitū uirus habeat, mirum est, cur nullum tamen animal homini pestiferū, in insula ea nasci perhibeatur, extra q̄ Solpugam, ut Solinus meminit: de qua in castigatione Pliniana dictum est abunde. Non solū uero Mel Sardoum, sed & Cholechicum infame traditur amaritudine. Sunt & alia Mellis fastigia, quæ mox subiunget dissertatio.

MEL PONTICVM.

Mel Heracleoticū, siue Ponticū, ex herba fieri candida cōmemorat, quæ Aegolethros uocet: quia uexatio iumentorū sit, præcipue caprarū. Non sentitur aut omnibus annis hoc malū, nec nisi cum flos ille marcescit aquoso uere. Signa uenenati sunt, nunq̄ densari, color magis rutilus, & q̄d ponderosius est, q̄ probū: qui gustauere abijciūt se humi, refrigerationē quærentes. Exitiū hoc per extremēta, ad canes quoq̄ peruenit, similiterq̄ torquet eos. Mulsū tamen ex hoc Melle inueteratū, desinit esse pnciosum. Aliud genus Mellis in eodē Ponti situ, Manicon, siue Menomenon appellant, ab infania, quā facit, existimatū, rhododendri flore contrahi, quo scatent syluæ. Optima tamen ex hoc uno cera fit. In Perside aut, & in Mauritania Casariensi, Geruliacq̄ Malsylis contermina, uenenati Fauis gignunt: quidāq̄ non toti, sed parte, quo nihil fallacius, nec nisi luore deprehendunt. In Themiscyra Ponti regiōe, mons est Scydisses, cuius incolunt Byzeres & Heptacomitæ dicti iuga. hi tris cohortes Pompeij, ea cōmeantes interfece- runt, dispositis qua trāseundū erat Mellis infani uasis, quod ibi ex arboris quarundā, ut inquit Strabo ramis, fundit. Corruentē enim potu eo militē aggressi, facile confecerunt.

SACCHARVM.

Pli. li. 12. ca. 8.

D

Prouerbiū.

Saccharum laudatius ferebat India: nunc popularis ortus eius est in Aegypto, Cypro, Rhodo, Creta. Italia quoq̄ nascitur. Nullū epulum magnificū iam, ne quotidianus quidem uisus placet, sine Saccharo. Digerit in pasillos, effingit in placentas, a maza & pane, ut puto Maza panes uocatas. Qz q̄ & Marci panes ab auctore dictos coniectari licet: quandoquidē & Marcium unguentū, & Marci pasillos in medicina legimus, ut est apud Aetiū, & priorem eo Paulū. Omnino cōponitur in oēm figurā Saccharum, non aliter q̄ farina, trahiturq̄ etiā in picturas, opere historiali: uenatus, classes, oppida, & quascunq̄ rerū afferri libeat imagines præsentās: a coronatis ministris, cū tūbicine introferri solitū conuiuijs, & ad principia eorū, & in secundam quoq̄ mēsam. Vnde natū sit prouerbiū: nullum ferculū corrumpi Saccharo. Amplissimū nūc is auellanae magnitudine, Plinij tēporibus, & medicinae dūtaxat usu, nunc tam promiscuū, ut desinat prodelle, multis obfit. Pueris certe lūbricos & tūneas contrahit. Varronis uersus sunt. Indica non magnā nimis arbore crescit arundo, Illius & lentis premitur radicibus humor, Dulcia cui nequeant succo contendere mella, Strabo quoq̄ nō ex iplis tantū arundinibus, sed & radicibus quoq̄ Mel exprimi cōmemorat in India. Nunc ex Alexandria Aegypti, & Cypro cōmendatissimū. Melius quo uetustius, q̄q̄ calidius, ita & capiti fere nocens. Dilutū aqua, refrigerandi uim concipit: præsertim ter coctū. Primō excoquunt arundinē, deinde flaua pars secernit: hanc Saccharū existere. Hoc iterum coqui potest, atq̄ ita fit candidius & concretius. Quod si tertio coquat, maxima in eo fit & candoris & densitatis accessio. Quartum & quintū quoq̄ solet excoqui, & donec specie aluminis scissilis fere transluceat: q̄d genus alij Candidū, alij Cantū cognomināt. Saccharū Græci Sacchar uocant. Rarū, nec plane cognitū Galeni quoq̄ seculo: tantū abest, ut instrumentum nitidioris uitæ fuerit. Qz q̄ non magnopere pridem inuētum puto, ut nucleos pineos, amygdalas, auellanas, pistacea, citreum, cinamomū, coriandrum, anisum, feniculū ductili tunicarum facilitate contegat, circumdatum modo corticis crassitudine, modo cutis tenuitate uestiens. Dulcioria quidē ex nucleis pineis, & amygdalis condebat antiquitas: sed cum melle, ut est apud Paulum. Venale porro Saccharū, in dupondiairos fere panes, metæ effigie diuiditur. Preciū optimi, in libras aurei nummi fere sexcunx. Cyprium non coibat ante: nunc densatur, tanto inuentoris quæstus, ut inde locupletissimus euaserit: neq̄ ratio tamen cōmunicata est, sed archanam habent, ut ad heredes latifundi cuiusdam, aut monopolij uice transeat. Illud monendi sumus, in Pampinij sylua quadam illo uersu, Et quas præcoquit Aebusita Cannas, Hypasitam, non Aebusitam legendum: ita enim populi uocantur Indiæ a fluuio Hypasi, ut est apud Strabonem, Pliniumq̄. Nec audiendi sunt, qui nullo auctore, nullo teste, in Syria locum eum tradant, inter Libanum & Antilibanum, conuale media. Nam ibi arundo quidem prouenit, sed odorata, non saccharea: ut alibi quoq̄ diximus.

De Cera.

CAP. XCIII.

A

CAera optima est subfulua, odorata, subpinguis, pura, odorisque quadamtenus mellei, natione Pontica, aut Cretica. Secundū locum obtinet candida, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo. Ex ea radunt album, syncerūq; atq; transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petita, insparsoq; nitri momento decoquūt. Cumq; iterum, tertio inferbuit, separatim uas refrigerant, ac cæræ pastillum eximunt, deterfa sorde, siqua forte adhæsit. Tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, basin ollulæ nouæ aqua frigida madefactam, in cæram summam suspensâ manu intingunt, quo celerius concreseat, & q̄ minima portio extrahatur. Suscepto primo cæræ orbiculo, iterum uas imum aqua refrigeratum, tantisper immitti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino confuti, ita ut intercedat spacium, suspenduntur. Et interdū, continuo sub sole, noctu sub luna aspergunt, usq; dum perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, eadem facitari, & identidem recoqui operæ præciū est. Nec desunt qui pro marina, in muria q̄ acerrima, semel aut iterū excoquant. Dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt. Postea orbiculos, substrato cespite hærboso insolant, donec candorem summū contraxerit. Præcipiunt hoc obeundū munus uere, cum sol remissa uehemētia humorem pariat, ut nō facile liqueat. Cera omnis molliet, calcet, modice explet corpora. Datur in sorbitione dysentericis. Ac milij magnitudine decem grana Cæræ hausta, lac in lactantibus non patiuntur coagulari.

BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 143

Cera græce uocatur Ceros. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tenebris siccatis, quarto die liquatis igni nouo fictili, aqua fauos regente, tum sporta colatis. Rursus in eadem olla coquitur Cera, cum eadem aqua, excipiturq; alia frigida, uasis melle circumlitis. Optima quæ Punica uocatur. Plurimum habet ex Propoli Cretica; ideoq; locum secūdum in nationibus obtinuit. Tertium Gorfica: quoniam ex buxo confiet, & medicaminis uim referat. Fieri candidam Ceram, nihil aliud esse uideo, q̄ Punicam fieri. Hæc medicinis utilissima, uarios in colores pigmentis Cera trahitur: ob id & Tracta dicitur, ut puto etiam a Græcis. Nigrescit, addito chartarum cinere. Anchusa mixta rubet, ad reddendas similitudines, & innumeros uita usus, ut taceatur interim pugillariū, parietūq; & armorū tutela. Superat niuem candore Cera, quā Pharmacopolæ nostri præparant, nuperrime uri coepta publicis, priuatisq; sacris solēnibus & prophanis usibus. Officina tantū una concinnabatur hæc patris memoria. Nunc urbe tota uenditur, nec alta crematur Cera dumtaxat apud nos, q̄ candida. Primus omnium Cornelius, e Senatu domū rediens, funali Candido usus dicitur, tanta uerecūdia, ut non prius accendi pateretur, q̄ tota curia & foro decessisset: quia cæteri, aut latēna, aut triuali Cera deducerentur. Exemplum eius deinde sequuti dēs, maiestatiq; hoc illius ordinis amplissimū, non luxuria datū. Itaq; Senatu misso, post occasum solis, tam longus est ordo luminū, ut plene diem reddant. In Cera qui nascitur uermiculus, ab Aristotele uocatur Acar.

EX M. VERG. COMM.

Quod habet in medicina utilissimū Cera, excipiendis, retinendisq; alijs medicamentis materia est, qua omnium generum Cerata quotidie fiunt. Maturandi, abstergendiq; uires aliquas nihilominus habere illam, aliqui ex ueteribus tradiderunt: hic calefacere tantū, molli-terq; eam dixit: & omnia mediocriter, quoniam parum efficax uis eius ad omnia sit: præ-terq; (modo id Cera possit) ad prohibendā in nutricibus lactis in caseum densationē. Quod uisū ex Dioscoride uerbis descriptū a nobis est, Barbarus id Colostrari dixit.

C
πρόπολις

De Propoli.

CAP. XCIII.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat. Aculeos, et oia infixa corpori extrahit. In uetere tussi suffita proficit. Impetigines admota tollit. Et in alueariū foribus, cerosę naturę iuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

EPropoli Apes faciunt ad foramē introitus protectum, æstate maxime, ut inqt Varro. Alia hæc ab Rhitace uocata, qua fauos extremos simul conglutinant. Interdū extra fores aluei obducq. De hac & in Lili mentione differemus.

VERG.

Quæ in aluearibus apū uideri etiamnū possunt fundamēta operis, ut diuersos habent in apibus usus, neq. eandē ex qua confecta sunt materiā, sic diuersis appellationibus a grecis pariter & latinis discreta sunt. Inter ea post Meryn, & Pissoceron, tertia Propolis est, inter coria & ceras media crassioris materiæ: ueluti gūmi, additis aliquādo etiam floribus: nondū tamen cera, sed fauorū stabilimentū: qua oēs frigoris, aut iniuriæ aditus apes obstruit, magni ad medicamēta usus. Quorū genera hic breuiter complexus, nihil quod de Propoli ab alijs dictū fuit, non duobus uerbis, & maiorū rotidem generibus profectus est. Eam Plinius ab apibus præcipue fieri dixit, ex gutta quam populi arbores in folijs ferunt.

πυρί

De Tritico.

CAP. XCV.

Optima e Tritici generibus ad secundę ualitudinis usus habetur, quæ recentia, & iam perfecte adulta, colorē mali referūt. Dein sequuntur trimestria, quæ nōnullis Sitania nominant. Itaq. cruda in cibis retinetur tineas gignūt. Canū moribus profunt māsā & imposita. Confectus eorū similagine panis, plus alit q̃ cibarius. E trimestriū farina panis leuiter cibū præbet, & qui facile in mēbra demandet. Farina eorū cum hyoscyami succo illinit, aduersus neruorū fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant. Itē contra interaneorū inflationes. Lentigines ex aceto multo tollit. Furfures aut in acri aceto decocti, turgentes māsas sedant. Viperarū ictibus auxiliant. Et torminosis profunt. Farinaceum fermentū calidum faciendi extrahendiq. uim habet. Priuatim callos pedū, clauosq. extenuat. Cætera tubercula, furunculoscq. ex sale concoquit, & aperit. Sitaniarū farina, contra uenenatos ictus cum aceto, aut uino comodissime illinitur. Eadem si decocta in glutini modū delingat, cruentis excretionibus proderit. Contra tussim, & exasperatas fauces, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulla, aut hydræleo decoquatur, oēm discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus inflammationes omnis illitu mulcet: cum emolliat & quadamtenus refrigeret. Sed hærbis succisue huic rei accommodatis ammisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus illitu, uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

B A R B.
Plini. lib. 18.
cap. 7. 10. 11.

Triticum & Satiuū & Syluestre, cultu annorū trium mitescit, in Leontino Sicilia agro plurimū. Degenerare Tritici in ordeum, ex eodēq. nasci pede, utrūq. fabulosum existimat a Theophrasto. Frumentū omne radicibus multis ac prætenuibus exit, folio uno, geminibus

oīno multis, sed quæ in rāmos brachiari non pōssint: cuius contrariū in omni legumine cōspi-
 citur, excepta Faba. Frumentū Sitos græce dictū, quicqd ex se aristas mittit: in herba quā Græ-
 ci Loion uocāt per hyemem est. Remolito aut cōlo, cauliculus de medio assurgit: cuius tertio
 aut quarto genu spica geritur, non prius euident, q̄ folliculo inclusa: qui Gluma dicitur. Con-
 sumato eo, flos erumpit: quarto aut quinto post die, ac totidem fere diebus, plurimūq; septem
 durat. Varro quindecim diebus frumentū in uaginis esse dicit, quindecim florere, quindecim
 arescere. Post florem crassescit, inquit Theophrastus: maturaturq; intra quadragessimū diem,
 cū tardissime octauo a satū mense, plurima parte metitur. Aegyptus, ut scribunt, septimo. Fo-
 lliū harundineum, angustius tamē Tritico q̄ ordeo, caulis quoq; leuior, & lentior, nec perinde
 fragilis. Triticū multus integitur tunicis, ordeum nullis. Culmus Tritico altior q̄ ordeo, spica
 quoq; remotior a folio. palea furuior, mollior, succosior. Incondita Tritico spicæ, explana-
 taq; ordeo dispositæ in uersus. Vtriq; culmūs spicā sustinet, quæ & Spicus, & Spicum a Ci-
 cerone dicitur in Arato. Spica granum & aristam, quæ uti actus eminent & folliculo siue glumiā.
 Sunt autē Aristæ partes in spica primæ, quæ a Græcis Antherices dicuntur, & Atheres. Est au-
 tem Ather propriè in ordeo, ut Galenus interpretat̄, cuspis ipsa spicæ. Nam & mēti pars extre-
 ma, hoc nomen inquit, habet, cum aristam non habet. Mutica spica dicitur, quasi mutila. Va-
 gina uocant, sub qua later herba. Stipulæ sunt folia culmū ambientia. Est autē Culmus, idem
 quod & Calamus, cum spicæ penitus oriūtur in summo spicæ iam maturæ. Quod minus est
 q̄ granum, uocatur Frit. Quod uero ad culmi cacumina in firma spica geritur, minus item
 q̄ granum, Vrucus appellatur. In tritico marcescente gurguliones, hoc est, Bīas (sed lego
 Cias, ut in pumice notauī) a Græcis uocatos, innasci ferunt, ut in faba Midæ, Gigni & canthā-
 ridem in Tritico (Scarabeus is paruis est) ut Phalangion in Eruo constat. Tritici multa dis-
 crimina. Sitanius uocat̄. Genus id est filiginis trimestre, ut Columella uoluit. Frumentago, di-
 cta Theodoro, differens crassitudine furculorū, quemadmodū inter ordea Crithanias, Ordea-
 go nominata. In nomine sunt Assyriū, Aegyptium, Ponticū, Thracium, Siculū, Africum, qd
 facile absoluitur folliculo. Nam Thraciū multas habet tunicas. Habetur & Cachrydias, siue
 Cāchrys, culmo crasso, quod etiā Africo tribuitur. Ponticum leuissimū. Siculum pondero-
 sum. Ponderosius Boëtium. Deprederit hoc Athletæ. Ponticū & Aegyptium sine lolio na-
 scitur. Item Siculū, præcipue Agrigentinū. Q̄ q̄ cum siculo, melāpyron nasci perhibent. Sed
 innoctū, neq; lolij modo graue, caputue tentans. Nominat̄ & Alexandrinū, oblongo semine,
 quod fortasse idem sit cum Aegypto, & Calymno. Ex Calydnis insulis, a Ptolomæo Philadel-
 pho in Aegypto conuecto. Dracontias, & Selenusium, & Sidengias, crasso cuncta calamo. Iam
 aliud trimestre, aliud bimestre. Sitaniū, uideo idem esse cum trimestri. Satinū dorice uocatū, &
 artice Ticiū, quasi purum, ut Phorioni placet, de quo & paulo supra dixi. Galenus Sitaniū,
 inquit, est Triticū instantis anni, id quod uere seritur. In Truculento Plauti Eranio, pro Setanio
 legitur mendose, castigauimus. Non possunt inquit, militares pueri setanio exducier, Euboicū
 certe intra diem quadragessimū a satū metitur, firmitate ac pondere præcipuū, non ut trimestri
 leuitas, ob id cibario panī utile: nam & furfuris partū habet, inuentu rarū. Bimestria, in Achaiā
 e Sicilia primū uenere, parum foreunda, sed cibo facilia & iucūda. Olynthi & in Euboea apud
 Cerinthum genus effoditur terræ, qua Triticum oblinētes diu id seruāt. Trimestria ubiq; sunt,
 uerū inutilia, & infirma, singulari calamo. In Asia quodā loco trans Bactra frumētum nucleis
 olitæ par nasci referunt. In Pissoris, tam firmū, ut multos Macedonum largiore usos, eo saties
 peremerit. Omni frumēto nocent imbres in flore. Itē iam plante crassato, Triticum plus q̄ orde-
 um uligine cōmeat in lolium. Camatias in Thessalia Tritici genus est, quod admissio pecore de-
 generat Babylonē: propterea nihil patitur, etiā bis derosum. Præter lupinū, nihil æquē in spica
 durat q̄ Triticum. Durat bonitas cibo in petra Cappadociæ, in septuagesimū usq; annū. Vn-
 de Cappadocio panī summa grātia, qui & Apalos, a teneritudine uocat̄, & Syrorū lingua La-
 gnan. Addebat in massam lac & oleum, & salis quantum satis esset. Laudabatur & Parthicus:
 quē aliq; aquaticum uocabāt, quoniā aqua traheret a tenui & spongiosa inanitate. Triticum ex
 Asso Troadis, in panē sibi Reges Persarum quærebant. Varro conditū diligenter Triticū, quo
 uentus non perueniat, mansurū ad annos promittit. Vis Tritico tanta, ut cados plenos siccet.
 Panifici multa & nomina & genera. Ex his nauticum intelligo, qui uetus atq; siccus a Diosco-
 ride in medicinis dicatur, fortasseq; biscoctus: quē Græci Diephthon appellant. Syncomistos
 uero, is est quē alio nomine Autopyron uocari Galenus auctor est: quoniā ex omnibus farinæ
 suæ partibus detractio nulla consistit. Inter Pityriā, & Semidalitin, hoc est, furfuraceum, simi-
 lagineumq; medius. Etenim Autopyros, siue quod idem est, Autopyrites, & Xeropyrites, &

A

Theoph. li. 3.
 capi. 25. 26. 27.
 28. de planta-
 rum caussis.
 Itē li. 4. ca. 17.

B

C Pymos Athenæo, siue Pyrinos Hippocrati, a Tritico, non ab igne flectitur, propterea quod non ex Tritici parte sit, sed ex ipso plane toto. Dicitur autem Anerectos ab Hippocrate. Item Syncomistos, quasi confusaneus, quoniam castratus non sit, sed omnia simul tulerit, fursures, utriculos, & similia. Idem fere qui Sordidus, Cuiusmodi Neronē usum legimus. Quod Paulus Sordidum, a Syncomisto separat. Utriculos in auctoribus intelligo, id quod fursure melius est, & similia deterius; hodieque Fertini suos farinę uentres uocant. In Cisalpina Gallia Redundago appellatur, Mediantū in Venetiā prouincia. Autopyri panes dicunt, & qui fursure tantū leuiter succreto sunt, qualis fere Cibarius, & Secundanus est, & qui Rubidus fortasse a Plauto poeta dicit. Hoc autem fieri solet, ut Galenus ait, quotiens Triticū generosum non est. Generosum inquit uocat, quod similaginis plus habet quam fursuris. Nam similago & simila prorsus idem sunt, Semidalis gręce dicta. Nimis fortasse multa de hoc pane, sed consulto: quia parum constabat inter eruditos qualis esset, præsertim cum in Plinio illa uerba legerentur. Ad omnia inquit, hæc fermenta tus qui uocatur Autopyrus utilior: nullo non accipiente fermentatū panem eundem esse cum Autopyro. Non hoc significari uoluit Plinius: nec tantū hallucinatus fuisset homo, seculorū omnium post Varronē fere doctissimus, sed quod fermentatus panis, non quicquid, sed qui sit Autopyrus, ad omnia ea quę dixisset utilior esse uideatur: quod & duobus locis seorsum Galenus præcipit: in altero panē Autopyrum, ut secundo ad Glauconē uolumine, in altero fermentatū ad omnia illa præferens, de simplicibus facultatibus lib. 9. Sunt qui fermentatū panem Autopyrian uocitant, ut Cratinus, non a Tritico, sed a pruna: quoniam torretur, ut ipsum nomen indicat, Farinā Græci Aleuron, & Alphiton, & Halisparton, & Aliaton, & Aliton uocant. Quod Alphita polentā fere significat, & Aliata farinam coctam, & Halisparton agrum consitū poetis, Fermentū Zymen, Cyribia, quæ nos excreta Tritici, aut ordeī, ut Columella, siue ut Palladius Creturā uocamus, auctore Iulio Polluce. Photion & Galenus etiam ipsos Fursures, quos Græci Appherema, & Pityra, nos etiā Canicas, & Apludas uocamus. Unde Canicæus panis, id est, fursureus Pacuio. At Ceribia in Cratino, idem Photion pro fabalibus interpretatur. Pepalem uero Pollux ipsum farinæ pollinē. Dioscorides & Plinius Pepalem Alphiton, pro lenta capiunt fere, Triticū Syracusanū Spyron, non ut ceteri Græci pyron uocabant. Panem Autoton, quē Phryges Beccum, ut testis est Herodotus, a perfectione, quia rotunda eius forma sit, ut Athenæo placuit. Tritici summa tria genera obseruant, qui minus operose persequuntur ista. Primum Robus, pondere & nitore præstat. Alterū Siligo: cuius candor & species in pane præcipua, sed pondere deficitur. Tertiū Trimestre, de quo supra diximus, Sitanium uocari: cuius usus agricolis gratissimus, inopiæ subsidio: hoc & Candidum esse dicitur. Nunc locus est, ut Panis genera dicantur quæ breuissime. Zymites, hoc est, fermentatus, qui & Nastos dicitur. Quod Nastos, quibusdam placenta genus est. Contrarius huic Azimos, qui & Daratos. Nam acidus & squarofus, græce Oxylepes uocatur ab Aetio, febrientibus eum dante, quibus uenter fluat. Hunc Aegyptij Tyllastin dicunt. Alij ex ordeo confectū accipiunt, qui Cyllastis uocetur. Herodotus ex filigine, Semidalites e similia. Dictam uero Similā a Cerere putauerim: quam Syracusij Simalida nominant, & Sitoha. Aleurites a farina. Gyrites a polline. Condrites ab halica, siue Zea. De Syncomisto, & Autopyrite, & Apopyria diximus. Item de Cappadocio, & Apalo, Parithico, & aquatico, & rubido. Ipnites, & Caminites, a coquendi ratione. Item Aescharites a craticula, sub finem cenæ cuius apponi solitus, & intingi passo, usque ad ebrietatem legitur. Hic & inuoluebatur, atque ita ut calebat intortus. Athenis maxime placebat. Cōiectari liceat id genus panificij, quod a tenuitate, & candore Nebulas fere uocamus, Aeschariten ueteribus fuisse. Nam & apud nos uulgari uote ita dicitur, una tantū detrita priore litera. Hinc & Escharulas mulieres a panificio dictas crediderim: cuius uerbi mentionē in Plauto, ut ceteros taceam, inuenias. Tabyrites pusillus erat. Achænes prægradis, quo in Thesmophorijs utebatur Atticæ mulieres. Qualis autem sit Apurites, Polluci non constat. Præfertur omnibus sanitatis usui a Galeno Cribanites, siue quod idem est, Clibanites, hoc est, ut Varro Textuaceus, a clibano, quē Attici Cribanon appellat, nostri Textū, quod in textu calido coqueretur, usas comitilibus matronas scribunt. Cribana uero placenta genus sunt, specie māmōsa, Encryphas, qui & Agoreus, hoc est, Forēsis, & Venalius, & Atticus uocari solet. Dipyros, qui & Pyrites Poluci, delicatus fuisse dicit, siue idem qui Dipyrites ab Hippocrate cognominatur, siue alius. Quia porro Dipyrites, ad aquā intercutem cibo utilis existimat, coniectari liceat, pro bis cocto pane capiendū esse eum. Lasgana, siue Lagana, minimo pondere, quod leuior & tenerior, etiam a carbone dictus Epanthraxis, Saturnalibus præberi solitus, nihil, ut quidā putant, ab Encryphia differēs. Vterque subcinericius est, iam Homoros, & Statites, & Encris, & Aliphantes, & Hemiarion,

Genera panis
multa.

Hemiarton, & Placites, & qui Tyntones a caseo nomen habent. Encridi similis est Physcilus, quo Spartani utebantur in sacris epulis, Rapi effigie. Magnos & sordidos panes Cilicios vocabant, & a colore subnigro Phæos, sicut Agelæos, qui a nostris cibarij & gregarij dicuntur. Ornides ab Oryza, siue ab semine quodam Aethiopico, tam simili sesamo, ut difficile posset internosci. De sicu ægyptia, Sycaminites sit. Collabus, siue quod idem est Collix, & per diminutionem Coliphion, ut Xyliphion e caseo recenti constat: de quo Iuuenalis, & in Persa Plautus. Hic & Crimmatias, & Chondribos quoque dicitur. Sunt & Macontides uocati. Sunt Chrysocollæ, sed ex lino, ac melle. Aegyptij sunt, & ad listendam aluum utiles, ut inquit Strabo, Caces appellati. Sunt Colloræ, siue Colliræ: quos Plautus non Colloras modo, sed Colluria uocauit, & Collyria ut existimo in Persa, & Collyridas sacræ literæ. Is olei mistione conspersus intelligitur a Hieronymo. Sunt Obeliæ Baccho sacri: ita dicti, uel quod obolo Alexandrig uenirent, uel quod in ueru torrentur. Sunt Eunitæ. Aut etiam Enitæ, cognomento Lecythitæ. Sunt Pani: unde apud nos uocabulum. Etenim Messapios redundantiâ & saturitatē, Paniâ appellasse, testis est Athenæus. Varro tamen Panis uocabulum a pano duci putat, quod figurâ in eo faciebant, ut in lana mulieres. Habetur & Cnestos a nidore. Itē Banchylos, & Thronos. Spodites idem uidetur esse cū Banchylo. Patrias nobilitauere Cyprius, & Cappadox, de quo supra dictum est. Artopiticius uero panis a Clibanite ac Turnaceo differre eo dicitur: quod hic e duriore fermento splendidus conficitur, illi fermentum semper perque tenerimum desiderant. Abolei forma Boletinus, papauere accepto & fumosi casei colore. Strepticius, siue Streptos, ex lacte, oleo, pipere conficitur: aut olei loco, adipe. Artolagana pusillū uini, lac, piper, oleum, siue ad pipem olei uice continent. Capyridia sunt, quæ alio nomine Tracta dicimus, ut Athenæo placet. Cuius uocis & apud Catonem metio est, ubi de placenta, & spira, & scriblita loquitur: quo uerbo ipse non Panificum, sed portiones tota materia detractas, & in solum, hoc est, stratum in tabella, siue aluelo diffusas cōgestasque significat. Proinde in hoc usu Græci sic loquuntur, *ἡνὶν ἀγῶνα*, pro eo quod est, tracta facere. Hinc et Cera candida, Tractum dici a Græcis quoque: autor est Photius: a quo & uerbum *τρακτικόν*, pro eo quod, perficere, ac subigere, ut alba fiat Cera. Paulus quoque Ceram tractam, ad pforas cōmendat. Sunt & Cubi, hoc est, quadranguli, aut etiam quadrati, ex oleo, anetho, caseo. Quancūq; Athenæus eos qui Romæ quadrati uocarentur, incisuris præinctos, & Bomilios a Græcis appellari prodit. Thargelos, qui & Thacysus: ita dici panem uolunt, quod primus e nouella messe fingit. Est & Samites, & Pyramus: quem nonnulli eundem cum Semamite putauerūt. Thiagonos Dñs coquitur in Aetolia. Sunt & Dramices, & Araxis. Quancūq; Dramin in Macedonia uocari, qui panis in Thessalia dicatur, nonnulli scribunt. Ericiem uocant, qui ex confractione, nec excreto sit tritico. Bema porro calidus, & egregie subactus, ac Depsitus panis est apud Seleucū: quem nostri forte Despitulum uocant, ut est apud Catonē. Quancūq; in Catone sunt qui Speuticium, a festinatione legendum putant: nec ut arbitror male. Brattimes, & Pityrites idem est, qui Furfuraceus, a quibusdā Euconos, & Teuconos appellatus. Nam Spolea, eum panem Græci uocant, quo necessarii dūtaxat cognatiq; uescuntur. Est & Phacinos de lente, popularis Alexandriæ, ut scribit Athenæus. Opis pistori genus est, & quod Buccellatū ab Paulo, & Aetio uocatur. Iustiniani codex, & Marcellinus in militaris annonæ grā cōnumerant, quæ bis coquat, a buccæa dictū. Est autē Buccæa, ut ex Sue-tonio colligit, idem fere quod holus. Sunt qui Buccellatum, fermento putent carere. Plautus Ruridum panē cū nominat, uidet Nauticū accipere: quia sit bis coctus. De Placentis alius mihi locus est: & sane proluxa metio ea foret. In Amylo dicent, ubi & panis quædā grā, sed admodū pauca necessario libabimus. Alioquin & Placenta panis est, ut Athenæus inquit. Illud obiter añotasse nō fuerit inutile, genus id quod Itricon, & Itrion Græci appellant, a nostris Libū uocari, et neutro et masculino genere, ut Athenæus testatum reliquit. Ego nō Libū simpliciter, sed Libū fuminale interpretor, ut in Amylo docebimus. Caro Libū ex caseo & ouo condidit: ut autē legumen, ita & triticū si coquatur: appellationē habet nouā. E piso & faba Etnos, ex lente & aphaca Lenticulam, ex tritico Pyanum, & ut recentiores malunt, Holopyron uocamus. Aliqui fruges omnium generum in passō coctas Pyanon appellant. Ut mirer Iulium Pollucem, qui Pyanon quasi Cyamon, pro faba caperit. Chidron uero coctum triticum, ut Athenæus inquit, seu frustum far, ut Hieronymus: quasi molam salsam. Est autem Mola salsa tostū far, sale conspersum: quo uictimæ perfundebantur. Vlochyton græce dicta. Iulius Pollux Chidron sorbitionem ex tritico uirenti factam intelligit: quia uirens triticum Chicria ab Aristophane dicitur. Nam Pelanos apud Aristophanem, a quibusdam accipitur pro specie leguminis. Pausanias placentæ genus accipit in Pelano. Euripides pro quacumque concreta, gelataue.

A

Strabo lib. 17.

B

C

De Hordeo.

CAP. XCVI.

xpi

Hordeū optimū est candidū, purumq;. Id minus q̄ triticum alit. Prifana tamen ob cremorem in decoctiōe redditū, plus alimentū prebet, q̄ polēta ex hordeo facta. Cōtra acrimonias atq; faucū scabrics, exulceratiōesq; pollet. Quibus etiā triticea prifana p̄sidio est. Sed plus alit, magisq; urinā mouet. Lac abūde suppeditat, si cū feniculi semine decocta sorbeat. Hordeū abstergit. Urinā ciet. Inflationē parit. Stomacho aduersat. Tumores cōcogt. Farina hordeacea decoquit in mulsā aqua cū fico, ut inflāmatiōes collectionesq; discutiāt. Duricias cū resina et simo colubarū cōcogt. Cū meliloto aut et papaueris calyce dolores finit q; latus excruciant. Aduersus intestinorū inflatiōes, cū lini semine, scenograco, & ruta, illini iuuat. Strumas cū pice liqda, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad cōcoctionē perducit. Et cū myrto, uino, malicorio, syluestribus pyris, & rubo, alui p̄fluuiā sistit. Podagricis inflāmatiōibus, cū cotoneis, aut aceto p̄dest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liquata eadē cū aqua, atq; cū pice decocta, pus excitat. Cum aceto liquata itidem contra articulorum fluctiōes prodest. Farina ex his aluūm cohibet, inflāmatiōesq; mitigat.

Pli. eodem ut
supra.

Srabo lib. 10.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Ordeum, Chymistē Lutum Vulcani appellant, in græcis cōdicibus. De Ordei radice, ortu, herba, flore, spica in tritici mentione diximus. In Aegypto metitur sexto mense: aliubi multo tardius. In Chalciā, Rhodiorum insula, celerime q̄dam loco. Itē Messanē in Sicilia, ubi Mylas uocant. In India syluestre nascitur, iocundum in panis esū. Hoc eqs appositū Alexandri, nec cabat eos primo: deinde in palea exhibiti, paulatim desijt esse noxiū. Fundit hoc in brachia, quemadmodū & Crithanias, hoc est, ut supius dixi, Ordeago. Ad Cedropolin, in Thracia q̄d nascitur, iumenta non attingunt: cuius rei causa, ut Theophrasto placet, malus odor, etiā si nō sentit homini. G̃na Ordei cōplura. Alijs granū rotundius, & breuius. Alijs maius, oblongius, et rarius. Aliud cādicat. Aliud uergit in purpurā, copiosius farina, ualidiusq; q̄ cādidū. Ita aliud binos spicarū uersus, aliud ternos quaternosq; habet, itē qnos: nullū t̄n plures senis, cui spica folio perq; p̄xima est, amplitudinis & crassitudinis maioris. Hoc Achilleis, & Achilleas ab Hippocrate cognominatur: ob id, p̄pensius obnoxii erugini. Erysibē gr̄ci uitiū hoc appellant, plenilunij fere accidens: q̄d & Rubigo frequētius dicit, ordeo q̄ tritico infestior. Eteorithon genus Ordei est tutū a Rubigine: qm incuruū nascat. Sunt & Leptides, a tenuitate dicta recentioribus Græcorum. Nam Amphicaustis, in tragœdia Ordeū montanū significat, q̄d & Euliro uocat. Differt Polēta a Farina ordeacea, q̄ torrefacta polēta, nō farina. Polēta Gr̄ci Alphita, nō ut in Palladio corrupte legas, alphica. Itē Gerania, instrumenti nomine, quo p̄cutiunt ligneo: & Euliro naulemata, p̄sertim cū uino et oleo. Ordeū Crithē et Cri, et Proconiō poet̄: q̄q; et tritici tostit Proconiō quoq; dicitur, & genus item suffitus, Photioni. Galenus in Hippoc. Proconiū, polentā ex ordeo recentij, aut etiā ex ordeo nondū tosto, significari tradit. Ordeacei uero panis genus unū Mazā nominant, int̄ ordeaceos panes deterrimum. Aetius polentā ordeacea, quæ sit humido conspersa, Mazā appellari testis est: quæ uidelicet mandat̄ cruda cū defruto, uel melle, uel alio quo huiusmodi. Mazariū uero plura genera, siue nomina. Physten Attici uocant, quæ non multum subacta sit. Est & Anthema, & Ephicois, & Concon, & Tripte, & Cardamale dicta, & Berex, siue Barax. Alij Caryx, etiā Carycce, a nigricia nomen habens, non a nucibus. Distinguit̄ Berex a Caryca sulio polluci, et Tolypa, et Thridacina, siue Thridacisca, et Anemolosi. Itē a uino Oenutta, sicut a melle Melirutta. Nam Achilleos uocata, ex ordeo cui Achilleis nomen est, constare creditur. In nomine sunt et Cypria, et Magidis. Hesiodus Amolge dicit̄ meminist, quæ nihil aliud sit q̄ recens. Iis uero quæ in sacrificijs Trophonij degustanda prebebantur, Melitūte, Arestē, & Hygie nomen erat. In summa, laudatur Lydia, Carycce, Eretria. Pr̄-

A fertur omnibus Conchos. Maza in latino non habet nomen, nisi quis interpretes panis offam, ut ipsi quandoque fecimus. Et ante nos Theodorus gaza, Offam, inquit Festus, abscisum globi forma nominabat, ut manu glomerata pultē. Frumenti genus est quod ueteres Ador, & Eder, & semē Adoreū, & Far uernaculū, aut etiā Verticulū uideo appellasse: ab edēdo: uel qm adu- rebatur, ut rostitū fieret, ex quo mola falsa in sacrificijs, & Adorea pro laude. Nam Ordeum etiā Sifar quandoque dici solet. Leguminibus fere ascribitur, quia ex eo prifana fiat, ut Columel- la inquit. Inuenio tamē & Sacrum ordeum a Græcis uocari Didalida: quasi eo pro farre ac mo- la falsa usos existimare liceat, si Photioni credamus: qui & Cāchryn dici frictum Ordeum nota- uit. Galenus plurali tantum numero Cāchryas pronunciat. Singulāri uero non Ordeum fri- ctum, sed radicem Libanotidos, hoc est, roris marini, ab Hippocrate significari cōmonet. Con- fractum porro indiligenter Ordeum, Ericidas idem Hippocrates appellat. Seminis porro Ado- rei quatuor sunt publica discrimina. Far Clusinum candidius, ac nitidum. Far quod uocat Ver- miculum, rutilo colore. Far Candidum, maioris utriusque ponderis quā Clusinū. Quarto genere se- men trimestre Halicacrum uocatum, pondere, bonitateque præcipuum. Ordei uero illarū differen- tia. Cāchierinum quidam & Exhastichū appellāt, animalibus quæ ruri sunt pascendis utilius, & homini quæ melius, quā malum triticū, fragili culmo, & nulla uestitum palea, celeriterque deci- dens, ac tritu facile. Aliud genus est, quod Distichō, siue Galaticum uocamus, ponderis & can- doris eximij: quod Oryzā esse quidam interpretantur ætate nostra. Græci, quemadmodū Far ipsum uocent, nisi Ordei appellatione contineri dicant, haud scio reddere.

De Zytho. CAP. XCVII.

Ex hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit. Renes & neruos tentat. Membranis, præsertim cerebrū uestientibus officit. Inflationē parit. Vitiosum succum creat. Elephantiasin. Qui eo potus ge- nere perluitur, agilis, & ad opus obscundum expeditus euadit.

De Courmite. CAP. XCVIII.

B It & ex hordeo potus quem Courmi nominant. Eoque sepe potu, pro uino utuntur. Verum dolorem capitis mouet. Malum suc- cum gignit. Neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent in Britania, & quæ occidentem spectat Iberia.

BARBARI COROLL.

Zythus, & Zythum dicitur, & Græce uulgo Phocadion. In Aegypto fit: ideoque a poetis quandoque Pelusiacus potus uocatur. Madesunt aqua fruges, donec resoluantur in liquorem uino similem. Inebriat hoc, & acre gustu est: quoniam ex putrilagine acescente constat. In Me- dia montanis, septentrionali situ, gentes uini loco succum e radicibus quibusdam ebibunt. Curmi porro fortasse hoc fit, quod Cerusiam in Gallia uocant, & Curmi, Curmithos insle- ſtitur. Possidonius homo stoicus, non Curmi, sed Corma appellat. Inuenio & Celiā, & Ceriā, unde Sibera, & Sicerites uinū forte nominet. Quanquā Hieronymus in eā uoce, quā uult Hebrai cā intelligi, accipiendū esse dicit omne potionis genus, quod inebriare possit bibētes. Id aut plur- bus omnino modis ac nominibus, ratione tū una fere ubique. Hispani iam et uetustatem ferre ge- nera ea docuerunt. Spuma uero dum resoluitur frumentū concreta, utuntur fermēti uice: quā ob causam leuior illis quā cæteris panis est. Aristoteles Pinū uocari tradit, quod ex ordeo fit uinum. Hoc qui sunt temulentū, nō in omnē partem cassabundos corruere, ut cæteri, sed retrorsum dū taxat, ac supinos. Paulum uinum quod ex sordibus uellerum elutis conficitur, Pinon uocari pu- tat. Sophodes, Aeschylus uinum ex ordeo Bryton uocant, non Zython, aut Pinum. Est & a- pud Theophrastum Bryton. Hellanicus & ex oryza Bryton fieri cōmemorat. Fit & e milio, ut Athenæus testis est. Nam Cyceon homericus aliud genus erat: id ex mixto farina caseo consta- tur, atque ita siccatum reponitur. Illud notatione dignum existimamus, Dioscoridem ebur scri- bere maceratum Zytho, facile tractari. Plinius non ebur, sed ipsum animal tractabile hoc mo- do reddi prædicat. Cæterum inquit, Elephantum misticantur ordei succo.

EX M. VERG. COMM.

Antiquum est, ex frugibus fieri pocula, quorum ad ebrietatem non minor quā uini etiam uis

1100

B
1100

Pli, li. 12. ca. 25.

C est. Nec nostra ætas eadem sibi parare his locis defuevit, quibus negata uina, ex quo non fa-
ris homini aqua est, quod eorum uicem expleret, quærere sibi homines coegerunt. Inter ea Zy-
thus quondam fuit, qui ex hordeacea fruge madida fieret. Meminerunt Zythi Plinius in natu-
rali, Diodorus Siculus in Gætium historia. Meminit & in carmine suo Columella, Aegypti in-
uentum & usum Zythi ostendens, cum cecinit. Iam Siser Assyriocq; uenit, quæ femine radix Se-
etacq; præbetur madido satiata lupino, Vt Pelusiaci proritet pocula Zythi. Veteres grecorum
medici, acrimoniam habere Zythum dixerunt: quoniam ex corruptione factus esset. Frigidum
præterea: quoniam acorem haberet: ideoq; mali succi esse. Quos autem in medicina usus habet
Zythus, & hic, & alij manifeste dixerunt.

¶ De Zea, seu Semine. CAP. XCIX.
Z Ea duorum generum est. Vna simplex. Altera in geminis puta-
minibus grana bina iuncta gerit. Ob id Dicoccos appellatur.
Plus q̃ hordeū alit. Ori grata. Digerit in panificia, minus q̃ triticū alēs.

Pli. li. 22. ca. 27.
lib. 18. cap. 8.

BARBARI COROLL.
Z Eam nostri Semen dicunt. Hæc si seratur pinsita, hoc est, tusa, transit in Tridicū, ut Tiphaz
idq; uon protinus, sed anno demum tertio: nunq; contra. Nihil hac robustius, terramq; magis
exinaniens, radice alta, multiplici, culmo numeroso, fructu facilimo, cunctis animalibus in-
cundo, simillima tritico aspectu quemadmodum & Tiphaz. Solū non q̃dcūq; ut Tiphaz, sed le-
tū, pingueq; desiderat. Zea & in Bromō dictā cōmeat. Dionysius halycarnalleus latine dici Fa-
bilā existimat. In Catōe porro Fabulus albus, fabā cadidā ut arbitror significat: quā bubus cū
languent, dari p̃cipit. Vt in Columella deprauate legi putē, Balbulos albos in cura Boū, p̃ Fa-
bulis albis. Dioscorid. certe Papauer albū, a Romanis Fabiolū uocari tradit. De hoc lectore ad
fabę mentionē differo, Zea, Zeteiō, & Zontiō, & Zostiō apud Aristoph. in comœdia, quæ Ba-
bylō inscribit, locus uocat, quo seruitia punienda mittebant. Meminit & Pollux. Ad q̃d allusit
poeta noster comicus in Afinaria (ni fallor) cū dixit, Qui polentā pransitāt, ubi uiuos homi-
nes mortui incurfant boues. Gregorius Tifernas in Strabone Zeas interpretat, rustica potius q̃
latina uoce Speltas: credo q̃a Rhemius Palæmō prior usurpauerit in carmine de pōderibus, ac
mensuris, quod tū Prisciano grāmatico inscriptū circūferi, Octo inq; speltas pēdere scrupulū.

EX. M. VERG. COMM.
D Nihil difficiliorem medicæ materiæ cognitionem semper fecit, & adhuc facit q̃ q̃ non eadē
ubi q̃ omnia sunt: neq; ubi eadem sunt, isdem nominibus appellant: & q̃ quo cōmunius
aliquid humano generi natura fecit, eo facilius neglectum ignoratur. Idq; in frugibus animad-
uertisse licet: in quibus nulla alicui certa huius, aut illius ex antiquis scriptoribus indicatio nūc
esse potest, cum tamen nihil in illis frequentius inueniatur. Fecerunt id mutare per tempora eadē
rum appellationes: sed multo magis, quod paulo ante diximus, neglecta cōmunia, et quondā
ana naturæ bona: & ut in Zea, de qua nunc agimus, accidit. Eam Plinius, Theophrastusq; triti-
co similem & hordeo dixerunt, ab Homero nullo non fere carmine laudatam. Posteriores no-
tam nūc frugem, quā Speltam rura nostra appellant, esse eam existimarūt. Nec huius scripto-
ris descriptio & historia, ab ea seminis forma penitus distat. Plinius in Italia, præsertimq; in Cā-
pania feliciter prouenire lib. 18. ca. 8. testatus est: priuatimq; semen appellari p̃clarā, ut ille ait, rē.
Quam in medicina ueteres grecorum medici, tritico similes habere uires dixerunt, medioq; in-
ter calorem & frigus temperamento esse. Ex hac fieri Alicam, non secus q̃ ex hordeo, idem
Plinius testatus est. De qua non multo post dicemus. Esse autem tritico similem Zeam, Theo-
phrastus præcipue. s. de plantarum historia uolumine ostendit.

¶ De crassiore Farina. CAP. C.
C rimnon crassior est ex Zea, triticoque farina, ex qua pulment fa-
ciunt. Abunde alit. Facile conficitur. Aluum uehementius ad-
stringit, si Zea ex qua fit, prius torreatur.

BARBARI COROLL.
C rimnō fortasse hoc est, quod Cremor latine dicitur, ut succus a cremore differat sola cras-
situdine. Interim confunditur. Cornelius Celsus cremorē p̃isang pro succo fere accipit. Crim-
non & Hordei genus est Photioni, et Cyceonis homerici liquamentum. Hippocrates Crim-

nodeas urinas pro crassis, & ad similitudinem farinæ tritici corpulentis accepit, ut Galeno placet, in Aphorismis, sicut alias eruo, alias frondibus, alias fufuribus haberi similes docemur. Nā Crymodes aliud est. Ita uocatur febris quæ pulmone, sacris ignibus correpto prouenit: sicut Lepyræ, quæ stomacho, & Typhodes, quæ iocinere, Pultem Græci Polton, et Poltarion appellāt. Plinius, Calidam inquit potionem in pultario poposcit Offilius. Vt Pultarium aut pro uase, aut pro forbitio genere accepit, Puls certe, ut Aetio placet, omnis forbitio uocatur, quæ aut de leguminibus, aut cerealibus granis coquendo in succum resolutis conficitur.

EX M. VERG. COMM.

Artis, non naturæ opus Crimnon quondam fuit, idem Romanæ Pulti, qua quondam Græcia pariter & Italia pro pane usa est: manifesteque id Plinius lib. 8. cap. 8. testatur, Pulse, non paulo longo tempore uiuissē Romanos dicens. Translata deinde ad medicinam res est, relictaque uere appellatione, posteriores Græcorum medici, non crimnon, sed πολτον, aut πολτάριον, i. Pulse, aut Pultriculam appellauerunt. Sic Paulus Aegineta, sic ante eum Galenus aliquando dixerūt. Fieri autem solitam præcipue ex hordeo, nomē testatur. ἀπό τῆς κριθῆς enim, id est, ab hordeo, dicta est. Vtilior deinde deprehensa fuit quæ ex Zea, & Tritico fieret. Qualis deinde ea esset, satis hic ostendit dicens. Crassiorē quæ farina sit cōfectione, trituraque Crimnon esse. Post hunc Paulus Aegineta lib. 5. de eadem agens, Crimnon, id est, Pulse appellari ait, quod ex Tritico & Zea crassius esset. Ceteri Græcorum medici eam his uel his diffinierunt. κρίμωνος γὰρ πολλὸν τὸ παχυμύρον οὕτως οὐκ ἔστιν αὐτῷ, τι πύρινον καὶ τοῦ τὸ σῖτον ἁλίσσον. Quod est, Crimnon, siue Puls dicitur, quod in Tritici & Zeæ farina crassum & crassiorum partium est. Poteritque quāta & qualis hæc crassitudo farinæ in Crimno sit, cupiens nouisse, si quas Hippocrates, & posteriores Græcorum medici κρίμωνος urinas appellāt, aliquando uiderit, in quibus corpulentioris farinæ similes nubeculæ apparent: quasque Plinius lib. 23. fufures, & nubeculas appellauit.

De Siligine. CAP. CI.

DE M generi Siligo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. In panes ut Zea cogitur, Fit quoque e Siligine crassior farina, quam Græci Crimnon uocitant.

B A R B A R I C O R O L L.

Olyra, Siligo a nostris uocatur, autore Plinio. Catoni quoque genus est tritici. Siligo locis apertis, celsis, ferenda, & ubi sol quæ diutissime sit. Vitium est Siligo tritici. nam omne triticum solo ulginoso, post tertiam sationem, conuertitur in Siliginem. Est & Olyra Galliarum propria quæ cognominatur Arinca, uel Italia copiosa. Theophrastus Olyram folliculo describit multiplici, ut Tipham, sed Bromo & Zea molliorem, infirmiorēque. Sit autem siligo, quam nunc rustici Secale uocant, ambiguum est quibusdam, nō mihi. Plinio certe farraginis & pabuli genus est Secale nominatum, occari tantum desiderās. Hoc inquit Taurini sub Alpibus Asia uocant, deterrimū, & ad arcendā famem utile, fecunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admiscetur huic far, ut mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoque ingratissimū uentri est. Nasci qualicūque solo, cum centesimo grano, ipsumque pro letamine est. Farrago autem ex recrementis farris prædensa feritur, admixta aliquando & uicia. Eadē aliqui in Africa fit ex Hordeo, unde hordeacea Farrago dicitur. Hæc esse puto, quam Græci uocāt Cratin, ut est apud Aristotelem, siue quod idem est, Grastin. Interpretantur enim Grastin, uirēs hordeum, alij Crastin dicunt, & senum semiaridum intelligunt, utique Pollux, quod & Poam, & Chilon uocant, atque Chonton. Fitigitur optima Farrago, cum cantherini hordei. 10. modis iugurum obferitur. A farragine Farraginarum deducimus, pro loco ubi Farrago feritur. A Siligine differt radica: quam pastores Consiliginem uocant, in Maris montibus frequentem, omnino pecori maxime salutarem. Corrigendus in Columella est locus, ubi de Consiliginis usu loquitur, circumscribendum esse ita, manante sanguine, tanquam olite reductum appareat. Legendū est, Tanquam, o, literæ ductum appareat. Hoc in transitu monuisse quid officiet.

EX M. VERG. COMM.

Congener, & ut Theophrastus ait σιμιθόρυπος, quod est, tritico similis Olyra est. Semen eius antiquiores Græci figura inter triticeū & hordeaceū tradiderūt. Longa est Olyra in Plinio historia: nec in Theophrasto breuis. Colledaq; ex his scriptoribus simul oia, eā indicare frugē uidetur, quā nostra tempora Secale uocāt: non tamen id pro cōperto habemus. Quod certū sit, inter tritici gēna, aut tritico similia ab omnibus numeratur, Græciæ magis & Aegypto quam Italiæ pecu-

C laris: & ob id in gentibus illis feliciore prouentu, magisq; nota. Siliginis nomen huic aliqui tenam comunicauerunt. Sed si Columellæ grauissimo rei rusticæ scriptori credendum est, Siligo secundæ conditionis triticum est. Verba eius sunt. Triticum genera plura cognouimus: uerū ex his maxime serendum est quod Robus dicitur: quoniam pondere & nitore præstat. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Habent nihilominus qui Olyram siliginem non dixerunt, latinos alios autores, quibus tueri rem suam possunt. Sed nos, qui ex professo hæc docuerunt, libentius sequimur. Vagæ rerum in gentibus appellationes, nec ubiq; eadem res, diuersitati, & incertitudini huic causam dederunt.

A **De Athera, idest, tenui pulicula. CAP. CII.**
THERA ex Zea fit tenuissime molita. Est autem sorbitio, quasi liquida pulicula infantibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

EX Olyra Atheram constare Plinius, Dioscorides & Zea scribit. Actius etiam ex amylo. Familiaris Aegypto Athera ex Siligine, hoc est, Olyra, quæ ut dixi Arinca dicitur. Iulius Pollux, Atharen uocat pultem & miliacea farina. In Plauto, Atharathrion compositum uidetur ex Athara & Thrio, quod placenta, aut libi genus est, dictum a folijs fici, quibus circumdatur: aut seorsum utrumq; legant, qui eius poetæ studiosi sunt. Porest & Athara, & Oathrion legi, ut est apud Alexin comædiarum scriptorem. A quo locus is in Plauto festiuissimus, ex persona coeci sumitur qui & Candauli mentionem habet. Erat autem Candaulos, siue Candylos, miscella ex carne cocta, pane, caseo phrygio, ut Athenæus inquit. Vt Photion, ex lacte, ac melle: qui & Amæracem tradit heroicum edulium fuisse. Dicitur & pinnula ea quam sub uentre habent thynnides, Athera, ut inquit Aristoteles; sed ut sit Tribachys.

D **Non uidetur Athera hæc a Pulte, nisi liquidiore habitu differre. Nec Paulus Aegineta aliter eam sexto uolumine descripsit: puliculam sorbilem ex tritico, zeauæ emollitis confectam esse Athera dicens. Obseruauimus tamē ex olyra, amylo, & milio factam pulitem, Atharam pariter dici. Plinius Aegyptiorum uocem Atharam esse dixit. 22. uoluminis ultimo capite: a grecis tamen recepta, non ad pultem tantū, sed ad tubercula quæ in homine aliquando extolluntur ea uox est, quibus quæ subest ueluti tenuis et dilutior pulicula, ab Athara hac Atheromata in æ abscessus ab antiquis grecorum medicis dicta fuerunt: de quibus certius cum primum dabitur occasio dicemus.**

T **De Trago. CAP. CIII.**
RAGOS quandam Halicæ figuram gerit. Multo minus quā Zea nutrit, quod multum aceris habeat. Quare ægrius conficitur. Aluumq; magis emollit.

EX M. VERG. COMM.
Ragos cognomine Sitodes, hoc est, Cerealis, ut ab herba Trago distinguat, frumenti genus est. In Hippocrate quid sit Strygis, quod ipse leuius esse tritico, & uentrem magis soluere statatur, non comperi, nisi quis pro Trago Strygite capiat.

Non habet in grecis unam significationem tantum Tragus, sed animal, herbam, frugem, & qui sub alis sentitur uirosus odorem significat. Ideo in frugis significatione, Tragon uocat, id est, Tragum frumentaceum ueteres aliqui frumenti genus hoc appellauerunt; peregrinum Italix. Cuius breuissime Plinius meminerit, nec ultra quæ ut diceret, ex omni eodem genere prætulit Oreuntium, & Tragum. &c. locus est libro decimo octauo, capite septimo. Quæntiam capite eiusdem libro decimo. Inter peregrina Italix tritici genera Tragus hic numeratur his uerbis. Adijciunt his genera bromos, siligo exceptitia, & Tragos externa, omnia ab oriente inuenta. Est & illud ex eodem Plinio intelligendum, non frugem tantum ipsam, & tritici genus Tragum dici, sed quæ ex semine eius pisanæ similis ad medicinam conficeretur farina. Verba eius eodem capite sunt. Pisanæ conficiendæ uulgata ratio est: simili modo ex tritici semine Tragum fit in Campania tantum, & Aegypto. Hic Tragum figura similem Chondro ait, non

fais certo intellectu, similem ne frugi dicat, quam græcorum aliqui Chondron, id est, Farho-
minant, an Alicæ, quæ passim Chondros etiam uocantur. Vtrunq; enim Chondros in græcis
significat: si qua hic usus est uoce χῆμα, & eius tota significatio expendatur, ad frugem potius,
q̃ ad alicam referenda similitudo uidebitur. Frugis enim figura aptius q̃ alicæ dicitur: Si ea
quæ mox hic de Chondro ait, ad alicam magis q̃ ad frugem. Chondron liquidem alicam, non
frugem uocat. Nobis inclinat animus ad frugem magis, q̃ ad alicam referri oportere. Legenti-
bus tamen & hoc liberum relinquitur.

De Bromo.

CAP. CIII.

BRomus genicula quædam habet. Folio & stipula triticum imita-
tur. Et in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas ge-
rit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata uti hordeum. Pulse
huius aluus sistitur. Prodest tussientibus in sorbitione succis.

BARBARI COROLL.

BRomos correpta prima, semen est spicam ferentis herbæ, de qua & libro quarto seposita
mètio est: hic enim de grano ipso potius, quia sit inter fruges, disseritur. Semen hoc natura ma-
xime operuit, ut Theophrastus inquit. Radice copiosa innititur, multiplici culmo sparsa, syl-
uestri fere habitu, quasi ægylas, inter uitia segetis, auenæ modo nascitur, dependentibus, ut
Dioscor. inquit, locustis, ut Plinius, lolis. Poeta Bormon, & Bormacem quoq; dicit interim.

EX M. VERG. COMM.

Quis non credat, Hauenā, cūctis notissimā frugem, hoc capite a Dioscoride de scribi tam
apposite in eo pictura naturæ rīdet. Quis etiā in hoc scriptore adeo incautus fuerit,
ut quæ inter Bromon, & Aegylas, alterā in frugū, alterā in herbarū genere discrimina sunt,
non facile sola eius lectione statim intellexerit. Toto em̄ genere, & partiū notarūq; historia disse-
runt. Hæc inter congeneres fruges a Dioscoride numerat, & describit, magno argumēto Bro-
mon Hauenā frugem esse: illa inter herbas. Hæc culmū habere dicit: illa *Βοτάνιον*, id est, Herbula
appellat. Hæc in summo dependentes paruulas ueluti locustas, duplici crure diuicatas habet,
in quibus semen est: illa in cacumine *καρπώει*, id est, q̃d semen cōtinet, duos, tresue colore rubētes
habet, ex quibus aristæ capilli figura p̃fodeunt. Hæc in medicina ad cataplasmata & tussim utilis:
illa ad oculorū ægylas, & discutiendas duricies uim habet. Et ne longiores simus, quis non
credat aliā ab Aegylas Bromon. i. Hauenā esse: si Paulū Aeginetā. s. uolumine legerit seor-
sum de utraq; agentem: & utriq; quæ sua sunt assignantem. Hanc similes hordeo uires habere,
quibus leniter & sine erosione siccet, habere idem aliquid quod adstringat, eamq; ob causam
alui fluores compescere: illam discutiendi tantū habere uim, qua duricies, inflammationesq; &
oculorum ægylas sanat. Erit quarto uolumine in Aegylas iterum de his dicendum: quæ
nunc causa est, ne in re nota ultra q̃ deceat immoremur. Quodq; nunc dictum est eo pertinet,
ne quis ex eo quod Barbarus in Dioscoride ait, Bromon Hauenā genus esse, & in Corollario
de grano tantum Hauenā dici hoc loco, de herba autem in quarto, eandem Bromon & Aegylas
topem huic scriptori esse opinetur, & hic de semine, in quarto de planta sub diuersis nomi-
bus actum a Dioscoride fuisse.

De Oryza.

CAP. CV.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Medis-
ocrem cibum præstat. Sed aluum supprimit.

BARBARI COROLL.

ORyzam, Theophrastus Oryzon uocauit. Quidam Ordeum galaticum, quia graue sit
atq; candidum, appellant. Peregrinum initio semen, ex Indiaq; illatum, simile Zeæ aspectu lo-
li, magna parte in aquis cubitorum quaternum altitudine: cæterum effundit non spicam, sed
milij modo ac panici iubam. In Baetrianis quoq; ac Babylonia, & Suside, atq; Syria inferiore
gignitur. In Italia uero multis locis. Indi hanc Farris, seu Zeæ modo pistam reddunt concoctu
facilem. In eadem gente Bosmorus, frumētī religiosi genus traditur, tritico minus. Inter amnes
prouenit, excussum areis torretur protinus. Iuramentoq; adiguntur melliores, non absporta-
turos id se prius inde, q̃ coxerint: ne semen in alias terras cōmunicari possit, Strabo auctor. In
Diodoro Bosporon, non Bosmoron corruptis exemplaribus inuenias.

C Nota omnibus etiam Oriza, parati & quotidiani in sanitate usus, præsertim quibus locis abundat. Descripsisse eam inutile, & inanis iactantia fuerit. Quod ueteres Græcorum medici ei tribuerunt, est: ægre concoqui Orizam: exigui nutrimenti esse: & quod hic ait, aluum subprimere.

De Halica.

CAP. CVI.

χέρδιον

Halica fit ex Zea, quam Dicocon appellauimus. Plus alit quàm Oryza. Aluum magis cohibet, Stomacho longe utilior. Decocta in aceto, illitaque, lepras tollit. Vnguium scabrias extricat. Incipientibus ægylopijs medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum idoneum est.

BARBARI COROLL.

Alicam Theodorus hanc interpretatur, quam Græci Chondron uocant: quod & Plinius quandoque facit. Paulus Alicam differre a Chondro putat. Alix inquit, similis Chondro est natura: nisi quod uentrem magis subprimit. Plinius, Alicam inquit, res Romana est: neque Pompei magni ætate in usu fuisse traditur, præsanaque antefertur sine dubio. Præsana Græcum uerbum est, & Præsana quoque dicitur, & olim græce Besana. Chondros porro, ut Paulus ait, similis est tritico, plus tamē lentoris habet si comanducetur. Hippocrates Chondron dicit esse utilissimi cibi forbitionem. Aetius Chondrum Alicam cum dicit, Præsana ex Alicam significat, hoc est, Alicam faris, modo fresam, in forbitionis usum, ut præsana. E Zea pista quemadmodum Chondros fiat, ut ex Olyra quoque generosa Tragos, rei rustici scriptores Græci produunt. Inuenio & Hadron dici, quæ sit Chondros. Alix, & Alicion uocatur. Quæque Alix Callimacho pro Chlamyde accipitur. Thessalico uocabulo Chondros, & cartilagine significat, & nucleum in ture, præsertim ceu quendam callum: quæ & Pyrena Hippocrates appellat. Oino Chondros ea frumenti species a Græcis intelligitur, quæ a nostris Far, siue Farrum uulgo nuncupatur. Archigenes Far Chondro potius simile, quæ idem uidetur existimasse. Far inquit Romæ, ut Chondros, Græcis conficitur sanitatis usu. Frumentum aqua maceratum nudatur cortice: mox siccatur in sole tunditur, sed leuiter, ita ut singula grana in partes quaternas, quinasue dissiliant. Idem Archigenes (ut meminit Aetius) pulre ad dysentericos, ex Farre quemadmodum conficiatur docet. Ad eumque uisum Far, inquit, clusinum desydere. Ita enim legendum credo, non iliufinum, ut omnes Græci habent codices. De clusino Farre dictum est supra ex Columellæ sententia.

EX M. VERG. COMM.

Romana res, inquit Plinius, Alicam est. Nobis eam cognouisse Hippocrates etiam uidetur, multo ante eum medicinam professus. Plures fuerunt latinis & græcis Alicæ confectiones: quas fere omnes idem scriptor lib. ii. cap. ii. prosecutus est. Quam tamen ille confectionem cui Gypsum adijceretur Africa assignat, Græci ut suam uendicant: & hoc modo faciunt. Tunditur Zea: rursaque in calidam conijcitur aquam: statimque exprimitur. Mox rufum in tenuissimum pollinem album, illi gypsum exigua quantitate additur: adpersoque itidem sale sub ardentissimo canis estu, ne acefcat, insolatur: & cum insolata fuerit, cribratur, & seruatur. Hæc nos ex græcis collegimus: quibus non dissimilia Plinius antedicto uolumine narrat: quæ relinquimus omnibus parata, & in eo scriptore exposita.

De Milio.

CAP. CVII.

μύρον

Milium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit. Sistit pulvere sua aluum. Urinam cit. Torretur Milium, seruensque in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisque doloribus auxilio sit.

BARBARI COROLL.

Milium intra quadragesimum diem metitur. Caulis ei harundineus. Flos lanugineus, ut frumento, largior aquatio detrahit folia. Plus centum manet annos, si condatur quo uenti non perueniant. Nihil leuius, mollius, aut caloris capacius Milio est. Farinam miliceam, seu fraetum Milium, sunt qui Scrutum uocari putent in Horatio. Sunt quibus ualis potius appellatio ea uideatur, ex Scroto, id est, corio confuti: quod genus Græci Thylacos, id est, folles, & quasi pasceolos dicunt. In quibus tamen, ut est apud Aristophanem, panis quoque seruabatur: cuiusmodi & Panarium, & Pa-

uariolū a nobis cōmode uocari potest, quacūq; constet materia: quæ uox in Varrone, & Papi-
nio poëta, & Martiali, Suetonio, Tranquillo legit. Nos de Scruto quid sentiamus in Cicere di-
cemus. Nam Miliariū uas a pondere, non a Milio nomen habet. Est autē, in quo excalsiunt a-
quæ, ut Athenæo placet: qd ē Græcis aliqui appellant Ipnolebēta, id est, caldariū. Porro Miliū
a miliaria summa deriuatū, non a græco, Festus existimat: apud quos Cenchros, & Straboni
Cenchrys dicit. Hippocrates Paspalem uocauit. Varro Miliū a græco deducit. Nam id Meli-
nem inquit uocant. Dioscorides & Theophrastus Melinē, pro Panico intelligit. A Milio, aues
quædā Miliaria dicunt, ut eidem Varroni placet: quas ego non ausim eas credere, quas a Mi-
lio Græci Cenchridas appellant: q; illæ uideantur in latino Tinnunculi uocatæ.

EX M. VERG. COMM.

Milio posteriores naturam & uires assignarunt, refrigerandi in tercio, siccandi uero in se-
cundo ordine. Habere præterea uires extenuandi aliquas Milium crediderunt, nihilq; ad con-
cipiendum & retinendum calorem aptius eo esse.

De Panico.

CAP. CVIII.

Panicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. Eo-
demq; modo in panes subigitur. Eosdem habet usus. Minus ta-
men & nutrit & stringit.

BARBARI COROLL.

Panicum Helymos, etiam Melinos a Theophrasto dicitur. Melinos porro cantionis græce
nomen est. Item Elynos, siue Linos, lugubris eiulatus, quē nos Lessum dicimus. Tibiæ genus
quoddam apud Sophoclem uocatur Helymos, ut in Harundine docuimus. Quadragesimo
die absolui constat, ut æstiuæ omnia. Calamus harundinis, ut milio. Flos lanuginis. Durantiſ-
simum inter fruges Panicum. Ideoq; Diocles medicus, Mel frugum merito appellauerit. Seras
uermiculos, e quibus Sericum uellus metitur, Panico ali quadriennio apud Seras populos,
tradit Pausanias: quinto anno Harundine recenti, quam prædulci pastu audius carpentes dis-
siliant. Alioquin non ultra eum finem uicturi. Ex utero Bombycem eam peſti, multo fertilio-
rem q; uiuentium, detractam pedibus, quos araneorum modo sub arbore textentium octonos
habeant. Esse autē corpus ijs amplitudine scarabei maximi. Seras ipsos in Aethiopia sinum ru-
bri maris intimū colere, uel ut alijs inquit, placuit, in Scythia Indis contermina, qua insulæ ia-
cent Seria, & Abasa, & Sacra, nihil contendo; uerum, falsumue dicat. Scio & ab alijs de hoc ia-
ctatā. Illud testari bene est, Seras uermiculos, iam pridē in Italia tam multos ali, Vicentino ma-
xime agro, ut non aliā re prouentus quibusdam maiores consent. Sed hos non Panico, non
Harundine, sed Mori folio uesci; ob id, multis locis plantaria sunt eius arboris frequentia. Cir-
ca Mediolanū quoq; Abiterno agro seritur, alias non magnopere in illis uisā regionibus, nunc
crebra in latifundijs Ludouici Sfortiæ, clari ætate nostra Principis, prædijs eius ad Ticinum
anem, uilla magnificētissime substructa.

EX M. VERG. COMM.

Fœminino genere Melinen, & masculino Melinon, Theophrastus Panicum notissimam o-
minibus frugem uocat. Romani a paniculis in quibus semen est, Panicum appellauerūt.

De Sefama.

CAP. CIX.

Sefama stomacho inutilis cibus. Halitus grauitatem facit, quoties in-
ster mandendum commissuris dentium inhæsit. Nervorum crassi-
ciem illitu discutit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationi-
bus, coli doloribus, & cerastæ morſibus. Capitis dolores, qui æstuatione
ne concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in uino. Præ-
sertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit ole-
um quo Aegyptij utuntur.

BARBARI COROLL.

Sesamum, & Sefama uocatur, & Plauti poëtæ Sesuma, caule ferulaceo, flore foliaceo, ut
Iriou. Quadragesimo perficitur die. Genus ex eo candidum præfertur dulcedine: quod & in
ceteris leguminibus contingit. Grana eius in siliquis distincta, ut Lupini, sed peculiari quodā-

C modo septa. Viride nullum attingit animal. Nihil ita emacrat solum: ut pote cui crassior & multiplicior harundo sit q̄ Milio, & radix quoq; numerosior, Sefaria, & Sefania quandoq; le-
gas corrupte in Columella, pro eo quod est Sefama.

EX M. VERG. COMM.

D Esit iam pridē feri in Italia Sefamū, neq; inter fruges nostras numeratur, pauloq; minus q̄ peregrinum, & alienum modo nobis est: quondā tam cōmune, tamq; omnibus agris satum, ut æqua esset huius & aliarū frugum cura. Indicantq; id quæ tam multa de semente eius a Co- lumella, Plinioq; & ab alijs docentur. Nouerunt tunc omnes Sefamū, nunc cum fruge mul- tis locis nomen etiā ignoratur. Et nisi ex Græcia repetatur, & Aegypto, quibus regionibus ad- huc feritur & abundat, nulla fere erit quæ ab hoc & alijs Græcorum medicis Sefamini olei ad medicinam utilitas ostenditur. Frugis oēm figuram Plinius lib. 18. capi. 7. apūssime & felici pi- ctura descripsit. Ideo nos nihil de ea repetemus: dictis ab eo tantū adijcientes, candido colore semen eius esse, dulce simul & odoratū: quod minores aues, quales fringillæ, passerēs, & car- dueles sunt, audius appetunt. Græcia omnis eo ad dulciaria utitur in panificio tritum, reliquo pani compinsentes: mox in summa panis cute integrum addito liquore aliquo inspergentes, ut retineatur, & in coctura panis concorporetur. Aegyptus oleum ex eo exprimit, quo in cibo, & omni alio domestico usu utatur, tanta copia, ut amplissima latifundia nulla alia fruge ui- rant. Nostra ætas, ut paulo ante diximus, uix nomen eius audit, & si aliquando utatur.

De Lolio.

CAP. CX.

λίπα
λίπα

L Olium quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, uetera
ulcera, gangrænasq; emarginat. Sanat cum raphanis, sale & ace-
to feros lichenas. Et ex aceto & sulphure uiuo, lepras. Strumas quoq; dis-
cutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in uino. Abscessus
etiam rumpit, qui ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua
D mulsa, utilissime ischiadicis illinitur. Si cum polenta, thure, myrrha, aut
croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

BARBARI COROLL.

L Oliū e Tritico & Ordeo, corruptis uligine seminibus, e lino quoq; nasci non desunt qui
affirmant. Negant uernā esse frugē, sed hyeme statim ineunte proflire terra, folio angusto, hir-
suto, pingui, non tunicis, ut Avena multis, sed nudū: nec ptunditur. Quidā non ex tritico, aut
ordeo, sed inter ea, ut in Sicilia Melampyron puenire putant. Inter Lolia flosculi uisunt, e car-
ne tantū, non e cortice atq; uena, ut ceteri. Loliū Græci Aerā uocant, etiam si Calimachus pro
pila quoq; & globo Aeram accipit. Plinius certe aliud uidet genus existimare Loliū, aliud Ae-
ram. Vnde farina Aerina dicit, Aeræ inquit granū minimū est, in cortice aculeato. Cum effusa
pane, tam Aerā q̄ Loliū inebriat, celerrimeq; uertigenes facit. Aiunt in Asia & Græcia, balnea-
tores ad pellendā turbā, solitos Aerā iniicere carbonibus. Triticū hæc circūligando se strangu-
lat. Plautus quoq; Loliū oculis officere testat in Milite: q̄q; non Lolio, sed Oleo corrupte lege-
batur hoc modo. Mirus oleo uisctaret, & tam uili tritico. Quid iam? quia lusciosus es.

Sed scribendum ita fuit,

Mirust Lolio uisctare te, tam uili tritico.

Et reliqua. Ouidius,

Et careant Lolijs oculos uiuantibus agri.

EX M. VERG. COMM.

I nter uitia frugum & noxas Lolium est, omnibus notissimum, macro solo plerunq; proue-
niens, & cum degenerauerunt uitio aliquo frugum semina, inter eas nascens: neq; enim solum
in triticea, sed in omni fere alia segete & per se etiam prouenit: frugum acerba pestis, ideoq; a
Poëta infelix appellatum.

De Amylo.

CAP. CXI.

ἀμύλον

A Mylum ex eo appellatum est, q̄ sine mola fiat. Optimum ex tri-
cestri, natione Creticum, aut Aegyptium. Ratio faciundi Amy-
li hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinquies in die, & si

fieri potest nocte. Cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitati-
one aqua, quo minus cremoris dulcedo una excludatur. Vbi molliissi-
mum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. Rursus infusa,
teri. Tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi. Reli-
quumque quallo, sportisque siccatum tegulis nouis confestum torreatur fla-
grantissimo in sole. Namque si paulisper udum maneat, acorem concipit.
Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaque efficax est. Sanguinis reie-
ctiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. Lacti atque obsonijs annua-
setur. Fit etiam Amylum ex zea, quae maceratur, ac eluitur uno aut al-
tero die, & farinae modo manibus subigitur: pressaque feruentissimo in
sole, ut ante retulimus, exiccatur. Nullius in medicina usus. Ad alia
tamen conueniens.

BARBARI COROLL.

Amylum ex omni Tritico, ac Siligine, ut Cato uoluit, sed e Sicario, i. trimestri: quod item Siligi-
nis genus est laudatissimum. Inuatio eius Chio insulae debet, unde commendatissimum Plinii report-
bus. Probat leuitate ac laetore: utique recens sit. Quia uero etiam Placentiae genus est Amylon, de
Placentis agere tempus est: quod & in Tritico pollicitus sum. Ergo patriae nomen habent Paria, &
Samis, & Rhodia: quae & Coptam, & Coptoplacunta noiant, insignem duricia, ut Martiali pla-
cet. Accipiebat haec & papauer, & mel, cui simile uidetur. In Festo Coctum dici legimus, & aliubi
Cocentum. Alexandriae Pancapra celebrabatur, in modum rotae Papyro inuoluta diuturnitatis gra-
tia. Similis haec ipsa erat, quae Itria dicunt, & a festo Sumenalia, ut coniunctio, quod fumen *ἵτρον* diceat.
Constabat autem Itrion, sesamo, ac melle. Quae & a sesamo & Sesamites, & Sesamides pilari specie
appellantur. In nomine sunt & Amæ Ionis, quae alij Ametas, & Ametiscos uocant. Sunt & Splenia co-
lore candida. Habent & Amphiphontes, sacrum Dianae fertum, faculis urentibus circumdatis, ut Ba-
syniae, iuridi, ex triticea farina cum melle. Celebrant & Thymaides, & Samiae, & Philoxeniae. Sunt
& Coccora, quorum meminit Demosthenes in oratione pro Ctesiphonte. Sunt & Tageniae, quae & En-
chidas uocat Pollux. Apud Caronem est, quod uocat Enchyton: cuius & Menander meminit. Ali-
ud hoc, an idem sit genus cum eo quod Epichyres dicit, aestimandum relinquo. Phorion nihil distinguit.
Pollux uidetur se iungere. Epichyros certe, atque Anites quoque noiantur, ut Paphilus existimat. Ca-
ronianae sunt & Spira, funi nautico in orbem conuoluta similis. Et Globi, siue Globuli: fortasse etiam,
quae Syracusani Epicyclos uocabant: Nam pastillum in sacris libi genus rotundum erat. Ite Erneum,
& Sphaerite, & Scribitae. Ite Sauillum: quod Athenus Subicillum noiat. Et ex halica quoque sic
ri monstrauit, Aelius stilio Subuculum uocari scribit. Libi genus ex halica, oleo, atque melle, ut Fe-
stus inquit. Chrysippus multa istis genera adiungit, Tarentinum, Crassianum, Siculum, Crustulum, Iulianum,
Apicianum, Canopicum plucidum, Cappadocium, Hedybion, Maryptum, Plicium, Guttatum, Monianum,
Coerianum, Tutatum, Tabonianum. Tria haec postrema Crustulacei sunt generis. Iis adijcit Mustacea,
e mullo, quorum hodieque in Iunenfi agro usus. Mustacea, Sesamata, Puriu, Gofgloaniu, Paulia-
nu: & haec quoque Crustula. Ite Lucetulae, Argyrotryphemata, libi Circi, siue Circuli, adempta farina,
& aqua, & caseo: quae circuitu aequabiliter fundebatur hos quidam, qui magis incedere faciebatur: & Lixu-
las, & Semilixulas uocant, ut Varro inquit Sabino uocabulo, Exaphae, Crustoplacites, Oryzites,
Pathoes, Ostracites, & quod Catillus ornatus a Romanis dicitur, lactucas, & piper, & axungia acci-
piens. Fit ex siligine. Post has sunt Creion: quae apud Argiuos spongiae ad sponsum ferunt. In car-
bone coquitur. Glycinas ex passo & melle, Cretenlibus familiaris, eademque fere cum Mustaceo, quod ex
mullo fieri docuimus. Empetras uero triticeus panis est cauius, ut in quae Placentiae caseariae, ut
in theca recondi soleant. Encris in oleo primum coquitur, mox accipit mel. Habet & Panis hoc no-
men, ut diximus in Tritico. Cyribanæ Lacædæmonis sunt propriæ, in cuius formam circumfer-
ris solitæ, cum uirgo laudanda esset a choro muliebri. Crimnites, a Crimno fit, de quo supra dixi-
mus. Stactites ex pingui, melle, caseo, ac sesamo conficitur. Erat & panis nomen Stactites. Charist-
os Aristophani Placenta est, panis Eubulo. Præmiu hoc in purgationibus dabatur. Apud nos hinc dor-
tasse Chalifiones, quasi Charistiones appellati ex amygdalis, & saccharo, nec alia fere materia quae
sunt & Fungi, sollicitudine matronarum cum feriuntur, prælatis semper quos sanctimoniales ipsae

A

Pli. li. 19. ca. 7.

De Placentis.

B

C finxerint, Epidætrōn sub finem cœnæ mensis apponebatur: unde nomen. Nanos panis uide-
tur placētaceus magis q̄ placenta, constat caseo & oleo. Psorhia, siue ut alij Psathyria, sunt qui
mīscas panis, quas & Attaragos uocant, ita nominatas putent. Attaragus porro & pro rimula
in pane ignis ui facta capitur, & oīno pro uilissima & minima quaq̄ re: ut Ectia apud nos: unde
uerbum Ectiafacio, de quo Festus. Polluci Attaragos est superior in pane crusta, sicut in ima E-
psethia. Sunt qui genus placentæ fecerint. Taganitæ a patellis ac sartagine dicuntur. Elaphos,
a mensis nomine quo fingebar. Sicula est Amor bites. Aliud ab hac genus est Amoras appella-
ta, Oedepæsa Cōi celebrant. Syracusani Myllos, ex sesama, & melle, muliebris pubis speciei q̄s
fœminæ Dearum focis & altaribus circūferant. Nastos e nucibus & intestinis, & fartilibus, ad-
fecto melle sit atq̄ lacte. Vnde dicitur Nastos, quasi fartum. Ab Erinaceo nomen Echinus ha-
bet. Ab Hemina Coryliscus. A tritico Pyramuntēs, & ab ijs diuersæ Pyramides, fortasse haud
ijs dissimiles, quas Cato Graneas triticeas appellat. Pyramides porro in perugilijs dabantur:
quasi prēmia ijs, qui nocte tota insomnes excubassent. Quidam tamen & Pyramuntas hoc ge-
nus uocabant. A caseo, & usu cribri Tyroscocina dicunt. Ab ijs differunt Hypotyrides appella-
tæ: quas e caseo, lacte, ac melle condūt. Nam Pityrides, siue ut alij quidā legunt, Epityrides, &
Epityra, oliuæ genus est: ut aliubi docuimus. In Creta sit a uentre, Gastris uocata, e nuce, tha-
sia, & auellana, & amygdala, & papauere. Item pomis, & sesamo, & pipere quadrangula figu-
ra. Ab ijs est Poltos dicta: quam nos Pultem uocamus. In Catone quidem punicea sit Pulis
mentio inter Placentas: forte non dissimilis a libo eo, quod punicum uocabant, q̄ ex Africa
uenisset, & Probum cognominabatur. A melle Melicerides. A suisbus Choerina. Latina sunt,
& sacris dicata libi genera quæ Fertum, & Strues appellatur: unde Struserani, qui ea ferre con-
sueuissent. Strues uero dicebatur, q̄ erat digitorum coniunctorum similitudine: qui superie-
cta panicula, in transversum continebantur. Item Libum farreum a farre, Libum uero, q̄ pri-
us libaretur q̄ esset coctum, ut Varroni placet, dictum est.

De Fœni græci Farina.

CAP. CXII.

r. d. 10

D

Graci Telin, alij Carpon, alij Buceras, alij Aegoceras, Latini Fœ-
num græcum appellant, Aegyptij Itasin. Vis farinæ est mollis-
re, dissipare. In aqua mulla decocta aduersus tam internas, q̄ externas
inflammationes efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & nitro trita ex-
tenuat. Succus decocti eius, fœminarum malis subuenit, & siue tumor,
siue præclusio sit uulvæ, fouentur, & insident. Decocti cremor, capillos,
furfures, & manantia capitis ulcera purgat. Locos laxat & emollit, si cum
anserino adipe pessi uice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimū imbecil-
lis partibus, & ulcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tene-
fmos, fœtidamq̄ dysentericorū proluuiem. Oleum quod ex eo exprimi-
tur, ex myrto, capillos & genitaliū cicatrices abstergit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 19.
Columel. li-
bro 2. ca. 11.

Fenum græcū a Theophrasto Buceras uocat. Ab aliquibus Cerastis, Epiceras Hippocrati,
quoniam semen habeat simile corniculis: unde Siliquā nonnulli appellant, Plinius Silicium, Var-
ro Siliculam. Inuenio & Carpum in nostris, & Græcis auctoribus uocatum: q̄ q̄ & pro balsa-
mi semine Carpum fere accipiunt. Item Carphos pro Fœno græco, quasi flocculum, siue aren-
tem furculū. Dioscorides Boton quoq̄ dicit uocatā. Quidam Lobon, hoc est, siliquam legen-
dum, non loton credunt. Ego & loton dici posse uideo, ut in Anoni diximus.

EX M. VERG. COMM.

Fœnograci a principio statim numerantur a Dioscoride aliæ appellationes aliquot. Ea-
rum plures a siliquarū figura, quas corniculis similes habet, factæ sunt. Neq̄ hæ quidem noui-
tiæ, posteriorum uel temporum, sed uetustissimæ sunt, & a Theophrasti temporibus. Siqui-
dem auctor ille libro quarto de plantarum historia, a bubuli cornu figura Bucceron appella-
uit. Eademq̄ ratione alij non a bubulo, sed caprino cornu similitudine accepta, Aegoceron
Fœnogracum dixerunt. Alj a cornu simpliciter Ceratida, nigræ enim græcis cornu est.

De Lino. CAP. CXIII.

A

LINVM aliqui Linocalamin uocant, alij Annon, alij Linon agri-
on, Romani Linum, Pœni Zeraphœes. Vulgo notum est. Cu-
ius semen easdem quas scœnum græcum uires habet. Discutit, & emol-
lit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaque
aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie, uarolq;
crudum tollit. Illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas, duricias
que discutit. Ulcera quæ serpunt, fauolque, cum uino decoctum expur-
gat. Ungues scabros eximit, cum pari modo nasturcij & mellis. Vitia
pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituatur. Tussim
lenit. Venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placentia
largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, uuluaq; erosio-
nibus immittitur. Alui excrementa euocat. Ad uulua inflammationes
in deflectionibus perquam utile.

BARBARI COROLL.

Linum, a Græco sumitur. Semen eius Linospermon appellatur. Oleo seminibus expresso,
frases, & retrimenta quoq; ipsa reponuntur, saginando iumentorum generi, præcipue bubus
obesitate sola insignibus futuris. Quales ad nos Mediolano coronati ueniunt, Principibus q̄t-
annis officij gratia donantibus. Visceratione huius solenni orta, Magistratibus diuina carne glo-
bulis, quos quia fere pares sunt, Sociolos consuetudo appellat. Quidam nō Sociolos, sed Suc-
cidulos, a suilla uisceratiōe uocari maluit, quæ singulis annis ante Curia uenationis die agit. In-
ter Lini genera est Cholcicum: quod tamē Sardonicū uocant Græci. Est & Aegyptium: a quo
Xylinae uestes, quas & Gossampinas dixere. Hoc iurisperiū Lanam ligneam appellant. Est aut
em Gossampinus, siue Gossipiō, siue Xylon, fruticulus e superiore parte Aegypti, etiam in Ita-
liam delatus, fructum ferens barbaræ nuci similem, plenum lanugine: nec alterum Lini genus
est, quod huic candore, aut mollicia præferri putent, quanq; firmitatis in eo parū. Huius pu-
tant esse generis quod uulgo a pocilli credo forma Coithonem uocamus, siue a mali similitudi-
ne coronæ, quod in eo gignitur. Id maturitate hians, lanuginis pilas ostendit. Folia huic uitiū
minora. Aliqui Gitonē, a Git, cui similem fere gerit in capite folliculum, appellant, Draconis
acetarij e Lini semine, ut post dicemus, nascentis, folia ipsa testantur originem.

Plin. libro. 19.
in præfatione.

B

De Cicere. CAP. CXIIII.

Cicer satium aluo idoneum est. Urinam ciet. Inflationem pa-
rit. Colorem commendat. Menses ac partus expellit. Lac au-
get. Cum eruo decoctum, illinitur ad inflammationes testium, uerruco-
sas informicationes, ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginescq;
Contra carcinomata, & ulcera quæ cacœthe uocantur, cum melle &
hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumq; cit ur-
inas, dato cum rore marino, hydropicis, aut regio morbo laborantibus
eorū decocto. Lēdunt ea exulceratam uescicam & renes. In uerrucarum
formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas
tangunt, eaq; grana lintheolo deligata abijci post se præcipiunt. Ita de-
cidere eas arbitrantur. Syluestre Cicer, folijs Satiuo simile est, odore ac-
cri. Sed semine discrepat. Idem quod satium præstat.

BARBARI COROLL.

Cicer Erebinthos a Græcis uocatur. Legumina gallicani, ut Varro ait, nominant Legaria.

u

Theoph. lib. 9
capite. 6.
Pli. li. 18. c. 12.
Col. li. 2. c. 11

C Dicuntur ita, quoniam uellantur e terra, non subsecuntur ut fruges. Eadem Gelius etiam Legu-
menta nominat. Inter hæc Cicer altissima radice adhæret. Floret diutissime ut Eruum: quadra-
gesimo die uellitur: caulis admodum lignosus. Ciceris aliud Arietinum, Erios a Græcis uoca-
tur. Aliud Columbinum, idemq; Venereum, Erui similitudine, Orobiaos ob id dictū, a Co-
lumbella Punicum, Siliquæ Ciceri rotundæ. Vni leguminum florenti, pluitiæ officium. Erucis
nascentibus, eluta falsilagine, nigrum & rufum candido ualidius, herbas omnes enecans, sed
tribulum celerrime. Sideratio Radicis & Erucæ, quas aliqui Vricas, & Græce Campas uocāt,
Ciceri propriæ dicuntur. E Ciceri corrupto nullum fit animal; contra q; in cætero frugum
genere. Quanc; hoc & seminibus olerum, & quibusdam alijs comitine. Nigrescit hoc cū cor-
rumpitur. Durat Erui modo annos; Ciceris generibus syluestre adijcitur, a Dioscoride, Gale-
no, atq; Paulo, cuius uis alia duot excedat, Orobiaos, siue Orobias, calidior est Arie tino, sub-
amarusq; ut Eruum: inde nomen. In Columbino, & Orobiaon, & Syluestre contineri puto.
Nasci & in India sūm Cicer aiunt, diuersum omnino genere. Cæterum tam simile, ut mensis
appositum, dignosci fere non possit. Cicerculam uero Theodorus putat esse, quam Lathyron
Græci uocant, folio non rotundo, ut plurima leguminum, sed oblongo: caulis humi serpens,
ut piso: quaterni & inequales grano sunt anguli, ut Plinius inquit. Idem Theodorus, Ochron
uocatum, interpretatus est modo Eruiūm, modo Eruiale, modo Cicerum. Folio ut Ciceru-
la oblongo, uermiculus, ut item Cicercula, obnoxio, secutis post imbres caloribus. **C O L V**
M E L L A quidem Cicerculam similem piso tradidit. Ciceram uero non tam leguminibus,
q; pabuli generibus annumerat. Nec Cicerum, sed ut dixi Ciceram uocando: quæ Bubus Erui
loco detur, fresa in Betica, nec hominibus inutilis: sapore nihil differens a Cicercula, colore tā-
tum discernitur, quo sordet obsoletior uidelicet, et nigro propior. Sunt qui Ochros etiam
Phasilos appellari scribant. Habentur & Dolichii uocati: quos Theodorus a Plinio sumptum
interpretatur Siliquas, qui & Lobii, siue Lobii nominantur: q; soli fere leguminum, ut in græce
tius, cum thecis suis mandantur in patinis. Scandunt hi pedamento cui accubant, prelongo af-
fixo: ita enim reddi putant frugi: contrahens eruginem, ni fiat ita. Semen eius æuum non patit,
breuiq; marcescit ut aphaca. Nec defunt qui Lobos, siue Dolichos a ueteribus, pro Phasilis
dictos existimarent a recentioribus Pisos. Cæterum Theophrastus, & ante Theophrastū Hip-
pocrates, Pisum a Dolicho manifeste separauerunt. De Phasilis nūq; meminit. Nisi quis Pha-
siolos ab eo significatos Dolichorum appellatiōe censeat, ut Aetio placere uideo. Sed nō sem-
per Paulus Pisos, & Ochros, & Phasilos, a Lobis, siue quod idem est, Dolichis manifeste se-
iunxit. Illud quidam putant Lobos esse; nō candidos istos et triuiales Phasilos, sed rubentes
ex milace herba. Alioquin idem Paulus in quadā compositione, Phasilos requirit albos: qua-
si sint etiam nō albi, utiq; ad renes. Pifus, Pifum, & Pifa uni tantum Palladio genere feminino
dicitur: cuius Africanum genus unum haberi meminit. Idem ualuulas thecasq; Ciceris, Con-
las appellat. Quod admonitionis gratia, non imitationis retulimus. Inter legumina & Acan-
seruntur, a duricie uocati, quod eos *καλίσιν*, id est, frangere non sit, lenti similes, ut grammæci
quidam interpretantur. Ego haud scio, idem, an diuersum id genus sit ab Aracis: quos Aetius
Cathyris, hoc est, Cicerculæ, ut Theodorus uult, similes esse dixit, & usui, & uiribus: duriores
tantum, & pici difficiliore. Aracos inquit Theophrastus, inter aphacas, siue lentem nascitur,
res dura & scabra, & proinde uilis. Hippocrates Aracida nominat, ab aliquibus dicta Lecichos.
Est & Aracidna, & alia q; Aracos in Tubere dicenda. Quidam Lecithō, p genere accipiūt, ad
Pisum, & Aracum. Nec scio, an ijs assentiā, qui Lecithō ab oui luteo, cui similis colore sit Ara-
cus, deductū putent: cum scriptura fortasse diuersa sit. Galenus certe Lecithō p lente, cui detra-
cta coriū est. Proinde contrariū ei genus esculētū fortasse fuerit: qd Horatius illo uersu insinuat,
Vilia uendentem tunicata Scruta popello.

D Ut Plautus quoq; Scrutea, & Collubia in hūc forte sensum appellauerit in Persa. Ceterū Hora-
tiani forte nō scruta, sed scuta legas, pro uasculo rustico. Vnde Scutiscum Catoni sepenumē-
ro, Matellum, Trullum, Scutiscum unum: Matellā, Trullā, Nasiternā unam. Quanc; pro uale
sunt q; coeperint Scruta in Horatio. Ceterum Collubia, & Collubiæ sunt, quæ Tragemata etiā,
& Bellaria dicunt, Ciceris frixi, uuarumq; passerum uilia munuscula, ut Hieronymus interpreta-
tur. Vnde Colybisitas, pro numularijs mutatiūm fornus exercitibus, uocari ceptos asserit.
qd genus a Polluce nominat Colybos. De Colybo & ante diximus. Propterea locū in Plauti
Persa eum, non scrutea, & colluthea, ut omnes habent codices, sed Scrutea, & Collubia legēdū
putamus, Fortasse Scrutea sunt, quæ græci Catachysmata, hoc est, missilia uocabant, spargisō

ficat: siue a uilitate, ut diximus, siue quoniam e pellicijs folliculis, quos & Pasceolos uocamus, effundi consueuissent. Quid si Coluthra legamus: cum maturas ficus ita graeci uocent, ut inquit Philomoni. Nam strutea pro cidonijs quoque sumi possunt. Apud Aristophanem & comicos Lecithopolae mulieres dicuntur, quae uilia quaedam uendunt, quasi Nugiuendulae. Sidonius Apollinaris in epistolis, nunc inquit quaedam friuola, nunc ludo apta uirgineo, Scruta donitabat, hoc est, scutula quaedam & quisquilias, & nihili minuscula. Meleager Graecus autor, uolumen singulare scripsit, Lecithi & Phaces comparationem continens. Porro legumen omne, ut inquit Athenaeus, tribus modis manditur. Aut enim ex eo fit quod Etnos dicitur, ut ex faba & pisco, quam nos Cochliu uocemus, si placet. Quamquam quid sit Conchis proprie, dictum est aliubi. Aut Lecithos, ut ex araco. Aut Phace. Aut ex aphaca & lente: quod nos Lenticula. Theophrastus Loti aegyptij radicem decoctam Lecithodem fieri cibo gratam scribit, hoc est, araci, uel leguminis alterius in modum. Quamquam Theodorus albumen oui, quemadmodum in ea uoce luteum intellexerit, uehementer miror: cum Lecithos, uicellum oui potius, quam candidum significare uideatur. Hoc primi uidimus, seu recte, seu perperam. Certe si errauimus, utilis & eruditus error futurus est. Nec illud tacerim, Lecythion pro gutto oleario, & ampulla falso a quibusdam coepisse, Lenticulam uocari. Nescio quam perite: cum Lenticula uasculum non sit magis, quam id quod graeci Discu uocant. Defendit eos fortasse Apuleij de strigilecula, quae lenticulari forma uisebat, aut toritas. Satis est locum notasse. In summa, Lecithos, pro legumine, aliquando pro putamine periora scribitur, pro uicello per, y, p ampulla per, u, potius quam per, y. Haec fortasse curiosius quam de bui, persecutus sum, sed innotandum fuit, quia & Graecis & Latinis multa hinc caligo per diu fuit.

De Faba. CAP. CXV.

Faba inflationem excitat. Aegre concoquitur. Tumultuosa somnia facit. Tussi confert. Carnem gignit, media calidi frigidi quoque natura. Decocta in posca, & cum suo cortice elicata, dysenterias et coeliacorum profluvia sistit. Contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus neque gocij stomacho exhibet, maioremque flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat. Cicatrices concolores facit. Turgentes praedurasque mammas, etiamsi inflammatione tententur, adiuuat. Lac restinguit. Furunculos, sugillata, parotidasque, cum foenigraci farina & melle discutit. Cum rosa autem, thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, uulnaseque, reprimat. Subactum uino, suffusus ictu oculos recreat. Manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluctiones, fronti illinitur. Decocta in uino, testium collectiones sanant. Quo tardius pubes erumpat, pueris imo uetris illinitur. Vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, et minus alimenti capefcunt. Cum polenta scisso alumine, et uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempro cortice, in illas parteis diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluctionibus ab hirudine concitatis. Namque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Faba Graece Cyamos, Hellenicos uocatur, ad differentiam Aegyptiae. Aul. Gelius & Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Plautus in Stichio. Conuiuium, inquit, hoc satis est pro opibus nostris, satis commodum, nucibus, fabulis, ficulis. De quo & in Zea diximus, Graeci Cyamon uocant, & primam in manu concretionem lactis. Eadem parte scapus & radix funditur, idque in omni leguminum genere. Non diuersa, ut in frumento singularis ei radix, sed capillata fibris, ut caetero legumini. Folij exit multis, ut pisum atque cicer: non singulis, ut triticum. Die-

Pli. li. 15. ca. 12.

C Pus quadraginta floret, non uniuersim, ut frumentum, sed particulatim, ut reliqua legumina: xost florem totidem diebus perficitur, quantum legumina nulla. Differunt folio rotundo, ut maxima pars leguminum geniculato & inani caule, lignosissimoque post cicer. Sola fere legumini scapo recto assurgit. Circa Philippos Ateramon uocant, in pingui solo herbam, qua necantur Fabae. Teramon de qua in Macro. Nonnunquam porro fieri, ut Teramos in Ateramō transeat, cum uapore atque halitu terrae madidam, indigena quidam uentus efflauerit, ut Theophrastum Plinius intelligit. Aliter Theodorus, qui duo illa, Teramon, & Ateramon, siue Ateramnō, pro costibili & incostibili, non pro herbis ita nuncupatis accipit. Theophrastus certe alio loco facile significat, ueriores Theodori & Plinii sensum fuisse. Ateramna uulgo Legumina Graeci uocant, inobsequiosa & contumacia. Quod genus seminis etiam Cerasbolon uocatur a Platōe, superstitiosa origine, quasi sterilia & irrita proueniant, quae per bouum cornua ferendo ceciderunt in terram. In Macedonia & Thessalia moris est, arua fabis florentibus inuertere: quia legumen id solo proficit, quasi pro stercore. Nascitur in marcescente Faba uermis, quem dixi, Mydas. Siliquae, Fabarum folliculi sunt. Fabalia uero, purgamenta earum dicuntur, autore Plinio. Arnigrum id, quod in summa ea uisitur, Hilum uocatur: cui respondet in prouerbio apud Graecos Gry: etiam aliud significat, hoc est, unguis fordecular. Legumina Graeci Olsria, & Theophrastus Chedropa nominant. Aristophanes Belecchos, ut quidam interpretatur. Fabae genus quod Mariscum uocant, uere seritur. Faba cum suis corticibus elixa, Conchis appellabatur, ad discrimen fresa: nam Conchos aliud eluij genus est, ut in Hordeo monuimus. A Fabis, Fabaginem Cato dixit, & Plinius Fabalia. Interdictum esse Pythagoricum, cibo Fabam. Inualuit opinio contra uerum. Sicubi porro detestatos usum eius ueteres inuenias, non Cyamon, id est, Fabam in eo uerbo, sed Venerem intelligi demonstrat oportere Gelius. Tota Insubria & Liguria, recentes Fabae uenditium uoce nuncupantur Baianae. In Etruria & Latio, Scaphi. Vtrumque originem habet eruditam. Nam & Baianas, Apitius ipse appellat, & Scapos fabarum Plinius decimo octauo libro. Inuentus est inquit Scapus, cetum Fabis onustus, ut inde uulgo Scaphi, pro Scapis, tenuis in statilem diuerticulo uocentur.

αἰγυπτίος κύμαδος

D **A**egyptia Faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plerumque prouenit. In Asia etiam, Siciliaeque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine, florem roseum, dupla papaueris amplitudine. Et ubi flore exiit, fert folliculos oculis similes, in quibus Faba supra operculum bullae modo prominet. Cibotion ideo nominant, id est, arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebae mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quae cruda coctaue estur. Ei Colocasiae nomen est. Faba uirens manditur, & exiccata nigrescit. Graeci magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem. Dysentericis, coeliacisque prodest, in sparso polentae uice lometo. Datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si ternique inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectat, gustu amarum, si tritum et cum rosaceo coctum instilletur.

Theoph. li. 2.
de causis plantarum cap. 19.

B A R B A R I C O R O L L.
Faba Aegyptia, & Colocasia idem sunt, ut fructus tamen ipse Ciborium dicitur, radix uero Colocasia, & Mazizanon ab Aetio. Pocilli genus ab hac similitudine, Ciborium uocari scribit Athenaeus. Paludibus stagnisque nascitur. Caulis ei longissimus redditur, decem pedum a Strabone: uel ut Theophrastus & Plinius, cubitorum quaternum, digitali crassitudine, mollis & sine geniculis, rimae intus per totum, ut Lilio. Propter quod & Liliū Aegyptium ab Herodoto uocatur: quemadmodum & Lotus ipsa. Calyx in cacumine rotundus, uesperarum fauo similis. Triginta plurimum oculis: qui singulas singuli contineant, non quidem omnino reclusas, sed paulo extantes. Ipsi quoque calyces ags extant, latissimis circa folijs, quae singulas Fabas ob-

re uideantur. Magnitudo ijs, ad similitudinem eorū, quæ ut Plinius inquit, Personata in nostris fluminibus uocantur. Atterenti Fabas, amaritudo uel odore prodit. Radice crassissima, plenior est Harundinis, rimosa ut Scapus: q̄ & Araneosus sentiri dicitur, ubi coctus est, in mādendo, ait Plinius. Filis ad morsum ut in lana sequacib. autore poeta Martiali. Thyrsus uero inter folia emicat spectabilis, a Theophrasto, Pilos ut arbitrantur uocatus. Quæq̄ Theodorus Pilulas interpretatus id uidet. Alij calicē rotundū in eo uocabulo significari uoluerūt. Indigenæ implexis Colocaliæ folijs, in uariā speciem uasorum poritare granissimū habēt. Nascitur sponte, ac satur, quo mō & in Italia quoq̄. Non excoquit Syriæ, Ciliciæq̄, & in Trorone Chalcidis lacu ad maturitatem omnino peruenit, sed magnitudine deficitur. In India quoq̄ fluuiū Hydaspes cernit, Alexandro id falso in coniecturam trahente, nauigari posse in Aegyptū inde. Fructus q̄dem, ut dictum est, amarus, sed ipsa radix perq̄ lauta cibus. Seritur in limo paleato, ut descēdat, cōprehendatq̄: ob id Spirobolos quoq̄ dicitur. Vbi semel coaluit, durat ad infinitum. Refugiūt eā Crocodili spinis horrentem, caule ac radice: oculis timentes, quos hebetiores habēt. Nominatur & Taba quædam Indica, ex arboribus, in siliquis digitorum decem longitudine dependens, mel le plenius, sed quo gustato difficile sit euadere, ut inquit Aristobulus.

EX M. VERG. COMM.

Quod ex Aegyptia faba usum in Aegypto nostra ætate habet, radix sola est: quam coctā, sed in taleolas prius sectā incolæ quodidie comedunt, odore cotonei mali, i. lēbi, nobilitatq̄ cōmunem cibum. Nec minus tota Aegypto Colocalia nunc, seruat antiquo nomine, q̄ nobis Rapa nota sunt. Falsum est quod antiquiores omnes de ea tradiderunt, non nisi in aquis nasci: quoniam in arida, sed non procul a mari, & humido harenosoq̄ solo, etiam sata, & perse provenit. Licetq̄ nunc totos Colocalijs confitos agros, ut ferunt, supra Tripolim urbem ad mare, non inuocundo spectaculo uidere. Latissimis siquidem & numerosissimis folijs uirent, quibus solis æstum in calidissima regione etiam arcent.

De Lente. CAP. CXVII.

LENS SV O cibo aciem oculorum obtundit. Aegre concoquitur. Stomachum male habet: eumque, & intestina inflat. Sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi. Qua ex causa aluum cohibet, si detractio antea cortice discoquatur accurate, priusq̄ aqua inter coquendū effundat. Quippe primū id decoctum uentrem resoluit. Somnia tumultuosa excitat. Capiti, neruis, ac pulmōni inutilis. Melius suo fungetur munere contra alui fluctiones, addito cū aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisue, pyris thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, uel uuarum rhois, quæ obsonijs insparguntur. Verum acetum cum eo diligenter percoqui debet: alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari, proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat. Cruistas rumpit. Vlcera purgat. Decocta in aceto, duricias & strumas discutit. Cum cotoneo, aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq̄, addito rosaceo. Sed in amplo sinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle decoquitur. Nomis quæ in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ ferunt, igni sacro, pernionibusq̄, ut antea dictum est. Contra turgentes

C mammas, et usq; eo duras ut quandam cartilaginis speciem referant, cō-
sta in aqua maris & illita auxiliatur.

Pli. li. 18. ca. 12.

BARBARI COROLL.

Lens feracissima leguminum, siliquis in latitudinem molliter fufis. Melior quæ cōstibilia,
& quæ maxime aqua abforbet. Enecat Lentē herba Securigida, ut Plinius Aparina, siue Lap-
pa, ut Theophrastus. Nascitur & sua India Lens fenogræco similis, quam circa occasum uer-
giliarum demetunt. Differt hæc a nostrate omnino. Sed illatam cibo discerni posse negant ab
ignaris. Aegyptia Lens a Marone Ouidioq; laudatur. Pelusiaca ob id uocata. Græci Lentē Pha-
con, Lenticulā Phacen uocant: quo nomine & Vlixis soror fuisse tradit, ab alijs Callisio appel-
lata. A quibusdā non Phace, sed Phaceus: ut Orpheus, & Peleus uocata est Lenticula: sed n̄ per-
egrinitatis in comœdia coarguitur. Laudes Lenticulæ apud autores Græcos legas, præsertimq;
Pythagoristas: utiq; si rationē Zenonis sequare, præcipiētis, ut in eā Coniadrū. 12. parte indicat.

ἢ δὲ φακὴν ἡμετέρας ἀνδραγαθῶν κορίαντων.

Gel. li. 13. ca. 23

Congruūt & cū ea Bulbi. Ob id & Bolbophace dicta est a poeta quodam. Vnde sciūt illud or-
tum uidetur, contra perditos gulones, Lentem laudat, ut apud Phalereum Demetrium est. No-
tū & prouerbiū apud Varronē in satyra Menippæa, τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον, hoc est, unguentū in Lē-
ticula: ut obiter emaculemus inolitum, atq; adeo receptum in Aulo Gelio multis seculis ero-
rē, ubi τὸν ἐν τῇ φακῇ μύρον, pro eo quod est, ἐν φακῇ μύρον legitur. Et ne librarij mendum fuisse uide-
retur, Theodorus Gaza locū interpretatus est, fabulam in Lenticula, hoc nos Atheni uiri do-
ctissimi testimonio corrigendū monemus. Hoc adagiū, contra caco zelos, et apirocalos inuētū
est: quos, ut est apud Senecam, & eundem Gelium, Infrunitos appellamus, qui nullo discrimi-
ne rerum quas agunt, aut dicunt, habito, pari nixu, cuncta moluntur: & eadem ornamenta, si
guras, emblemata, conuenire omnibus locis et temporibus existimant. Cuiusmodi et illud est,
τὸ ἐν λαγάνοις πίπερι, hoc est, Piper in oleribus.



De Phasiolis. CAP. CXVIII.

φασιόλης

Phasioli inflant. Spiritus cient. Aegre coquuntur. Virides cibo al-
uum emolliunt, ad uomitiones idonei.

BARBARI COROLL.

D

DE Phasiolo in Cicere disserui. Habetur & genus herbae Phasiolus, ut post constabit. Græ-
ci pro legumine Phasiulon, & Phasiolon, & Phasilon quandoq; appellant. Nostri Phascolum,
& Phaselum. Columella.

EX M. VERG. COMM.

Dolichum, nescio an Theophrastus aliquando idem legumen hoc appellet. Piso enim ma-
gis q; Phaseolo congruunt quæ de Dolicho ab eo dicuntur. Verba eius lib. 8. de plantarum hi-
storia hæc sunt. ὁ δὲ δόλιχος ἐστὶν παρακαταπύλη τις εἶδος μακρὰ ἀγαθαίνει καὶ γίνεται ὑδρπιμὸς, ἢ δὲ καὶ
φασιόλης καὶ ἰσχυρὸς ὁ δόλιχος. Quod est, Dolichus uero, si prope longius lignum defixerit aliquis, ascen-
dit, fecundusq; fit: sin minus, deterior, & rubigine uitatur. Paulus tamen Aegineta primo uo-
lumine quo capite de leguminibus agit, de Phaseolo his uerbis usus est. ἢ δὲ φασιόλης καὶ δόλιχος
καλοῦμεν. quod est, Phaseli uero, qui & Dolichi nominantur. Magna utriusq; autoritas. Neq;
ego ausim pro re, quæ ad utramq; partem trahi potest, inter eos censere. Dolichon enim longū
græcis dicitur, quod Phaselorum siliquis magis competit: & Pisum per se stare nequit ideoq;
adiunctis sibi lignis, ut Theophrastus ait, nititur.

ἐρρούς

De Eruo. CAP. CXIX.

ERuum paruius frutex, omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, se-
mina in ualuulis habens, e quibus farina fit nomine Erulina, ad
multos medendi usus conueniens. Eruum capiti onerosum est. Aluum
esu turbat. Sanguinem per urinam extrahit. Elixo boues saginantur. Pa-
randæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana, candidaq; deliguntur, per-
miscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter cōbibant. Postea tor-
rentur, usq; dū hians cortex disrumpatnr. Molitaq; farinario cribro in-
cernuntur. Postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est. Vrinam ciet.

Meliorem colorē efficit. Sanguinē per uescam, aut aluū cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumat. Vlcerā cū melle purgat. Lentigines, & uitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat. Nomas, gangrēnas, duriciasq; serpere non patiūt. Mammārū duricias emollit. At ulcera, quæ theriomata uocāt, fauosq; emarginat. Carbunculos rumpit. Cum uino illitū, moribus uiperarū, canum, hominūq; medetur. Vrinæ difficultates, tenesmosq; ex aceto mitigat. Tabidis, qui alimentū non sentiunt, tostū, & in nucis magnitudinē melle collectū, conuenit. Eius decoctum pernioles, & pruritus in toto corpore sanat, fouendo.

BARBARI COROLL.

Eruū, Herbumue, aliud candidū, aliud rufum. In siliquis grana sine sepro habet, quæ se in uicē quali tangāt, ut in Pifo. Siliquæ forma terēs, & ad rōnē grani Cylindracea, ut itē Pifo. Partentissimū uertutis est atq; cicer. Genus est & Eruiia leguminis, quā nōnulli falso Durellā uulgo dictā interpretant; propterea, q̄ hodie quoq; in Vmbria uocant Eruiā agricolæ, q̄d in Gallia & Venetia prouincia Dorā, Durellāq; folio crasso & oblongo leontopodij, sed maiore; capitulis semē includētib; minutū, simile nasturtio, tantū exilius flore cādido. Scopas ex ea ruri faciūt. At Eruiia, syluestris herba ē, amaritudinis eximig, colorē & folio cicercule, q̄q; minore.

Pli. li. 18. ca. 15.

De Lupinis.

CAP. CXX.

Satius Lupinus notus est. Cuius farina cū melle delinctu, aut potu, uentris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, & cū sua amaritudine elitati eadē efficiunt. Decoctū eorum idē munus præstat, cū ruta & pipere potū. Quare lienosis prodest. Eodē ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangrēnas, incipientē scabiē, eruptiones pustularū, ulcera in capite manātia, uutiligines, maculasq; fouere utilissimū. Menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subditū in uellere. Borū farinā cutē liuoresq; corrigit. Inflammationes cum polēta & aqua mitigat. Tubercula, & coxendicū cruciatus, ex aceto lenit. Strumas in aceto cocta illitaq; dissipat. Carbunculos rumpit. Decocti coelesti aqua, donec in liquamētū crassiciem redigantur, faciem abstergunt. Medentur pecorū scabiē, cum radice nigri chamaeleontis, ita, ut tepente decocto abluantur. Cit urīnā radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatē faciunt. Gignunt & syluestres Lupini satius similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satui possunt.

Erysipor. Erysipor.

B

Erysipor. Erysipor.

BARBARI COROLL.

Lupino cura officit, quā alitē conditū in terra, diducit eam radice, & in summitate nititur. atq; ita germinat ceu per uim. Grana eius in siliquis discretā sepris. Viride nullum mandit animal. Diuturnius id tradunt Eruo, ac Cicere. Sabulum, & arenas, & omnino uitia terræ sequit, horretq; culta ex omnibus quæ eduntur. Sicco nulli minus ponderis, plus utilitatis. Mitescunt cinere, aut aqua calida. Circumagi Lupinum cum sole, tradunt pleriq;.

LUPINVS SYLVESTRIS.

Lupini syluestres per omnia minores inueniuntur satius, præterq; amaritudine.

De Rapo.

CAP. CXXI.

Decocta Rapi radix alit. Inflationem parit. Mollesq; spongiosasq; carnes creat. Venerem stimulat. Decocto podagræ, per-

777777

u. iij

Cnionesq; fouentur. Contritoq; Rapo, atq; imposito iuuantur. Si ex-
cauata radici rosaceum caratum adigatur, & feruenti cinere eliqueſcat,
exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti eſu, urinam ci-
unt. Semen antidotis & theriacis, præſertim quæ ſenſum doloris auſe-
runt, Anodyna uocant, idoneum eſt. Potum contra uenena ſalutare
eſt. Venerem concitat. Muria conditum, minus alimenti ſufficit. Sed
multo magis appetentiam recreat. Sylueſtre Rapum in aruiſ nāſcitur,
fruticoſum, in cubiti altitudinem aſurgens, ramoſum, læue. In cacumine
folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in ſiliquis calic-
culatis. Cumq; pulpæ aperiuntur, alia intus ſiliqua ſpectatur, quæ quan-
dam capituli ſpeciem præbet. In qua ſemina paruula concipiuntur, foris
nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cuti-
tem in facie, totoq; corpore utimur, præſertim quæ ex lupini, aut erui,
tritici, aut lolij farina fieri ſolent.

Theophr. lib.
7. cap. 4.
Pli. li. 15. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.
Rapa, quaſi Ruapa, ut inquit Varro, tellure accumulata conditur ab olitoribus, ut inſe-
quentem annum regerminet. Semen includitur ſiliqua. Vtrunq; ſexum in hoc quoq; genere in-
telligunt, ex eodem ſemine prouenientem, ut ſcribit Theophrastus. Quæ uideretur Athenæo,
marem a Theophrasto nihil aliud intelligi, q̃ Napum Buniada. Effeminari collocatæ rariuſ
dicunt, maſculeſcere denſius compoſitæ. Laudatur ſemen eius tenue. Seritur ſemine, poſt trans
fertur. Dulceſcit algoribus: per quos & in radicem, non in folia incrementum capeſcit. In Italia
Nurſina præferuntur a Columella, Pollux, & Athenæuſ e Mantinea maxime commendant.
D Gongylen, & Gongylida Græci uocant, quemadmodum & noſtri Rapum, atq; Rapam. Nam
Rapina ut Napina, & Cepina dicitur: & Rapitium, ut Auitium, Piſcitium. Cato coles Rapiti-
os uocauit alio loco, Rapa biennio ſata conuertuntur in Napos, alio Napuſ Raporum natura
accipit. Gongyliorum uocabulo Hippocrates globos puſillos quaſi pilulas, & cataporia ſigni-
ficat Galeno: ipſos autem paſtillos, ſiue orbiculos, quibus in medicina utimur, Dactylios ap-
pellat: quod & officina modo ſeruant. Rapas Lacedæmonioſ Gaſteras uocare Apollas tradi-
dit. Sed Nicæder colophoniuſ Gaſteras a Boëtis Braſſicas intelligi: Rapas uero Zacetidas ap-
pellari uoluit. Ameriaſ, & Timachideſ non Rapas, ſed cucurbitas ita dici arbitrantur. Sunt e
Græciſ qui Rhaphyn eſſe dicant Napum Buniada: licet Glauciuſ non Rhaphyn, ſed Rapyn uo-
cet: unde apud noſ Rapo nomen uideri poteſt manāſſe.

Pli. li. 18. ca. 19.

R A P V M S Y L V E S T R E.
Sylueſtris Rapa longior, in ſpeciemq; Raphani, caule breui, ſemine intus candido, duplo ma-
iore q̃ papaueriſ. Haſ in Dalmatia frequentes ſponte naſci, Poſſidoniuſ eſt auctoꝝ.

E X M. V E R G. C O M M.
Communem latinis græcam Gongylem, non Rapum, ſed uocem fecit in carmine ſuo Co-
lumella, cum peractiſ Vulcanaliſ cecinit: Nube noua ſeri coeli impendentibuſ undiſ Gong-
gylin, illuſtri mittit quam Nurſia campo. Nec peregrinitatem uocis uerituſ latinuſ homo eſt
tam grata omnibuſ erant omnia, quæ ab ea gente in doctriſ audirentur. Cumq; in ſecunda
græcorum declinatione, & in quinta nomen id in græciſ inueniatur, ex quinta elegit ſecunda,
ſcilicet hoc quod Dioſcorideſ ait, ſunt qui Gongylida, nulla ſignificatiōiſ diuerſitate. Niſi quiſ
forte diminutiua forma Gongylida, a Gongyle factum id nomen dixerit. Quacunq; autē for-
ma dixerit aliquiſ eadem ſignificatione, ſemper indicabit quod rotundum ſit: qua figura ubiq;
plærunq; naſcuntur Rapa. Græciſ enim γόγγυλον γόγγυλον, id eſt, rotundum ſignificat. Quod
deinde hic ait, minus nutrire in cibo Rapa quæ in muria ſeruatur, ex antiqua ſalgamorum con-
ſuetudine rationem habet: quoruſ cum eſſet quotidianuſ uſuſ, docere Dioſcorideſ uoluit, mu-
rata aliquantiſper natura, minorem ex conditura uim in nutriendo Rapa habere. Quomodo
autē condirentur, & condita ſeruarentur, Columella. 12. uolumine capite quinquageſimo ter-
tio ſatiſ docuit. Poterūt uolenteſ ex eo ſcriptoꝝ omnia facile nouiſſe, Quos obiter monemus,

Quærendum medicæ materiæ studiosis esse, quas nam hic dicat in sylvestris Rapi siliquis capitum speciem & figuram. Quale enim id sit, non satis constat.

C De Buniade Napo. CAP. CXXII.
Octa Buniadis Napi radix inflat. Modicum alit. Semen eius potum uenenorum uires hebetat. Antidotis ammiscetur. Conditur sale radix.

B A R B A R I C O R O L L.
Naporum in medicina quoque Græci fastigia duo seruant. Angulosi foliorum caulibus florentis, quod Bunion uocant, dicendum inferius. Alterum genus Buniada appellant, de qua hic agitur. Amiterinam Buniada maxime sunt qui probent. Græci Thebaicam. Officinæ modo ignorant Buniada, & sylvestris Rapi semine Buniadis uice utuntur. Quæque facile cognosci poterat. Est enim sylvestri Rapo semen & nigrum & maius, quæ Buniadis.

E X M. V E R G. C O M M.
Rapis congenere Napi sunt, quibus locis nascuntur, omnibus cogniti, & a cunctis rei rusticæ scriptoribus longissime descripti. Eorum plura a Theophrasto, Plinio, aliisque genera numerantur. Columella in his etiam græca uoce in eodem carmine usus ait, Quæque Amiterinis defertur Buniis aruis. Eodemque loco de conditura eorum a Rapis statim certam rationem monstrauit.

C De Radice. CAP. CXXIII.
Raphanus latine Radix dicitur. Excalfacit. Flatus gignit. Ori suauis est, sed stomacho aduersatur. Ructus ciēt. Vrinam pellit. Alio aptior. Summo tamen cibo sumi debet, quo magis eius distributio nem adiuuet. Cum autem presumitur, cibum subleuat. Quare uomituris commodissime datur ante cibum. Sensuum aciem excitat. Decocta contra ueterem tussim, & pituitæ crassiciem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius uomitiones mouet. Hydropicis commodissime illinitur. Lienosis utilis. Sugillata cum melle tollit. Contra uiperarum ictus auxiliatur. Alopecias ad pilum reducit. Lentigines cum loliacea farina emendat. His qui fungis strangulantur, tam cibo quam potu salutaris est. Semen uomitiones facit. Vrinam mouet. Menses cit. Lienem extenuat. Cum aceto potum gangrenas ualidissime emarginat. Coctum cum aceto mulso, anginis perque utiliter gargarizatur. Contra cerastis morsus, potum ex uino auxilio est. Sylvestris Raphanus, quam Romani Armoraciam uocant, alij montanum Raphanum, alij Apium, alij Iscada, alij Chamæbalanum, Romani etiam Radicem sylvestrem, ramulos tenues iunceaos duos siue tres spargit, rubentes, folijs rutæ sylvestris, oblongioribus, & angustioribus, semine paruo, radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radice superior uomitione. bilem pituitamque extrahit, inferior per aluum. Tota fuscæ decoque purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernatat succus pinna eximitur. Is fescuibolo potus, utraq; parte purgat.

B A R B A R I C O R O L L.
Radix, quam ut Varro inquit Raphanon, & Raphanida, & Crambidion Græci nominant, caudice uno assurgit fere arboreo, ut in Ruta quoque cernitur: proinde hoc genus olerum Den-

C drosachana cognominant, hoc est, ut Theodoro placet Oleriarbores. Die tertio a saturo profilit, radice terra adoperta, Rapi modo. Sequenti anno germinat, tellure abiecta. Semen in flitiquis. Genera, Bæotium rotundum & dulce. Liothalion, quod alij Thracium uocant, patenti-
tissimum hyemis. Cleonæon, in longitudinem porrigitur. Corinthium, amplissimum detecta
stirpe nascitur. Quo folium leuius, eo suauior atq; mitior est Raphanus. Dulcescit ut Rapum
frigoribus. Traditur genus unum eruca folio. Pulices appellantur bestiolæ Raphanis in na-
scentes. Raphanorum radices lignescere Theophrastus est auctor. Hæ, ut inquit Palladius, for-
minini generis existimantur, quæ minus acres sunt, & habent folia latiora, leuiora, & iocunde
uirentia. Raphanum, ut brassicam, uiribus inimicū esse constat, ut si circum se seratur, diffu-
giant. Genus ei unum est, quod ab Herodoto uocatur Symæa. In Aegypto cum cepis & allio
pyramidibus condendis præberi solitum, Iulius Pollux auctor. Confirmant id & Diodorus,
& Plinius, qui scribunt ad id opus in Raphanum cepas & allium talenta mille octingenta ero-
gata. Vt mirer Laurentium Vallam, apium, uertisse pro Raphano. Sunt & Græcis qui Syme-
am apud Iones genus oleris apio similis accipiant. Itemq; pro edulio ex adipe, atq; melle. Sed
Symeam legi malo, q̃ Syneam. Vtq; hinc fortasse ferculum nuptiale uulgo Symiam cor-
rupte pro Symæa dixerit, ex amygdalis, & pulpa gallinacea, & saccharo. Nam Hippocrates
Symeam, siue Symæam, pro succi quodam genere, seu passum, seu defrutum id sit, intelligi
uolebat, cum præciperet, quid in uino odorato, Symæaue fumendum esset. In compositi-
onibus quibusdam Pauli & Aetij Bacanum inuenio commemorari. Nec quid ea res sit compe-
rio, præterq̃ in quodam glossemate, ubi semen, siue nucleum, siue mucronem Raphani Ba-
canum esse legebatur. Bacanum Aetius iocinori prodesse in cibo, utiq; parti eius uisceris
incuruæ prædicat.

A G R I O R A P H A N O S.

Agrioraphanos, ab Raphano agria differt auctoribus: ut aliud sit syluestris Raphanus, a-
liud Raphanus syluestris: quemadmodum leuca canthe, ab acantha leuce distat, id est, alba spi-
na, a spina alba. In quo tamen honestius puto nominibus Græcis uti, q̃ Latinis. De Agriora-
phano, & hic, & libro quarto paucis immutatis agitur. Apion, & Ischada nominando. Nec
D Theodorum probō, caricam, atq; pirum interpretantem. Falsum est & quod scribit, inter spi-
nas esse, quam pirum uocant. Non enim hoc in Theophrasto, quem uertit, legitur. Fesellit ho-
minem, q̃ auctor ille de Orchi herba scribit, similem ei caulem esse apio, sed spinosum. Proin-
de Plinius, caule inquit spinoso est Orchis. Paulus Chamæraphanon quoq; dici hanc existi-
mat, quæ Apios, siue Agrioraphanos uocetur. Radicem habet cepæ, sed ampliorem, uel ut
Theophrastus inquit, asphodeli, uerum squammosam. Nascitur in montosis & asperis, ali-
quando & herbosis. Effoditur uere.

De Syluestri Raphano.

C A P. CXXIII.

ῥαφανὶς ἀγρία

Syluestris Raphani, quam Romani Armoraciam uocant, folia sa-
turo similia, & quadamtenus Lampsanam imitantur. Radix gra-
cilis, tenera, subacris. Tam folium q̃ radix in olera recipitur. Excalfac-
cit. Vrinam concitat, æstuosus.

B A R B A R I C O R O L L.

Raphanos agria, id est, Radicula syluestris, & quæ Cheria, & in Ponto Arnon, & ab aliqui-
bus Leuce, a nostris Armoracia uulgo dicitur, fronde copiosiore q̃ corpore. Laudatissima na-
scitur Arcadiæ. Seritur in Italia, & Armoraciam uocant satiuam, ut inquit Plinius.

De Sisaro.

C A P. CXXV.

σισαρον

Sisarum uulgo cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stoma-
cho utilis. Vrinam ciet. Et appetentiam inuitat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 5.

Sisler Græci Sisaron appellant. Duorum generum est, Satiuum, & Erraticum. Inest longitu-
dine Sisleri neruius ut pastinacæ: qui decoctus extrahitur, magna tamen parte amaritudinis re-
lictæ: quæ multo in cibis temperata, etiam uertitur in gratiam. Nobilitauit hoc princeps Ti-
berius, flagitando a Germania omnibus annis ex Gelduba castello, quod impositum Rheno
est, ubi generositas præcipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Non prætereundum,
quod tradunt, ideo utilem stomacho uideri cibum, quoniam nemo tres Sisleres edendo con-

tinuaret. Sisaram Varro, Plinius Sisarum appellat herbam, cuius flore uescantur apes: ut in Eryce disputatum est.

EX M. VERG. COMM.

Inter olera quorum radix tantum in usu est Siser antiquis fuit, nec quæsitam in eo nisi radice crassitudinem Plinius, & Columella indicauerunt. Siquidem alter, n. rei rusticæ suæ libro de satione eius agens, iubet pastinato, stercoreatoq; loco, & præ rarissime ponenda esse pastinacam, Siser, & inulam, ut maiora capiant incrementa: Alter naturalis historię libro. 19. e Germania maxime laudauit: quoniam egregiæ generositatis, & amplissimæ magnitudinis, in frigidissima regione nasceretur. Seri hoc non semine, sed bulbis ueteres dixerunt: qui ut in lilio, inula, & auro sit, a reliqua radice auulsi, ad nouam sobolem in hortis disponuntur. Fecerunt in hoc genere ueteres etiam satium, & erraticum: quemadmodum & in pastinaca, cui congener esse creditur, si cuncta a ueteribus de eo tradita diligentius obseruentur. Poterant dici & alia, sed quæ ab alijs tradita sunt, sine desyderio a nobis relinquuntur.

De Lapatho, & Rumicæ.

CAP. CXXVI.

Ex generibus Lapathi, Oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi in palustribus nascens. Aliud est satium, illi dissimile. Tertium syluestre, paruum, plantagini proximū, humile & tenerum. Quartum genus est, quod alij Oxalida, alij Anaxyrida, aut Lapathon uocant, syluestri ac exiguo Rumici simile, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olerè aliud emollitur. Crudi illitu, melicerides temporis tractu discutuntur. Syluestris & Oxilapathi, & eius quam Oxalida nominant, semen ex aqua, aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues perfricant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur, aut in solijs balneum confricetur. Coctæ in uino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem mulcēt. Strumas, parotidasq; discutunt. Lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicem gestaminè utuntur, eas collo appendentes. Tritæ & inditæ, sceminarum profluuiâ sistunt. Cum uino autem potæ, regio morbo medentur. Calculos uescicæ comminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur.

BARBARI COROLL.

Lapathum, nostri Rumicem fere appellant. Radice altissima, & inter olera maxime singula: nec enim lateribus crassiores alias emittit, sed prætenues. Multicaule hoc olus, ac ramosum, & cum perfecte adoleuit, figura betæ proximū, corpus carnosum & madidum: eoq; uel exemptum terræ diu recens. Viuacissimum præ cæteris oleribus est Lapathum, præsertim satium. Differt hoc a syluestri, q; sesquipedalis satiuo radix, breuior syluestri: gustus tamen gratior syluestri, sed acrior, ut omnia syluestria satiuo collata. Syluestre Lapathum, Aetius Centrodies, a pungendo cognominauit, radicem ei sublongam tradens, Raphano paræ similem. Quæ porro Lapathum a nostris Rumex dicitur, proprie tamen Rumex est, quem Oxalida, & Oxylapathum Græci nominant, satiuo similem, folijs aquosiss, colore betæ candido, radice minus esse, q; Oxalida, siue Rumicem existimant. Lapathos Democritus pro uenaticis scrobibus accepisse dicitur. Theocritus Alapathon uocauit, ab effectu, quoniam exinaniat. Et enim Arcti Alapatha, quæ nos inaritiones dicimus, appellant.

A

λάρπαθον
ὀξύλαπαθον

ὀξάλιδα
ἀναξυρίδα

B

Pl. II. 10. ca. 22.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C **Q**Uæ a principio capitis huius frequens uox auditur, ἐξ ὑπέρου, & quæ ab his composita sunt, ὑπεράπαιον, & ἕραλις, in quibus anceps ad acetum, & quæ acuminata sunt significatio est, causam antiquis interpretibus, & latinis medicis dedit, ut omne Rumicis genus uno acetosa nomine indicarent: quod scilicet ἐξ Græci acetum dicunt. Cum tamen quartum Rumicis tantum genus acido sapore sit, ideoque ἕραλις dicta fuerit: qua uoce uinum quod acorem contraxit, & acelcentem fecem, Græci etiam appellant. Cætera uero omnia ab acuta foliorum marginis minusue cuspidē ὑπεράπαιον, & ὑποὑπεράπαιον dicta fuerint. Quod forte miretur aliquis, si nesciat late in græcis patere significationem τοῦ ὄφιος, id est, eius quod illi acutum dicunt: nec tantum indicari ea uoce quæ in cuspidem, aut mucronem desinunt, sed quæ celeri motu etiam transeunt, & subito efficacique sensu sentiuntur: quoniam quemadmodum illa cuspidē mucroneque suo quod primū penetrant, eodem modo & hæc festinata & efficaci actione potestatem suā exercent. Sic Homerus gladium acutum sæpenumero dixit. Pindarus uero acutam niuem, non eodem quo gladius modo acutam, sed gelu, sensuque suo in humanum corpus penetralem. Qua uoce Lucræti, & Maro felicissime in frigore uli fuerunt. Eadem ratione Hippocrates etiam καίρος ἐστὶν, id est, occasionem non acutam, sed citissime transeuntem, & præcipientem dixit. Ob hanc ipsam causam acetū etiam ἕρος a Græcis dictum est, quod acore suo altius, efficacissimeque in hominis sensum penetret, nec sine doloris aliquo sensu sentiatur. Fuit itaque in Rumicum nominibus antiquis græcis hæc ratio, ut una eademque uoce in alijs acidus significaretur sapor, in alijs acuminata foliorum cuspidē. Ideoque nos in quibus acidus sapor sit, ea descriptione uli sumus, quæ id indicaret. In quibus autem acuminata essent folia, aliquid iudem adiecimus, quo ea significaretur species. Quodque hic in quarto genere ait, non oxalida ab acido sapore tantum, sed anaxyrida etiam dici, a foliorum figura acceptum est.

De Hippolapatho.

C A P. CXXVII.

ἵππολάπαθον

HYppolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Easdem habet uires quas supradicta Rumicis genera.

D **H**Yppolapathum maius satiuo, candidiusque, ac spissius. Adiecere nonnulli Bulapathon, radicis tantum altitudine differens. Sunt qui & Hydrolapathum tradunt, in aqua natum.

De Lampfana.

CXXVIII.

λαμφάνη

LAMPfana, quod Romani Napium uocant, syluestre olus est. Plus alit quæ Rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesque comquantur in cibo.

Pli. li. 20. ca. 9.

LAPsanam Græci uocant Lampfanem, Cyma est, siue Brassica syluestris, pedali altitudine, foliorum trium: quæ hirsuta ei sunt, Napo simillima, nisi candidior esset flore. Hinc a latinis uocari Napium existimo: in quo tamen Dioscoridem auctorem solum habeo. Lampfanam diuili carminibus, præcipue iocis militaribus celebratam, ait Plinius. Alternis quippe uersibus exprobrauere, Lampfana se uixisse apud Dyrrhachium, præmiorum parsimoniam cauillantes. Atiam puto herbam fuisse, qua cum lacte uictitauit exercitus. Cara nomine, ut alibi notabimus. Nam radice utebantur eius, non folio, ut ait Hirtius.

E X M. V E R G. C O M M.

Hæc est Lampfana illa, qua Plinius ait ad Dyrrhachium, uixisse Cæsarianos milites, eamque in triumpho Imperatori suo iocularibus carminibus exprobrasse: Vulgare olus, & in Brassicarum genere. Eam præcepit Columella prope aluaria ferendam esse: quoniam copiosam ex ea ceram apes colligant: Vulgaremque dixit, quoniam ubique fere nascitur, folijs non dissimilibus Brassicæ, & ut nos uidimus, utrinque trinis.

De Bunio, Napi genere.

C A P. CXXIX.

βουνιον ακτινον
ανιμος φερρος
παράλακρυ

BUNion aliqui Actinam uocant, alij Anemosphoron, magi Paradachry, Aegyptij Erxonem, Romani Scopā regiā, Aphri Zigar, aut Tēpso. Caulē emittit quadrangulū, & in eo foliosos ramulos, tenues,

preuenuibus foliis et flosculis scatentes, longitudine digitali, folia ppter radicē, Apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitentur. Flores anethi, semen odorati, minus Hyoscyamo. Excalfacit Bunion. Vrinā ciet. Secūdas detrahit. Lienī, renibus, & uesicæ utile. Eo humēti aridoue utunt, exēpto radice & caulib. succo, ex aqua mulla.

BARBARI COROLL.

Bunio, hoc est quod nostri Napum uocant, ut in Buniade meminimus. Quancūq; Dioscorides Scopam regiam uocari Romæ scribat. Cæterum alia quoq; Scopæ regia est, ut in Siderite constabit. De qua porro Scopæ regia loquatur Plinius uigesimo primo libro, non leuior inquit odor ei, quam Scopam regiam uocant, quancūq; folia eius oleant, non flores, existimandū relinquo. Paulus Aegineta Buniō, a nonnullis Arction appellari scribit. Galenus Arcticonē. De Buniō eadem a Dioscoride libro quarto, quæ hic legebantur detraximus, quia inutiliter repetita esse uidebantur.

De Blitō. CAP. CXXX.

Blito Aegyptij Echlotripā appellāt, alij Riplā. Romani Blitū, Daci Bles. Olus est aluo utile, nullius in medicina momenti.

BARBARI COROLL.

Blitum, siue Blitus (Græci etiam Bleton) erumpit ocyslime, semen ut Betæ, corticeum, copiosum, racemosumq; ut Atriplici. Radice non una, crassa, in rectum tendente, ut Betæ, & Lathyrion, & maxima pars olerum, sed continuo, multiplici, ac proluxa. Inspidum, & sine acrimonia. Vnde conuiciū foeminis apud Menandrum faciunt mariti. Blitum duplex ostenditur, rubens, & candidum. Apud Aristophanem quoq; Blitomamæ, pro stolidis accipiuntur; quos Plautus noster Bliteos appellat in Truculentis.

Blitea inquit, & lutea est meretrix. Etiam si corrupte legitur Blittera. Hippocrates Bubleton quoq; nominat herbæ genus: modo mendum in uerbo non sit. Scio enim & Bolbiton pro fimo bubulo, & Bolbiton pro quodam polyporum genere minuto capi ab Hippocrate, ut Galenus testatum reliquit. Sed & Onobolion herba, linguæ similis, Hippocrati, contra foeminarum profluvia in uellere apponitur.

EX M. VERG. COMM.

Maledicebatur quondā hominum ingraui ex hoc olerē, & in accusanda ridendaue alicuius foecordia & inutilitate, despectiorem Blito uulgus appellabat: tam nullum in morbis, aut sanitate usum habet. Edendo herbam esse Blitum, Paulus Aegineta in sexto ait, humereq; in secundo ordine et frigere. Palladius in Martio mense, his uerbis de naturā rationeq; eius tradidit. Hoc mense Blitus feritur, solo qualicumq; sed culto. Olus hoc neq; runcādum, neq; sarculandum est. Cum semel natum fuerit, ipsum se per multa secula seminis sui deiectione reparabit, ut etiam si uelis uix possit aboleri. Paulus itidem Aegineta, præter paulo ante dicta, in primo inter olera Blitum numerauit, coniunxitq; Atriplici: nec quicq; de utraq; aliud dixit, q̄ humidū esse, uentrem deicere, & parce nutrire.

De Malua. CAP. CXXXI.

Malua, aut horrensiam Pythagoras Antema uocauit, Zoroastres Diadema, Aegyptij Cochorrem, Magi Lieneim capræ, aut muris Vrinam. Satiua esui longe aptior syluestri. Stomacho aduersatur. Aluum iuuat, sed multo magis caules. Interaneis & uesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, ægylopas ex melle sanant. Verum cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem utēdum est. Contra aculeatos apium uespærumque ictus, illita efficax est. Eadem cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcerā manantia in capite, furesq; cum urina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tri-

A

Blitov

Pli. li. 20. cā. 23
Theoph. lib. 7
cap. 1. 2. 3.

B

μαλὰχὴ ἀνθὺς

Craque, utilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulvas in fessione mollit. Prodest erosionibus uesicæ, & intestinorum, uulvæ, sedisq; clistere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si continuo a bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morbus remedio est. Lac euocat. Semen in uino potum, addito Loti syluestris semine, uesicæ cruciatus lenit.

Pli. li. 20. ca. 21
Theo. li. 9. c. 19

B A R B A R I C O R O L L.

MAlua culturæ opera, intra sextum, septimumq; mensem grandescit in arborem, hastant, baculorumq; usu in Arabia, Mauritania quoq; Lixi oppido æstuario, ad Hesperidū hortos, & iuxta delubrum Herculis. Duo genera earum summa; quæ amplitudine folij discernuntur. Maiorem Græci Malachen uocant in satuiis. Alteram ab emolliendo uentre dictam putant Malachen e syluestribus, cui grande folium, & radices candidæ, Athæa nominatur. Est & quæ uniculis nascitur, Monocaulos ex factio cognominata. Omne solum in quo feruntur Maluæ, pinguius faciunt. De Althæa, quæ item Dendromalache, siue Anadendromalache dicitur, & libellus, uolumine tertio differitur. Est & Alcea huius fere generis seorsum indicanda.

ατρίπλις
χρυσολάχανον

De Atriplice. CAP. CXXXII.

Atraphaxin aliqui Chrysolachanon uocant, Romani Atriplicæ, Aegyptij Ochi. Cognitum olus est. Duo eius genera. Syluestre, & Satium. Coctū est ut olus. Aluū mollit. Panos discutit, siue crudū, siue coctum illinatur. Semē cū aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

Pli. li. 20. ca. 20

B A R B A R I C O R O L L.

Atriplex, octauo die a satui, Octobri mense prouenit. Radix ei una descendit in altitudinē, unde fibræ alix promantur, ut in Beta. Foliatum habet semen, & obductum cortice, numerosum, racematimq; singulis ramis insidens. Atriplex & syluestre est, & satium: accusatum a Pythagora, tanq; faceret hydropicos, morbosq; regios, & pallorem. Coquitur difficillime, ac ne in hortis quidem iuxta eum nasci quicq; nisi languidum, culpauit. Addidere alij plurimas aegritudines ex eo gigni, nec nisi aqua sæpius mutata eo quēdum. In Italia difficulter id nascitur. Syluestri capillos tingebant. Atriplex ueteres, nō Atriplicē uocasse perhibent: ab ægyco nomine potius, q; ab atriore, ut a birtor. Hippoc. etiā Adraphaxin appellat: post Anaphaxin dixere Atticis, d, literam in, t, mutare amantibus: ut facit Aristor. qui entelechiam, pro entelechia usurpauit, ut Lucianus autor est. Quibus porro Atriplex idē uidet esse cum eo genere qd Spinacia uulgo dicimus, & Græci recentiores Spanachia, fallunt apertissime. Si quē porro uocabulum id parum delectat, Atriplex Hispaniensis nominetur. Et Hercule fieri potest. ut inde profectum sit ad nos olus, icinijs aptissimum, nec ueteribus (ut coniectio ac demiror) comperit.

E X. M. V E R G. C O M M.

Iocatus ex hoc olere quondam in fabula quæ Equites inscribitur, græcorum omnium comitorum lepidissimus Aristophanes, est, falsi Atriplicis olere, ab oratoribus Athenienses impleri in condone dicens: compositosq; ex olere, & mendaciō nomine, quæ sitam in pōpulo uulgari ratione gratiam, & credulæ plæbis irritam honorum spem simul deridens: non aliam ob causam, q; quia uulgare hoc olus est, nullamq; habet maiorem utilitatem: qualia hominum mendacia sunt, ubiq; omnibus in promptu parataq; & inutiliter plerimq; euadentia: quod olus hoc etiam habet in tertio refrigerandi ordine, per aluuiū celerrime descendens. Quæ tota species fortuna est: siquidem in ancipiti posita, quantumuis leui pulsu & strepitu tota perit & euolat. Sationem Anaphaxis docuit Columella libro. 12. his uerbis. Cherephilum, itemq; olus Atriplicis, quod græci uocant ατρίπλις, circa calendas octobres obrui oportet, non frigidissimo loco. Nam si regio sæuas habet hyemes, post idus februarias semine differenda sunt, suaq; se de partienda. Papauer, & Anethum eandem habent conditionem sationis quam Cherephilum, & Anaphaxis. Cur autem Chrysolachanon etiam, id est, aureum olus quondam diceretur, facilem habet coniecturam: quoniam luthæo flore sit, ideoq; ab auro nomen inuenit.

De Brassica. CAP. CXXXIII.

CRamben Romani Brassicam uocant. Ea aluo est idonea, si modo leuiter feruefacta edatur. Nam percocta aluum sistit. Sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem male habet. Acrior est æstiuæ. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, et tremulis esse, prodest. Summo cibo sumpta, crapulam discutit, & uini noxam restinguit. Melior stomacho Cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam ualidior. Ea condita, stomacho inimica est. Aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. Cum uino quoque epotus, uiperarum moribus auxiliatur. Cum feno græci farina, podagris & articulorum uitij illinitur. Prodest & sordidis ulceribus, & uetustis, illitus. Caput purgat naribus infusus. Menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque. Epinyctidas, ignem sacrum, lepræque sanant. Carbunculos ex sale rumpunt. Fluentes capillos retinet. Cocta, addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrænasque ualent. Lienosique, ex aceto cruda profunt. Mansa deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post concupitionem in pello subditus, partus spem adimit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum, tineas repellit. In antidota celiacorum additur. Faciei cutem, lentiginisque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diurnos laterum dolores mitigant.

BARBARI COROLL.

Bassicam, antiqua Græcia, non Ramben, sed Raphanon appellabat: quod & Aristoteles, ut Iulius Pollux inquit, et Theophrastus fere sequitur. Crambe quasi Coramble dicta existimatur: quæ pupulas oculorum, quas Græci Coras uocant, hebetet, autore Columella. Sed & ipsi quoque Attici Corambem dicunt eam. Dederit hoc locum prouerbio fortasse, repetitâ Brassicam, nedum nocere, etiam occidere. Græci tostam carnem Crambaleam uocant, Athenæus autor. Brassica, ut Varro inquit, dicta quasi passica, quæ ex scapo minutatim præficatur, & passica fiat. Die a saturo decimo se ostendit Brassica. Digeritur a Theophrasto in genera maxime tria. Syluestris, cui folium æquabile, paruum, rotundum, multiplex: ramosa, succo aspo, medicato, ad detractones per aluum præcipuo. Secundum Crispæ: quæ & amplitudine folij, & bonitate succi præfert omnibus. Tertium Leuis appellatur. Nonnulli addidere Quartum, cui semen deterrimum, aut omnino nullum. Cato quoque tria facit discrimina. Vnam extetis & grandibus folijs, caule magno: propterea Cauloden uocatam, aliquando Septembrinâ, ab alijs Eleada. Alterâ crispâ folio, Selinada nominatam, a similitudine foliorum Apij: quâ & Apiam cognominant, alij Clitaculâ. Tertiam proprie appellatam Crambem, minutis caulibus, folijs tenuioribus, & simplicibus, densissimisque, sed amariorem, leuiorē, tenerā, quæ ob id & Lenis dicatur. Sed de syluestri Brassica suo loco agemus. Athenæus tria inquit Brassicæ sunt fastigia. Primum Halmyris: quâ & Liophyllos, a foliorum leuore dictum, ubique nascens. Tertium Selenussa, folio crispo, et Apij similitudine, a qua & nomen habet. Hæc naturæ, illa gæneæ distinctio. Tritiana magnitudine ac sapore præcipua, cui pedale aliquando caput. Dein Cumana sessilis folio, capite patula: mox Aricina, altitudine non excellens, folio numerosior quæ tenuior, cuius sub omnibus pene folijs fruticat cauliculus peculiaris. Ideoque utilissimum genus existimat. Pompeianæ, in oppido Capaniæ. Pompeijs præceris caulibus, ab radice gracili, inura folia crassescens, Rariora hæc, angustioraque, sed teneri

A

красица

B

Theo. li. 7. c. 4.
Pli. li. 20. ca. 9.
Cato de re rustica, ca. 156. 157

x ij

Ctas in dote, frigora non tolerat. Sabellicę usq; in admirationem crispa sunt folia: quorū crassitudo ipsum caulem extenuat, sed dulcissima perhibentur ex omnibus. Non pridem ante Colu-
mellam subiere Lacutres, a loco dicti, quo lacus Turni, siue ut Plinius scribit, lacus Turonis
fuerit, conuallē Aricina, capite prægrandes, folio innumero. Alij in orbem porrecti. Alij in la-
titudinem torosi. Nec plus ullis capitis post Tritianos, et Cyma nullis serior. Hoc genus quidā
interpretant qd mō Capitios coles, & in Hispania Murrianos uocāt, Brutiani, frigidioribus alunt,
grandes folijs, caule tenues, sapore acuti. Addunt ijs Silirenses, Tiburtini, Stabiani, Parthene-
pę, q sunt hirsuti. Vesuuii, q sunt amari, nō sine suauitate. Marrucini, rubent paucis folijs. Si-
gnini breuiiores, crassiores, lapidiores Cappadoce folijs, caule pene nullo, frequentibus tunicis,
& contra frigus muniti, priusq; in florem exeant, ut uix prima folia discernantur hyeme. Cul-
tūq; generi pruinę plurimū suauitas conferunt. Suauissima ex omnibus est Cymā. Est autē Cy-
ma qdā ipsorū caulium, delicatior teneriorq; cauliculus, quem a prima sectione, proximo uere
præstant, Græci Cyema, quasi partū eius uocant. Nos & Cymas, & Cymata uocamus: nec in
Brassica mō, sed in Raphano, & alijs cōpluribus: q̄q; absolute Cyma, nō nisi de Brassicę fructu
capit. Palladius Quymā uocat, et semel opere in toto Plinius. Post Cymā æstiuū, autumnale
q; cauliculi, mox hybernū, tū deinde iterum Cymę, nullo æque genere multifero, donec sua fer-
tilitate cōsumatur. Omnibus oleribus anteponit Catō Brassicā: p̄pterea, ut inquit Varro, nō-
mine oleris Brassica intelligitur. Vites ad Brassicā assitę diffugiunt, introsumq; in fundum se
declinant: quo argumentō usus Androcydes, cōtra ebrietatem ualere Brassicam dixit. Tāc est
inter plantas quoq; discordia. Hinc Nestor in eo libro, qui Alexicepos inscribitur, olus hoc ex
lachrymis Lycurgi, a Libero patrē uitibus adalligati, natum prodidit. Brassicę decoctę aqua,
nihil æque fetet humi effusa, crustę si occupent intus uasa calidaria, in tantum, ut nō sit eas
auellere: si Brassica in ijs decocta fuerit, abscedūt: Coles capitatos, uulgaris sermo, Scapitos ap-
pellat, antiqui Lacutres, et Tritianōs, ut cōiñcio. Ex semine uetusto Brassicę nasci aiunt Ra-
pam, & contra ex Raporum Brassicam. Nobilitauit Brassicam Iohā, per eām iurando, quasi p
aliquem Deorum: ut Zeno Citeius stoicę familię caput, per Capparin, Socratis credo amula-
tione deierantis per canem. Ob id & mantin, ceu uatem quandam ab Hipponasie Brassicam
tuocari, testis est Athenæus: qui & puerperis in Attica regione amuleti cuiusdam loco Brassicā
apponi solitam commemorat. Nomen oleris commune quidem est quibuscumq; Lachanum
apud Græcos, priuatim tamen Brassicę tribuitur. Ab olla dictum Olu, testis est Varro: uiceo
uideatur poeta Veronenis alludere cum cecinit, non olera Olla capit. In quo sciamus obiter,
non pro uase in eo uersu capi Ollam, sed nomen esse uiri proprium, quod ignorātes fere gram-
matici, delyrant: Quemadmodum & in eiusdem poetę uerbo, Mentula.

E X M. V E R G. C O M M.

Autor omnibus, ut credimus, post se Theophrastus fuit, ut Brassicę, quę edendo est, præ-
cipuam diuisionem triplicem faceret: nec aliter, si conferatur ueterum latinorum cum eo in
hac parte cōmentaria, rem diligenter intuentibus uidebitur. Nihil enim octauo de plantis li-
bro, de olera hoc ab eo dictum, non iisdem uerbis, Romana breuitate a Marco Catone rustica
rum rerum capite centesimo & quinquagesimo septimo redditum est: & post Catonē a Plinio
naturalis historię. 19. cap. 7. Quę ideo non repetuntur a nobis: quoniam quę tria a Diosco-
ride numerantur hoc loco Brassicę genera, satiuę, agrestis, & marinę, aliam diuisionis rationē
habent. Siquidem illę ex ruris, hortorumq; disciplina, & ad usum sanitatis in pascenda familia
ab autoribus illis traditę fuerunt: hęc diuersis locis nascentes, ad medicinam docentur. Opor-
tet itaq; in priore illa Brassica, & quam satiuam hic dixit, tria illa Theophrasti, Catonis, & Pl-
nii genera collegisse. Omnium enim pares uires sunt. Tum agrestem, & marinam illis adijcere
sponte sua, alijsq; locis, & ad medicinam tantum nascentes, & quę non aliunde q̄ ex similitudi-
ne aliqua in familiam & nomen Brassicarum uenerunt: quales plantę alię multę, deficientibus
proprijs appellationibus, quibus indicarentur, gentiū adoptione, nomen, & dignitatem inue-
nerunt. Vidimus nos marinam Brassicam, nihil præter florem simile satiuę habentē, eadem si-
gura quā a Diosco. describitur, tenuissimis, & in longitudinem porrectis folijs, qualia in Salice
sunt, pediculis pendentibus, & in longis ramulis per interualla binis deinceps dispositis. Hanc
in antiquissimis gręcorum codicibus a Romanis legimus marinum Codiculum uocari. Agre-
stem Plinius Erraticam etiam nominat, cōmuni syluestribus cunctis appellatione. Quę enim
gręci ἄγρια dicūt, erratica plerūq; latini appellauerūt. Non relinquendum illud etiā, qd ad grę-
corū in hoc olera appellationes pertinet: quam posteriores in ea gente Cramben dixerunt, an-
tigores Raphanum dixisse. Testatur id Theophrastus libro de plantis octauo, qui non alio q̄

Raphani nomine p Crābe utit. Verba eius sunt. τὸ δὲ ραφάνον τριχὺ διακρουμένον, &c. Nec multo post, ἢ δὲ ῥαφανὸς ἔχει. Itemq; lib. 2. de causis plātarū. καθάπερ ἢ ἔμπλεος τῷ τῷ δάφνι καὶ τῷ τῷ ραφάνον. Quæ oīa nō de Raphano, quæ Radicula nūc est, sed de Crābe, quā Brassicā nostrī nomināt, ab eo dicta fuerunt. Idem, & longe certius Aristoteles lib. 5. de animalīū historia, q̄ loco de erucis in Brassicis nascētibus his agit uerbis. αἱ δὲ γίνονται ἐν τοῖς φύλλων τοῦ χλωρῶν καὶ μαλιστα ἐν τῷ ραφάνον ἢν καλοῦσι τινὲς κράμβην. Qd̄ est. Nascunt et aliq̄ ex uiridibus folijs, p̄sertimq; in Raphano, quā Crambē aliq̄. i. Brassicā nomināt. Actum de tota hac re lōgius a nobis est, ut intelligent legentes, quanto periculo huiuscemodi docent, nisi res prius q̄ uoces cognouerit aliq; & scirent, qui medicinam profitentur, posse aliq̄ fieri, ut Raphanū, p Brassica in antiquis simis græcorum scriptoribus inueniant, qualis Hippocrates est: oportereq; in ea uoce, non Radiculam quæ nunc græcis & latinis Raphanus dicitur, sed Brassicæ olus intelligi.

Syluestris Brassica, quam Romani Rusticā appellant, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur. Satiuæ similis, sed candidior, hispidiorq; amara. Cuius Cyma i lixiuio cocta ori nō insuauis. Folia illitu uulnera conglutinant. Et inflammationest, umoresq; discutunt.

BARBARI COROLL.

Brassicam syluestrem, Græci medicantes Ceram quoq; nominant; nos Erraticam. Quanc̄ sciendum, Ceram genus Raphani a Plinio acceptū, non Brassicæ. Hanc aliq̄ Petræam uocāt, in micillimam uitis. Sunt qui Calem syluaticum appellant. Syluestris laudes inēso plus prædicat Caro q̄ satiuæ. Folia syluestri leuiā, rotunda, parua, & ut Plinius inquit, bina, sed densissīma, & plurima, plantis oleris similior. Inter syluestres Brassicas & Lapsana est, ut diximus: itē Sandix, & lallione, & Enthuficon, siue ut aliq̄ codices, Anthriscōn. De Petræa Theophrastus, si modo hæc est quam supra diximus, circa Psophidem nasci scribit optimā, numerosamq;. Aliubi non Petræam, sed Petræum uocauit. Alioquin & Capparis Petræa quandoq; dicitur. Nā Petrophytes Aizoum est, ut Empetron Saxifraga.

Marina Brassica a satiuā prorsus abhorret, q̄ folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia. Singula a ramulis rubentibus exeunt, singulari ut Hedera stilo. Habet lacteum succum, sed paucum, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui compage. Hærbā in totum stomacho inimica, acris. Vehementissime aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur, propter acrimoniam, cum pingui carne.

Bassicæ marinæ cauliculos quidam Halmyrida uocari putant, quoniam nisi in maritimis non proueniat. Nauigationē quoq; longinqua, uiridibus asseruatis ad transferendum, Plinius hanc marinum Olus, est ubi appellat, recentiores græci Thalassocramben.

Beta duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticulo, ut uentrem sistat. Quod magis radice eius præstatur. Candida alio utilis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxi succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat. Aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorū, furfures, lentescq; deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis folijs uirilgines nitro antea perfrietas, alopeciarū inanitates, atq; depascentia ulcera, illi n̄ prodest. Eruptionibus papularū, igni sacro, ambustisq; cocta medet.

Beta culturæ quadam ratione incrementum capescit arboris. Seritur circa mensem maium,

A

κράμβη ἀγρία

Theo. lib. 7. capite. 4. 5.

B

κράμβη θαλάσσια

βέτα

Pli. li. 19. ca. 8.

C sicut omnia, quæ græci uocant Epispōra: quod genus etiam sementis primæ nomen habet: etiam si alio quoque sata mense proueniant. Ideoque Beta æstate, sexto die nascitur, hyeme decimo. Peculiare in Beta est, ut non continuo singula semina producat, sed anno interim sequenti, sepe tertio. Radix Betæ unica, longa, recta, carnosa, gustu iucunda, & nonnullis grata cibo uel cruda. E lateribus aliæ item crassæ, modo singulæ, modo binæ, ternæque funduntur. E quibus si bræ coherentes alligant: Cortex neque crassus, neque Raphani modo extricabilis: sed Olusatro ad quendam modum similis. Semen integitur cortice. Folio Beta uiret, pede candicat, figurâ, h, literæ cum deprimitur, ab olitoribus refert, unde nomen. Beta horrentiorum leuissima est. Græci præferunt ex Alsra ubique candidam, parcellissimi seminis, appellantes Siculam. Nostri Betæ græa faciunt, uernū, & autumnale: quæque & iunio & ianuario feratur. Medici Betam innoxentiorē, quæ olus esse indicauere, ut inquit Diphilus. Quamobrem apposititas, non nemini degustare etiā religio erat, utque ualidis potius in cibis essent. Gemina huic natura, & oleris, & capite ipso exlicis bulbi. Neque alij horrentium latitudo tanta, ut in lactucis, cum coeperit colore trahere, imposito leui pondere, in binos pedes aliquando se pandendo. In Circiensis agro amplissime pueniunt. Vini sapor in dolio corrumpitur Brassica, sed odore Betæ folijs demerlis restituit. De alia porro Beta, proprie syluestri dicemus in Limonio. Græci Betā modo Seutlos, seu modo Teutlos uocant. Hippocrates Tetylon (ut arbitror) nisi corruptus locus est in eo libro, quod de mulierum natura inscribitur. Aliud uidetur genus esse Teutlis, ut Athenæus inquit, ex Diphili comici sententia. Nam duo fuere Diphili: medicus, qui & Siphnius cognominatur: & comicus. Hic imperitum quendam in comœdia describit, taxans quod Teutlon Teutlida nominaret. Eudemus quam or Betæ facit genera. uulfile, furculosum, populare, candidum. Betam græci, ouillum Corium uocant: unde Bætylus is lapis appellatus est, quem pro Ioue Saturnus uorasse fingitur. Monstratur & saxum hoc nomine, ad lutiopolin in Syria, proxime Libanum montem. Est & autem la, quæ uocatur Betylus, olim dicta Detylus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quotquot hætenus de Beta notissimo omnibus olere, aut in historia, aut medicina aliquid tradiderunt, omnes duo genera eius fecerunt, colore alterum ab altero distinguentes. Theophrastus lib. 9. *ἡνυχλότιρον δὲ καὶ τὰν τυτλὸν τὸ λευκὸν τοῦ μίλανος, καὶ εὐλαμπιμώτερον καλοῦσι τινὲς σικλικόν*. Quod est. Meliore autem succi copia in Betis candida quæ nigra est: pauciore etiam semine, quam Sicelicam aliqui uocant. Plinius. 19. uolumine a Theophrasto accepta eadem, his reddidit uerbis. Eius quoque a colore duo genera græci fecere, nigram, & candidam, quam præferunt, parcellissimi seminis: appellantque Siculam. Paulus Aegineta etiam in sexto, candidam nigræ anteposuit. Athenæus præterea in tertio Diphilosophistæ, candidam nigræ prætulit: quod simul aluum mollit, & stomacho accommodata est: quod non facit nigra, quæ adstringendi uim habet. Et ne longiores simus, nullus non de Beta agens, discrimen eius oleris ostendit, quibus cognita in frequentiore usu esset: & is non quod ad colorem pertineret, sed quod ad uires, bonitatemque succi, & exiguum seminis copiam. Solus Columella, quod hætenus legerim, in carmine suo facilem coloris huius in Beta cognitionem indicauit, dicens. Sic & humo pingui, ferratæ cuspidis ictu. Deprimatur folio uiridis pede candida Beta. pedem candidum, radicem appellans, quæ facilis cognitu, nota omnibus cum feretur & uelleur erit. Quæ enim nigra radice erit, agrestis Beta habebitur: ideoque in uetustioribus & melioribus aliquot græcis, a principio huius capitis legitur, non ut Barbarus uertit *τυτλὸν μίλα*, quod grande significat, sed una tantum mutata litera, *μίλαν καὶ ἄγριον*, quod nigrum indicat & syluestre. Hæc enim candidæ comparata, agrestis a græcis habebitur: non quam Plinius uicesimo libro cap. 8. Limonion, aut Neuroides a quibusdam uocari ait. De qua hic ipse scriptor libro quarto folia Betæ similia habere tantum dicit.

ἀνδρογάθη ἄγρια

De Portulaca syluestri. CAP. CXXXVII.
Syluestris Portulaca, quam aliqui Aizoon syluestre uocant, alij Telephion, Romani Illecebram, aliqui Portulacam, Aphrimœmœon, Daci Lax, Aegyptij Mochmutim. Folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsutis, latoribus. Nascitur in petrosis. Nonnunquam in hortis. Folia Oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex uir-

na radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum par-
uunt, uiscosi, & aliquantum falsi. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans.
Discutit strumas, cum axungia illita.

B A R B A R I C O R O L L.
Andrachne sylvestris, de qua hic agit, genus est Aizoi, ut quarto uolumine constabit, ubi
Dioscorides hanc herbam fere iisdem uerbis demonstrat. Nascitur breuiore cacumine, q̃ mi-
nus Aizoum: quod in muris, parietinisq̃ prouenit: cui & similis ostenditur. Colligi hanc & ci-
bi causa constat. Habentur & alia duo genera sylvestris Andrachnes, hoc est, Portulacæ nomi-
ne, ut in Telephio, & Pepli diximus. Telephion in Theocrito, sunt qui folium papaueris accipi-
ant, ad explorandū amorem crepitu adhiberi solitū, qui lusus fere puellaris erat, ut inquit Pol-
lux, etiam nū ex Lilio. Non defunt qui sui generis herbā intelligant, succo seminis sanguineo,
folijs Loffi satius, siliqua Pampini modo intorta. Alij miscellam quandā esse putant Telephion,
quæ corporis partibus imposita, si cutis rubescat, indicium amoris esse, ob id Philtron quoq̃ di-
ci: si accendatur, & exulceretur, odij. Ego Telephion Theocriti eādem esse cum ea de qua hic
agitur existimo, quippe cui excafactoria & ulceratoria uis insit.

A

Pli. li. 25. ca. 17.

De Portulaca.

CAP. CXXXVIII.

Portulacæ uis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus or-
culorum, cæterisque, cum polenta imponitur. Ardoribus stom-
chi, sacro igni, uesicæ doloribus auxilio est. Commanducata, dentium
stupores sedat. Stomachi & intestinorū æstuationem, fluctionesq̃ mul-
cet. Renes & uesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant. Veneris impe-
tus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febris ualens. Con-
tra teretes uentris tineas, cruentam excreationem, dysenteriam, hamor-
rhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est. Item cōtra sepsis mor-
fus. Ocularibus medicamentis utilissime commiscetur. Interaneis flucti-
one laborantibus, atq̃ uuluarum erosionibus infunditur. Contra dolo-
res, quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur. Eruptiones
papularum in capite, cum uino emendat. Vulneribus quæ ad syderati-
onem spectant, ex polenta illinitur.

ἀνδράχνη

B

B A R B A R I C O R O L L.
Portulaca exit post Cucurbitam, Ianuario mense, ut Theophrastus inquit, feritur. Hippo-
crates Portulacam fluuiatilem dicendo, uideur recentem, & non inueteratam intelligere. Flu-
uiatilis inquit Portulaca refrigerat, inueterata excafacit, atq̃ purgat.

Theoph. li. 7.

De Asparagis.

CAP. CXXXIX.

Asparagvs, quem aliqui Petreon, alij Myacantham, alij
Myon uocant, uulgo notus est. Huius cauliculi in cibo, uen-
trem emolliunt. Urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficul-
tatem, regium morbum, renum uitia, & coxendicum cruciatus, in potu
proficit. Cum uino autem phalangiorum moribus auxiliatur. Si deco-
cti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen ad eādem
ualet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriūtur. Asparagum etiam
nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atq̃ defossis. Quod, q̃tum
equidem sentio, plane a ueritate abhorret. Is tamen Asparagus multis ra-
mis fructicat, folijs feniculi, numerosis, radice rotunda, grandi, tuber ha-
bente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant.

ἀσπαράγος

C Assus autem, coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq̃, ac dysenterias, mitigat. Radix cum uino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Cum ficis, aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat. Coxendicis cruciatus, stranguriamq̃ leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctū, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Pli. li. 19. ca. 9.

ASPARAGUS, uel ab asperitate, ut inquit Varro, uel quoniam ita Græci nominēt, Aspharagos a Theophrasto dicitur. Ipsum quoq̃ guttur a quibusdam Aspharagus uocatur. Ab Apione tamen grāmatico, non Aspharagus, sed Spharagus. Corrudā nostri appellant hanc herbam. Spinosi sunt Asparagi ex toto fere, ut scorpius, unde Scorpiones quoq̃ a Columella fortasse nominātur: quamq̃ Asparagus cognomēto Scorpius, siue Scorpio aliud genus est, ut in Scorpio de herba disputabitur. Post æquinoctium autumnī flos exit & quodam folliculo secundum aculeos. Asparagā uero Theophrastus pro planta ipsa uidetur accepisse, aut etiā pro loco, ubi satus est Asparagus: eodem etymo fere quo apud nos Cepina, Rapinaq̃. Theodorus Corrudagine quasi aliud q̃ Corroda genus interpretatur. Cato certe ad eundem modum Corrudam, quo Cepinam & Rapinā accipit. In arundinetis inquit Corrudā serito, unde fiant Asparagi. Exit uere caulis cibo idoneus: tum scabrescit, & processu in florem abit: qui nō ex ipso tantum, sed ex prioribus erumpit. Non enim caulem habet annuū. Hæc ueteres, qui Altilis Asparagos non uidentur nouisse. Corrudam Attici, non Horminion (aliud enim est) sed Orminion, & Ormenon potius, aliqui Libycum Asparagū dixere, utiq̃ syluestrem qui post inuētos Altilis, proprie Corroda est. Corrudæ iterū species duæ, candoris solo discrimine. Candidior efficacior uis tribuitur. Iulius Pollux syluestrem Asparagidā scribit uocari: satiuū, Ormenon. Serunt spongijs hortenses Asparagi. Ita em Radiculæ Altiliū uocantur. Vellitur præterq̃ primo anno radicitus, alioquin decerpitis stirpes præfractæ angunt, & quasi excæcāt oculos spongiarū, nec patiuntur Asparagū mitti: spongiæ post quadragesimū diem inter se implicantur, & quasi unitatem faciunt: post annos aliquot transferunt fertilitate in decenniū durante. Seruntur & seminibus paxillo dimissis. Viret thyrsos, siue stilo primū emicante: qui caulem educens, tempore ipso quo fastigatus est, in thoros struitur. Nullum ijs gratius solum q̃ Rauennæ fuit, quæ gloria in hodiernū quoq̃ mansit ei terræ. Nomen porro Asparagi generale est: ut Betæ, Bilio, Lactuæ, Atriplici, Maluæ, Rapo, Sinapi, Radiculæ, Pyrethro, Brassicæ, Nasturtio, Bryonia, Lauragini, ut in omnibus ijs alia res Asparagus, alia frutex sit. Errant qui Corrudā pro eo capiunt, quæ medicorum officinæ Lupulum cognomināt: folijs aperitissime redamantibus, quæ in Corroda capillamentū modo tenuata, in Lupulo Bryoniæ similia, paulo asperiuscula. Caulis ei spinis horret, cacuminibus tamē, & Corrudæ modo in torulos turbinatis. Flores habet foliaceos & candidos, qui fere allium, uinūq̃ subolent. Hanc Græci uulgo Bryton uocant, a Bryoniæ ut puto similitudine. Brusculam, quasi bryon scansile, rura dicunt. Aut hæc oino, aut non absimilis huic herba est, quæ occidentis populi Ceruisiam suā maceratis humore floribus cōmendant, sapore quodā uini. Habiolam, siue Habillam Gallicæ uocantes, Humulū, & Tholophin Germani. Ego Lupum salictariū a Plinio dictam censeo. subit enim, scanditq̃: salices, & arbuta omnia, circūuoluendo se complectitur. In Flaminia quoq̃ Lupus reptitius uulgaris nomine uocatur hodie. Herbarū inquit sponte nascentiū, quibus utimur in cibis, in Italia paucissimas nouimus, Fraga, Tanum, Ruscum, Batin marinam. Batin hortensianā, quam aliqui Asparagum uocant Gallicū: præter has Pastinacā pratensem, Lupum salictariū: eaq̃ uerius oblectamenta q̃ cibos. Habetur & aliud quoddā genus, ut idem Plinius testatur, in cultus Asparago, mitius Corroda, passim etiā in montibus nascens, refertis superioris Germaniæ campis. Nam quod in Nefide Campaniæ insula sponte inquit oritur, optimū existimatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Vix credat aliquis, q̃ multa in notissimo olera toto hoc capite mutata, corrupta, & addita fuerint, quæ nouisse legentes inutile penitus non fuerit. Estq̃ illud ante omnia sciendum, deagrestis Asparago omnia hæc a Dioscoride dici. Ideoq̃ a principio statim Petrus, id est, in petrosus nascens dictus est: ut eā additione ab Altili, quem in hortis consitum, solæ nouerunt diuitum mensæ, discerneretur. Nec tantū Petrus illic legitur, sed in aliquot græcis ἄγριος, id est, agrestis etiā inuenitur. Indicantq̃ id manifeste quæ sequuntur appellationes, Myacantha, & Orminion, quæ omnes in agresti Asparago a Plinio numerantur. Habetq̃ Myacantha caulissimam &

originem nominis ex Rusci appellationibus; ut in eo indicabimus. Orminton autem a nobis dictum est, quod myon in impressis codicibus legebatur, nulla significatione; instauratusque locus Plinij, & aliorum auctoritate merito a nobis est.

De Plantagine.

CAP. CXL.

ARnoglōsson, alij Arnion uocant, alij Probatō, alij Cynoglōsson, alij Heptapleuron, alij Polyneuron, Magi Eurechnemona, Aegyptij Asonth, Romani Plantaginem, Hispani Thesaricam, Poeni Atjrcon. Duo eius genera. Minor, folia habet angustiora, minor, molliora, lauiora, & tenuiora, caule anguloso, in terra sessili, floribus pallidis, semine summis caulibus emicante. Altera maior & uirentior, latis constans folijs, olerum generis. Cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, sububer, a medio ad uerticem tenui semine circumdatus. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo utilior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, constringentem. Quare omnibus malignis ulceribus, & fluctioni opportunis, atque elephantiacis, sordidisque illita profunt. Profluuii sanguinis, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasque cohibent. Vetera ulcera, & inæqualia cicatrice obducunt. Chironia sanant. Sinus conglutinant. Morfibus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægylopijs illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, coeliacisque sumptum subuenit. Datur & in locum Betæ, cum lenticula coctum. In leucophlecmatia, inter aridas epulas herba decocta datur. Comitialibus, & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat. Cum cimolia, aut cerusa, igni sacro medetur. Fistulis infusus prodest. Lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert. Clystere dysentericis infunditur. Contra tabem datur in potu. Ad uersus strangulationes uulvæ, in uellere subijcitur, etiam si uulua fluctuatione laboret. Semen ex uino potum, alui fluctiones & sanguinis excretaiones sistit. Decocta radix, & manducata, & collutione dentium dolores sedat. Eadem cum folijs, ulceribus reitum, & uesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari, & quatuor quaternis. Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis utantur. Syri ius Plantaginis & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos uires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, ueneris die. Hoc autem ueluti arcanum accipito, quod ueraci experientia compertum est.

BARBARI COROLL.

Plantago herba, Stelephuros, & Ortyx a Theophrasto dicitur, a Plinio Selapyros, & Ortygia. Coturnix a Theodoro uertitur, a Dacis Simpeax, alij Thyericem, alij Theucaricon

A

ἀρνόγλωσσος
ἄρνειον
κυνόγλωσσος
πολύνηυρον
ἰππία πλευρον

B

Pli. li. 27. ca. 2.

C appellant, a nostris quādoq; Septineruia. Quamq; Heptaneuron alia uidetur herba q; Plantago, id quod ex emplastro quodam aduersus collectiones, cui nomen est Botanicon, aperte liquet: quippe in quod tres quærantur herbae: Plantago ternis uncis, heptaneuron senis, leoneuron quoq; ternis. Nec quæ sit Leoneuron intelligo. Flosculus ei lanugineus, ut frumentor; partuculatum erumpens, ut aphaca, & intubum. Inter spicatas est Plantago, sed minor, nigrioribus folijs, & linguæ pecorū simillimis, unde nomen apud Græcos Arnoglossio: maior folijs laterū modo includitur: quæ quia septem sunt, Heptapleuron nonnulli uocauerunt. Caulis angulatus, & similis Napi, Arnoglosson, & Arnoglossa dicitur, a Græcis Plantago.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ a Dioscoride numerantur tam multæ Plantaginis appellationes, una tantū uoce a Plinio colliguntur. Siquidem 25. uolumine capite. s. linguæ pecorum similia Plantaginis folia esse dicens, Romana breuitate complexus omnia est: quæ in legentium gratiā explicanda modo a nobis sunt. Arnoglossos itaq; a Græcis Plantago dicta est, q; agnitiue linguæ folia eius speciem habent, ἄρνιον enim agnum, γλώσσαι uero linguam ea gens appellat. Eandem habet rationem & caussam ἄρνιον, quasi adiectiua forma agninā herbam dicas. πρὸς αὐτὸν itidem ab oue, quasi ouillam, πρὸς αὐτὸν enim græcis otis est. κυνὸς γλώσσα, id est, canina lingua, non quia quæ uere Cynoglossa dicitur Plantago sit, sed non dissimili foliorum figura. Videturq; appellatione hac minor potius, q; maior Plantago significari, quæ caninæ linguæ similior q; maior est. Dico autem Caninā linguam herbam sic appellatam, de qua in quarto agendum erit. Heptapleuros eadem, & Polyneuros ex eadem caussa, iisdem notis dicta est. πλυνρὸς enim Græci costas dicunt. Et quoniam septem crassioribus fibris, quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sint, ideo nomen id inuenit. Nec minus a multitudine earundem fibrarū, quas neruos etiā uocant, Polyneuron. Factumq; postremū hoc nomen ex eo est, quoniam non semper septem, sed aliquando quinque tantū his fibris distincta est. Eamq; ob caussam, quoniam non semper responderet numerus, aliqui incertā relinquentes rem, Polyneuron, quasi multiter uē dixerunt. Tam enim quinque q; septem multa sunt. Variant autē Plantaginis fibræ pro latitudine folij: quod enim latissimū fuerit septem, quod angustius, quinque plerūq; habet.

D

σίον ἀναγallis
χίνοσ ἀροματική

De Lauere, seu Sio.

C A P. CXL.

Sion, quod in aquis est, aliqui aquatilem Anagallida, alij Darenion, alij Lauer, alij Schinon Aromaticum uocant. In aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, Holusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu calculos rumpunt, atq; excernunt. Virinas cient. Menfes & partus extrahūt. Dysentericis in cibo auxiliantur. De Sio Crateias tradit herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora q; Mentæ, nigra, & ad Erucam accedentia.

Pli. li. 26. ca. 8.

Sium latius Apio est, nigrius, pinguius, copiosum semine. Sion ἡ ὄσλα a Græcis uocatur, hoc est, Sium in aquis, siue aquaticū. Hoc multi uulgo Cresionē dici rentur falso, promiscuū & acetariū olus, & refrigerantis naturæ. At Sium calfacientis est, & odoratū. Sunt qui Lauer Plinio uocatū, in riuis proueniens, utile torminibus coctum & conditū, & ad calculos uescicæ crudum pro Sio capiant. Nam & Dioscorides hoc loco Sium ait a Romanis Lauer dici, etiā si Lauer de scriptū est. Sunt qui herbā, quæ ab eodem Plinio Silaus dicat, in glareosis & riuis nascēte, Apij similitudine, uescicis perinde laudatā, pro Sio & Cresionibus intelligant. Ego in castigatione Pliniana uerbū illud Silaus, adulterinū arbitratus sum, nec Silaus, sed Lauer scribendum. Hoc autē Lauer, ipse pro Cresionibus accipio, nō pro Sio, qd odoratū est, ut cōmonui.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est ut uidetur dubitandum, quo loco nascatur Sium: quale autem sit, Anagallis indicabit: ob cuius similitudinem aquatica Anagallis a quibusdam dictum est: indicabit ob eandem causam & odoratus Iuncus. De quorū altero actum in primo uolumine est, de altera non multo post in hoc ipso agetur. Idem hoc Sion a Romanis Lauer dici, hic ipse scriptor testatur. Meminit autē Laueris Plinius, ut credimus, lib. 26. non tamen idem Laueri in eo Sion esse: quoniam de Sio. 22. uolumine eiusdem numeri capite longius egerat: dixeratq; latius Apio esse, in aquis nasci, pluraq; alia, quæ poterunt in eo uolentes certius expendere. Nos illud tantum mo

nemus, Lauer dici Sion ob natalium similitudinem, quoniam ambobus uita in aquis sit. Quid autem Lauer Plinio dicatur, non difficile erit rem diligenter in eo contemplantibus intellexisse. Describit enim, in aquis nascentem uulgarem herbam, qua rura fere omnia cum aceto in cibis utantur. Sunt qui credant hanc esse, quam uulgius Cresiones appellat. Quod nos ut non negamus, sic etiam non confirmamus. Quod autem testatur est, non esse Sion quod Lauer. Id enim auctore Dioscoride odoratum est, Lauer nullo odore commendatur. Qualecunque autem Sion sit, non adeo dissimile Apio describitur. Nec est quod miretur aliquis, nostra ætate tantarum rerum incertitudinem: cum nec quondam florentem Græcorum fortuna, Sium, ut paulo ante monstraui mus, a professoribus cognosceretur. Ostendunt nostræ ætatis herbarij, dissimilem huic penitus quam illi Sion uocant, Feniculi folijs, altiore crassioreque caule, grandi in summo umbella: nisi confertior sit feniculo, non dissimili colore, in cunctis albicante.

De Sisymbrio.

CAP. CXLII.

SISYMBRION, alij Serpillum utocant, alij Veneris Coronam. Romani Veneream, aut Eusteralem. In solo inculto nascitur, Mentæ hortenlis similitudine, odoratus, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi uim habet. Contra stillicidia urinæ, calculosque semen ex uino bibitur. Tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. Item contra uespærum, apiumque ictus. Vomitiones potu cohibet.

BARBARI COROLL.

Sisymbrium, siue ut recentiores Græci, Cimbium, degenerat in Nepitam aspectu, sed odore in Mentam, ut Theophrastus existimat. Latissimum nascitur circa piscinas, & stagna, & in putreorum parietibus. Foliū in sicco nascenti angustius, quod in riguis prouenit: de quo mox agetur. Sisymbrio montes plerique scitent, sicut Thracia: ubi & Serpyllum, aut aquæ deserunt ex his auulso ramis, feruntque. Item Sycione ex suis montibus, & Athenis Hymetto, Sisymbrium folio tantum coronat.

EX M. VERG. COMM.

Sisymbrium ut odore in Mentam, figura in Nepitam degeneret, præcipuam a culturæ negligentia causam habet. Nisi enim assidua cultura coercetur, & translatione nouos ueluti naturales quot annis accipiat, in varias plantas quæprimū diuersa sui parte degenerat. Testantur id rei rusticæ, & plantarum historiam tradentes scriptores omnes, Theophrastusque præsertim: qui nullibi de naturæ mutationibus his egit, ut non Sisymbrij in Mentam, degenerantis exemplum usus sit: causamque mutationis eius in quinto de plantarum causis longius prosecutus est: docens fieri, ut cum Sisymbrium non excoluerit olitor, nec propriam illi & necessariam culturam reddiderit, alius radices agat, actisque in alio omne illud nutrimentum conuertat, eoque destitutas superiores partes infirmiores fieri, & odoris acrimoniam amittere: eaque amissa, reliqui corporis odorem infirmum, languidumque, & Mentæ similem fieri. Eamque ob causam, ne id patat, transferri sæpius Sisymbrium in disciplina ruris & hortorum præcipitur. Serpilli figuræ & speciem aliquam Sisymbrium habet: ideo a quibusdam, ut hic ait, Serpillum etiam uocatum est. Quemadmodum in similibus fieri solet. Plinius Serpillum ait syluestrem Sisymbrium a quibusdam dici. Facit id negligentia, & rerum ignorantia: cogitque, commutatis ob similitudinem inuicem nominibus, diuersa rerum genera, graui periculo miscere. Veneris coronam, & herbam Veneream, ob odoris suauitatem, uerisimile est dictum quondam fuisse Sisymbrium. Amorū enim Dea: amoribus aptas tantum sibi exigit herbas, quibus coronata in comestationibus suis iuuentus, suauiore odoris oblectatis Sisymbrij appellationibus dicta satis sunt. Quæ deinde in altero & Sij modo in aquosis nascente a Dioscoride numeratæ fuerunt, ab eodem etiam declarantur. Ideo enim Cardamine facta a Nasturcio nomine, dictum quondam Sisymbrium hoc fuit, quod simile Nasturcio in gustu & sapore sit. Tantaque est Sisymbrij huius quod Cardaminæ dicunt, ad Sium similitudo, ut Paulus Aegineta in sexto retulerit, dicere quosdam, Cardaminæ hanc Sium esse. Nasci hoc ipsdem locis quibus & Sium, a Dioscoride tantum dicit, in aquosis, scilicet. Idem genus Plinius etiam descri-

A

Theophr. lib.

6. cap. 7.

B

C pisse his uerbis uidetur. Lætissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. Cum tamē hic aliter tradiderit, non circa, sed in aquis eodem quo Sium modo nasci. Non possunt abundantibus rebus, deficientibusq; nominibus priuam, seorsumq; omnia citari. Generatim necesse est uocari, describiq; multa, unamq; hanc ob causam medica ubiq; materia tam parum certa est, tamq; in antiquis etiam scriptoribus multiplex, & uaria. Nos quod possumus præstamus, immensi operis huius aliquam post nos alijs partem relinquentes.

De altero Sisymbrio.

CAP. CXLIII.

καρδαμίνη

Alterum Sisymbrij genus, quod aliqui Cardaminam, alij Sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis quibus Sion prouenit. Quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, q̄ gustu Cardamū, id est, Nasturciū representet. Folia primū rotunda prodeunt, adulta Erucae modo findunt. Id exalfacit. Vrinæ mouet, Crudū estur. Purgat lentiginēs, cutisq; uitia in facie, noctibus impositū, matutinisq; detractū.

S BARBARI COROLL. Si Symbrium syluestre a quibusdam Thymbræum appellatum, pedali, nō amplius altitudinis conspicitur. Huic cognomen est Cardamine, ut Galeno placet, atq; Dioscoridi.

De Crithmo.

CAP. CXLIII.

κρίθμον
κρίταμον

CRITHMUM, seu potius ut aliqui Critamon, fruticosa herbulæ est, cubiti altitudinem petens. Nascitur in maritimis, & petrosiss, folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, uelut Portulacæ, crassioribus, & longioribus, salso gustu. Flores candidi sunt, & semen ceu Rorismarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. Habet intus semen rufum, radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta uino, potu urinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur. Menses cient. Estur crudum coctumue in olere. Seruatur etiam in muria.

Pli. li. 21. ca. 27.

C BARBARI COROLL. Rethmon, Batis latine dicitur: q̄q̄ Batis duplex, marina, & hortensiana: quā aliqui Asparagum uocāt gallicum. Liguria Baticulam hodie quoq; appellat. Caulis ei palmū altus Plinio, cubitalis Dioscoridi. Semen feruens, nucleo interiore, qui ut in Rosmarino Cachrys uocetur. De marina potius q̄ de hortensiana, siue quod idem est, satia loquitur Plinius, quotiens Batim, & olus Chordum a Columella dictam inuenio. Hanc quia serotinum fit olus, quo modo & Fœnum Chordum, pro eo quod secundariū est, & augusto mense uellitur, autumnaleq; uocatur. Sed & pecus Chordum, & Chordū suum dicimus, ut Græci Opsigonon. Nam Metacheron uitiatus in utero partus suillus uocatur Aristoteli. Hæc rustica Hecale apud Callimachū notat apposuisse. Hippocrates Aethiopicā Batim cōmendat. Est & Batis, siue Batos, inter pisces, quæ admodū & Botis. Q̄q̄ sunt qui Botin, pro herba potius q̄ pro pisce capiant. ut Athenæus inquit. Batin, atq; Baton nostri Raiam appellant. Nam quod Græci Rhinam, ipsi Squatinā uocamus, cuius aridā cutem Hippocrates Ichthyen notat. Quamq; & instrumentū medicinale, quo partus ex utero præcidit, Ichthya dici solet. Raiam certe Theodorus pro Batracho, siue Rana quādoq; uertit: nisi alterutra lingua librarius errauerit. Batis porro piscis in tria genera diuitur, Baton, Hobaton, & Asterianbatin; & ex Squatina & Raia, natus Rhinobatos.

EX M. VERG. COMM.

Quam Græci Crithmon, a figura seminis, ut credimus dixerunt, Plinius, & alij ubiq; Batim, Columella nunc Batim, nunc olus Chordum, q̄ sero & appropinquante uindemia conditur, appellat: ad mare primū, & in littorum petris, quoniā priora satius sunt syluestria, & per se nascentia, inuentū: mox in hortis ubiq; ad quotidianos usus consistit herbarum quam ditiorū, & plæbis mensæ pariter nouerunt. Eam hic paulominus q̄ cubitali altitudine in

caulem crescere ait: ceteri palmum erigi a terra tantum dixerunt. Quod in Italia, praesertimque in Hortensi uerius uidetur. Non ideo tamen arguendus Dioscorides. Nulla enim in his certa naturae lex & mensura est. Refertque magnopere in huiusmodi rerum historia, quibus locis aliquid commeteretur aliquis: credimusque nos quod hic ait, cubitali fere altitudine esse Batim, sic accipiendum esse, ut maxima omnibus locis haec eius mensura sit, nec altiore cubito Batim alicubi inueniri. Estque legitimus hic, et ob naturae uarietatem necessarius metiendi omnia modus: ut praefinito altero extremo, nec ultra, nec citra id aliquid fieri intelligatur.

¶ De Coronopo. CAP. CXLV.

Coronopus, aliquibus Ammonos, alijs Alstrion, Pœnis Atiristite, Romanis Cicatrix, alijs Stilago, alijs Sanguinaria dicitur. Oblonga haerula est per terram repens, fissis folijs. Coquitur in oleo. Radicem habet tenuem, adstringentem, quae in cibo coeliacis facit. Prouenit in semetis, iuxta domicilia, & locis incultis.

BARBARI COROLL.

Coronopus, hoc est, Pes cornicis, inter aculeatas a Theophrasto ponitur, sporeque nascentes. Interim & feritur, medicinae ad usum, Silago, aut Stilago dicitur a nostris, a Graecis etiam Coronopodion, ut Galeno. Sunt Arabes qui hanc Coruinum uocent. Nec prohibeo, dum res confert, quibus cuique libet uocibus utatur: illud monendi sunt, herbam, quae modo Pes coruinus ab officinis & herbicidis appellatur, non tam Coronopoda uideri, quam Ranunculi genus, quod Polyanthemum cognominatur: quandoquidem aculeata & oblonga esse Coronopus herba traditur, & aluinis prodesse: Coruinus autem pes, auis eius, & Ranunculi similitudine conspicitur, plurimis foliorum diuisuris, cuius uel tactu solo pustulae, ambusti modo corporibus attollunt, floreaureo, copiosoque: quibus notis, Ranunculum Polyanthemum uocatum coniungunt.

EX M. VERG. COMM.

Scripsit de Coronopode hac iam pridem multa Leoniceus, uir nostra aetate dignus, cui multum deferant bonarum literarum cupidi, in commentariolo eo quod de Plinij erratis aliquot edit. Conarusque inter cetera est, quam hic romana appellatione Coronopodis Castaticem esse dicit, ostendere ab Apuleio Galli crus dictam fuisse: & ex Galli crure ab imperitis graecorum librarijs Castaticem in hoc scriptore factam esse. Quod si confirmare ego ausim, uaticinari magis quam censere me credam. Nulla enim eius uocis uestigia in hac supersunt. Nec coniectura aliqua in ea se offert, qua quod ignoratur & latet in lucem trahi possit. Illud potius admittendum, quoniam graeci a Cornicis pede eam uocauerunt, uerisimile esse, latinos a Galli crure congruentibus alijs notis, ob similitudinem, nomen illi fecisse: quemadmodum ab aliquibus etiam, non cornicis, sed Coruinus pes haec ipsa nominatur. Idem praeterea eandem a Plinio ait lib. 24. Graemen aculeatam appellari. De quo dubitandum nulli esset, si hic aut aculeatam dixisset Coronopodem, aut quod aculeos indicaret aliquid illi adiecisset. Quam ob causam, non sine ratione subsister in Plinio alijs, audiens in aculeatas lib. 22. & secundo Coronopoda ab eo numerari. Nec nos Plinium arguimus, sed uarietatem historiae demiramur: dubitamusque, posse eam notam Dioscoride deesse. Theophrastus lib. 8. de ea tradidit humi caulescere, quod hic ait per terram sterni: numeratque inter aculeatas, & sponte nascentes. Vulgaris & ubique fere nascens herba haec est.

¶ De Cicerbita, seu Soncho. CAP. CXLVI.

Sonchus asperum, aliqui Cichorium uocant, Romani Cicerbitam asperam. Aphri Gathonem. Huius duo genera. Syluestrior magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibis expetitus, anguloso caule, interdum rubicante, folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtri usque uis refrigerat. Modice adstringit. Vnde aestuanti stomacho, et inflammationibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rationes sorbitione mitigat. Lac elicit. In uellere appositus, sedis ac uuluae collectionibus opitulatur. Tam haerba quam radix illita, uibratis a scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs. Eum qui ra-

A

καρωνόπον

Pli. li. 22. ca. 19

B

σόνχος

Cmos habet, folia distinguunt. Sed ad eadem pollet.

B A R B A R I C O R O L L.

Sonchos, in candidum, nigrumque diuiditur. Lactuca similes ambo; nisi spinosi essent, caule cubitali, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manet. Sunt qui nigro uelci prohibeant; quasi faciente morbos. Sonchum Hecale cum Bati supradicta Thefeo, apud eundem poetam intulit, non tacendo Eulidis parafiti dicto non insulso, qui Sonchum in coena copiosam apponenti, senarium ex Euripide poeta protulit, ubi Capaneus inquit.

μὴ τῶν πρᾶσις ὅτις ἰσχυρὸν τῶν

Aculeatur postquam tenera esse desit, et adulta facta Sonchos, ut Galenus inquit. Aetius hanc quandoque Dipsacon uocauit. Dioscorides Cicerbitam a Romanis dici prodidit; quod quidem uocabulum in Ethruria hodieque durat. Nunc Romanum uulgus Crispinos, Venetia Lactucinos. Folia ex aceto, saleque manduntur. Esculenta est & radix.

E X M. V E R G. C O M M.

Estur toto fere anno Sonchos; sed nihil autumnino, quo tempore post primas pluuias nouo ortu tenerior frondet. In acetarijs nostris frequentius est. Eam, ut hic etiam testatur, rura nostra, & omnis Ethruria Cicerbitam uocat. Non ideo tamen credimus fuisse hoc eius antiquum nomen. Potuit enim ex non multo tempore Diosco. accreuisse, eo quo a principio diximus modo. Est ubi Crispinus, & ubi Lactucella Sonchos uocetur. Quotque toto orbe gentes sunt, tot fere huiusmodi herbarum appellatione audiuntur. Nihilque in medicæ materię disciplina periculosis est, quam neglectis rebus, nominum tantum sollicitum esse. Nota omnibus Sonchus est. Certas enim habet notas: & si in scriptoris huius historia omissum uideatur quod precipuum in ea est, cuiusque meminit Plinius, & unde Lactucella a quibusdam dicta fuit. Id autem est lactis liquor, quo fractus caulis eius manat. Potuit a Dioscoride propterea, quod nota uulgo Sonchus sit, ea nota relinqui. Potuit perisse, ut perierat etiam in caulis descriptione *ὑπόλευρος*, quod est, inanis & uacuus: quæ uox in cōmuni græcorum lectione nulla est, & ex alijs, in quibus erat, restituta a nobis fuit: præsertim monente id Plinio, qui ait, caule cubitali, anguloso, intus cauo, & qui fractus copioso lacte manet: quæ omnia manifeste Sonchus habet. Inter aculeatas herbas, sed non simpliciter a Theophrasto lib. 6. Sonchus numeratur. Aculeatur enim postquam induruit, & arescere cœperit. Fecerunt ceteri omnes Sonchi duo genera: appellanturque alij candidam, & nigram: alij asperiores, & mitiores: alij edendo, alij non edendo esse dixerunt, eadem rei diuisione et significatione. Vbique enim duo illa nascuntur genera. Solum Diosco. tertium genus Sonchi arborecētis fecit, quod caret Italia. Nec nos hæcenus qualis ea sit, & ubi nascatur, a quoque audiuimus.

De Intubo, & Seris. C A P. CXLVII.

Satiuam Serin alij Picrida appellant, Aegyptij Agon, Romani Intubum. Duum generum est. Altera syluestris, quæ Picris, et Cichorio uocatur. Altera latioribus folijs constat. Stomacho quam hortensia utilior. Quæ iterum in duas species digeritur. Vna folio latiore prædit, Lactucarum simillima. Altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat et adstringit. Stomacho utilissima. Aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Syluestres sitomacho meliores. Quandoquidem aestuantem ipsum, et quem imbecillitas uexat, leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinunt. Podagris, et oculorum inflammationibus auxilio sunt. Hæba cum radice illita, percussis a scorpione subuenit. Igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ceruicis & aceto ualet ad illitus eorum quæ refrigerationem desiderant.

B A R B A R I C O R O L L.

Serin satiuam Dioscorides non describit, sed syluestrem dumtaxat. Summa ergo Intuborum genera, Seris, & Cichorium. Seris Lactuca simillima, Troximon a recentioribus græcis uocatur. Iterum duplex hæc. Satiua, quæ proprie dicitur Seris, minor Cichorio & ueniosior. Et Syluestris, melior priore; nigra hæc & æstiuæ, deterior hyberna, & candidior. Cichorium, siue ut Theophrastus inquit, Cichore, nunc est satiuum. A latinis Ambugia, & Intubus erraticus, in Aegypto Cichorium nomen habet. Duplex & hoc naturæ. Folio angusto, Chreston, & Part-

Theophr. lib.
9. cap. 11. & 7.

eration, propter salubritatem uocatū, folio latiore, quod Edypnoida cognominant, & Leonis dens uulgari uoce dicta creditur. Similitudo Intubis tanta cum Lactucis, ut neq; ex eodem genere dici possint, neque item ex alio. Hyemis quidem impatientiores sunt q̃ Lactucæ, uirufq; præferentes, sed caule nō minus grati. De Cichorio Theophrasti uerba subiiciemus in Chondrilla: quando & illa species existimatur Intubi a nonnullis.

EX M. VERG. COMM.

Prima oleris huius, & amplissima diuisio est, in satiuū, & erraticū. Dico autē Erraticum, q̃ sponte sua natum, omni humano cultu caruit: qualia in plantis, & disciplina ruris multa fecit natura, feniculū, serpillū, pluraq; alia: a ueteribus latinis sic appellata, q̃ sub nulla olitoris, aut agricolæ lege, libera uagantur & errant. Ideoq; incastigata, satius minus speciosa sunt. Quod manifeste in Intybo deprehenditur: cuius a principio unum idemq; genus, hac una ratione, in duas statim distrahitur species: quarū diuersæ penitus notæ sunt. Amarefcit enī Erraticū, & angustiore folio est. Satiuū ori, & in cibo gratius, latioribusq; folijs. Quod autē unū idemq; in am bobus seruat, flos est, & q̃ flores ferunt ramuli: quos natura nobis indulfit, ut esset unde satiuum Intybū facere uolētes, Erraticum cognosceremus. Post primā deinde & amplissimā diuisiōem illam, alia rursus, accedente maiore, diligentioreq; cultura, & hominis labore, diuisio facta est: discretumq; satiuū Intybū in Lactucæ dulcedine, foliorūq; quātitate & figura simile: & q̃d minus eo sit, & amarulenti saporis. Et hic census Intyborū nostra ætate etiā est, uocatq; Flo rentinus ager Erraticū & Amarū primū Intybū illud, q̃d græci ab amaritudine Picrida nomi nāt: gentes autē aliq̃ priuatim Cichoriū: a multis quē habet in radice capillamētis, Radiculā. Idemq; huic nomini genus est, quod translaturum, terraq; sepius obrutū, candorē teneritudinēq; acquirit, & maiorem amaritudinis partem amittit. Duoq; hæc genera sunt a Diosc. primū nu merata. Satiuum deinde illud uno Intybi nomine nunc censetur: etsi corrupta ab Intybo uoce, Echurria Endiuia passim appellat. In hoc & maius, et minus est, dulcedinisq; et amaritudinis discrimen aliquod: quod ut uidetur ex una diligentia & culturæ ratione euenit. Prius illud notis simo uersu in Georgicis suis indicauit Maro, cum dixit. Et amaris Intyba fibris. Intelligens enī Intybū gr̃is nomē, ut gr̃cis Seris est, latinis esse amaritudinem, ut ad certā contraheret speciem, addidit. Secundum illud Galenus dicens, κίχουρον ἢ ῥωμαῖοι λεγόμενον ἰντυβολάχων, quod est. Cichorium, quod Romani olus Intybi appellant. Indicauit & Flaccus cum cecinit, mē Cichorea, leuesq; Maluæ. & cætera. Est enī Cichorion peregrina gr̃cis etiam uox, quæ omnia hæc Intyborum genera simul indicet. Etsi ab aliquibus ad primum illud & amarum Intybum cōtra cta fuerit. Nihil, ut uidetur, in antiquis scriptoribus circa congeneris plantæ huius appellatio nes certum est. Theophrastus lib. s. de plantarum historia, Cichoriō appellat syluestre illud ge nus, quod eodem autore ab amaritudine nomē inuenit. Agit enī de herbarum caulibus, αἰτῶν, ὅτι αἰτῶν κίχουρον μίλας ἔχει ἀποφύσεις ἔχων πολλὰς, ἔτι δὲ γλῆκος καὶ δυσδιαίρετος διὰ καὶ διαμῶν χρόνῳ. Quod est, Cichorei autem caulis magnus est, multas habet ueluti brachia agnationes: len tus itidem est, & in frangendo contumax. Quā ob causam, pro uinculis eo utuntur. Qua de scriptione, uidetur amarū & agreste illud significare. Idem paulo post Picridem hoc ipsum ap pellat. Sæpe etiam in describenda in aliquibus latiore foliorum figura, κίχουριδι ea appellat, id est, Cichorio similia, satiuum indicans: hoc enim latiore & lactucino scilicet est. Paulus Aegi neta Romana appellatione usus in primo, ἰντυβὴ totum hoc genus uocauit. In sexto deinde sa tiuum, agresteq; & amarum uno eodemq; nomine Serim: in secundo postremo Serim satiuū, Intybum agreste. Plinius libro. 19. capite septimo, a Lactuca digressus, satiuum esse Intybum his uerbis declarat. Neq; ex eodem genere possunt dici, neq; ex alio Intybi. Pauloq; post. Est & erraticum Intybum, quod in Aegypto Cichorium uocant. Mox iterum lib. 20. cap. s. de erra tico & satiuo hæc ait. Intybi quoq; non extra remedia sunt. Erraticum apud nos quidam Am bubeiam appellauere: in Aegypto Cichorium uocāt quod syluestre sit: satiuum autem Serim. Columella lib. 2. cap. 18. cum docet, quomodo prata colantur, Primū ne stirpes, aut spinas. &c. atq; alias ante hyemem, alias per autumnum exstirpemus, ut rubos, uirgulta, tuncos: alias uel lamus, ut Intyba, ac solstitiales spinas. Qua descriptione, Intyba indicauit, quæ syluestria sunt. Satiua enim in pratis non inueniuntur. Idem postea lib. 9. capite. 13. cum de educandis anseribus agit, Serim satiuam appellat his uerbis. Palustris quoq; sed herbis destinetur ager: atq; alia pabula conserantur: ut uicia, trifolium, foenū gr̃cum, sed præcipue genus Intybi, quod gr̃ci appellant Serim. Postremo Palladius in octobri mense satiuum Intybū uocat. uerba eius sunt. Mense octobri serenda sunt Intyba, quæ hyemī seruiant. &c. Ex his quæ tam multa & longif sime repetita a nobis sunt, colligere facile est, nullam in his, nec gr̃cis, nec latinis certam, per

C pertiaamq; appellationem esse: sed in græcis Cichorium nunc agreste, nunc satiuum Intybum indicare: Picridem semper agreste, quemadmodum Serim plerumq; satiuum. In latinis Intybum modo satiuuum, modo agreste, Ambubeiam autem agreste semper. Nec fore antiquos autores legentibus aliquid utilius, q̄ præcedente rei coniectura, contra q̄ in cæteris fit, non ex uocibus res, sed ex rebus uoces intellexisse. Solus Celsus libro. 2. cap. 29. de utroq; gñe agens, ad certas uoces in medicina rem contraxisse uidet: satiuumq; Intybū, syluestre Ambubeiā appellasse. Verba eius sunt. Lenticula, cui uel Beta, uel Intubus, uel Ambubeia. &c. alterutū sumi iubēs, aut satiuū qd Intybū, aut agreste qd Ambubeiam uocat. Censeremq; ego: qm̄ graui periculo in medicina hæc uariant, satiuū in græcis Serim, in latinis Intybū: Agreste in græcis Picrida, aut Cichorium, in latinis Ambubeiam semper appellari: ut certa nominū ratio, cæram legentibus rem indicaret: nisi in medicæ materiæ nomenclatura audacior uideri aliquis timeret.

κόνδριλλα

De Condrilla. CAP. CXLVIII.

Condrilla, quam aliqui Cichorion, alij Serin appellant, caulem, flores, & folia habet Cichorio similia. Qua ex causa nonnulli syluestris Intubi speciem esse pronunciarunt. Verum tenuior tota est, in cuius ramulis gummi mastices simillimum, tuberculo fabæ inueniri solet. Quod cum myrrha tritum, & linteo appositum instar oliuæ, feminari menses trahit. Tusa cū radicibus tota, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro ammissi uiliginēs emaculant. Gummi, inordinatos pilos repliat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admouetur. Contra uiperas in uino pota proficit. Succus decoctus in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosus, humi sparsum, caulem succo madentē lacteo. Radice tenui, rotunda, leui, uegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis, & cultis.

The. li. 7. ca. 7.
Pli. li. 21. c. 35. 17

BARBARI COROLL.

Chondrilla, siue Chondrillon olus est folio Intubi, & propter amaritudinem ingustabili. Succus radici lacteus, copiosus, acer. Caulis fere pedalis, succo manans amaro. Radix Fabæ similis, aliquando numerosa. Gummi eius proximum terræ funditur. Herbam mures agrestes a serpentibus læsi, mandunt. In Theophrasto Andryala, in Plinio Chondryala, pro Chondrylla deprauate legitur. Hanc Galenus speciem Seridis unam esse meminit. Germinat post Virgilias. Omnia Intubacea, ut Theophrastus inquit, ineunte uere, caulem, floremq; simul edunt. Cichorium foliatu, & caulibus, & ab radice, unaq; cum emerfu ramusculorum flosculus emicat. In caule per partem, ut Heliotropium usq; in autumnum. Caule magno, surculisq; brachiato pluribus, itemq; ad uinctum quoq; lentis, ut radices: quarum prolixitate contumaciter emoritur. Fert & siliquam, siue folliculū, et in ea semen per extrema caulium. Intubam auem pleriq; falso intelligunt amari iecoris, non herbam, in Virgilij uersu primo Georgicorum, Et amaris Intuba fibris.

Quo doctissimus Poeta, ad genus illud Intubi uidetur alludere, quod Picris appellatur. Aetius Picrida pro Cichorio syluestri, quod & Serin dici uult, accepit. Iulius Pollux autor est, appellatione Cichorij ueteribus syluestria olera uenisse dumtaxat: quæ & gracilia, & tenuia cognominabantur. In Ouidio ad cutem probari Seram legimus illo uersu.

Et simul instantis corpora finge Seræ.

Quod autem id genus sit fruticis, non ausim decernere: nisi q̄s ab eo Serā, pro Seride uocatum credat. Nā & Chondrilla, quæ itē Seris est, ad illū usum, ut Diosc. hac parte docet, adhibebat.

EX. M. VERG. COMM.

Intybis congenerem esse Condrillam, argumēto est ueterum omnium de ea historia, q̄ ab Intybis statim de Condrilla agentes, eam illis coniunxerunt: deincepsq; descripserunt quā naturā coniunxerat, & simul docendam esse ob similitudinem monuerat. Plura ceteri omnes q̄ hic de

ea docuerunt: caule pedali, & amarissimo totam sapore esse: radicem habere numerosam: gummi illud proximum terræ in ea inueniri, & candidum conspici florem: multa; alia: quæ quoniam in Corollario suo a Barbaro collecta fuerunt, a nobis relinquuntur. Adijciemus hoc solum, tantam esse illi cum Ambubeia, quam diximus agreste Intybum, similitudinem, ut sepe legentes in campis fallat. Nascitur, ut hic etiam ait, pingui & lutofo solo: quem habitum una uoce *γιδύου* *χωρίω* felicissime Dioscorides indicauit. *γιδύου* enim *χωρίω* in re rustica ueteres dixerunt eas agrorum partes, quæ nullos habent terræ mixtos lapides, sed solam terræ profunditatem: ob quam causam, non dilabentibus per lapidum interualla aquis, lutosus ager & pinguis sit. Idque una *γιδύου* uoce Dioscorides monstrauit. Sit autem hoc, an secus quod Barbarus uerit, nasci in terrosiss, aliorum iudicium sit. Nos reni primum, mox uocis rationem secuti, & pinguibus lutosissq; locis nasci eam diximus.

De Cucurbita. CAP. CXLIX.

Cucurbita esui apta. Cruda illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syria sin uocant, in sincipite illinuntur. Oculorum inflammationes, podagrasque refrigerant. Succus e ramentis tuis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis illitu adiuuat. Totius feruefactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

BARBARICOROLL.

Cucurbitam satiuam Colocynthen greci uocant. Syluestrem, Colocynthida. Erumpit satia, post quintum, sextum, septimumue diem. Cucurbitæ multa genera. Satiuum, & Colocynthis, ut prædiximus. Tertium Somphos cognominata: quia sit inanis, digitali crassitudine, non nisi in saxosis nascens. Cucurbitam marinam nonnulli putant. Satiuæ fastigia duo. Prima, Camerarium in tecta scandens, leni umbrâ testudines & pergulas operiens. Plebeium humi reptat flagellis. In priorē, mire tenui pediculo libratur pōdus immobile: auræ. Crescit qua coarctatur forma in uaginas uiciles coniecta, postq; defloruit: plerumq; & draconis intorti figura: liberrate uero pensili concessa, iam uisâ est nouem pedum longitudinis. Cortex uiridi tener dardioribus, quemadmodum & primis quoq; caulibus. Ipsæ quo longiores tenuioresq; sunt, eo gratiores, & ob id salubriores, quæ pendendo creuere, minimumq; seminis tales habent. Chrysippus unus omnium damnabat eas in cibis, cum tamen adagiū illud celebre iam esset, *κολοκύνθη δὲ ὀφθαλμοῖς*, hoc est, saniores esse q; Cucurbita. Siccantur fumo Cucurbitæ hortensiorum seminibus condendis, rusticæ supellectili, Alexandrinæ maxime. Iam & in balnearum usum uenerunt, urceorum uice, multo etiam prius cadorum ad uina condenda.

EX M. VERG. COMM.

Quotidianus, sed uulgaris usq; dum lignescat, cibus Cucurbita est, quibus nascitur locis omnibus pariter nota: nihil ideo longius de ea repetendum. Quod in medicina nouisse in utile non sit, ex grecorum placitis, quod infantum Syriasis sit, breuiter dicemus. Cuius mali appellatione Romani caruerunt. Et si Plinius ardores capitis id, lib. 20. capite. 3. appellauerit. De Syriasi autem hac grecorum medici, præsertimq; Paulus Aegineta his uerbis docuerunt. Inflammatio partium circa cerebrum, membranasq; eius, in infantibus Syriasis est. Concauum sit in ea sinciput. Concaui itidem cum pallore oculi. Accedit etiam totius corporis siccitas. Succurrit huic malo, impositus sincipiti cum rosaceo uitellus oui: sic tamen, ut continua mutatione renouetur. Oportet eodem loco etiam imponere herbæ quam Heliotropiū greci, latini Solarem dicunt, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem Peponem uocant, adiacentem carni currem, aut hortensis solani cum rosaceo succum. Greci dulcem, & quæ edendo est Cucurbitam foeminino genere in secunda declinatione *κολοκύνθη* dixerunt: medicam uero & amarā, de qua suo loco longius agetur in quinto, & ab hac diminuta appellatione *κολοκύνθη*. Est & illud animaduertendum, in dulci Cucurbita ex duplici genere duplex etiam nomen esse. Rotundæ, & in globum tumenti, q; Cucumeri similis sit *σικύα*. Tereti & in longitudinem extensæ, *κολοκύνθη*. Latini utramq; eodem Cucurbitæ nomine appellauerunt.

γ ι η

A

κολοκύνθη

The. li. 7. cā. 4.
Pli. li. 19. cā. 5.

B

C De Cucumere satiuo. CAP. CL.

SATIVVS Cucumis aluo & stomacho perquā utilis habetur. Refrigerat, qui corruptionem non sentit. Vesicæ prodest. Olus factu reuocat, quos animus liquerit. Semen modice urinam mouet. Cum lacte, aut passo, uesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant, & epinyctidas cum melle.

Pli. li. 19. ca. 5.
libro. 20. ca. 1.
Theophrast.
lib. 7. cap. 4.

BARBARI COROLL.

Cucumis a curuitate, ut placet Varroni. Græce Sicyos, & attico more Sicyos uocatur, & Sicydiō a Phrynicho poeta, & cucumeraria Sycelata. Cucumerem Heraclides Tarentinus Hedygeon uocauit. Quinto, sexto, septimoue die emicat, sed omnino celerius quæ Cucurbita. Radice breui, ut Pepo. Dulciores fiunt, maceratis aqua, lacteue seminibus. Tres satiu differētiæ Theophrasto sunt, Laconici, Scytalij, Boetij. Laconici rigantur: nō gaudent aqua reliqui. Adiecit hys Euthydemus quos Dracontias uocauit. Tanta porro naturæ cognatio est inter Cucumeres, Pepones, Melopepones, Cucurbitas, ut sepe numero & proprietates & nomina latini, græciq; confundant. Ipsum quoq; instrumentū Cucurbitulā græci a Cucumere cognominant, Sicyā uocando. Quamq; non desunt q; Sicyam hoc intelligant, qd uulgo Anguriū, et Palæstinus Melo dicit. Athenæus certe Sicyā ueteres, p Cucurbita uocare solitos affirmat. Atq; ita & Nicandrus poeta uti Georgicorū uolumine. 2. Apud Græcos certe Cucumeris appellatio, Pepones q; uenit. Demetrius Ixion, Sicyos dici uoluit, ἀπὸ τοῦ σίκεσθαι καὶ κίτν. q; uenerē ciant: qd tñ cōtra multa sentiunt. De Cucumere, puerbiū Græci celebrāt illo uersu. σίκεται τρωγούσα γυνὴ τὴν χλαίναν ἵσαν. ut mulier uidelicet texēdo Cucumerē manducet. Fortasse, qm textrices, ut Aristoteli placet, impudicę sunt magna ex parte. Ceterū cartilaginei oīa ea gñis sunt, crescūt quacūq; libeat effigie. Virides Italię Cucumeres & q; minimi sunt, inquit Plinius, prouincijs q; maximis. Citrinos, nigrosq; pbant. Copiosissimi Aphricę, ac grandissimi Moesię. Aquas ita diligunt, ut ad eas modice distantes, etiā disseci arrepant. Oleum odere mire, ita ut in hamos curuent, ne attingant. Inuenti et sine seminibus sunt, macerato uidelicet semine farina cuiusdā herbe, quam Culicem appellant. Citrinos Cucumeres intelligūt, qui uulgo Citreoli a colore Citri nominant, maiores multo uulgaribus, nec striati, q iam & in Italiā passim nascunt. Particulatim floret Cucumis, si bi ipse superflorescens, et sicciore locos patit. Candida lanugine obductus, magisq; dū crescit. Seruatur in muria usq; ad alios fere prouentus, & uiridis quoq; in sabulo locis opacis, sceno sicco operiente. Cucumeres in fistula, ut est apud Hippocratem, dimisso flore, mira longitudine, quasi anguina specie proueniūt. Quāq; anguinus Cucumis, idem uidetur esse qui Syluestris, multo infra magnitudinē Satiui, Erraticus, & Angueus Columellæ appellatus, a Satiuo penitus differens, uix, ut solo aspectu gentilis ei appareat. Serotinū æstate germen, & flos, gaudetq; frigidis. Cucumim nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis tradunt. Alij in Arcadia, similem Heliotropio, cuius inter folia & ramos proueniret semen, magnitudine nucis iuglandis. Esse autem ad speciem Scorpionis, cauda reflexa, cāndida: propter quod aliqui Cucumim Scorpionū uocant. Decoctionē Syluestris sparsā mures non attingūt, cicimes ea necant. Cucumis syluestris Elaterium quoq; dicitur, quemadmodum ex ipso succus. Vinum & inde sit Phthorium uocatum, ut post liquebit. Herbam Culicem, cuius hoc capite meminimus, a Theophrasto Conopa uocari censeam, nec ne, quoniam & Cynopa scriptum est maiori parte, nō dixerim. Theodorus Canis oculum, & Canuram conuertit, quasi Cynopa, non Canopa probauerit. Olus est hoc Theophrastus inquit, primisq; post æquinoctium imbribus germinat, & inter spicatas herbas ponitur, a Plinio quoque duobus locis dictum, ut in casificatione Plinia-

C De Pepone. CAP. CLI.

PEPONIS caro in cibis, urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam Syriam uocant, sincipiti imponuntur. Fronti admota, oculorum fluctio auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in sinegmata, quæ faciem repurgāt, & nitore afferunt. Radix sicca, & ex

hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionē mouet. Si quisq̃ mode
rate secundā cœnā uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quo
q̃ illita cū melle, ulcera concreta in modū faui, quæ Caria uocant.

B A R B A R I C O R O L L.

Pepo, a Græcis Pepon, a Theophrasto Sicyos, & Persicyos quandoq̃ dictus, a Polluce
Spermatias. Cucumerum generi contribuitur. Siquidem cum magnitudine excessere, uocan-
tur Pepones. Particularim florēt, ut Faba. Sunt qui & Melo pepones dicuntur, in Campania pri-
mum reperti, effigie mali cotonei, a quo & nomen fortuito natum ibi, mox semine ex illo ge-
nus factum. Non pendent hi, sed rotundantur humi, figura & odore præstantissimi, ubi matu-
rui. Quæ non pendent statim a pediculo recedunt. Lulirani Regis Liburnicæ inter alia me-
ridianæ illius nauigationis miracula, Melones in Aethiopia nobilissimos haberi prædicat, quo-
rum odorem Elephantis, sagacissimi olfactus animal, de longinquo sentiant, aduolantesq̃, cu-
cumeraria tota depopulentur ac proterant. Illud propter iactatam a medicis controuersia præ-
terire nolo, Auctores esse Græcos aliquos, qui præcipiant, post Pepones, Melo peponesq̃ ui-
um bibendum ijs, qui pituitosi fuerint, biliosis uero acida edenda.

De Lactucis.

CAP. CLII.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gra-
tæ habentur. Somnū conciliant. Aluum emolliunt. Lac euocant.
Verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum
semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit. Et Ve-
neri refragatur. Frequentiores tamen in cibo, claritati oculorū officium.
Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscun-
tur, succo, aut lacti syluestris Lactucæ similem.

B A R B A R I C O R O L L.

Lactuca, Lactucula, & Lactecula, sicut apud Græcos Thridax, & Thridacina dicitur, & uul-
go Myrilon, caulem primo blandum, processu spinulis inhorrentem habet: die quarto aut
quinto emergit. Suauior resciso caule regerminat. Semen lartugine occultitur. Ex ijs candida
tenerior & dulcior. Lactucæ Græci tria monstrauere genera. Vnum lati caulis, adeo, ut olito-
ria ex ijs hostiola factitari prodiderint Theophrastus & Plinius. Foliumq̃ ijs paulo maius her-
baceo, & angustissimum, ut alibi consumptio incremento. Alterum rotundi caulis. Tertium a
gente cognomento Laconicum, sessile, folio Scolymi, rectum, amplumq̃, nec brachiatum a
caulibus. Alij distinguunt in nigras, rubentes, candidas, ratione satus colores uariante. Pri-
mas Ianuario, secundas Aprili, tertias Martio ferentes. Quidam fastigia quinque faciunt. Pur-
pureas & crispas, utraq̃ Cecilianam uocantes. Tertium Cappadoces. Quartum Græcas.
Longiora his folia, caulesq̃ lati, præterea longi & angusti, Intubis similes. Quintum genus
Pieris, amaritudinē insignis. Vnde nomē. Alij Crispā, Fuscā, Cappadocem, Tartesiācam, &
Cypriā, ut Columella. Cappadoci pexum, densum, pallidūq̃ folium. Tartesiācæ, siue Beticæ,
candidū, crispissimū. Cypriæ, siue Paphiæ rubicundū ex candido, tenerimū ac leue. Alij distin-
xere Atram, quæ Meconis, & Meconitis dicat, a lacte papaueris simili, maxime soporifero, qd
apud antiquos Italiæ solū genus earū fuit: & ob id Lactucis nomen inditū. Purpuream, siue fu-
scā, maxime radicis, quā uocant Cecilianā, a Cecilio Metello dictam. Rotundā minimā, sed
latis folijs, Artylida nominatā, siue ut Græca fides habet, quæ & a mulieribus ita uocari scri-
bit, Artylida. Et Eunuchion a Pythagora, hoc est, Spadoniā, quia hæc maxime refragetur Ve-
neri. Candorē lacteum contingere putant arte, atq̃ cura, sed ijs dumtaxat quibus semen album
est. Candida Lactuca maxime hyemem tolerat. Irrepsit & satiuis aliā, ut Plinius inquit, admo-
dum probata, quæ Cecilia uocatur, a supradicta Cecilianā, quæ purpurea est differens, folio
Cappadociæ, nisi crispū, latiusq̃ esset. De Caprina, & alijs agrestibus, in Lactuca dicemus syl-
uestri, & uno eodemq̃ pede quemadmodū Lactuca, Ocimū, Apium, Eruca, & omnino gene-
ra olerum diuersa proueniunt, Græcus auctor Didymus, memoriæ scriptū reliquit, Cypriū La-
ctucam Brenthistū uocabant. Sunt & Brenthiæ quedam radiculæ, quibus mulieres genas ru-
bificant, quas nonnulli Fucum, aut Anchusā interpretantur.

Epistola

B

Theophras-
ti li. 7. cap. 5.
Pli. li. 20. ca. 7.

C Nobis in tam noto, tamq[ue] utili olere suspecta capitis huius tanta breuitas est. Inclinatq[ue] animus, desiderari posse in eo multa ex his quæ Plinius, Galenus, Paulus Aegineta, pluresq[ue] alij docuerunt, præsertimq[ue] Serapion: qui in collectis a scriptore hoc, abscessibus, & sacris ignibus mederi hoc olus ait: quæ hominis mala in hoc scriptore modo nulla sunt. Accedunt suspitioni huic nostræ etiam argumenta alia. Primum, q[uod] in seminis medicina nihil hoc loco legitur, prodesse scorpionum ictibus, & Cenchri moribus. Quorum alterum Plinius, alterum hic ipse in extremo opere, capite de Cenchri morfu indicauerunt. Verisimileq[ue] est, ut in cæteris ab eo factum fuit, ad eius periculi remedium ex hoc olere semen etiam accipiendum fuisse. Mox quod plurali numero, non procul a fine legitur, continuu[m] Lactucarum cibum claritati oculor[um] officere, deesse aliquid ostendit, quonia[m] singulari numero semper antea de sativa Lactuca egerat: quod inconcinnu[m] simul, & hoc scriptore indignu[m] est: credimusq[ue] nos, nihil dicendum huiusmodi ab eo fuisse, nisi prius aliorum scriptor[um] exemplo, de tam multis sativæ Lactucæ generibus egisset. Quo fit, ut suspicemur deesse huic capiti aliquid, præsertimq[ue] Lactucar[um] censum, & nomenclaturam aliquam: quam negligentes in exscribendo antiqui librarij, mutilum nobis hoc caput reliquerunt. Eamq[ue] ob causam nos locum vitij notam signauimus. Poterit tamen qui plura Lactucæ genera, nomina, & bonitates noscere uoluerit, ex Columella, Plinio, alijsq[ue] multis ea audire, & condituræ earum antiquam rationem intelligere.

De Lactuca sylvestri.

CAP. CLIII.

ἡγρία ὄψις

Sylvestris Lactuca, quam Magi sanguinem Titani, Zoroastres Phrombion, Romani Lactucam sylvestrem appellant, Satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est, & uiribus aliquantum papaueri similis. Vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos. Argema, caliginemq[ue] repurgat. Contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum allicit. Doloris leuamentum præstat. Menses trahit. Contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter q[uam] sativæ, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, ante, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

BARBARI COROLL.

Lactuca sylvestris, radice breuior, & multicaulior q[uam] sativa est, sponte nascens in aruis, folio pulillo, & ubi consummatum est, aculeato: caule candidiore, a lacte copiosissimo acri medica toq[ue], quod carpitur per messes, scapo inciso, præclarum ad multa. Sylvestris Lactuca plura genera. Esopon, de qua hic agitur. Secundum Caprinæ, qua pisces necantur, Marinam Cornelius appellat, de qua inter Titymallos sermo est. Tertium in syluis proveniens, latis uocatur. Quod & duplex est, Satiuum, & Syluaticu[m], ut suo constabit loco. Quartum Hieracium, rotundo folio: quemadmodum post liquabit. Communes notæ Sylvestrium, candor caulibus, interdum cubitali longitudine. Thyrsos & folijs scabricia. Succus omnibus candidus.

De Gingidio.

CAP. CLIIII.

γινγιδιον
ἀπὸ τοῦ γιν

Gingidium aliqui Lepidion, Romani Bisacutū, Aegyptij Doryfartu[m], Syri Adoriū, Aphri Tirieta appellant. In Syria & Cilicia placent, nascit. Herbula sylvestri Pastinacæ similis, tenuior, & amarior, radice parua, candidate, subamara. Olus hoc crudū, coctū, coctiu[m] ue estur magna stomachi utilitate. Urinā cit. Decoctū ex uino potū, uesciq[ue] prodest.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 15.

Gingidium Syria in hortis operosissima. Vnde natum est adagium. Multa Syrorum olera.

Simillimam Staphylino, & Scandici herbam ferit, non differenda recentium medicorum imperitia, Gingidium pro Fumaria, siue Capno accipientium.

EX M. VERG. COMM.

Eregrinū Græciæ & Italiæ, si Plinio, & Dioscoridi credimus, Gingidiū quondā fuit. Ille in Syria, hic in Cilicia & Syria nasci & feri dixerūt. Quo minus miret aliquis, ignorari nostra ætate, quod nā olus Gingidiū sit. Cognouit tamen id utraq; gens: descripsitq; Plinius. 20. uolumine, capite quinto omnē eius figuram & usum. Paulus Aegineta libro. i. capite de oleribus post Ocimum, Sinapin, Nasturcium, Vrticam, multaq; alia quæ acrimoniam habent.

De Scandice.

CAP. CLV.

Scandix, quam Romani hærbam Scanariam, aut Aculam nominauerunt, syluestre olus est, amarum, subacre. Quod crudum, coctum ue manditur. Stomacho & uentri utile. Decoctum in potu, uesicæ renibus & iocineri confert.

BARBARI COROLL.

Scandix olus est syluestre, ut in Brasicâ notauimus, Plauto quoq; dictum. Hanc Aristophanes Euripidi poëtæ obicit ioculariter, matrē eius ne olus quidem legitimū uenditasse, sed Scandicem. Vnde uerbum *σκανδική*, pro eo, quod est, *ἀσπιγνίστη* confectum, hoc est, ad imitationem Euripidis aliquid aut dicere, aut facere. Eademq; erat, ut Theophrastus ait, Enthusiasticon, siue ut Athenæus & Plinius, Anthriscion, si tenuiora folia, odoratioraq; haberet. Et lasione olus est syluestre, repens in terra, cū lacte multo, florem fert candidū. Conciliū uocant, singulati folio, sed ut descriptio tamē, & quasi rudimētū multorū in ipso appareat. Theophrastus autem Plinius, Folii inquit unū habet lasionē, sed ita implicatū, ut plura uideant. Huius flos, ut Theophrasti uerbis utar, conceptaculo auersa parte nō indiget, sed postrema eius exeunt in angulos, qualis fere oleagineus aspicit. Stimulat hæc herba coitū, lactis ubertatē præstat, phthitici, pdest: infantiū illita capiti, nutrit capillū. In Plinio tamē pro lasione, Lassina deprauatū erat, duobus locis. Differt Scandix a Sandice: q̃ Scandix herba est, Sandix metallica. Scandix aliē non describit, q̃ q̃ olus est syluestre, gustu acri, subamaroq; folijs Anthrisci, sed maioribus, & minus odoratis. In exēplari græco Dioscoridis, adpictā uidi Scandicem, feniculi folio fere cum corniculis, in summo floribus luteis, siue albis. Hæc ipsa specie in syluis quoq; uisit, frutice odorato, flore candido. Paulus, Aetius, & si recte meminī, Galenus, similit̃ Gingidio fecere Scandicē.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Scandix illa quæ toties Athenis in theatro plausum & risum excitauit: cum in Comædia lepidissimi poëtæ, Dicaeopolis ex agro in urbem profectus, rudis homo, ab Euripide eam humiliter poëtæ supplicans peteret, *οὐδ' ἄνδρά μισθὸς μισθὸν δίδωμιναί*, Nouerant enim omnes uulgare & uile olus: meminerrantq; poëtæ, illius matrē quotidie in urbem uenientem, uendito eo olere, filium in summa paupertate theatro & spectaculis educasse. Nec antiquæ hominis paupertati illudentes, sed ad uirtutem in angusta re studium & occasionē admirantes, totis subfellijs audito uersiculo illo exultabant. Nota tunc omnibus Scandix erat, uulgare & sponte sua nascens, locis plerunq; incultis olus, plæbis cibus, & quotidianum pulmentum & acetariū, quo ad sanitatē magis q̃ quæstus toto mari & orbe obsonijs proficerent. Vires enim illi sunt siccandi in extremo ordine, calefaciendi uerō in secūdo, aut incipiente tertio. Sed quod utilissimum in ea est, urinam ciere, & renes egregie laxare, testati ueteres Græci sunt: utiturq; ad eas difficultates sæpissime Paulus Aegineta: iubetq; in primō, si non iuste quotidie purgetur aliquis, Scandice, Apio, Asparago, similibusq; alijs sollicitandam esse urinam. Plinius etiam capite eiusdem numeri, multis Scandicem prosequitur laudibus: peculiaremq; illi laudem tribuit, q̃ uenere fatigato corpori succurrit, marcescentesq; senio iam coitus excitat. Quo magis mirū, in tanta morū ruina & labe, in nullo honore esse herbā, neq; ab Herbarijs nostris cognoscī. Græci nunc etiā Scandicem appellāt, nihilq; in eorū gente notius, sed non congruente antiquorū noris ostendit. Quā em̃ illi Scandicē modo appellāt, latiore, & quasi Betæ folio est. Antiquiores autē, ut in re nota sit, nullas eius certas notas tradiderūt. Verūtamen, ut ex multis coniectere licet, tenui, & q̃si capillato folio est. Plinius li. 21. cap. 15. inter spontē nascentes numerat: conuincitq; illi, ut uerisimile est, cōgeneres plures alias, quæ oēs tenui folio & capillaceo sunt: præterimq; Caucalim, & Tragopogonā: q̃ a capillamētis, q̃ pro folijs habet, Coma dicta a Græcis est. Ob quā causam non ab re penitus fuerit, similem in foliorū figurā illis credere.

A

scandix

Pli. li. 21. ca. 15.

B

C ^{καυκαλίδης} De Gallinaceo pede, seu Caucalide. **CAP. CLVI.**
Caucalis, quam alij **Caucum**, alij syluestre **Daucum**, alij **Myrtin**, **Democritus Brion**, **Romani** **Pedem gallinaceum**, aut **Pedem pulli**, **Aegyptij** **Seselin** uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, hirsuto, folijs **Apio** similibus, feniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbella, suauiter olente. **Crudum**, coctum uel olus estur. **Vrinam** mouet.

BARBARI COROLL.
Caucalis, olus est flore candido, Syluestris **Daucus**, ut **Galenus** inquit, a pluribus uocata, propter similitudinem & gustus & uirium.

EX M. VERG. COMM.
Genus herbarū lib. 8. de Plantarū historia facit **Theophrastus**, quod ἀρωγὰς uocat, id est, in aruis sponte sua nascēs: statimq; in eo **Caucalidem** hanc numerat, nullis alijs adiectis notis. Nec parū, si quis rem iuste aestimet, fuerit, tam certe, a tam graui auctore, **Caucalidis** natalesolum, & ubi quaerenda sit, audisse. Id enim additū his quae hic scriptor, **Galenus**, & alij tradiderunt, facillimā eius inuentionē nobis efficiet. Nota enī omnibus **Apij** folia, quibus similia **Caucalis** sua habet. Alitudinē deinde, hirsutam lanuginē, in summo incisa folia, & candidi floris umbellā oculus deprehenderet: inuenietq; **Dauco** tam similem herbam, ut aut syluestris **Daucus** sit, aut rudimentū naturae **Daucum** facere confidens. Qualis autē **Daucus** uterq; sit, in eo certius cognoscetur. Nullibi non **Caucalis** nascit: praesertimq; in noualibus, anteq; noua aratione renouent. **Galenus** **Dauco** **Caucalidem** sapore & uiribus similem ait. Hic tamen, ex similitudine figurae, ab aliquibus agrestem **Daucum** potius appellari ait. Habet enī & haec, & **Daucus** folia incisuris diuisa. Habent ambo etiā candidi floris umbellā. Dico autē u umbellam graecorū exemplo, qui σκιάδων ab umbra appellant, in aliquibus plantis floris ueluti pedamentū, in plures diuisum longiores pediculos, qui singuli florem sustinent, & in orbem circumactum. Quae floris figura feniculum, anisum, sambucus, pluraq; alia sunt. Quod quoniā umbellae, qua solem a uultu mulieres arcent, forma est, ob latitudinem circinationēq; suam, ideo **Graeci** primitūeam floris formā σκιάδων, mox **Graecos** imitati latini, **Umbellā** dixerūt. Quae uox huic scriptori multa est. **Caucalidis** huius **Nicander** etiā in theriacis suis meminit. Retulitq; **Chrisippus** antiquissimus scriptor, in secundo de oleribus, habere **Caucalidem** in gustu salsuginem aliquā: quod nec sensus, nec ex ueteribus alij indicant. Longe plura q; hic in medicina **Plinius** **Caucalidi** tribuit, quae poterunt uolentes in eo legere. 22. uolumine, eiusdem numeri capite.

^{ευζωμον} **De Eruca.** **CAP. CLVII.**
Evzomon, **Romani** **Erucam** uocant, **Aegyptij** **Ethericem**, **Poeni** **Asuric**. **Cruda Eruca** uenerem largiore cibo concitat. Semen eodem effectu prodest. **Vrinam** cit. **Aluo** perq; comodata. **Semine** ad condimenta utuntur, quod uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris **Eruca**, maxime in **Iberia**, quae occidentem spectat. Cuius semine pro **Sinapi** incolae utuntur. **Vrinam** uehementius pellit, multo satiuā acrior.

BARBARI COROLL.
ErUCA, **Euzomos** graece dicta, quoniam comendat iura. Concitat haec morantem, ut poeta inquit, **Venerem**, frigorum contemprix. Idcirco iungitur **Lactuca** in cibis, ut contrarietudinarum naturae temperamentum afferant. Nemo ignorat florem **Erucae** candidum, multas in folio diuisuras esse.

^{οκισμον} **De Ocimo.** **CAP. CLVIII.**
Ocimum uulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem habet. **Aluum** mollit. **Spiritus** mouet. **Vrinam** pellit. **Lac** euocat.

cat. Aegre tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest, & cum uino Chio oculorū doloribus. Succus, uisus caliginem abstergit. Destillationes exiccat. Semen potū conuenit insanientibus, difficili urinæ, inflatisq;. Naribus haustum, subinde mouet sternutamenta. Quod idem hæba efficit. Sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant. Quandoquidem manducatum, & in sole positum, uermiculos gignat. Aphri autem adijciunt, si feriantur a scorpione, qui Ocimum ediderit, nullo conflictari dolore.

B A R B A R I C O R O L L.

Ocimum prorumpit e terra celerrime, floret particulatim, contra quæ olus: cæterum, primo parte inferiore, demum superiore: quo fit ut diutius quoque floreat. Quemadmodum Fabæ, & Heliotropium. Radix una descendit in altitudinem crassa, & admodum lignosa. Cæteræ a lateribus exiles ac prolixæ. Semini cortex obducitur. Vni Ocimo aqua datur meridie: cum cætera matutinis rigentur. Feruenti quoque aqua sparsum, maturius prouenire dicitur. Sub canem exalbescit. Differre uidetur Ocimum ab Ocimo, quod Ocimum pabuli & faraginis quoddam genus est uocatum: ab ocys uerbo, quod ualet cito, ut Varroni placet: siue ab eo quod citat aluum bubus, & ideo ipsi datur, ut purgentur. Pabularium, & Catoni erat Ocimum, sed fistebat eo bubus aluum. Id erat e segete uiridi defecta antequam gelaret. Quæque manibus carpendum, non falcula secandum, ut renascatur ocimum, Cato præcipit. Sura Manilius, aliter interpretatur, & tradit Fabæ modios decem, uitæ duos, tantundem & Eruiæ in iugerum: melius & auena Græca, cui non cadit semen, addita misceri, & autumno Bonum causa feri solitos, hoc apud antiquos Ocimum uocatum. De Ocimo sunt, qui scribant capras id aspernari, & insaniam facere. Tritum si operiatur lapide, Scorpionem gigni. Manipulo eius cum cancri decem marinis, uel fluuiatilibus trito, conuenire ad eum Scorpiones a proximo omnes. In cibo pediculos facere. Capras id elitare, alij uolunt. Habetur & syluestre Ocimum, quod aliud est quæ Acinos. Quæ Acinos, quemadmodum & Ocimoides a Romanis Ocimastrum uocari Dioscorides existimat. Illud monendi sumus, de syluestri Ocimo nihil scripsisse Dioscoridem, de Ocimoides nihil Plinium. Martialis de Ocimo scripsisse rem miram dicitur: quod modo purpureos, modo albos, modo roseos flores pariat. & si ex eo semine frequenter satum sit, nunc in Serpyllum, nunc in Sisymbrium abire solitum. Recentiores Græci, qui de Rustica re scripserunt, Basilicon, & Misodulon appellant Ocimum: tantumque cum eo foemine discordiam inesse prædicant, ut si pultario subiectum sit, nec mulier id sciat, futurum, ut nunquam cibo manus admoliat, priusquam subductum fuerit: ut fortasse huic alluserit Persius poetâ illo uersu.

Dum ne deterius sapiat Panutia baucis,
Cum bene discincto cantauerit Ocima uernæ.

Pro, excantauerit, hoc est, cantando excluderit. Nam & Varro, Plautusque, ut ait Nonius, Excantare usurpant pro excludere. Meretriculam quandam Corinthi Ocimum uocaram legimus in comædijs: sicut aliam Abrotonum: quo & Themistoclis mater fuit nomine. Quæ sunt qui Euterpem uocaram scribant, & aliam Thryallidem, & aliam Sisymbrium: & aliam Meconidem, & aliam Herpyllidem, & aliam Myrrinem.

E X M. V E R G. C O M M.

Est Ocimo quemadmodum & plerisque alijs, in ruris & hortorū disciplina, eadem quæ uirtutis humanæ fortuna & ratio. Maleficio enim & iniurijs meliorescit. Vtque illa infortunio aliquo obruta, aut a Principibus neglecta, maleue habita, nihil ex suo censu amittit, sed quod in ferro, metallisque alijs sit, longo attritu subinde magis nitet, & speciosior plerumque emergit. Sic etiam non dissimili ratione Asparagus lætior in census prouenit. Gaudet calcari, & atteri pede Crocus, pereundoque lætior prouenit. Crispum nunquam in hortis fiet Apium, nisi cum est natum incrementum eius, superuoluto cylindro coerceretur olitor. Rutâ dum conseritur, maledictis prosequuntur qui adfunt, nec aliter maiore bonitate nasci id olus antiquitas credit. Ex hoc genere Ocima

A

Pli. li. 10. ca. 12.

B

Cum est: gaudetq; & ipsum cum obrutū terra semen est, paucula, uel cylindro diligen-
culcari. Nam si terrā suspensam reliquerit olitor, facillime totū corrumpitur & perit. Quodq;
uix credat aliquis, feruenti aqua conspersum, celerius etiam prouenit.

De Orobanche. CAP. CLIX.

ὀροβάνχη

Orobanche, alij Cynomorion appellant, a similitudine canini genitalis, Cyprij Tyrfinen, communiter Lycon. Cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, folio pingui, flore luteo, aut candicante, radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter legumina nasci constat, & ea strangulare. Vnde Orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus cruda, & in patinis Asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

B A R B A R I C O R O L L.
Orobanche Cynomorion quoq; appellatur, a similitudine Canini genitalis. Enecat & Cicer, circumuoluendo se ut Eruo. Vnde nomen Orobanche. Dicitur a recenti Græcia & Osprioleon, & Leonteos botane, hoc est, Herba leonina.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex maleficio nomen Orobanche fecit antiquitas. Et quoniā fruges, legumina, Eruiq; præsertim circūligando se enecat, Erui angina dicta est. Id enim Orobanche græcis significat. Qui quoniā ea in uitæ humanæ usum aliquando ueniret, leguminūq; cocturam sæpenumero adiunxerat, in damnāda eius fama, hanc saltem illi gratiā habuerunt: ut in cōmuni frugū, leguminūq; omniū iactura solum Erui strangulare crederet. Quod ut Theophrastus ait, cirris quibusdam circūligando se facit. Numerat ille primū libro octauo de historia, mox quinto de causis plantarū multas huiusmodi nocentes alijs plantas: quæ aut adnascētes, aut scandētes, aut circumligantes se, alijs pestem afferunt: cōmunemq; omnibus plantis alias, alias priuatim aliquibus noxā afferentes. Qualis angina Erui hæc est: quæ cæteris quidē omnibus nocet, priuatim tamen & maxime Eruo notissimæ frugi. Nocendi autē causa, infirmitas Erui est. Nocent & aliæ alijs, quas idem Theophrastus eodem loco numerauit, & nos suis locis dicemus. Hanc ipsam Erui anginā Plinius etiam lib. 22. capite ultimo, ait a similitudine canini genitalis Cynomorion ab aliquibus nominari: non mala, neq; inconcinna similitudine, si plantā contempletur aliquis: quæ a radice surgens nudo, glabro, singulariq; caule, in summo folia aliquot confecta, & inter ea emergentes habet flores simul & quasi in glomerem collecta omnia: qua forma caninum genitale in summo est crassius, & quali galeritum. Vidimus nos Erui anginā, nec quicq; inter segetes & legumina per æstatem frequentius inuenitur.

D

De Barbula hirci. CAP. CLX.

τρυγανόχυον

Barbula hirci, quæ ab alijs Come uocatur, breui est caule, folijs Croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, e cuius summo semen nigrum dependet. Vnde nomen inditum est. Hærbæ esui apta est.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophrast.
lib. 7. cap. 7.

Tragopogon, hoc est, hirci Barba, quæ & Scandix a Plinio uocatur, nisi quod suspicor deprauata lectio est. Describitur a Theophrasto in hunc modum. Radix longa, dulcis, folium Croci longius, caule paruo, super quem calix latus, & Barbula, quæ summo uertice in canā & proluxa funditur. Nascitur in asperis, sine usu. Acetarium quidam olus hanc esse falso uolunt, quā uulgo Barbam petræ, & in Gallia Cispadana Barbulam hircinā uocent. Habetur & quæ Gerontopogon, id est, senis, siue præbyteri Barba dicitur, Tragopogoni fere tota similis: nisi quod lacte manat, & radice amara est, non dulci. A Nicandro Geraospogon fortasse nuncupata. Sed & radice dulci carpitur Romæ. Tragopogona uocari & in Trago pisce, inuenio partē subgula eius nigrantē, ut Athenæus auctor est. Tragos porro piscis, Exocæto, qui & Adonis uocatur, similis describit: præter nigrū id quod sub gula eum habere diximus.

EX M. VERG. COMM.

VNa eademq; causa est, cur Hirci barbam, & Comam Romani, Græciq; Tragopogona quondam appellauerint. Cuius si fuerit aliquis oculatus testis, nihil a ueteribus dicit aptiore imagine descriptū fuisse. Non tñ præterq; in integra ætate has notas in ea deprehendit. Quo tēpore em̄ florēt, pauloq; ante descriptū calicē, & ex calice prodeuntē comosam lanuginē, & capillamenta ex se fundit: a qbus Cōma, & Hirci barba dicta est. Eā lib. s. de historia plantarum Theophr. aptiore pictura, et his uerbis effigauit. Quidā uel alia innumerabilia nomināt. Int̄ quē & illa est quā Hirci barbā uocant. Cuius radix longa & dulcis: folia Croco similia, longiora tantum: caulis breuis, in sumō cuius ingens calix est & barba, de sumō uertice cana pendens, proluxa. Nascitur sponte sua in aruis. Sed crescit etiam altis in hortis, aut pastinato altiusq; subactō solo. Suspensa enim terra, crassiores & altius radices agit. Non fuit hęc quondā in honore hortorū. Nos etiam meminimus in maiore precio q̄ nunc sit aliquando fuisse: tam nec in gustu & ganea nobis ipsis constamus. Ethruria, gentēq; omnis nostra, q̄ in asperis & petrosis nascitur, Saxifragam, alieno illi assignato nomine, ubiq; uocat: nihilq; hyeme notius, & ad acetaria paratius, præsertim radice, quē una in hac plantā ob dulcedinem suam non ingrātū habet usum. Quod animaduertat aliquis in ea est, dicere Plinium in asperis nasci sine usu. Sed congruentibus alijs notis, non multifacienda est saporū per tempora gratiæ uarietas, & inconstantia.

De Ornithogalo. CAP. CLXI.

Ornithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, a quibus flores prodeunt, foris hærbacei, & cum hiantes se pandunt lactei uisuntur. Inter quos dissectum ut milio capitulum emicat. Coquitur cum pane ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

BARBARI COROLL.

Ornithogale, siue Ornithogalon, caulem habet semipedalem Plinio, Dioscoridi duū palmarum. Coquitur in pulste.

De Tuberibus. CAP. CLXII.

Tvera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescentes. Vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.

BARBARI COROLL.

Tvera Græce Hydnon a Galeno dicitur. Quidā a tumore legunt Oednon. A Theophrasto describitur, carens medulla, neruis, uena, cortice. Hoc & Aschion ab eodem autore nominatur. Sunt & alia sine folio, aut herba, aut caule supra terram pluscula, cibo idonea, in Aegypto maxime, ut Aracidna, & quod Araco simile uocatur a Theophrasto. Plinius Aracos appellat fructum. Duo hęc pariunt sub terra, non minorem superno: cuius pars carnosā radicem mittit altā atq; crassā, simplicem, cæteras uero quibus insidet fructus, graciles atq; multas, & summo cespite coherentes agit: nec folium, nec herba ulla, aut quicq; aliud supra terram ceruitur. Loca modice arenosa diligunt. Quia porro geminum et utraq; parte fructū ferunt, Amphicarpa cognominantur.

EX M. VERG. COMM.

Nihil quod medicinā augeat, aut instruat Tuberibus Diosc. tribuit. Terrestris tñ substantia cōcerni, & constare ueteres aliqui dixerunt, & extenuandi aliquam habere potestatem. Credidit antiquitas, cognationem illis aliquam cum cœlo esse, nec nisi tonante Ioue nasci. Quod in Satyra Aquinas poeta monuit dicens. Et facient optata tonitrua ecenas Maiores, &c.

De Smilace. CAP. CLXIII.

Hortensia Smilax frutex, cuius semen a nonnullis Lobia uocatur. Folia habet Hederg, molliora tamen, tenues caules, & capriolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adolefcunt, ut topiarum quoddam tabernaculum effingere uideantur. Fructum foeni græci profert longiorem, & corpulentum, in quo semina renū simi-

A

ὄρνιθόγαλον

B

ἵδνον

Pli. li. 19. ca. 23

*

σμίλαξ λόβια

Clia, sed inæquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Fructus cum semine in oleribus Asparagi modo manditur. Vrinam ci-
et, & tumultuosa somnia facit.

B A R B A R I C O R O L L.

Smilax cepea, id est, hortensiana, non eadem uidetur esse cum ea, quæ læuis a Dioscoride. 4. libro cognominata est. Recentiores cum Aetio Phaseolum a Dioscoride hoc loco intelligi scri-
pserunt, utiq; non candidum, sed rubentem, qui & Lobos & Doliehos dicatur, & latine Sili-
qua. Erem duo esse Phaseolorum genera, Paulus Aegineta in compositione quadam ad Renum
uitia, quæ *diatryphos* uocatur, indicat, Phaseolos in eam quærendo candidos: quasi sint etiam
non candidi. Quancq; est ubi Plinius Siliquam sylvestrem dicendo, satiuam quoq; fieri posse ali-
quam intelligat, de quo in *Smilace* tractet latius. Porro Theodorus cognomento Priscianus,
quancq; recentiusculus, Phaseolo inquit uirtutem eam tribuunt, ut & uentrem soluat, & urinam
moueant. Dioscorides Phaseolos aluum, Lobia, siue Smilacem urinas ciere uoluit.

E X M. V E R G. C O M M.

Credidit Barbarus, nominis similitudine persuasus, quoniam Phaseoli alterum genus Lo-
bon græci uocent, & hic Lobia, Smilacem hanc a quibusdam uocari, ait legumen illud hoc
loco indicari: quoniam & id capreolos, seu clauiculas aliquas, quibus nitatur & implicet solia
bet: & in utroq; Phaseolo, renibus similia semina sunt, & in rubente hoc amplius idem color.
Nobis tamē parum uerisimile uidetur, ad eam altitudinem & frondium copiam esse legumen
aliquod augeri, ut scenas & tabernacula uestiens inumbret. Id enim *σκηνωσις* græcis, et hinc
scriptori significat. Sunt autem græcis *σκηναι*, id est, Scenæ quæcunq; in castris, alijsue locis ex
frondibus, culmis, pellibus, tabulisq; temporaria domicilia fiunt: quales ad umbram in hortis
aliquando etiam eriguntur. Antiquiores latini Attegiæ uno nomine cuncta hæc dixerunt. Sic
Iuuenalis, Dirue maiorum attegiæ, &c. Quinetiam antiqui hębrearum literarum interpretes,
eius gentis tabernacula Attegiæ interpretati sunt. Barbarus opus topiariū hoc dixit, non fa-
tis, ut nobis uidetur, ad exprimendum uocis illius & uerbi captum.

D

De Medica. C A P. CLXIII.

medicus

MEDICA cum recenter prodijt, folijs & caule trifolio prater
si similis est. Procedens uero folia contrahit, caules edens tri-
folij, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Quod in cornu
cula incuruatur. Id siccatum iucundi saporis gratia, conditaneo sali am-
miscetur. Viride semen quibus refrigeratione opus est, illitu suffragat.
Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Medica nominationē unde inuenerit, testatur ipso nomine: q̄p̄ imperitia uulgi Melica uo-
cari cepit. Theophrastus perire stercoratum putauit, aut mincū pecoris incumbens resper-
sam. Per bella Persarum, quæ Darius intulit Græciæ, aduecta scribitur. Differt ab ea quæ Me-
dion uocatur, ut suo loco indicabimus. Medica scribitur iactato semine, ita ut pabulum, & fru-
mentū, tanta dote, ut uno sari plus tricenis annis durare credat. Similis est Trifolio, caule folijs
q; semper uiuens, ut Dionysius est autor. Item geniculata. Quicquid in caule assurgit, in folia cō-
trahitur. Sexies reflorescit: cum minimum, quater, modo non secetur. Arefcit furculosa. Postre-
mo in puluerem inutilem extenuatur. Pabularium omnium cōmendatissima. Hac quondam
plena erat Venetia, sed pridem perijt. Nunc in eandem prouinciā reuerti eam, quasi possi-
minio curauimus, ab annis multis fere non uisam in Italia, sed ne intellectam quidem magno
pere qualis esset, allatam ex Africa in Campaniā. Semen eius, sub dente Phaseoli recentis sapo-
rem presentat. Propter altitudinem radicum eius reliquę herbe intereunt, sine ipsius damno.

De Aphaca. C A P. CLXV.

aphaca

Aphaca in aruis nascitur, altior lenticula, tenuioribus folijs. Sili-
quas maiores fert, in quibus terna quaternauae semina, lente
minora, continentur. Quæ adstringendi uim habent. Quare torrefacta,

Stomachi aluicq; fluctiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

BARBARI COROLL.

Aphaca differt ab Aphia, quæ olus item est, ut Aphaca, florẽ edens cum germine. Differt & ab Apharca, quæ arbor est Vnedoni similis, ut diximus. Aphacam Theophrastus modo leguminum generi, modo inter olera connumerat. Et ut uerum fatear, idẽ, an diuersum genus sit, fere ambigo. Olus inquit est Aphaca, imbribus ab Aequinoctio primis germinans, per partes florendo, amaritudine ingustabili, aculeata herba; uerum ex mitioribus properat flos eius. Sed breui marcescit, & in lanuginem pappum uocatam soluitur: deinde alius subnascitur, atq; iterum alius hyeme tota, & uere usq; in æstatẽ: qui & luteus fit. Forma filiquis Aphacæ latiusculat ut Lenti: celeriter perit, ut Dolichos. Necatur a Securigada. Semen præter alias differentias madidius est, q̃ Lentis. Inuenio e recentioribus, qui uitiam esse Aphacem existiment.

EX. M. VERG. COMM.

DE Aphace Plinius lib. 27. cap. 1. nihil non ab hoc scriptore dictum, isdem, totidemq; reddidit uerbis. Aphace tenuia admodũ folia habet: pusillo altior Lenticula est. Siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaternaria semina sunt, nigriora, & minora Lenticula. Nascitur in aruis. Natura ei ad spissandum efficacior q̃ Lenti. Reliquo usu eosdem effectus habet: Stomachi, aluicq; fluctiones sistit semen decoctum. Et hæc Plinius. Barbarus post eũ in Corollario suo, quæcunq; in Theophrasto lib. 8. de plantarum historia de Aphace leguntur, totidem uerbis pariter reddidit. Sic nihil fere quod adiciamus relictum nobis est, nisi quæ diuersis locis ab eodẽ Theophrasto dicta sunt, breuiter collegerimus: hæud sane, quia collectis his digito legentibus Aphacẽ ostendere cogitemus, sed q̃ coaceruatis in unum tot notis, faciliõ poterit alicui rei nobis incognitæ coniectura esse; & quod se nobis non obtulit, alijs se offerre. Diximus non multo antea, cum de agresti Lactuæ ageremus, quale herbarũ genus esset quod Theophrastus ἀρωγὰν nominauit. Ex eodem genere, eodem autore Aphacæ est: idq; hic ipse etiam testatur in aruis nasci dicens. Nullam itaq; in ruris, hortorumuẽ cura culturam Aphacæ habet: quærendaq; in aruis est quo tempore inculta cessant. Retulit idem, non admitti in cibos Aphacem; ob amaritudinẽ suam, similia agresti Cichorio folia habere. Primam appetentẽ uere florere, citissimeq; senescere, florem in lanuginosos pappos resolui, pluraq; alia in ea fieri: quæ omnia a Barbaro collecta, relinquenda a nobis sunt. Ex quibus non facile ratiocinetur aliquis, uitiam notissimam omnibus frugem esse: & si congener, aut similis illi sit, syluestrem omnino existimandam esse.

De Porro capitato. CAP. CLXVI.

Capitatum Porrum inflationem facit. Noxium succum creat. Tu multuosum somnum parit. Vrinam ciet. Aluo accommodatur. Extenuat. Oculorum aciem hebetat. Menses pellit. Sed lædit exulceratam uescicam, renescq;. Cum pusiana uero coctum, esu pectoris uitia extrahit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deflectionibus, ad præclusiones uulvæ & duricias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctũ, aut frigida maceratum, dulcescit, et multo minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam uim habet. Quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat. Contra omnia thoracis uitia, tabemq;, pro delinctu efficax est. Arteriam esu purgat. Sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Cum aceto & thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia, illita cum uua rhois, qua ad obsonia utuntur. Epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpũt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis & æquali baccharum myrti pondere bibantur.

A

Theophr. lib. 7. cap. 7.

B

ἀρωγὰν
κισσώτου

Pli. li. 19. ca. 6.

C **B A R B A R I C O R O L L.**
Porrum, siue Porrus, die a fatu decimonono interim uigesimo prorumpit. Biennium per-
 fert ab eo tempore sementescit, emoriturq; Vermiculi Porros, Brassicam, Laciucalq; infestan-
 tes, & alia quædam olerum, Præstocurides uocatur: quasi Porricidæ, aut etiam, ut Palladio ui-
 detur, Herbicidæ: non ut Theodorus, Blattæ alueariorum, apud Aristotelem, q; *κρυπιδίων* pro
κρυπιδίων legerat, etiam si tineas alueorum in Columella dici legimus, ex fercore papilionum na-
 scētes, et Lucifugas Blattas in Marone. Nascitur et in mari Porru, extra Herculis columnas, ut
 Theophrastus ingit, sed inter Algarū gña. Capitatum Porrum, Græci Cephaloron appellant,
 & Gethyllida. Sunt q; Gethyllida, p Gethyo acceperint, qd & Epithyllida uocauerunt. Didy-
 mus uir doctissimus is, qui tria milia et quingenta scripsit uolumina, Gethyū simile facit Ampe-
 lopraso, mox dicendo, Gethyllides, ut Athenæus ingit, Latonæ sacras esse Græci uolunt: qm o-
 lus id in Malacia pregnans Latona concupisser. Delphis legem esse, ut qui maximam attulisset
 Gethyllida, sportulam e sacerdotis mensa caperet. Has magnitudine Rapi crescere nonnun-
 q; tradunt, Gethyon inuenio, & Getion sine, y, & aspiratione scribi.

E X M. V E R G. C O M M.

Liberalis cibus Porrum est: non tamen a natura tantope damnatū, ut non medicinam mul-
 tiplici remedio etiam instruat: præsertimq; q; ueteres, qm in caput creuisset, Capitatum dixe-
 runt. Cui maiores q; sectiuo ad omnia effectus antiquitas tribuit. Quapropter & hic de Porro
 acturus, id genus elegit qd ad medicinā primū haberet bonitatis honorem: eaq; est causa, cur
 capitati tantum meminerit Dioscorides, ne quis forte adiectum Porro capitati discrimen mire-
 tur. Vtrunq; enim Porri genus, sectiuum, s. & capitatum, eadem omnia potest, sed capitati effi-
 caciior uis. Et quoniam ubiq; inuenitur utrumq; ideo alterius tantum & efficacioris usum Dio-
 scorides probauit. Nihil in disciplina ruris sectiuo & capitato Porro frequētius in antiquis est.
 Laudauit Martialis in Xenijs suis utrumq; in altero sita, in altero niueum stipitem describens.
 Neq; ab re: quando discrepent inter se, satio, cultura, & forma.

ἀμπελόπρασον

¶ De Ampelopraso. CAP. CLXVII.
Ampeloprasum stomacho magis aduersatur. Et plus Porro ex-
 calfacit. Vrinam & menses uehementius ciet. Id contra serpen-
 tium morsus esse conuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

Ampeloprason dictum est, quoniam in uinetis folio Porri nascitur, ructu graue.

E X M. V E R G. C O M M.

Non fuit Plinio, nec post eum tot alijs cura latinum nomen Ampelopraso dare: græcorūq;
 appellatione usi omnes, cogitandū legentibus reliquerunt, inter uites nasci hoc Porru. Id enim
 græcorum uox illa indicat. Nos præter id syluestre Porru etiā Ampeloprason diximus: nec li-
 ne autōre. Siquidē Paulus Aegineta lib. 6. sic illud nominauit. ἀμπελόπρασον οἷον πρᾶσον ἐν ἄρμεν.
 Rursusq; lib. 1. capite de his quæ esculentas habent radices, τὰ δὲ ἀμπελόπρασον τῶν πρᾶσων ὡς ἄ-
 γρια ὑπόγεια. Quod est, Sunt autem Porris ficiora Ampeloprasa ueluti syluestria. Credimus
 præterea, nec negligendis coniecturis, perijisse in hoc capite aliqua. Siquidē q; omniū mihi est uerū
 ficiissimus & pbatissimus Diosc. codex, plura alia habet ad historiā, diuersasq; appellationes Am-
 peloprasii pertinentia. Quæ licet ex Galeno accepta uideant, consiliū tñ, institutūq; Diosc. in de-
 scriptionibus his habent. Numeratq; esse illi caput Allio simile, folium Titimallo, florem pure-
 pureum, caulē Lychnidi herbæ æqualē, et semē Nasturcio simile. Plinius etiā pter ea quæ nūc in
 Diosco. legunt, ructu graue ait esse: eruptionem sanguinis per genitale cōpescere, & ob eandē
 causam a partu mulieribus dari: dari & contra canum morsus, nonnullaq; alia. Quæ ignorat-
 se, præsertim tam multa, aut oblitum fuisse diligentem in scribendo hominem, parum uerisimi-
 le est. Quin etiam Paulus Aegineta exulcerare, & incidere addidit.

κρόμμιον

¶ De Cepa. CAP. CXLIX.
Crommion aliqui Polidos uocant, Magi Calabotum, Romani
 Cepam. Cepa longa acrior est q; rotunda, item flaua q; candi-
 da, & sicca q; uiridis, & cruda q; cocta, aut condita. Omnes tamen mor-
 dent. Flatus gignunt, Appetentiam inuiant, Sitim mouent. Et extenuat.

Fastidium pariunt, & expurgant. Aluo utiles sunt. Eæ detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus laxant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. Anginæ eodem perunguntur. Suppressos menses pellit. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cū aceto, ruta, & melle illinitur. Cū aceto autem perūctas in sole utiligines sanat. Et cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Cōtra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. Citæ aluo prodest. In auribus sonitū ac grauitatem emendat. Ad purulentas aureis, & eliciendā earundē aquā ualet. Alopecie earum succo perfricantur, qui celerius q̃ Aleyniū, pilos euocat. Largiore cibo Cepa capitis dolores ciet. Coctaq; uehementius urinam pellit. Eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo uescantur. Cum passis uiuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

B A R B A R I C O R O L L.

Cepæ, aut etiam Cepulæ caua sunt folia: quod peculiare cum Gethyo habet, nec nisi oleribus hæc proprietas. Plura earum genera. Sardix, Gnidix, Samothracix, Setanix omnium minime, sed prædulces. Præterea Fissiles, & Ascalonix. Fissiles appellant, quia hyeme cum sua coma inertes relinquunt, & folia uere detrahunt: nō deniq; diuisuris, alia parte inferiore subnascuntur. Hoc exemplo reliquis etiam generibus uelluntur, ut in caput crescant potius q̃ in seminem, Ascaloniarum propria natura. Etenim uelut steriles sunt ab radice, nec parte illa crassescunt. Maturæ celeriter putrescunt. Seri semine præcipiunt: quia deposite caulem, semenq; tantū reddant, deinde inaniant, & euanescent. Samo, & Sardibus candidissimæ proueniunt. Iulius Pollux e Samothracia cōmendat. De Creticis dubitat, an eadem sint quæ Ascaloniæ: quia satis capitari soleant, sed distant sapore tantum dulci. Reliqua Ceparum genera, de posito proficiunt. Ascalonium genus optimum Columella prædicat. In nomine est & Pompeia Cepa, & Maritima simplex, quam uocant Vnionem Rustici: ea est autem quæ nō fructificauit, nec habuit soboles adherentes. Cepa in rectitudinem dissecta, nō germinat. Radix non ut Allio nucleis includitur, sed tunicis, ut Bulbus et Scylla. Cepæ syluestres non sunt ullæ: ut q̃ apud Aristophanē poetam Thymum pro Cepa syluestri capiunt, errasse coarguamus obiter. Mentem lædi Cepa quidam scripsere. Hippocrates conspectu potius, q̃ esu cōmendasse dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Fit quidā Aegyptijs Porru & Cepe nefas trucidare, & frangere morsu, damnatq; ab ea gente: alioquin in sanitatis usu, & medicina utiles Cepæ fuerunt. Quod contra q̃ in reliqs naturæ partibus fit, quæ uirgæ Lunæ fortunā plerūq; sequuntur: & dū toto orbe ea fulget, subinde augentur: pereunte autem illi luce, & ipsæ paulatim minuunt: una hæc in eius sideris morte & tenebris, speciosiore habitu lætiorq; fiat & germinet. Accessit ad eā supstitiōe etiā, q̃ inutiles feriatis, in lætitiāq; agentibus, pariter & ieiunio castitatē custodientibus essent: his, q̃ sitim et cibi appetentiam excitarent: illis, q̃ lachrymoso odore quæ habent, optatam per ferias lætitiā turbaret: & quas in diuturna re Dei munere lachrymas, tristitiāq; animi mortales fugerent, inuiti lachrymoso ostre admittere cogerent. Erant & alię supstitiōis Aegyptiæ in hac ipsa re causæ, nō minus ridiculæ: quas Plutarchus cōmentariolo illo quod de Iside & Osiride scripsit, longius & diligentius indicauit, a nobis aliud modo agentibus, relinquendæ. Quæ Ceparum ex nationibus diffusiua antiquis fuerint, Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, & ab eo accepta omnia uicesimo uolumine Plinius, longius docuerunt.

De Allio. CAP. CLXIX.

Allium græci Scorodon, alijs Geboscon, alijs Elaphoscorodon uocant. Quoddā satiuū atq; hortensium habetur. Quod in Aegypti

A

Pli. li. 19. cā. 6a

B

ἐν ὁδοῖς

z in

Cpto, singulari ut Porru capite cōstat, dulce, ī purpureū uergēs, parū. Reliqua uero magna & cādida, ex plurib. coaugmētāt nucleis, q̄s Aglithas grēci nomināt. Aliud est syluestre, q̄d Opioscorodō, i. Anguinū uocant. Vis Allij acris ē. Excalfacit. Mordet. Excernit. Aluū turbat. Inflatōes facit. Stomachū exiccat. Sitim gignit. Flatū permouet. Acīe oculorū esu habet. Eosdē effectus p̄bet Anguinū, q̄d et Elaphoscorodō dicit. Latas uē tris tineas in cibo sumptum abigit. Vrinās detrahit. Contra uiperarum īctūs, et priuatim hēmorrhoidum prodest, ita ut non aliud magis, si cū uīno iugiter adsumatur, aut tritum in eodem ebibāt. Cōtra rabioforū morsus, et illitu, et cibo ualeat. Magnē et Allio utilitates cōtra aquarū mutatiōes. Vocem clarificat. Veterem tussim crudū, coctum uel lenit. Potum aut cū origani decocto, pediculos et lendes enecat. Cremati cinis illitus, fugilatiōibus cum melle, et alopecijs cum nardino unguine medet. Eruptiones papularum cū oleo et sale sanat. Vitilignes, lichenas, lētignes, ulcera capitis manantia, lepras, et fursures eximit. Cum thure et tēda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. Contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruēscitā comā ius, scēminarum defessionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. Facium ex eo & nigra oliua intritū, esu cit urīnā. Laxat uenarū spiracula. Hydropicis utile.

D
The. li. 7. ca. 4

B A R B A R I C O R O L L.

Allium, siue caput Allij, habet plures uelut coherentes nucleos, siue spicas, quas Grēci Cēges, & Aglithas. Dorice ipsum quoq; Alliu Aglidion appellant q̄nq; Discrimen, q̄ aliud prēquox est, sexagesimo die maiorefcens. Aliud serotinū. Est et in magnitudine diuersitas. Vlpicū nominatur prēgrande. Grēci Cyprium, & Antiscorodon prēcipue celebrātum Africā, ob id & Aphroschorodon, siue a spuma dicitur, a nostris Allium Putricum uocari consueuit, sed rudum, inter pulmentaria ruris, quē Myrtotos appellant, Allio trito in oleo & aceto: ut mirari sit, quantū ita increfcit spuma. Myrtotos ab odoris fastidio est dictus. In hūc & caseū q̄q; addebāt. Alij genus placentē faciūt ex oleribus, ut Phoriō. Nos in Dioscoride q̄d hac parte Myrton legitur, Myrtotō legendū monemus. Est & in nucleis diuortium: quo em plures fuere, hoc asperius sentit. Genus esse Theophrast. ait, sine nucleis. Radix primo extumescit in nucleos; deinde curuatur: ubi accreuit, diducit iterū in nucleos, & ex uno plura fiūt, p̄sertim Vlpicū, ut Cepa; nisi matura p̄tinus uellant. Scordiō a Scorodo, idest, Allio, itē ab Ophioscorodo, idest, Allio syluestri differt. Quāq; impitua medicorū sit, ut Allis syluestre pro Scordio in pasillos theriacos addi soleat: cū tñ Scordiū folio Trixaginis, nō Allij descriptū legant: si mō autores bonos audire sustinent. Sunt in Allio q̄dem capita, sed nō solo: nam & in Cepa, & in Porro capitis et capituli nomen legas apud Columellā. Alliorum Manipulum Grēci τριπηνδυον appellant, adhibent foliū quibusdam sacris, ut Photion inquit: in quibus mos erat, Allium mansitare, ne unguentā redolerent. Comas eius cum capite solo Molyzam Hippocrates appellat. Caput ipsum cū am Datis uocatur. Quāq; Datis Lampadem quoq; pusillam significat. Galenus auctor.

E X M. V E R C. C O M M.

Fuit quādam, & adhuc est Alliu, sicubi lōgius ab urbibus īnocētius uiuitur, honestū simul & gratū rusticā plebi obfonsū. Nisi em id sit, nō cōtundisset messoribus suis Allia Serpillūq; Maionia illa Testilis, quos uerisimile iustūq; erat, lautiore epulo p̄ messē sole & ope defatigatos, a muliere excipi: nec q̄ in comordia īexpectatā fortunē seruus mutationē Theatro significabat, ridicule dixisset, tā beate tunc agere omnes, ut q̄ antea calculis ab egesto statim fimo sedē extere cōsueuisset, tūc relatis ad eā partē integris Allijs idē facerēt: quasi nihil ex antiqua paupertate numerare sibi liceret, quo neglecto melioris fortunā mensuram augere posset. Eaq; ob causā, in ruris honore, & hororum disciplina non contemnendum locum inuenit Allium.

Docuerūt ueteres longius, quot Alliorū genera, & quo cultu in hortis colenda essent, nō negli-
genda ab his, q̄s aut nūq̄ satis cognita naturæ maiestas delectat, aut ad iustas, piasq̄ & certas
opes a scenore & mercatura innocēs augēdæ rei studiū cōuertit. Poterūt nouisse ea oīa cupien-
tes Pliniū, Columellā, Palladiū, mille alios de tota hac re longius agētes cū uoluerint audire.

De Scordopraso.

CAP. CLXX.

Scordoprasum magnitudine Porrum æquat, qualitatū Porri &
Allij particeps. Vnde promiscuas sibi uires ex utroq̄ uendicauit,
effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum Porri mo-
do dulcescit, & in olerum uicem transit.

EX M. VERG. COMM.

Quale hoc simul Allium & Porrum ueteribus fuerit, incertū nobis est. Pliniū, quod ha-
ctenus legerim, nullibi eius meminit; nec rei rusticæ scriptores alij; solus Paulus Ae-
gineta, breuissimēq̄ in sexto inter Allia id numerauit. Verba eius sunt. Porri & Allij mixtas ha-
ber qualitates & uires Scordoprasum. Monstrum aliquod naturæ credimus id fuisse, coactis
humano opere coalescere simul, non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica
aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuerunt.

De Sinapi.

CAP. CLXXI.

Sinapi hortensium, aliqui Napi, Romani Sinapi uocant. Eligī debet
maturum, ualde ruffum, non magnopere siccum, sed quod fractum
interne uirescat, & quodam succo madeat, cæsum colore. Siquidem re-
cens id genus, adultumq̄ habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, ex-
trahendum efficax est. Ad eliciendā capitis pituitam manditur. Con-
tra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq̄ arteriæ scabrie-
ciem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur. Sternutamen-
ta ciet, tritum & naribus admotum. Comitialibus quoq̄ auxiliatur. Fœ-
minas uulnæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, il-
linitur cum ficis ammistum, donec rubescat locus. Ad coxendiciū cru-
ciatus, lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualetu-
dinis causa, ex alto uitia extrahenda sunt. Alopecij illitum medetur.
Faciem purgat. Sugillata cum melle, adipe, aut cærato rapit. Feræ im-
petigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra februm circum-
itus aridum bibitur, aut potui polentæ modo inspargitur. Extrahenti-
bus emplastris, scabiemq̄ extenuantibus utiliter ammisceri solet. Graui-
tati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudi-
nes oculorum, & genarum scabrias magna utilitate illinitur. Expressus
recenti semine succus in sole siccatur.

BARBARI COROLL.

Sinapis, & Sinapi, & Sinape mediā producta legitur. Græcia & Napy uocat, quasi Naphy,
ut Athenæus interpretatur, quoniam acri, & proinde incommoda natura esse uideatur, addit
& pusillo corpore. Sinapi uero dici putat, quia olfactum luminibus officiat, ut Allium. Athe-
nenses etiam Thapsi, & Saurion appellant. Quinto die post factum comparet, eoq̄ semel satō,
uix est liberare locum: quia semen cadens protinus uiret. Tria eius genera. Gracile. Secundum
Rapi folijs, Tertium Erucae. Optimum Aegyptium, præsertim ad Sinapismum: in quo usu &
Syriaticum dabatur. Succus tribus modis exprimitur. In fictili, calescitq̄ in eo modice ad so-
lem. Exit & cauliculo inciso lacteus, ad dentium dolores cum induruit. Fit & oleum ex semi-
ne, ut docuimus. Pro pulmentatio quoq̄ in patellis decoquitur, citra intellectum acrimoniæ.
Coquuntur & folia, sicut & reliquorum olerum. Pythagoras principatum ei dedit. Inter ea,

A

scordopraso

sinapi

B

Pli. li. 20. ca. 22.

C quorum uis in sublime fertur: quia non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Sinapis a Dropace distinguitur, q̄ Dropax cum pice fit: eoq̄ Pittorois, & Pittosis quoq̄ dicitur, hoc est, Oppicatio. Sinapismus e Sinapi conficitur, multoq̄ uehementior est Dropace. Propterea Sinapismus Dropax uel praecedit, ut praeparer, uel consequitur, ut reliquias ab soluat. Maxime laudatur Dropax, Gallus cognomine.

E X M. V E R G. C O M M.

F Vit Samio sapienti quondā Sinapis in maximo horrensum omnium, quibus tantū cum toto discipulorum grege magister uescebat, honore & precio. Neq̄ ex tam multis, quas habebat fanitate & ualitudine uires & usus Sinapis, aliquid magis priusq̄ admirabatur & amabat Pythagoras, q̄ in altū sublimeq̄ ferri uim eius, & quasi in coelū niteretur, cū per nares in cerebrū penetrasset, purgatoria & ad usum mentis uegetiora illic omnia ab ea fieri. Laudata ab his magnopere etiā, qui medicinā homini in tam multis quotidie morbis facien tes, nihil ad calefaciendum, siccandūq̄ aptius & praesentius datū sibi a natura inuenerūt. Recepta eadem in uitae & sanitatis usu iam pridem est: nec hyeme ad intinctus quicq̄ frequentius ubiq̄ cibis intermiscetur, gratissimo obsoniorū condimento, nisi acrimonia feruoreq̄ suo non sternutamenta tantū, sed lachrymas etiā cieret. Quod solū in carmine suo Columella illi obiecit, dicens. Seq̄ laessenti letum factura Sinapis: quasi omnium animantium sensu, modoq̄, & ipsa nocētibus sibi renoceret.

De Nasturcio. C A P. CLXXII.

καρδαμύς

C Ardamon, alijs Cynocardamon, alijs Iberis, alijs Cardaminæ ca, Aegyptijs Semeth, Romanis Nasturcium dicitur. Optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre. Excalcit, Stomacho aduersatur. Aluum turbat. Tineas excutit. Lienem immittit. Partus exanimat. Vrinam cit. Venerem stimulat. Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle, lienem extenuat. Fauos expurgat. Pulmonū uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium uenenis potum resistit, atq̄ eas suffitu fugat. Capillorum defluuia cohibet. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinitur. Tumores collectionesq̄ discutit. Emitterit furunculos, illitum cum muria. Herbae ad omnia eadem effectus, licet minor.

Pli. li. 20. ca. 17. lib. 19, ca. 8.

NASTURCIUM die quinto nascitur: duorum generū, mite, ac syluestre. Prioris quoq̄ ratio duplex, albi, & nigri. Nomen ei a nariū tormento, uigoremq̄, uel proverbio significat, iubente Nasturtiū mandendū inertibus, quasi torporem excitet, animūq̄ obacuat, contra uenerem inhibeat: q̄q̄ Dioscorides accendi eam putet. Mirae amplitudinis in Arabia dicit gigni. Nasturtiū herbis reliquis succū admittit iuxta satis, quod & apud Aristophanē poetam legit. Hanc Graeci non modo Cardamū, sed etiā Cardamida uocant, ut Galenus inquit, & Hippocrates Sauridion, a Sinapis, quod & Saurion dicit, similitudine. Milesium Nasturtiū ueteribus laudatissimum fuisse, Iulius Pollux auctor est, Persas id cū sale mensis apponere solitos, celebre est, cum principio frugalitatē amplecterent, mox aucto imperio, in omne genus luxus prolapsi.

E X M. V E R G. C O M M.

Eius plures quondā, ut uidet, appellationes fuerunt: sed oēs ex eodē principio, & ab eadem Cardami appellatione, excepta Hiberide, q̄ agreste Nasturtiū est, ut in. i. uolumine diximus, in Dioscoridis cōmentatiōes has irreperūt. Cynocardamon em̄, et Cardamitice solo noīe statim Cardamon indicāt. Hiberis uero, ut hic paulo ante dixit, & ut nos auctore Paulo Aegineta tūc cōfirmauimus, agreste Nasturtiū est. Has ipsas uoces oēs Apuleius etiā in Cardamo numerauit: inuicē sibi ideo ridentes, quoniā inter satiuū & agreste Nasturtiū maxia similitudo patitur & uiriū oīm sit. Ob eamq̄ cām uagis appellationibus inter se utunt. Notū nunc olus ubiq̄ Nasturtiū est. Contra uenenata p̄cipue usus eo Nicāder: usus & hic ipse cōtra Cenchridis uenenū, quēadmodū tunc copiosius docebimus: usus & Paulus Aegineta, Graecorūq̄ medici oēs totiens, & in tā multis, ut non contemnendā medicinā partē solum Nasturtiū expleat.

De Thlaspe.

CAP. CLXXIII.

Thlaspi, aliqui Thlaspidion, alij Sinapi persicum, alij Myiten, alij sylvestre Sinapi, alij Dasmophon, alij Myopteron, alij Bistron, Aegyptij Sintempsum, Romani Scandulatum, alij Capsellam, aut Pedem gallinaceum uocant. Hærbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpinguibus, in cacumine diuisis, sesquipedali cauliculo, tenui, non sine adnascensibus ramis, fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente, semine Nasturcij incluso, lenticulæ effigie, nisi quod infringitur. Vnde nomen accæpit. Flos albiat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens. Bilem & pituitam utrinq; extrahit, potum acetabuli mensura. Prodest ischiadicis infusum. Sanguinem potu educit. Internas subpurationes rumpit. Menstrues ciet. Sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crateias, quod aliqui Persiconapi uocant, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

BARBARI COROLL.

Thlaspe, loculos fert peltarum similitudine, in quibus sit semen. folia latitudine digitali, & longitudine. Galenus Thlaspen, Dioscorides Thlaspi neutro genere pronunciat. Thlaspidion, & Thlasposin Hippocrates, Peltam amazonicam Iulius Pollux, hederæ frondibus assimilat.

EX M. VERG. COMM.

Galenus genere forminino θλάσπιν nominauit: & quod hic ait, potum sanguinem trahere, ille contra coxendicis dolorem clystere infusum ἀματῶδιν κινῶν, quod est, cruenta euacuare dixit. Adiecit præterea Dioscorides persicum & erraticum Sinape a quibusdam Thlaspi hoc dicti, ex similitudine ut credimus uirum. Plinius non hoc, sed alterum illud genus quod auctore herbario Crateia hic ipse in extremo capite testatus est, persicum Sinape uocari: nec aliunde ut uideretur in primum illud genus, q̄ ex secundo hoc appellatio illa irrepsit. Cæteræ Thlaspis appellationes illæ causam & originem suam nobis non ostendunt; eamq; ob causam sine honore commentationis huius nostræ a nobis relinquuntur.

De Arabide.

CAP. CLXXIII.

Drabis hærbula ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroq; latere folia, ceu Lepidij, sed molliora, & candidiora. In cacumine uero Sambuci umbellâ gerit, candidos flores habentem. Hærbula hæc cum ptisana coquitur, in Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere obsonijs ammiscetur.

BARBARI COROLL.

Legebatur Draba, non Araba. Sed huius secundi calce, ubi caput hoc repetit, Arabis, siue Araba, non Draba scriptum est. Galenus, Paulusq; nullâ mentionē huius herbari faciunt.

De Irione.

CAP. CLXXV.

Erysimon, aliqui Chamæplion, Latini Irionem uocant, Magi Herculis Alphita, Aegyptij Erethmon. Iuxta urbes, domicilia, hortosq; nascitur, folijs Erucae sylvestris, cauliculis in lori modum lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, ut foenogræco corniculatis, semine Nasturcij, exiguo, urentis gustus. Contra thoracis fluctiones efficax est, & si purulenta extulsiuntur. Regio morbo, & lumborum uitij prodest. Contra uenena in delinctu cum melle datur. Illi

A

Thlaspi

Pli. li. 27. c. 2. 130

B

Arabide

Erysimon

Chamæplion

C nitur ex aqua, aut melle utiliter cæcis, carcinomatibus, parotidibus, duricijis mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat, atq; torreatur: uel linteo illigatum, oblito adipe perassetur.

Pli. li. 18. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L.

Erysimon Galli Velarū, Irionem Romani appellant. Inter fruges annuerat, caule ferulaceo, ut Sesama, floreitem ut Sesama foliaceo, amarū, fruticosum, folijs Erucae angustioribus paulo, & sanguineis, omninoq; ut Theophrastus inquit, Sesamæ proximū: nisi esset pinguisculū, Erysimon nostri herbarij significant, quæ uulgo, nobilis Eruca dicitur, quam & Erucae ueræ præferunt; ut mirū sit, quamobrem inter fruges a Plinio constituta uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

S esset frugibus, leguminibus, & oleribus idem qui homini sensus: liceretq; illis, ut in republica sæpe aliqui fecerunt, mutata fortuna transfugæ, modo harum, modo illarū partium esse: dicerem ego, græcis Erysimon, latinis uero Irionem Bacchi illius modō, qui ab Aristophane in ranis suis, nunc Deus, nunc homo: iterumq; dōminus, mox seruus, uariante fortuna describitur: in alijs scriptoribus inter fruges, in alijs inter olera numerari uoluisse: tam incerta in antiquis scriptoribus historia eius est, tamq; aperte a Theophrasto & Plinio frugum, ab hoc ipso, & Paulo Aegineta olerum generi adscribitur. Nec persuadēbitur unq; non esse frugem Erysimon, seu Irionem aliquis, Theophrastum de eo sic docentem audiens, quo loco lib. 9. de plantarum historia, de frugum culmis in uniuersum sic agit, τῶν δὲ θέρων κίττων μὲν καὶ μάλινον καὶ χαμῶδιον, σινδῶνον δὲ καὶ ἑρυσίμον καὶ πανικῶδιον. Quod est. Aestiuarum autem, Milij scilicet & Panici harundinaceus caulis, siue culmus est, Sesami uero & Erysimi ferulaceus, Rursusq; eodem libro. σισαμὸν δὲ ὀνδύριον ἰσθμίου χλωρόν, ἰσθμίου καὶ ἑρυσίμον, &c. Ex quibus ratiocinari licet, in censu frugum numeratum Erysimon frugem esse, & ex culmo inter olera censei non posse. Plinius item, Theophrastum secutus, frugibus Irionem ubiq; adnumerat, libro. 18. Primum capite. 7. Aestiua quæ æstate ante Vergiliarum exortum seruntur, ut milium, panicum, Sesama, Irionem.

D Mox iterum eodem capite. Sesamo & Irioni sanguinea folia. Nec multo post eodem libro, sed capite. 10. Sesama ab Indis uenit: ex ea & oleum faciunt. Color eius candidus, Huic simile est in Asia, Græciq; Erysimum: idemq; erat, nisi pinguis esset, quod apud nos Irionem uocant, medicaminibus adnumerandum potius q; frugibus. Idem etiam libro. 22. capite ultimo ait. Irionem inter fruges Sesamæ similem esse diximus, & a Græcis Erysimon uocari. Contra hæc olus aperte Dioscorides, non frugum a describit, a Nasturtio statim & Thlaspi, folio erucæ, colicula, non culmo, cornutis in summo siliquis, non spicis aut paniculis, & si fœnogræco similibus: quodq; frugi nunq; conueniat, inter rudera, & circa hortos nasci. Et præter Dioscoridem Paulus Aegineta libro primo capite de Veneris utilitate & usu: quo loco docens, quibus cibis ad uenere uti oporteat, inter cetera monet comedenda, καὶ τῶν λαχάνων τὸ ὀνδύριον καὶ ἑρυσίμον καὶ τὸ ἰσθμίου, &c. manifeste inter olera Erysimum numerans, ut uideatur. Elloq; latinis Irionem, quod Græcis & huic scriptori Erysimon est. Satis tam multis locis testatur Plinius, præcipueq; libro. 22. capite quo paulo ante diximus, quo loco integrum, & ipsam uerbis totū hoc caput latinis reddidit, quod cognouisse omnibus paratum, & in promptu est. In tot itaq; tamq; diuersis antiquorum scriptorum auctoritatibus, temere & impudenter fecerit, qui in hoc, aut illo genere Irionem numerabit: præsertim docentibus Theophrasto & Plinio, feri in agris, & inter fruges Irionem: Dioscoride autem & Paulo Aegineta, per senas locis incultis: & si seratur, in hortis inter olera quod olus sit serendum esse. Nobis, ut credamus frugem a multis existimatum Erysimon fuisse, in causa siliquæ sunt, quas fœnogræco similes Erysimon habere hic ait: qd; inter fruges pabulo destinatas numeratur: a multis uero olus, folio agrestis Erucæ, & semen Nasturtio simile. Antiquiores omnes non secus q; de quoridiana & uulgari re de eo agunt. Alicubi nunc genus etiam parum cognitum est, ignotæ & appellationes illæ aliæ, ideoq; a nobis relictæ.

De Pipere.

C A P. CLXXVI.

Piper in India nasci, breui arbore traditur. Quæ inter initia, prælongum fructum, ueluti siliquam promit. Quod longum Piper est. Habet intus aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum Piper

per euadit. Id autem suis temporibus adustum, racemos emittit grana fer-
rentes, quæ noscimus. Ea acerbæ, candidum Piper faciunt, aptum oculis
laribus remedijs, antidotis, & medicaminibus quæ contra uenenata pa-
rantur, Theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet. Et quo-
niam priusq̃ ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur. Anti-
dotis, & theriacis medicaminibus expetiū. Nigrum uero, utpote quod
tempestiua maturitate collectum sit, odoratū esse constat, candido sua-
uius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. Sed candi-
dum adhuc in acerbum uergēs, prædictis infirmius est. Eligi oportet gra-
uissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime fursuro-
sum, Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina macie confecta, cas-
sa, & inania, quod uocant Brasina, Indorum lingua, sic significante abor-
tum. Vis omnium excalfacit. Urinam ciet. Concoquit. Extrahit. Discu-
tit. Abstergit caliginem quæ oculis obuersatur. Piper febrium rigori-
bus, siue potu, siue illitu, subuenit. Serpentiū morsibus auxiliatur.
Partus extrahit. Conceptum adimere creditur, statim ab initu supposi-
tum. Tussi, omnibusq̃ pectoris uitijs, siue eclegmate, siue potu, succur-
rit. Anginæ eo & melle conuenienter perunguntur. Potum cum recenti-
bus lauri folijs, tormina discutit. Cum uua passa manducatum, pituitam
a capite elicit. Valitudinem tuetur. Dolores finit. Appetentiam mouet.
Concoctionem adiuuat, in embammata additum. Strumas cum pice
discutit. Vitilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, ut aiunt, motum, tor-
retur. Non est huius arboris radix Gingiber, ut aliqui existimauere, si-
cuti paulo post ostendemus. Namq̃ Piperis radix Costo similis est, gu-
stum calfaciens, eiq̃ Hygræ cognomentum est. Hæc lienem reprimat,
cum aceto illita aut pota. Caput etiam purgat, manducata cum uua ta-
minia, quam Staphidem agriam uocant.

BARBARI COROLL.

Piperis genera duo Theophrastus constituit. Rotundi ut Eruū, putamine carneq̃ subrutita
ceulauri baccæ. Oblongi, nigri semina continētis papaueracea, q̃d multo ualidius priore iudi-
catur. Passim in India sunt, ut Plinius existimat. Quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis nostris
similes, q̃q̃ in fronte Caucaſi, foliis opposita, nasci tantū eas aliqui putauere. Semina a Iuni-
pero distant paruulis folliculis, quales in Phaseolis uidemus. Piper quod intēperie coeli carboni-
culatur, lingua Indorum Bregma dicitur, significans abortū. Hoc & pallidum est & asperrimū.
Tria cæteri fecere genera. Nigrū, quod & Cōmune dicitur a medicis, Dioscoride, Paulo, Ac-
tio. Lenius longo & nigro est, Candidum. Piper longū facillime adulterat Alexandrino Sina-
pi. Eritur hoc in libras. 25. album. 17. nigrū. 14. utiq̃ Plinij tēporibus. Nicāder Colophonius,
uetus satis studiosus, non peperit, sed Peperion appellat. Hippocrātes uero medicū Pharmacū.
Aliud genus est apud eundem Hippocratem Indicum Pharmacū, quo foemina, quibus anima
foeret, ora sibi colluit. Medicamentū id est, cuius compositionē reddit ipse. Cæterū est ubi Pi-
per semen Indicum dicatur ab Hippocrate: in quo rotundū, quod inest, Myrtidani uocari pro-
dit. Est etia ubi rotundū Piper Strongylen Myrtidani scriptum reperias in eodem auctore. Syl-
uestre porro gentibus suis est Piper. Piperis arborem iam etiam habuit Italia, maiorem Myrto,
nec absimilem. Amaritudo eadem recenti, & cum lactescit, quæ Piperi. Desyderat toſia illa ma-
tuitas. Ideoq̃ & rugarū deest, & coloris similitudo. Huiusmodi est & quod Lusitani regis dili-
gentissimi Liburnicæ, magna parte meridiani situs ambitu Mauritanie circūuecta, retulere hoc

A

B

Pli. li. ii. ca. 7.
Theophras. li.
bro. 9. cap. 22.

*

Strabo, lib. 17

C anno. Sed abest illa, ut dixi, retorrída rugosaq; maturitas. Nam solibus tostum Piper, e candido & leui mutatur in nigrū rugosumq;. Adulteratur Iuniperi baccis, thire uim trahentibus, in pondere uero multis modis. In Aegypto granū Piperi simile paulo tantū maius nascit, Cori-
on uocatū, ut Straboni placet. Est etiānum in India Piperis granis simile, quod uocatur Gario-
phillon, grandius, fragiliusq;. Tradit in luco Indico id gigni. Aduehebat odoris gratia. Nunc
& cibi, ut Piper, Septentrionis maxime populis. Paulus Aegineta Caryophyllon, non Gario-
phillon uocandū existimauit, quasi nucifoliū: etiāsi hanc inquit non habet naturā, quæ no-
mine prætenditur. Sed flores arboris cuiusdam Indicæ festucacei sunt, & nigri, longitudine pol-
licari, acres, odorati, subamari. Lignū eius Xylocaryophyllon appellant. Ab huius odore uo-
larum genus altilium Caryophyllon, uulgo dicitur, ubiq; modo nascens.

E X M. V E R G. C O M M.

F Ruticem, non arborem Piper ferre affirmāt, albæ uiti, quæ in sepibus plærunc; inuenitur, si-
milem, propinquas scandentē arbores: quæ racemosum fructum ferat, magnitudine ea qua ui-
detur, sed uiridem, nec aliter q̃ in Ligustro coaceruatum, ante q̃ maturitate nigrescat: lectumq;
æstate, ante integrā maturitatem sub sole in palmeis regetibus expandi, caloreq; solis & æstu
corrugari, & nigrum fieri. Nec longum, aut album Piper aliquod iridisse illic se dicunt: esse qui-
dem arbores alias, quæ sapore Piperis aliquid ferant, & inter eas, cui conferre in nostro orbe ali-
quam posse se negant, quæ oblongum ueluti uillum inter folia ferat, ponticæ nucis floribus si-
milem, quod illic longum Piper incolæ appellant. Folium Piperis ipsi uidimus ab eis allatum,
colore pallido magis q̃ herbaceo, longitudine quantum diuicati pollex & index humani di-
giti aperiuntur; latitudine qua parte maxime patet, quatuor digitorū: Plantaginis figura, præ-
terq̃ in summo, cui habet numero pares & figura similes a tergo fibras septem per longitudi-
nem extensas, median claudentibus utrinq; trinis: non tamen ut in Plantagine, utrinq; binæ a
media nascunt, sed inæqualibus interuallis utrinq; prodeunt. In summo fastigiātū, & acumina-
tius q̃ Plantaginis extremū folium est. Definitq; in mucrone eodem, quo in malo medica mo-
do uidetur: non omni, sed in qua folium acuminatum est: idq; in Piperis fructe breui pediculo
pendet, & qua parte a pediculo incipit folium, paulo minus q̃ rotundum est. Quæ omnia di-
cta longius a nobis sunt, nō ut antiquorum historias damnemus, sed ut meminerint toto hoc
opere legētes, q̃ difficilis omnibus medicæ materiæ fuerit, & futura semper cōmentatio sit, præ-
sertimq; ubi parum integra ueterum cōmentaria totam rem miscent.

γίγγις

De Gingiberi. CAP. CLXXVII.

Gingiberis sui gñis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex
parte nascēs. Qua uirēte, ad multa, perinde ad q̃ nos Ruta, utim-
tur. Et primis potibus, & edulijis ammiscent. Huius radices Cyperi mo-
do paruæ sunt, candicantes, & odoratæ, atq; Piper sapore imitantur. Eliza-
gi debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condium
tur, q̃ celeriter cariem sentiant. Ficilibus in Italiam asportantur. Gingi-
beris cibo conueniens est. Et cum condimēto assumitur. Excalfactoriam
uim, & excoquentem habet. Aluum leniter emollit. Stomacho utile est.
Efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt. In Antidota addi
solet. In totum Piperi uiribus non dissimile.

Pli. li. 12. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Zinziber, in Arabia & Troglodytica in uillis nasci dicitur. Parua herba. Precium radices in
libras sex. Quidam hanc & Siniberim, & Gingiberim appellant. Facile perit dicitur Zinziber,
ob incoctā quandam & excrementitiā corporis uliginem, ut Galenus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Quid de Pipere, ex India ad nos reuersi, quæ superiore capite dicta a nobis sunt, retulerūt,
hīdem Zingiber graminis simile in India nasci dixerunt: geniculatū, nouasq; subinde
radices agens, longius sub terra augeri, inueniriq; ubiq; non aliter, q̃ & nostrum gramen: bisq;
aut ter folia per annū proferre, quæ harundinacea sint, sed nō tantæ longitudinis, latitudinisq;
nihil eo frequentius tota illa regione & copiosius nasci, ingensq; saporis discrimen ex tempore.

quo lectū fuerit sentiri. Quodq; Gal. & post eū Paul. Aegineta dixerūt, ideo teredinib. cētari, sentireq; cariem, & pforari, q; crassioris cuiusdā & ineuitā humiditatis particeps sit, fieri id illi dicunt, cum importune per uer ante maturitatem lectum fuerit: esseq; opportunū legendi tempus, cum folia illa aruerint: idq; in effodiendo Zingibere ab Indis obseruari.

¶ De Hydropipere. CAP. CLXXVIII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt. Caulem ædit angulosum, prædurum, multis alis concuum, folia menthæ, maiora, molliora, cādidioraq; gustu Piperis acri, citra tñ illam odoris gratiā. Fructum acrem in furculis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita, tumores, ueteresq; duricias discutunt. Sugillata delent. Quæ postq; inaruerunt, tusa pro Pipere in obsonijs ammiscuntur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

BARBARICOROLL.

HYdropiper, quale sit in Plinio, nondum comperi. Nam Piperitis, quæ & Siliquastrum dicitur, nonnihil ab Hydropipere uidetur differre, non solum medicinæ ulu, uerumetiam descripiōe. Monstratur enim caule rubro, et longo, densis geniculis, folijs Lauri, semine albo, tenui, gustu Piperis, uulgo dicta Costum. Distat porro Siliquastrum a Salicastro, ut in mentione sua docebimus, sicut & a Seliquastrum. Etenim Seliquastrū herba non est, sed antiq; gñis sedile, ut Pōpeius inq; Georgius Tiphernas, Siliquā Cerauniam, in Strabone Siliquastrum interpretatus est pessime. Non desunt qui Perficariam mō nominatam Hydropiper esse suspicentur, quanq; foliū Perfici huic reddatur, unde nomē, Hydropipi uero Menthæ atq; Lauri. Est & in folio Perficariæ litura, maculæ modo inscripta: quæ si fuisset in Hydopeperi, fortasse nō omisissent autores. Est ergo Perficaria folio Perfici, flore cādido, spicaceo, gustu acri, semine minuto, caule nodoso, rubenti, longo: quæ sunt oīa & Hydopeperi tributa. Liberū sit æstimantibus iudicium.

EX. M. VERG. COMM.

Nulla Plinio, latinisq; alijs scriptoribus sub Hydropiperis titulo & uoce planta hæc est. Nec qualem hic describit prope aquas nascentem, inuenire adhuc licuit. Vidimus tamen in antiq;ssimo latino Dioscoride, & qui longobardis literis scriptus, sexcentorum annorum uetustatem refert, Hydropiperis appositam imaginem, diligēti ut erant ea tempora pictura, effigiatam. In qua descriptioni huius scriptoris omnia conueniunt, caulis, geniculi, alarum concauitates, folia, foliorumq; color. Vnum in fructu discrimen tantum est. Quod enim hic ait, in ramulis secundum folia nasci, & acinosum esse: in ea pictura in summis ramulis est uasculi potius q; folliculi, aut siliquæ figura: indicatq; in eo claudi semen, quod hic cum fructu miscet, fructum, uasculum, & in eo semen simul appellans. Quod deficientibus coniecturis alijs, non penitus ab re audisse fuerit. Quemadmodum nec inutile etiam, ex aliquarum plantarum natura cognoscere, quæ aliquando nobis in hoc opere Alarum concauitates in plantis sunt. Græci translata ab humano corpore appellatiōe *μαχαλας* dicunt caua, quæ aliquando bina, aliquando singularia, & ex intervallo semper in plantis uidentur, humanis alis similia, in quibus ueluti lacuna est. Sunt autem homini alæ qua parte brachium humero coniungit ex interiore parte, in quibus non aliter q; in pectore pubes aliqua nascitur, uirosi plærumq; odoris. Earū similitudine, concuos geniculos, quales in harundinibus, & plerisq; alijs sunt, *μαχαλας* græci, Romani Alas dixerunt. Ab Adnatis eo differētes, q; ex alis noua semper germinatio prodit; Adnata uero nullam habent certam partem unde emergant.

¶ De Parmica. CAP. CLXXIX.

Parmica frutex est, furculos habens paruos, multos, & rotundos, Abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa, & in cacumine capitulum uti Anthemidis, paruum, rotundum. Quod suo acri odore sternutamentum excitat. Vnde nomen accæpit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamēta efficacissime mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

D I O S C O R I D I S

C **P** **B A R B A R I C O R O L L.**
Tarmice, sub falso herba gustu, Diptarmice a quibusdam uocari solita, quoniam sternu-
tamentum iterari faciat.

E X M. V E R G. C O M M.
E X re nomen habet Parmice; Parmon enim graeci sternutamentum uocant. In quo egre-
am necesse est habere uim: ex quo tam praesenti salutis augurio & honore, dignata eam Grae-
cia est. In nullo, quod haecenus sciam, herbarum censu sub hoc nomine latinis Parmice est:
& si Barbarus in Corollario suo testetur, a quibusdam hanc ipsam Diptarmicem dici. Me-
morant eam tamen inter graecos Galenus, & Paulus Aegineta, eadem omnia quae Dioscorid.

S **De Radicula, seu lanaria herba. CAP. CLXXX.**
S T R U T H I V M ab aliquibus Cerdon, ab alijs Catharsis, ab alijs
Struthocamelus, a quibusdam Chamærrhyton, a magis Calyrhy-
ton, a Latinis Lanaria herba, aut Radicula appellatur. Nota est hær-
ba, qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris.
Vrinam ciet. Prodest tussi, quam iecur excitauit, & orthopnoeae, ex mel-
le sumpta cochlearis mensura. Aluum soluit. Eadem cum Panace &
Capparidis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat. Duriciem lie-
nis absument. Menfes imposita trahit. Partus enecat. Cum polenta aut-
em & aceto illita, lepras tollit. Tubercula discutit, cum farina hordeae-
cea & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & colyrijs, claritatis causa.
Sternutamenta mouet. Per os purgat, trita cum melle & naribus infusa.

B A R B A R I C O R O L L.
S Truthion, a nostris Radicula uocatur, spinosa herba, non tamē acanaceae. Flos sine odore,
spectabilis aestatibus, caule lanuginoso, Semen nullum, Radix magna, quae conciditur purgan-
dis lanis. Mirum quantum conferens candore, molliciaque. Nascitur Satiua ubique, sed sponte in
Asia, Syriaque, saxosis & asperis locis praecipua. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule se-
culaceo, tenui, & cibus indigenarum expetita, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur.
Folium Oleae, a medicis aureum Poculum uocatur. Hippocrates commendat nascentem in An-
dro insula littoribus. Ab hac similitudine potiorum quoddam uasculum fortasse Struthion ap-
pellatum sit. Smyrnae mulier Galena, flore hunc non Struthio, sed Strythion uocauit. Porro
Strutheum latine, ut est apud Festum, a salacitate passeris membrum uirile significat, praecipue in-
mimis: ut qui passerem, in Martialis & Catulli uersibus, aliter accipiunt, nihil mihi dixisse ui-
deantur. Ne quis in ea re Politianum, quia sine autore loquitur, somniasse cauilletur.

E X M. V E R G. C O M M.
P Linus. 19. uolumine cap. 3. ad candorem & molliciem lanarum Struthij succo usos fuisse
antiquos ait. Idē mox tñ. 24. cap. 11. quod nos paulo ante diximus, his uerbis testatur. Tingenti
bus & radica ramos praeparat, quam Struthion uocari diximus a graecis. &c. Diuiditur in
eodem usu, quod in graecis alioquin unum est: & ramulis Struthij tribuit, quod radicibus illi tri-
buerunt, quae succo saporeque asperae, ad imbibendos colores unguine sordidas praeparat lanas. Possit
quidem quod Plinius ait, purgatas alypo lanas candidiores reddere: sed illud obit est. Quod autem ab in-
sectoribus primum, & ut graeci dicunt προύρπον a Struthio quarebat, purgato sordidum & alypi un-
guine erat. Nescimusque nos, quosnam Plinius ramulos in Struthio appellauerit. Radicibus enim
in tingendo, ut diximus, utebantur: ostenditque latinum nomen, radicem tñ fuisse usum. Neque enim alia ob
causam radica, quae ex potiore usu dicta a Romanis est. Quinetiam, nihil fere excepta radice Stru-
thion est, quam per longitudinem, & in latera sub terra, non in altum extendit, proferentibus
se ex intervallo graminis modo & quasi ex geniculis, quinque in unum collectis plerumque folijs,
ex quibus coliculi cum floribus prodeunt. Vulgaris, & ubique locis incultis nascentis herba, so-
lio ut diximus in cespitem conferto, & per interualla ex eadem radice erumpente. Lauri figu-
ra, uerum maiore. Latini ab usu Lanariam radicem, & herbam, & ab eius praecipua & utiliore
parte Radiculam dixerunt, Vnde autem graeci Struthion nominauerint, non satis nunc patet.

στρούθιον
στρούθινά μιν λαν

Pli. li. 24. ca. 11

nisi forte a foliorum positura, quæ autum alas quadamtenus imitantur, nomen illi fecerunt. *spoudon* enim, & *spoudion* ea gens passerem, & minores alias appellat aues. Quod si in cibos radix hæc transiret, crederemus ob caliditatem, quam in quarto ordine habet, Venerem stimulare, & ob id Struthion dictam. Græci enim *spoudon* passerem dicunt: & ab eius auis salacitate *spoudon*, quasi passerem ad Venerem procliuiores homines, & ex ea ratione id facientem herbam Struthion etiam dicere potuissent. Sed nihil horum pro comperto est.

De Cyclamino. CAP. CLXXXI.

Cyclaminus a quibusdam Cysanthemoni, ab alijs Cysophyllon, ab alijs Chelonion, alijs Ictyopheron, ab alijs Silene, a Zoroastre Triphalites, ab Osthane Aspho, a Magis Miaspho, Aegyptijs Thelce, a Romanis Rapum terræ, aut terræ Umbilicus uocatur. Folia habet hædera, purpurea, uaria, in quibus susq; deq; albicant maculæ, caule nudo, quaternos digitos æquante, floribus in eo purpureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, ut Rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamq; detrahit. Menfes potu appositue ci-
et. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur. Illita, contra serpentium ictus remedio est. Radix immista uino, inebriat. Regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus conte-
tum, loco calido, & perfrictioibus tuto recumbere, quo facilius exudet. Eiecti autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. Ad deijcienda quoq; alui excrementa, in uelle re sedi subiicit. Illito umbilico & imo uentre coxarum tenuis, alui emollit. Sed abortum efficit. Suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus, prodest. Medicamentis abortum inferentibus, amiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduam sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. Eruptiones papularum reprimat. Vulneribus ex aceto, aut melle medetur. Li-
nem absumit. Vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto, luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesq; foueri congruum est. Ipsaq; in oleo uetere feruescunt, illito oleo, ulcera ad cicatricem perdu-
cit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto in-
terdam thyrrenicæ ceræ momento, ut stigmati crassitudinē unguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix Scyllæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.

BARBARI COROLL.

Cyclaminos a nostris Rapum, & Tuber terræ dicitur, ut inquit Plinius, non malum terre, ut Theodorus putauit. Nam Malum terræ, ut Dioscoridi uidetur, Aristolochia est. Erraticum uero malum a Plinio uocatum, & ad calculos radice commendatum, quale genus sit, nondum comperi: præterq; si quis pro Anthemide accipiat, quando utilem uesicæ uitæ eam nouimus. Et Chamæmilon, hoc est, malum terrestre, dicitur a Græcis Cyclaminos. Folia habet minora q; Hædera, nigriora, & tenuiora, sine angulis. Flos ei, ut Plinius scribit, colossinus, & in coro-
A ij

A

κυκλάμινο

B

Pli. li. 21. ca. 9.

lib. 25. cap. 9.

lib. 26. cap. 12.

D I O S C O R I D I S

Cnas admitti solitus. Est autem genus in eo nomine coloris, ut Straboni placet a Colossis urbe Troadis, ubi præcipua lanitij commendatio fuisset: quemadmodum Laodiceæ, Coracinum pecus, a colore item uelleris appellatum. Sed cum duo florum genera Cyclamino reddantur, purpureum, & candidum, uter eorum Colossinus dici possit, extimandum relinquimus. De Coracino Laodicensium uellere, etiam Vitruius. Pernicialia Cyclamino cum olera sunt. Siquidem aduersam ei Brassicam inarescere affirmant. Sphæritis herba quæ sit Aetio, non constat. Quid si Cyclaminon interpretare: cum quæ alopecias emendat, cum quæ Cyclaminos Orbicularia latine dicitur, hoc est, Sphæritis.

E X M. V E R G. C O M M.

Est præter numeratas a Dioscoride Cyclamini appellationes, ubi nostra ætate porcorum, ubi terræ Panis Cyclaminus appelletur. Nullusque non audito alterutro nomine, ubique fere inter sepes & uepres nascentem plantam intelligit, quam subulci pecori suo gratam cognouerunt, et ab eo nomen illi fecerunt, porcinum Panem appellantes. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, a panis figura sub terra latentem eius radicem, terræ Panem uocauerunt. Nihil in agro agentibus nunc etiam notius, nigro colore: radix in orbem circumacta, non tamen in globum surgens, sed ueluti pressa pondere, in latitudinem se explicans, eadem forma qua nunc in quotidiano usu panes uidentur. Qui primi nomen illi fecerunt, circumactam in orbem eius circinationem contemplati, *ἄπο τοῦ κύκλου*, quasi ab orbe Cyclaminon, id est, orbicularem dixerunt. Fuitque hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Secuta ætas, non radicem, sed folia eius contemplata, quæ hederacea essent, Cissanthemon, et Cissophyllon eandem nominauerunt. *ἡ δὲ* enim græci Hederam dicunt: & si in prima hac Cyclamino longe maiora quæ Hederæ folia sint, solamque Hederæ figuram in folio referat. Non defuerunt quondam etiam, qui a testudinis forma, Cheloniam eandem dicerent: quemadmodum non defunt itidem, qui ideo testudinis nomen retulisse dicant, quoniam ea id animal uescatur: quemadmodum contra pisces oderunt, qui non secus quæ ueneno aliquo in aquam coniecta Cyclamino enecantur: ideoque piscium Venatio dicta fuerit. Plinius tertiam Cyclaminum id facere dixit, cuius hic non meminit. Romani scriptoris huius historiam secuti, Rapum terræ, uel Umbilicum, uel Tuber dixerunt: quoniam hic dixerat radicem esse nigram, Rapo similem. Umbilicum autem, quoniam ut in aliquibus circinata forma umbilicus est, sic & Cyclaminus sub terra uideatur. Dico autem umbilicum, non qualis in homine ceterisque animalibus media pars est, sed quales in Epigrammate suo Marialis dixit. Iam peruenimus usque ad umbilicos, extremam uoluminis clausuram, quæ aut nodus, aut fibula opus clauderat. Vidimus nos aliquando Cyclamini radicem, globo & latitudine amplissimi panis: ex qua folia erumpebant: & inter folia flos breui pediculo, potius quæ colliculo surgens, in quo color erat qualem hic describit. Plinius Colossinum uocat. Nec ambigendum de eo colore erit, qui Cyclaminum florentem uiderit. Eundem lib. 25. idem purpureum dicit. Nec uidetur tantum scriptor in his sibi constare. Habet ut uidetur Cyclaminus numerosas, & egregias in medendo uires. quas paulo minus quæ omnes nouit & indicauit ante Dioscoridem Theophrastus lib. 9. de plantarum historia, ostendens & ipse, adalligatum Cyclaminum partus adiuuare: prodesse ad amores: subdi mulieribus: purgare caput: ulceribus ex melle mereri: & ne longiores simus, nihil non idem in utroque est. Addidit Theophrastus, tantum cremari radicem Cyclamini, tum uino restingui, cineremque eodem quo fex modo in pastillos conformatum seruari.

De Altera Cyclamino. C A P. CLXXXII.

Est & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon, aut Cissophyllon uocant, minoribus quæ Hederæ folijs, geniculatis caulibus, crassisque, circa uicinas arbores capriolorum modo se uoluētibus, flore candido, odorato, acinis Hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini drachmæ unius potere potum cum uini albi cyathis duobus triginta diebus, lienem per urinam & aluum absumunt. Ad Ortopnoeam bibitur. Reliquias a partu purgat.

B A R B A R I C O R O L L.

Cyclaminos altera est, cui nomen ab Hederæ floribus impositum Cissanthemos, de qua hic agitur. Plinius & tertiam Cyclaminon demonstratam sibi prodidit, cognomine Chamæcis.

son, uno omnino folio, Radice ramosa, qua pisces necantur. Ideoq; hanc proprie Ichthyoteris uocari autumo, quanq; nomen hoc a Dioscoride Cyclamino primæ datur.

EX. M. VERG. COMM.

Alteram Cyclaminum hanc a superiore illa diuersam faciunt, minus in latitudine exequa, & globosior radix: longiores coliculi, quibus in alias arbores uitium modo ascendit: folia longe q; illius minora, quantitate, incisuris, toroq; habitu hederacea. Ob qua causâ Plinius ait, hanc tantu Cissanthemon dictâ fuisse. Flores candidi, odoratiq; qui in illa purpurei sunt, & sine odore. Acinofus fructus, & qualis in Hedera corymbaceus: & qd ad medicinâ pertineat, radix inutilis, quæ sola in altera illa expetitur & usum habet. Hæc aspis locis nascens, illa in uesperis & in sepibus. Hanc ipsi non uidimus, nec possumus oculati testes eius legentibus esse.

De Dracunculo. CAP. CLXXXIII.

DRACCVNTIVM magnum aliqui Aron, alij Isaron, alij Iaron, alij Geracicon, alij Biaron, alij Armiagrion, alij Cyperida uocant. In umbrosis sepibus gignit. Caulem habet rectu, læuem, duum cubitorum, baculi crassitudine, uersicoloribus draconum maculis, purpureis tamen euidentibus. Folia Rumicis, inflexa. Fructu summo caule facit racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum & purpuram uergentis, radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui uestitam. Colligitur, & dum maturus scit succus exprimitur, sicuturq; in umbra. Radix quoq; messibus foditur. Elotaq; particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatur in umbra. Cum diluta potione crudam, coctamue, cum melle delingi prodest, contra orthopnceas, rupta, conuulsa, tussim, & destillationes. Pota cum uino uenerem stimulat. Ulcera quæ cacœthe uocantur, atque phagedanica expurgat, præsertim cum uite alba. Ex ea & melle collyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur. Ad uirilignes cum melle efficaciter illinitur. Polipos, & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albuginesque effectum præbet. Herbae, radicisq; odor, teneros conceptos abortu uiuat. Item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius succum cum oleo, aurium doloribus infudere. Quinetiam folia, utpote quæ adstringant, uulneribus recentibus imposuere, & cocta in uino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse a uipera feriri, inficiantur.

BARBARI COROLL.

DRacunculus a caule uario draconis more dicitur: siue a cauda, quæ illi subrutula est, & draconis intortito modo conuoluta. Diffonât aliquatim in hoc genere scriptores. Alijs Dracunculum ab Aro separantibus. Alijs idem existimantibus. Glaucias Dracunculum syluestrem Arum uocabat. Phœnias Aron, & Aroniam. Aliqui radicem Aron appellauere, caulem Dracuncion. Theophrastus Aron putauit genus esse, sub quo species quasi multæ continerentur. Dioscorides quatuor uidetur fecisse genera, Dracunculum maiorem, Dracunculum minorem, Aron, & Arifaron, quanq; in describendo Aro, discrepat a Plinio. De Dracunculo quoq; parum conuenit inter eos, ut sequenti capite liquebit. Dracunculus hordeo maturecente fodit, luna crescente, Serpentariam sunt qui uocent. Inuenio apud Hippocratem & Ophiin herbam, semine muliebribus medicinis utile probari. Nec an eadem sit cum Dracuntio satis constat, etiam si a serpente nomen habeat. Idem Hippocrates candidam radicem cum nominat, Dracuntij radicem, ut Galenus uult, intelligit.

A in

Dracunculus

B

The. li. 9. ca. 22

C **EX M. VERG. COMM.**
 Erit legentibus & nobis non leue laboris compendium, si antequam de maiore Dracunculo agatur, tota minoris medicina & historia pariter reddita fuerit. Sunt enim utriq; paulo minus q̃ cuncta communia, tamq̃ in minore incerta, mixtaq; cum maiore multa, ut continuato sermone de utroq; utilius dixisse fuerit. Aequo animo ob eam causam tãtis per dum hoc agimus, differri sibi nostram Dracunculi commentationem legentes patientur.

D **De Dracunculo paruo. CAP. CLXXXIII.**
 Racunculus paruus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni, caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine. Fructus summo caule racematim cohæret, colore primum felleo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque, radice rotunda, bulbosa, raphano non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat. Naribus etiam ex lana impositus, polipum absumit. Carcinomata illitu sistit. Triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit. Orthopnceis, ruptis, uulsis, tussi, destillationibus auxiliatur. Humores pectoris excreatu faciles reddit, siue eocta, tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur. Vrinam pellit. Venerem excitat, cum uino pota. Phagædenas ulcerum, & quæ cacœthe uocantur, trita cum melle & Brionia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas, & eijciendos partus fieri solent. Qui radice suas manus perfricauerunt, a uiperis feriri negantur. Illita ex aceto uiligines emaculat. Folia recentibus uulneribus, conceptorum lintheolorum uice, conuenienter imponuntur. Decoctam in uino pernionibus appo-
 fuisse prodest. Caseus folijs inuolutus, a putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctaue, ad sanorum usus, pro olere recipitur. In Gymnetidibus insulis, quæ Calarides uocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placentarum loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustatim concidit, & lino traiecta siccat in umbra, & ita reconditur.

B A R B.
 Pl. li. 24. ca. 16

D Racunculi duo sunt Dioscoridi, maior, & minor, ut prædiximus. Plinio tres. Vnus folijs
 Berg, nō sine thyrsō, flore purpureo, similis Aro. Alter radice lōga, ueluti signata, articulo
 factq; tribus omnino cauliculis. Tercius folio maiore q̃ cornus, radice arundinea, totidem (ut
 aiunt) geniculata nodis, quot habet annos, totidem etiam folijs. Actius Dracunculi semen oc-
 cultari terra, & piperi simile describit. Olitores & Draconem uocatam ferunt, huic toto genere
 dissimile, quam mirabili quodam modo nasci prædicant ex lini semine incluso, raphanis, aut
 scilla bulbis, atq; in terra obruto. Pusilla herba, nigro ac minuto semine, folio tenui & oblon-
 go, acri, & utranq; originē prode, linguam & folio & radice amburens, & aceti & salis gu-
 stu. Pyretum sunt qui a ueteribus appellatam falso putent hanc, inter olera acetaria gratissima.
 Ita em uocare institui, quicquid crudū manditur ex aceto, sale, oleo. Quancq; hortos suos præci-
 pe quos, ut inquit Cicero, quasi altera succidia ueteres habuerint. Ab eodē uerbo et Acetabur-
 lū deducit, etiam Greci Oxybaphō ab instinctu aceti nomināt, ita em aceto uas dicatū uocabatur.

ut Athenæus testatur. Quæ & mensuræ genus significat, quod & Cochleare dicimus.

EX M. VERG. COMM.

Misuerunt adeo veteres cum Aro Dracunculum, totum nunc ipsum, nunc diuersis notis descripta Dracunculi genera ab illis fuerunt, ut nihil in re aliogen satis nota, difficilius aut ipsi fecerint, aut per se legentibus ostendat. Quodque anxios diu nos habuit, & adhuc habet, nec aliter in partes trahit uarias, perque omnia uersat, quæ qui in amoribus Medæ ab Apollonio primum descriptus est, solis ex aqua fulgor, summi feriens laquearia tecti, nuncque stabilis, sed continua uersatione in omnes discurrens partes, Dioscorides est: & quæ in cunctis grecis duo maioris, minorisque Dracunculi capita in eo leguntur, nullibi quod egregia diuersitate faciat, uariata eorum historia, aut medicina, & si alterum Rumicis, alterum Hederæ folia habere hic dixerit. Multiplex enim huic scriptori similitudo est coloris, figuræ, quantitatibus, uirum, aliorumque huiusmodi. Fitque ob eam causam sæpenumero, ut quod totum diuersum est, in partibus simile dictum, totam similitudinem referre male credat: & quod undique simile est in partibus, differre dictum totum dissimile falso habeatur. Quod in utroque scriptoris huius Dracunculo fieri facile potuit. In quorum altero folia Rumici in quantitate & figura, in altero Hederæ in colore comparari potuerunt. Nihil enim nobis, excusso diligenter utroque capite, inuentum est adeo dissimile, diuersumue, ut altera oportuerit, præsertim tam longæ rei & medicinæ ipsædem uerbis historiam conficere. Auxitque suspicionem nostram, quod nec Galenus, nec post Galenum Pausanias Aegineta diligentissimus in grecis medicinæ auctor, & qui scriptoris huius dicta ubique bona fide retulit, alterum hunc, & minorem Dracunculum nouerunt: nec post grecos latini scriptores Apuleius, Ioannes Serapion, & quod multi apud nos est, uetustissimi latini codices, in quibus unius tantum Dracunculi caput, alterius uestigium nullum ostendit. Ex eo factum est, ut crediderim, & adhuc credam, unum tantum a Dioscoride Dracunculū hoc loco describi. Neque enim uerisimile, si alter ille in natura Dracunculus esset, & ab hoc scriptore descriptus fuisset, relinquendum ab illis penitus fuisse. Et nihilominus in cunctis & antiquissimis grecorum codicibus, utrumque hoc caput adhuc legitur. At non est eadē utriusque historia & medicina. Concedimus id quidem: monemus tamen uocem magis quæ rerum diuersitatem esse: nec ad constituendum rei genus satis id esse. At minori Dracunculo aliquid tribuit, quod in maiori non legitur: quale est, incorruptum seruari, folijs eius inuolutum casum. Neque id etiā diuersitatis necessitate facit. Potuit enim in noua alterius eius capitis descriptione illud addi. Siquidem non Dracunculo Plinius, sed Aro eam uim tribuit: possuntque eandem habere rationem quæcumque alia minori addita magis quam alia inueniuntur.

De Aro.

CAP. CLXXXV.

Aron apud Syros Lupha uocitatum, aliqui Alymon, alij Thyamon, alij Dracontiam, Cyprii Collocassion dicunt. Folia emittit Dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis, caulem subpurpureum, dodrantralem, pistilli specie, a quo croceum semen exit. Radice Dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum conduntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen, & folia Dracunculi uires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & Dracunculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

BARBARICOROLL.

Arorum Theophrastus inquit radices, inhibita germinatione sunt atiles, folijs uidelicet terra obrutis. Prægrandia hæc sunt, item caua, cucumeracea. Radix nuda cortice, quæ mandipossit. Nam & folia in aceto inquit decocta eduntur, nec insuauis cibus est, caulem ei nullum reddendo. Differt a Dracunculo, si Plinium sequamur: qui radicem habet nigram, in latitudine rotundā, multo maiorem, & qua manus impleatur, Dracunculus subrutilam, & intortam. Semen ei seruens ac mordax, Aro lenius. Quod & Galenus confirmat. In cibus Aros foemina præfertur: quoniam mas sit dulcior, & in coquendo lentior. Folijs Ari, caseum ne copularetur, seruari affirmant: quod quidem a Dioscoride, maiori, aut minori Dracunculo tribuitur.

Confundit Plinius cum Dracunculo Aron lib. 19. cap. 4. Numeratque Aron inter Aegypti chorresia, his uerbis. Est inter genera Bulborum, quod in Aegypto Aron uocant, Scyllæ proximū amplitudine, folijs Lapathi, quæ Rumex est: caule recto, duum cubitorum, baculi crassitudine.

A. 111

A

B

ἀρον λούφα

Theophrasti.
lib. 7. cap. 11.
Pli. lib. 24. ca. 16.

VERG.

Cradice mollioris naturæ, quæ edatur & cruda, & c. Folia enim Lapathi, caulis rectus, ductu cubi-
torum altitudo, & baculi crassitudo ex maioris Dracunculi historia cuncta sunt: nec Aro con-
gruunt, cuius caulis semipedalis pistilli figura est. Quam formam in nostri orbis Aro quotidie li-
cet uidere. Confundendiq; simul diuersa genera, nulla maior, ut credimus causa fuit, q̃ similitu-
dine primū: mox antiquorū historia, in qua totū hoc genus Aron aliquando, nonnunq; pri-
uatim illud Dracunculus, hoc Aron dictum est. Discreuit tamen alterum ab altero natura: & il-
lud procerius, hoc breuius fecit. In illo figura est, qualē superiore capite tradidimus: in hoc ubi
q; cognosci potest. Reliquit in hoc etiā Dioscorides inuolucrum illud, & cucullum, quo inuolu-
tum semen claudit, pallido magis q̃ herbaceo colore, non ut in Dracunculo purpureū. Nume-
rabatur quondā, serebaturq; inter olera Aron: quod uix credibile sit, tantā habet radix, quæ in
ciborū usu erat acrimoniā. Cogitandūq; alterum est, aut aliunde inuectū mitius fuisse, aut cul-
turæ genere aliquo & humano artificio meliorescere nunc etiam posse.

De Arifaro.

CAP. CLXXXVI.

Ἀρίφαρος

ARifarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem im-
plet, longe maioris q̃ Aron acrimoniæ. Vnde illitu nomas sifit.
Fiunt collyria ex ea ad fistulas. Illitu radice, genitale animalis cuiuscūq;
in perniciem agitur.

B A R B A R I C O R O L L.

ARifaros, siue Arifaron, in Aegypto nascitur. Similis Aro herbæ, minor tamen multo, mi-
noribusq; folijs, & utiq; radice: quæ tamen Oliuæ magnitudinem prægrandis impleat. Alba,
geminum, altera unicum emittente caulem. Corrupte nomen huius herbæ medici, ut ab ipis
iam non Arifaros, sed detritis duabus literis, Afarus dicat: quod quidem & in Afari mentio-
ne testati sumus. Est & Aris herba Hippocrati, nec qualis sit, & an pro Arifaro capienda sit, nō
constat. Aris & instrumenti quoddam genus est.

E X M. V E R G. C O M M.

DCongeneres, ut uidetur, plantæ tres hæ sunt, Dracunculus, Aron, & Arifaron. Bulbosas em
radices oēs habent: & in reliquis non adeo dissimiles, in medicina conueniūt. Plinius lib. 24. ca-
pite. 16. Erin, sed ut credimus, corrupta ex Arifaro uoce appellat. Additq; in historia eius, nasci
in Aegypto. Et quod hic ait, emplastri modo impositā radicem, omnium quadrupedū genitali-
bus in perniciem ea agere, ab eo aliter, & his uerbis dicit. Sed unū miraculum ingens, contactu
genitali cuiuscūq; foemini generis, animal in perniciem agi. Hic autē non magis foemini,
q̃ masculini sexus id malum fore ostendit. Signauimus hoc, ut suspicari & querere legentes
possint, huic ne capiti aliquid desit, an aliter Plinius rem intellexerit. Dubitauit in Plinianis ca-
stigationibus Barbarus, diminutiua ne forma nō Arifaros, sed Aris, quasi paruū Aron uocan-
da planta hæc sit: quoniam Arin Hippocrates, herbā sibi tamen ignotā appellauerit: & q̃ Arifa-
ron oia minora q̃ Aron haberet. Sed uocandā Arifaron esse Paulus Aegineta lib. 6. testatur, di-
cens multo breuius Aro Arifaron esse, uocatq; Arifaron manifeste, non Arin.

Ἀρίφαρος

De Hastula regia.

CAP. CLXXXVII.

HAstulam regiam Græci Asphodelon, alij Narthecion, Romani
Albucum uocant, uulgo notum. Folijs est maioris Porri, caule
læui, ferente in cacumine florem, quē Anthericon appellāt. Radices sub-
iacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Quæ excoacti-
unt. Vrinæ, & menses eporæ cient. Lateris doloribus, ruptis, conuulsis,
& tussibus, drachmæ pondere potæ ex uino medentur. Ea uero uomiti-
ones adiuuat, ludicri tali magnitudine cōmanducata. A serpente demor-
sis datur aptissime. Verum trium drachmarum pondere, folijs, floribus,
& radice ex uino morsus illinire oportet. Item ulcera sordida, & depascen-
tia. Mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercula, furun-
culosq;, decoctis in facie uini bulbis. Recentibus oculorum inflam-

mationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, myrrha, & croco decoquitur, fitq; perç utile oculis medicamentum. Ad purulentas aureis per se, aut cum melle, uino, & myrrha tritus, prodest. In contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus, & ambustis igni, conducit. Surditati, instillatus in aurem, auxiliatur. Candidam uiriliginem lintheo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen, floresq; in uino positi, scolopendræ, & scorpionum uenenis, mirum in modum resistunt. Aluum purgant. Floret messibus Albucum. Quare æquinoctio uerno, antequam semen adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, ueneris cupiditatem inhibere. Quod hæbarius Crataeias asseuerat. Addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

BARBARI COROLL.

A sphodelus, de clarissimis herbarum Hastula regia uocatur, radice cibus apta, folio Porri syluestris, angusto, prælongo, sublenito, caule præcellenti, qui cubitalis est, & sæpe duum cubitorum, Antheriscos, siue Anthericos a Græcis, Albucus a nostris proprie uocatus. Differt Antheriscus ab Anthriscu, ut ex mentione Scandicis facile colligitur. Asphodelus, & aqua, & sicco uiuit. Lignosum ei semen, copiosum, triquetrum, colore atro. Nascitur in orbiculo subiecto flori, decidens æstate folliculo dehiscente. Particulatim floret Asphodelos, incipiens ab imo. Vermes in eo uolucres, specie flosculorum eroso, floris incipientis operimento euolant. Proprium huic cauli, qd tamen si leuis & angustus, in ramulos tamen fundit superne. Torretur hic in cinere ad esum. Itē bulbus cum semine, oleo, & sale addito, cum fisis quoq; tundit, præcipua uoluptate, ut uidetur Hesiodo, in syluis eum nasci prædicante. Mentionem Asphodeli & Homerus fecit, Heroion, siue ut alij codices, Erineon appellatū ab aliquibus uideo. Cochleæ terrestres mire in Campania caulem eius persequuntur, & fugendo arefaciunt. Bulbos eius Napis modicis similes octuaginta sæpe simul aceruatō autumnō colligunt, cum plurimū ualent. His mures necant, & cauerna præclusa immorantur. Amuletū esse putant, in domibus ante portas satum. Hællanicus prodit, quosdam esse Nomadas in Libya, qui nihil aliud possideant, qd situlam, gladium, & calicem, & ex Asphodelo casulam, umbræ tantū gratia: quam & circumferant. Eius tamen genera duo faciunt, Albucum intelligentes candidum: cui scapus cubito amplior, purus, leuisq; Asphodelum uero, siue Hastulam regiam, cui acinosus sit caulis. Dionysius discreti uir sexu, marem, & foeminam, pronunciando in ea.

EX M. VERG. COMM.

Vix credat nostra ætate aliquis, in cibos & sanitatis usum uenisse quondā Asphodelū: tam alienus homini nunc cibus est, tamq; inter medicamenta magis qd olera merito censet: nisi Hesiodū audierit canentem, nescire homines iniuste rem suam augentes, ὅσον ἐν μαλαχίᾳ, καὶ ἀσφodelῷ, λω πύλ' ἐννύπῳ, grauē poētā, sapientemq; & cuius carmina in priuata uita pro oraculo a professoribus sapientiæ recepta semper fuerint. Et post Hesiodum Pliniū, mandī Asphodelum, semine tosto & bulbo dicentem: & ad temperandā eius acrimoniā fisis misceri iubentem: Tanta rudi, nouoq; adhuc sæculo, aut indiscrēta ciborum frugalitas erat.

De Bulbo uomitorio. CAP. CLXXXVIII.

BVLBVS QVEM uomitorium uocant, folia habet lentiora multo & longiora Bulbo cibario, radicem similem, cortice magno. Ea mansa, aut decoctum eius potum, uesicæ malis medetur. Vomitiones mouet.

BARBARI COROLL.
BVLBUS Vomitorius, a Græcis Emeticos uocatur, folijs nigris.

Pli. li. 21. ca. 17.

B

Bulbo

C

βουλβόν ἰδιώδι-
μος

C De Bulbo cibario. CAP. CLXXXIX.
IBARIVS BVLbus uulgo cognitus, a nobis estur. Stomach-
cho & aluo utilis ruffus, & ex Aphrica delatus. Amarus uero,
& scylinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi om-
nes acrimoniam habent. Excalcaciunt. Venerem stimulant. Linguam,
tonfillasq; exasperant. Multum alimenti præbent. Carnes creant. Infla-
tionem pariunt. Luxatis, fractis, articulorū doloribus efficaciter illinun-
tur. Spicula extrahunt. Gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese, hy-
dropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illi-
ti cohibent. Stomachi dolores mitigant. Furfures & ulcera quæ in capi-
te manant, cum tosto nitro abstergunt. Sugillata, uarosq; per se, aut ex o-
ui luteo, & lentigines cum melle & aceto, emendant. Fractis auriculis,
unguibusq; ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tol-
lunt ficus. Item cum cinere e manarum capitibus, impositi. Cremati ue-
ro, & cum alcyonio misti, uicia cutis in facie, atrasq; cicatrices, in sole illiti
emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore
eorum cibo abstinendum. Quoniam neruos tentant. Cocti cum polen-
ta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula uelocissime ad sup-
purationem perducunt, & rumpunt.

Pli. li. 19. ca. 5.

D

B BARBARI COROLL.
Vlbi foliū angustum, ut omnibus fere bulbosis. Radice seritur hortensis. Nam semine par-
tim primo, partim sequenti anno prouenit: quod & in Avena, Loto, Berac; conspicit. In Tau-
rica Cherfoneo tam dulces sunt, ut crudi mandant, Laudant ex Alcatheo, Pelasga, ut Ouidius
ait, urbe candidus, hoc est, ut puto Megaricus, auctore Pausania, sed ad uenerē. Idem auctor.
Daunis, an Libycis Bulbus tibi missus ab oris,
An ueniat Megaris, noxius omnis erit.
Est & Bulbi genus circa ripas amniū, cuius inter esculentā partem, & summū corticem lanæa
contineatur natura: ob id Eriophoros appellatū, ex qua uestes quoq; fiant. In Indis Bulbi non
lanigeri, sed criniti nascuntur. Bulbis amaritudo in uertice. Habetur & Bulbina, rubicunda ora-
dicis bulbo. Item candido, & squamis carente, folijs Paracæ, ut inquit Plinius. Codices antiqui
non Paracæ, sed paruis habent. Ego porraceis legendū existimo: quandoquidem ita modo cer-
nitur Bulbina, quam Maurice Buberigi cognominant herbarij, folijs croci, flore uiolæ, purpu-
reo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine. Syluestrium Bulborum florem, coronis interuere
ueteres, Anemōnem uocantes post Narcissum, ut Theophrastus inquit, exeuntem uere. Condi-
on Bulbi eum florē Græci appellant: haud scio an hic sit, qui per initia mensis Aprilis Narcisso
similis eripit, maioribus diuisuris, ceu stella quaternis folijs cædidus, cum caocis interioribus,
& odoratus, fronde porracea, radice bulbosa, ceu Allium, sine odore glutinosa. Bulbum ruf-
um Græci Bolbon, & Hippocrates Bolbion pyrron uocant. Inuenio apud Hippocratem ge-
nus syluestris oleris Omoconitidem, siue Oloconitidem uocari, dulcem, Bulbo simili radice,
uerum parua, & Oliuæ magnitudine, ad secundas trahendas utili.

P EX M. V E R G. C O M M.
Peregrinos Græciæ diu & Italiæ fuisse Bulbos, aut peregrinis quasi ad omnes usus meliori-
bus usas fuisse has gentes, & plura eorū fuisse genera Græcorū antiqui, & probatoris fidei scri-
ptores omnes testantur, Theophrastus primum. s. de plantis uolumine, cuius ea de Bulbis hi-
storia est. Bulborū autem plura esse genera, manifestum. Magnitudine siquidem, colore, figu-
ra, & sapore differunt. Alicubi enim adeo dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio edan-
tur: quales in Taurica Cherfoneo sunt. Post Theophrastum deinde Athenæus secundo sui di-
pnosophistæ libro inter cætera, quæ de Bulborum huiuscemodi natura multa dixerat, Regios
uocari aliquos ait: quos cunctis alijs prætulit. Post Regios a colore Ruffos laudauit. Subijciens

statim Candidos, Lybicosq; in genere Scyllarū magis, q̄ Bulborum esse. Aegyptios omnium deterrimos: quemadmodū contra, auctore Nicandro, cunctisq; alijs, Megarenses omnium optimos. Quod genus conferi praecipue Cato iussit, & Columella in carmine suo his uerbis instituit. Iam Megaris ueniāt genitalia semina Bulbi: Et quæ Scylla uenit getulis obruta glebis. Primum illud Ruffum & optimū, mox Candidum, Libycumq;: & Scyllæ magis q̄ Bulbo simile genus describens. Addidit eodem libro Theophrastus, quod & Athenæus pariter retulit, maximā & huic generi propriā Bulborum differentiā esse, quā ad maris littora aliquibus locis nascentes Bulbi ostendūt. Inueniūt enim littorales, in quibus intra primas tunicas lanæ sint, inter id quod manditur, & extimam tunicam mediæ, tam uera & præsentī natura lanæ, ut uestes ex ea texant: uocariq; ob id Lanosum Bulbū: non quemadmodū in India nascentē Capillarum noīant. Hoc genus, q̄ ad mare, & littora nascit, & cum eo reliquos Bulbos oēs, quoniā congeneres inter se sunt, iuniores aliqui marinā Cepulam dixerūt. Cum tū Lanosum illud genus ad mare nascens, priuatim cognouit illo discerni debuerit. Serebat in hortis diligenter antiquas hoc olus, eratq; illis in quotidiano usu, irritamentū Veneris potius, q̄ uitæ necessarius cibus. Nihil enim ab antiquis aliud in eo laudat: nec ex alia naturæ uī Columella, quod paulo ante diximus, genitalia semina Bulbi, appellauit. Et Martialis in Xenij suis. Cum sit anus coniux, & sint tibi mortua mēbra, Nil aliud Bulbis q̄ satur esse potes. Idem tot alijs locis salaces eos uocans, nec aliā uitam, nec aliū usum cognouisse in Bulbis uidet. Indicant idē in antiquis Græcorū Comædij sales & disteria in Theatris factata: quale illud est, *βολβὸν χύτραν καταπαγῶν*, qd est, Bulbū pleno fictili satur: contra salaciores dictū. Et contra Veneris impotentes *δουλιὸν ὀνίσου βολβὸς ἀνὴρ ἐκλυῖται*, id est, nihil pderit Bulbus, nisi farinā habueris. Sesami enim farina, caseo, melle, & aceto ad cibum condebantur Bulbi. Perse enim amari, nec in cibis grati sunt. Numerauitq; Tarentinus Heraclides Bulbum hunc inter ea quæ seminis abundantia faciunt: hic inflare dixit, quæ ad Venerem non minor q̄ illa occasio est. Priuatim, ut a principio diximus, totū hoc genus Bulbos antiquitas uocauit. Alioquin commune omnibus his Bulborum nomen est, quorum radices sub terra sic crescunt, ut ad nouam quotannis sobolem decerpi aliqua pars possit: ut in lilio, croco, & plerisq; alijs fit. Non sic tamen certa est nominis huius ratio, ut ad alia genera aliquando etiam non trahatur: a quibus licet non auellatur noua illa soboles sub terra, tamen augentur. Sed illa est totius bulbacei generis propriā nota.

A

B

De Scilla.

CAP. CXG.

Scilla uim acrem atq; feruentem habet. Assatam multo utiliore esse constat. Polline, aut luto oblita, in clybanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducēs farina sufficienter intosta fuerit. Quæ exempta, si non emollescat, altera farina, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt. Nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet medium, direptis uiuotenus tunicis: quod frustra tim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, aut acrimoniam habeat: traiectaq; lino frustra siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. His Scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ Scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto, demorsis a uiperis, cataplasma est. Ad singulas affæ parteis, adiectis octonis tosti salis, cochlear unum, aut alterū damus ieiunis, ad emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicaminibus, quibus urinā ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, Regio morbo, torminibus, in tussi uetere, suspiriosis & cruentat extussientibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coqui

scilla

D I O S C O R I D I S

Cur cum melle, & estur eorūdem gratia, maxime ut cōcoctionē adiuuet. Strigmenta per aluū extrahit. Cocta, & simili sumpta modo, eisdem præbet effectus. Sed cauendus Scillæ usus, his qui intestinum sentiunt ulcus. Ad pensiles uerrucas, & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica, aut melle deuoratum, aluum emollit. Scilla in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 20. ca. 9.
Theophr. li. 7. cap. 11.

B A R B A R I C O R O L L.
Scilla, siue ut Varro appellat, Squilla, Hippocrates uero etiam Scella, & terra & mari alitur. Radix sit Bulbus, an Cyma, siue fructus, a Theophrasto dubitatur. quoniam sunt qui radicem in ea geminā demonstrant. Vt cunq; tenera est, non omnis, sed eius quæ ab usu Epimenidia Scilla dicitur, angustiore folio, ac leuiore q̄ reliqua eius genera, quibus omnino lata ea sunt. Germinant celerius quædam intra Scillam confita. Nam & fructus condendos, præsertim granata seruat, exempto pediculo prius. Folio caulis, ut in Croco & Narcisso profilit. Flo-
Endem penitus, non similem Scyllæ Pancration hoc nostra ætate Herbarij ostendunt, confunduntq; simul, alioquin diuersa genera: tanta nataliū similitudo & mixtura est. Nos unamq; simul uisam, præterq; colore, & id quidē non satis manifeste, diuersam secernere nequimus.

παιράτιον

De Pancratio. CAP. CXCI.
Pancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est magni bulbi, ruffo colore, aut subpurpureo, gustu amaro ac feruente. Folijs lilij, sed longioribus. Scillæ uires & præparatiōem habet. Eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Cui tamen mitior q̄ Scillæ facultas inest. Radicis succus, cum Erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

B A R B A R I C O R O L L.
Pancration, quam & Scillam pusillam uocamus, folijs Lilij albi crassioribus aspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.
Endem penitus, non similem Scyllæ Pancration hoc nostra ætate Herbarij ostendunt, confunduntq; simul, alioquin diuersa genera: tanta nataliū similitudo & mixtura est. Nos unamq; simul uisam, præterq; colore, & id quidē non satis manifeste, diuersam secernere nequimus.

καππάριον

De Cappari. CAP. CXCII.
Capparin aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui malū, alij Ophioscorodon, alij Phyllostaphylon, quidam Thalliam, aut Petream, alij Olophyton, alij Ionitem, nonnulli Oligochloron, aut Acontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Magi Potera, alij Pentheron, aut Cor lupi, alij Alofchorodon, Romani Inturim, Aphri Harbiezathon. Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagat. Spinæ ut rubus habet, in hami modū aduncas. Folia mali Cotonæi rotunda, fructū oleæ similē: qui cū dehiscens pandit, florem candidū promittit: quo excusso, nihil glandis oblonge figura inuenit: quod apertum, grana acinis puniceorum similia ostendit. Radices lignosas spargit, grædes, numerosasq; Tenui solo, asperisq; locis, in insulis iuxta domicilia nascitur. Caulis, & fructus cibi gratia condiunt. Aluū turbat. Stomacho aduersatur. Sitim gignit. Cocta tamen, stomacho q̄ cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in uino potus, qudraginta diebus, lienē absumit.

Eturinam, cruentumq; excrementum emittit. Bibitur utilissime in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis. Menfes ciet. Caput purgat. Dentium dolorem sedat, semeni ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadē proficit. Vlcera omnia uetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat. Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demorsa dolori eius auxiliatur. Cum aceto trita, uicilines albas absterget. Radix, foliaq; intrita strumas, ac duricias discutit. Auriū uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & Marmarica Capparis, uehementer inflant. Apula uomitus facit. Libyca, & quæ Rubro mari defertur, mirum in modum acris est. Siquidem in ore pustulas excitat, gingiualesq; offetenus exest: quare in cibus non ab re damnatur.

BARBARI COROLL.

Capparin, siue ut Palladius Cappar, alij diligentia marcescere affirmant, alij negant. Fruticulus est firmioris ligni, seminisq; & cibi uulgaris, caule q; una plerumq; decerpro, aculeatos rosae modo ramos habet, folio quoq; horridulo ac spinoso, radice una, caule humili. Germen & flos ætate roseus, odoratusq; folium ad uergilias usq; uiget, fabulosis macrisq; gaudet. Quatuor ei genera. Arabicum, quod & pestilens est, ut Plinius, & Galenus ait. Africum, Marmaricum, Apulū, omnia quondam infesta, nunc mitia undecunq; illata. Quidam eum Phyllostaphylon, Opheostaphylen uocant. Innocentius Italicum cibū. Capparis nisi area defossa, hoc est, circulari scrobe coereatur, & ripis, undiq; circumstructis lapide, late serpit, euagaturq; per agros, & cogit solum sterilefcere.

Pli. li. 13. ca. 23.

EX M. VERG. COMM.

Vigaris, quotidianiq; usus cum suo fructu herba Capparis est: & quo cōmunior cunctis ubiq; gentibus, & ubiq; nascens, eo plures appellationes inuenit, singulis eam suo nomine indicantibus. Quo fit, ut exceptis paucis, nullum habeant reliquæ intellectum. Cynosbatus tamē, id est, caninus rubus, ob hamatos quos habet rubo illi similes aculeos, dicta Capparis est. Quemadmodum Phyllostaphylon, q; inter folia fructum quasi uuam fert: & si hic paulopost Oliuæ comparauerit, Sic Petrea a natalibus suis, quos inter lapides & rudera inuenit. Cur autem Sinapi persicum a Romanis hic Capparin uocari dixerit, incertum nobis est: quemadmodum contra norum omnibus, Capparin a cunctis rei rusticæ scriptoribus appellari. Vsum eius ante alios cibos in sanitate cōmendauit Paulus Aegineta: iussitq; sumi ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Monuit præterea, excitare Capparin cibi appetentiam: iecur, lienemq; laxare: & pituitam per aluum deijcere: idq; est quod hic ait, aluum turbare.

B

De Lepidio. CAP. CXCIII.

Lepidium aliqui Gingidium uocant. Herbula uulgo nota. Muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris, et exulcerans. Quapropter ischiadicis illita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice quarta parte horę illinatur. Lienosis simili modo prodest. Lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

λεπιδιον

BARBARI COROLL.

Lepidium, Aegineta Paulus Hiberida, siue Hiberiada iam uocari cœptum scribit, a Galeno (ut arbitror) temporibus. Lepidium ab eo, q; lepidas & maculas in facie deijciat ac repurget: quas Columella Fucas uocauit, appellatum Græci putant. Idem autor Columella, duo genera Lepidij esse intelligit, syluestris, & satiuū: ut syluestre quidam accipiant pro Hiberide, satiuū pro Lepidio. Peregrinum inquit Plinius fuit & Lepidium, seritur a fauonio. Dein cum frutificauerit, iuxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoreaturq;. Per biennium hæc, postea ipsdē fruticibus utuntur, si non sæuitia hyemis impediatur: quando impatientissimū est algoris. Exit & in cubitalem altitudinem folijs: non ut Hiberis nascuntur, sed laurinis, utiq; per initia, uerū molibus. Post Gladioli recti fere speciem accipiunt, usq; eius propter acrimoniam non sine la-

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 17.

B

D I O S C O R I D I S

C. ēte. Herbarij modo hanc, non Lepidium, sed Raphanum appellant, in Pannonia frequentem: ubi ferunt eam non aliter q̄ radicis scobe. Paulus Lepidium inquit, quod apud nos habetur, folio Lauri, sed maiore multo nascitur: quod ei tamen æstate nullum est.

¶ De Ranunculo. CAP. CXCIII.

βατράχιον

RAnunculum, aliqui sylvestre Apium uocant. Complura eius genera. Vis tam omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum Coriandri folijs cōstat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo, caule gracili, cubitum alto, radice alba, exigua, amaracq̄, multis capillamentis hellebori modo fibrata. Nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerumq̄ in Sardinia proueniens, q̄ acerrimum: quod sylvestre Apium appellāt. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas nō sine dolore gignunt. Quare ungues scabros exstricant. Scabiem eximūt. Stigmata delēt. Formicantibus uerrucis, & persilibus, alopecijscq̄ paulisper illinuntur. Tepente decocto perniones foventur. Sicca radix, tritaq̄, sternutamenta ciet, naribus admota. Dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Pli. li. 27. ca. 12.

D

BATRACHION, siue Ranunculus, siue Strumea: quoniam medetur strumis, nam Strumus Solani genus est. Dicitur & Apiastrum Ranunculus, hoc est, Apium sylvestre, uenenatū in Sardinia, manifesto Nigidij doctissimi uiri errato: qui Apiastrum pro Mellissophyllo appellat: quāq̄ hunc & Varro sequitur et Dioscorides. Opacis gaudet. Primum genus, cui et color liuidus, ad latitudinem Maluæ accedentibus folijs. Secundo generi, caules ut Plinius inquit alti, ut Dioscorides, minores q̄ priori: nisi librariorum culpa fuerit, μικροκαυώτερον pro μικροκαυώτερον scribentium. Genus ab his diuersum in totum uidetur, Batrachion, cognomine Polyanthemus, caustica ui exulcerans cicatrices, & ad colorem eas reducens, & uirilgines concorporans, neq̄ aliter indicatur a Plinio quale sit: nisi quis & hoc in unam quatuor specierum contribuat, ac reponat: illam uidelicet, quam plurimis foliorum diuisuris & Plinius & Dioscorides deliniant, uulgo dictam Pes Coruinus, alteram omnino q̄ Coronopus, de qua superius habita mentio est. De uenenato Salustius, In Sardinia inquit quædā herba nascitur, quæ Sardoia dicitur, Apiastri similis. Hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. In ea insula, ut Pausaniæ ac Solino placet, locis riguis prouenit iusto largior: nec ramen aquas inficit. Strabo ex hac ipsa herba Hispanos toxici genus conficere ait: quod urgente ui maiore haufit, citra dolorem humanis rebus exigit. A qua σαρδάνιος uulgo γίλωρ, quod & Dioscorides in uenenis meminit. Homerus Sardanion risum uocauit illo uersu.

Vide Erasmi Chiliadas.

Meminit & Plato in Repub. Timæus aliā originem prouerbio huic reddidit, aliam Clitarchus, aliam Sophocles & Simonides poetæ: nos id in annotationes Plinianas distulimus.

ἀνέμω

¶ De Fremio. CAP. CXCV.

FREMIVM, græci Anemonem, alij Agriam, aut Nigram uocant, alij Anemonem phcenicam, alij Euemion, nonnulli Meconion, alij Tragoceros, alij terræ Parinem, aut Barbylam. Ostanes Berilion, item Ornios Cheranion, Pythagoras Attrachilida, Magi Cnicum agriam, Romani Orci tunicam. Duo Fremij genera. Vnum sylvestre. Alterū in cultis nascens. Cuius multæ species. Vna phœ-

niceum florem profert. Altera candidatem, aut lacteum, aut purpureum. **A**
 Harum folia Coriano similia, tenuioribus prope terram diuisuris: caules
 lanuginosos, tenues, in quibus flores ut Papaueris, & in medio capitula
 nigra, aut caerulea. Radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grande-
 scit, fermeq; geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo maior,
 latioraq; folia, & duriora. Oblongius caput, flore puniceo, multis radi-
 cum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis omnium acris.
 Ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix,
 pituitam trahit. Decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflamma-
 tionibus. Cicatrices eorundem, & hebetudines emendat. Sordida ulce-
 ra abstergit. Folia & caules, si cum pifana decocti edantur, copiam lactis
 præbent. Menstrua ciunt, uellere appositi. Illiti quoq; lepras eximunt.
 Sunt qui errore ducti, Argemonem nominari Eupatorium putent. Quo-
 niam a sylvestri Fremio, Argemonem, & Papauer, quod Rhœam appel-
 lant, de quo inter Papaueris genera referemus, propter colorum coga-
 tionem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papaueris & Arge-
 monæ color, minus puniceus spectatur, & utraq; tardius floret. Quineti-
 am Argemone croceum succum, gustu admodum acrem reddit, Rhœas
 uero candidiorem & acrem. Insuper Fremio & Rhœadi capitula sylue-
 stris Papaueris similia insunt, sed in Fremio supne crassiusculū, in Rhœa
 de angustius, Fremij genera nec succum remittunt, nec caput habent, sed
 quasi Asparagi cacumen. In aruis illa sæpius nascuntur.

BARBARI COROLL.

A nemonem quidam Fremium uocari putant, sed scribendum est Phenion, auctore Plinio.
 Edit florem suum haud multo post germen. Erumpit autumno post Aphacen a primis imbr-
 bus. Inter aculeatas, sed mitioris generis Anemonem collocant. Quatuor sunt nominis huius
 fastigia. Duo coronis dicata, hoc est, sylvestris bulbi florem uocatum Anemonem: et aliam A-
 nemonem, quæ Timonia, siue Limonia potius cognominatur, post Heliochryson florentem,
 & cum Viola nigra uere. Duo medicinis, sylvestrem, & satiuam, de quibus præsens mentio co-
 piofissima omnium est, phoeniceum florem habens, inter satiuas. Satiuis omnibus folia Apio
 similia, nec fere semipedalem excedunt altitudinem, cacumine Asparagi. Flos nuncq; se aperit,
 nisi uento spirante, ob id Anemone dicta. De Othonna syria herba, quam quidam Anemonē
 existimauere, dicemus in loco. Nicander Anemonem, Anemonida solet appellare. eamq; ex
 Adonidis cruore natam prodit. Sosibius Anemonas a Spartanis Phænidæ uocari tradidit.
 Horus Anemonæ flores inquit in Aegypto pingi, quoties morbos hominum intelligi uoluit.

EX M. VERG. COMM.

V Agum, cōmuneq; plantis aliquot, & si congeneres omnino non sint, earumq; floribus sit-
 tisse quondam Anemones, nomen, testes, & indicio sunt Theophrastus, Plinius, hic ipse, & Bu-
 colicorum insignis poeta Theocritus: modo eius legitimum poema sit, quod passim legitur
 Adonidis Epitaphium carmen. Nominisq; inconstantiam, & cōmunionem hanc, papauera-
 cei præcipue, in cunctis his, floris figura fecisse nobis uidetur. Neq; enim satis constat, tam mul-
 tæ diuersis temporibus prodeuntes flores, Anemonæ omnes dicti quondam fuerint: q; non
 nisi spirante uento dehiscerent, & in folia se explicarent; quod manifeste patitur, quæ priuatim
 primoq; Anemone dicta ab antiquioribus græcis est: quam uim naturamq; eius ex re factum il-
 li nomen indicat, & Plinius lib. 21. cap. 23. his uerbis testatur. Flos nuncq; se aperit, nisi uento spi-
 rante: unde & nomen accepit. Potuit quidem in proferendis floribus eadem omnium infirmi-
 tas esse: uerum tamen quod obseruasse uolentibus difficile non erit, cur Anemone omnes dice-
 rentur, cōmunis omnibus tota floris figura maxime fecit: pauciora tria. f. & ad summam, quæ in
 B ij

Pli. ll. 21. cā. 11
& 23.

D I O S C O R I D I S

C floribus folia, grandia, eadem, infirma, & quavis iniuria decidua: quodq; non minus obferuandum fuerit in cunctarum medijs floribus, inter folia surgens apex, cacumen, capitulumue, aut papaueraceum uasculum: quæ notæ papaueracei floris omnes sunt. De coloribus nō agimus: quoniā nullibi magis luisse uidetur natura, & in Anemonis his tam uarij & inconstantes sunt, ut nihil quod certum & exactum sit doceri possit. Tamq; late quondam patuit Anemonarum nomē, ut quod posteriores rubrum Papauer dicunt, in triticea & hordeacea segete, Maio men se puniceo colore florens, de quo nunc agitur, Anemonem ueteres etiam dixerint: & si contra credi posse multa indicio sint.

De Argemone. CAP. CXVI.

ARGEMONEA Græcis Oenone tiocatur, ab alijs Anthemis, alijs Homonœa, aliquibus Flos campestris, Romanis Concordialis, aut Pergalia. Alijs Lyburnia, Gallis Corona. Syluestri Papaueri similis est. Folia habet Fremij, diuisa, florem puniceū, caput in cauliculo Papaueris rheadis, oblongius, & summis partibus latum, radicem rotundā. Succum Croci colore acrem dimittit. Argemone & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compescunt. Ea, ut hærbarius Crateias autor est, contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro & sulphure ignem non experto, contra uiliginēs efficax est. Easq; sicco linteo antea confrictas in bali eis sanat. Facit & ad scabiem.

BARBARI COROLL.

Pli. lib. 25. ca. 9

Argemonen, & Argemida puto dictam a Dioscoride, ubi de Anemone loquitur. Folia habet Anemonēs æqualia, et Apij modo secta. Nascitur in aruis apud nos, ut Plinio placet. Genera eius tria faciens, ut id demum probetur, quod radice Tus redoleat. Diuersum uidetur genus esse quod apud Plinium Argemon nōcatur. Argemonēs radicem Eupatorium a recentioribus appellari quandoq; uideo, autoritate (ut arbitror) Dioscoridis in Anemone hoc inuenta, ut aliud tamen intelligatur genus esse quod Eupatorium proprie uocari solet.

EX M. VERG. COMM.

Fvit, & adhuc est magnæ lris cum Eupatorio Argemone, duo simul diuersa genera miscetibus cunctis. Nec satis adhuc constat, nominis ne, an rei controuersia hæc sit. Si quam nostræ ætatis in Ethruria medici Argemonem circumferunt contempletur aliquis, nihil cum uera Eupatorio, descriptaq; hoc loco Argemone cōmune uidebitur habere, si quam iuniores scriptores tradiderunt, & nos in antiquissimis eorum cōmentarijs pictam uidimus Eupatorium, mutato nomine Argemonem appellasse, merito credentur. Eupatoriū em̄ a Dioscoride traditis in quarto uolumine notas omnes, in historia & pictura illi assignant. Nec est q; demiretur aliquis, nos picturarum fide ad hanc rem utentes. Calami enim, & penicilli eadem pene ratio & usus est: nec alter altero minus, incertiusue nostri animi sensus alijs ostendit. Verisimileq; est, relictas ab illis medicæ materiæ picturas, ex his quæ tunc in communi æstimatione erant, relictas fuisse. Quod totum non sine causa a nobis dicitur. Vidimus enim, & nunc in manibus habemus sexcentorum annorum latinum Dioscoridem, regium, ut tunc tempora erant, opus, in quo diligentissima pictura omnes Eupatoriū notæ Argemonæ huic adiectæ fuerunt: quæ ex historia huius scriptoris tribuendæ Argemonæ non erant, quam agresti Papaueri similem dicit: folio Anemonēs incisuris diuiso, flore in caule puniceo, & in flore erratici Papaueris capitulo: quorum nihil in Eupatorio uidetur. Miscuit hæc, & ignorari fecit similitudo: quodq; hic superi ore capite in Anemone ait, nescientes, syluestrem Anemonem ab Argemone hac, ob similitudinem discernere imperiti herbarij, syluestrem Anemonem, et Argemonem hanc unam eandemq; crediderunt, & esse tradiderunt: & ne ociosum in incognita re uacaret Argemonēs nomē, ad Eupatorium transulerunt: Argemonemq; sui generis alioquin herbam Eupatorium, falso appellauerunt. De Eupatorio copiosius suo loco agetur. In Argemone hac autem satis illud nouisse sit, sui generis esse herbam, syluestri Anemonæ adeo similem, ut discerni nequeat: appellatamq; a ueteribus Argemonem, q; oculorum & lucis uitio, quod græci argema uocant, illita.

ἀργεμόνη
οἰνώνη ἀνθεμὶς
ὁμόνοια
ἐν θοῇ πίνυεν

medeatur. Plinius plures, maioresq; q̄ hic & alias illi vires assignat. Videturq; in ampliore, & honestiore medicinæ & remedium censu eam constituisse: quo fit ut suspicemur, potuisse eū scriptorem Argemones nomine etiam pro Eupatorio uti. Non tamen hoc constituimus. In Eupatorio enim certius tota hæc agetur res.

¶ De altera Argemone. CAP. CXC VII.

Altera est Argemone, quam Artemonen aliqui, alij Arselā, aut Sarcocollam uocant, Romani Argemoniam. Ea folijs syluestri Papaueri similis est. Recens trita, intercisiones imposito sanat. Oculorū inflammationes mitigat. Pota cum aqua, dysentericis auxiliatur. Vulnēra conglutinat, Conuulsis, & uellicatibus, imposita medetur. Inflammationibus utilis. Contra serpentium morsus cum uino bibitur.

BARBARI COROLL.

Serpentibus & uenenis Argemonem aduersari nouimus, & ob id fortasse nomen habet, cū sit Arges Hippocrati nomen angitis, ut Galeno placet.

EX M. VERG. COMM.

Tria Argemones genera Plinius sua ætate cognosci, & numerari a Romanis tradidit: probari tamen unum tantum, & id, cuius radix Tus olet. Antiquiores græci, Galenus. f. & Paulus Aegineta, unam trī Argemonem nouerunt. Hic primā & alterā descripsit, & medicinæ utilē tradidit. Dicimus autē in hoc duo eius grā legi, ut in impressis, & q̄ circumferunt græcis codicibus inueniunt. Nā in uetustissimis nullū est alterius Argemones hoc caput: nec quē nos habemus uetustissimū latinū Dioscoridem, alteram hanc Argemonem ostēdit. Obseruauimusq; nos in multis, pares uetustate græcū & latinū Dioscoridē, quē tam sæpe citamus, fide pares etiā esse, nihilq; aut in altero inueniri, aut deesse, q̄d non in altero pariter inueniat & desit. Quā legi timū itaq; scriptoris huius caput hoc sit, uiderint pitiores. Nobis inclināt animus, ut credamus adulterinū, supposititiumq; esse. Vtimurq; ad hāc suspicionē, nō tam quas pauloātē diximus rationibus, q̄ q̄ pleraq; sunt in eo aliene huius scriptori elocutionis indicia. Dubitamus præterea, de esse huic Capiti aliquid, quo loco. f. sanare præcisiones Argemone hæc legitur. Delyderatur enim cuius partis præcisiones. Nobis inclināt animus, neruorum intelligi oportere: quoniam hic, & alij græcorū medici διακοπῆς, quæ uox huic scriptori eo loco est, in neruis priuatim plerūmq; appellāt. Plinius præfectiones eas dixit undecimo uolumine, capite. 37. Eius uerba sunt, Mirumq; uulneratis neruis summus dolor, præfectis nullus.

¶ De Anagallide. CAP. CXC VIII.

Anagallis purpurea, quibusdam Aëritis, aut Aegitis uocatur, alijs Sauritis, a Magis Oculi sanguis, aut Chelidonium, Romanis Macia, Ethruscis Masytipos, Gallis Sapanā, Dacis Cerceraphron. Anagallis communis, a quibusdam Corchoron, alijs Halicacabō, alijs Zeliaurus, Magis Nycteritis, Aegyptijs Mecij, Romanis Anciaton, Aphris Asirrisce. Duo eius genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, scemina dicitur: Mas, quæ phoenico. Frutices sunt parui, in terra iacentes. Folijs in quadrāgulo caule pusillis, subrotundis, ad Helxinæ folia accedentibus. Semine rotūdo. Vtracq; mitigandī uim habet. Inflammationem arcer. Adactos corpori aculeos extrahit. Nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. Et naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur. Argema cum mele attico emendat. Retusæ oculorum aciei auxiliatur. Contra uiperarū morsus, iocineris et renum uitia, ex uino bibere prodest. Tradunt eam quæ cæruleum adit florem, prociduum sedem reprimere. Quæ uero

B iij

A

σαρκόκλαιο
ἀρτέμιον

B

ἀναγallis
ἀιρίτις αἰγίτις
σαυρίτις

D I O S C O R I D I S

C phoeniceum, illitu euocare.

Pl. li. 26, ca. 7.

BARBARI COROLL.

Frutice tenero Anagallides, non altiores Palmo nascuntur in hortis & aquosis. Prior floret cerulea. Mirum quod feminam pecora uitant: aut si decepta similitudine (flore enim tantum distat) degustauere, statim eam quoque (asyla, siue, ut alij codices scripsere, casyla uocatur, a nostris ferus oculus) in remedio quaerunt. Praecipitur effossuris, ante solis ortum, priusque quicquid aliud loquantur ter salutare eam, tum sublatam exprimere, ita praecipuas esse vires. Anagallin Dioscorides Sauritin quoque dici perhibet. Sunt exemplaria in quibus Gauritis, non Sauritis legitur. Hippocrates Anagallin dicendo, utilem mordendis & assiccandis ulceribus Anagallidem uidetur intellexisse. Aetius Nycterida herbam ad oculorum albugines comprobat, pro Anagallide utputo accipiendam reliquit, quandoquidem et Nycteritis a Dioscoride uocatur. Errant qui Passerinam uulgo dictam, florem candidum ferentem, Anagallida existimant. Quem admodum & qui Myosotin, idest, muris Auriculam pro Anagallide compictam praefertunt. Anagallidem phoeniciam, a colore Paulus Aegineta Corallium quoque dici meminit. De quo & compositioni datum nomen, quod Diacorallin. Quamquam & pastillus est hoc eodem nomine, sed in eum lapis Corallius, non haec herba sumitur.

EX M. VERG. COMM.

Non demirabitur aliquis, in humili & neglecta nunc ab omnibus herba, tam multas appellationes. Plurimumque enim sit, ut ubi maior fortunae & uirtutis gloria splendet, illic etiam numerosus nominum ambitus audiatur. Plinius ex tam multis quae nunc in scriptore hoc numerantur, unum tantum retulit, Anagallida dicens aliquos Corchoron uocare: quae uox antiquissimis graecis ad maledictum translata est, contra eos, qui in humili & indigna fortuna, maiores ea honores sibi quaerent. Frequensque in graecis dictum est, *κόρχορον* in *λαχάνοις*, quod est, Corchorus inter olera. Quoniam haec necessarium, gratum, & utilem usum habent: ille uero miscet se quidem in horto oleribus, sed ob humilitatem suam sine gratia, aut maioris utilitatis spe. Theophrastus tamen libro. 8. de plantarum historia, in proverbium & maledictum transisse ob amaritudinem testatus est. Verba eius sunt. *καὶ ἴτερα δὲ πάλιν τούτων ἐν οἷς καὶ παροϊστέοντες ἐπὶ δὴ πικρότητα κόρχορον. τὸ πολλὸν ἔχον ἀκριμῆδος.* &c. Quod est. Et praeter haec plura alia, inter quae & Corchorus est, ob amaritudinem in proverbium translatus, folio Ocimi figura. Quod si hac ratione intelligendum id erit proverbium, contra eos dicitur, qui paratam homini uoluptatem, & suauis rei alicuius usum, tristi & amaro aliquo turbabunt. Fuerunt deinde, qui colorem floris Anagallidis adijcentes, Puniceam, & qui Aeritim, idest, aeriam a ceruleo colore nominarent, genera eius potius distinguentes quam nouis appellationibus indicantes. Quemadmodum & Augitim a fulgore coloris & luce aeris, quam graeci *αὐγὴν* uocant, alij pariter indicauerunt. A lacertis deinde notissimo insecto, quas graeci *σαύρας* dicunt, Sauritis appellata Anagallis fuisse credi potest: quoniam succo eius uiperarum moribus antiquitas mederetur, quae lacertis quadamtenus similes sunt: uel quod frequens hoc insectum in aruis inter Anagallides inueniatur. Acceditque sententiae huic testis Nicander in Theriacis suis, *σαῦρον* herbam appellans, contra uenenata utilem. Quam ob causam, mutata tantum nominis forma, hic Sauritim ab aliquibus appellari dixit. Non tamen ex Nicandro colligi, & pro comperto haberi potest, *σαῦρον* ne ille Anagallidem, an aliam in olerum genere herbam sic uocet. Nosque ad hanc rem coniectura magis quam ratione, aut aliorum autoritate usi sumus. Fecit praeterea similitudo, ut Hirundinaria, & Alicacabus, alterius generis herbae, sola appellatione in Anagallidem censum & nomenclaturam uenerint. Et haec pro tam multis Anagallidum nominibus dicta facis sint. Caetera enim incognita nobis, alijs docenda relinquuntur. Restituimus huic capiti etiam quod in eo perierat, mederi scilicet Anagallides praeterquam iocinorosis, cutem subeuntibus aquis. Id enim in describendo relictum a librarijs fuerat, nec nisi in antiquissimis graecis & latinis seruabatur.

De Hedera. CAP. CXCIX.

Pl. li. 26, ca. 7.

Hedera aliquibus Citharon, alijs Cissaron, alijs Chrysocarpos, alijs Poetica, alijs Corymbethra, alijs Cyssion, alijs Dionysia, alijs Ithytherion, alijs Persis, alijs Cemos, alijs Asplenos, Romanis Syl-

A
 tia mater, alijs Hedera, Gallis Suibites. Hedera differentias multas in
 specie sortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est.
 Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra
 nigrum, aut Croci æmulum, quam uulgo Dionysiam uocat. Helix
 fructum non gignit, sed tenues habet palmites, & folia parua, angu-
 losa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. Neros ten-
 tat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die
 potus. Ambustis cum cærato illinitur. Recentia folia ex aceto cocta,
 aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum
 succus, cum irino unguento, melle aut nitro, naribus infunditur. Et
 contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfun-
 di utile est. Purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo medetur. Ni-
 græ Hederæ succus, aut epoti corymbi corpus infirmant. Mentemq;
 turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punico cor-
 tice cum rosaceo, si instillentur a contraria aure, dolorem dentium mi-
 tigan. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta illi-
 nuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacœthe sint. Vitia cutis in
 facie, & ambusta sanant, uti antea diximus decocta. Mouent menses
 triti, & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes sceminarum, dra-
 chmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle
 irrigatus, ac uulvæ inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus suc-
 cus, putrida tædia narium, graueolentiamq; emendat, & sanitati restituit.
 Lachryma Hederæ Psilothrum est. Illitu pediculos enecat. Succus in
 aceto potus, contra phalangia prodest.

BARBARI COROLL.

Hederæ frutices quædam uendicant, sed arborum magnitudine crescendo æquât. folia primo an-
 gulosa, processu rotundant. Multa ei gñâ. Humi repit Chamæcissos; de qua in loco. Celsarum
 tria capita. Candidum. Nigrum. Et Helix, id est, Clauicula, siue Pampinus uocata. Candidum ali-
 ud fructu solo, aliud fructu & folio. Id qd fructu solo cander, aut crassiusculum, densum, globa-
 tumq; habet eum, & Corymbias uocat. Athenis uero Acharnicon irriguû, aut minorem aci-
 num, sparsiolemq; Racemum, & Silenition appellant. Simili modo in nigra, cui & suæ quædam
 differentie sunt, sed minus perspicuæ. Alicui enim semen nigrum. Alij crocaceum, cuius coronis
 poctæ utant, folijs minus nigris: quæ & Nysiam, & Bacchicâ, & Dionysiam uocabant, maximis
 inter nigras corymbis. Alij duo genera fecerunt a colore acinorum, Erythranon, & Chrysocar-
 pon. Helix ab Hedera distat apertissimo discrimine. Primum folia huic angulata, concinna, exi-
 gua: Hederæ simplicia, rotundioraq; distat & longitudine internodiorum, præcipue tamē sterili-
 tate: quoniam fructum non gignit. Quidam hoc ætatis uitium intelligunt, primoq; esse Helicem, &
 Hedera senectute fieri: qd quidē falsum esse Theophrastus & Plinius contēdunt: cū quia foliū
 & germen Helicis ab Hedera cōlibet annosæ folio plurimū differat: tum quia plures eius diffe-
 rentiæ noscant. Herbacea, seu tirens, quæ numerosissima est. Altera folio alto. Tertia uersico-
 lore, quæ Thracia uocat. Herbacea duplex genus. In uno tenuiora folia, digestaq; per ordinē,
 longiora densioraq; in altero diuersa oia in minus. In uersicolori quoq; alia folio crebriore,
 tenuiore, ordinato: in altera incondito, nūc maiore, nūc minore, maculosoq;. In candido gñe,
 alia plus, alia minus sunt candida. Crescit in longitudinē potissimū Herbacea. Nunc reuertor
 ad Hedera. Hedera ubi semetescere occipit, germē sublime, rectūq; agit. Radice numerosa, cōn-
 torta, densa, crassa, lignosa: nec admodū profunda, præsertim nigra. Et candidarū quæcūq; asper-
 rima imitissimaq; est. Hæc & arbores amplexu & suctu stragulat, tanta crassitudine, ut ipsa per

B
 Theophras. li-
 bro. 8. cap. 2.
 Plin. li. 16. ca. 34.
 lib. 24. cap. 10.

C se arbor fiat. Signa eius, folia maxia & latissima, māmas, hoc est, germina subrigētis, quæ sunt cæteris inflexæ. Racemi stantes atq; recti. Radicosa & robusta. Huic maxime uni brachia. Post ipsam Nigræ: sed propriū Albæ, q̄ inter media folia emittit brachia, q̄bus arbores cōplectit, & parietibus obrepit. Pluribus hæc locis succisa durat, atq; uiuit. & tōidē initia radicis habet, q̄ brachia, ob id flexipedē cognomēto apud poētas. In nigra & alba alijs dulcedo Acini: alijs tanta amaritudo, ut aues nō attingāt. Est & rigens Hedera, q̄ sine adminiculo stat sola oīm generū, ob id uocata Cissos a Theophrasto & Plinio, quasi Columellā in eo uocabulo significent. Sed summa diuisio iisdē auctoribus, in marē, & foeminā, q̄ altera foliū durius, pinguius, maius habet, & florem ad purpurā accedentē: altera non habeat. Vtriq; tñ flos syluestri rosæ similis, sed minor & inidoneus. Quæ descriptio uidet̄ recētoribus quibusdā non Hedera, sed Cisso cōueniens, cui & sexus & flos punici tribuit̄. Sed Theophrastū sequutus est Plinius li. stirpiū sexto, hæc ipsa non de Cisso, sed de Hedera prodeuntē. Hedera Theophrasti ætate in Asia nasci nō poterat: nec in India, nisi mōte Mero, unde ortus est Bacchus. Frustra & Harpalū laborasse oīmo do tradūt, ut fereret eam in Medis. Inimica arbor satis oībus, sepulchraq; ac muros rūpens Serpentū frigori gratissima. Vfos in funes, et armamēta nauū Hedera ueteres, auctor est Athenæus, quæ e Rhodano petebāt, ut Canabim. Catonis experimentū, uolenti scire, aqua in uinū addita sit, nec ne: ut uasculū e materia huius faciat, uinū quod erit dilutū, transluet, aqua manebit, nec em̄ continet uinū inquit uas Hederaceum. Quod poculi genus græci Cissybion, ab Hedera uidelicet appellant, q̄q; pro quocūq; ligneo id accipitur. In quo significatu & Cymbiū, & Cypellū quandoq; sit. Alij uerustos calices Cissybia intelligunt, propterea q̄ in Didymi Iouis dedicatione folijs hederaceis libare moris fuisset. Cymbia uero, quæ ansis careant, oblonga & angusta, nauigij spēm præbentia. De Hedera Cilicia, quæ tamē Hedera non est, in Smilace tractica quarto uolumine monstrabit̄. Cisson, hoc est, Hedera pusionē Liberi patris fuisse Græcia conflinxit, in noīs sui fruticē conuersum, dū minister cū eo deo saliens, terræ allisus perijt. Athenienses Citron ipsum Bacchū uocant, & apud se Acharnis uico natā Hedera primo uolunt, ut ingit Pausanias. Syluestre Hedera cerui phalangio percussū mandūt, & liberant. Aelianus auctor.

EX M. VERG. COMM.

D Nūmerantur a Plinio uiginti Hederarū genera, folijs, corymbis, uiticulis, altitudine, humilitateq; & usu diuersa, oīa a Theophrasto diuersis locis accepta. Copiosiorq; ille generū numerus, quē in ore oīm fuisse quondā uerisimile est, occasione ut nos credimus scriptorē hunc exscribentibus attulit, ut a principio statim Hederarū historię tā multis, tamq; diuersis appellationibus, non una noīaretur plantā, sed unius plura numerarentur genera.

De Chelidonia.

CAP. CC.

C Helidoniā magnā, nonnulli Pæoniam uocāt, alijs Crataam, alijs Aubion, alijs Glauciā, quidam Philomedion, alijs Othonon, Romani Fabium, Galli Thonan, Aegyptij Nothorh, Daci Crustana. Chelidonia maior, caule est cubitali, aut altiore, surculoso. Folijs Ranunculi, multis, mollioribus tamē, & colore caesijs, flore uiolæ albæ, secundū singula folia prodeunte. In ea succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauiter olens. Radix superne singularis in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua ceu corniculati Papaueris, tenuis, longa, in qua semen Papauere maius recluditur. Succus in æreo uase, cū melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos Radix cum aniso, & uīno albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpūt. Imposita cum uīno, aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, q̄ aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant hirundines matres excacatis pullis adferentes hærbam uisum restituere.

Χελιδόνιον
παιονία
κρατάνα

EX M. VERG. COMM.

Chelidonium; siue Chelidonia, siue Chelidonea, hoc est, Harundinaria maior, fruticoso caule, folio Pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudine duum cubitorum. flore luteo. Collyria quoq; quibus ex hac utuntur, Chelidonia appellantur.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Hirundo, quæ Græci Chelidona uocant, notissima auis, notissima omnibus etiam nunc herbarum nomen. Vtq; id pro cōperto est, sic contra non satis certū, quid sibi & aui tam cōmune sit; quidue inuicem agentes, patientesue cōmunicato nomine inter homines censeantur.

De Chelidonia minore. CAP. CCI.

Chelidonia minor, quam Tyrinon sylvestre aliqui nuncuparūt, hærubula est stolonibus constans, sine caule, folijs Hedera, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpinguibus. Radices habet complures pusillas, in granorū tritici modum acruatim congestas. Quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas nascitur. Vis ei acris & Fremij modo summā cutem exulcerat. Pforas, & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus, ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctū eius cum melle gargarizatum ualide caput inanit: & omnia pectoris uitia extrahit.

BARBARI COROLL.

Chelidonia minor, folia Hederae habet, minus candida.

EX M. VERG. COMM.

Emendauius ex antiquissimorū græcorum latinorumq; codicum fide, in minore Hirundinaria quod male in impressis uulgatioribusq; πύρινον legebatur: diximusq; agreste triticum, id est, πύρον uocari minorem hanc Hirundinariam. Nec tantū antiquitatis fide & testimonio id fecimus, q; ex historia scriptoris huius, qui habere eam ait inter cetera, radices tritici modo coaceruatas. Satisq; pro ea dicta hæc sint.

De Othonna. CAP. CCII.

Othonna aliqui maioris Chelidoniae succum esse aiunt. Alij succum floribus corniculati Papaueris expressum. Alij permistos ceruleæ Anagallidis, Hyoscyami, & Papaueris succos esse contendūt. Alij Troglodyticae hærbae succū, quæ Othonna uocatur: nasciq; eam in eo Arabiae tractu, qui ad Aegyptū spectat. Othonna similis Erucae, perforatis crebro folijs, & ueluti a tineæ derosis, squallore obsitis, paucis. Flore Croci, latifolio. Quare quidā Fremij speciem esse putauerūt. Extractus succus oculorū medicamentis adijcitur, ubi expurgare est opus. Mor detenim, & abstergit omnē caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendā ex hærba emanare, qui elotus, semotis calculis, in passillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmāt, lapidem esse Aegyptiū, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, candido colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

BARBARI COROLL.

Othonna herba nascitur in Syria, Plinio secundo. Paulus Othonnam uocando in compositionibus plerisq; maius Chelidonium interpretatus est. Sed aliud tamen genus est Othonna, quod hic describitur.

EX M. VERG. COMM.

Quis audeat ætate hac nostra, cui præteritorū seculorum negligentia & temporū iniurijs notissima quæq; adeo perierūt, ut quæ in hortis etiā quodidie per se, aut humano o-

A

Theophr. li.
bro. 7. cap. 14.
Pli. li. 27. ca. 26.

χελιδόνιον τὸ
μικρὸν
τύρινον ἄγριον

B

Othonna

Pli. li. 27. ca. 12.

D I O S C O R I D I S

C pere nascunt, ex antiquis appellationibus signari & ostendi digito nequeant, qualis, & quæ qñ dam Othonna fuerit dicere: Scriptori huic, & post eū cunctis alijs non satis cognita, & ex alio rum fama historiaq; tantū tradita: qdq; magis miremur, oēs in diuersis penitus gñibus nume- rata, alijs succū, & hunc multarū simul & per se herbarū, alijs herbā cuius longior sit historia, alijs lapidē in Thebaide Aegypti nascentē eam indicantibus. Quo fit, ut pter ea quæ a posteri- ribus tradita de ea fuerūt, nihil nos dicere, & in tanta tot scriptorū unius rei uarietate censere ua leamus. Plinius lib. 27. cap. 12. herbam tantū credidit. Verba eius sunt, Othonne in Syria nasci- tur, similis Erucae, perforatis crebro folijs, flore croci: quare quidā Anemonē uocauerūt. Sue- cus eius oculorū medicamentis cōuenit. Mordet em̄ leniter, & calefacit, adstringitq; sicando. Purgat cicatrices, & nubesulas, & quicqd obstat. Quidam tradūt lauari, atq; ita siccata digerī in pastillos. Quæ oia paulo minis, q̄ iisdem uerbis ex hoc scriptore accepta sunt. Videturq; Plinius, relictis de Othonna opinionibus alijs oibus, in herbarū genere eā pro cōperto consti- tuisse. Paulus Aegineta de simplicibus sexto uolumine agens, non herbā hoc noie, sed herbæ succū in Arabia ad Aegyptū nascentis appellauit. Idem eodē loco retulit, & eodē quo hic scri- ptor modo dicere alijs lapidem Aegyptiū esse Othonnā. Hic ipse pterea in cōsecutionibus me dicamentorū quorundam, Othonnā interpretatus est, maioris Hirundinariæ succū. Nos illud iam pridē cogitauimus, & in eam partē inclinat animus, ut credamus sui gñis herbam oīno esse Othonnā: quæ uero alia de ea tradunt, a uirū & potestatis similitudine ab alijs credita, di- ctāq; fuisse: & ex eorū rōne, quæ græci ἀντιβαλλόμενα .i. ut nostræ ætatis medici uocāt, quid pro quo, ad Othonnā translata fuisse. Quod autē dicimus, huiuscemodi est. Potest Othonna oculis mederi: atq; hic χυλίσθηαι ὑπὸ τῶ ὀφθαλμικῶ ὀπενδύ ἀποκαθαίρειν, qd est, exprimi ad oculorū medi- cinā ex ea succum, ubi purgandū exterendūue aliquid sit. Quod totū pariter potest Hirundina riæ succus, de qua hic ait, ἀρμόειν πρὸς ὁφθαλμίων: quod est, conferre oculorū claritati. Causaq; hæc, ut nos credimus fuit, ut Othonna Hirūdinariæ succus esse crederet: non quia idem illi ef- fer, sed q̄ idem posset, nec aliunde q̄ ex eadē hac p̄tate Glauciū esse Othonnā, pariter tradidisse alijs. Siquidē & Glauci (ut hic in eo dicet) χρῆσις ἐστὶ πρὸς τὰ ὀφθαλμικά, qd est, usum Glauci ad oculorū medicinā esse: quibus cornutū Papauer etiam, Anagallis, Apollinarisq; herba pariter utiles (ut ex earū historia medicinaq; legentibus patebit. nos enim breuitatis causa suis locis di- cenda iterum, nunc relinquimus) succo suo in Othonnā appellationem uenerūt. Ex his facilis coniectura est eius, quod paulo ante diximus, quia pro Othonna, quā non facile omnibus lo- cis inuenisse erat, in Arabia & Trogloditis nascentem, a medicis alia illa imperari soleret, ideo credidisse multos sui generis herbam aliarū multarum succum fuisse: qui legitime deficiente ea, in oculorū uitijs, ob æquales uires, in usu esset. Nec alia ratione Aegyptius lapis Othonna etiā creditus est: quoniā ex eo, scilicet collyria ad eadem oculorū uitia conficerentur. Eum lapidem Barbarus aris colore, quasi χαλκοχροὺν, secutus quorundam codicum fidem dixit. Nos uetu- stiorum, meliorumq; lectionem λευκόχρουν, id est, candido colore.

D

μυῖος ὄτης

De Auricula muris. **CAP. CCCIIII.**
MYosota, alijs Myoton, alijs Anthilion, alijs Alsinen, nonnulli Mys- orthochon, alijs Myrtosplenon, Latini muris Auriculam uo- cant, Aphri Labatholabat. Nomen ideo accēpit, q̄ musculorum au- res folijs imitetur. Lucos, & sabulosa loca amat, ideo Alfine dicta est. Ea Helxinæ similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratori- am habet. Oculorum inflammationibus conuenienter ex polenta illi- nitur. Succus eius aurium doloribus instillatur. In totum eadem po- test quæ Helxine.

Pli. li. 27. ca. 12.

BARBARI COROLL.
MYosotis Alfine cognominata, quasi nemoralis. Nascitur & in hortis, & maxime in pa- rietibus. Incipit a mediā hyeme. Arescit æstate mediā, cum prorepat auribus musculorum ex- pressis. De hac sub uocabulo Alfine repetuntur omnia hæc libro quarto. propterea nihil ibi diximus. Dicuntur Myosotides, & Myosotæ a Galeno.

EX M. VERG. COMM.
Satis cur Myosota, & Alfine herba hæc quondam dicta fuerit, hic scriptor ostendit: & qui

græcas nouerunt literas, auditis tantū uocibus illis, idem intelligent. Plinius etiam libro. 27. ca. pite quarto eam describens ait. Cum prorepit, musculorū aures folijs imitatur. Cuius animalis uox alijs appellationibus coniuncta, eandem causam habet. Siquidem Myoton, muris aurem pariter significat: & Myotosplenon, ex muris aure & aspleno herba composita uox est: quæ ab altera muris auricula ad priorem hanc trāsata fuit. Siquidem hic in ea quæ paulo post sequitur Scolopendrio, quæ eadem Aspleno est, similem esse dicit. Est illud in appellationibus his etiam animaduertendum, de eadem herba doceri hoc loco sub titulo Myosota, iterumque in quarto sub titulo Alfine: esseque eandem utrobique historiam eius & medicinam: ideoque cum semel hic de ea actum fuerit, non esse de ea iterum agendum. Cum eo peruenerimus, iterum legentes idem monebimus. Illud etiam significasse uolumus: quæ plerumque inuenitur, & quam nos aliquando uidimus Muris auriculam, altera, & quæ statim sequitur est.

De altera Auricula muris. CAP. CCCIII.
Muris Auricula quā Myosotida uocant, herba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus rubentibus, concavis ab imo. Folijs angustis, oblongis, dorso acuto, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis, ex alarum sinu prodeuntibus, flore ceruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. In summa, Scolopendrio similis, sed breuior, minor. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui Helxinen, muris Auriculam uocent.

BARBARI COROLL.
Myosotis hæc quæ posterior describitur, iustius Myosotis tantū dici solet quæ proxima, quæ Alfine potius, quæ Myosotis appellata sit ueteribus.

EX M. VERG. COMM.
VNum tantū nos uidimus Muris auriculæ genus, alterum scilicet hoc, & secundo loco a Dioscoride traditum: respondentque sensui omnes eius notæ: prioris nullum inuenimus oculatum testem. Antiquissimi etiam latini Dioscoridis codices, posteriorem hanc solam ostendunt. Quinetiam Plinii ætate, si quis uerba eius sagacius odoretur, non satis certa res erat. Ait enim post descriptam Alfinem, Sed aliam docebitis quæ iustius Myosotis uocetur. Paulus Aegine tamen postremo unum tantū genus eius in sexto pariter agnoscit. In omnibus tamen græcis duo capita hæc legunt, quo uertimus modo ubique scripta: eaque ob causam qualia erant latinis reddita.

De Glassto satiuo. CAP. CCV.
ISatis satiuæ, aliquibus Augion, Magis Arusion, Romanis Gluta, aut Glasstum dicitur. Glasstum quo infectores lanarum utuntur, foliū habet Plantagini simile, uerum pinguius, nigriusque. Cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia, tumores omnes discutiunt, Cruenta uulnera glutinant. Sanguinis profluvia sistunt. Ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant.

BARBARI COROLL.
ISatim Lactucis syluestribus annuerant. Duo ei genera Plinio redduntur, itemque Dioscoridi. Nascens in syluis. Alterū insectoribus dicatum: quod & satiuum Dioscoridi, Galenoque uidetur. Plinius syluaticum uocari tradit, simile Lapathio syluestri folijs, nisi plura essent & nigriora, quam uulgo modo Gualdum, ueteres Glasdum, siue Glasstum lingua gallica dicebant. Eo Britannii mares & foeminae oblinebant se. Mares, ut ceruleo colore metum hostibus afferrent. Foeminae, ut in quibusdam sacris incederent nudæ, colorem Aethiopum imitantes. Istam Dioscorides Egenen quoque uocari prodit. Credo hanc ab Hippocrate Icnem, siue Ignem dici. Dioscorides Istam latine dici Rutam, Apuleius Alutam scripsere. Fallum utrumque suspicor, & Lutam, siue Luteam uocari credo. De Lutea herba Plinius & Vitruius inter colores tantum loquuntur. Plinius, Chrysocolla inquit illa quoque herba tingitur, quam Luteam appellant. Idem paulo post: Luteam Chrysocollam ab herba Lutea dictam putant, quam ipsam ca-

A

B

ισαρία
αυγίον

Pli. li. 20. ca. 7.

D I O S C O R I D I S

Ceruleo subtili pro Chrysocolla inducitur, Viſtruius, qui non possunt inquit Chrysocolla propter raritatem uti herba, quæ Luteum appellatur, cæruleum inficiunt: & utuntur viridissimo colore, hæc autem inquit, Infectiva appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Nihil nunc Isatide notius, Maximūq; sibi uestigial ex ea fecerunt, qui Tiphernates agros ad Tyberim, omnemq; regionis eius tractū, neglecta omni alia annona, hac tantū herba conserunt. Tantis nūc tinctis colore eius lanis honor est. Guadū nostra ætas appellat. Apuleius in commentariolo illo, quod de aliquot herbis reliquit, Alutam ab Italis uocari ait. Quæ uox q; integra in eo scriptore sit, non satis cognitū nobis est: quoniam nihil herbæ huic cū corio. Quæcūq; autē ea futura sit, eam credimus esse quā hic pariter uitiosa uoce Rutam a Romanis uocari ait, cōmune nihil, aut simile illi habentē. Non tamen ab re est, ex Ruta, & Aluta uitiosis uocibus, neq; Isatidi cōuenientibus tercia aliquam suspicari, Luteam, scilicet quā Romani aliquot scriptores inter colores retulerūt, Viſtruiusq; præserim, ad extremū septimū uolumen dicens, Qui non possint propter caritatē, Chrysocolla uti herba, quā Luteam appellant, cæruleū inficere. Barbari quondā tingendis corporibus suis tam uiri q; fœminæ ea utentes, Glastum uocabant. Eratq; in tingendo præcipuus eius usus. Antiquiores græci, latiniq; inter syluestres Lactucas eam numerauerūt. Plinius longissime de ea egit. 20. uolumine capite septimo.

De syluestri Glasto.

C A P. CCVI.

ἀγρία ισάτις

Syluestre Glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima, caules prætenues, multifidos, rubicantes. In quorum cacumine folliculi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen. Flore tenui, luteo. Eadem quæ & supradicta præstat. Potu & illitu lienosis auxiliatur. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, satiuum Glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos linguæ speciem representantes, in quibus semen continetur, Melanthio simile, caulemque supra binum cubitorum altitudinem attolli. Syluestre uero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiolem. Florem purpureum, aut cæruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito diuisum.

B A R B A R I C O R O L L.

De hac Isati dictum est in satiuo proxima: qui & Radiculā, quæ sit Struthion, Isatin uocari putent, ducunt mendoso loco: quæ nos in Plinio correximus. 19. naturalis historię libro.

E X M. V E R G. C O M M.

Abundabāt in syluestri Isatide multa, quæ ab eo quo nos desijimus loco in alijs legunt: eaq; ob eam curtū, minusq; omni ea parte nos fecimus hoc caput. Nec sine rōne, ut credimus: quādo in antiquissimis græcis, q̄s licuit uidere, nulla ea est. Neq; is quæ nos habemus, longissime antiquitatis latinus Dioscorides id habet. Quodq; pluris facere nos decet, q; absurdū uidet, post utriusq; Isatidis decreta, hunc ipsum scriptorē, quæ a se facta fuerant dānare, legētesq; his uerbis monere. Cæterū scire oportet, falsas esse descriptiones has. &c. Cum liceret quæ male incepta a se fuissent, anteq; ederent, in melius, & quod uerū esset mutare. Accreuit ea pars scriptori huic ab aliquo, qui aut certius de Isatide omnia nouisset, aut nouisse se crederet. Multa huic scriptori hac rōne adscripta a medicis, a librarijs deinde illi cōmixta, & inserta mala infusione, in unū corpus coaluerunt. Quæ nisi diligentius & cautius excutiantur, & purgent, multis locis, usum eius & gratiā dehonestabunt. Est illud etiam hoc loco repetendū, quod non multo antea in Arabide dictum a nobis est, abundare, scilicet hoc loco, quod Isatidem statim sequitur, Arabidis caput. De ea enī quæcūq; ea sit, qd oportebat, dictū hoc ipso uolumine fuit.

De Telephio.

C A P. CCVII.

ἐλεφίον
αἰγίον ἄγριον
αἰγίον ἄγριον

Telephium aliqui syluestre Semperuiuum, alij Portulacam syluestrem appellāt, Romani Illecebram, Aegyptij Anoth, Aphri

A Tirtopurin. Hærbæ Portulacæ similis & caule & folijs, habens geminas alas, singulis foliorum geniculis inhærentes: a quibus rami seni septeni-ue fruticant, a radice referti cæruleis folijs, crassis, lentis, carnosis. Flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maxime inter uites. Tempore uerno folia senis horis illita, albam utiliginem sanant. Sed postea hordeacea farina illini debet. Perunctam etiam in sole utiliginem tollunt. Sed ubi inaruerunt, absterguntur.

BARBARI COROLL.

T Elephion uagum et cōmune plusculis herbis nomen. Dioscorides senos septenosq; ab radice ramos ei tribuit, Plinius etiam octonos. Differre hanc merito existimant ab alia quam diximus hoc libro Telephion, & Andrachnen agriam uocari; quando quidem tam Dioscorides q̃ Plinius medicinas earum, atq; notas seorsum utriusq; reddunt, ceu duorum generum, Telephion hic descriptam, sunt qui eam putent esse, quam Romanæ officinæ Pulmonariam uocāt. Vegetius in Mulomedicina Pulmonariam, siue Pulmonatiam appellat: quam & Consiliginē dici tradit, bubulcis & mulomedicis, hoc est, ueterinarijs præclare cognitam.

EX M. VERG. COMM.

T Elephion. 27. uolumine capite ultimo breuius certiusq; scriptore hoc Plinius descripsit. Nihil tamen non acceptū ab eo est. Quo fit, ut suspicemur uitiū aliquod in historia Diosc. esse. Sunt enī pleraq; parum certa, nec sequaci uerborū serie tractata. Nos tñ nihil mutauimus: monemusq; tñ. p̃ter sex horas, q̃ tēporis spacio hic iubet leucem Telephij folijs illini, addere Pliniū ternis mensibus id faciendum esse: quod in scriptore hoc desyderari posse uidetur. Manifestam tamen causam id non habet, longiusq; id tempus merito alicui pro rei necessitate uideatur.

The. li. 9. ca. 19

Pli. li. 27. ca. 13.

¶ Finis LIB. Secundi.

PEDACII

B

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Tertius.

IO. RVELLIO interprete.



P VPERIORIBVS charissime Ari cōmentarijs, tradidimus de aromatibus, unguentis, oleis, arboribus, & prodeuntibus ex eis fructibus & lachrymis. Item de animalibus, frumentis, oleribus, & hærbis acrimonia præditis. In hoc autem Tertio de radicibus, succis, seminibus, hærbis quæ & uernacula consuetudine usurpantur, quæq; pluribus scatent remedijs, differemus.

¶ De Agarico. CAP. I.

A Garicum radix fertur Laserpitio similis, sed facie summa soluti- or & fungosa tota. Duo eius genera. Fœmina rectis uenarum discursibus constat. Mas rotundus est, & undiq; compactior. Virique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit Sarmaticæ in Aqu

A

D I O S C O R I D I S

C folia prouenit. Sunt qui radicem esse Plantæ affirmant. Alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asiæ contermina, & Cilicia in cedris. Sed friabile & infirmum. Ad stringendi, calfaciendiq; naturam habet. Contra tormina, & cruditates, rupta, præcipitationesq; efficax. Datur duobus obolis in uino mulso, febrem non sentientibus. Febriculosis uero in aqua mulsa. Arquatis quoque, suspiriosis, iocineris, renumq; uitio laborantibus, dysentericis. Item si urina ægre reddatur, si uulvæ strangulatus urgeat, si pallor membræ decoloret, drachma una dari solet. Si tabes infestat, ex passo. Si lien negocium exhibet, ex aceto mulso. Si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acide ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articularum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur. Menses ciet. Fœminis, quas inflatio uulvæ uexat, utiliter æquali modo datur. Rigores soluit, datum ante febrium significationes. Alium purgat drachma una, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Venienorum antidotum est, drachmæ instar, cum diluta portione sumptum. Si serpentes ictū uibrarūt, morsumq; subfrixerūt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, p uiribus et ætate datū nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

D ictū uibrarūt, morsumq; subfrixerūt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, p uiribus et ætate datū nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.



H E R M O L A I B A R B A R I
Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ Collegiariorum **L I B. Tertius.**

Pli. lib. 27, ca. 9

A G A R I C V M in arboribus nascitur, fungi similitudine circa Bosphorū, colore candido. Masculus amarior. Galliarum quoq; glandiferæ maximæ arbores relucens, & candidus. Ideoq; in tenebris decerpitur. Dioscorides Agaricum ueneni uim habere, sed id quod nigrum est affirmat; & regione Sarmatarum, quæ ὄρεια, hoc est, syluestris dicitur nasci. Quidam codices non Agriam, sed Agariam habent. Vtrumq; tueri possumus. Primum ex Plinio, Regio inquit Sarmatiæ syluestris Hyleum mare, quo alluitur, cognominauit. Alterū ex Ptolomæo, qui Agarum & urbem, & amnem in Sarmatia uocari tradit. Appianus Alexandrinus, Agaros scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert, propter quod Mithridates eos apud se habuerit.

f^o p^{ro}v

R H A aliqui Rheum, aliqui Rhiā, Latini Rhaponticum uocant. Prouenit in ijs quæ supra Bosphorū sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantum leuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorem reddat pallidū, aut ad crocū inclinantē. Id eposū facit ad inflatiōes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolorū, ad conulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renū, uesicæ, & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uulvæ mala, coxendicum dolores, sanguinis

A excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualitudinibus eodem quo Agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febricare ant, in mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabe experiunt, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso. Si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur. Liuentia, lichenasque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

BARBARI COROLL.

Rhaponticum, radicem Ponticam a Cornelio uocari cenfeo, a Galeno & Paulo Rheon, a Plinio Rhacoma, nisi deprauatus (quod fere suspicor) locus sit, uulgo Rheu. Aetius Rhaon. Plinius Costo nigro simile demonstrat, in caetera cum Dioscoride conueniens. Habetur & Rha Barbarum, multo praestantius, efficaciusque Pontico, sed ante Paulum Aeginetam fere medicis incognitum. Eius mentionem autor is, in compositione quadam ad podagras habuit.

EX M. VERG. COMM.

Qui supra Pontum & Cymerium Bosphorum ad Panticapeum regionis eius metropolim uicinus Tanai, in Meotidem paludem influit, maioris illius fluminis luce & nomine, non satis in Geographia clarus quondam Rha dictus fluuius, Ponticae radici huic nomen dedit, & in ripis suis nascentem, ueluti adoptione quadam in sui nominis honorem admisit. Neque alia nominis eius, quam a natali solo causa & ratio est, ab Ammiano Marcellino historiae suae. uolumine his uerbis tradita. Tanais, qui inter Caucaseas oriens rupes, per sinuosos labitur circumflexus, Asiamque ab Europa determinans, in stagnis Meoticis delitescit. Huic Rha uicinus est amnis. In cuius supercilij uegetabilis quaedam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplices medelarum usus proficiens. Quod nouisse non parum hijs fuerit, qui sollicitis animis diuiserunt, & adhuc sunt, Ponticae ne huic radici eadem, an alia sit quam nostra aetas in quotidiano medicinae usu Barbaram appellat, facti enim dimidium, ut poeta cecinit, qui modo caepit habet. Auditis siquidem Ponticae huius radicis natalibus, non difficile erit, diligenti per mercatores qui ad nos Barbaram illam afferunt, a uenditoribus facta percontatione, nouisse, an quae nunc Barbara dicitur, Ponticae eadem sit: et an his quibus locis nasci eam Marcellinus ait, an alibi nascatur. Nobis pro comperto habemus nihil est, & si diligentiores in quaerenda tota hac re fuerimus. Si enim quae nunc ad nos Barbara affertur, aliud quam Rha fluminis supra Pontum & Cymerium Bosphorum ripas natale solum habebit, radices duas eodem nomine, sed diuerso patriae & gentis cognomine tunc esse constituendum erit. Sin contra, ex quibus Amianus Marcellinus locis tradidit ad nos afferri, unum tantum radicis huius faciendum erit genus, & in eo ex diuersis notis, non eadem bonitas. In quam partem inclinat animus nobis. Quo autem maxime inter se differunt, odor est: qui in Barbara uehementissimus, in Pontica nullus, si huic scriptori credendum est, sentitur. Nos certe scimus, sine odore uisam aliquando radicem quae Barbara uideretur, & crederetur, non tamen esset, ideoque a medicis in usu damnatam. Quocumque autem modo id fiat, non uidetur hic scriptor, siue alia penitus, siue bonitate a Pontica diuersa sit, Barbaram cognouisse. Nunc enim *ῥαπον*, id est, sine odore eam dixisset. Cetera in hoc & in alijs scriptoribus Ponticae radicis appellationes, ex eodem principio, primaque illa Rha fluminis appellatione fluxerunt, ideoque a nobis & alijs relinquenda. Relinquenda & quam Plinius dixit Rheomam, sine ratione aliqua, nunc in eo scriptore & incognitam penitus.

De Gentiana. CAP. III.

Gentianam aliqui Centauriam radicem, alij Aloen Gallicam, alij Narcem, alij Chironion, Dardani Aloitin, Romani Gentianam, uel Cicendiam, alij Ciminalē uocant. Huius inuentio prima assignatur Gentidi Illyriorum regi, a quo cognomen habuit. Folij proxime radicem, Iugladi, Plantaginiue similibus, subrubris, a medio caule, praesertim iuxta cacumē paulum dissectis, caule cauo, & inani, digiti crassitudine, geni

γυντικὴν
κενταύριον ῥίζαν

Culato, & ex interuallis maioribus foliato, binū saepe cubitorū. Seminē in calycibus lato, leui, paleaceo, satis ad Sphōdiliū semē accedente. Radice longae Aristolochiae, crassa, amara. Nasctur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radice excaustoria, & adstringens. Contra morsus serpentium, duabus drachmis cum pipere, ruta, & uino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deuolutis, ruptis, & conuulsis prodest. Hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus eiicit. Imposita ut lycium, uulneraria est; & ulcerum cunicularum depascendum medela. Succus praecipue eodem effectu prodest. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyrii acris imiscetur. Radix utiliginem absterget. Succus extrahendi ratio haec est. Con tusa radix quinque diebus aqua maceratur. Postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. Et ubi refrixit aqua, lintheo excolatur, Mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat. Ficulicq; reconditur.

Plin. li. 25. ca. 7.

Gentianam ubiq; nasci, sed copiosissimam sub Alpini montibus in Illyrio, praestantissimam affirmant, folio fraxini, magnitudine lactuca; caule tenero, trium aliquando cubitorum, radice lenta, subnigra, sine odore, aquosa.

B A R B A R I C O R O L.

DNota omnibus nunc etiam Gentiana est. Eam Centaurio similem Centauriam radicem alii qui nominauerunt, & ex eo Narcem; quoniam Narce Centaurium etiam dicatur. Fuerunt qui Aloem Gallicam, nulla foliorum, sed radice similitudine aliqua, quam utriusq; genus recta sub terram agit. Chironia a centauro Chirone dicta itidem est, quoniam et Centaurium ab eodem Chironia pariter nominetur. Credimus praeterea, quoniam Aloe diceretur Gentiana, a Dardanidis Aloitim pariter nominatam fuisse. Suspiciamus tandem in extremo capite uitium esse, illic scilicet ubi de radice coctura agitur, quam coqui hic iubet usq; dum radix illa superster & emergat. Qui sensus rei non satis respondet. Neq; enim ponderosae radices, quanta uoluerit aliquis coctura coctae per se emergent. Potuit quidem sic intellexisse, tamdiu coquendam Gentianae radicem, donec decrecente paulatim aqua desinat radix sub ea esse, eaq; ratione superster. Verum hic nunq; cocturae alicuius spacium sic docuit. Praeterea antiquissimi latini omnes pro eo habent, donec uirtutem ex se dimiserit; manifesto argumento, aliam fuisse quondam eius loci lectionem. Potest tamen ut diximus, defendi res; ideoq; nos communem aliorum omnium lectionem secuti sumus, & nihilominus quod obseruatum etiam a nobis fuerat, alijs significauimus. Non sunt etiam de Gentianae natalibus Barbaro, & nobis eadem omnia. Ille in altissimis montium crepidinibus nasci eam, nos in altissimis montium uerticibus diximus. Dioscorides in ὑψηλοτάτοις ἀκρωτηρίοις ait: quae uoces nihil aliud q̄ altissimos uertices significat. Siquidē montes omnes à grecis trifariam diuiduntur: ὡς τέρμαν, quod imas partes & radices significat, ὡς ἀκρωτηρίαν, idest, montium cacumina, & ὡς ὑψηλοτάτην, qua uoce descendencia iam montium latera indicantur. Aitq; hic ἀκρωτηρίαις, & addidit ὑψηλοτάτοις, idest, uerticibus altissimis. Cur autē ille crepidines uerterit, quae fundamenta maioris alicuius molis sunt, non satis uideo.

ἀριστολόχια
τραγγύλη

De Aristolochia rotunda. CAP. IIII.

Aristolochia rotunda nomen ex eo eius gēna tradūtur. Vna quae scemina uocatur, folijs hederaceis, praestanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, praelongisq; palmitibus, flore cādido tanq̄ pileolo, rubro, grauius olente.

BARBARI COROLL.

Aristolochiæ color ater, folium Alfinæ, ut Theophrastus inquit, rotundius. Nascitur in montibus præcipua. Genus quadruplex in ea latini seruant. Vñ Rotundæ, quam & Pheuxiæron uocabant aliqui, folijs inter maluam & hederam nigrioribus, pinguioribusq; qua cõtusa cum calce, in mari sparsa, pisces aduolant cupiditate mira, ut ait Plinius, uidisse id testatus, continuoq; exanimati fluitant: ob id piscatores, inqt, Campaniæ uocabant hanc Venenum terræ. Nunc & Cyclamini radice id contigit in eadem terra: ut putant. Alterum masculæ, atq; Longæ. Tertiū radice longissima, quasi uinum nouellarum, efficacissima: quæ & Cretica nomina- tur, flore purpureo, colore buxæo, bacculas ferens ut Capparis: quæ tamē tria in omnibus quoq; inueniuntur generibus. Est & quarta Pistolochiæ nomine, tenuior q̃ tertia, densis radicis capillamētis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrrhizon cognominant, & Satyri- on esse dicunt, ut in eius mentione docui. Odor omnium medicatus, sed Clematiti, hoc est, tertiæ iocundior. Nardinis quoq; unguentis conueniens. Effodere eas messibus tempestiuū est. Ma- xime tamen laudat Pontica, & in quocunq; genere ponderosissima, quæq; medicis aptissima. Nascuntur fere pinguius locis & plano, ut quidam scripsere.

De Aristolochia longa.

CAP. V.

Aristolochia longa, macula appellatur, nonnullis Dactylitis, alijs Melocarpos, alijs Teuxinon, Latine Aristolochia, longior q̃ rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus, flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in Pyri similitudinem cōformatur. Tuberibus radicum rotundis, ut Rapum. Longæ uero radix digiti crassitudinem, & palmi longitudinem implet. Nonnunq; paulo grandius adolefcit. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ Clematitis uocatur, ramulos habens tenues, re- fertos folijs subrotundis, minori Semperuuiō similibus, flores Rutæ, pleniores, radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; uestitas, unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis re- sistit. Longa uero aduersus angues & uenena, drachmæ pondere ex uino bibitur & illinitur. Pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, et omnia uuluarum onera eijs. Eadem efficit subdita in pello. Rotunda ad eadem pollet. Insuper singulis, suspirijs, rigoribus, lienī, conuul- sis, laterum doloribus, pota cum aqua singulariter auxiliatur. Acule- os & spicula extrahit. Ossium squammas illitu adimit. Vlcera putrida exest, & sordida expurgat. Caua cum iri & melle explet. Ginguas & dentes extergit. Clematitis ad eadem pollere creditur. Viribus tamen inferior est. Appellatur a quibusdam Ararisa & Melecaprum, Ephesti- os, Lestitis, Pyxionix, Dardanion, Iontitis, Gallis Theximō, Aegyptijs Sophœoph, Siculis, Chamæmelon, Italis Malū terræ, Dacis Ablinthiū rusticum. Nascitur in montibus & calidis locis, aut campestribus et pe- trosis. Ad grauem febrem efficax est. Si nidore subditis carbonibus fe- bricitans suffiatur, febris leuatur, Vulnera impositi sanat. Carcinoma- tis narium, cum cypiro & dracunculi semine, & melle prodest. Rigoris- bus medetur, cocta in oleo, aut adipe suillo, illitaq;.

BARBARI COROLL.

De hac qualis esset proxime indicatum nobis est. De Tertia, in primo Aristolochiæ genere

C iij

A

Pli. li. 25. ca. 7.
lib. 25. cap. 8.αριστολοχία
μαύρα
δαικτυλίτις
μηλόκαρπος

B

C

¶ De dulci Radice.

CAP. VI.

γλυκύριζα

Glycyrrhizam aliqui Ponticam, alij Glyceraton, quidam Symphyton, alij Leonticam, alij Glycyphyton, aliqui Seythion, alij Adipson, alij Sylithrā, alij Lybiestafon, alij Omceonomceon, alij Penzhaomceon, Latini dulcem Radicem appellauere. Plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus, folijs Lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet, ruffas & paruas, radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxci, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum Lytj exemplo. Is in arteriæ scabricia efficax habetur. Verum oportet ut linguæ subditus eliquefcat. Aestuantî stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit. Sanat uesciæ scabiem & renum dolores cum passo potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accommodatur. Cōmanducatus, stomacho prodest. Recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

Pli. li. 22. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Glycyrrhiza, siue ut Palladius, Glycyridia. Sunt qui hanc & Eryngem eādem esse falso putent, quoniam spinosa, & foliata uideretur. Fruticosa est, præstantissima in Cilicia, deinde Ponto. Adipson uocatur: quia sitim, famemq; sedet. Carpitur Vergiliarum occasu: quæ longa est ceu uitis, colore buxco. Melior nigra, quæq; lenta, q̃: quæ fragilis.

E X M. V E R G. C O M M.

D

Solo nomine in fingendis componēdisq; uocibus suis Romanis feliciores Græci, amabilem omnibus Glycyrrhizam fecerūt. Nec aliter q̃ in comœdia Glycerium, & in Venulinis carminibus Glyceram grato dulcedinis sensu in amorum leporibus poetæ illi illustrarunt: sic Ponticā, siue ut Theophrastus appellauit Scythicam radicem hanc, grata naturæ eiusdem dulcedinis nota, sola appellatione gens illa cōmendauit. Nec tantum ut amarent eam omnes effecit, sed in Scythia & Ponto sub septemtrionibus nascentem, propriam sibi, noui, & a se facti nominis alii cuius adoptione fecisse conarentur: laborarentq; libenter pro ea omnes, quæ in sanitate & ualitudine tam suauis posset homini rependere grātiā. Quod nos modo agimus, præsentî quorundie ab ea fructu & spe in tussî, & exasperatis faucibus: quo malo, frigiditate, tenuitateq; nostris aeris sæpenumero tentamur. Eam Theophrastus nono de plantarum historia, uolumine nondum factio illi a græcis, aut saltem non recepto ab omnibus, Glycyrrhize nomine Scythicam radicem uocauit. Estq; hoc quod Dioscorides ait, Scythicam ab aliquibus dici: & si passim in græcis non Scythicam, sed scythion corrupte legatur. Verba eius sunt. γλυκύριζα δὲ ἢ καὶ ἐκασθία, ἢ καὶ εὐθυγλυκία ἀπὸ τῆς καλοῦσιν. γίνεται δὲ περὶ τὴν μαίωτιν. Quod est. Dulcis & Scythica radix, quæ aliqui Euthyglyciam uocant. Nascitur circa Meotium paludem. Idem eodem loco causam reddidit, cur Adipfos etiam diceretur, non tam quia sitim simpliciter arceat, q̃ quia Scythæ ea, & Hippacæ, de qua diximus superiore uolumine, decem, & aliquando duodecim diebus sine alio cibo purarent. Verba eius sunt. ἀνέχεται δὲ καὶ τὴν διψᾶν παύειν ἰδιότης ἐν τῷ σώματι ἔχει. Διὸ τὸν τι καὶ τὴν ἰππᾶκην διὰ τὴν φασὶ τοὺς σκύθας ἡμέρας καὶ δέκα καὶ δώδεκα. Quartum sit sensus qui pauloante dictus a nobis est. Eadem ratio fuit, cur Pontica itidem diceretur: cur aut Symphyton, utriusq; similitudo fecit. Est enim, ut in quarto uolumine certius patebit, Symphyti radix dulci & saluam prouocante sapore. Pectoris & illud uitia emendat: faucium asperitati confert: postremoq; sitim cōmanducatum arceat: quæ omnia dulcis Radicis propria sunt. Credimusq; nos, in τῶν ἀντιβαλλομένων, idest, ex æqualibus, & eorum comparatione ad dulcem Radicem alterius plantæ translatum nomen fuisse. Dico autem æqualia, quæ nostræ ætatis medici, quid pro quo, appellant. Numerantur & aliæ ab hoc scriptore appellationes. Glyceraton, & Glycyphyton: a dulcedine factæ omnes, sola nominum conformatione diuersæ: quantum altera dulcem plantam, altera quod dulcedine sua amabile sit, significat. Celsus quod hic ipse testatur libro quinto

capite, 20. dulcem radicem simpliciter uocauit: quæ nos imitari, dulce Radicem, & si græca uoce Plinius usus fuerit, Glycyrhizam diximus. In cæteris appellationibus non est quod legentes moneamus, barbaræ enim sunt, aut adeo corruptæ, ut a barbaris non differant.

De Centaurio magno.

CAP. VII.

Centaurium magnum aliqui Narcen uocant, alij Limnesion, alij Maronem, alij Plectroniam, alij Chironiam, alij Limnestin. Magi Herculis sanguinem, Romani Fel terræ. Folia habet iuglandis, oblonga, uiridi Brassicarum colore, serrata in ambitu, caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu Papauerum, in rotunditate oblonga, flos caruleus, semen Cnico simile, floccis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusque locis circa Pholœon, Lyciam & Smyrnem. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, halitus difficultati, ueteri tussi. Sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur: si febris sit, in aqua, cæteris in uino. Item ad tormina & uulua dolores. Ramenta eius in collyrij formam uulua subdita, menses atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest. Nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio utuntur. Panacia appellata est, quoniam omnia mitiget uulua, quæ inflammationem minantur, plurimisque scateat remedijs. Pulsationes uulnerum, urinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complentur.

BARBARI COROLL.

Centaurion maius, caules habet geniculatos, folia lata & oblonga, & ab radice densa, radix tenera, fragilisque. Durat ætatis nec ultra duodecim. Cõmendatissima in ijs quarum Dioscorides meminit regionibus, præterquam in Alpibus. Dicitur & Centaurea, & Chironion, quia curatus ea Chiron sit, cum Herculis pertractanti arma sagitta excidisset in pedem. Nostri herbarij aliud Centaurium maioris cognomine demonstrant, flore luteo, folijs per interualla binis, æterfa parte candicantibus, interna uirulentibus, Salice maioribus, & connexis fere.

EX M. VERG. COMM.

Quæ Centaurium a biforini quam fabulati poetæ sunt natura eius dicta fuerit, Chironia a nomine, Pelethronia a Thessaliæ monte, in quo Lapithæ quondam equitadi peritæ gens, fræna & giros, ut poeta cecinit, alios docuerunt: inter quos & Chiron censebatur. Eandem hic Maroniam uocari ait, non amplius ex Thessalia, sed ex Thracia, in qua Maronius mons & Maronia ciuitas Homero notissima erat: quo loco copiosum forte, aut probatum nascitur Centaurium. Limnesion iudicæ a natalibus suis Centaurium aliqui uocauerunt, quod secundum paludes, quas Græci limnas dicunt, & aquarum scatebras nascit: quod & Plinius testatur. Libadion eadem aquarum significatione uocari dicens. Quæ deinde Romanæ uoces Centaurio in Dioscoride accreuerunt, Vnefera, & Phieri, nullam nobis significationem habent. Et quod Fel terræ in maiore hoc Centaurio legitur, ex minore adiectum contrarij sensu est. Siquidem ab hoc ipso maioris, radix dulci sapore describitur, minoris amaro. Præter quæ id sensus & experientia etiam ostendit, Alterius enim dulcior, alterius amarior in gustu sapor sentitur. Quo fit, ut Fel.

C. iij.

Κένταυριον μέγαν

Plin. lib. 25. ca. 6.

C quod amaro sapore est, minori, nō maiori cōueniat. Aperte id Plinius etiā lib. 15. ca. 6. testatur, de minore agens his uerbis. Hoc Centaurion nostri Fel terrā uocāt, propter amaritudinē sum mā. Ex eo facile fuit, ex maiore in minus appellationē eam transferre. Et hæc pro Centaurij ap-
pellationibus dicta hæcenus sint: in quo ueluti inutilia, nec huic scriptori legitima reliquimus, quæ in extremo capite in impressis, alijsq; quibusdā græcis codicibus leguntur ab eo loco, scilicet qui in græcis est, *ἡλὸν δὲ πανάκεια*, &c. In nouissimis aut latinis, cognominata est & Panacia, &c. Fecimusq; id uetustissimorū græcorum & latinorū fidem secuti, in quibus tota ea pars nulla est. Et si in Plinianis castigationibus hac sola auctoritate nixus, qd in Plinio legebat, mē-
deretur & ouīū morbis decoctæ succus, non ouīū, sed omniū scribi oportere Barbarus decreue-
rit; propterea, q Panaciā dici etiā Centauriū in Dioscoridis hac parte legisset, quæ uox omniū morborū remedia pollicetur. Verū id nos non pbamus, & nihilominus unicuiq; suū seruatur iudiciū. Persuasitq; id p̄cipue, qd ultimū in ea parte ad superstitionē solam p̄tinet, legendū esse, Centauriū appetente ortu solis, casto tēpore, quo oīa pleniora & p̄fectiora sunt, quæ ætate hu-
ius scriptoris insueta, et naturā docente homine indigna erant. Scimus qdem Theophrastū lib. 9. de plantarū historia, multas huiuscemodī obseruationes p̄currere; & in fodienda Centaurij ra-
dice nescio qd de Triorche accipere dicere, quæ tunc cauere oporteat. Sed nihil qd ad solem & tēporis obseruationē pertineat, in eo legitur; & nihilominus cuncta ab eo ex uulgi opinione re-
feruntur; & quatenus tutū sapienti erat, contra plebis superstitiones conari, ab eo damnatur. Cautius enim eo loco Theophrastus, ne uideretur religioni obstrepere, ait. *τὸ δὲ ἰσχυρότερον τὸ μὲν ἐν δὲ τῷ ἀποπον*. quod est, præcedente autē precatōne aliqua, radices fodere nihil absurdum.
&c. Verum nos latinorum omniū, & meliorum græcorū, in quibus nihil huiuscemodī legi-
tur, fidem secuti, omnē eam partem expunximus; & nihilominus poterunt uolentes ab alijs eam si placuerit repetere. Diximus deinde, nasci Centaurium, & amare stirpibus & arboribus confercta loca, *ἀρμύρας* sic appellantes, non sepes, sed arboribus fruticibusq; densos montes. Licet enī a quercu, quæ *ἀρύς* græce dicitur, *ἀρμύρας* fieri uideatur, nihilominus in cōmuni signi-
ficationis æstimatione, syluofus stirpe omnis locus ea uoce indicatur.

D

κνταύριον μι-
κρόν

De Centaurio minore.

C A P. VIII.

Centaurium minus aliqui Limnession, alij Elleboriten, alij Amma-
ranton, Magi Hercules sanguinem, Latini Febrifugam, alij Au-
ram, multi Radicem, Daci Tulbellam appellant. Limnession aliqui uoca-
uere, quoniam rigua amet loca. Hæba Origani, aut Hyperici similis,
caule anguloso, palmum excedente, flore Lychnidis, e puniceo in pur-
puram uergente, folijs Rutæ prælongis & paruis, fructu tritico simili, raz-
dice pusilla, læui, & superuacua, quæ gustāti amaritudinem adfert. Hæ-
ba recens tusa, suo illitu uulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & cis-
catrice obducit. Bilem, crassosq; humores per aluum exigit, si decoctā de-
uoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissime infunditur. Trahit enī
sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perq; uti-
lis. Siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. In uellere ap-
positus, menses & partus extrahit. Epotus peculiariter neruorum ui-
tjjs succurrit. Legitur semine prægnans, & diebus quinq; madefacta,
decoquitur donec superemineat aquæ. Mox ubi refrixit, lintheolo ex-
primitur. Et eiecta hæba, iterum decoquitur, usquedum mellis cras-
situdinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamq; contundunt,
atq; succum fictili non picato exprimunt, & in sole lignea rude affidue
mouentes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus uasis adhære-
scat, detrahunt, reliquosq; humori permiscunt. Noctu diligenter operiūt.
Namq; ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quæ autem ficcis ra-

A dicibus, aut hærbis liquamenta exprimuntur, decocta ut in Gentianæ mentione retulimus, præparantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut contulis hærbis factitatur, in sole, uti ante dictum est, coguntur. Sic e Tapisa, sic e Madragora, reliquisq; similibus succus, sic ex acerbis uuis Meligo elicitor. Lycium tamen, & Absinthium, Hypocistis & consimilia, decocta eo quo diximus modo coguntur.

B A R B A R I C O R O L L.

CEntaurion minus, a foliorum tenuitate Lepton cognominatū, sicut Libadion, quoniam secundum fontes nascitur. Ipsa herba legitur autumno. Succus e fronde, aut caulibus concisis madefactisq; .is. diebus capitur. Hoc Centaurium nostri Fel terræ uocant, propter amaritudinem summā. Galli Exacon, quoniam omnia mala medicamenta potum exigat per aluū. Est & Centauris appellata, cognomine Triorches. Hæc qui eruūt, iubentur accipitrem cauere, dictum a numero testium Triorchem: quoniam ut Theophrastus inquit, raro non uulneratur ab alite, qui colligit. Tradunt & per se infestam esse carpentibus, raro unq; non ferientibus se, dum secāt. Hæc succum sanguineū mittit. Imperiti miscent has notas, & uni generi assignāt. Nam quod Centaurion Panaces uocat, alterius est naturæ, ut in Panace monstrabimus. Huius radix minoris, penitus inutilis medicinæ est, ut Galenus quoq; scribit.

E X M. V E R G. C O M M.

CVr Elleboritem ab aliquibus uocari Cetauriū minus in hoc scriptore legatur, difficilem habet coniecturā. Nihil enim inter eas tam simile est, ut misceri & comunicari diuersarum plantarū nomina potuerint. Incertum itidem, quæ Amaranthi nominis in eo causa sit, & ob quas uires Romani Febrifugiam dixerint, & Multiradicem herbam. Cum Amaranthus spica potius q̄ flos sit purpurei coloris, quia nuncq; marcescit, sic appellatus. Nisi forte ex colore floris tantū captata similitudine sic uocari ab aliquibus cœperit: unaq; tantū radice nitatur Centaurium, & nullis febribus mederi hic dixerit. Quales itaq; in scriptore hoc a nobis inuentæ sunt, tales etiam post nos alijs relinquuntur.

De Chamæleone albo.

CAP. IX.

CHamæleo albus quibusdam Chrysisepton, alijs Ixia, Romanis Carduus marinus, Aegyptijs Ephcar dicūt, alijs Ephthoschin. Ixiam ideo aliqui uocauere, q̄ quibusdam in locis uiscum circa radicem inueniatur: quo pro mastiche utuntur mulieres. Folia habet Sylibo, aut Carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq; Chamæleone ualidiora. Caulem non promit. Verū ex medio spinas Echini marini, aut Cinnaræ modo erigit. Flores purpureos ueluti papporum lanugines emit. Semen Cnici simile. Radicem in lætis collibus crassam, in montosis uero graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latas interaneorū tineas pellit. Bibitur autem in uino austero cum Origani feruescētis succo. Hydropicis commodissime drachma in uino datur. Etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinq; decoctum propinatur. Hausta in uino, serpentū uenenis resistit. Occidit canes & sues. Mures item necat subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

B A R B A R I C O R O L L.

CHamæleontis album, a Theophrasto Ixinē uocari Theodorus existimauit, quia Cardui pineam interpretari uoluit: quæ nihil aliud est, ut Dioscoridi placet. q̄ albus Chamæleon, Plin.

Theophrast.
lib. 9, cap. 9.

B

χαμῖλαιος
λευκός

Pli. li. 21. ca. 18.
& 21. ca. 16.

Cus in Theophrasto non Ixinem, sed Helxinem uidetur legisse. Fere suspicor utrūq; falli, Theodorū, & Plinium: Theodorū, quia Chamaleontē album Ixiam quoq; dici nouerat. Sed aliud est Ixine, aliud Ixia Theophrasto noni uoluminis intro, ubi non omnibus locis. sed in Creta la chrymā ab Ixia, hoc est (ut arbitror) Chamaleonte albo fundi scribit. Pliniū quoq; decipi extitimo, affinitate uocis, Helxinē, pro Ixine capientē, librarij alterū pro altero scribentibus: qui modo parū diligentes, modo nimis scioli, peruertunt oīa. Tres igit herbae sunt, Helxine, Ixine, Ixia, Ixia Chamaleon albus est Hippocrati, & Galeno. De Helxine suo loco age, ubi de Ixina quoq; differendū nobis erit. Chamaleontē album Ixion quoq; dici uideo, quia uiscū gignit album, nō ubiq; sed sub alis foliorū, maxime circa Canis oriū, cum Tura nasci dicitur. Succus radices decoctae mures cōtrahit & necat, nisi protinus aquā sorbeant. Volētibus scire, uisurus sit aeger, nec ne: praeceptū radices diluto pfundi triduo qui langueat: moriturū negantes, qui teras uices pferat. Theophrastus auctor. Nascit̃ aequē oībus locis, capite magno, & Acano herbae simili: unde quidā inquit, eam uocauere Acanon, qd quidē & Ixine appellata cōinet.

E X M. V E R G. C O M M.

In Lacertarū genere Aegyptus, Africa, & India Chamaleones passim, & quotidie uidet, mater herbarū Italia, regionesq; aliae oībus fere locis: tā undiq; spinis & aculeis fertiles agros, anonamq; suā natura omnibus miscet & turbat. Descripsit animal Plinius longissime octauū uoluminis capite. 23. facileq; est legentibus nouisse, unde factū a leone ferociore, grandiq; bestia nomine, paulominus q̃ integram Lacertā, & minori Crocodilo simile animal, humilem, & ueluti per terrā serpentem Leonē Græci uocauerint. Descripsit idem herbā eiusdem operis uolumine. 22. capite. 18. possuntq; legentes in eo iudē cognoscere, unde ab animalū genere in herbarū censum humi repens leo ille transferit. Quod non totius, aut partium, diuersorū in natura generū figura & spēs fecit, sed idem mutationis euctus. Vt em̃ animal mutabili coloris natura est, mutatq; cum subinde, & oculis, & cauda, & toto corpore: redditq; semper quēcūq; proxime attingit, prater rubrum & candidū (& si discrepent in hoc antiqui scriptores, excipiantq; alii qui candidū tantū) eodē modo & herba cū terra colores mutat: hic nigra, illic uiridis: alibi cyanea, alibi crocea, atq; alijs coloribus. Nec alia noīs huius in herba, q̃ a coloris mutatione, quā simile cōmunemq; cū eo animal: habet ratio, in græca appellatione est. Alioquin in censu Carduorū uterq; Chamaleon est, candidus, scilicet & niger. Dico aut̃ Carduus nunc, spinosum omne illud genus, qd siue altius a terra erigat̃, siue humilīus serpat: siue his, aut illis, hac ueritate, aut illa aculeatū sit, spinosum florē aliquē profert, in quo lanis & pappis femina inuoluunt. Neq; erit difficile, diligenter pinguia, inculta loca, praesertimq; rudera mensibus Maio & Iunio obseruātibus, utrūq; hoc genus, & eorū discrimina obseruasse: praecipueq; ex floribus, qui ex latiore ueluti pyxide in altero purpurei prodeunt, in altero quō mox colore describentur. Fuerunt qui hunc Pineum Carduum huic scriptori additum legerent.

C De Chamaleone nigro. C A P. X.
χαμαλέον
μύλας Chamaleo niger, quem Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Ocimoides, alij Cnidion coccon, alij Cynoxyllon, Latini Carduum nigrum, aut Vernilaginem, Aegyptij Sobel uocant, folijs Scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta uiderentur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum & in umbella flores spinosos, tenues, hyacynthi amulos, uersicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quae dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus siccis, & eliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito attramenti futuri exiguo, cedrina oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem cum sibi sulphur & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cara oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa & in aceto decocta dentes fouentur. Eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens ad

A moueatur. Vitia cutis in facie, uirilignesq; cum sulphure emendat. E= rodentibus medicamentis ammiscetur. Phagedænas, tetracq; ulcera illi= tu sanat. Quare Chamæleo uocetur, a uarietate foliorum euenit. Mu= tant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, aliubi cæru= lea, nonnusquam rubra inueniuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Chamæleon niger, spinosi generis, uerū folijs aculeatis non constat. Gelidis & inertibus lo= cis prouenit. Ex nigris, aliqui marē dixere, cui flos esset purpureus: foemina, cui uiolaceus. V= no nascitur caule, cubitali. Vlophyton uocatur, quoniā anginae modo iupēcas necet, & ab o= doris grauitate Cynozolon. Ferunt & nigri uiscū: sed qd pro Mastiche non sit, ut ex albo.

E X M. V E R G. C O M M.

Communis utriq; Chamæleoni Ixiæ uox & appellatio est, falso tamē, & sine causā: quo= niam albo tantū adnascitur uiscum, unde ea facta est, illiusq; propria, cæteras nigro relinquit. Quorum Plinius duas numerauit: Vlophonon, q; ricinos canum necat: iuuenas quodq; An= ginae modo perimit. Vlophonon enim, & φώνος græcis exitium significat. Cynozolon item, propter grauitatem odoris: quoniam φύνος olere hīdem græcis est. Nos illud addidimus, ideo Cynoma= zon dici, q; in pulve necandis canibus detur, quam Græci μάκρον dicunt. In cæteris non est quod legētes moneamus, præterquā, non uideri integrum, quod redditum est, Librario stilo eadem= denti, in quo dolor est. &c. Neq; enim rationem nobis aliquam, cur sic fieri debeat, id osten= dit. Cogitq; id suspicari antiquissimus latinus Dioscorides, in quo nihil est, quod ad Librari= um stilum pertineat: sed in carbonibus combustam radicem Chamæleonis, dentibusq; admo= tam, eos frangere indicat. Communem tamen omnium Græcorum, & aliorum interpretum= lectionem, secuti & nos sumus.

De Crocodilio.

CAP. XI.

Crocodilion Chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syl= uosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore ut Nasturcij acu= to. Feruefacta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pel= lit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, du= plex uti scutum. Quod suapte ui urinam ciet.

B A R B A R I C O R O L L.

Crocodilion radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Aetius hanc fortasse intelligit, cum radicem Crocodiladis eius quæ maxima est, commendat in eo capitum dolore, qui Cæ= phalæa dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Differt ab utroq; Chamæleone Crocodilion: q; eorum alter albus scilicet, sine caule in me= dio inter folia spinam marino Echino similem profert: Niger non unam, uerum duas, tresue aliquando coliculis potius q; caulibus impositas ostendit. Crocodilion autē singularem mit= tit caulem, & in caule spinosum Echinū. Est & alia differentia: q; illi pinguibus, campestribus & maritimis locis nascuntur: hic inter stirpes, & confertis arboribus locis. Differunt & radi= ce: quæ in illis est, qualis ab hoc describitur: in Crocodilio longa cum latitudine aliqua, alijs= q; notis illis, quæ descriptæ paulo ante sunt. Nasci Crocodilion Barbarus a Plinio acceptum= in fabuletis dixit: quæ uox τὸ πρὸς ἀπυμώδεται, quibus hic nasci eam ait, nullatenus ut credimus responder: modo fabuleta illi significant, quod in ruris disciplina cunctis alijs significant. In medicina hoc amplius Græcorum ueteres medici tradiderunt, prædesse Crocodilij radicem= pectoris excreationibus.

De Labro Veneris, seu Dipsaco.

CAP. XII.

Dipsacum aliqui Crocodilion uocant, alijs Chamæleonem, alijs Onocandion, alijs Veneris Lauacrū, Romani Labrum ueneris, alijs Carduū ueneris, Aegyptij Sefencor, alijs Chir, alijs Meleta, Daci Sciaz= ram. Aculeatarū generis est. Caulē habet altū, spinis horridū, folia Lactu=

Pli. li. 22. ca. 18.

B

κροκοδιλίου

δι-λαυς

D I O S C O R I D I S

Cæ, aculeata, prælonga, bullas intus & extra spinosas in dorfi medio, binis folijs geniculatim caulem amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde *Dipsaci* quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta candida spectantur, dissectaq; medullatenus, uermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasq; si tusa & decocta in uino radix, usq; dum sit crassitudo cæræ, immitatur. Medicamentum ærea pixide recondendum. Aiunt fornicationibus, uerrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Pli, li. 24. c. 2. 17.

D I P S A C I B A R B A R I C O R O L L.

Dipsacos, folio cauo, in quo salus ros. Nascitur in aquosis & flumine. Huius herbæ carduus is est, quo rudes panni, uelut echino quodā, ut inquit Plinius, uestes expoliuntur, & colluuntur. Floccis siue fimbrijs, quas Græci *Crocydas* appellant, detractis, complanatisue. Hic frutex *Labrum Veneris*, aut *Venerum* latine dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Tota Romana & antiqua uox est, *Labrum Veneris*, nō ab oris humani parte sic dictā, sed ab his *Labris* quæ Maro dixit, plena musto in uindemia spumare. Indicatq; id, q; Græci Romanam uocē imitati, ἀφροδίτης λουτρόν eam dixerūt: quod erat in latinis *Labrum*, græcæ λουτρόν, ex usu balneorū transferentes. Sunt enim græcis λουτρόν quæ lauandis corporibus parantur: quemadmodū in balneis labra etiam Romanis. Nota res est, laetēt tñ causā: nec nos hæc tenus inuenimus, cur *Labrū Veneris* spina hæc ab illis quondā dicta fuerit. Videmus quidē quotannis, cauos in ea sinus illos, in quibus etiā ardentissimo solis æstu exoribus, aut pluuijs aquis ad multos dies seruatur humores. Sed quomodo his *Venus* laueret, aut se aliquādo lauisset ignoramus. Græci a ficti ἀφροδίτης eam dixerūt: uel ut hic ait, quoniā humorem illū contra eam paratū semper habet: uel quæ nobis ex natura magis causā uidetur, q; secus fontes, aquarū scatebras, aquosos limites & fossas nascit, nec alijs locis raro inueniūt. Egregia est plantæ spēs, quæ supra hominis altitudinē aliquādo crecit: quodq; in ea contemplari aliquis gaudeat, bullantes toto eius corpore spinæ sunt, & ueluti peluem constitutū bina illa folia, intra quæ humor semper inueniūt. Cum creuit, in summo singulorū caulium singulos Echinos in oblongo rotundos profert, flore qui purpuream lanuginem refert. Oēm eius spēm diu nos obseruauimus: in Echinis aut nascentes uermiculos inuenire non licuit, & nihilominus græci latiniq; quod merito credendū sit, oēs testant. In medicina usum radix tantū habet. Nosq; quibus ea medet rimis, fistulis, fornicis & uerrucis iam pridem diximus, qualia mala illa omnia in homine sunt.

D

De Spina alba.

C A P. XIII.

ἀκανθα λευκή

Spina alba, quam *Agriocinnaram*, alij *Donacitin*, alij *Erysisceptrum* uocant, Romani *Spinam albam*, aut *Regiam*, alij *Cardum Ramptarium*. Nascitur in montibus & syluosis. Folia albi *Chamaeleonis*, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, digiti magni aut pollicis crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini amulum, sed minus, & oblongum. Flores purpurei, in quibus semē ceu *Cnicum*, sed rotundius. Huius radix pota, celiacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extussunt, efficax est. *Vrinam* cit. Tumoribus illinitur. Decoctio eius dentes in dolore collui prodest. *Epotum* semen contuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

BARBARI COROLL.

Acantha leuce, hoc est, spina candida, ut superius quoque diximus, aliud genus est, quod Leucacantha, siue Leucacanthos, etiam si & hanc nonnulli Galeno teste Leucacanthon uocare consueverunt. Habetur, sed inter arbores uel promiscua, quae spinus albus uulgo dicitur, cortice ligni candido, molli folio: aculeata tota, Pruni magnitudine. Quo nomine ueteribus cognita haec sit, haud possum reddere.

EX. M. VERG. COMM.

Spina haec alba alia est ab ea, quae primo uolumine ab hoc ipso scriptore, & a nobis longius descripta fuit. Illa inter spinosas arbores genus suum habet: haec inter aculeatos frutices, & cum reliquis carduis, quorum multiplex genus est, numeratur. Illa *λευκακάνθα*, composito & coniuncto nomine, haec discretis uocibus *κανθα* & *κύνθ* appellatur. Illa undique suis spinis, & quales in arboribus uidentur infesta riget: haec praeter spinas in folijs aculeatum etiam echinum in summo caule habet. Illa in sepibus, haec montanis & siluosis nascitur locis. Illa tandem solidam habet materiam, haec concuum & inanem caulem. Sunt praeter haec in utriusque historia & medicina discrimina alia etiam. Quae poterunt uolentes ex hoc scriptore, & ex re ipsa facillime cognoscere, Nulli enim non nota omnibus haec spina est, cuius flore ad lactis coagulum multis locis in E-thuria pastores & uillice in casei confectione utuntur. Eam hic ait syluestrem Cinarum uocari, propterea quod satiuæ Cinaræ comparata, minora aliqua, asperiora uero omnia habet. Est enim Cineræ altitudo Cardui omne id genus, quod siue in globi squamatis corticibus, intus nitentibus tumet: siue calathi figura longioribus & in exteriorem partem descendentibus, ipsi squamatis corticibus aperitur: quae ueluti naturae monstra in ganeam gulae proceres uerterunt.

De Spina arabica. CAP. XIII.

Arabicae spinæ, quae Acanthis aliquibus dicitur, naturam, albæ spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluctuationes radix etiamnum ualeat. Prouenit in asperis.

BARBARI COROLL.

Acanthen, hoc est, spinam arabicam nonnulli hanc esse putant, quam Plinius Lamam uocauit, etiam in India nascentem, a qua gummi adulterio Myrrhae prouenit, ut in Myrrha & Ma-siche notauimus. Eandem hanc cum ægyptia spina Acaciæ fundente nonnulli faciunt: quoniam Galenus & Paulus hanc & ægyptiam & arabicam appellant.

EX. M. VERG. COMM.

Inter congeneres herbarum spinas, non inter aculeatas arbores Arabica, siue ægyptia spina hæc numeranda est. Eam ueteres greci utriusque gentis nomine indicauerunt. Ideoque nos inuenta in antiquissimis grecis, alia illa uocem ægyptiæ, scilicet addidimus. Maximas etiam in adstringendo siccandoque uires illi tribuerunt. Peregrina quondam Italiae ea fuit, nunc quod sciamus, nulla est.

De Carduo. CAP. XV.

Carduus graece Scolymos, alias Pherusa, alias Pyracantha nominatur, in Aegypto Cnus. Folia Chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. Caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso. Radice nigra & crassa, quae illita graueolentiam a-larum, totiusque corporis emendat. Item si decocta in uino bibatur. Copiosam autem urinam foetidamque expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera Asparagi modo transit.

BARBARI COROLL.

Scolymos a Theodoro, Carduus, diu floret, ac sero. Distat a cæteris spinosis, quod radix eius uescendo est, decocta & cruda, maxime dum florescit, quodque lacteum succum durata emittit. circa solstitium flos incipit. Senescens in pappos amittitur, quod quidem est huic generi commune. Mirum quod sine interuallo tota æstate, aliud floret, aliud cœcipit, aliud paritur. Semen uliginosum & armatum aculeo. Folium arefcens desinit pungere. Caput ei Theophrastus contra quod Dioscorides, spinosum negauit, sed oblongum haberi dixit: quod in hoc uno ratum spectetur.

A

The. li. 6. ca. 3.

κανθα αραβική

B

σκόλυμος

Pli. li. 21. ca. 16
lib. 22. cap. 22.

C inter ea, quæ lanugines folio spinosas obtinent. Nascit similis Scolymo Carduus circa Tegæa, radicē dulci: quam, cum Pandius statuarii magister editauisset, alienatus mente ferit. Hactenus Theophrasti de Scolymo sententia. Nunc quæ ceteri scripsere uideamus. Scolymon oriens & Limonia uocauit. Frutex est nunc cubitali altior, utiq; in montibus, & quædiu syluestris, & nodū altilis. Alioq; in Mauritania caulis ei duodecim cubitos altus. Palmos quaternos crassius esse dicit, thyrifq; foliorū ac radicē dulci: laudata quondā in pauperis cœna. Florente Scolymo, cecadas acerrimi cantus esse, mulieres libidinis audissimas, uiros cōtra in coitū pigerrimos, scripserunt Hesiodus, & Alcæus poetæ. Difert ab hac, quæ a Plinio itē Limonia uocat, cōtra serpen-tes, herba lacteo succo manans, cōcrefcente gūmi mō in humidis locis, affirmare nō ausim. Est & Lemonion pro syluestri Beta ueteribus acceptum, graui lapsu Theodori, Limonia, quæ Scolymus est, pro syluestri Beta in Theophrasto capiētis, & aculeato folio eam prodētis. Habet & Anemone genus unū, cognomine Limonia, ut dictum est suo loco. Sunt qui & Cynoglosson herbam Limonion appellent. Sane Scolymos Carduus intelligitur syluester. Syluestrium autē Carduorum genera duo. Alterū fruticosius, a terra statim. Alterū uniuersale, & crassius. Vtriq; folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus, lanuginoso caule. Sed alter florē purpureū mittit, inter medios aculeos celeriter canescentem, & abeuntem cum aura, qui proprie Scolymos dicatur. Radicis horum ex aqua decoctæ natura, sitim potioribus uini facere. Hinc illud Columella de Cynara.

Quæ dulcis lacho

Potanti ueniat, nec Phœbo grata canenti.

D Quid autem sit in Columellæ uersu, mirtiolum in Cynara crinem spectari aliqui, nihil habeo quod afferre possim: nisi quis non mirtiolum, sed mirteolum, uel muricē certe legat. Sunt enim muricata Scolymo cacumina, ut inquit Plinius. Murtioli mentionem in Columella & alio loco uideas, ubi hæc uerba sunt ultimo uolumine. Habeto inquit, iuridis feniculi semina, & lentisci destricta & purgata murtiola. Fateor nescire quid sit murtiolum. Scio Murcum montem Romæ dictum, qui sit & Auentinus, autore Festo: ut obiter corrigamus locum in Plinio iuniore, Auentinum & Martium montē, ab Anco Martio Urbis adiectos prodente: non enim martium, sed murtiū legere oportet. Scio & intimū circū Romæ a murcis cognomē habuisse, quasi ab urceis, quod ibi fingerentur, ut Porcilio placet: siue a propinquo Veneris murteæ sacello, quā postea Murteam, & Murtiam uocare cœperint in Auentino colle, ut Varro. Hinc & Myrtum arborem uulgo, & Murtum, & Murtellam uocamus hodieq;. Plinius certe duobus locis Scolymum, & medicinas eius ceu duarum rerum descripsit. Cynaram porro Carduū intelligit faciuam: ita enim Lucius Columella uocat, Palladius Carduum a cinere, ut quidam autumant, quo letatur, uocatam. Sunt qui puellæ nomen in eam herbam uersæ intelligant, Paulus, & Aetius Scolymon a Cynara discriminat: priorem stomacho prodesse, Cynaram officere monstrantes. Proxima certe genera uidentur esse. Fuit hæc ueteribus maximi res questus, ex Carthagine magna & Corduba precipue, sestertia sēna millia, carduetis etiamnū paruis inferetibus arario. Tanta est earum rerū prouentus, quæ Veneri obsonantur et ganæ: ut nihil iuuerit portenta quædam naturæ uideri Carduos, & quæ refugiant quadrupedes, quo minus in luxum eos humana gula uerteret. Adhibentur Cynaræ conuiujs, Asparagi modo coctæ iuribus: nec sine his magnifica, aut adicialis ulla est cœna, utq; si neq; locus, neq; tempus obstat. Ligures Arcocum uocant, quasi alcoccalon: ut prima eius uerbi syllaba pro articulo sit, quem Mauritanio-um uero græce idem est quod Strobilus, hoc est, nux pinea, cui similis est Scolymus. Dioscorides, Romani Scolymum uocat inquit, Strobilum. Nondum irrepsit hoc ferculum Venetis, una tantum eius planra Mauriano uico cernitur in hortis barbaricis.

EX M. VERG. COMM.

V Agum per aculeatas omnes plantas Pyxacanthæ nomen est: quā primo uolumine Lycitū uocari etiā diximus: suisq; spinis tū, non ubiq; spinosis omnibus adest. Impudentē quidē, sed multo impudentius a suo gñe in aliud ab his translata, qui naturā ignorantes, temere oia mittunt, Strobilum a Romanis Carduum uocari Diosco. ait, græcā quidem uoce, sed tunc forte quotidiana, & in usu populi: quæ a Pineæ nucis figura cui simile in summo Carduus capitulum habet, facta est. Græci em̄ ὀβελίδαν arborem Pinū, & nucem eius pariter uocant. Quæ coniam conij figura in Pinastris, & oblonga est, quam formam Cardui capitulum habet, cōmunicata appellatione Strobilos, Carduus hic a Romanis aliquando dici potuit. Siquidem Plinius, 16. uolumine cap. 11. de Pinastris agens ait, Easdem arbores alio nōmine per orā Italiæ quas

Strobilos uocat, ut plerique arbitrantur. Ex quo patet, scribere etiam Plinio historiam suam, fuisse eam uocari in Pinastris Italique populari. Simile Chameleoni Cardui, Nicander, Theophrastus, oesque alii fecerunt. Sed Theophrastus hoc amplius: non solum habere Carduum radices, quae crude parit & coctae in hominis cibos ueniant, quod priuatim solus hic in spinoso genere habet, uerum quod easdem cum floret optimas habet: quodque uix credibile uideatur, cum durat per aetatem fuerint, & quasi in lignum transierint, candidum liquor ex se mittere. Estque hic Scolymus, siue Carduus is, quo per solstitium florere, Hesiodus ait, in arboribus maxime canere cicadas, acerrimeque ad uenerem stimulari feminas, uiros autem ignauissimos tunc ad eam fieri. Descripsit, & remedia eius tradidit pluribus locis Plinius: a quo poterunt uolentes multa audire ad omnes Carduos pertinentia, priuatimque ad Scolymum hunc, qui priuatim Carduus ab omnibus dicitur, & est.

De Poterio.

CAP. XVI.

Poterium aliqui Phrynion, Iones Neurada, aliqui Acidoton uocant. Large fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthae proximis, folijs paruis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris. Seminibus nulli usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis & collibus. Radices demittit binum, ternumue cubitorum neruofas, & firmas. Quae proxime terram recisae, dant succum gummi similem. Tussae, praecisus neruis, & uulneribus glutinandis illinitur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

BARBARI COROLL.

Poterio circumsodit autumnus, praeciditurque ad succum. Radices habet multas, bene olentes, sed duas, aut tres, cubitorum binum. Galenus hanc Neuradis appellatione intelligit. In Plinio non Poterio, sed Pontirrim, nec Phrynion, ut in Dioscoride, sed Parcenio, 17. lib. legi uideo, corrupte utrumque. At 25. non parcenion, sed Phrynion, nec Pontirrim, sed Polyrrizon mendose item scribitur. Phrynion porro a Rubetis ranis dicta est, quibus aduersat. eas Graeci Phrynos uocant.

EX M. VERG. COMM.

Quae Poterio in Dioscoride adiectae sunt Neurados, & Phrynij appellationes, in alijs Graecorum & Latinorum scriptoribus, Galeno, scilicet Paulo, Plinioque praecipue & post se illam trahentes sunt. Siquidem priores duo illi Neurada tantum uocant, Plinius Phrynion, omnes tamen Poterion ab alijs appellari addunt. A neruorum medicina & ope alterum: a rubetis ranis, quibus ea medetur, alterum nomen illi factum est.

De Acanthio.

CAP. XVII.

Acanthium albae Spinae simile, folijs aculeatis per extremitates, et lanugine araneosa obductis, quae collecta & in unum aceruata Bombicis effigie praebet. Folia, uel radices ad remedia opisthothi bibunt.

BARBARI COROLL.

Acanthion spinulam significat. Est enim spinae albae proxima, sed minoribus multo folijs.

EX M. VERG. COMM.

Perisse capiti huic aliquid, sermonis parum sequax ductus ostendit. Quid autem desiderare, & amissum instaurare nos oporteat, Plinius 24. uolumine, cap. 12. manifeste indicat: quod de aculeis plantis quibusdam agens, Acanthium hoc his uerbis descripsit. Huic similis est spina illa quam Graeci Acanthion uocant, minoribus multo folijs, aculeatis per extremitates, & araneosa lanugine obductis: qua collecta, etiam uestes quaedam Bombicis similes in oriente fiunt. Ipsa folia uel radices ad remedia opisthothi bibunt. Et haec Plinius. Quae si quis ab eo dicta cum scriptore hoc cotulerit, omnia eadem utrumque esse inueniet. Praeterea, quae Plinius ait, lanugine obductis, in nullis Graecis haecenus inuenta, uerum ad explendam Acanthij & scriptoris huius historiam tam necessaria esse, ut sine eis non possit integer sensus Dioscoridi esse: contraque suo loco instauratis nihil aptius audiat. Erit ergo hic sermonis ductus. Spinae albae similia habet folia Acanthium, in summis extremitatibus aculeata, araneosa lanugine obducta: qua collecta, simulque composita, bombicinis similes uestes fiunt.

Dij

A

πότηριον

Pli. li. 25. ca. 10
lib. 27. cap. 12.
eod. icap. 12.

B

ἐκάνθηιον

Ε
 ἀκανθα
 ἡ ἀκανθα

De Acantha. CAP. XVIII.

ACANTHAM, aut Hærpacantham, quidam Melamphyllon, Romani Pæderotam, aliqui Topiariam, alij Mamolariam, quidam Cræpulam uocant. Nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, Erucae diuisura, nigricantia, pingua, læuia. Caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuē prope uerticem, ex interuallis circumdatum, foliolis paniculatis oblongas referentibus, Hyacinthi similibus. E quibus flos prodit albus, semen oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ ustis igni, & luxatis artibus illitæ subueniunt. Potę urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mire profunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 12. cap. 20. & 22.

ACantha, siue Acanthos, topiaria & urbana est herba, elato longoq; folio, crepidines marginum assurgentiumq; puluinorum toros in hortis, historiali facilitate uestiens. Duo genera eius sunt, Syluestre, aculeatum, crispum, quod & breuius est, Agriacanthos appellatū. Alterum lenē ac satiuum, quod proprie Pæderota uocant, alij Melamphyllon, de qua hic agitur. Unguenti quoq; genus est, quod Pæderota nominabant, quo & Demetrius Phalereus sibi os linebat. Alexis poeta fœminas, quibus nimis candida cutis esset, Pæderote uti solitas in comœdia significat; quod & Aegyptium unguentum dicitur: ut in Staete diximus. Pausanias auctor est, genus herbae Sicyonis in uno tantum ueneris septō nasci Pæderota nomine, folio minore q; sagi, maiore q; ilicis, & omnino quernis simili, altera parte candido, altera subatro, ut albe Populi: hanc ibi tm spectari, præterea nultq; gentium. Sit autem Acanthus hæc uulgaris spina, cuius & in Aspalatho meminimus, nec ne, dubito. Plinius certe duobus locis, altero Acanthon, altero Spinam uulgarem appellando, easdem utriq; medicinas tribuit. Spina est, & Appendix uocata: quoniam bacca in ea puniceo colore nominentur Appendices, siue ut ueteres dicebāt, Ampendices. li & Lumam prætensis spinæ genus appellabant, & ab eo Lumesta, & Lumarias falces, auctor Varro: dictam ita, q; a terra soluunt, id est, luunt eas agricolæ. Acanthos, Seruius inquit grammaticus, in Aegypto & Cyrenaica insula nasci fertur. Sed homo literator, herbarumq; parum gnarus, cum Spina ægyptia confundit, quæ ab Acantho prorsus alia est, ut facile dignosci potest.

EX. M. VERG. COMM.

Hæc est Acantha, siue Acanthus ille (utroq; enim genere a græcorum medicis, scriptoribusq; poetis alijs omnibus dicitur) quæ antiquis in tanto laudum & honoris ambitu fuit. Quæ Maroni pastoralis poculi ansas amplectabatur: quæ in hortis crepidines marginum, assurgentiumq; puluinorum thoros, longioribus & latioribus folijs uestiebat: et in architectura Corinthiæ columnæ, capitulum grato foliorum amplexu nunc etiam ornat. Quæ inter aculeatas non censeretur, nisi in oblongis foliolis nucamenti modo caulem eius per interualla uestientibus, & ex quibus flos prodit breues aculeos natura illi seruasset. Quod ceteri interpretes cōmuni & uulgari græcorum codicum lectione decepti, ad Hyacinthinum colorem retulerunt: cum ad spinas referendum esset: ἡ ἀκανθα δὲ τῆς ἡσυχίας legentes, quod est Hyacinthinis, cum ἀκανθα δὲ τῆς ἡσυχίας, id est, spinosis & aculeatis legendum esset, nulla Acanthi cum Hyacintho foliorum coloris in flore, nucamenti, aut Spinæ cōmunionē, similitudineue. Descripsit Acanthum Plinius. 22. uolumine, & eiusdē numeri capite, Melamphyllōq; & Pæderota uocari & ipse ait: sed nullā earū uocis causam docuit: p̄sertimq; cur Pæderota eā aliq; dicerēt: quæ tota græca uox est. nec aliud q; puero rū amorē, aut qd a pueris amē significat. Quo magis demirer aliq; qd in Dios. legit, a Romanis Pæderota Acanthū dici: cū uocis eius, quæadmodū & aliarū illarū græci tm auctores fuerint.

ἀκανθα

De Syluestri spina. CAP. XIX.

Est & syluestris Spina Carduo similis, aculeata, breuior q; quæ in hortis satisq; pueniat. Cuius radix ad eadē ad quæ superior pollet.

BARBARI COROLL.

DE Agriacantha, hoc est, sylvestri spina, proxime dictum est, ubi alterum spinę genus sylvestre nominavimus.

De Anonide.

CAP. XX.

ANonis, quam aliqui Onotida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulę, pusillis ad Rutę, aut pratensis Loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucunde olentibus. Muria conditur anteq̃ spinosa fiat. Cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti durioribus aculeis horrent. Radicem mitit candidam. Quę excafacit, & extenuat. Huius cortex ex uino potus, urinam ciet. Calculos comminuit. Margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentiũ collutione mitigat. Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

BARBARI COROLL.

ANonis, & Ononis quandoq̃ dicitur, ut Galeno Theophrastoq̃, spinosa post uer, folio rutę, aculeata, ramis ut Tribulus. Nascitur solo culto, præcipueq̃ in segetibus, aratro inimica, uiuaxq̃ unice. Propagat se in annos, ideoq̃ runcanda & extirpanda tota est, cum terra maduit imbribus. Germinare incipit æstate, a frugibus perficitur autumno. Durat anno folium toto caule per interualla collocatum, ut corona. Flos mutilus in siliqua, nec conspectus. Est & alia Ononis, cognomine Flomitis, quę a Dioscoride Onosma dicitur, quanq̃ sunt qui Onomida, non Ononida uocent, hoc uolumine a nobis reddendam. Ononim porro dictam Phoriũ uult, q̃ asinos se ad illam terentes & scabentes iuuat. Plinius Anonin similem Fœno Gręco, Dioscorides Loto fenarię, aut Rutę faciunt, ut æstimare liceat, Lotum fenariam, cum Fœno Græco eandem uideri, aut persimilem.

EX M. VERG. COMM.

Inter aculeatas plantas omnib. facile cognoscenda quotañis renascit̃ Ononis, unice uiuax, & in annos ipsa seipsam propagans: nisi cū terra imbribus maduerit totā runcauerit & extirpauerit diligēs agricola. Frondet ea uiuicq̃ in aruis, sed lætior in proscisso iteraroq̃ agro surgit, labore hominũ ut ceterę fruges & ipsa pficiens: nihilq̃ aliquibus locis hac peste frequentius: quę non solũ pedibus ingrediendiũ aculeis suis nocet, sed aratorē etiā remorat, aratro inimica, & ille implicans. Descripserunt Ononin antiquiores oēs qui de medica materia, aut de plantis alifando egerunt, sed unus omniũ felicissime Theophrastus, s. de plantarũ historia uolumine.

De Leucacantha.

CAP. XXI.

LEV CACANTHAM quidam Polygonaton, aliȝ Phyllon, aliȝ Ischiada uocant, Romani Spinam albam. Radice Cyperi ualida & amara. Quę manducata, dolorem dentium sedat. Veteri laterum dolori, atq̃ ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino poto. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eodē dem præbet effectus.

BARBARI COROLL.

Leuacantha, siue Leucacanthos, ab Acantha Leuce differt, ut sæpenuerō cōmonuit: priorem gręce Plinius fere appellat: posteriorem latine Spinā candidā, id est, Acanthā leuce.

EX M. VERG. COMM.

VNo, eodemq̃ breuissimo capite Plinius. 22. uolumine omnem Leucacanthę huius historiam & medicinam complexus est: dicendum ideo nihil nobis aliud superest, q̃ ex similitudine aliarum plantarum Polygonaton Phyllon, & Ischiada dictam ab aliquibus fuisse: quemadmodum ex earum plantarum historia cognouisse licebit: in quarum singulis aliquid est q̃h Leuca-

A

A. 1018

Pli. li. 29. ca. 49
The. libro. 6. 4

B

λευκακάνθα

C canthæ huic æquale, aut commune sit. Sine caule, sine flore, sine Echino spina hæc est, folijs longis, aculeatis, Lactuæ similibus.

τραγανθα
T De Tragacantha. CAP. XXII.
Ragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, furculos humiles, robustos, latissime fundens, in quibus minuta folia, nonnunquam tenuia exoriuntur. Quæ sub se spinas albas, reætas, & firmas occulunt. Est etiamnũ Tragacantha lachryma, quæ, utlenerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, syncera, & subdulcis. Cutis spiracula ut gummi obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu. Subdita quoq; linguæ liquescit. In passo madefacta drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & uesicæ rosiones, mixto cornu cerui usto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Pli. li. 13. ca. 21.
T BARBA RICOROLL.
Ragacantha, siue Tragacanthos, radicem spinæ albæ continet: in Creta nasci tantum creditur. Sed & in Achaia, & apud Medos quoq; prouenit, in Arcadia largissime: nec Cretica deterior, aspectu tamen prælata: lachrymam non incisura, sed sponte manando spissescere Theophrastus existimat. Precium Creticæ in libras. 13. apud quam uidelicet & dignatio remansit.

I EX M. VERG. COMM.
In quotidiano medicinæ usu Tragacantha est: utq; omnes lachrymā passim nouerūt, sic peregrinam Italiæ stirpem. Si Theophrasto credimus, pauci nouisse nunc possunt in Creta, Arcadia, Peloponnesi Achaia, & Asia Media nascentem. Quo magis græcos demiretur aliquis, qui natam apud se plantam, & plantæ lachrymam corrumpi in hoc scriptore permiserint, perireq; legitimam & necessariā eius in sole densationem. Quo em loco hic ait, Vocatur Tragacantha etiam sectæ radici inherens lachryma. &c. defunt necessariæ uoces aliquot, quibus doceatur, sectam radicem spinæ huius lachrymam mittere quæ in sole densetur.

ήρύγγιον
E De Eryngio. CAP. XXIII.
Eryngion aliqui Eryngen, alij Caryon, alij Gorginion, alij Heronion, alij Origanum, Chlounion, alij Myracanthion, alij Moly, Aegyptij Crobyson, Magi Siserton, Romani Capitulum Martis, Daci Sicupnoex, Hispani Centumcapita, Aphri Cherdam, alij Oriam Chloem, alij Chida appellant. Aculeatarum generis est. Cuius folia in principio sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: quæ cum adolescunt, per multas caulium pminencias spinose inhorrescunt. In quorū sumitatib. globosa capitula, durarū acutissimarūq; spinarū ambitu stellatim circūuallant: quorū colos alias uiridis, alias albus, interdū ceruleus inueniunt. Radix oblonga, lata, foris nigra, interne cādida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis, & cæpestribus. Vim habet calfactoriam. Pota menses & urinas pelit. Tormina, inflationesq; discutit. Contra iocinerū uitia, serpentiū morsus, & hausta uenena, cū uino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum seminis Pastinacæ drachma una. Appensa illitaue tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.

BARBARI COROLL.

Eryngion, clara in primis aculeatarum herba est. Genera eius duo, albicans, & nigricans. Priorem Græci Hecaton cephalon, nostri Centumcapita uocant, omnes caule & radice in cibos græcorum receptæ, utroq; modo, siue coquere libeat, siue cruda uesci. Radicem eius, alter utrius sexus similitudinem referre prædicant. Raram inuentu. Et si uiris contigerit mas, etiam amabiles fieri. Ob hoc Phaonem Lesbium dilectum a Sappho. Ipsa dura, fruticosa, caule geniculato, cubitali maiore aliquando, & satiuia quidem est: sed & sponte nascitur in asperis, & saxosis, & in littoribus maris, durior nigriorq; folio Apij. Sub solstitio colligi eam iussere quidam. Sunt qui & Acanon Eryngion ascribāt, sicut & Glycyrrhizam falso Asclepiades, ut meminuit Aetius, Eryngion cui Orion, hoc est, montani cognominati est, folijs describit paruis & angustioribus, flore aureo, & oculi figura. Ex Eryngij radice Gallia Oisalpina confectionem cum saccharo, aut melle condit, Eryngiatum uocatam.

Si Eryngij caulem, ex grege ouis, capellæ uel aliqua morsu defectum ore substulerit, totus statim subsistit grex, relictoq; pascendi studio, nouo ueluti spectaculo attonitus, inō prius admirari rem desinit, q̄ accedens pastor caulem illum abstulerit: abiectoq; longius, inutile gregis sui ocium, ea ratione castigauerit. Auctores eius rei, Aristoteles primū, qui in nouo grege, & si gregis dux id fecerit, euenire dixit. Post eum Plutarchus, pluresq; alij. Quo magis miretur aliquis in huiusmodi re Plinij silentium, qui similia his pleraq; alia de candida Erynge tradiderit. Hic enim, ut herbarium decebat, necessarias medicinarum Eryngij uires tantum tradere debuit. Cuius numerantur plures ab hoc scriptore, modo eius sint, appellationes: sed tam incertæ, & ex alijs plantis tam obscure repetitæ, ut nulla hætenus earum coniectura uti potuerimus. Id tantum monemus: quæ a prima statim sequitur, solo genere in declinatione a priore differret: neutro enim, & feminino declinatur. Neutro hic, & Græci alij usi sunt: Plinius feminino. uicesimo secundo uolumine capite septimo his uerbis de ea agens. Et clara in primis aculeatarum Erynge est, siue Eryngion, &c. Idem etiam, quam hic Hispanis Centumcapita tribuit, Romanam suæ ætatis appellationem fuisse testatur, sed candidam tantū ea uoce uocari solitā. Græci etiam eadem ratione *καρυωιδες* a numero capitum dicunt. Quæ deinde Myracantha inter alias numeratur, a ui & radice odore facta est. Nihil enim aliud q̄ odoratam spinam ea significat uox, Cæteræ quales illic leguntur, tales alijs relinquuntur. Notum nunc etiam Eryngium est, pluribusq; locis in Italia antiquum seruat nomen & usum: melleq; seruat radix eius, nec habet ingratum in cibis saporem.

A

Pli. l. 21. c. 2. 161

VERG.

B

De Aloe.

CAP. XXIII.

ALOE ALIQVIBVS Amphibion, alijs Herminion, alijs Eryngion, alijs Tragoceros, Romanis Aloa, Barbaris Aloe dicitur. Cuius folium Scyllæ similitudinem habet, crassum, pingue, latum, rotundum, retrorsus pandum. Folia utrinq; gerit, ex obliquis spinosa, rariuscule striata, breuiā. Caulis emittitur non dissimilis Anthericus. Flos albus. Fructus Hastulæ regiæ cognatus. Graui tota est odore, & gustu amarissima. Radice una, ceu palo in terram depacta. Plurima, præpinguisq; in India gignitur, ex qua cōactus succus adfertur. Nasctur etiam in Asia, & Arabia, in insulis quibusdam & maritimis, ut in Andro, minime succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda uulnera sane q̄ utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera. Quoddam harenosum, quod sicens crassamentum purissimæ esse uidetur. Alterum ad iocineris imaginem uergit. Eligi debet sycæra, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis ac iocineris modo coacta, facili liquefcens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant, quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore, Eoq; argumēto, q̄ digitis friata non ad minima usq; frus-

D iii

D I O S C O R I D I S

Cista resoluitur. Nec defunt qui Acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnum allicere, & corpora densare, aluum resol- uere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua fris- gida, aut lacte pota. Sanguinis reiectiones sistit. Regium morbum pur- gat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit. Pur- gationis perfectæ causâ tribus drachmîs sumitur. Alijs purgatorijs me- dicaminibus ammixta, præstat ut minus stomachum infestent. Sicca glutinandis uulneribus inspargitur. Vlcera ad cicatricem perducit, co- hibetq;. Eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur. Disrupta infantibus iungit. Condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat. Hæmor- rhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit. Pterigia ad ci- catricem ducit. Liuires & insignita, ex melle tollit. Priuatim scabras, lippitudines, pruriginēsq; angulorum permulcet. Dolorem capitis se- dat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum uino. Tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in muns- da & candenti testa, pennaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torre- ri. Lauatur, ut quod sit harenosissimum, tanq; inutile subsidat, & leuæ ac pinguisissimum assumatur.

D

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 27. ca. 43

Aloe laudatissima ex India, post ex Syria Coele, ut Galeno placet, & Arabia. Improbatur e Syria, quasi multo dilutior & languida. Serit eam Asia, in turbinibus cadorū, ut Sedum ma- ius. Caulis eius tener rubet medius. Inuenitur & per se lachryma adhærens: ob id pauimentan- dum, ubi sata sit, præcipiunt: ne lachryma quæ manat, absorbeatur. In Iudæa super Hierosoly- ma, fossilem gigni, & metallicam, fuisse qui traderent, omnium deterrimā, humidissimā, nigerri- mam. Negat id huius operis præfatione Dioscorides. Familiare tonstrinis Aloen, nemo igno- rat. Virentem semper, propter Semperuium marinum, appellatū uulgo. Aloidarum uero, me- dicina dicitur ex Aloe, ad uentrem soluendū, in Orbasio, Philagrio, Actio.

E X M. V E R G. C O M M.

Aspinis, quas cōmunes Aloe cum Eryngio habet, Eryngium & ipsa ab aliquibus dicta est, sed mala similitudine: quando in cæteris nihil dissimilius q; Eryngium & Aloe uidetur. Fuerit etiam qui Amphibion hanc dicerent: quod nisi eadem illa ratione dicatur, qua in genere ani- mantium Amphibia a græcis aliqua dicantur, incertam nobis causam habet. Sunt autē græ- cis Amphibia, quæ communem & ambiguam in utroq; elemento, terra, scilicet & aquis uitam degunt: qualem hic Castora secundo uolumine descripsit, & quales multæ aues ubiq; sunt. Po- tueruntq; aliqui sic Aloem uocasse, q; procul a mari, & maritimis locis, ut hic ait, pariter nasci- tur: & si ut Amphibios diceretur, non satis discrimen id fore uideri possit. Neq; enim diuersa elemento sunt maritima, & quæ procul a mari distant. Orminion ab aliquibus dicta Aloe pa- riter fuit, q; utraq; altiore caule est: & quemadmodum Aloe in folijs aculeatas eminentias ma- gis q; spinas habet, sic & Orminium, ut in historia eius certius patebit. Tragocerota postre- mo eandem Aloem certiore similitudine aliqui appellarunt: ab hircorum cornibus facta ap- pellatione, quibus folia eius quantitate, longitudine, figuraq; apposite respondent. Est & in- ter appellationes has illud animaduertendum ex antiquissimorum græcorum fide, non dixisse nos in foliorum Aloes historia, habere eam utrinq; folia ex obliquo spinosa, sed utrinq; spinu- las. In melioribus enim legitur *ἀκνίδια*, id est, spinulas, non *ἀκνίδια*, quod commune nobis cum Barbaro est, & si naturæ rei q; id non magnopere interfit.

¶ De Absinthio.

C A P. XXV.

A De Absinthio. CAP. XXV.
ABSINTHIUM aliqui Bathypicron, Aegyptij Somi, Roma-
 ni Absinthium. Herba uulgo cognita. Praestantius in Ponto &
 Cappadocia. In monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & ad-
 stringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri inhæsit. Vri-
 nam cit. Crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes uentris, & sto-
 machi dolores prodest, cum fefeli & nardo gallico potum. Fastidia dis-
 cutit. Arquatos sanat madefacti dilutum, aut decocti ius, cotidie tribus
 cyathis haustum. Menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra
 fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur
 Ixiæ uenenis cum uino. Item cicutæ, & muris aranei morsibus, & draco-
 ni marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex
 aqua. Ad fugillata, & oculorum caligines ex melle illinitur. Item auria-
 bus, si manat sanies. Dentium, auriumq; dolores decoctum, uaporis
 suffitu compescit. Decoctum in passo, dolentibus oculis oblinitur. Item
 præcordijs & iocineri, tritum cum cerato cyprino. Stomacho quoq; lon-
 ga ualeitudine laboranti cum rosaceo. Cum ficis autem, aceto & Erui fa-
 rina, aquæ inter cutem lineosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod Abs-
 inthiten uocant, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antedicta
 utuntur, cum febris carent. Alioquin in æstate propinant, & acceptam
 huic uino incolumitatem referunt. Inparsum arcis Absinthium, uestes
 ab erodentium iniuriâ uindicat. Culices eo, & oleo perunctis abigit, &
 a corpore arcet. Atramentum librarium diluto eius temperatum, lites-
 ras a murium erosionem tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præ-
 stare effectus. Attamen potionibus improbat: quoniam stomachum
 male habet, & capitis cit dolorem. Sunt qui cocta Amurca liqua-
 mentum adulterant.

B A R B A R I C O R O L L.

A B S I N T H I U M C O R O L L.
 Absinthii frigidus provenit. Latinarū ferijs certabant in Capitolio quadrigæ, uictorq; Absinthii bibebat; sanitate interpretantibus in eo præmio maioribus. Poetæ Græci sunt, qui Absinthium quandoq; dixerint. Hippocrates, Absinthium Cyprium cōmendat.

¶ De Marino Absinthio.

C A P. XXVI.

R Bsinthium Marinum, quod aliqui Seriphum, Latini Cento-
nicum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappa-
dociam, & in Taphysiri Aegypti gignitur. Quo Asiatici pro Oliue ra-
mo utuntur. Herba est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta mi-
nutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauitur olet, &
cum quadam calfactione adstringit. Id per sese, aut cum Oryza coctum,
interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto melle enecat. Alium la-
uigat. Cum edulio autem, uel lenticula decoctum, eadem praestare po-
test. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. ¶ Tertium genus Ab-
sinthio assignatur, quo Galatia Alpibus finitima scatet. Id patrio nomi-

A
α + iνθρον

B

Pli. li. 27. ca. 7
Theoph. li. 9.

ἐφινθεον θα-
λάσσιον

Cne Santonicum uocant, regionis in qua nascitur cognomento, Absinthio non dissimile, uerum subamarum est, non adeo feminis fecundū. Eadem quæ Seriphium potest.

B A R B A R I C O R O L L.

Absinthium Seriphion, siue Seriphon, angustius priore, minusq; amarū. Absinthij genera plura. Vulgare, siue Ponticū, de quo diximus. Seriphium, id est, marinū, de quo hic agitur. Ponticum a Ponto ueniens, ubi pecora pinguescunt illo, & propterea sine felle reperiuntur, nequa aliud præstantius, multumq; Italico amarius, sed medulla dulci. Tertium Santonicum a Gallicæ ciuitate appellatum. A Colūmella uero Santonica herba dicitur.

De Santonico, proxime dictum est. Illud notari dignum arbitror, Santonicum Absinthio similis describi, quam Seriphium, aut quod idem est, marinum: quoniam marinum Abrotoni potius, q̃ Absinthij figura demonstratur ab Dioscoride ac Plinio, ut prædixi. Recentiores contrarium decernunt. Et sane uidentur haud falsa dicere: Marinum, siue Seriphium doctes Absinthio q̃ Abrotono similis, Santonicum Abrotono, q̃ Absinthio. Marinum certe, id quod passim in littoribus, & secus mare nascitur, sapore salso, & folio albicāte, notum omnibus, nihil fere commune cum Abrotono. Galenus quoq; Seriphium inquit, & conspectu & gustu Absinthio simile est, præterq; q̃ minus linguā adstringit, q̃ Absinthium, sed plus excalfacit, & cum quodam salis gustu, amarum sentitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Tria diuersis locis a Plinio etiā Absinthij genera numerantur, Ponticum, Santonicum, & quod Seriphion, siue Marinū a cunctis uocatur, religioni in Aegypto consecratū, cōmune & ubiq; proueniens. Ponticum est, a regione, in qua optimū nascitur, bonitatis magis q̃ naturæ merito inuenta appellatione. Hoc in Dioscoride legitur Rusticum a Romanis uocari: sed nullā habere ea appellatio rationē. De Santonico hic cerussime egit, quondāq; in honore & nota Absinthij gentis nomen id fuit, ut cum decinit ille, Santonica medicata dedit mihi pocula uirga. De Seriphio, quod & Marinū dictum quondā est, duobus locis Plinius egit lib. 17. cap. 3. his uerbis. Est & Absinthiū marinū, qd quidam Seriphium uocant, probatissimū in Taphosiri Aegypti. Huius ramū Isiaci præferre solēne habent, angustius priore, minusq; amarum, stoma-choq; inimicū. Iterumq; lib. 33. capite. 1. quo loco de eo sic ait. Nascitur & in mari Absinthium, quod aliqui Seriphium uocant, circa Taphosirim Aegypti maxime, exilius terrestri. Quæ id eo repetita a nobis hoc loco sunt, ut quæ a principio capitis huius incerta, aliundeq; repetita, & mixta simul difficilem habent intellectum, legentibus certiora fierent; intelligerentq; omnes, ex Pontico Absinthio ad Seriphium, siue marinū hæc translata esse, quæ in alijs leguntur. Largissime in Cappadocia, & monte Tauro prouenit. Quæ Pontica sunt, & superiore capite, uulgarī Absinthio in censu bonitatis ab hoc ipso dicta. Cum probatissimum in Ponto & Cappadocia nasci ait. Misere enim diuersa hoc est, intellectumq; rerum adeo confundere, ut nullus possit huius scriptoris usus esse. Qui enim potest Seriphia herba, & ad mare nascens in Cappadocia, & Tauro monte inueniri? Ideoq; nos omnem eam partem, ueluti inutilem, omnemq; illic sensum turbantem expunximus.

De Abrotono.

C A P. XXVII.

Abrotonum alijs Abutonon, alijs Absinthium, alijs Heraclion, alijs Cholopceon, alijs Absinthiomēnon, alijs Theliphthoricon, alijs Procampylon, Magi Neura phcenicos, alijs Cynanchiten, Romani Absinthium ponticum, nonnulli Thelythamnum, alijs Glycyn ancona uocant. Duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans candicat, circum ramulos folijs Seriphi modo minutim incisis. Floribus referta est, comantibus in summo fulgore auri corymbis. Quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, tenui semine uti Absinthium. Plurimū in Cappadocia gignitur & Galatia Asia

lica, atq; in Syriae Hierapoli. Crudum semen, tritum & feruefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinae angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In uino potum exitialium uenenorum antidotum est. Rigoribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu & nidore fugat. Contra ictus eorum cum uino potum prodest. Priuatim efficax contra scorpionum & Phalangiorum uenena. Oculorum inflammationibus commodè illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Iris in compositionibus ammiscetur.

BARBARI COROLL.

A Brotonū campestre, ac montanū. Hoc foeminā intelligunt, illud mare. Amaritudo Abrotoni in utroq;. Vacuum sponte provenit, cacumine suo se propagans. Seritur quoq;, sed melius semine, q; furculo, aut radice. Numerosum eius semen. Radix una, quæ alte descendit, ceteris in summo terræ leuiter hærentibus. Floret cum Fraxino. Siculū laudatissimū, dein Galaticū. Pamphilus, Abrotonū a Romanis Santonicū appellari credidit, a Galeno reprehensus. Græcū uulgus, a contrario Melitine uocat Abrotonū, sicut semen acius, & ab interitu tinea. rum Helminthobotanom, Dioscorides a quibusdā Thelyphthoron, & Thelythānon, & Glycyna Aconna dicit appellari. Saneq; uidetur h̄ ad historiā, & uetus prouerbiū respicere. Ea est huiusmodi. Lydi gens in libidine effusissima, feminas ingenuas constuprare in hortis, ad hoc flagitiū questus, amoenitatibus excultis, aliquādiu impune solita est. Demū Omphale mulier, dominatione haud magno negocio, effeminatis & luxu disfluentibus excussa, imperitare coepit ipsa: ubi eos cruciatibus uarijs affectos, ultra est, in uxores eorum deluxit: inclusas enim eas, eisdem septis prostituit seruitijs. Inde uiridario nomen, Glycys ancon, quod & Thelyphthori, & Thelythamni uocabulo significatur, ceu Abrotono confusus fortasse locus esset is.

De Hyssopo.

CAP. XXVIII.

Hysopum aliqui Later uocāt, alij Cassialam, Aegyptij Pesalem. Hærbā nulli non cognita. Duum generum est, montanum, & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. Decoctū cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq;, peripneumonicis, diuturnæ tussi, suspiriosis, destillationibus & orthopnoicis auxiliatur. Tineas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluū cum ficis uiridibus detritis manditur. Vehementius addita Iri, Cardamomo, aut Irione, deijcit. Colorem in corpore fouet. Lienī, & aquæ intercutem, cum fico, nitroq;, inflammationibus quoq; ex uino illinitur. Cum feruente aqua impositū, sugillata discutit. Cum decocto ficorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat. Inflationes auricularū uaporis suffitu discutit.

BARBARI COROLL.

Hysopum, siue Hyssopus. Præferitur Hippocrati Cilicium, sed & Tauro monte, Dein Pamphilum, & Smyrnum.

EX M. VERG. COMM.

Non negligendi usus in medicina Hyssopus est: quā inter cætera hīc ait aluū multo efficacius purgare, additis Iride, aut Irione: aut ut cæteri interpretes uerterunt, Cardamomo: ut aliter nos ueterū codicum fide admoniti, Nasturcio. Multa enim, quoniam facilis lubricusq; est lapsus a Cardamomo ad Cardamum, quod Nasturcium est, diuerti huiusmodi uocum inter se in scriptoris huius, nouis & antiquis codicibus commutatio & alternatio est. Nobis præ-

Pli. li. 27. c. 17.

B

V. 27. 17.

Pli. li. 27. c. 17.
lib. 26. c. 11.

Cter meliorū codicum fidem, aptius ad deijciendā aluum Nasturcium q̄ Cardamomū etiam uisum est. Sigdem in Cardamomi decretis nihil qd ad hunc usum p̄tineat, in Nasturcio autē legitur, & inter ceteras eius uires numeratur aluū turbare, qd a deiectione eius non longe abest.

De Stichade. CAP. XXIX.

S Tichas, quā aliqui Syncliopa, alij Alcibiadem, alij Pancration, nonnulli Styphoniā, Aegyptij Suphlo, Magi Pythonis oculū, Romani Sciolebinam uocitant, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis, e regione Massiliæ gignitur, unde cognomentū accipit, Herba tenui semine, coma Thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquatūm acris. Cuius decoctū Hyssopi modo ad pectoris uitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera omnia, & uniuersum animantis habitum extenuat.

BARBARI COROLL.
Stoechas, odorata herba Hyssopi, aut Thymi coma. Confudere quidam recentiorum Stoechaden cum Stachye, Item cum Santonico Absinthium.

BARBARI COROLL.
Massiliam incolentibus cunctis notissima Stoechas, eiusq; gentis mulieribus post puerperium in quotidiano usu est. Si quidem incensæ, Stoechadis suffitu a partu statim adhuc confirmat præteriti puerperij laxamenta, omnemq; corporis infirmitatem. Quæ eius uires in græcis aliquot non leguntur. Verū tamen restituendæ huic capiti fuerūt, propterea q̄ in antiquioribus & melioribus adhuc leguntur. ἡ στήχας λεγόμεναι, ὅτι τῆς καὶ στήχας. Quinetiam Paulus Aegineta in. 6. has illi uires præcipue tribuit, στήχας ἡ στήχας, ὅτι τῆς καὶ στήχας. τὰς ἀπὸ τῆς καὶ στήχας. Quod est. Occludit Stoechas, abstergit, confirmat interanea, & totum animalis habitum. Quorum aliqua in impresso non leguntur: ideoq; cum plerisq; alijs a Barbaro relictæ, quoniam quo Dioscorides codice ille utebatur, nihil huiusmodi habebat: sed ex meliorum codicum fide, & Paulo Aegineta restituenda erant. Quod nos fecimus.

De Origano. CAP. XXX.

ὀρίγανος ἡ ῥακίλη
 τικὴ νοχρίλη

Organum Heracleoticum, quod & Cornelion uocant, folium habet Hyssopo non dissimile, umbellamq; non in rotæ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam, semine in summis uirgis haudquaquam denso. Excalfacit. Vnde decoctum cum uino potum demorsis a serpente conuenit. Si cicutam, aut meconion hauserunt, ex passo: si gypsium, aut ephemerum, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico esui datur. Aridum acerbuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluū extrahit. Menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur. Ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum decocti ius, in balneis prodest. Succus uirentis tonsillas, uuam, & oris ulcera sanat. Et per nares ex oleo irino infusum trahit. Aurium dolores cum lacte mulcet. Conficitur ex eo & cepis & rhois frutice quo ad obsonia utuntur, uomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uase per tricenos dies insolatis, dum caniculæ sydus flagrat. Harbæ autē substratu serpentes fugantur.

Pli. li. 21. ca. 10.
 lib. 20. ca. 14.

BARBARI COROLL.
Organum, nigrum, & candidum. Priori nullum semen, candido perq; minutum. Id autē cui odor est, Creticum uocatur. Negant in Arcadia erumpere, quo status a mari non accedit. A saturo non ante trigessimū diem emicat. Folia ei cadunt a cacuminibus. Aemulus Thymbrae, hoc est, Cunilæ uocatæ sapor. Nunq; utrumq; additur, quippe similis effectus. Organū ei tantum dumtaxat Aegyptiū præfertur. De Cunilæ tribus generibus, in Thymbra disputabitur.

sicut de Cunilaginibus quatuor in Conyza. Origanum tam pertinaci cum Brassica dissentit odio, ut aresciat, fugatque aduersum. Origani multa sunt nomina. Heracleoticum, quod a nostris Cunilaca, siue quod magis probo, Cunila Gallinacea uocatur, ab Heraclea Ponti dictum, uel Plauto teste in Trinumo.

In Ponto inquit, ubi Absynthium fit, & Cunila Gallinacea.

Sub qua tam Creticū, & Aegyptium intelligunt, de qua presens mentio. Deinde est Origanū Onitis, de quo proxime differendum est. Tertium Heracleoticū sylvestre. Quartū Tragoriganū. Eius duę species a Dioscoride redduntur, quę a Plinio tributę sunt Heraclio. Non est autem omnino idem, Heracleoticū, & Heracium. Prius inter Cunilas accipitur a nostris, posterius pro Tragorigano sumptum uidetur a Dioscoride. Origanum, & Origanus dicitur, producta quę ante ultimam esse syllaba. De sylvestri & Tragorigano statim prodetur.

EX M. VERG. COMM.

Prima Origanus illa ab Heraclea Ponti ciuitate, bonitatis notam & laudem nominis eā inuenit: dictaque Heracleotica est, ut gentis cognomine illo, a sylvestri, & ab Onitide distinguere-
tur, & prima probaretur. Quę itidem causa fuit, ut Heraclos eadem diceretur: quod Plinius 20. uolumine, cap. 17. indicat: & sic hic uideatur tertium illud & agreste genus potius Heracium uocare. Deerat in aliquibus gręcis Heraclij illa uox: nosque eam ex meliorum codicum fide huic scriptori restitimus. Fecimusque id autore Nicandro in Theriacis suis: qui non tantum *πανδ-
κτιον κοιλαν* eam uocari tradidit, uerū *ηρακλειον οριγανον*. Versiculi eius sunt. *πανδκτιον τε κοιλαν
ην τε ης ηρακλειον οριγανον αμφοτερον*. Adiecitque antiquissimus eius interpres ex autoritate Dio-
clis, Cunilam ab aliquibus Heracium uocari & Origanum, ab aliquibus autem sylvestrem Origa-
num: & Panacem, siue Panactiam, quę omnibus morbis medeatur: nihilque Onitidis eius, quę se-
cundum genus huic scriptori facit, aut Nicander, aut interpres eius meminerunt. Vocauitque
Diosc. Panacem agrestem illam tantum, quę sibi tertium genus facit, cum tñ Nicander priorē
illam ea laude ornauerit. Quę omnia, quod paulo ante dictum a nobis est, indicant, non posse
in tam diuersa de Origano tradentibus antiquis scriptoribus, certum aliquid cōstitui. Nihil eū
am in Plinio, multis locis, minus certum Origanos et Cunilas plures quę hic, Theophrastusque, et
aliter tradente, gręcisque aliquando nominibus, aliquando latinis, nulla certa ratione utente, p-
serim quę in Cunila. Quę gręci uocē *κοιλαν*, pene eadem multis locis legentes, merito suspendit.
Ob eam causam nos nihil censere ausi, nihil maluimus quę quod nesciremus dicere. Eam hic scri-
ptor ait *μύλανα κατὰ κοιλαν ἔχειν*. quę si uerbū de uerbo uertas, nihil significabunt aliud, quę per-
alium nigra ducere Origanum. Plinius de Origani uiribus & medicina libro. 20. cap. 17. agēs,
extenuare eam ait crassiores pituitas & nigras: eumque imitatus Barbarus, extenuare per aluū,
& ipse pituitas nigras dixit. Nos alios omnes secuti, nigra illa ad atram bilem tantum contra-
ximus, nullibi pituitam nigro colore tradi simpliciter inuenientes: in quo posterioribus me-
dicis subscribentes, qui omnes melancholicos humores purgare Origanum dixerunt, certius
rem docere arbitrati sumus.

De Onitide. CAP. XXXI.

Quę Onitis appellat, candidiore est folio, non dissimilis Hys-
sopo. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Ori-
gani Heraclei, sed multo inefficacior.

BARBARI COROLL.

Origanum Onitis, siue Præson. Quidam & Ornithis, quasi Gallinaceū dixere, sed genus
illud Heracleoticū uocari cernō: quemadmodum proxime indicatum est.

De Sylvestri Origano. CAP. XXXII.

Sylvestre Origanum aliqui Panaces Heraclion, alij Cunilam uo-
cant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est Origani,
ramis tenuibus palmium altis, in quibus umbellę Anethi insunt. Flo-
res cādidī. Radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis a serpente,
folia & flores ex uino poti auxiliantur.

BARBARI COROLL.

In primo genere quod Heracleoticū uocatur, Galenus Origanū sylvestrem, Panaces He-
E

Craction, & Cunilam quoq; dici solitum affirmat.

De Tragorigano. CAP. XXXIII.

τραγοριγανος

Tragoriganum tenuis frutex est, syluestri Serpyllo, aut Origanis similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis uirentius inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui Prassium uocauerunt. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio, Cooq; proveniens. Omnia excalfaciunt. Urinam cient. Aluo accommodantur. Decoctio potu bilem deijciunt. Lienosis ex aceto bibere prodest. Contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur. Menses trahunt. Peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est. Quare cibum fastidientibus, & stomacho acide ructanti, imbecilloque traditur. Item si a maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores uero cum polenta discutiantur.

BARBARI COROLL.

De Tragorigano dictum est in Origano Heracleotico.

EX M. VERG. COMM.

Possimus autore Paulo Aegineta, de tam multis Origanis dicere, quod de tam multis antiquorum Dijs sapientiores quondam dicebant: nominibus tantum distingui Deos, unam tamen omnium potentiam esse. Simul enim de omnibus lib. 6. is egit, complexusq; cunctas, incidere, extenuare, siccareq; & calefacere in tertio ordine Origanos omnes dixit: quod parum ab eo abest, si quis dicat nominibus distingui Origanos, omnium tamen similes & easdem uires esse. Quo sensu intelligenda sunt quæ ab hoc ipso scriptore hoc capite dicuntur, *ἡ ὑπερτινὴ αἰ πᾶσι τοῖς ὀρίανος* &c. Quod est, ut nos reddidimus, Omnes calefaciendi uim habent. &c. Plinius tamen Tragorigano priuatim uires quaspiam alias tribuit, quas poterunt uolentes in eo uidere quod diximus uolumine & capite.

βλίχων

De Pulegio. CAP. XXXIII.

Glichona Græci, aut Blechra, alij Arsencantho, Latini Pulegium uocant, Galli Aluolū, Aphri Apoleium, Quidam Galiosopsum. Herba uulgaris noticiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. Menstrua, secundas, ac partus eijcit. Pulmonis uitia ex melle & aloë potum extrahit. Conuulsis auxiliatur. Nauseas, stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet. Atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. Gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta, inflammationes omnes sedat. Podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus. Cum cærato uaros extinguit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriges mitigat. Conuersas uulvas corrigit. Contra inflationes duriciasq; uulug, in deflectiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona: quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 14

Pvlegium, ipso brumali die germinat in carnarijs, refloretq; Ramulis etiam a parente absunctis ut Scylla. Nascitur hoc etiam non satum. Semel uero satum, disticta arate durat. Magna cum Nepeta & Metha Pulegio societas. Fœmina in eo efficacior, florem habet purpureum.

um, Mas candidum. Vtriusq; recens incensus pulices necat; unde nomen Pulegio. Habetur & Pulegium sylvestre, Origano simile, folijs minoribus q̃ satium, & a quibusdam uocatur Dictamnus: occasioe hinc orta, Dictamnū Creticam Pulegium sylvestre nominātiū. Pulegium graeci Glecona, & artice Blechon, sed & Blechroon quoq; uocant, ut in gr̃ Dioscorides. Ego Blechroon Hippocrati, pro legumine quodam accipi uideo apud Galenū, Pulegium (ut dixi) brumalis herba dici potest, quemadmodum & solstitialis aliquā dicuntur. Plinius, Condurdō inquit, solstitialis herba, flore rubro, suspēsa in collo cōprimūt sūmas, Plautus q̃q; in Pseudulo. Quasi solstitialis, inquit, herba paulisper fui, Repente exortus sum, repentino occidi.

EX M. VERG. COMM.

Q̃uas Plinius uigesimo uolumine, cap. 14. de hoc ipso Pulegio agens, intercisiones uocat, non satis certa nobis indicatione, priuatim ne labem aliquam eius partis sic appellet, an late patētes in hoc scriptore & alijs *ἀντισει*, idest, morsus & erosiones. Intulit contra concioni castigationis graui amaritudine gr̃cus sapiens idem Pulegium, quō tempore dissidentibus & lasciuientibus ciuibz suis, in pulpitu progressus, nihil locutus aliud, uerum sola prolata pulce, cum eam Pulegij ramulo identidem miscuisset, e concione abiit: humili quidem, & facile contemnendo p̃cepto, nisi intellexerit aliquis, nullas comitari frugalitatem ciuium inflammationes, quōd cum polenta Pulegium stomacho praestat; nec lasciuie petulāterq; aliquid acturos homines, qui paucis contenti, ex horto & agro, non ex macello & foro uitam sibi quēserint; et quas Pulegij cū p̃osca stomachi erosiones sanat, frugi id uitę genus, nihil male cōgītares ciues, cōcordiā et cōmunē dignitatē amare cōegerit. Erat, ut ex his cōijcere licet, Quidianus in sanitatis usu Pulegij cibis. Seruabātq; id sale aliorū Salsamorū mō, ut autor ultimo sui opis uolumine Columella est. Neq; īmerito tā multos habet in medicina usus, qbus & in sanitate utile etiā est.

De Dictamo. CAP. XXXV.

Dictamnū, aliquibus sylvestre Pulegium uocatur, alijs Embastron, alijs Belouacos, alijs Artemedeion, alijs Cretica, quibusdam Ephemeron, nonnullis Eldia, aliquibus Belotocos, aut Dorcidion, aut Helbunion. Romanis Vstilago rustica. Cretensis hærba est, acris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam, spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum, aut semen profert. Praestat omnia quæ satium Pulegium, sed efficacius multo. Non potum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eiicit. Prostant in Creta capras sagittis percussas, huius hærbae pastu, eas excutere. Purgandi uim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Hærba impactos pedibus, reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis do lorem efficax habetur. Siquidem ipsum imminuit. Metunt semen aestate & autumno. Radix eius gustu calfacit. Partus accelerat. Succus cū uino potus, contra serpentium morsus praesidio est. Tanta hærbae factas est, ut olfacta abigat bestias quæ uenenato ictu sauiunt, appensaue exanimet. Vulneribus ferro illatis, & uenenatis moribus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

BARBARI COROLL.

Dictamnū, nō Dictamnū ex Theophrasto, & Virgilij quodā uersu lego. Ramis hoc p̃tenue, Pulegio etiā gustu simile. Caulis nullus, radix gracilis & superuacua, & in Creta quoq; nō spaciose nascit: nec nisi in asperis, quę uera Dictamnus sit, minimo p̃dēre, accendēs os: quo argumēto a falsa protinus discernitur. Qui legere eam, manipulos in ferula, uel harundine condentes praeligant, ne potentia euanescat. Mire a capris expetitur. Dictamnū legitimum in Felicis horto Patavij uidisse crederem, folijs interpūctis, quemadmodum & pingitur, nisi q̃ non

E η

A

Dictamnū

B

The. li. 9. ca. 16

C alibi q̄ in Creta prouenire scribunt. proinde Pseudodictamnium potius eam fuisse, q̄ Dictamnum arbitror.

ψευδοδίκταμος

Q De Pseudodictamo. CAP. XXXVI.

QUOD Pseudodictamnium uocant, multis in terris nascitur, antedicto simile, sed minus q̄ illud acre. Eisdem effectus prębet, sed inefficacius multo.

P BARBARI COROLL.
Pseudodictamnium, folio simili, ramulis minoribus, a quibusdam Chondris uocatum. In pinguibus agris nascitur.

Q De Cretensi Dictamo. CAP. XXXVII.

DEfertur a Creta alterum Dictami genus, folijs Sisymbrij, ramulis maioribus. In quibus flores syluestris Origani, nigri, molles. Odor foliorum inter Sisymbrium & Saluiam iucundissimus. Efficax ad eadē, sed uehementius nares ferit. Miscetur emplastris, & medicamentis quę aduersus serpentū iniurias confingunt, Theriaca uocāt.

D Ictamnium hoc neq̄ facie, neq̄ effectū simile uero est.

EX M. VERG. COMM.

DUAE desiderari posse in hoc scriptore uidentur, quę nobis prima fuit causa, cur omne Theophrasti de Dictamnis historiam commentationibus his nostris adijceremus, quibus quod ad eius appellationes pertinet, addendum adhuc est. Artemidion, s. dici Dictamnium a uenatrice dea Diana, quam Gręci Artemida uocant: qm̄ uulneratę ab ea in uenatione caprę & ceruę, eius herbę pastu sanarentur. Quod erat numini in primis gratum, sine maleficio & naturę iactura, studium & uoluptatem suam amanti. Eademq̄ de causa Dorcidion, quasi cerualem (dorcada enim gręci Inulum, & in ceruorum genere minores) uocāt: quod animal Plinius ait Dictamnium hanc ostendisse: uulneratis eo pastu, statim decidentibus telis. Foemini generis hic Dictamnium ueluti herbę, Theophrastus, pluresq̄ alij neutro tradiderunt. Quę generis mutatio multa in plantis est: non tam quia sexu aliquę a ueteribus discretaę fuerunt, q̄ quia alterutro genere eas antiquissimis appellare placuit: interpositaq̄, n, litera Dictamnus, non Dictamus dicenda est. Indicat id gręcorum codices omnes Theophrasti, huius, aliorūq̄ omnium qui forte Dictamni meminuerunt. Indicat & poeta noster in. 11. Aeneidos suę canens. Tum Venus indigno nati concussa dolore, Dictamnium genitrix Cretę carpit ab Ida, Puberibus caulem, folijs, & flore comantem Purpureo: non illa Seris incognita capris, Gramina cū tergo uolucres hęlere sagittę. Nisi enim producta sit eius uocis penultima syllaba, stare uersus non possit. Quod bene, & ex antiqua Dictamni appellatione feliciter dictum, eandem in homine totius naturę aliquę peritissimo diligentiam desiderari sæpenumero nos cōegit: & in Dictamni pictura, quam ille æternam in suo carmine faciebat, tria eius nō miscuisse gñā. Quod em̄ in eo est, Dictamnium genitrix Cretę carpit ab Ida Puberibus folijs, ex uera ueri Dictamni historia est. Siquidē in Creta priuatim nascitur: & ut hic ait, *ναφαλοῦ δὲ τὰ φύλλα ἔχει. καὶ ἱκανότατα τινὲς ἐπιφύουσιν.* Quę enim hic ait, tomentosa folia, & lanosam adnationem, ille ab hominis lanosa pubertate, felicissime indicauit. Quod uero statim ait, caulem & flore comantem purpureo, non ex ueri Dictamni, sed ex eius historia est, quod Theophrastus tradidit, solo nomine Dictamnū esse Sisymbrij folio maioribus ramulis, nec eiusdē usus, aut potestatis. Quodq̄ hic præter ea ait, agrestis Origani flore esse medio inter Sisymbrium & Eleisphacō odore. Dictamnū em̄ cretensem herbam omnes sine caule, sine flore, & ob id sine semine, excepto Theophrasto, descriperunt: q̄ quo diximus loco, semen Dictamno tribuere uidetur: & si semen, prius etiam florē, quando hic naturę ordo est, ut in cunctis semen ex flore aliquo fiat. Verba eius sunt. *καὶ ἔναι δὲ τοῖς φύλλοις, οὐ τοῖς κλαδίς, οὐδὲ τῷ καρπῷ.* quod est. Videntur autem folijs, non ramulis, nec semine. Negat Theophrastus seminis usum: qui negandus non fuerat, si natura illud negasset. Ceteri oēs caulem & florem, & semē in Dictamno negauerunt. Potuitq̄ Maro hunc sequi, & si contra aliorum historiam dixisse uideatur. Non tñ ideo ignorantie omnino damnandus poeta tantus erit, qui aliorum exemplo, in fabulosa re uoluprati magis q̄ utilitati legētiū cōsuleret.

Nec nos aliam ob causam locum indicauimus, q̄ ut legētes moneremus, aliam ex professo ali quid scribentibus, q̄ poētis in tradendo rationem esse. His enim suæ artis priuilegio agentibus sibi concessio, licuit, semperq̄ licebit, non quæ optima & ex re, sed quæ speciosissima sint dicere. Est & illud in Dictamno animaduertendum, quod hic ait, facere Dictamnium quæcunq̄ & sari uum Pulegium, non ad omnium malorum remedia referendum esse, sed ad menses, secundas & partus: quæ omnia hic Pulegium ducere dixerat. Indicatq̄ id quod sequitur statim. Non em̄ potum tantum, sed subditum & suffitum enectos in utero fetus pellit. Quod iūdem ab hoc di citur, Habet & succus purgandi uim, a Theophrasto sic tantum traditur, Habet Dictamni suc cus aliquid Pulegij succo æquale: nihil aliud intelligens, q̄ qd hic in Pulegio dixit. ἄντι δὲ καὶ κατὰ νομίαν ὑδάρα, quod uersum a nobis est, per aluum nigram trahere bilem. Et hæc satis pro Dictamnīs omnibus dicta hæcenus a nobis sint.

De Saluia.

CAP. XXXVIII.

Elelisphecon, alij Elaphoboscon, aliqui Phaenon, alij Ciosmin, a lij Phagnon, Aegyptij Becion, Romani Saluiam uocant. Frutex est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canas. Folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attrita ram quasi uestitum scabriciem referant, hirsuta, subalbida, perq̄ iucun do odore, sed graui. Semen summis in caulibus syluestri Orminio simi le gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ra morumq̄ potum. Partus extrahit. Pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulnerū sanguinem cohibet. Tetra ulcera purgat. Testium pruritus sedant rami, foliaq̄, si decocto eorum foueantur.

BARBARI COROLL.

Elelisphecos, ut Theophrastus inquit, differt a Sphacelo: q̄ altera mitior est, altera syluestri or. Sphacelo folium breuius, & leuius: Elelispheco squalidius & scabrius. Sed aliter fere Plini us. Syluestris inquit lens est Elelisphecos, a Græcis dicta, fatiua lente leuior, & folio minore, at q̄ sicciore & odoratiore. Est & alterum genus eius syluestris, odore graui, hæc mitior: nostri q̄ nunc inquit sunt herbarij, Saluiā appellant, Menthæ similem, canam, odoratam. Elelisphecon sunt qui Hieram botanen, hoc est, sacram herbam cognominant, ut Agrippa, salutarē ad mul ta, præsertim ad fecunditatem: ut inde Saluia fortasse a nostris dicta esse uideri possit. In Aegy pti Copto, multis pestilentia sublati, coactæ sunt mulieres huius herbæ succo ad cōceptū uti.

EX M. VERG. COMM.

Magnæ litis nostra ætate Elelisphecos, quam quondam Plinius Saluiam dici testatur, cū simili & quasi congener fruticosa herba est, cui a claritate oculorum, quibus prodest, nomen in gente nostra factum fuit. Censentibus alijs, quam hic Saluiam uocari a Romanis inquit, alterā illam mutato in uicem nomine esse. Alijs cōtra nitentibus. In quorum numero non pudet nos etiam numerari. Neq̄ em̄ turpe nobis fore aliquando credimus, autoribus Diosc. Plinio, Apu leio, Serapione, totq̄ alijs, credidisse id, & constituisse. Siquidem non uerisimile solum, sed pau lominius q̄ necessarium est, testantibus idem tam multis, antiquā plantæ eius eam appellationē per manus traditam, continua eiufdem rei significatione ad nos peruenisse. Quid enim, ut ceteros omittamus, aliquando Plinius apertius docuit dicens: Nostri qui nunc sunt herbarij, Elelisphecon græce, latine Saluiam uocant, &c. Aut quis Apuleio non credat, Saluiam totidē quot Diosco. nominibus indicanti, & in medicina iubenti, ad pruritus uerendorū decocto eius infe riores partes fouere: Quod ultimum hic scriptor etiam iubet, dicens finire genitalium prurigi nes foliorum, ramorumq̄ Saluiæ cum uino decoctum, si eo abluantur. Accedunt his deinde caulibus, foliorūq̄ tam p̄sentes notæ, ut suspicari nemo aliud facile possit. Fruticis nō adeo p̄cera altitudo, fruticosus, ramosusq̄ habitus: quadrangulæ uirgæ, in his & in folijs albicans color: foliorum tam multis additis exceptionibus similitudo: & quod præcipue contempletur, & ad hanc rem amet aliquis, attrita uestis modo aspera: quarum alteri illi aliq̄ congruunt, huic ue ro omnes. Egit Theophrastus librō. 6. de plantarum historia de Elelispheco hac: simulq̄ de con genere illi alia, quam Sphacelon nominauit.

A

ἑλελίσφακος
ἐλαφόβοσκον
σφαγνον

B

The. li. 6. ca. 2.
Pli. li. 22. ca. 25

C

¶ De Mentha.

CAP. XXXIX.

ἡδυόσμος μίνθη

Hedyosmon satiuū alij Mintham, alij Calaminthan, Latini Men-
tham uocant, alij Nepetam, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Ma-
cetho. Cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccandi uim
habet. Siftit sanguinem, potio ex aceto succo. Tineas in uentre teretes
enecat. Venerem stimulat. Singultus, uomitiones, choleraeque sedant, ter-
ni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum
polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. Mammās si
tendantur, aut lacte turgeant, compescit. Cum sale, canum moribus illi-
nitur. Aurium doloribus cum aqua mulsā subuenit. Vuluae ante coitū
admota, conceptioni resistit. Linguae scabriciem confecta laeuigat. Coi-
re lac, densariq; in caseū non patit, si folia potionibus lactis imergant.
In summa, stomacho utilis est. Et in condimentis peculiarē gratiā habet.

B A R B A R I C O R O L L.

The. li. 7. ca. 7.
Pli. li. 19. ca. 9.
lib. 20. cap. 14.
& de planta.
caus. li. 2. & 5.

Mentha aestate uiret, hyeme flauescit, humido minus gaudet, semel sata pluribus annis re-
stibili fertilitate durat. Menthae nomen suauitas odoris apud Græcos mutauit (hoc enim signi-
ficat Hedyosmos) cum alioquin Mintha uocaretur: unde ueteres nostri Mētham appellauere.
aut fortasse quoniam odore mētem excitat. Theodorus Hedyosmon in Theophrasto Mentha
strem interpretatur, ut a Mintha in eodē autore separaret. De Mentha stro statim prodetur. Ga-
lenus porro Mintham quæ sit odorata, Hedyosmon, idest, Mentham uocari tradidit, Mintham
uero quæ sine odore sit, Syluestrem esse Mintham, & pprie Calaminthā appellari uoluit. Stra-
bo in Achaia montem esse iuxta Pylum scribit Mintham nomine, a Plutonis pellice in hac her-
bam conuersa, Proserpinæ inuidia, quæ uocatur inquit a quibusdam Hedyosmos. Ouidius.
Femineos hortos in olentes uertere Menthas
Persephonæ licuit.

D

Quarit Aristoteles in problematis, quamobrem dicatur, Mentham in bello nec edendam, nec
ferendam: Soluit. Qm inquit refrigeret, absumendo genituram: sed cum alij oēs ex calfactio-
riam uim Menthae ascribant, fieri potest, ut per se calfaciat, per accidens refrigeret: quod & in
alijs plerisq; conspicitur.

E X. M. V E R G. C O M M.

Solo nomine in græcis Mentha cōmendatur: nec quisq; est qui eo audito, suauitatem odoris
in notissima omnibus herba non amet. Id enim Hedyosmos græcis est. Quod ambitiose nescio,
an molliter ab eis factum fuit: qui antiqua Minthes appellatione, quæ hominis in eam con-
uersæ honorem haberet, parum contenti, nouo, & quod uitæ tantum delicias indicaret, uligi-
notis locis feliciter prouenientem herbam nomine ornauerunt. Quo secuta ætas, uoluptatis
suæ magis q; alieni nominis ambitiosa, libentius & frequentius q; antiquiore illo usa est. The-
ophrastus enim nō alio q; Minthes nomine, pluribus locis Mentham indicauit: & ante eum ro-
ta Græcia, præsertimq; Arcadia: in qua non procul a Pylo nobilis Minthes cognomine mons
fuit: quā Plutonis pellicem poetarum fabulæ, & a Proserpina, ut solent pellices semper odif-
se uxores, in hortensem Mentham transformatam fuisse narrant, æterno in æterna planta ho-
minis monumento. Quam uocem Romani magis amantes, q; in ea male habitæ ob amorem
puellæ memoria seruaretur, una tantum & altera mutatis literis græcorum, Minthen, Men-
tham suam fecerunt. Quotidiani in sanitate usus, & præsentis in medicina contra tot mala re-
medij. Quam cum Calaminthe, quæ Nepeta est, miscere non decet. Sui enim generis Calamin-
the herba est, a Mentha stro statim a nobis dicenda: quæ ab imperitis alijs Menthae appellatio-
nibus importune adiecta est.

¶ De Mentha stro.

CAP. XL.

ἡγρὸν ἡδυόσμον

SYLVESTREM Mentham Latini Menthastrū uocant, hirs-
sutiore folio, et prorsus maiore q; Sisymbrij, grauiore odore. Quare

minus ad sanorum usus expetitur.

BARBARI COROLL.

Menthastri, hoc ē sylvestris Hedyosmos, aliter a Plinio describitur, foliorū specie a sativā differens, quasi figurā Ocimi, colore Pulegij: propter quod quidam sylvestre Pulegiū uocant. Dioscorides hoc non Menthastrū, sed Calaminthæ genus unū (ut arbitror) existimat.

EX M. VERG. COMM.

Sylvestris Mentha Menthastrū est, in hortēsi & rustica re cūctis notissimū, satis a Dioscoride descriptū, & quale passim ab oībus & quotidie uidetur. Inter cætera māius & procerius Sisymbrio ab hoc scriptore dictū fuit: q̄ multa inter Sisymbrium & Mentham similitudo est: mutaturq; & degenerat in Menthā neglectū Sisymbriū, quemadmodū secundo & quinto uolumine de causis plantarū testatus Theophrastus est. Quæ fuit huic scriptori causa, ut procerius eo Menthastrū esse diceret: ne multæ similitudinis inter se plantæ uidentes fallerēt, haberentq; herbarij certā ex proceritate notā, quā Menthastrum a Sisymbrio discernere.

De Calamintha.

CAP. XLII.

EX Calaminthæ generibus, quædam montibus familiaris, folia Ocimi habens, incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior. Quam sylvestre Pulegium ideo appellant, q̄ odore ipsum æmuletur. Nepetam Latini uocant. Tertia Menthaastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄ superioris, sed uiribus inefficacior. Omnium folia gustu feruentia & acria. Radix superuacua. Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses & urinas expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnææ, torminibus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Regium morbum expurgat. Præsumpta in uino uenenis resistit. Tineas, cæteraq; interaneorū animalia, cum sale & melle pota, enecat. Nec secus cocta crudatue si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subijciuntur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa, aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita. Sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut concretum humorem euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

BARBARI COROLL.

Calaminthā, nostri fere Nepitā appellant, etiā si Dioscorides spēm eius unā priuatim Nepitam uocari tradat. Profus tāta inter Menthā, Mēthastrū, & Nepitā societas est, ut mirū non sit misceri quāq; ab auctoribus earū & spēs & noīa. Alioq; & q̄d modo Pulegiū officinis & ruribus uocat, haud plane scias Calaminthæ genus sit, an uerū Pulegiū. Nepita etiā non satis nascit. Calaminthā græce Cæterā quoq; dictā fuisse, testis est Strabo, q̄ nōnullos scribit existimare, Lacedæmonē ab Homero nō cetoesiam a magnitudine, sed cetoesiam a Calaminthæ copia uocari.

EX M. VERG. COMM.

Congenerem aliqui, similem tantū aliqui Menthæ Calaminthem, quā nos Nepetam diximus, in græcis fecerunt. Subscribitq; illorum sententiæ, nomen quod coniunctam sibi habet Mentham. Habent contra posteriores illi figurā, quā Menthæ similem faciunt: naturā uero & vires, qui sui generis herbam esse dicūt. Triplicem hanc Dioscorides ait: diuersisq; notis inuicem separat, sed nō facile cognoscendis: tanta trium generū similitudo est. Plinius unum tantū constituit genus lib. 20. cap. 14. Nepetāq; id uocat. Nicander in theriacis suis duo tantū, & alter Calaminthes gēna cognouisse uidetur, aquaticā, palustre; alterū: montanū uero alterum: haud sane, quia montanā Calaminthē ille dicat, sed cum aquaticā & riguis gaudentē dixit, pro

E iij

A

Pli. li. 20. ca. 4.

καλαμίνθη

B

C prium signasse genus uidetur: cui diuersum montanum, & in ficcis nascens fit. Versiculi eius sunt. *τῆμος δὲ ποταμῷ πολλὴν ῥαγὶς καταλίνασθαι ὑδρῶν καὶ ἀμύνθον ὁπότε χαρτόωναν. πολλὰ γὰρ διόρει παρὰ ἔσται ἀμφὶτε χεῖρα ἔρεται. ἀγρῶν οἰσιν ἀγαλλομένη ποταμοῖσιν.* Quorum sensus est, Sumito tunc circa resonantis fluminis uortices comosam frondentem Calaminthem. Copiosa enim prope aquarū scatebras, & circa labra earum nascitur, fluminibus gaudens. Ex quibus pro comperto habendum est, Nicandro duo hæc tantū genera esse, locis in quibus nascuntur distincta. Hic tamē ex foliorū, ramulorum, florum, & odoris diuersis notis sua genera separat. Non facile, ut diximus, inuenienda & cognoscenda: tanta est nataliū mixtura, & naturæ cognatio. Apuleius, quicūq; ille fuit, in cōmentario, qd de aliquo herbis reliquit, Neperā hanc ait montanā, Mentham a græcis dici, a Magis sanguinem Hammonis, ab Italis Neperam montanam.

De Thymo.

CAP. XLII.

T Hymon quidam Cephaloton, alij Epithymum, alij Thyrsion, Latini Thymum, Aegyptij Stephanen, Daci Mosulam. Thymum ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs & angustis circumdatus, capitulis in cacumine flore purpureo refertis, Gracili folio & petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus. Tineas uentris exigit. Menses, partus, & secundas pellit. Vrinasciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes. Recentes tumores discutit cum aceto illitum. Concretū sanguinem dissoluit. Verrucas Thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit. Ischiadicis cum uino & polenta impositum subuenit. Hebetibus oculis in cibo prodest. Perq; utile pro condimento, dumtaxat ad usus eorum, qui recte ualent.

D

Plin. lib. 21. capit. 10. & 21.

T Hymū, siue Thyma pluratio numero, siue Thymus, in mari quoq; nasci traditur, extra Herculis columnas, quod eiectum in pumice durescat. In Heroo sinu, color etiamnū floris in eo est, ceu nondū absoluti pars. Quæ aquis extat, duricia lapidis aspicitur, similis tamē uiuenti. Sero floret Thymū, per solstitia fere cum & apes decerpunt, & auguriū mellis est. Seritur flore, in quo semen intelligitur: etiam si oculis deprehendi non potest. Coalescere quidam Thymū negant, nisi afflatu maris feratur. Ideoq; translātū ex Attica non durasse in Arcadia. Nunc prouincia inquit Narbonensi Plinius, lapidei campi Thymo scatent. Flos Thymi perit imbribus. Duo autem sunt genera eius. Candidum radice lignosa, in collibus nascens, quod & præfertur. Alterum nigricans, florisq; nigri. Colligunt in flore Thymum, & in umbra siccant. Epithymum quidem pluribus uidetur flos eius Thymi esse, q; & durius sit, & similitudinem Cumilæ nostratis habear. Sed de Epithymo posterius. Thymum ē Thyna laudatur ab Hippocrate. Est autem, ut inquit Galenus, Thyna in terra Thraciæ locus.

EX M. VERG. COMM.

Prima Thymo laus in antiqua plantarū historia græcis a Theophrasto est: qui a principio statim sexti de plantarum historia uoluminis longiore descriptione totā eius naturā fortunāq; complexus est. Post Theophrastum latinis a Plinio, & ante Plinium plerisq; alijs, qui Romanorum, Italiæq; hortos & mellationem instruxerunt. Omnī uero maximā & æternam æternocarmine Maro illi fecit, cum in Georgicis suis cecinit. Redolentq; Thymo fragrantia mella, Romana breuitate, & poetica dignitate, omnē plantæ huius honorem & usum in ruris & apium disciplina complexus. Quæ licet præcipui saporis, & egregij odoris homini mel dederit, in quo extremā suauitatis lineam natura clausit: nec secus q; in humana fortuna totum in regibus, autore Pindaro, fastigiū definit, sic mellis extrema in saporibus dulcedo sentiat: non tamē tanta illi gloria hætenus fuit, aut posthac erit, suauitate mellis suauiorē homini fecisse cœnam, q; multiplici remedio sanitatem eius, & uitā instruxisse, cuius nullū obrepat homini quacūq; ætate fastidium, κέρων δ' ἔχον καὶ μέλι, ut lyricorum maximus Thebanus poeta cecinit. Quæ ad Thymi historiam, factiq; ex eo mellis bonitatem pertinent, Theophrastus quo diximus loco, Plinius ab illo accepta omnia. 21. uolumine capite decimo, Columella quo loco de apium pabu-

lo & cibarijs agit, in mellificio tandem, ne longiores simus, iam pridem plerique alij prosecuti sunt: possuntque uolentes ex tam multis auctoribus ea repetere. Nobis satis est, locos, & auctores legentibus signare. In quibus monemus, quæcunque a Theophrasto dicta fuerint, a Plinio totidem uerbis reddita ciuibus suis fuisse, nec desideranda Plinium legentibus quæ Theophrastus tradiderit: qui Thymum in duo genera diuidens, candidum, & nigrum, monuit nos quod in Dioscoride legitur, ab aliquibus candidum Thymum dici, non appellationem, sed alterum genus eius esse, a Theophrasto ad hunc scriptorem importune translatum, qui nulla huiusmodi diuisione usus est. Coloris autem discrimen id Theophrastus in folijs tradidit, in altero genere albicantibus, in altero nigrescentibus. Florem enim hic πορφυρίσσει, id est, purpurascens tradit, inter purpuram, & candorem medium: qualis etiam passim uidetur. Sunt Thymi appellationes aliæ. Epithymis, & Thymon, solo declinationis genere diuersæ: antiquæ & ipsæ. Si quidem Theophrastus genere neutro Thymon dixit: sic fœminino genere Epithymida alij herbam, scilicet intelligentes. Potuerunt Aegyptij accepta a græcis uoce, quoniam forte eo coronarentur, Stephanem, id est, coronam appellasse. Quemadmodum & græci Thyrsion, quoniam Bacchicæ hastas, quas in orgijs eius dei Thyrsos uocabant, pro Hederis, ramulis Thymi forte inuoluerent. Suspitiones tamen, seu malis dicere, coniecturæ hæc sunt. Quod postremo est κεφαλήν, quod capitatum significat, certam ex figura floris capitulorumque eorum in quibus hic florem Thymi purpurascere dixit, rationē habere potest.

De Satureia.

CAP. XLIII.

Satureia nota est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, Thymo similis, minor tamen & tenerior. Desert spicam florum plenam, diuque permanentem. Eadem potest quæ Thymum, si modo consimili sumptitur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quædam satua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

BARBARI COROLL.

Thymbra post trigessimū diem nascitur in maris afflatu sata, nec ut quidam putant aliter. Hæc apud nos & Cunila uocatur, & (ut arbitror) transmarina Cunila est. Apud Columellam Thymbra est condimentarij generis. Satureia quoque a nonnullis Thymbra dicitur. Columella Thymbrā a Satureia diuisit, & Cunilā nostratē esse docuit: quā rustici Satureiam nominant, colore floris purpureo, ut Thymbrā herbaeo. Quintus Serenius spēm Thymbre Satureiam intelligit, ut Satureia sit non Thymbra simpliciter, sed Thymbra cephalote, quā Plinius Cunilam capitatā semel tantū, quod meminerim, opere toto nuncupat, intra hæc quæ in Cunilagine dicuntur. Cæteri Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera, fortasseque hanc Hippocrates intelligi uoluerit, ubi Origanum Cephaloides appellat. Bubulam appellant, semine Pulegij. Origanum ab Aristotele putatam, cuius pastu Testudines cum Serpētibz pugnaturæ, uires suas recreant: quamque in hunc usum nonnulli Panaceam uocant. Quidam falso Ligusticum interpretati eam sunt. Corrupta est in L. Columella dictio, ubi cuniculabula, & interim culabula, pro eo, quod est Cunila bubula, inter pecoris medicinas legitur. Plinius Origanum multis locis, non aliter quæ Cunilam bubulam conuertit. Est & Cunila gallinacea, de qua in Origano Heracleotico dictum est. Non omitrendum, aduersa dicere hoc loco Dioscoridem, & Plinium. Omnia inquit syluestria fere sunt, & folijs minora, & caulibus succo acriora: sicut Cunila, Origanum, Ruta. Dioscorides contra hic prodidit de Thymbra. Sunt & græcis utique recentioribus, qui non Thymbra, sed Thymbra neutro genere, plurali numero pronuncient. Et nos quandoque seruamus in Satureia. Ouidius.

Sunt qui præcipiant herbas Satureia nocentes,

Sumere. In Thymbra Paulus Epithymbrum uocari tradit id, quod in Thymo Epithymū. Ridentur merito grammatici fere omnes, in herbarum exponendis, iudicandisque nominibus, in quo & Seruius honoratus sepiissime decipitur, & in hac ipsa Thymbra Placidus Lactatius is, qui Papinij Thebaida interpretatus est, Thymbra, a qua Thymbreus Apollo cognominatus sit, latine dici Polium affirmans.

EX M. VERG. COMM.

Habemus antiquissimū & probatissimæ fidei scriptoris huius codicē, in quo plures Thym

A

Thymbra

B

Pli. li. 19. ca. 9.

Cbrae a principio appellationes aliae leguntur, Clinopodion, Probation, Ageratum, Origanus agrestis: & post barbaras, nulliusque intellectus plerasque alias, a Romanis Cunilam rusticam appellari Thymbra. Id ueterum latinorum decretis additum facile confirmavit, quod constitutum iam pridem a nobis fuerat, in Cunilarum genere Thymbra esse. Si quidem Columella decimo sui operis uolumine de apium passionibus agens, inquit, Eademque regio sit fruticis exigui, secundae, & maxime Thymi, aut Origani, aut Thymbrae, uel nostratis Cunilae, quam Satureiam rusticam uocant. Plinius item, 19. uolumine capite, 7. inter Cunilas Thymbra his uerbis numeravit, Thymbra uero quae sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulum, & aliud Satureia dicta in condimento genere. Estque quod Columella ait, sic intelligendum, ut ultima illa distinctio, uel nostratis Cunilae, &c. non herbas, fruticesque duos, sed unius duas appellationes alterneret: indicetque autem ille, non Thymbra, & praeter eam nostratam Cunilam, sed hac, aut illa appellatione unam tantum significari: & quam antiquus Dioscorides hic noster a Romanis Cunila rusticam uocari dicit, Columella nostratam peregrinitatis ratione in alio genere dixerit. Transmarina enim Cunila etiam quondam numerabatur. Sicque bifariam a duobus scriptoribus idem dictum: a Columella nostras, ut eo pronomine a transmarina distinguere: a Dioscoride rustica, ut a satua separaret, inuili & minoris efficaciae. Fuisse autem satiuam Satureiam, & condimentariam idem, in carmine suo testatur Columella, cum cecinit ferendum in hortis Nasturcium, Et Satureia Thymi, referens Thymbraeque saporem. Quae quoniam multo minore acrimonia quam rustica illa esset, ideoque medicinae inuiliis, mutato nomine a graecorum Thymbra, & latinorum Cunila, Satureia dicta est. Eadem quidem, sed diuersis locis nascens, & ex eo diuersae bonitatis, non isdem ubique appellationibus indicata. Quod Plinius aperte ostendit, dicens, Thymbra uero quae sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulum, & aliud, Satureia dicta in condimento genere. Nihil certius ex his est, quam unam & eandem Thymbra Cunilam dici, habereque in Romana gente id uocabulum: mox aliud Satureiam, scilicet in condimento genere: quod nihil aliud est, quam satiuam Satureiam dici. Cunila itaque Thymbra sit Columellae nostras, ut a peregrina & transmarina discernat: Dioscoridae uero rustica, ut a satua separetur: Plinio Cunila, incultis & asperis locis: Satureia, in hortis nascens & satua. Hoc nos de Thymbra, Cunila, & Satureia sentimus, quod auctoritatibus, ueterumque indicibus alijs multis confirmari poterat. Sed breuitati consulentes, caetera omnia relinquimus, praesertim uno Satureiae nomine totum hoc genus, ubicumque nascatur, indicantibus aetate nostra herbarijs oibus: quibus nullum Cunilae alicuius nomen est: utinamque agrestem Origanum, Thymbra, & Thymum non simul misceret. Non uerum nunc rura omnia, asperis & incultis locis, montibusque plerumque nascentem Satureiam, isdem oibus notis, ab imperitis etiam cognoscendam. Omnem hanc cognoscendam ex antiquis appellationibus plantarum difficultatem, non tam similitudo, eademque multarum uires & notae, quam in fecerendis diuersa appellatione similibus herbariorum negligenter fecerunt: eoque res perducta est, ut tres toto genere diuersas plantas, una appellatione monstrari aliquando audierimus.

De Serpillo.

CAP. XLIIII.

Σερπίλλο

Serpillum aliqui Zygin syluestrem, alij Polion uocant, Aegyptij Meruopyum, Latini Serpillum. Duorum generum est. Hortensium odore Sampsuchum imitatur, atque in coronas addi solet. Cui a serpendo nomen inditum est, quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In macerijs multo procerius assurgit. Syluestre Zygis appellatum non serpit, sed in altitudinem increscit, ramulos aedens tenues, furculosos, folijs refertos longioribus quam Rutae, & durioribus, angustis. Flores iucunde olent, gustati acres. Radicis nullus usus. Nascitur in petris satiuo efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit. Urinam potu ciet. Torminibus, ruptis, uulsis & incineris inflammationibus auxiliatur. Et aduersus serpentes potu illitum ue. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Maxime uero Phreniticis & Lethargicis conuenit, Cruentos uocant

mitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

B A R B A R I C O R O L L.

Serpillo radix multifida, sublimis, retorrida. Crescit in altitudinem quatuor ad unum adminiculo, aut sepibus appositum. Aqua ei modica satiffacit. Fimo, præcipue fumetorum gaudet. Sed & demissum in puteos, & circa piscinas, & stagna lætissimū provenit, obnoxium squalori. Translatum uehementer iuuatur, autumnō fere feritur. In montibus plerisque copiosissimū, ut Thraciæ. Seritur autem Sicyone. Athenis quoque, ex Hymeto deferentibus auulsos ex ijs ramos aquis. In montibus natum, Satureiæ odorem habet, uehementissimum illum quidem, sed gratum atque mollem. Satiuum non serpit Plinio, sed ad palmi altitudinem increfcit. Voluntariū, id est, syluestre, serpit in petris maxime: hoc & pinguis, & candidioribus folijs atque ramis: Dioscoridi contra serpit satiuum, non syluestre.

E X M. V E R G. C O M M.

Serpillum nouerunt, quæ urbes & agros incolunt gentes omnes. Pauci tamen syluestre a satiuo discernere didicerunt: tam paratū ubique satiuū est, humana opera a syluestri & horridiore illius aspectu, ad mitiorem & speciosiore habitū translaturum. Quo uno habitu, & ramulorum infirmitate, a syluestri differt. Fit enim in satiuo Serpillo, quod in urbanis & elegantioris uitæ hominibus, ut per se rigentibus ramis stare nequeat, sed horiorum delictijs, & nimia humoris copia uiceat quidem speciosius, infirmius tamen per terram serpat. Quæ fortuna in urbibus omnia fere sunt, quæ comparata agro sanitatis, uirium, patientiæ, aliorumque uitæ laborum, & munerū minus habere ubicunqueprehenduntur. Neque Serpillum a Græcis, & ex eo Serpillum a latinis dictum est, quod per terram simpliciter serpit, quæ satiuū nostra ætate fortuna est, sed quod, ut Theophrastus ait lib. 6. de plantarum historia, proprium quoddam est ramulorum Serpilli incrementum. Priuatim enim possunt in quantā uoluerit aliquis longitudinem trahi, adiecto illis pedamento aliquo: aut si prope sepes planteretur: aut ex altiore loco aliquo deorsum dimittatur. Sic enim in longū protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura, quod in longū Serpillum latini & græci olus hoc nominauerunt. Syluestris contra illius quod Zygidæ hic ait uocari, nulla est nominis eius inuenta nobis ratio. Nisi forte a trutina, quæ græci Zygon uocant, restitutineque eius ad restitudinem ramulorum in syluestri Serpillo translata ea uox sit. Aut quia ramulis his natiuo lentore ad uincendum, & uiciliū usum aptis, in re rustica forte uteretur antiquitas, Zygis hoc Serpillum dictum fuerit: & quod eo iugarentur uites, quod σύγιν græci aliquando dicunt, in eadem significatione, in qua ligare & uincire passim latini utuntur. Syluestris Serpilli huius, quod tacuit hic scriptor, duo genera numerauit Theophrastus. Alterum Thymbræam, quod Thymbrææ parem acrimoniam habet. Alterum quod odoratius & mollius sit. Hic autem nullā forte in medicina eorum diuersitatem sentiens, uicini generis syluestre Serpillum dixit, & ex præcipuo discrimine a satiuo discerni monuit. Multa alia Theophrastus etiam de Serpillo dixit, qualia sunt. Longissime & speciosissime frondere Satiuum, si in puteum descendere dimittatur, podio eius impositū, nec aliud quodpiam genus eius est: plantarumque Serpillum autumnō plerumque, plantari etiam uere: amare domos & hortos: gaudereque aquis & stercoreatione: præsertimque ex fumetorum fimo: & meliorescere sæpius translaturum.

De Sampfuco.

CAP. XLV.

Sampfuchum aliqui nominant Amaracum, alij Triphyllon, alij Agathides, alij Cnecon, alij Acapnon, Pythagoras Thramben, Aegyptij Sopho, Armenij Myurō, Magi Ichrei asinū, aut Hecigonon Isidis, Romani Maioranam. In Cypro & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius Calaminthæ, quæ tenui folio constat, Letophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius exalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illi ta ex melle arida folia, sugillata tollunt. Menses subditi in pefso tra-

A

Pli. li. 19. ca. 5.

B

σάμψυχον
ἀμαράκων

D I O S C O R I D I S

C hunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. Luxatis tumoribusq; carato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmaticisq; calfaciendi gratia commiscetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 21. ca
pit. 21.

S Ampsuchus in Syria & Aegypto dicitur, Amarantus uero & Amaracus a Siculis. Item a Theophrasto. Semen ei copiosum, odor molliter iucundus, Radix arida, tellure summa harenis, multifida. Floret æstate, non omnis, sed quam Phrygium cogitominant. Semine & auulsiōe prouenit. Transferti & plantæ solent.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine, cum de Sampsuchino & Amaracino unguentis ageretur, de Sampsucho & Amaraco ex Plinii historia, quæ satis ad eam rem tunc fore credidimus: distulimusq; in hunc locum, quæ alia tunc ex aliquot græcis scriptoribus omittenda alioquin non erant, nisi ea nunc repetenda fuissent. In quibus præfari illud inutile non fuit: Magni in plantarū historia referre, quos scriptores, & quibus temporibus scribentes aliquis sequatur: & quæ diuersis locis isdem, aut alijs nominibus appellantur, obseruasse. Nisi enim id fiat, gemitari aliquid & augeri in numerū continget, quæ unum sunt: & quod idem natura, aut paulo diuersum ubiq; fecit, aliud uideri: eaq; ratione confundi intellectu, & miseri rerum historia. Quod in Sampsucho hac fit: in qua si Galenum, hunc ipsum scriptorē in unguētis, & Paulum Aeginetam aliquis sequatur, aliud ab Amaraco uidebitur. Siquidem omnes seorsum de utraq; egerunt, aliasq; in medicina uires alterutri assignarunt: Amaracum calefacere in tertio, in secundo uero ordine siccare dicentes, Sampsuchum extenuādū, discutiendūq; uires habere: & in tertio ordine calefacere & siccare, & in unguētis a Dioscoride diuersa, multa in utroq; numerari, quæ tractata suis locis iam pridem a nobis fuerunt. Si Theophrastum, Plinium, poetascq; Latinos, Lucretiū, Maronemq; & Columellā, eandem Sampsucho Amaracū omnes intelligent. **D** nihilq; certius Plinii decretis in hac re est. Primū lib. 21. capite. 11. quo loco auctore Dioscoridē ait, quod Aegyptus & Syria Sampsuchum uocat, Siculos Amaracum appellare. Mox eodem uolumine iterū, sed capite. 22. Sampsuchum, siue Amaracum in Cypro laudatissimū & odoratissimū. Nec multo post. Fit ex eo oleū, quod Sampsuchinū, aut Amaracinum uocatur. Maro, quod pueri omnes nouerūt, super alta Cythera per Venerem auiam Ascanium transfulit, ubi mollis Amaracus illum. &c. Lucretius isdem. Aut Amaracini blandum Staetq; liquorum. Columella etiam in carmine suo Romanorum hortos excolens ait. Grataq; iam ueniant hilari Sampsucha Canopo, peregrina uoce Romanā Amaracum appellans. Et ne longiores simus, hic ipse etiā hoc capite, in Sicilia Amaracū uocari Sampsuchum dicit: nec esse inter Sampsuchum & Amaracū, nisi appellationis discrimen. Graues contra, græcorū medici illi, quos paulo ante nominauimus auctores, ad hanc rem sunt: nec nostrū est, ut in Buccolicis legitur, tantas componere lites. Non tacebimus tamen, uideri nobis aliam historiā, q̄ medicinæ rationē in multis esse: fieriq; posse, ut, quod idem & congener sit, non tam quia diuersis locis aliter atq; aliter nominetur, q̄ q̄ diuersis locis natū, diuersas uires habet, diuersum in medicina & historia censeat: duplexq; Sampsuchū, scilicet & Amaracū fecerint græcorū medici, quod unū idemq; genere est: quoniā non idem uiribus & natura diuersis locis proueniens esset, diuersisq; gentiū appellationibus, ad constituendas diuersas eorū uires, usi fuerint: non duas in natura plantas, sed in una diuersas nominibus illis uires intelligētes: duplexq; Sampsuchinū & Amaracinum unguentū hac ratione a Dioscoride in primo traditum fuisse: nunc autē in plantæ seorsum, ab unguētis historia & medicina, solum Sampsuchū tradidisse, & de Amaraco id solum testatum fuisse, a Cyzicenis & Siculis Amaracum Sampsuchū dici: quod & in Amaracino unguento etiā dixerat, in Cyzico probatissimū fieri: quoniā in ea gente, quod alibi Sampsuchū uocabatur, Amaracus nominat. Quod & Plinius fecit lib. 17. capite. 11. seorsum de Amaracino et Sampsuchino & ipse agens. Esseq; idem Dioscorid. Sampsuchum & Amaracū illud, in hoc capite præsertim indicat, qd hic ait, probatissimū in Cyzico & Cypro. De Sampsucho agebat, & nihil omīus in Cyzico, in qua Amaracinū probatissimū unguentū fiebat, nasci testat. Manifesto argumēto, eandē Sampsucho Amaracū, & Amaraco Sampsuchū esse: quodq; Plinius tot locis ait, nihil aliud indicat, q̄ in Aegypto & Syria Sampsuchū, in Asia deinde, tota Græcia, Sicilia, & ut in uicino sit in Italia Amaracum uocari. Nec si quis ueterū græcorū, latinorūq; historiā

& medicinam diligenter eruscabit, aliter iudicio nostro, de his colligere, ratiocinariq; poterit, præsertim nullam ex professo Amaracum docente Dioscoride, quod relinquendum in quoridiano usus planta, tamq; ob odoris suavitatem amabili, diligentissimo homini non fuerat. Cui a principio adiectæ in Sampsucho tam multæ appellationes, nullam habent nobis rationem, aut causam: nec nos ab eo commentarijs suis additas credimus, sed per tempora illi accreuisse; quodq; hic proposuerit, Sampsuchum tantum fuisse, tum in bonitatis censu Cyzicenum & Cyprum cæteris omnibus anteposuisse, mox ab eo Aegyptium laudasse, & a Cyzicenis & Siculis Amaracum uocari. Hæc enim in uetustissimo quem habemus latino Dioscoride tm legunt. Quo fit, ut miremur in hoc etiam Barbarum, qui a Cyzicenis & Siculis non Amaracum, sed Amaranthum uocari Sampsuchum dixerit: præsertim docente id tam multis locis Plinio.

De Sertula campana. CAP. XLVI.

SERTULA CAMPANA laudatissima in Attica, & Cyzico, & Carthagine nata. Cuius color uicinus est Croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolum, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus erupat, si ex passo cocta illinatur. Interdum autem addito oui luteo affato, aut fœnigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis Papaueris, intybo ue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, illita cum creta chia, uino, aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat. Doloribus auriu mitigadis cruda ex passo instillatur. In aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorē lenit.

BARBARI COROLL.

Melilotos, alij Sertulam campanam, Cato Sertam campanicam, quia folium eius coronamens sit dicatum, in Campania Italiæ cōmendatissima, ut nostri uolunt, odoratorq; & candida: deinde Attica in Sunio, mox Chalcidica, ubicurq; uero asperis & syluestribus nata, recens, nec candicans, & Croco q; simillima. Melilotos arida, diutius odorē continet: qui et Croco uicinus est, quemadmodum & flos. Ipsa cana, placet maxime, folijs breuissimis atq; pinguis finis. Inter aromata, quibus defrutum condiri solet. L. Columella Cripam pampinacam nominat. Deprauatum esse locum arbitror, & Sertam campanicam, non cripam pampinacam legendum. Nec ignoro & Crepitā, & Crepulam haberi herbas, sed quibus ad unguentum & aromata nihil sit opus.

EX M. VERG. COMM.

Campanā Sertulā Plinius & Celsus Romani sermonis candidi autores, Melilotum appellant. Cato nulla diminutione usus, Sertam Campanicā dixit, ab usu & natali solo tota appellatione hac illi facta. Nosq; his autoribus græco nomini, latinā uocē in titulo capitis addidimus. Nec ratiocinantes facile, quo referenda uox illa κροκίσων esset, quæ Croci aliquid habentem significat, ad colorem contraximus, qui nō nullibi q; in flore uideri potest. Virescūt em folia. Fecimusq; id autore Plinio, qui de ea lib. 21. ca. 9. agēs ait. Odor eius Croco uicinus est, & flos. Neq; em ad odorē referri & cōtrahi uox illa in hoc scriptore poterat. Sequebatur em statim ὑωδνσ quod odoratum significat. Nisi forte κροκίσων κθ, ὑωδνσ eodem pertinet: dixeritq; hic bis quod ad odorem pertinebat: quod tamen parū uerisimile est. Quod erat etiam ὑν κερυνδόν, quæ uox Carthaginem significat, ad Calcedonem detorsimus: qm in græcis aliquot & latinis omnibus sic legitur. Nisi forte neutrum eorum legendum eo loco sit, sed in Chalcide. Siquidem Plinius ibidem ait. Est enim in Campania Italiæ laudatissima: græcis in Sunio: mox Chalcidica, & Cretica. Et hæc pro Sertula Campana notissima nunc etiam omnibus planta, satis hæcenus dicta sint.

De Maro. CAP. XLVII.

MA R V M aliqui Origanida, aut Hysobrion uocant. Hæc ba cognita uulgo, surculosa, flore Origani, folijs multo candidioribus.

A

μυλίσων

B

Pli. li. 21. ca. 11.
& 22.

μύρον ὑσώβριον

F

C dioribus, flore odoratiore. Vim habet Sisymbrio consimilem. Substringit enim, & modice calfacit. Qua de causa illitu, serpentia ulcera sistit. Et in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Tralles copiosissima gignitur.

Pli. li. 12. ca. 24.

B A R B A R I C O R O L L.
DE Maro Plinius inter odoramenta sic loquitur. In Aegypto inquit nascitur Marum, peius q̄ Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, odorata. Lydium Marum Plinio fortasse fuerit, quod Dioscoridi Magnesium: cum sit Magnesia Lydia ciuitas penes Sipylum, cui uicina Caria est, in qua Tralles, ubi Marum quoq̄ nascitur. Est & Magnesia penes Maxandrum, et Tralles in Caria: nō tamen ut Lydium propterea decernam idem esse quod Carium, gentis suae, ut Plinius ait, appellatum nomine, culinifq̄ principale, ut in Cario demonstrabitur. Habent & Arabes suum Marum, siue Maru, sed penitus diuerfum, & magnis ambagibus impeditum: inter quas illam sit satis indicasse, q̄ species eius sunt Mellisophyllon, Manubium, & Buglossa: quo nihil dici poterat ineptius.

E X M. V E R G. C O M M.
Semel tantum Mari (modo illud huic idem sit) Plinius meminit. 12. uolumine cap. 24. tantaq̄ breuitate, ut quale id sibi fuerit, non facile intelligatur. Nihil enim ultra tradidit, q̄ nasci in Aegypto Maron peius q̄ Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, ac odorata. Nihil enim de Maro in censu medicae materiae Paulus Aegineta docuit. Et qui nobis sunt graecus & latinus uetustissimi Diosc. codices, nullum hoc loco, neq̄ alibi Maron ostendunt. Ex eo nihil in peregrina planta, & ad Meandrum in Lydia nascente, praeter pauciora illa ex Plinio accepta, dici a nobis potuerunt. Non tacebimus tamen, uideri nobis in eius historia non satis inter se conuenire, scriptorem hunc nostrum, & Plinium. Hic herbam omnibus notam, surculosam, flore Origani: ideoq̄ Origanida, quasi minorem Origanum dictam, cadioribus Origano folijs, & multo odoratiore flore describit: inter nostrates praeterea, & si ad Magnesiam & Tralles nasci dicat, nostriq̄ orbis odoratas alias numerat herbas Melilotum, Acinon, & Bacharem. Ex quo credendum, similem, & natura congenerem illis esse. Plinius contra: suum Maron inter peregrinos odoratos frutices numerat Ligustrum, & Aspalathum: & ab historia Aspalathi statim in Aegypto nasci Maron dicit: non absurda penitus suspitione, si qs dubitet, nō esse Plinij & Diosc. idem Maron. Nobis ob eas quas diximus causas, inclinat animus, diuersa esse. Acceditq̄ opinioni nostrae, q̄ Plinius in Aegypto nasci Maron tradit: licetq̄ peius Lydio, in quo poterit Magnesium hoc, & Trallianum forte intelligi: qm̄ ad Meandrum in Lydia utraq̄ ciuitas illa fuit: hic tñ Aegypti non meminit, quod relinquendum in censu bonitatis non erat: sed simpliciter ad Magnesium & Tralles nasci dixit. Plinius praeterea folia Lydij Mari, hic flores odoratos esse dixit. Sed quod ratiocinari in tota hac re & animaduertere aliquem oporteat, historia utriusq̄ scriptoris est: quorum alter inter herbas Maron numerat, & Origano comparat: alter fruticibus coniungit, nec aliter q̄ de frutice omnia tradit.

EXIVVS EXVVS

De Ocimaestro. CAP. XLVIII.
A C I N O S, aut Aconos a Graecis dicitur, ab alijs syluestre Basilicum. Latinis Ocimastrum, tenui siccq̄ ramulo herba, Ocymo similis, odorata, sed hirsutior. Qua coronae factitantur. A nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos, ignemq̄ sacrum sanat.

Pli. li. 21. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.
Differt Acinos ab Aconō: q̄ Acinos Ocimastrū est, siue Ocimi syluestris genus: Aconos spinosa, breuis & lata herba, Eryngio a quibusdam contributa, spinis latioribus. Acinos familiaris Aegypto herba, coronarum & ciborum gratia obseritur: sponte uero nascitur aequinoctio. Hanc et Acinon, & Acinean Plinius appellat, & Epipetron, nuncq̄ florentem. Aequinoctio inquit nascuntur Aphace, Achine, quam Epipetron uocant. Ut nesciam tamen, legendū ita sit, an illo modo potius, Aequinoctio nascuntur Aphace, Acinos, & quam Apipetron uocant, quae nuncq̄ floret. Ut duo gñā faciamus, Acinon, et Epipetron. Alioquin Theophrastus, unde Plin. ca mutatus est, Epimetron q̄ de (ita em̄ ipse nominat) nuncq̄ florere scribit. De Acino.

mentionem nullam habet. Hippocrates Epipetron ad tumores & inflammationes commendat, illi tu folijs eius decoctis & impositis. Hanc ipsam proprietatem, Acino Dioscorides adscripsit: ut coniectari liceat, Plinij uerba quæ prætexui, legenda esse in hunc modum, Aequinoctio nascuntur Aphace & Acinos, quam Epipetron uocant. Mirum grauissimos autores Plinium, & Dioscoridem in huius herbarum medicinis contraria præcipere, alterum cieri ea posse menses & urinas, altero contineri. Nec illud mihi abierit indicium, primo & uigesimo libro, priore mentione (bis enim loquitur ibi Plinius de Acino) in uetustis aliquot codicibus, non Acinon, siue Acinonem, sed Chenopus legi, quo nomine anserino pedi similis herba significatur. Sed corruptum locum suspicor, etiam si Chenopus quoque celebratur herba.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod hætenus legerim, nulla Theophrasto in plantis suis Acinos est. Plinius pluribus locis Acini meminit: sed ut modo Acinon, modo mutatis aliquibus literis Acinonem, si brarij magis scripserint quæ ipse: nihilque certius his quæ ab hoc scriptore accepta lib. 21. cap. 27. his uerbis tradidit. Acinon & coronarum causa, & ciborum Aegyptij setunt. Eademque erat quæ Ocimum, nisi hirsutior ramis & folijs esset, & admodum odorata. Quod solū non est illi cum hoc scriptore idem, menses & urinae sunt: quos hic sistere, Plinius cieri Acinum testatur. Dioscoridi tamen subscribit Paulus Aegineta in .6. mediocres adstringendi uires habere Acinon, dicens, ideoque potius menses & aluum sistere. Nunquam florere Acinon, idem Plinius eodem uolumine, sed cap. 15. ait. Qua floris priuatione & nota, non male forsitan suspicetur aliquis, quæ Theophrastus. s. de plantarum historia uolumine Epimeton uocat, hisque uerbis tradit, *ἡνία δὲ καὶ ἑπὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ τῷ ἵππῳ*, quod est, Quædam etiam omnino non florent, ut Epimeton, Acino huic eandem esse, & quam Plinius eodem loco Epipetron dicit: ut in alterutro uerbi literæ tantum uitium sit. Plinij uerba sunt. Et aequinoctio nascens Aphace, Acinos, quam Epipetron uocant, quæ nunquam floret. Seri in hortis Acinon a quibusdam hic ait, Aegyptios intelligens: qui ad coronas & cibos ea passim uterentur. Ocimo notissimo cunctis oleri similis Acinos est: ob eamque similitudinem a posterioribus addita huic scriptori uox illa est. A quibusdam syluestre Basilicum dici Acinon: quoniam quod græcis & latinis Ocimum fuit, nobis ex multo tempore Basilicum in quotidiano sermonis usu est. Non multi tamen facienda uox ea est.

De Bacchare. C A P. XLIX.

BACCHARIS hæra fruticosa, quæ in coronas addit. Cuius folia aspera sunt, media Violæ & Verbasci magnitudine. Caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, adnatis appendicibus aliquantulum asperis, flore purpureo subalbicante, odorato. Radicibus Veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamomo proximus. Asperum, squallidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsi, præcipitatis, spirandi difficultati salutaris. Item diuturnæ tussi, & urinae difficili. Menses pellit. Contra serpentium morsus utilissime datur in uino. Recens radix apposita, partum extrahit. Puerperis eius decoctum in deflectionibus prodest. In diapasmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt. Oculorum inflammationibus, mammis tumentibus a partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxilianter. Odor somnū gignit.

B A R B A R I C O R O L L.

Baccharis, quæ & Baccar dicitur, qua fascinum depellitur, radicis dumtaxat florisque odorati est: a quibusdam uocata Nardum Rusticum falso, cum Nardus Rustica sit Asarū. Oleum, & unguenta ex ea radice fieri solita, Hippocrates, & Cephisiodorus, & Aristophanes poetæ testes sunt. Vnde quidam errore ducti, Barbaricam eam uocabant. Addit Cephisiodorus, & pedes eo lini consueuisse, ut Aegyptio manus, Sisymbino brachium, malas & papillas Palmeo, Amaracino comam & cilia, Serpillino ceruicem & genua: quod & in comædia cecinit Antiphanes. Baccharis inquit Galenus, Hippocrati unguentū quoddam Lydium significat, Similli

F ij

C mūm Bacchari Combretum, sed pcerius, & foliorū exilitate usq; in fila extenuatum. Baccharē Plinius Asarū, Dioscorides a nostris appellari uolūt Perpensam, Aretij, & in Illyrico nascē rem, cōmendatissimam ad calculos: si modo eadem est cum Perpressa: utroq; em̄ mō legitur, & alterutram lectionē deprauatā esse duco. Sunt exemplaria, in quibus nec Perpensā, nec Perpressā, sed spersā, siue sparsā scriptum sit. Nō defuere, qui Baccharē genus esse floris existimaret: quem mō Caryophyllon uocamus, sed syluestris: nunc altiles ij spectantur, ab odore ita cognominati, tāta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut Rosę pares, non inferiores uideri possint, cū eaq; de principatu certent: quando nec colore superantur purpureo, uermiculato, candido: nec odore, nisi q; a longinquo plus olet recens Rosā. Iam nihil Rosā fugaciū. Iōgissima namq; decerpis mora dies. Caryophyllo in triduū, & amplius uita, uigorq; durat. Aliqbus tanta magnitudo, Patauinarum p̄cipue matronarum cura, ut orbem utraq; manu completi fere nequeas. Folia quaterna, quinaq; nonnullis Rosę mō numerosa, mirabili quorundā alabaastro cultū ratione: q; dehiscens, ipso staminum loco alabastrum ostendit alium, pandentem se paulo post in florem, caliculo priore consenscente. Scio putare aliquos Caryophyllon ueteribus fuisse Caltham. Sed cum Virgilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctam, nec Plinius a Virgilio dissentiat, nondum uideo qui possit ita statui. A Caltha porro Calthulæ uestis genus dicitur, ut a Croci similitudine Crocotula. Quæ sit autem Barbarica, cuius mentionem supra modo fecimus, non constat. Nam Sylua barbarica, idest, Confeminea omnino aliud est: quippe quæ ager sit glandibus, & quæ sunt ijs similia, manu consitus. Nam & uineæ Confeminales dicuntur, in quibus diuersa uitium genera conseruerint, autor Columella. Nam sylua Ciminia, cuius omnes fere mētionē habēt, Strabo, Plinius, poeta Virgilius, & Silius, in Ethruria monfiratur inter coloniam Tusellanam, & Viterbium, & ubi nunc uici lacus dicitur. In ea sylua loca sunt, in quibus depacta in terram non extrahuntur. Fuisse quidem inter Romanum Sabinūq; agrum quæ Sylua diceretur, scio autore Stephano. De Sylua quoq; populi Romani propria, seu hæc, seu alia Cicero in actionibus suis contra Rullum Tr. Pl. meminit.

EX M. VERG. COMM.

Diximus primo uolumine cum de Asaro ageremus, multa quæ ad Baccharē pertinerēt. Illudq; p̄cipue tunc legentes monuimus, non illic, sed hoc loco priuatim de ea nobis agendum fore: quod reddere modo nos decet: & si non adco multum sit quod in notissima omnibus planta repeti ex antiquis possit, aut debeat. Satis eam descripsit Plinius libro. xi. capite. 6. satis & rura omnia uolentibus eam ostendunt. Nosq; utriusq; Plinij scilicet, & ruris auxilio, qd erat in scriptore hoc, amare Baccharē aspera loca, & *ὑνικμα*, idest, uliginosa & humentia, in cōtrarium habitum detorsimus: diximusq; rati antiquam fuisse lectionem, *ὑνικμα*, nec humida: propter ea, q; Plinius ait, Gracili, nec humido solo provenit: & in quibus ea nascitur locis, *αἰσ* & humore omni p̄cipueq; carent.

De Ruta. CAP. L.

ῥιζανον

Ruta duplex, Montana, quam aliqui Rhyten montanā uocāt: & hortenſis, quā Aegyptij Epnubū, Syri Armala, alij Befala. Aphri Churma. Mōtana syluestrisq; acrior est, & in cibis damnata. Satiua uero quæ sub arbore Ficus enascitur, magis in cibos admittit. Vtraq; urit, calfacit, exulcerat. Vrinā ciet. Mēstrua pellit. Aluū sistit potu, ciboue. Letaliū medicamentorū antidotū est, si semen ex uino acetabuli mensura ebibatur. Folia per se p̄sumpta, aut cū nuce iuglāde, aridifq; ficis, inefficaces uenenorū uires reddūt. Cōtra serpētes simili mō sumere cōuenit. Geniturā cibo, potuue extinguit. Cū Anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterūq; dolores, difficultatē spirādi, tusses, pulmonis inflāmationē, coxendicū articulorūq; cruciatus, & rigores febriū circūitu repetentes, pota ut antedictū est. Item ad inflatōnes colī, uulua, rectiq; intestini, decocta & imposita. Feminas uulua strangulatu liberat, si a genitali sedetenus cum melle subijciatur.

A Feruefacta ex oleo & pota, uētris tineas excutit. Articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxilia-
tur, decocta in uino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda, conditaq; ci-
bo, uisus aciem excitat. Dolores oculorum cum polenta lenit. Dolori-
bus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxiliatur. Profluentem naribus
sanguinem sistit, trita et indita. Testium inflammationibus cum laureis
folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cærato pro-
dest. Cum pipere autem & nitro affricta, albæ uutiligini medetur. Cū
eisdem illita fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem repre-
sentant. Contra impetigines cum alumine & melle utilissime imponi-
tur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter in-
funditur. Hebetudinem oculi qui sensere, Ruta cum Fœniculi succo
ac melle peruncti iuuantur. Ignem sacrū, ulcera quæ serpunt, aut in ca-
pite manant, cum aceto rosaceo & cerusa persanat. Mansa Alliorū, Ce-
parumq; acrimoniā domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum
florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, et rubore quodam
inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. Oportet itaq; eam un-
ctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pul-
B lis insparsum feles arcere. Adhiciunt eam quæ in Macedonia circa Olci-
mū amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus aut is locus, ui-
peris scatet. Semen eius potū cōtra intestina uitia efficax est. In antido-
ta cōmode additur. Contra incontinentiam urinæ, tostū semen septe-
nis diebus potui datur. Radix huius montanum Moly uocatur. Sylue-
stris Ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum dor-
loribus. Menstrua mouet. Partus enecat. Acrior est uiribus q̄ hortens-
is & ualidior. Syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

BARBARI COROLL.

Rutam, ut alia quoq; olera, quæ diu uiuunt, unitas caudicis, & p̄grandes ramī, quos Acre-
monas, & Cremonas quandoq; Græci uocant, arborem uideri faciunt. Latiora satiuæ folia,
Rami fruticosiores. Cicuta Rutæ aduersa, probabili argumento: quoniam colligentes Rutam,
manus Cicutæ succo muniūt sculptores, pictoresq;. Ruta in cibo utuntur, ppter uisum. Mustel-
la cum serpente dimicatura, in murium uenatu, Rutam prius edit, Pythagoras marem minori-
bus & latioribus folijs, & coloris herbacei, discreuit a fœmina & odore. Humore, simū, hyemæ
Ruta odit: apricis gaudet & siccanis, terra q̄ maxime lateritia, & cinere: qui & miscetur semen
ti, ut careat erucis, Mustū Rutarum populo Romano dari solitum, non ignotum est.

Pli. li. 20. cā. 15.

De Syluestri Ruta. CAP. LI.

Rutam syluestrem aliqui appellant Hypericō, alij Androsēmō,
alij Coron, alij Chamæpityn, Romani Hederalem, aut Cento-
nalē, Aphri Churma semmaced. Odor seminis resinofus est. Ideo Cha-
mæpitys aliquibus nominatur. Frutex est furculosus, rubescens. Folia
Rutæ figura, flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant. Un-
de Androsæmon uocitarūt. Ramuli subhirsuti. Siliquæ teretes hordei
effigie, in quibus semen nigrū resinā olens. Gignitur in cultis & aspe-
F iiij

πύρον ὑγρίον

D I O S C O R I D I S

Cris. Vrinam ciet. Menses appositu trahit. Pota cum uino, quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitu medentur. Et diebus quadraginta epota ischiadicos sanant. Vocant etiamnum hoc modo syluestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima Moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos. Folijs multo ^{q̃} alterius Rutae longioribus, tenerioribusq̃, odore graui, flore candido, capitulis in cacumine paulo maioribus ^{q̃} satiuæ Rutae, quæ tribus maxime partibus constant. In quibus triangulum semen, subruffum, gustu amarum recluditur. Cuius est usus. Semen autumnino maturefcit. Quod cum melle, uino, croco & sceniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Armalam uocet, Syri Befassan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quandã cum Moly seruet similitudinem. Radice nigra, flore candido. In collibus & lato solo prouenit.

BARBARI COROLL.
Rutæ syluestris proprium genus est. Montana hæc, & uulgaris. Sed & Hipericon nonnulli ad Rutam syluestrem referunt: de quo inferius.
Ruta Galatica hæc est, quam Plinius intelligit præcipuam in antidotis.

De Moly. CAP. LII.
DMoly aliqui syluestre Leucoion appellant. Folia habet graminis, latiora, humi sparsa, florem albæ uiolæ similem, sed minorem, lactei coloris. Caulem candidum, quaternum cubitorum. In cuius cacumine inest aliquid quod Allij speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum ualet ad aperiendas uuluas, si trita cum irino unguento in pefso subijciatur.

BARBARI COROLL.
Pli. li. 29. ca. 4.
Moly Homericum, Phineo & Cyllene Arcadiæ uernaculum, radice nigra, Cephæ magnitudine, rotunda, folio Scyllæ. Negat Theophrastus uerum esse quod Homerus cecinit, difficulter effodi: affirmat Plinius. Hanc uates ille a Dijs uocari putat Moly, Mercurium inuentorem fuisse, Vlixiq̃ contra Circes ueneficia monstratam. Ouidius. 14. Metamorph. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentum. Aliqui florem eius non candidum, ut Homerus, sed luteum pinxere. Plinius in Campania effossam, ægre inter difficultates faxeas & allatam sibi meminit, radice triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ. Tale uerum est Moly. Dicitur & Moly Ruta Galatiæ, de qua diximus: quod solum ætate nostra medici nouere, Harmelam uocantes: quemadmodum & Dioscorides & Galenus a Syris dici eam testantur. Differt ab hac Molon, quam & Syron dici tradit Plinius, etiam si Oestron, non Syron in exemplaribus quibusdã legit, scapo striato, folijs paruis, mollibus, radice quatuor digitorum, in qua extrema Allij caput est: anhelantibus, & stomacho pdesse credita.

EX M. VERG. COMM.
QUOD in græcis & latinis poetis passim auditur, & celebratur Moly, Homericum, illud est, quod contra Circes ueneficia Vlyx Mercurius armauit: & in quo describendo poeta ille pluries decima Odissæ Rhapsodia cecinit uersus. ὅς κ' ἐρα φωνήσας πῶρι φάρμακον ἀργυρόντα, ἐν γαίῃ ἱρύσας, καὶ μοι φέρειν αὐτοῦ ἰδύσιν. εἴθε μὲν μάλα ἴσκι γάλακτι δὲ ἱκίλον ἄνθος, μάλα δὲ μιν καλῶσιν οἱ θεοὶ, καλεπὸν δὲ τ' ὀρέσων. ἀνδράσι γινώσκουσιν θεοὶ δὲ τι πάντα δύνανται. Quodq̃ Naso in Transformationibus suis dixit. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentum. Et quod in Priapeis carminibus audit. Hinc legitur radix de qua flos lacteus exiit, Quam cur Moly uocant: mentula Moly fuit. Omnia nullam habent, nisi ex Homericis illis

figmēto causam & rationē. Quam tamē graues græcorū & latinorū scriptores, honorem huic principi omnium poëtarum, ut nos credimus, habentes, tanti fecerint, ut Theophrastus libro nono de plantarum historia Moly describens, Homero, præterquam in radice, subscripserit: testatus in Phæneo & Cyllene Arcadiæ nasci, quale Homerus cecinit, radice rotunda, ceposæque, folio Scyllæ: usumq; eius contra ueneficia & excantationes esse: non tamen difficulter, ut Homerus dixerat, ex terra effodi. Et post Theophrastum Plinius libro uigesimo quinto capite quarto, omnia a Theophrasto dicta Romanos docens, hæc amplius tradiderit, nigro colore radicem eius esse: nec candido flore, sed luteo ab aliquibus græcis describi: nasciq; in Italia, & ab herbarum peritis medicis sua ætate allatum sibi ex Campania, inter difficultates saxeas natum, radicis triginta pedum: quæ nec tota effossa esset, sed abrupta. Ex his tam multis, tantæq; auctoritatis ad hanc rem testibus, ratiocinari, colligereq; necesse est, proprium habere genus inter herbas Moly: nomineq; hoc non sylvestrem Rutam, sed sui generis herbam communiter indicari: in Galatia tamen & Asia priuatim sylvestrem Rutam eo appellari. Quod manifestè in sexto Paulus Aegineta indicat, de eo his uerbis agens. Moly, quod agrestem Rutam aliqui. &c. Et præter Paulum in græcis & latinis omnes fere alij in agresti Ruta hoc nomine utentes, non aliam ob causam, q̃ in Cappadociæ & Asiæ Galatia sylvestris Ruta, ut hic paulo ante testatus est, eo indicabatur. Neq; ætate hac nostra Moly aliud, q̃ sylvestrem Rutam significat: eam scilicet quā Plinius in Galatia nascentem, in antidotis præcipue laudauit, Galatiam appellans. Dioscorides tamen aliud a Ruta Moly esse intelligens, cum de agresti Ruta testatus esset Moly a quibusdam uocari: de eo quod priuatim Moly ab Homero & Theophrasto dicit, egit, ex proprijs notis eum legentibus ostendens. Vidimus nos undiq; scriptoris huius historiae, præterq; in flore, respondentem plantam: quem luteo, non candido, & ut hic ait lacteo colore ostendebat: ex quo non penitus uanum opinati sumus quod a Plinio dicitur, tradidisse quosdam luteo flore Moly esse. Verumtamen contra Homerum & Theophrastum temere quispiam aliquid dixerit: neq; ego id ausim: cum similitudo naturæ in huiusmodi late pateat, & ea multiplici uarietate solita sit suos diuersis locis flores effingere. Non relinquendum illud etiam, q̃ parum uerisimile est, proferre Moly hoc caulem altitudine cubitorum quatuor: suspicamurq; nos in cubitorum numero uictum esse: neq; enim herbæ, fruticisue, quale Moly nunc ostenditur, sed arboris legitima altitudo ea est.

[De Panacæ.

CAP. LIII.

PAnax nonnullis Heracleum dicitur. Ex quo Opopanax colligi solet. Plurima ex parte in Beöria, & in Phocide Arcadiæ nascitur. Ibiq; compendij causa studiosè colitur. Folijs est asperis, in terraiacentibus, hærbacei coloris, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis. Caule, ut Ferulæ altissimo, qui lanugine quadam incanescit. Folijs etiam minutionibus obsitus. Muscarijs ceu Anethi incacumine. Flore luteo, & semine odorato, feruenteq;. Radices habet multas ab origine una candidas, graue olentes, crassi corticis & amari. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus albæ, rigidæ, & siccæ, ingustabiles, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex mediâ Ferula cibo idoneus est. Sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, q̃ amarissimus, interne albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, læuis, pinguis, friabilis, statim in aqua eliquefcens, græ

F iiiij

D I O S C O R I D I S

Cui odore. Niger improbatur ac mollis. Adulteratur Ammoniaco, aut Cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat. Febriū rigoribus, uulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsa, aut uino bibitur. Menses trahit. Fœtum enecat. Inflationes quæ uulua male habent, duriciasq; ex melle impositus discutit. Ischiadicis illinitur. Acopis, & capitis medicaminibus ammiscetur. Carbunculos rumpit. Podagricis cum uua passa illitus, subuenit. Dolor dentium liberat, cauis inditus. Oculorum aciem excitat. Ex eo & Pisce optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Ramenta radices uulua admota, partus extrahunt. Ad uetera ulcera efficax est. Nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum Absinthio sumptum, menses pellit. Cum Aristo- lochia prodest aduersus animalia, quæ uenenum ei aculantur. Contra uulua strangulatus in uino bibitur.

Plin. lib. 25. ca-
pit. 4. & 12.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces generibus continetur pluribus. Syriū nascitur unguētis: quod & in Psophide Arcadia, circaq; Erymanthi fontes gignitur. Ferula sui generis quinque cubitorum, folijs quaternis, mox senis, humi stratis, ampla magnitudine, rotundis in cacumen, oleagineis. Radix autumnino, caulis mellibus inciditur. Precium succo, in libras bini asses, erant candido. Laudatur enim in primis candor eius coacti: sequens pallido statera. Niger colos, & mollicia improbat: id quod ex Macedonia affertur, Bucolicon uocant: quoniam armentarij succum excipiant eum pentē sponte. Hoc celerrime euanesceit. Secundū genus Asclepion. Tertium Heracion. Quartum Chironion. Quintū Centaurion, & Pharnaceon. Theophrastus primū genus Heracion uocauit, folio magno & lato, undiq; sesquipedem. Radice digitum crassa, bifida, trifidaq; sub fassa, odore turis. Idem auctor & Panaceam noīat, circa Clitorium nascentem in Arcadia. Nec constat, an hæc idem sit habenda, quod Panaces Arcadicū, de quo per huius capitis initia disserui. Panaces ipso nomine morborum omnium remedia promittit: ob id & medicamento ad uina quæ corrumpi nolunt, Panaceæ nomen dedere scriptores Græci. Radice huius euulsa, religio erat, impleri scrobem eius uario frugum placentarumq; genere: in mercedem uidelicet & piamentum terræ. Panaces, & Panax, Galeno teste dici solita.

E X M. V E R G. C O M M.

Libet in Herculeo Panace hoc, & alijs quæ statim sequuntur, Asclepio scilicet, & Chironio, ut in bonorū uirorū arbitrijs quotidie sit, tertium aliquē dari mihi uelim, qui diuersa, contrariāq; de omni Panace sentientibus duobus maximis auctoribus, scriptore hoc, & Theophrasto, alteri accedens, non leuē dirimeret litem, & certiore aliqua nota, ex tam multis unū saltem Panaces nobis ostenderet. Turpiter em, nec sine graui iactura ignoratur, quod solo audito nomine, malorū omnium medicinā, & remedia homini pollicetur. Liceret ad hanc rem Plinio uti: sed alienæ potius historiæ interpret, q̄ suæ assertor ille est: miscensq; duorū sæpenumero simul scriptorum dicta, difficiliora omnia, & minus certa legentibus facit: nunc peregrinā Italiæ plantam, & unguētis utilem in Syria nascentem, nunc in hortis nostris consistam, & in uitæ quotidiano usu receptā: nunc ex tam multis eius generibus unum tantū docens, modo multa & plura q̄ hic & Theophrastus numerās. Quo fit, ut in tanti nominis apud ueteres planta, nostra uero ætate non satis nota, difficiliora omnia futura sint.

De Panace Asclepij.

C A P. LIIII.

πᾶν

Panax Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus q̄ sceniculi folijs, hirsutioribus, odoratis, aureo flore, acri, odorato, ex muscarijs dependente. Radix parua est & tenuis.

Auxiliarem uim habent flores & semina, contra ulcera, phagedanas & tubercula, si trita cum melle imponantur. Aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui Panaces syluestre Origanum uocant, alij Cunilam: de qua in Origani mentione diximus.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces Asclepiion, dictum aiunt, quoniam is filiam Panaciam uocauerit. Huius radicem Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit: quod quidem priori generi a Dioscoride tribuitur. Est & Heracleion appellatum, Herculi ascriptum inuentori, quod ab alijs Origanum Heracleoticum syluestre accipitur. Quidam Heracleion intelligunt genus id, quod mentione proxima descripsimus.

B A R B A R I C O R O L L.

Quæ hic Asclepium Panaces, folia Feniculo similia habere dixit Theophrastus li. 9. de plantarum historia, Thapsia nulla diuersitate comparauit. Sigdem Thapsia Feniculi folio est: ut hic in eius historia non multo post dicit. Idem radicem Panacis huius crassam, & candidam esse dixit. Verba eius sunt. τὸ δὲ ἀσκληπιον πῶς ῥίζαν μῆκος ἔχει ὡς ἀσθάμνην, λευκὴν δὲ καὶ παχύν σφῶδρα. Eiusque nos accedente testimonio probauimus, quod in uetustissimo & oim. probatissimo mihi codice legebat, ῥίζα δὲ μικρὰ λευκὴ, quod est, breuis & candida. Multus, & paulominus quæ ubique in impresso codice hic error est: ut λεπὴν, & λευκόν, quorum alterum tenue, alterum candidum significat, intus cem commutent. Quæque alij tenuerunt, nos Theophrasti et melioris codicis fide adiuti, candidam diximus. Non posse autem tenue legi, idem Theophrastus indicat, dicens, σφῶδρα παχύν. i. ualde crassam esse. Superest, ut de longitudine eius etiam aliquid dicamus. Theophrastus ἀσθαμνίαν, i. do drantalem dicit: hic μικρὰν, i. paruam, & si in melioribus grecis μακρὰν, i. longam legatur.

De Panace Chironio. CAP. LV.

Panaces Chironium, in Pelio monte maxime prouenit. Folium eius Amaraco simile. Flos aureus. Radix parua, quæ non alte demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit. Illita coma eadem præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces Chironion, & hoc ab inuictore. Folium Rumicis Theophrastus & Plinius ei reddunt, maius tamen & hirsutius, radice parua. Nascitur locis pinguibus: cuius flos efficacissimus, eoque amplius quæ supradicta prodest. Est & genus aliud Panacis ab eodem Chirone inuentum, & Centaurion cognominatum. Sed & Pharnaceon in controuersia inuentionis a Rege Pharnace deductum. Seritur hoc longioribus quæ cætera folijs, & ferratis. Radix odorata, in umbra siccat, & gratia uino adhæret. Huius duo genera fecere, alterum leuioris folij, alterum tenuioris.

E X M. V E R G. C O M M.

Discrepant toto genere in historia foliorum Chironij Panacis Theophrastus, & hic scriptor. Ille enim Lapathum, quæ latinis Rumex est, eam comparauit. ἔχει δὲ τὸ μὲν χειρῶν ὅσων ἔχει ὁμοίον λαπάθῳ, μῆλόν δὲ καὶ λαγύρεον. Quibus uerbis, nisi uitiosa sint, certius aliquid audiri non potest. Hic, ὅσων δὲ ἔχει ἀμαράκῳ ὅμοια, quæ id indicant, quod nos paulo ante diximus, folio Amaraci est: quod in tam grauib. antiquisque scriptoribus merito aliquis demeret: multoque magis, quod uterque habet antiquos alios scriptores idem in commentarijs suis testatos. Hic scriptor Nicandrum in Theriacis suis, qui de Chironio Panace hoc agens, ait, πρῶτον μὲν χείρωνος ἰαλθία ῥίζαν ἔλθῃ, κενταύρων κρονία δὲ φερώνμων ἢν ποτιχέων, πάλιν ἢν νηότοι κίχον ἰφράσας αὐτοῖς, τῆς μὲν ἀμαράκῳα χυτὴ περιδιδρομαὶ χεῖτη ἄνθια. &c. Quorum is est sensus, qui non multo ante in Herculeo Panace dictus a nobis fuit, idque amplius. Quod Amaraco similis fusa circūuoluitur coma. ἀμαράκῳα enim ille Amaraco similem dixit. Ille Plinium, qui lib. 25. capite. 4. de Chironio Panace ait, folium eius Lapathum simile, maius tamen, & hirsutius. Quæ licet in eisdem uerbis ex Theophrasto reddita ab eo fuerint, nec maior ob id fides huic historiæ accedat, antiquam saltem Theophrasti eam fuisse lectionem testantur. Graues utrinque scriptores stant, nec leui auctoritate utrinque pugnatur: & in re non satis nostra ætate certa, difficillimum est censere aliquid: inuenisseque, quomodo Rumicis & Amaraci folijs, quorum grandius alterum, alterum breuius est, comparari eodem tempore folium aliquod possit. Nisi forte dixerit aliquis, in altero figuram, in altero quantitatem in comparatione æstimari. Verum in tanto discrimine parum uerisimile id

C est. Solent em̄ cognomines plantæ, quales hæ sunt, maiore sui parte inuicē sibi similes esse. Idq̄ in Origanis, Veslicarijs, utroq̄ Elleboro, alijsq̄ huiuscemodi manifeste deprehenditur. Neq̄ ego is sum, qui facile persuadeat. Si Herculeum Panaces, qd̄ hic ait folia habere *πρὸς τὰ τῶν οὐκ*, quod est, ad ficulnei folij figurā, multoq̄ magis magnitudinē: & Theophrastus *πολλὸν ἔχει μίαν καὶ πλατὺ καὶ τριπλάσιον παντὰς*, quod est, habere Herculeum Panaces folium grande, latum, & in omnes partes trinis dodraūbus, Chironium hoc ob similitudinem Panaces, iidem appellatū folio Amaraci esse. Inclinat ob eam causam animus in Theophrastum, qui Rumi cis folio Chironij huius Panacis folia comparauerit, quæ grandia Panacum omniū folijs magis congruent. Quodq̄ a Nicandro & scriptore hoc de Amaraco dicitur, odoris, coloris, aut figuræ tantū rationem habere. Legentibus tamen & herbarum peritiōribus liberum & arbitrium hoc, quemadmodum & multa alia, relinquitur.

¶ De Ligustico.

CAP. LVI.

Λιγυστικόν

Ligusticum, quod alij Panaciam, alij Panaces uocāt, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino. Vnde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant. Quoniam & radice & caule Heracleotico Panaci simile sit, & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisq̄ montibus, ac umbrosis, maxime iuxta riuos. Cauliculum fert Anethi, geniculatum, tenuem, & in circumitū folia Sertulæ campanæ molliora, odorata, prope uerticem graciliora, & longe magis diuisa. In cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, durum, & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre & Aroma olens. Radix candida, Heracleotici Panacis similis, odorata. Radicis seminisq̄ uis excafactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat. Et contra serpentū ictus. Vrinæ, & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus appositæ radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus ammisceatur. Stomacho perq̄ utile. Quare pro pere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodā simili. Quod facile gustu discernitur. Amarum enim est. Alij semen Fœniculi, aut Sefelis ammiscentes, Ligusticum dolo uitiant.

Pli. li. 19. ca. 8.

B A R B A R I C O R O L L.

Ligusticum syluestre est in Liguriæ suæ montibus: sed feritur ubiq̄, quod & suauius est, q̄q̄ sine uiribus. Crateias apud Græcos, Cūnilam Bubulam eo nomine intelligit falso. Cæteri fere Cunizaminem, Cūnilaginemq̄. Ligusticum Galenus unius inuersione literæ, Li- bysticon appellat.

E X M. V E R G. C O M M.

Pro Pipere Ligustici semine utebatur ubiq̄ antiqua & rustica plebs, ferebatq̄ in hortis suis: licet non adeo efficax, ut in montanis Liguriæ per se nascens: nō tam quia Piperis eam nondum copiā miserat India, quā nostra ætas, peragrato omni Indico mari, haberet: quando, quia peregrinis mercibus libenter abstinentes, non minus sibi, q̄ alijs in obsoniorum condituris liberalem fuisse naturā indicare uoluerunt. Ideoq̄ quibus regio hæc nostra abundat, libenter utebantur. Sentiebant etiam, quas habet nimias Piper in calefaciendo & siccando uires, parcentesq̄ illi, ex montibus, hortisq̄ suis ad cœnam saporem, uiresq̄ eius alias quærebant. Præstabant id multa quondam in herbarum & seminum genere, sed Ligusticum præsertim: quo Columella ultimo ultimi libri capite ad Oxypora uti docuit. Frequens peculiarisq̄ Apennini montis ad Alpes planta hæc est: a gente inuento nomine, quod etiam a græcis omnibus receptum fuerit, idq̄ ex Galeno scriptore hoc, cunctisq̄ alijs patet, in Liguria nasci testantibus: & si ut paulo ante diximus, in hortis feri postea coeperit: ne ex India, longinquisq̄ locis repe-

tendūm esset, quod sapore Piperis obsonia & pulmentaria eorū temporum cōmendaret. Credimusq; nos, esse hoc quod Columella lib. 12. Panacis nomine autumnno, & uere feri iubet, leni & subacta terra, raris interuallis, quo maius incrementū capiat. Idem quo diximus paulo ante loco Oxyporis misceri Ligusticiū iubet: & qualia antiquis Oxypora essent, & quo modo conficerent, longissime etiā docuit: sic dicta, q; aceto condita ad intinctus seruarentur.

De Pastinaca.

CAP. LVII.

Pastinacam syluestrem, aliqui Cerasconiam uocant, Latini rusticam Pastinacam, aliqui Carotam, Aegyptij Babubyron, Aphri Sicham. Folia Gingidij habet, latiora, subamara, caulem rectum, scabrum. Umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impositum menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos urinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit. Serpentium moribus ictibusq; prodest. Præsumentes eam, nulla affici iniuria a serpentibus traduntur. Conceptus adiuuat. Radix urinam pellit. Venerem stimulat. Partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedænas ulcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

BARBARI COROLL.

Pastinaca syluestris, siue quod idem est Erratica & pratensis, ad differentiam satiuæ dicitur. Præfertur satiuæ syluestris in medicina, magisq; in petrosis nata. Pastinacæ omni radicibus calens natura, sapor uehemens, ob id Venerem ciere creditur, & propterea Philtron uocari. Cartilaginei omnis generis. Satiua in cibum utilis esse incipit annicula. Bima utilior, gravior autumnno, patinisq; maxime, & sic quoq; uirtus intractabile illi est, ut inquit Plinius. De Hibisco & Dauco, quæ simillima existimantur Pastinacæ, dicemus suis locis. Diximus & de Sisere, cui cum Pastinaca uicinitas eadem est. Pastinacam Diocles medicus non Staphylinum, ut cæteri, sed Astaphylinum uocauit, duodecim cubitorum in Mauritania magnitudo caulis, crassitudo palmorum quaternum.

EX M. VERG. COMM.

Dvplex genus Pastinacæ, satiuū, scilicet & agreste. Rursusq; agrestis multiplex. Potius diuilio q̄ genus suspicionē quorundā merito auxit, sit ne agresti Pastinacæ idē Daucus, an alterius generis herba: præsertim duobus capitibus, diuersisq; locis de utroq; tradente scriptore hoc. Verum ex his, quæ in græcis & latinis obseruata diu a nobis fuerunt, sciendum illud est, Staphylinum a græcis simpliciter Pastinacam dici olus, & oleris notissimam, & quotidiani usus radicem: nullaq; adiecta nota alta, satiuam semper intelligi. Sic Columella in carmine suo cecinit. Latetur, mollemq; sinum Staphylinus inumbret. Serenda enim in hortis tunc numerabat. Idem libro decimo capite quarto. Tunc agrestis Pastinaca, & eiusdem nominis Edomita, quam Græci Staphylinum uocant: Edomitam satiuam intelligens. Sic rei rusticæ & hortensium scriptores alij. Plinius, quoniā utriusq; quotidianus esset usus, satiuæ, agrestis ue addito discrimine, alterutram præuincit indicat. Habet satiuæ hæc, ut fere in plantarum genere omnia, diuersam sibi syluestrem nascentem ubiq; multi usus & ipsam, & in medicina præsertim. Nam satiuæ illa præcipuum habet in salutē inter blera usum. Syluestris uenit & ipsa quædem in quodidianos cibos, sed ob multas, quas habet medicas uires, a medicis celebratur, & expetitur magis. Hanc Græci nuncq; nisi addito syluestris discrimine, appellant, σαφύλινον ὀλίγον uocantes, id est, Pastinacam syluestrem. Intelliguntq; eam, quæ locis incultis nascens, Satiuæ pariter frondeat & floreat, sed minore radice, & magis fibrata sit. Syluestrem hanc idem Græci, ut certiore uocis discrimine a satiuâ illa separaretur, Daucum dixerunt. Testis pluribus locis Galenus: qui de utroq; Staphylinō agens, ait, ὁ μὲν ἡμῶν ἀσθινέτερος ὁ δὲ ἀγρίος ὃν καὶ σαφύλινον καλεῖται, Quod est, Satiuâ quidem Pastinaca ignauior, agrestis uero, quâ Daucū uo-

A

σαφύλινον ὀλίγον

Pli. li. 19. c. 25.

B

Cant. &c. Agrestem Staphylinū, Daucum tanti nominis auctor uocari tradidit. Testis Paulus Aegineta lib. 6. de simplicibus agens, *δαυκός* ὁ καὶ *σταφυλίνος*, quod est, Daucus, qui & Staphylinus. Sed manifestius primo uolumine capite de his quæ edendo radices habent: in quo cum plures alias numerasset radices, *σταφυλίνος καὶ δαυκός* ait: quod est: Staphylini autē & Dauci, fatuam, & syluestrem Pastinacā intelligens. Plinius præterea multis locis, & ipse congenerū duarum radicū discrimina aperte indicauit. Nec dubitandū cuiuspiam est, quin Staphylinus græcis, & Pastinaca latinis simpliciter dicta, in hortis consita non significet, longiorem, crassiorē, nec fibris capillamentisue tot quot syluestris in terra hærentem: Daucus uero illis, nobis agrestis Pastinaca, syluestrem illam significet in aruis, pratis, & incultis locis per se nascentem. Cuius radix per hyemem satis grata in cibis etiā sit. Est enim cruda in acetarijs, sed cocta suauius respondet & sapit. Rura nostra fatiua illam Pastinacam, Syluestrem non multo diuersa uoce, mutantisq; tantū aliquot literis appellant: ut ex hoc etiā congeneres herbas esse conijcere liceat. Superest modo, ut dicamus, si fatiua tantū, & agrestis Pastinaca sit: illaq; simpliciter Pastinaca, hæc Daucus quondā, aut syluestris Pastinaca dicta fuerit: cur duobus capitibus, diuersis locis, primūq; sub titulo agrestis Pastinacæ, mox sub Dauci uoce de eadē planta hic scripsor egerit. Quod ex Theophrasto, Plinioq; nouisse difficile non fuerit. Necq; enim hic, quia diuersi oīno generis sunt, syluestris Staphylinus, & Daucus duobus locis, & duplici historia de eis egit: sed quia uarietate in diuersis gentibus earum herbarū natales & uires natura, testari in medicina seorsum id oportebat. Plura enim Daucorum gēna numerauit antiquitas, non gēne, sed natali solo diuersa. Indicantq; id Plinius lib. 19. cap. 4. qui cum agrestem, fatiuaq; Pastinacā numerasset, moxq; tertiam, quā ille Hibiscum noīat, statim subiecit. Est & quartū genus in eadē similitudine Pastinacæ, quā nostri Gallicā uocant, Græci uero Daucon. Ex quibus conijcere facile est, quondā in græcis non omnē syluestrem Pastinacā Daucon, ut postea factū est, sed propriū, priuatimq; aliquod eius genus uocatū fuisse: quale Theophrastus lib. 9. de plantarū historia his uerbis indicauit. *δαυκόν δὲ περὶ πλὴν παρτινὴν τῆς ἀχαΐας διαφέρει θυρωπιδιὸν φῦλον, ὃν δὲ ἔχει μύλαινα*, quod est, Egregia bonitate autē Daucus in Achaia Spartensi agro, calefacit natura, & nigrā habet radicem. Qui color in fatiua & agrestis Pastinaca nescio an in Italia uisus aliquādo fuerit. Ex eo nō fuerit in hoc scriptore absurdū, bis de eadē plāta diuersisq; nominibus actū fuisse. Primitū, ut quas habet in medicina uires agrestis oīs Pastinacæ, ubiq; nascens indicaret: mox Dauci appellatione Cretica, ut ille in Dauco ait, & certis locis nascens doceretur: cuius propriæ uires propria sibi etiā historiā exigent. Potuit & illud in causā esse, quod tēpore hic medicīnā suam cōmentabatur, Dauci appellatio non oībus syluestribus Pastinacis respondebat, sed Creticæ tantū. Quos enim nos testes citauimus Galenū, & Paulum Aeginetā, cum ostenderemus paulo ante eundē illis esse Daucū, & syluestrem Staphylinū, huic scriptori posteriori fuerit: & quod certæ rei ante eos æstimationē habuerat, mutata ut in cæteris humanis rebus sit uocū fortuna, aliud significare potuit. Quotidie enim fieri uidemus, qd Flaccus ait, perire multas, renasci multas subinde uoces, si uelit usus, Quæ penes arbitriū ius est & norma loquendi. Nobis, ut tā multa colligamus, pro cōperto est, agrestem Staphylinū, & Daucum græcis eandē radicem ex multo tēpore esse, & a latinis Erraticam Pastinacā uocari: & in hoc scriptore non damnandā eiusdem plantæ duplicem historiā. Factum enim id est, uel ob diuersas uires & notas, quas Cretensis & in Achaia nascens Daucus haberet, ob quas hic a cōmuni Staphylinō hac uoce separauit: uel in quā partem nos propensiores trahimur, quoniā Dauci uox, antiquiore illa ætate, priuatim inter syluestres Staphylinos, aliquē indicans, a posterioribus ob similitudinē ad totum eorum genus translata fuerit: pertinetq; eo quod Plinius ait. Est & quartū genus in eadē similitudine Pastinacæ nascens, quā nostri Gallicā uocant: Græci uero Daucon. Ex his enim ratiocinari licet, Daucum similē Pastinacæ erraticæ esse, non eundē: & a Romanis nomine gentis distingui, quemadmodū in græcis a Staphylinō agresti alio noīe distinguebatur. Hunc, siue syluestrem Staphylinū, siue Daucon appeller aliquis, hic *κέρως*, id est, cornu uocari ait. Quod & græcorū Lexica testantur, in quibus legitur *σταφυλίνος ἔργον δὲ ἔναι κέρως καλοῦσι*. Credimusq; nos, quod paulo ante dictū est, a cornu forma & longitudine sic dictū a Græcis fuisse. Potuit tamen & alia rōne sic uocari, a fibrata & capillata radice, quā habet. *κέρως* enim, ut testatur Plutarchus in li bello, cui titulus est, Vtrobī, in terrestribus, i. an aquatilibus maior prudētia sit, antiquis græcis *τρίχας*, i. capillū significabat. Cuius significationis indicium est *κέρως* uerbū, quod tondere est: & *κονὴ* nomē, i. tonsura: & qui apud Archilochū *κροπιδέστω* legebat ὁ περὶ κόμην καλλωπισκός, i. qui in ornāda coma occupat. Quæ snia melior & probanda magis uidet, ob id quod statim sequitur. Sunt qui & comā Staphylinū agrestem, ob eandem scilicet causā uocent,

De Sefeli. CAP. LVIII.

Sefeli Massiliense, quod nonnulli Sphagnon uocant, folia Fœni-
culi habet, crassiora, caulem uegetiorem. Umbellâ Anethi, in qua
semen oblongum, angulosum, degustanti acre. Radix longa est, iucun-
di odoris. Semen & radix excalfaciendi uim habent. Potu stranguriæ
& orthopnœæ medentur. Suffocationibus mulierum, comitialibusque
profunt. Menfes & partus trahunt. Ad omnia interna mala pollent.
Tussim ueterem sanant. Semen cum uino potum concoquit, & tormi-
na discutit. Epialis febribus utile. Contra perfrictiones in itineribus, cū
pipere & uino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quo
facilius suos foetus enitantur.

BARBARI COROLL.

Sefeli Massiliense optimum. Lato enim granò & fuluo est; quo & Vultures uescant, & Cera-
uæ parituræ. Sefeli & Sili dicitur, & Seli apud Hippocratem, unde orta confusio Siler pro Sefe-
li uocantiū Arborescit porro Siler, ut baculos rustici ex eo quæ faciunt, in aquaticis nascens.
Molle Siler

Pli. li. 20. ca. 5.

a Poeta dictum neutro genere, quod per quæ rarum sit in arboribus latina lingua. Refugiunt hoc
serpentes. At Sefeli frutex non est aquaticus: quod quidem aliqui distinguere putantes, non Si-
ler, sed montanum Siler appellauerunt id, quod Massiliense est Sefeli.

EX M. VERG. COMM.

A Seminis figura latum Cyminum in græcis, Massiliense Sefeli aliqui ut uidetur appellau-
erunt. Ea uox in antiquis eorum codicibus adhuc seruatur: nec nos eā negleximus, dicente Pli-
nio optimum Massiliense: lato enim granò, & fuluo est.

De Aethiopico Sefeli. CAP. LIX.

Aethiopicum Sefeli, quod Aegyptij Cyonum phricen uocant,
folia habet Hederæ, minora, & ad Periclymeni modū oblon-
ga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipe-
dalibus, capitulo Anethi. Semine in Tritici morem denso, nigro, ama-
ro, Massiliensi odoratiore & acriore, multum suauis.

αἰθιοπικὸν σέσιλι

BARBARI COROLL.

Sefeli Aethyopico dignitas secunda. Hoc & nigrius est, & nascitur hodieque apud nos: sed fru-
stra, medicis officinisque incognitum.

De Peloponnesi Sefeli. CAP. LX.

Peloponnesense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora. Caulem su-
pra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum in cacumi-
ne capitulum, in quo semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eis-
dem uiribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inue-
nitur etiamnum in Ida monte.

De Cretico Sefeli. CAP. LXI.

Tordylum, quod aliqui Creticum Sefeli uocant, iuxta Cilici-
am in Ameno monte nascitur, hærbula surculosa, semine du-
plici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ diffi-
cultatem bibitur. Potu cit menfes. Succo seminis caulisque uirentis, ter-
tis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est ra-

τορδύλιον

C dix ad ciendas pectoris excreationes in delinctu cum melle.

B A R B A R I C O R O L L.

Tordylon, & Gordylon, & Tordilon & Tordyle dicitur, & Sefeli cognomēto. Creticum inter omnia genera odoratissimum. Tordylen porro, alij semen Sefelis dixerunt, alij herbā per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse Plinius fatetur, q̄ q̄ in montibus nascitur, Paulus non Tordilon, sed Gordylon appellauit.

E X M. V E R G. C O M M.

Non habet certum in antiqua medicina Tordylon hoc nomen, nec certam penitus historiam; aliter alijs id appellantibus, & de eo tradentibus. Plinius non satis cognouisse rem uidetur, diuerfas ante se scriptorum sententias tantum referens. Paulus Aegineta in sexto, Gordylon, non Tordylō uocat; facile tamen & lubrico in una tantum litera ad uitium lapsū, quo loco eādem huic scriptori uires illi adscribit. Alij sceminino genere Tordylem uocauerunt. Alij Sefelis semen hoc nomine censerī uoluerunt. Alij sui generis herbam Græciæ & Italię peregrinā, ideoq̄ parum notam. Nec nos quod pro ea dicamus aliud habemus, q̄ Sefelis genus esse credere nos; ex quo hic statim ab omni Sefeli eā descripsit; propriūq̄ & priuatim ab illis aliud a genere in qua nasceretur nomen sibi inuenisse. Fecit rei incertitudo hæc etiam, ut in fine capitis ab alijs quo qui deprehendisse Tordylon se crederet, accreuerint aliqua quæ in impresso & p̄terisq̄ alijs leguntur, ab alijs interpretibus continuata sermonis serie reddita. Nos ea reliquimus indigno huic scriptori uerborum ductu tractata, & in uetustissimis græcis latinisq̄ nūq̄ inuenta.

De Sifone. C A P. LXII.

Sifon

Sifon exiguum semen est in Syria natum. Apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur. Vrinæ difficultatem potu emendat. Remoratos menses citat. Quo in condimentis cum Cucurbita & aceto indigenæ utuntur. In cacumine granula multa gerit.

B A R B A R I C O R O L L.

D

Sifon, siue Sinon, & Senon Hippocrati, & quandoq̄ Silion uocatur, quaternis constare ramis scriptum reperio.

E X M. V E R G. C O M M.

Cognouit Hippocrates Sinnon. sic enim eum appellat. Cognouit & Paulus Aegineta, qui calidū, & subamarum esse testatus est: ideoq̄ concoctiones adiuuare, menses pellere, & interanea, quæ græci πλεγμα dicunt, laxare. Latini scriptores, quod hæcenus legerim, aut meminerrim, nihil de eo egerunt. Hic etiā exiguum semen in Syria nasci dicens, importune relicta herba historiam eius incipit. Fuisse rem & usum eius satis Hippocrates, Paulus, græciq̄ omnes & latini huius scriptoris codices testantur.

De Aniso. C A P. LXIII.

Anisum

Anisum semen paruum est in Syria natum. Apio simile est, magnum, feruens, oblongum. Contra lienem et urinam quæ ægre redditur, bibere prodest. Retardatos menses pellit. Id incolæ ad condimenta usurpare solent, & cum Cucurbita in aceto decocta assument. Anisum in summa exalfacit, exiccat. Oris halitum iucundiorē facit. Doloris leuamentum præstat. Vrinam ciet. Aquam quæ subijt cutem dissipat. Potū sitim cohibet. Animalium uenenis aduersat. Valet ad inflammationes, aluumq̄. Alba sceminarū profluuiā sistit. Lac ad mamas elicit. Venerē stimulat. Dolores capitis leuat, suffitiū narib. Cū rosaceo tritū, instillatq̄ fractis aurib. medet. Melius semp̄ recēs, plenū, non fursuro sū, odore p̄stans. Inter prima laudatū est Creticū. Proximū Aegyptiū.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 17
lib. 19. cap. 9. 2

Anisum culinīs gignitur, crudum, decoctum, uirens, aridum, panis etiā crustis inferioribus subditum. Succis quoq̄ laudatur additum cum amatis nucibus comendādo uino. Anisum

cerum & hoc uocatur Anethi modo, quoniam appetentiam præster ciborum. Aegyptium Ligustici uicem præbet in condimentis. Efficacius semper recens & nigerrimum. Stomacho tamen inutile est, præterquam inflato.

¶ De Caro. CAP. LXIII.

CArum semen est uulgaris notitiæ. Excalfacit. Vrinam concitat. Stomacho utile. Os commendat. Concoctionem adiuuat. Mistum antidotis & oxyporis Anisi uicem præbet. Radix cocta Pastinacæ modo manditur.

BARBARI COROLL.
Caros arbitror hoc esse, quod Plinius Carium, siue Careum gētis suæ nomine appellatum dixit: ab aliquibus Careosemen, & Caroum: culinæ principale, in quacunque terra ferendum ratione qua olus atrum. Laudatissimum in Caria, proximum Phrygia. Caros Græci, ut Pathos neutro genere pronuntiant & inflectunt. Dicitur & Caro, ultima producta. Caron Athenæus Pastinacam maiorem esse putat, & multo præstantiorem sapore, quam Pastinacam uulgarem. Est & radix Cara, de qua in rebus gestis a Cæsare mentionem facit Hirtius. Hac lacti admixta, multum leuasse dicitur inopiam, similitudine representata panis. Meminit & Plutarchus, sed nomen herbarum non reddidit.

EX. M. VERG. COMM.

Medicinam pluribus subinde remedijs instruens hic scriptor, Cari semen præcipue commendauit. Athenæus contra, ganem cibosque Dipnosophistas illos suos nono sui operis commentario docens, radicem celebrauit, Maiorem Pastinacam appellans, uulgari hac & quotidiana meliorem. Idem Paulus Aegineta libro primo capite de radicibus quæ edendo sunt, tres has ueluti congeneres his uerbis coniunxit. σαπυλίνου δὲ καὶ λαύου καὶ κάρον, αἱ μὲν ῥίζαι ὀλιγοτροφώτεραι τὸ γογγυλίδων ῥίζαι, θηρυαὶ δὲ καὶ ἀρωματίζονται σαφῶς καὶ οὐρητικαί. &c. Quod est, Pastinacæ uero, agrestis Pastinacæ itidem, & Cari radices minus quam Rapa nutriunt: calent tamen, odorataeque sunt, & manifeste urinam cient. Ex quibus ratiocinari & colligere licet, aut Pastinacis congener, aurililis non dissimile Caron hoc esse.

¶ De Anetho. CAP. LXV.

Anethum quod estur, aliqui Polygida uocant, alij Anicetum, Magi Cynocephali genituram, aut capillos, alij Mercurij semē, Latini Anethum, Aphri Sicciriam, Aegyptij Adracum. Daci Pulpum. Aridi Anethi comæ seminisque decoctum, potu lac euocat. Inflationes & tormina sedat. Aluum uomitionesque sistit. Vrinam ciēt. Singultus lenit. Oculorum aciem hebetat. Genituram restinguit assidue potum. Foeminis uuluae malo opportunis ad deflectiones utile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

BARBARI COROLL.

Anethum, culinæ Anisi modo gratum. Coronabantur hoc & in conuiuio recenti, atque roscido, ad conciliandum, ut uidetur Galeno, somnum.

¶ De Cumino satiuo. CAP. LXVI.

Cuminum satiuum ori gratum est. Sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates Regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium. Reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Therentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, excicat. Ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca. De morsus a serpente in uino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum.

G ij

A

καρόν

B

ανήθου

Pli. li. 19. ca. 89
lib. 26. cap. 113

κύνινον

Cum cum uua passa, aut lolij farina, caratoue. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis p^rfluuiā sistit. Colorem bibentium, aut perunciorum mutat in pallorem.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. cap.
14. & 15.

Cumino semen angustum, nudum, canaliculatumq^{ue}, facile inarescens frumenti modo, ubi plane accreuit, defluū atq^{ue} lubricum. Peculiares Cumino morbi, scabies, & falsilago. Nascit in summa tellure, uix hærens, & in sublimē tendens; in putribus & calidis medio ferendū uere. In Carpentania maxime laudat; alioquin Aethiopico, Africoq^{ue} palma. Quidam huic Aegyptium prætulere. Hippocrates in segetibus inquit triticeis, præsertimq^{ue} in Aegypto nascitur semē Aethiopico simile Cumino, uehemētis acrimoniæ, ad conceptus seminarum utile, si uuluis apponatur. Hoc ego Cuminum Aegyptiū interpretor. Basilicum & Aethiopicum apud Hippocratem, pleriq^{ue} interpretantur Ammi.

EX M. VERG. COMM.

Meliore scire feliciusq^{ue} provenire Cuminum, lib. 8. de plantarū historia testatus Theophrastus est, si in ferendo maledicant, imprecanturq^{ue} illi mala qui id ferunt; nec minus gaudere maledictis his & imprecationibus, q^{uam} laudibus & blanditijs in spem honoris erigantur homines.

Συριαν κύνινον

De Syluestri Cumino. CAP. LXVII.

Syluestre Cuminum, siue syluaticum, plurimum efficaciusq^{ue} in Lycia & Galatiæ Asia, atq^{ue} Carthagine Hispaniæ gignitur. Fructus ce paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, ueluti ferratis, & Gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore. Nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua aduersus tormina, inflationesq^{ue}. Item cōtra uenenatas bestias ex uino. Singultus ex aceto sedat. Somacho utile, quem humor uexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle et uua passa illinatur. Testium inflammationibus, adiectis eisdem medetur. Est & aliud syluestris Cumini genus, satiuo non dissimile, quod a singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est Melanthio simile. Quod potum omnium serpentium moribus præsidio est. Calculosis, & ijs qui urinæ stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. Sed Apij semen feruifacium postea bibendum est.

BARBARI COROLL.

Cuminum syluestre est, quod & Rusticum & Thebaicum appellat. Aetius Cuminum inquit syluestre, hoc est quod modo Aethiopicum uocari coepit.

De Ammio. CAP. LXVIII.

Σίμμι

Ammi, LATINI Ammum Alexandrinum, nonnulli Aethiopicum, quidam regium Cuminum appellant. Plerique diuersarum naturarum esse Aethiopicum Cuminum, & Ammum existimant. Vulgo notum est, semen exile, multo minus Cumino, Orizganū respiciens. Eligendum est purū, minime fursuofum. Vis ei excalfactoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē, serpentium ictus cū uino potū. Menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ Ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu, aut illitu

mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat.

BARBARI COROLL.

Est Cumino simillimum quod Græci uocant Ammi, tantum candidius & exilius Cuminum. Similis autem & huic usus. nam & panibus alexandrinis subigitur, & alimentis interponitur. Herbam quoque ipsam græci uocant Ammi.

EX M. VERG. COMM.

Peregrinum semper Græciæ & Italiæ fuit, siue sui generis herba & semen, siue Cymino congener Ammi sit, meliusque & efficacius in Aegypto nascatur. Eamque ob causam usa eo antiqua medicina est, aliunde inuecto. Fuit in Aegypto quondam domesticus Ameos huius, & quotidianus usus: panibus enim cōpinsebant, & alimentis miscebant. Calefacere, siccareque in tertio ordine ueteres græci id dixerunt, maioreque in extenuando uique Cyminum esse. Quæ autem a principio statim leguntur, uocare, quosdam hoc Aethiopicum, & regium Cyminum, ex aliorum opinione, non huius scriptoris decreto intelligenda sunt. Neque enim ipse id probat, sed a quibusdam sic uocari tamen testatur. Sigdæ Aethiopici, et regni uoces, bonitatis a gente in Cymino notæ sunt, non generum diuersitates.

De Coriano. CAP. LXIX.

Corium, aut Corianum Aegyptij Ochion uocant. Vulgaris est notitiæ. Vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt medetur. Epiphytydas cum melle, uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosque sanat. Cum faba fresa, strumæ & tubercula discutit. Tineas interanorum expellit, semen cum passo potum. Genituram adauget. Largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. Quare continuo & copiosiore usu abstinendum. Succus cum cerusa, spumaue argenti, necnon acetato & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

BARBARI COROLL.

Coriandrum, Corion, & a Theophrasto Corianifon uidetur appellatum, siue ut magis probò Coriannon. Ita uocari solitum a ueteribus, testis est Galenus & Dioscorides. Seritur maio, & contumax prouentu scribitur. Radice breuiuscula, nec admodum fibrata: caulibus ramisque multis, nudo semine, ac firmo & diutino. Sub canis ortum salescit. Inter syluestria Coriandrum non est. Huic subtrito cum aceto, uis tanta, ut carnem incorruptam seruet æstate. Xenocrates tradit menstrua contineri uno die, si unum granum biberint foeminae: biduo, si duo: & totidem diebus, quot grana sumpserint.

EX M. VERG. COMM.

Crediderunt Coriandro aliqui in Græcis nomen fecisse Cimices, quos folia eius & caules olent. Et quoniam insectum id græci Corin uocant, ideo olentem eos plantam Corion nominauerint. Sunt contra, qui quod Corian non græci frequentius quam Corio Coriandrum uocent, non a Cimicibus, sed quasi Coriamblon, i. hebetantem oculorum pupulas dictum fuisse uelint. Notum enim oculi pupulæ, & ἀμεινόντιν hebetare istdem græci dicunt. Quod quod uerum sit, peritiores intelligent. Ab hoc enim nihil quod ad oculos pertineat priuatim in Coriandro decernitur. Omnium eius appellationum prior illa in hoc, & alijs medicinarum scriptoribus frequentior est. Altera illa in communiore sermonis usu fuisse, indicat in egiptibus suis Aristophanes. Quocumque autem nomine uocetur, nota omnibus planta est, semperque precipue: ideoque non ultra a nobis tractanda. Numeratur ab hoc ipso scriptore. 6. uolumine inter uenenatos doreque presertim deprehendi, quod similis uiuenti Coriandro toto corpore sentiat. Meminit & Nicæder in Alexipharmacis suis, quod loco interpretis eius syluestri Coriandro ueneni maleficium inesse ait: quod ab eo describitur latioribus longioribusque folijs, multis adnatis, & numerosa radice copiosaque flore. Quod nescio an uerum sit: testante Plinio. 20. uolumine eiusdem numeri capite, non inueniri inter syluestria Coriandrum. De eo iterum in. 6. agendum nobis erit.

De Hieracia. CAP. LXX.

Hieracia magna, alijs Sonchites, Romanis Lampuca, Pœnis Sithileas, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum,

G iij

A

κόριον

B

Pli. li. 20. ca. 20

ἱερὰκιον ἢ μέγα

C folia, ex interuallis rariuscule diuifa, fimilia Soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice substringendi. Vnde illita, ftomacho æftuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erofionem forbitione mitigat. Hærbæ cum radice illita, uibratis a fcorpione ictibus auxiliatur.

Pli. li. 8. 4. ca. 11

DE Hieracio inter Lactucas fylueftres meminimus: quoniam Romani Lactucam folio rotundo & breui Hieracion intelligebant. Dicta eft ex eo, qd accipitres fcalpendo eam, & oculis fucco tinctis obfcuritatem cum fenfere, difcutiunt.

BARBARI COROLL.

Ἱερᾶκιον ἢ μικρόν

Hieracia parua, quam aliqui Sonchiten, alij Entimō agrion, Romani Intybum fylueftre uocant, folia ex interuallis habet diuifa in ambitu. Cauliculus teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim fuam ad eadem quæ fuperiôr impendit.

CAP. LXXI.

Hieracium, & hoc fuperius etiam Hieracia dicitur Aetio atq; Horo, cuius fucco palpebræ reglutinant. Idem autor eodem loco, Anacollia inquit appellantur, qm lachryma in cômôdâtes pilos corrigit. Quid aut fint Anacollia nō cōpi: nec fimplex, an cōpofita fit facultas fciō.

BARBARI COROLL

EX M. VERG. COM.

Accipitres, quos græci Hieracas dicunt, Hieracio quondam nomen fecerunt: fcalpentes eā, fi Plinio credimus, fuccoq; oculos tingentes, ut eorum obfcuritatem cum fibi obrepiffæ eam fenferunt, difcutiant. Apuleius, quod fabuloſum uideatur, his addidit, Aquilam in altum alis fe tollentem, ut rerum naturam certius contempletur, Lactucæ filuaticæ (Hieracium hanc intelligens) folia euellere: fuccoq; fibi oculos tingentem, optatam eorum claritatem acquirere. Sed quodcunq; id fit, ab his auibus græci Hieracium dixerunt. Sæpe enim a brutis, naturæ neceffitate impullis, ignotum aliquid nobis fit. In quo eorum fenfus ignari homines, quod uero fimilius, non quod uerum fit commiſcuntur: quemadmodum longius in utroq; Echino dictum fecundo uolumine a nobis eft. In Lactucarum fponfe nâſcētium cenſu ab omnibus propter fimilitudinem Hieracion hoc numeratur. Plinius. 20. libro, capite. 7. ultimam hanc in eo genere deſcribit, folijs rotundis, & breuibus. Apuleius in agreſti Lactuca Hieracifon uocari dicens, meminit eius. Hic Lactucam erraticam dici a quibusdam tradit: quæ uox & appellatio quoniam in ſcriptore hoc perierat, ex melioribus græcis a nobis inſtaurata eft. Non meminit eius in medicæ materiæ cenſu Paulus Aegineta: credimus, qd nullas hanc forte intelligeret, diuerſas ab agreſti Lactuca ures habere. Multa ſiquidem in Lactucarum cenſum & nomen uenerunt: Tithymallus, quæ ab aliquibus Caprina, ab aliquibus Marina Lactuca dicta eft. Vtræq; Ifatis, quam Glaſtum, ſiue Luteam uocari diximus. Hieracia poſtremo hæc. Omnium eadem ratio & cauſa fuit, qd latiore, ſ. & ampliore folio, quali Lactuca eft, omnes ſunt, & omnes lactis liquorem aliquem ſectæ reddunt. Et nihilominus, quoniam priuatim aliquid ſingulæ habent quod Lactucæ & alijs non congruat, alijs appellationibus dictæ, & in alijs generibus conſtitutæ fuerunt. Sonchitem maius Hieracium uocari a quibusdam hic ait, manifeſta ratione, quoniam & hæc & illa concauo, & lacteum ſuccum remittente caule eft. Foliorum enim quantitate longius interuallo diſtat Sonchus ab agreſti Lactuca, & ex eo ab Hieracio hoc: eamq; ob cauſam inuenientes in melioribus græcis, quo loco hic ait habere folia Hieracium per interualla incifuris diuifa, Soncho ἰσφίτῃ, id eſt, æqualia, non Soncho, quæ noſtris Cicirbita eſt, ſed τὴν δὲ, id eſt, Betæ naturam et rem ſecuti, Betæ folio, non Sonchi Hieraci folia comparauimus. Lactucæ enim Beta uerius qd Sonchus in foliorum quantitate comparatur. Quemadmodum & minus Hieracium illud quod ſequitur, agreſti Intybo in foliorum quantitate exæquatam pariter eſt. Omnia enim eo pertinent, ut Lactucæ ſimile Hieracion fit. Eius unum tantum caput, Maioris ſcilicet in melioribus græcis legitur. Nec Plinius niſi unius meminit. Quo fit, ut ſuſpicemur alterum hoc, & minus Hieracium priori illi accreuiſſe ab aliquo, qui inuentum forte breuius, & ut cœli terræque uis poteſt huiuscemodi uariare, alterum crediderit a ſuperiore illo eſſe. Indicatque id, quod neque in hiſtoria, neque in medicina poſterius hoc a ſuperiore illo diuer-

sum aliquid habet. In censu & genere sylvestrium, & sponte nascentium Lactucatum, sine unum, siue duo sint, Hieracia hæc numeranda sunt. Ostenduntque id Paulus Aegineta, qui nihil de his in medica materia egit. Indicant & latini omnes, in quibus Hieracii nulla historia est. Et quem nos habemus antiquissimum Dioscoridis latinum codicem, nihil quod ad Hieracia hæc pertineat, ostendit: cui in huiusmodi antiquitatis uestigijs, & ueræ lectionis coniectura, ob uetustatem suam, nos multum deferimus.

De Apio.

CAP. LXXII.

Satium Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammarum duriciam reprimat. Urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potu, uenenorum noxæ resistit, quum uomitiones excitet. Aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit. Contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit. Ammiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

BARBARI COROLL.

Apium & Apius Græci Selenon uocant. Durat biennio. Prouenit crispus, pedibus, aut cylindro, pilæ uel pulsatum, quinquagesimo a satū die, quadagesimo cum ocyslime. Apium aliud folio spisso, hirsuto, crispo. Aliud raro, expanso, caule item maiore. Item aliud caule albo, aliud purpureo, aliud uersicolore. Syluestriora hæc, ut Theophrastus inquit, proprii Apio, quod colorem mutat. Rami eius per iura quoq; uulgo innant: & in condimentis peculiarem uoluptatem præbent. Pisces quoq; si ægrotant in piscinis, Apio uiridi recreantur. Honos ei in Achaia, coronare uictores sacri certaminis Nemeæ. Apud eruditos, non aliud erutum terra in maiore sententiarum auctoritate est. Distinguitur sexu. Fœmina ut sit crispioribus folijs, atq; duris, crasso caule, sapore acri & seruido. Mas folijs nigrioribus, breuioris radicis, uermiculoscq; gignens. Neutrum ad cibos admittebant, Nephasium existimantes, quoniam defunctorum sit epulis feralibus dicatum: & ut Plutarchus inquit, coronentur Apio sepulchra: unde uetus illud, indigere Apio, de ijs qui profligata ualitudine uruntur. Vermiculos & fœminæ caulibus innasci: propterea eos qui ederint, sterilefcere utroq; sexu. In puerperis uero ab eo cibo comitiales fieri, qui ubera infantes hauserint. Innocentior tamen esse marem, eaq; causa est, ne inter Nephasios frutices damnetur.

EX M. VERG. COMM.

Quæcūq; a Plinio de Apio lib. 19. capite. 7. eorumq; folijs, caulibus, coloribusq; dicuntur, multo ante a Theophrasto de plantarum historia octauo uolumine dicta fuerant: Differre scilicet Apiorum inter se genera, folijs & caulibus: Esseq; hoc denso, crispoq; & hirsuto folio, illud raro & lato: hoc maiore caule, illud minore. Et in hoc genere rursus aliud candido, aliud purpureo, aliud uersicolore: totumq; hoc genus syluestri simillimum esse. Rursusq; eodem libro. Quod grande, palustre, montanumq; appellatur, inter se & a satiuo differre: quoniam palustre prope aquarū riuos, & in palustribus nascatur, raro folio, nec hirsuto: simile tamen Apio esse odore, succo, & figura. Quod grande, folio palustri simili, hirsuto, & altiore caule, radiceq; Rhaphani crassitudine, colore nigro, semine iudè nigro, maiore q; Erui: duriorq; hæc cōtra urinæ angustias, calculosq; credi uim habere in albo dulci uino pota. Nasci hoc ubiq; conrescereq; in eo lachrymam Myrrhæ odore, quam ueram esse Myrrham aliqui crediderunt: Montanum maiores adhuc, & certiores habere differentias. Cicutæ enim folio est, radice tenui, caule Anethi, uerum minore. Vsum huius esse ad muliebria, id est, menses in uino austero. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Quæ omnia a Plinio qua cætera breuitate consueuit, antedicto uolumine numerata, & descripta fuerunt. Columella libro. 12. in hortorum prosa foliorum discrimina hæc, quæ a Theophrasto natia numerantur, culturâ & artificio humano facere his uerbis docuit. Apium quoq; possis plantis serere, nec minus semine. Aqua præcipue laetatur, & ideo secundū fontes comodissime ponitur. Quod si quis id uelie latius folij facere, quantum possint tres digiti seminis comprehendere, raro linteolo illiget, & ita in areolas dispositum religet. Vel si crispæ frondis id fieri malueris, semen eius inditum pilæ, & saligneo palo pinxitum, expoliatumq; similiter in linteolis ligatum obruas.

G. iij.

A

Pli. li. 20. ca. 116.

lib. 19. ca. 7. 8.

B

D I O S C O R I D I S

C Potest etiā citra hanc operā fieri crispum qualitercūq; satū, si cum est natum incrementū eius, superuoluto Cylindro coërceas. Quæ omnia de satiuo intelligenda in eo scriptore sunt: ideo longius a nobis repetita, ut sciant, meminerintq; legentes: si natia foliorum Apij Theophrasto discrimina illa sint, licere, sperandumq; homini labore, diligentiaq; sua non imitari, quod multæ aliæ possunt artes, sed in ruris disciplina naturā etiam æquare.

De Eleoselino.

CAP. LXXIII.

ἐλεοσέλινον

Eleoselinum, quod a quibusdam Pedinon, ab alijs Hydroseli-
non agrion, Romanis Apium rusticum appellatur. In humidis na-
scitur. Satiuo grandius, & ad eadem efficax.

BARBARI COROLL.

Eleoselinon, Paludapium, ficto ut solet nomine Theodorus appellauit, quia in paludibus nascatur, secundumq; aquæ ductus, folio raro, nec hirsuto, simile Apio sapore, figura, odore. Homerus Apium Eleothrepton uocauit, hoc est, palustre.

EX M. VERG. COMM.

Satis ex Theophrasto superiore capite dictū est, quale hoc Apium sit, & quæ a satiuo & ab alijs discrimina habet: caules scilicet & profluentes aquas prope quas nascitur, rarius foliū, sed non hirsutum: satiuo Apio odore, succo, & figura simile. De eo Palladius in Aprili sic ait. Eleoselinon molli folio, & caule tenero, quod nascitur in lacunis.

De Oreoselino.

CAP. LXXIII.

ορεοσέλινον

Oreoselinon, quod aliqui Petroselinon syluestre appellant, Aegy-
ptij Anonim, caule est palmum alto, ab radice tenui exeunte. Ra-
mis & capitulis Cicutæ, multo tamen tenuioribus, semine Cumini, ob-
longo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis & montibus. Vrinam
ciet semine ac radice, in uino potis. Menses trahit. Antidotis, necnon me-
dicamentis urinam cientibus, & excalfactorijs inseritur. Nec hallucina-
ri nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in saxis prouenit.
Aliud enim est Petroselinum.

BARBARI COROLL.

Oreoselinon, a quibusdam Orthoselinon: quia frutice recto nascitur. Caule Anethi ex-
liore tantum, folio ut Theophrastus inquit cicutæ, nisi quis deprauatum in eo locum puret.
καὶ τὰ φύλλα ἔχει καὶ οὐκ ἔμφερῶς, pro eo quod est, κεφάλια ἔχει μικρῶν ἔμφερῶν. hoc est, capitula Papa-
ueris similia, ut Dioscoridis uerba sunt.

EX M. VERG. COMM.

Diximus in satiuo Apio, quæ Theophrastus in montano discrimina ab omnibus alijs nu-
merasset: ea superuacaneum & inutile repetere nunc fuerit.

De Petroselino.

CAP. LXXV.

πέτρινον καὶ τὸ
πेत्रοσέλινον

Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis. Semine
Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac
menstrua. Contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest.
Laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit. Ammifiscetur an-
tidotis urinam cientibus.

BARBARI COROLL.

Petroselinon, hoc est, Apium in saxis natum. Addidere quidam Buselinon, differens breui-
tate caulis a satiuo, & radice colore ruffo. Galenus Petroselinon in Ciliciæ Amano monte na-
tum Smyrnion potius, q̃ Petroselinon uideri sibi tradidit.

EX M. VERG. COMM.

Indicat uox ipsa, in petris & saxis natū Apium, Petroselinon a Græcis quondā dictum fuisse.
Hic tantū in Macedonia natale solū illi assignat. Palladius in latinis nihil aliud de eo, q̃ locis a-
speris maxime prouenire ait. Nec nos credimus, alia q̃ nataliū ratione a satiuo differre. Mede-

ri inter cetera saxatile Apium crassioris intestini, quod colon dicunt, inflationibus, hic scriptor ait, non tota, neq; ex quacuncq; causa facta colicam affectione intelligens, sed quae priuatim ex crasso & quasi peditu efflatur, non transeunte ill hac spiritu saepe fit.

De Olusatro.

CAP. LXXVI.

Hipposelinum aliqui Grielon, alij Agrioselinum, Latini Olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quauis aliud sit, quod proprie Smyrnion dicitur, ut paulo post referemus. Est autem maius, & satiuo Apio candidius. Caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas. Folijs latioribus, in puniceum uergentibus, coma Rorismarini. Dependuntibus in cacumine corymbis, anteq; deflorescat. Ea semine turgēt nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix demittitur tenuis, odorata, candida, quae os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur. Olerum generis ut Apium. Radix cruda, coctaue estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus praeparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso uino menses ciet. Rigentes calfacit potu, aut illitu. Vrinae stillicidio auxiliatur. Radix eosdem praestat effectus.

BARBARI COROLL.

Hipposelinon Theodorus ab equis dictum, Equapiū uocare maluit, cum latine Olusatrum, & Olus pullū dicat. Viret ei foliū cacumine perpetuū, palustri simile, sed pilosum, caule gradi. Radice crassa, mō Raphani, sed nigra, fructu Erui maiore, atro. Nascit ubiq; e lachryma sua: quā nihil differre a Myrrha dicit. Auctorq; est Theophrast. Myrrha sata natū. Serit & radice.

De Smyrnio.

CAP. LXXVII.

Smyrnion, quod in Cilicia Petroselinum uocant, passim in Amaseno monte gignitur. Caulem habet Apij, & stolones multos, folia latiora, pinguis, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescēte. Capitibus caulium orbiculatis, ut anethi. Semine Brassicae, rotundo, nigro, acri, myrrhae sapore: ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoq; odorata, gustu acri. Fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis & collibus, atq; squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, haerbae & seminis, excalfacere. Folijs muria maceratis, ad obsonia utuntur. Aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. Tusses & orthopnoeas mitigat. Vrinae difficultati medetur. Recentes tumores, collectiones, duriciasq; discutit. Illita uulnera ad cicatricem perducit. Partus abortu uitiat, si feruefacta subijciatur. Semen, lienis renum, & uesicae uitijis prodest. Menses & secundas pellit. Commode datur ischiadicis in uino. Inflationes stomachi lenit. Sudores ciet & ructus. Semen peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circūitus.

BARBARI COROLL.

Smyrniū, caulē habet, q̄ aestate incipiente arefcit. Cortex radice intus, & pallet cortice arido. Ad obsonia utunt, cū Mulso, & Oleo, & Garo, maxie in elixis carnibus. Radix sapore Pipi similima. Odor herbae Myrrhae, unde nomē. Hoc & Petroselinō syluestre uocari scribit Galenus.

A

ἵπποσελίον

B

σμύρνιον

E X M. V E R G. C O M M.

SEntiebat iam tum cum hæc scriberet Dioscorides a grauissimis plantarum & hortensium scriptoribus confundi cum Olusatro Smyrniū: miscerique simul cōmunicata inuicē appellatione, similes quidem, & congeneres, non tamē easdem plantas: ideoque in Olusatro, cuius superiore capite tractata historia & medicina est, aperte omnes monuerat, aliud esse Olusarum ab eo quod proprie uereque Smyrniū diceretur. Et in Smyrniō eas numerauit nataliū, uirum, feminis, foliorum, aliarumque partiū notas, ut his qui Olusatrū nouerunt, nihil facilius posthac sit, quā alterum ab altero discernere, præfertimque ex Myrrhæ gustu, ideoque pari & promiscuo alterutrius usu. Quod in nostri orbis Olusatro sentiri, deprehendique nequit. Miscuisse autē ueteres inuicem similes & cōgeneres plantas, in latinis Columella testis est lib. 12. capite. 3. scribens. Atrum olus, quod quidam græcorum uocant Hippofelinon, nonnulli Smyrniō. Testis Theophrastus. 9. de plantarum historia uolumine, Hippofelinū nominans quod hic Smyrniō, & quæ Smyrni in hoc scriptore sunt Hippofelino tribuens. Locustus est, ubi de excipiendis plantarum liquoribus ille agit, inter quas Hippofelinon numerat. Suntque eius hæc uerba. *ἵναι δὲ ἐν ταῖς ῥίζαις ὡς αὖτε τοῦ ἵπποφελίνου*, quod est, Aliquorū etiam in radicibus quemadmodū Hippofelini. Pauloque post. *τὸ μὲν οὖν τοῦ ἵπποφελίνου παρόμοιον τῇ μυρρῇ, καί τινος ἀκούσαντες ὅς ἐν ταῖς ῥίζαις ἔχουσιν, ἡγούνται βλασάνην ἐν αὐτοῖς ἵπποφελίνου*. Quorum sensus est, Hippofelini autē lachrymā Myrrhæ similis est. Audientesque aliqui hinc esse Myrrham, nasci apud eos Hippofelinon existimāt. Ex quibus facile ratio cinari est, a Theophrasto Hippofelinon dici, quod ab alijs Smyrniō uocatur: peregrinamque Græciæ fuisse plantam, & lachrymam odore & sapore Myrrhæ habere, quod hic semini tribuit. A Myrrha enim, quā Græci Smyrnen uocant, Smyrniō nomen Græcia fecit. Testis Nicander etiam in Theriacis suis: qui Smyrniō uocat, *ἡ δ' ἐστὶ καὶ σμυρνήων ἀνέστη*. &c. adiectiua forma *σμυρνήων* Hippofelinon uocans, hoc scilicet, ut ab illo separaret: addiditque interpres eius, magno Apio, id est, Hippofelino simile esse Smyrniū: uocarique Smyrniū, quoniam Myrrham odore refert: uocari & Coptium, auctore Anacreonte in cōmentario de radicum sectione. Similitudo hæc miscet, & in ueterū historia confundi cogit, quæ alioquin diuersa sunt: ut hic, & alij græcorū medici docent. Poterūtque qui certius nouisse id cupient, colatis inuicē duobus capitibus, duarum plantarū multa inuenisse discrimina: nec natali solo tantum differre, quod ad faciendā naturæ diuersitatē magnas habet uires, sed ex uniuersæ plantæ notis & partibus congeneres quidem, diuersas tamen penitus cognoscere.

D

ἐλαφοβοσκον

De Elaphobosco.

CAP. LXXVIII.

GRæci Elaphoboscon, aliqui Elalphicon, alij Nephriōn, alij Ophigeniōn, nonnulli Ophioctonon, aliqui Herpyxen, alij Limen uocant, Romani Cerui ocellum, Aegyptij Chemin, Aphri Afchancam. Fœniculaceus caulis est, aut Rorimarino similis, geniculatus, folijs duum digitorum latitudine, ut Terebinthi prælongis, aliquantum asperis, circumfractis. Adnata multa caulis habet, ferentia umbellas Anethi similes, & semina eiusdem, florem subluteum. Radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis unius. Candida, dulcis, esui apta. Caulis tener pro olere manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est, hoc pabulo ceruas serpentium morsibus resistere.

ELaphouoscon, ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine. Semen in corymbis dependentibus similis effigie, sed non amarum. Folia oleris atri.

E X M. V E R G. C O M M.

QUæ Elaphobosci, id est, Ceruiocelli (modo id Romani sic appellauerint) a principio tam multæ numerantur appellationes, unā eandemque causam & originem habent, & eam quā hic ipse non procul a fine capitis, & Plinius. 22. uolumine eiusdem numeri capite, indicauerunt: quoniam scilicet fama sit, hoc pabulo ceruos resistere serpentibus. Eo siquidē pertinet, quæ prima illic auditur Elalphicon, id est, ceruina herba, Mox Nebrium, ex eodem euen-

ur: *ρερπιδιον* enim ceruorum inulos Græci uocant. Ophigenium itidem, & Ophioctonon: quarum altera ab enectis serpentibus manifestam habet significatiōem: altera, q̄ serpentes aliquo huiusmodi malo uexet. Corrupta enim est: nec licuit eam instaurare, quemadmodū & eam quæ sequitur Herpyxem. Suspiciari tamen in ea licet, *ἡ τῶν ἱερπιδίων*, quæ græcis reptilia & serpentes sunt, in ea aliquid fuisse.

¶ De Fœniculo.

CAP. LXXIX.

Fœniculum, si herba edatur, aut semen cum pitfana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum, in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. Contra serpentium ictus in uino conuenienter bibitur. Menses ciet. In febribus nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commode temperantur. Extrahitur etiam semine uiridi, ramulisq̄, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia succum reddit gummi similem. Caulem medium dum herba floret rustici demetunt, igniq̄ admovent, quo facilius ui caloris exudans gummi remittat. Quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

BARBARI COROLL.

Fœniculum in Hiberis Hispaniæ laudatissimū, condimentis prope omnibus inseritur. Quin & crustis in panificio apūssime subiicitur.

EX M. VERG. COMM.

Fœniculū, si Nicandro in Theriacis suis, q̄ mox subiiciemus, scribenti credimus, nobilitauere serpētes, gustatu eius senectā exuendo, oculorūq̄ aciem succo eius reficiendō. Versiculi potius eius sunt. *τῆμος δὲ αὐτῶν φησὶ δὴν ἀπιδύρατο γῆρας. μάστιγι τισι τῶν ὄντων φησὶν. ὁμασιν ἀμειδῶσαι. μάστιγον δὲ ἐν χυτῶς ὄρπιξ, βωσκυβίς ἐκκνῖτι καὶ ἀνγκνῖτα τίθειν.* Quorū sensus ille est. Quo tēpore relicta arefcentium squamarū senectute, torpidus & segnis ingrediens, uerū naq̄ tempestate cauū suū fugiens, hebetibus oculis cecutit: uerū depastus Fœniculi comosus ramus, celerem, & claræ lucis eum efficit. Nobilitauere & homines, toto anno quondā uiridi, sicco, seruatoq̄ sale, totaq̄ mensa, non ut nostra ætate sit in secunda, et ad augendā sitim tantū, nec semine solū, sed comā & caulibus utentes. Neq̄ immerito tā multæ in sanitatis & medicinæ usu dotes illi sunt: quas hic scriptor profecutus, labori huic parcere alios uoluit.

¶ De Erratico Fœniculo.

CAP. LXXX.

Graci Hippomarathrū, aliqui Marathin, alij Marathrū agrion, Aegyptij Sampsoth, Magi Thymarnolion, Latini Fœniculū erraticū, aliqui Mion, Galli Sistrameor. Syluestre est Fœniculū, magnū. Fert autē semen Canchry simile. Cuius radix iucūde olet, potaq̄ stranguariæ medet. Menses iposita ciet. Ventrē sistit, radice, aut semine potō. Contra serpentū morsus auxiliat. Calculos cōminuit. Regiū morbum expurgat. Lactis abundantia facit. Decoctum foliorū haustum, scēminas a partu purgat. Traditur aliud Hippomarathi genus, longō, exili & angustō folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturā habet, & uiribus Fœniculo respondet. Ad omnia infirmius.

BARBARI COROLL.

Hippomarathrū, a magnitudine uidet appellatum: q̄d aliqui Mysineū uocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, crassitudine brachiali, radice candida. Nascit in calidis, sed saxosis, tātæ amplitudinis in Mauritania, ut caulis. 12. cubitis assurgat, crassitudine palmorū quatuor.

A

μαρπιδιον

Pli. li. 20. cā. 23.

B

ἡ πομπηρῶν

D I O S C O R I D I S

C

Hippomarathri aliud hoc est, quod tradidit Diocles: foliū habet angulosum, atq; longū.

E X M. V E R G. C O M M.

GRande est erraticum Feniculum. In cuius appellationibus quæ sceminino genere Marathris dicta est, solā habet ex sexu a superiore illo discriminis causam: qualia in hoc opere multa alia audiuntur, quemadmodum agreste Marathrum eandem Hippomarathro significatiōnem. Ferre erraticum Feniculum hoc semen Cachryi simile Dioscorides ait, Cachry id intelligens, quod ab eo in Libanotide mox describetur, & quod in umbella eius fructus concipitur et maturatur: cui erraticum Feniculum hoc similem suam habet.

Δαυκος
Διρκαιον

¶ De Dauco.

C A P. LXXXI.

DAUCUM aliqui Dircaum uocant. Creticum, folijs Fœniculo simile, minoribus & tenuioribus, caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo, semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. Radix digitali crassitudine, & palmi longitudine adolefcit. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus syluestri Apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs Coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario Pastinacæ, semine oblongo ceu Cumini, acri. Omnium semen excalfacit potum. Vrinam, menses & partus extrahit. Torminibus liberat. Veterem tussim mitigat. Phalangiorum morsibus potum in uino auxiliatur. Tumores illitu discutit. Seminis dumtaxat in alijs generibus inualuit usus. In Cretico etiam radicis. Quæ maxime contra uenenatorum iniuriam in uino bibitur.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 25. ca. 9.

D

B A R B A R I C O R O L L.

DAUCUS, quæ a nostris Gallica Pastinaca dicitur, specie Lauri, colore Croci, radice nigra Theophrasto, Dauci quatuor nonnulli fecere genera. Dioscorides & Plinius tria persequuntur. Probatissima in Creta, Mox in Achaia, Patrensi & Spartano agro, & ubiq; in siccis. Priori generi folia etiam hirsuta, caulis rectus, radice suauissimi gustus & odoris. Reliqua genera passim nascuntur, terrenis collibus, limitibusq; nec nisi pingui solo, folijs Coriandri, caule cubitali, capitulis orbiculatis, sæpe plurimis q̃ ternis. Radice lignosa, & cum inaruerit superuacua. Semen Cumino simile: prioris Milio. Album, acre, odoratū omnibus, & feruēs. Secundū priore uchemētius est, eoq; parce sumi debet. Tertium genus simile Staphylino, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc, & hyeme & æstate, quadrupedi sunt intacta, nisi post abortus. Quidā, ut Paulus, & Galenus prior eo meminit, Daucū nihil aliud esse uoluerunt, q̃ Staphylinū syluestrem: q̃ uidetur a Dauco aliud genus esse Daucos herba cognominata, apud Galenum duas Daucos seorsum indicantem. Nisi quis librariorum accuset, q̃ quæ Galeni non sunt, adiecerint. Hippocrates Daucum Aethiopicam laudat.

E X M. V E R G. C O M M.

MAsculino genere, & neutro Daucum dici in antiquis obseruauimus. Nos hunc scriptorem secuti, masculino eum semper indicauimus. Quodq; inter appellationes eius male, Dircaon legebatur, ex Nicandro in Theriacis Daucion emendauimus. Sic enim ille appellauit. Δαυκων γίγασ τετρωνάδιον, quod est, Daucium, & Bryoniae uitis radices. Fuerunt etiam in antiquis, qui Daucum scriberent, duoq; eius tantū genera facerent, Creticum, & Asiaticum: hic tamen tria, Plutarchus uero plura Daucorum fecit genera. Illud etiam a principio statim quod hic ait, habere Creticum Daucum Fœniculo similia folia μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα. Quorum nisi uerbum sit, sensus est, minora tamē & tenuiora: Plinius & Plinium secutus Barbarus, candidiora dixerunt, quasi λεπτότερα, non λεπτότερα legendum sit.

Δελφίνιον

¶ De Delphinio.

C A P. LXXXII.

DELPHINIUM Græcis Diachysis, alijs Diachytos, alijs Paralysis, alijs Camarus, alijs Hyacinthus, alijs Delphinias, alijs Neriaz

dion, aut Sosandron, aut Cronion, Romanis Bucinus minor uocatur. **A** Surculos emittit a radice una sesquipedales, aut maiores, a quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quae Delphinorum effigiem representant. Vnde tractum nomen est. Flos uiolae albae non dissimilis, purpureus, & sement in siliquis, milio proximum. Quo non aliud utilius bibi potest ab scorpione percussis. Aiunt enim, obiecta haerba, scorpiones resolui, atque ignauos torpescere. Semota uero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis.

¶ De altero Delphinio. CAP. LXXXIII.

Alterum est Delphinium, quod Romani Bucinum uocant, superius simili, sed folijs & ramis longe gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

EX M. VERG. COMM.

Quam nostra aetas Senam officinis omnibus & uulgo nota uocat, antiquitas, ut opinati aliqui sunt, Delphinion appellauit. Posterioris & quo nunc medicina utitur nominis incerta ratio nobis & causa: antiquioris notissimi nauitis in mari pisces autores sunt: repando dorso, repandas Delphinij huius siliquas, non folia a se uocari & indicari gaudentes; ut non tantum maris honor Delphinus esset, sed haberet nutritrix & parens omnium terra quod ex eo pisce in futurum humanitatis nostrae sensu quodam attulit, sic etiam in plantis aliqua esset quae Delphinorum figura, repandoque siliquarum suarum inflexu salutem homini faceret. Eiusque beneficii merito Sosandros etiam diceretur. Id enim ea uox significat. Dictumque Delphinium hoc Sosandros est, quod τὸν ἀνδρῶν σώζω, id est, uirum & roboris firmitatem seruat. Fuerunt qui mutata tantum declinationis forma, Delphiniada, s. herbam uocarent, & qui a floris figura Hyacinthum. **B** *ἡ αὐτὴ* enim a graecis, id est, Hyacinthinus flos eius describitur. Legitur postremo inter appellati ones has a Romanis Delphinium hoc Bucinum minorem dici, quod nullibi hactenus comper tum nobis est. Facilis tamen nominis coniectura, ut enim graeci a Delphinis & ex mari nomen illi fecerunt, sic posteriores etiam latini potuerunt ex eodem elemento, sed ab alijs piscibus eam indicasse. Sunt enim Bucini in purpurarum genere, sed non repando dorso ut Delphini. Quod mirum quod in Delphinio hoc illud est, nihil agere de eo Plinius: nec Delphinij aut Sosandri, quod hactenus legerim in tota eius historia, sub his nominibus unquam meminisse. Nihil etiam Pauli Aegineta: qui cum medicam omnem materiam lib. s. per capita numeraret, quotidiani in medicina usus herbam, remediumque relinque non debuerat. Dubitamus ob eam causam, latere in antiqua etiam medicina Delphinium hoc sub appellatione aliqua alia.

¶ De Pyrethro. CAP. LXXXIII.

Pyrethrum aliqui Dorycnion, alij Pyrinon, alij Pyroton, aut Pyrothron, alij Arnon pyriten, Magi Pyriten, Romani Saluareni uocant. Folia caulemque emittit ut Daucum syluestre, & Foeniculum, umbellaeque Anethi circinatae rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit. Ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis rigoribus efficax. Contra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximie conducit.

BARBARI COROLL.

Pyrethro depictum coloribus umbraculum, purpureo, cadido, luteo, porraceo, ut scripserunt quidam. Sunt qui hanc interpretentur quam uulgo rustici & olitores, Draconem Acetarium uocant, ut aliubi notauimus, omnino dissimilem eius quam Dioscorides hoc capite demonstrat. Sed aestimanda res tota diligentius.

Phil. II. 25. ca. 9

C Non dedit ut forte opinabitur aliquis in græcis Pyrethro nomen ignis, sed qui in ea similis igni feruidus sapor est. Qui tantus adeoque uehemens in ea sentitur, ut plures in gentibus ab eadem uel appellationes inuenerit. Quæ enim in hoc scriptore numerantur *ὑπερ τοῦ πυρός* incipientes uoces, eandem omnes habent causam: & quæ Romanorum appellatio fertur Saliuaris herba, a feruidi saporis eius euentu causam & originem duxit. Commāducatum enim copiosam oris saliuam proritat: qua potestate plerumque sunt feruida omnia: ideoque ueteres græcorum medicos ad purgandas capitis pituitas eo utebantur. Præcipitque id inter cæteros Paulus Aegineta lib. i. capite quo de purgantibus caput apophlegmatismis agit: qui græcis sunt medicamenta omnia quibus per os capitis pituita purgat. Hanc ipsam non Pyrethron, sed Pyretida Nicander in Theriacis suis uocauit. Versiculus eius est, *ἄποτι δ' ἡ ἐλαιοῦς πυρετίδος ὑψηλὰ πόλλα*. Cur autem Dorycnion uocari etiam feratur, incertum nobis est. Inter uenenam enim Dorycnion numeratur, ut sexto uolumine priuatim dicitur.

νεανωτις

¶ De Rosmarino. CAP. LXXXV.

Duo Rosmarini genera. Alterum fructiferum, aliquibus Zea, aut Campsanema appellatum. Cuius semen Canchrys uocatur. Folia Fœniculi habet, crassiora & latiora, in Rotæ speciem humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis comæuuum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum. Quod in mandendo linguam exurit. Radix Tus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylylion odoratum, minime exurens, radice foris nigra, intus alba. **D**rum id quod sterile dicitur, illorum plane similitudinem refert. Sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium hærbæ communiter hæmorrhoidum profluvia sistit. Sedis inflammationes, & condylomata mitigat. Concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem ægre perducuntur. Sicque radices cum melle ulcera purgant. Torminibus medentur cum uino potæ. Et contra serpentium morsus conueniunt. Menses & urinas cient. Veteres tumores illitu discutiunt. Tam radices quam hærbæ succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. Si comitialiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. Regio morbo laborantibus, cum uino & pipere datur. Sudores mouet cum oleo perunctum. Ruptis & conuulsis prodest. Podagris cum lolilacea farina, & aceto tritum illinitur. Purgat uirilignes, addito aceto quam acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Canchryn non ferat. Quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum Erica nasci, folijs Lactuicæ syluestris, asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus autor est. Potumque id ipsum alterutra parte purgare.

καρχρυ

¶ De Canchry. CAP. LXXXVI.

Canchrys uim habet excalfaciendi & uehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluator.

BARBARI COROLL.

Libanotidis uocabulo, multa genera feruntur. Vnum inter Cunilagine a nobis dicendum. Alterum, de quo hic, in species ternas diuisum. Tertium coronariæ: quam Rosmarinum proprie uocari Dioscorides existimat. Libanotis porro, de quo præsens caput loquitur, radicem habet Olusatris: locis putridis, macris, faxosis, & roscidis prouenit: feritur semine, quod quidem fertili Rosmarino, scabrum & oblongum a Theophrasto redditur, folio palustris Apñ, minore multo, sterili, folium Lactucæ syluestris & amaræ, candidius & asperius, radice breui. Vestibus interposita Libanotis, abigit tineas. Carpitur per messem fertilis. Caulis quoque, non modicum semen, resinaceus. Folij & radici odor Turis, unde nomen. Libanotidem cum Erice lætissimam nasci Theophrastus inquit. Theodorus locum, non ubi Erice, sed ubi dictum est, conuertit, pro eo quod est ὅπου ἰσχυρὰ, legens ὅπου ἰσχυρὰ, librariorum græcorum sanæ culpa.

EX M. VERG. COMM.

Plures quondam non Dioscoridi tantum, sed cæteris græcorum herbarijs & medicis omnibus Libanotides fuerunt: ut eodem Turis cognomine omnes, sic non eodem eius odore insignes. Vna enim, & quæ Canchry fert, primo & perse, quæ radix eius Tus olet, ab eo indicari merita est. Cæteræ aut congeneres, aut aliqua parte illi similes, in censum et nomen eius uenerunt. Satisque certa earum diuisione hic usus, posteriores græcorum medicos & herbarios alios subscribentes sibi habuit. Siquidem omnes, excepta Coronaria, quæ statim ab ijs describetur, tria eius genera fecerunt. Præcundam, fructumque ferentem. Et hanc duplicem. Tum sterilem nuntiantes: peregrinas, ut nos credimus, Italiæ plantas, & quarum omnis miscetur historia, si Theophrastus audiatur, præsertimque in foliorum figura. Quæ palustri Apio in primo genere, in sterili uero amaræ Lactucæ similia ille facit. Cum hic Foeniculo comparet, & crassiora tantum, latioraque esse dicat: quæ una foliorum forma, uulgarem nostratam & coronariam Rosmarinum cognomen ille fecit. Alioquin nulla erat ex similitudine causa, cur quondam Libanotis, & nunc tota græcia Dendrolibanon coronaria Rosmarinus diceretur: nihil enim simile, commune illi aliud habet. Quodque facile ex historia earum intelligat aliquis tota, & iudicet diuersa. Siquidem coronaria Rosmarinus frutex magis, quam herba, ramos habet: illæ caulem, & quæ fructum inter eas ferunt, umbellam etiam. Hæc a terra erigitur, illæ per terram folia spargunt: & ne longiores simus, plures habent illæ notas quibus a Coronaria separantur: quinetiam in folijs prius illud genus suas habet itidem differentias. Quo autem maxime differunt Canchry, est: quod in secundo utroque illo genere in summo caule simile arborum Canchryi surgit, in quo concipitur & maturatur semen. Quid autem Canchrys sit, & quomodo in arboribus nascitur, dictum iam pridem a nobis est. Quæ una nota a coronaria Libanotide, reliquum omne hoc genus præcipue separat. Nec Nicander aliter eam signat in Theriacis suis, ὅταν γυμνασίου ἴδων περιβαλλομένην, quod est. Sumito & calidam radicem καρχηδοῦσαν, i. cachry hoc ferentem Libanotidis secundum illud genus significans. Rursus ἡμίγυα καρχηδοῦσαν Libanotidis, quod est. Simul cum Libanotide cachry ferente. Vna autem hac nota Libanotis præcipue discernebatur, quod in medicina cachryos huius, i. seminis tantum usus esset. Eaque ob causam seorsum a reliqua planta Paulus Aegineta de eo egit, fructum, seu seminem Libanotidis uocans: uiresque illi extendi, discutiedum, & calefaciedum tribuens. Vt illo etiam est ex oleo contra febrium perfrictioes, & cum tremore algores. Duplexque illud Libanotidis genus secundum ex cachry hoc dictum est. Tertium enim quia eo caret, ideo ἀκαρπον sterile & sine fructu a græcis nominatur: prioribus præterque in hoc simile.

De Rosmarino coronario. CAP. LXXXVII.

Rosmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, et circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, superne uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur, & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoque unguento ammisceri solet.

BARBARI COROLL.

Libanotis Coronaria, differt quidem folio a prioribus, sed comprehensa forte a Plinio est inter fertiles. Nisi quis hanc pro Cunilagine accipiat. Ea quæ Libanotis uocatur, & in coronas admittitur, Paulus, & Galenus, Dioscoridem secuti, quatuor Libanotidis genera connume-

Hij

A

Pli. li. 19, ca. 12

B

D I O S C O R I D I S

C rat. Vnam sterilem. Fœcundas duas, Quartam generis coronamentarij: quam a Romanis præuatim Rosmarinum dici uolunt, etiam si priora quoque genera Plinius ita uocari prodat.

EX. M. VERG. COM.

Coronaria quondam uulgaris hæc nostras Libanotis fuit: nec certior habuit hic scriptor nota qua legentibus eam indicaret. Quotidianus enim hic usus eius erat: necessebanturque in coronis ramuli eius non aliter quam Serpillum, & quæ alia Theophrastus περιφραδα uocat, toto corpore odorata. Nunc alius eius usus est. Descripsit eam satis Diosc. nihilque in tota foliorum figura desiderari potest. Vnaque hæc foliorum similitudo, quæ omnibus in se par æqualisque est, et qualiter paulo ante in coronaria hic descripsit, in Libanotidum nomen et censum eam asciuit. Quæ licet in priore illo genere fœniculacea sint, ut hic ait, eamque ob causam περιφραδα, i. comosa & capillata: nihilominus quoniam in comoso illo habitu latiora & crassiora Fœniculo sunt, ad formam foliorum Libanotidis huius, i. coronariæ nostratiquæ Rosmarini accedunt. Fitque hæc illis eatenus tantum similis: Quatenus enim Tus Libanotides alia olent, nihil huic simile habent.

σφονδύλιο

De Sphondylío. CAP. LXXXVIII.

Sphondylium aliqui Arangen uocant, alij Phalangion, alij Astereion, nonnulli Nesyryn aut Sphondylin, quidam Chorodanon, aut Oenanthen, Romani herbam Rutinalem. Aegyptij Apsaphæar, Magi Osirin. Folia Platani & Panacis habet. Caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex Sefeli simile, sed latius, candidius & magis paleaceum, grauis odoris. Flores eius albi, aut pallētes. Radice Rhaphani candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocineris uitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uuluarum strangulationi. Vternosos suffitu reuocat. Cum oleo comode infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus. Cum Ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris uitia. Circumrassa eadem, callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accomo datur. Qui cæterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

BARBARI COROLL.

Sphondylii succus qui exprimitur, mire appetitur a muscis, & quæ sunt illis similia. Sphondylium ferula est, differens a Panace folijs, quia sunt minora & Platani diuisura. Non nisi in opacis gignitur, in palustribus Patavini agri sæpe uisum. Huic semen eodem nomine medicinae tantum utile.

υέρη

De Ferula. CAP. LXXXIX.

EViridi Ferula medulla pota, utilis est ad cruentas excreationes, ecceciacosque. Contra uiperarum morsus in uino datur. Erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxilium. Sudores ciēt, uncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt. Muria condiuntur. Ferula itaque caulem profert ternum sæpe cubitorum, folia Fœniculi, longe asperiora, & latiora. Qua ab imo caule uulnerata, Sagapenum efficitur.

BARBARI COROLL.

Ascribitur arborum generi Ferula: quoniam teneritudo eius processu transit in lignum. Propterea Clearchus inter quæstiones lusorias, quas nostri Scirpos, Græci Gryphos, & Aenigmata uocant, Ferulam dicit esse, lignum non lignum: sicut Pumicem, lapidem non lapidem: & Noctua, uolucrem non uolucrum, Calidis Ferula nascitur locis, atque trans maria, geniculatisque

Pli. li. 13. ca. 22
lib. 10. cap. 23.
lib. 24. cap. 1.

A uices nodata scapis. Duo ei genera. Narthecem Græci uocant, assurgentem alte. Nartheciā uero semper humilem: quæ ab aliquibus Ferulago dicitur. Quāq; et Thapsia Ferulago appellari solet. Est & instrumentum medicinale Ferula, siue Narthex. A genibus folia exeunt grandia, mollia, multifida, maxima, ut quæq; terræ sunt proxima: caulē amplectantia ut Harundines: sed magis scinditur in coliculos, quibus flores lutei & semen Anethi paulo maius insidet, sed quæ ab uno caule diuiditur in cacumine, femina putatur. Germinat uere primum folio, tū caule: qui annuus ei est. Radice singulari, profunda. Ferulæ lignum omne corticis loco habent, hoc est, forinsecus: ligni autem uice fungosam intus medullam, ut Sambuci. Nonnullæ inanitatē, ut Harundines. Nulli fruticum leuitas maior. Ob id senectuti Baculus. Semen Ferulæ Thapsiam uocauere aliqui falso. Hoc in Italia cibus est. Conditur quippe, duratq; anni spacio in urceis. Caules quoq; decocti eduntur. Commendanturq; musto & melle. Corymbiam nominant: sicut racemos eius quos item condiunt Corymbos: quibus & in coronas utebantur. Ignem Ferulis optime seruari certum est, easq; in Aegypto præcellere. Natura Ferularum Murrenis infestissima. Moriunt ea tactæ. Alinis gratissimæ sunt in pabulo. Ceteris iumentis præsentan eo ueneno: qua de causa id animal Libero patri assignatur: cui & Ferula. Ferulā nō minus a feruendo dictam uideri facit Hippocrates: qui eam Plestinga uocauit. Inter fortunatas insulas, Norion uocatur. In qua Ferulæ tanta crescunt amplitudine, ut arbores fiant. Earum nigræ succo amarissimo damnantur: candidæ probantur, adeo, ut poculentus quoq; sit.

EX M. V. E. R. G. C. O. M. M.

B Ondiebat quondā, seruabaturq; sale ad cibos Ferulæ coliculus toto aīo: si huic scripto ri primū, mox Columelle credimus. 13. operis sui uolumine, cap. 7. iubenti cum plerisq; alijs oleribus & hunc condi. Nec fuit hic usus parum in ea laudandus: & si copiosior eius cibus capitis dolores faciat. Primas enim mensas in acetarijs, secundas uero cū obsonijs cocta multa frugalitate instruebat. Eadem senectuti, & a longa ualitudine se recolligentibus auxilio fuit, et adhuc est: quoniam nulli frutici leuitas maior, et cum leuitate ligni firmior duricies, & rigor. Quā etiam ob causam Libero patri, Sileno, alijsq; numinis eius comitibus dedicata & concessa est, ut infirmos in ebrietate pedes leui hoc pedamento regerent.

De Peucedano. C A P. XC.

P eucedanum aliqui Agrion uocant, alij Agriophyllon, Magi bonum demonem, Romani Satariam. Caulem emittit tenuem, gracilentum, Fœniculo similem. Comam habet statim ab terra foliosam, spissamq;. Flore luteo, radice nigra, crassa, firma, graui odore, succosa. Gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; e plaga succus, umbræ mandatur. In sole siquidem confestim euanesceat. Colligere capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiatnr. Assata radix utilior fit. Tam lac, q̃ succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e Mandragora. Verum inefficacior lacte succus habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma Turis similitudine, caulibus, radicibusq; adherens. Præfertur succus e Sardonia, & Samothrace, colore ruffo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitū, pdest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. Omnibus in uniuersum uitijis neruorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant uulux strangulatus, & ueternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Auriū doloribus conuenienter ex rosaceo insillatur. Cauernis dentiū inditum, mitigat dolorem. Contra tussim efficacissime ex ouo assumit. Suspirijs, torminibus, & inflamationibus subuenit. Ventre leniter emollit. Lienē absūmit. Dif

C ficiles partus mire adiuuat. Facit ad uesciæ cruciatus, & renum diffen-
tiones potum. Vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est. Sed ineffica-
cior. Eius decoctum bibitur. Farina eius sordida ulcera purgat, & ue-
tera cicatrice obducit. Squamas ossium extrahit. In carata & calfacien-
tia malagmata additur. Eligi debet recens, esu difficile, firmū, odoris ple-
num. Succus ad potiones amaris nucibus, aut Ruta, aut pane calido,
aut Anetho resoluitur.

Pli. li. 25. ca. 9
lib. 26. cap. 7.

P Eucedanum, siue Peucedanus nomen a Pinu inuenit, ut Myrtidani a Myrto, quanq̃ &
amaritudinem uocabulum id significat apud poetas, celebrata inter primas herba. Laudatissi-
mum in Arcadia Plinius existimat. Foditur exitu autumnī. Placent tenerrimæ, & altissime ra-
dices. Hæ conciduntur in digitos quaternos osseis cunctellis, funduntq̃ succum. Probatu hic
& crassitudine mellea, & odore suauiter graui. Peucedanum officinæ ostendit quale Dioscori-
des in cætera tantum, radice non succosa, sed lignosa, nec graui odore, sed iucundo. Quod nos
admonitionis causa dictum uolumus.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G C O M M.

F Ecit Pinus, quæ græcis Peuce dicitur Peucedano nomen: non congener eongeneri, aut simi-
lis simili planta, sed speciosa & procera arbor, parem folio tantum sibi humiliorem fruticem,
ut inter homines quotidie fit, sola eius partis similitudine in genus & nomen suum sibi adopta-
uit: quod posteriores intelligentes latini, Pinastellum eam uocauerūt. Cuius uocis autor Apu-
leius est. Sic enim emendanda est quæ corrupte in impresso codice Pinastellum legitur. Idem
quod in Diosc. simpliciter agrion nominatur, ab eo Sison agrion dicitur, quasi ex similitudine
Peucedanus hæc Sison etiam diceretur, de quo non multo ante actum est, sed syluestre. Nobis
uero ab re non fore, si quis suspicetur, deesse uoci illi agrion, quæ syluestre significat Marathrum:
ut quoniam similes illi caules, & capillata folia habet, syluestre Marathrum diceretur. Quem
admodum quod sequitur Agriophyllon, agreste Feniculū potuisse quondam legi. Suspiciones
tñ hæ sunt: nec nos aliquid mutare ausi sumus, præterq̃ ex Apuleio agrion .i. agreste Sisonē
uocari Peucedanum inter alia dicentes. Quæ nō tñ a Peuce arbore dici in græcis potuit, q̃ ab
amaritudine, quæ in eadem gente eadē illa uoce indicatur. In Arcadia nasci Peucedanū Theo-
phrastus ait. 9. de plantarum historia uolumine. Verba eius sunt *γινεται δὲ ἐν ἀρκάδιᾳ*. Quem
autorem secutus Plinius lib. 25. cap. 9. laudatissimam in Arcadia nasci tradidit: tam aperte, tam
q̃ uetusto autore, ut non dubitandum fuerit, in Arcadia ne, an in Sardinia legendus locus sit.
Theophrastum enim secutus Plinius est. Neq̃ obstat q̃ hic dixerit, expressum in Sardinia et Sa-
mothrace liquorem, probatissimum esse. Hic enim succum in his gentibus expressum lauda-
uit, illi plantam in Arcadia nasci laudatissimam dixerunt. Eius in antiqua medicina multus fu-
it usus. Tradiditq̃ hic inter cætera, mederi Peucedani liquorem conuulsis: Græci *καρμυσίν* *ὑδὸν*
καὶ ἀμύραν uocant, Romani græcæ uocis imitatione, conuulsa appellauerunt.

Μελάνθιον

De Gith, seu Melanthio. CAP. XCII.

G ith ex Græcis aliqui Melanthium, alij Mecona agrion mela-
na, Romani Papauer nigrum appellant. Exiguus frutex est,
sæpe binos palmos excedens. Folijs ut Senetionis minutis, sed multo
tenuioribus. Capitulo in cacumine tenui, ceu Papaueris oblongo, in-
tercurfantibus intus membranis. Quibus semen includitur nigrum, az-
tre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum
fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex liri-
no, & infusum naribus. Tollit lepras, lentigines, duricias, tumoresque
uetustos cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cū uere-
re uino impositum. Dentium doloribus decoctum cum aceto & redā

prodest. Teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. De stillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo & olfactum. Vrina & menstrua ciet, multis diebus sumptum. Et lac extrahit. Difficultate spirandi cum uino potum leuat. Phalangiorum moribus ex aqua drachmae pondere haustum auxilium. Incenso serpentes fugant. Tradunt largius epotum enecare.

MELANTHION, qd & Melanspermon, & Melanthe interim ab Hippocrate uocat: & a Theophrasto, ut Theodorus existimat, Anthemion, siue Anthemion, Nigellam interpretatus. Quod Anthemion oino alia species est, quam Melanthion, siue Git, siue ut Palladius, Giddi. Nam & Melanthemon Chamemilon est, Melanion uero nigra Viola. Optimum Git, quam excitatissimi odoris, & quam nigerimum. Culices suffitu necat, & mulcas. Succum eius largius sumendum, uenenum esse, mirari licet: cum semen ipsum, inferiorem crustam panis, cereali sapore condit gratissime. Aliud oino genus uidetur esse Git, qd in segetibus passim nasci cernitur: & Pseudomelanthion uocari potest, & Gitago, folijs fere Porri oblongis, flore purpureo, semine ac toto frutice maius quam Melanthium, nec odoratum. At uerum Git, de quo praesens Dioscoridi mentio est, folium habet Foeniculi, Senetionis uel, florem ceruleum. Odor semini iocundus, nec ubique provenit. Hippocrates Cyprium commendat. Alia est herba Melandryum, in segete pratisque nascens, albo flore, odorata, cuius cauliculum iocineri tritum, ex uino uetere probant.

Pli. li. 20. ca. 17.
& 22. ca. 21.

EX M. VERG. COMM.

Ident Maio & Iunio mensibus in pratis, sepibus, limitibusque omnibus nascentem rura omnia Nigella: nihilque eo frutice frequentius, simul & uilius. Quondam grato sapore panem Nigellae semen commendabat. Insupergebatur enim ante cocturam illi tritum, quemadmodum & Papaueris: non aliter quam & nos modo dulcarijs potius quam panis Anisum miscemus. Quod in Nigella merito miratur aliquis, sagacis naturae artificium est, in conformandis eius uasculis: quibus concipitur, maturatur, & seruat semen, colore nigrum, Panici seminis magnitudine. Sunt ea uascula longe papaueraceis minora, nec in mensura sua, ut illa longa. Nulla praeterea habent quale Papauera in summo stellata, sed latiore umbilico: neque intus eodem modo discurrentes membranas seminum locos dissepientes. In Papauere enim sulcorum modo intercedente, quasi aggere quodam canales sunt: in Nigella per medium transeuntes, quasi parietes, quibus loculamenta illa seminum diuiduntur. Est illud discrimen etiam, quod singula in singulis Papauerum caulibus uascula sunt, in Nigella numerosiora: ut quod numero seminum in singulis uasculis deest, uasculorum numero expleat. Solaque haec uasculi forma fecit, ut syluestre & nigrum Papauer a quibusdam Nigella diceretur. Graeci a colore seminis Melanthion, & eorum exemplo latini Nigellam nominauerunt.

De Laserpicio, & Lasere. CAP. XCIII.

LAserpicium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem Maspetum uocant. Folijs Apio similibus, lato semine. Radix excalfacit. In cibis aere concoquitur. Vesicae noxia. Sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum caerato, medetur. Ischiadicis conuenit cum Irino, aut Cyprino caerato. Excrescentibus circa sedem tollendis, illinitur cum putamine mali punici & aceto decocta. Venenis pota resistit. Os commendat, cibis aut salis permista. Laser e radice, atque caule scarificatis colligitur. Praefertur autem rufum translucent, Myrrhae aemulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu. Quod dilutum facile albescit. Syrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo, ut ne os quidem gustanti, nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus uiribus ualent, & grauiorem reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat adulteratur sagapeno, aut fabae lomento. Quod maleficium deprehenditur gustu, odore, uisu.

H. iiii

C & madefactione. Caulem aliqui Silphion, radicem Magudarin, & folia Maspeton uocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caulis. Acrem uim habet. Inflationes facit. Perunctas cum aceto, pipere, & uino, alopecias sanat. Oculorum aciem exacuit. Incipientes suffusiones, illitum cum melle dissipat. Cauernis dentium in dolore inditur, aut cum Ture in linteo circumligatur, aut cum Hyssopo, Ficis coctis in posca, os colluitur. Iis prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immisum. Valet aduersus uenena telorum, & animalia omnia quæ uirus eiulantur, potum, aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangrænis præcoërcitis immittitur. Et cum ruta, nitro, & melle, uel per se carbunculis. Clauos, callosq; prius circumrafos uellit. Carato, aut aridorum ficuum carne præmollium, recentes Lychenas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, polyposcq; si alia quot diebus cum atramento sutorio, aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabricijs opitulatur. Grauem, subitoq; irruentem uocem, dilutum aqua sorbitione confestim expedit. Vuam illitum cum melle reprimat. Anginis ex aqua mulsa utilissime gargarizatur. Vescentes eo, latiore colore mangonizat. Tussi commode in forbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus. In fellis suffusione, & aqua inter cutem cum aridis Ficis. Rigores discutit cum uino, pipere, & Ture potum. Neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum. Hærentes gula hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur. Comitialibus ex aceto mulso proficit. Menses ciet cum pipere & myrrha potum. Coeliacos adiuuat in acino uuæ sumptum. Cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potiones resolutur, nucibus amaris, aut ruta & calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expeditendam arteriam, maxime cum uox retunditur. Eo cum lactucis utuntur, exitq; in uicem Eruæ. Fertur & altera Magudaris in Libya nasci. Radix Laserpicio similis, sed minus crassa, acris & fungosa. Ex qua non profluit succus. Eiusdem cum Lasere facultatis.

Pli. li. 19. ca. 7.
lib. 22. cap. 23.

B A R B A R I C O R O L L.

Silphio, id est, Laserpicio, radix crassa, multaq; Caulis annuus, altitudine & crassitudine quasi Ferulæ. Foliū simile Apio: qd ineunte uere profilit, deciduūq; est, eximū purgando & saginando pecori. Carne mirabilem in modū iocunda. Folio amisso, caulis emicat: qui omnibus modis paratus igni manditur, hominēq; diebus quadraginta purgat omni uitio. Semen ei latum, foliaceum. Succus duplex e scapo, Caulias uocatus. E radice Rizias, uilior ac putrescens. Radici cortex niger, qui & detrahitur ad mercis adulteria. Præparatur uero succus admixto fursure, aut farina. Subinde concutiendo uas, quatenus ad maturitatem perducant, id est, quatenus sudare desinat, & colorem suū capiat. Ita inueteratum a situ uendicant & carie, Laser uocantes. Perlucidior hic & purior a radice, dulcior a caule: ob id farina inditur, ut coëat. Natum ferunt Silphiū hymbre crasso & piceo, repente madefacta tellure circa Hesperidum hortos, Syringq; maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenarū conditum. Vim autē illam, quatuor stadiis

rum spacio in Africa ualuisse, rem ueram & contumacē, atq; si coleretur, in deserta fugientē. Quidā radicem Laserpicio maiore fuisse cubitali perhibent, e cuius medio caput sublime conspiciedumq; tuberet, unde primū succus eui lacteus erumpat. Supernasci caulem Magydarin uocatum. Quāq; & semen eius quoq; Magydaris ab aliquibus dicitur, ut Galenus scribit, folio aurei coloris: quo seminis uice, austrinis flatibus decusso, a canis ortu Laserpiciū nascatur: eodemq; anno & scapum, & radicem aboleri, solū circumfodi subactum, glutumq; fieri. Radices eius recens præfectas ex aceto mandi. Pecora non purgari eo, sed si ægrotant, aut sanari protinus, quod fere consequitur, aut emori. Prior opinio uidetur persico Silphio congruere, multo infra Cyrenaicum nascenti. E Syria quoq; importari maxime solebat, Parthico, siue Persico deterius, Medico præstantius. Aetius Laser a Cyrenaico lacte separauit, siue quia Laser succus ipse Silphij, non lac esset: siue quia Laseris appellatione Persicum, aut Medicum, ut cognobiliora, non Cyrenaicum ueniret: quippe quod ad pondus argenti denarij pendebatur, multisq; iam annis, ut Plinius ait, non inuenitur. Cum comedit ouis caulem, protinus dormit, capra sternutat. Tauros inflammat naribus illitis. Serpentes auarissimas uini admixtum rumpit. Præcipitauit se quidam ex alto, cum in dentium dolore cauis addidisset inclusum cæra. Laser Græci Opon uocant. Et quāq; Opos manantem hærbæ cuiusq; succum, ex uulnere significet, Cyrenaicum tamē absolute pronunciatum indicat, ut Varroni placet: qui coagulari lac eo tradit. Post Cyrenaicum auctoritas deinde Medico, & Syriaco, ut Galenus inquit, Hippocrates, Phyllon Libycon, & Aethiopicum uocando ipsum Silphij semen significat Galeno: ut qd præ sua latitudine foliaceum sit. Interim Phyllon uocat hoc, nec adicit Libycum. Radicem huius proprie Silphion appellat. Caulon uero, & eccaulema, scapum, id est, colem, ut Herodotus. Solini quoq; uerba de Silphio subiiciam. Apud Cyrenenses inquit Syrpe gignitur, odoratis radicibus, uirgulto herbido magis quā arbusculo: cuius e culmo exudat æstatis tempore pingue roscidum, idq; pascentium hircorum inhaeret barbulis: ubi cum arefactum inoleuit, guttis steriacis legitur ad usum mensarum, uel medelæ potius. Dictum est primum inquit Syriacum, quia manat in modum lactis. Deinde usu deriuante, Laser nominatum. Paulo post Asbiæ inquit, uiuunt Lasere, hoc aluntur, hoc illis dulce est. Ex his uerbis Solinus satis indicat, se de Silphio loqui uoluisse quidem, sed parum nouisse quid diceret, ita salebrosus & desuetus in eo genere sermo eius est. Plautus in Rudente.

Speras inquit tibi multum hoc anno futurum Syrpe & Laserpiciū. Sed cur Varro Draconon appellari dicit ipsum lac Cyrenaicum? An non Draconon, sed Diaconon legi potest: quia odorem intentum & uehementem habeat: & an Draconon a colore rubro. Talis enim præfertur, nam & herba Rubia, quandoq; apud Græcos Cinnabaris, & Draconon uocata est, auctore Dioscoride.

Magydaris siue, Magudaris, a Laserpicio differt teneritudine. In Syria & Parnasso monte plurima. Theophrastus & Plinius in Libya eam nasci pernegant. Sunt qui & hanc Laserpiciū appellent. Periti uero facile discernunt uel aspectu.

EX M. VERG. COMM.

Longissime omnium Theophrastus de Silphio in sexto de plantarū historia egit. Licetq; Plinius, & præter Pliniū plures alij plantam, partesq; eius omnes longiore historia illustrauerint, nihilominus quoniam cuncta alij ab eo acciperunt, singuliq; aliquid, quod dixisse oportebat, reliquerunt, operæ precium erit, ex eo scriptore iisdem uerbis omnia semel reddidisse. Quæ huiusmodi sunt. Habet Silphium numerosas radices, & crassas: caulem qualis in Ferula est, & crassitudine illi æqualem. Folium, quod Maspeton uocant, Apio simile, Semen latum, foliaceumq;. Caulem non ultra annū prorogat, quemadmodū & Ferula. Vereq; primū folia & Maspeton hoc profert: quo oues mirifice purgantur, & pinguescunt, egregia odoris suauitate carnes cōmendans. Post hæc caulē profert cibus quocunq; modo aptum. Tostus siquidem, & elixus estur. Feruntq;, quadraginta diebus corpora purgare. Destillat duplicem liquorem Silphium: a caule alterum, ab radice alterum. Vocantq; hunc a caulibus Cauliam, illum a radicibus Rhiziam. Habet radix nigrum corticem: auferuntq; in usu eum. Sunt & radicem, sectionisq; mensuræ quædam, quibus quantum oportet, cedunt, reliquum ad sectiones seruantes. Neq; enim in secando errare, neq; ultra q; constitutum sit secare oportet. Corruptur enim, putrescitq;, si aliter fiat. Curant autē in Pyraeo, Athenas ferentes Silphium hoc modo. Cum in uasa coniecerint, farinam illi miscent, multoq; tempore cōmouent: eaq; tractatione colorem contrahit, rationeq; hac curatum incorruptum permanet. Quæ igitur in secando, curandoq; Silphio seruanda sunt, sic se habent, Libya latos occupat campos: siquidem spacio ultra sta-

Cdiorum quatuor milia nascitur: copiosumque provenire ab Hesperidum hortis ad Syrtim. Proprium illi est, cultos odisse locos: & si colatur, in deserta fugere, velut id quod ferum sit, & culturam non indigeat. Narrant Cyrenæi, septem ante conditas Cyrenas annis apparuisse. Ex quo autem ædificata urbs est, trecenti intercesserunt anni, magistratum gerente Athenis Simonide. Et hæc quidem sic ferunt aliqui. Alij radicem Silphij ferunt cubitalem, pauloue ampliorem nasci: tumereque in medio veluti caput, quod sursum in sublime fertur, pauloque minus quod supra terram emergit. Ex qua erumpit quod Lac vocatur. Tum caulis. Et post hunc quod Magydaris, & folium dicitur, quod semen est. Cumque ualidus spirauerit Ausser post caniculares dies, uenit id spargi: ex eoque nasci Silphium. Eodemque anno radicem fieri, & caulem. Verum non est hoc Silphij proprium. Habent enim & alia. Nisi hoc forte dicunt a sparso semine statim nasci. Quod uero priuatim, & ab alijs diuersum Silphium habet, illud narrant. Oportere annum fodi. Si enim relinquatur, semen totum, caulemque proferre, deteriusque ea ratione fieri & hoc, & radicem eius. Narrant præterea, fieri meliores circumfollas radices: quoniam renouetur terra. Sed hoc contrarium illi est, quod dicitur odisse culturam Silphium. Narrant & comedidi radices recentes in acetum concisas, & folium colore auri esse. Contrarium his etiam, purgari oues solum comedentes. Ferunt enim, hyeme & uere in montem exire oues, uescique eo, & alio quod Abrotono simile sit: & quod utrumque calefaciendo est, non purgare, uerum scitcare, & concoctionem adiuuare: ideoque fieri, si morbosae, maleque affecta ouis aliqua accedat, conualescere statim, aut mori: uerumtamen saepius conualescere. Hæc autem utro modo se habent, considerandum est. Quæ uero Magydaris dicitur, aliud a Silphio est, rarius, & minore acrimonia, succoque carens: discernitur a peritis solo aspectu. Nascitur in Syria & Cyrene. Narrant & in Parnaso nasci copiosam: & hanc Silphium esse. Si uero culta fugit loca, uelut Silphium, considerandum erit. Similiterque an simile, æqualeue aliquid in folio & caule habet. In uniuersumque, si lachrymam destillat. Et hæc Theophrastus longius forte quam legentium aliquis æquo animo ferre potuerit ab eo & a nobis dicta: sed non inutilia, ut quæ a Dioscoride dicuntur, certius intelligi possint. Siquidem & ille de foliaceo semine, de Maspeto, Magydari, alijsque omnibus pariter egit: & ut tunc ferebat fama, totam Laserpicij historiam tradidit, quod Cyrenaico agro probatissimum nascebatur. Tantumque illi ex eo laudis & honoris accreuerat, ut Catullus una hac nota Cyrenem illustrauerit, Laserpiciferas in epigrammate suo Cyrenas uocans. Nouerant enim tunc omnes, quod ubique nunc ignoratur. Eratque in quotidiano ciborum usu Laserpicium, quos grato sapore & odore commendabat. Miscebatur id, ut indicat Columella, oxyporis: & ut plures alij testantur, Laserpiciatum acetum in multo usu erat. Longior erit commentatio hæc nostra, si quot usus Laser habuerit (sic enim Plinius etiam uocat) numerare uoluerimus. Illud dixisse satis sit, quod Martialis de simila ait. Nec Laseris dotes poteris numerare, nec usus. Cum medico totiens, cum sit & coquo totiens aptum. Vtebatur eo passim antiquitas, ob egregiam calefaciendi uim quam habet. Nunc autem tantum abest, ut nostrorum temporum Laserpicio uti, ganea, aut medicina possit: ut rem ipsam utraq; ignoret, nec coniectura saltem ostendere possit. Nouerunt quidem nostræ ætatis medici Opon Cyrenaicum, sed nomen tantum, & in eo nomine, quod longissimè ab antiquo Opo Cyrenaico differat. Idem enim Opos Cyrenaicum, & Laserpiciu hoc quondam fuit: nunc autem in fetida Asa ea uoce utuntur: quæ tetri & ingrati odoris sensu, tantum a Laserpicio differt, quantum uersimile est quondam discrepasse eorum usus. In medicina sane infinitis pene fuit eius usus: indicantque græcorum medici omnes, qui adhuc supersunt. Indicat Plinius uigesimo secundo uolumine capite uigesimo tertio, longissimeque omnium hic scriptor. Ex cuius remedijs nos tantum signabimus, quæ nobis non sunt cum Barbaro eadem, duoque præsertim. Quorum id primum est, quod ille ait, mederi Laserpiciu neruorum contractionibus: contractiones neruorum uertens, quod Dioscorides tetanicos dixit, longe ab illis diuersos. Qui quales sint in Samplicino unguento dictum longius a nobis est. Alterum uero, quo loco uertit, dari Laserpiciu his qui lactis coagulum biberint. Quod γαλακτορροϋµενον hic scriptor uocat, in uenenorum censu ab eo libro sexto numeratum.

σαγηνιον

De Sagapenio.

C A P. XCIII.

Sagapenium ferulaceæ hærbae succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter Laser & Galbanum redolens, gustu acri. Prodest laz

terum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, conuulsis & ruptis. Cras-
sam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotoni-
cis, lienosis. Item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & fe-
brium circumitus in potu. In unguenta probe admittitur. Menses pel-
lit. Sed scetum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino
haustum serpentium ictibus. Olfactum ex aceto uuluarum strangula-
tus excitat. Oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suf-
fusionesq; detergit. Resoluitur succi modo, ruta, aqua, & amaris nu-
cibus, aut melle, aut calido pane.

B A R B A R I C O R O L L.

Sagapenum medicina tantu feritur in hortis. Dicitur & Sacopenium. Quod apud nos gignitur, in totu transmarino alienatur. Illud enim Hammoniacy lachrymae simile Sagapenum uocant, fruticis sui nomine, ut Galenus inquit, per abusionem.

E X M. V E R G. C O M M.

Estati sunt ueteres Graeci, Ferulam Sagapenum ferentem, nullos habere in medicina u-
sus: quodq; in ea expetitur, liquorem solum esse: nec ultra id historiae eius aliquid addiderunt.
Hic etiam Graeciae peregrinam fecit, in Media nasci dicens: & ex quo ferulaceam herbam di-
xit, genus, formam, partesq; eius ignorasse uidetur. Plinius in Italia nasci Sagapenum testa-
tur, dicens. 20. uolumine capite. 18. Sagapenum quod apud nos gignitur, in totum transma-
ri- no alienatur. Neq; ipse etiam ferentis id fruticis, aut herbae naturam tradidit. Ob eam causam,
nec nos longius de eo agemus. Et si Plinius, ut paulo ante diximus, Sagapenum Italiae pla-
tam dixerit, & praeter ea quae paulo ante ex eo citauimus libro. 19. capite septimo, in hortis, sed
medicinae tantum feri dicat. In qua separarunt alij interpretes, perfrictiones a circularibus fe-
bribus: cum tamen ab hoc scriptore dicatur, dari Sagapenum contra perfrictiones quas circu-
larium febrium accessiones faciunt.

De Euphorbio.

CAP. XCV.

Euphorbia Libyca arbor est, Ferulae speciem habens, quae in mon-
te Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo tur-
get. Cuius eximiu feruorem expauescentes incolae, ouillos uentres elu-
tos, arbori circūligant, & eminus caulem conditis incidunt. Confestimq;
e plaga perinde atq; uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor
effluit, praeter id quod sparsi in humu, uulnus ei aculatur. Duo succi ge-
nera. Vnum Orobi magnitudine, Sarcocolae modo emicat. Alteru in
uentriculis concreuit, atq; uitreum spectatur. Eligendu est translucens,
& acre. Euphorbiu adulteratur Sarcocollae, & glutini mistione. Sed dif-
ficile quidem experimentu. Quippe cum leui gustu, os accensum diu de-
tineat, adeo ut quicquid ori obijciatur plane Euphorbium resipiat. Eius
inuentio tempore Iubae regis Libyae cognita extitit. Succus illitu suffusi-
ones discutit. Potus tota die exurit. Quare melli, collyrijsq; pro acrimo-
niae ratione ammisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorife-
ra portione haustus. Squammas ossium eadem die eximit. Verum eo u-
tentes necesse est linamentis, aut ceratis communire corpus, quo ossa
conuestiuntur. Aliqui memoriae prodiderunt, percussos a serpente ni-
hil molesti passuros, si incisa offetenus capitis cute, intritus succus infun-
datur, uulnusq; postea consuatur.

A

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 18.

B

Euphorbia

Pli. li. 26. ca. 11.
lib. 25. cap. 13.

C **BARBARI COROLL.**
Euphorbium, & Euphorbiam, Iuba Ptolomei pater, in Atlante gigni herbā scribit, dicato priuatim uolumine, folijs acanthinis, appellatam homine inuentoris eius medici sui, & fratris Musae. Suscipitur lac non omni uentriculo, sed haedino. Qui colligunt clarius uident. Siccatur Conto, ut effigiem Turis habeat. Adulteratur haedino lacte. Sed discernitur igni. Quod enim syncerū non est, fastidiendum odorem habet. Multū infra hunc succum est, qui in Gallia sit ex herba Chamalea, granum Cocci, ut Plinius inquit, ferente. Fraetius, Hammoniaco similis est. Accendit os semel gustatū, & magis ex interuallo, donec fauces quoq; assiccet. Galenus & Paulus Phorbion, siue Phormion herbam quandā nominant, longe ab Euphorbio diuersam: cuius folio & semine, ad albugines utantur cum melle: spicula quoq; corporibus extrahi persuasum est. Graeci codices Euphobion, pro Euphorbio fere scribunt.

χαλβάνη

De Galbano. CAP. XCVI.
Galbanū succus est nascentis in Syria Ferulae, quod nōnulli Mesopotii uocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merū, Thuris effigiem praebens, minime lignosum, retinens, nonnihil adiecti seminis aut Ferulae, graui odore, neq; humidū, neq; aridū. Adulteratur faba fresa, & Hammoniaco. Galbanū excalfacit, urit, extrahit, discutit. Menses ac partus trahit, appositū, uel suffitu. Lentiginēs aceto & nitro perunctas tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatē spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersat toxicis potū cum aceto & myrrha. Simili modo sumptum, mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis. Comitiales, & uuluae strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Si uratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. Serpentes cum oleo & sphondylo circumpositū necat. Dentiū dolorem oblitū, aut cauernis inditum, mitigat. Vrinae difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsaue. Alias meconio, aere usto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles, in feruentem aquam demittito. Namq; cum liquefactum fuerit, eius fordes fluitabūt. Quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo alligatum in fictili, aut aerea pixide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat. Opertoq; uase in feruidam aquam demittito. Sic enim syncerum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Pli. li. 12. ca. 25.
lib. 24. cap. 5.

BARBARI COROLL.
Galbanum, Chalbanen Graeci uocant, & ferulam, & lachrymam. Item Stagonitum, & Mesopotion. Laudatur simile Hammoniaco. Adulteratur Sagopeno. Permutatur in libras quinque. Medicinae hoc tantum Galbanon a colore dictum candido existimant: a quo & uestis nomen Galbanum luuenali. Vulgo quoq; nautica opera sic uocamus. Nam Galbeum, ut Tranquillus ait, remedia sunt lanis inuoluta.

EX M. VERG. COMM.

Satis fore legentibus credimus, quod in Galbano natura ostendit: q; in Syria nascens, odoramentorum omnium fecunda genitrice, ut auctor Theophrastus est, ingrato odore tetrū, regionis eius hanc felicitatem turbauit. Nisi forte quae in agendo sagax natura est, Galbanum Balsamo, Casiae, Cinamomo, odoratisq; Calamo & Iunco ideo miscuit, iisdemq; locis nasci uoluit: ut quātum ingrati odoris ex terra Galbanū in se traxisset, tantū purioris odoris illis relinqueretur: damnareturq; una Galbani ferula, ut felicius caetera agerent. Quod illi, & horros conferentibus consilium aliquando est, male & grauiter odoratis plantis, eodem loco confitis, aliarum odores augere. Nihil tamen sic etiam a natura damnatum, inutile homini penitus genitum est. Habet enim, ut caetera relinquamus, suas uires & laudes Galbanum. Solum aucto-

re Theophrasto, grauiter odoratum in Syria nascens. Potestq; præter alia quæ illi in morbis ab hoc scriptore, & ab alijs tribuuntur, ingrato agitare graues nidore chelidros: ut Maro cecinit. Et Nicander, *ναίμην καὶ βασιόδομος ἐπὶ φλογὶ μνησθῆναι χαλδάνη, καπνὸν ἄγει καὶ φύσιμον ὀσμὴν*. Potuit quondam etiam, ne bellorum & fortunæ gloria, & honoribus careret, oppida expugnare: illiusq; liquore suo facibus, Hispaniæ oppidum frustra diu oppugnatum, succendere: eaq; uictoria Romanis ciuibus gentile nomen ex se dare: quod non multo post a Domitij Neronis turpi & funesto principatu, inter Cæsares coleretur: essentq; a Galbano, quo usi in incendio oppidi in Hispania fuerant, Galbæ Romana gens, per Cæsarem suū toto orbe clari. Ex eo non paruum Galbano honoris accessit incrementum. Nosq; hæcenus a fortunæ gloria laudatum, ad naturam transferimus. Primumq; illud legentes monemus, non Turi tantum, sed Hamoniaco liquori simile Galbanū ceteros dicere, Pliniumq; presertim. Quo fit, ut deesse huic scriptorid suspicemur. Quod præterea in impresso Diosco. legebatur, *τοξικὸς μεδερὶ οὖν ἔστι*, quod est, cum aceto, ex ueterum meliorumq; codicum fide, cum uino uertimus. Persuasitq; id Plinius lib. 24. cap. 5, aduersari uenenis, maximeq; toxicis, cum Myrrha & uino dicens, Fecit eiusdē scriptoris autoritas etiam, accedente ueterum codicum eadem fide, ut quod erat *στονὸν δὲ καὶ λυσεν τοὺς ποτὶν*, significareq; uidebatur, facere ad urinæ angustias, ad contrarium sensum deflecteretur: indicaretq; urinæ nocere, & eius angustias facere, Plinius enim eodem loco ait, Nocere urinæ existimatur.

De Ammoniacō. CAP. XCVII.

Ammoniacum hæra est, ex qua Ammoniacum fit suffimen qd Tymiana uocant, aliqui Agazyllon, alij Criotheum, alij Helizurum, Romani Guttam appellant. Ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit. Cuius fruticem cum radice Agasyllim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, Turis similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus Trausma, id est, friatum appellat. Quod uero terram & calculos collegit, Phyrana, quod significat misturam. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. Tubercula duriciaq; discutit. Potum aluum soluit. Partus extrahit. Lienem consumit, drachmæ pondere haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Itē quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur. Cruentam urinam pellit. Albugines oculorum abstergit. Genarum scabriciam absomit. Tritum autem cum aceto & impositum, iocineris lienisq; duricias sedat. Discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perūgi utile est, cū nitro et cyprino oleo uice acopi.

BARBARI COROLL.

Hammoniacum dicitur, quoniam stillat in harenis, iuxta Iouis Hammonis oraculum resina modo, aut gummi ipsum Thrausma, siue Thraustum, Turis habet masculi similitudinem. Phyrana uero pingue, resinosumq;. Adulteratur harenis uelut nascendo apprehensis, igitur q̄minimis glebis probatur, & q̄purissimis. Precium optimi in libras asses quadraginta. Metopion arbor ipsa dicitur, ut Galbani a Solino Metops.

EX M. VERG. COMM.

Habet salem, habet liquorem medicina Hammoniacum. Vtrūq; ab harenis, sed diuersa ratione dictum. Illū, q̄ sub harenis concreseat, et inueniatur. Hunc, q̄ in harenosa Libya ad Hammonis Iouis templum ex Ferula in harenas deflillet, & ut in Ture fit, concretis grumis inter eas

A

ἀμμωνιακόν

B

Pli. li. 24. ca. 23.
lib. 24. cap. 6.

C inueniatur. Græci ab harenis, quas ἁμωνα dicunt, utrumq; indicauerunt, sed illum saltem, hęc liquorem Hamoniacum, quasi harenosum uocantes: graui periculo miscendi simul diuersa, si eorum exemplo discrimen aliquod ex rei substantia addatur. Quod nos timentes, ut illū salē suo loco uocabimus, sic hunc autore Diosc. guttam uocauimus: quasi & hic quemadmodum Tus Stagonias aliquando dictus fuerit: quæ uox in græcis stillicidium & guttam significat. Plinius Hamoniaci lachrymā eiusdem rei significatione appellat. Græci Hamoniacon simpliciter, ut tunc erat eius uocis æstimatio, uocant. Fugientesq; nos æquiuocę appellationis periculum, guttā Hamoniacam diximus, lachrymam liquoreq; significantes Ferulæ, quæ priuatim in Libya ad Hamonis Iouis templū tūc nasci ferebat. Quę siue ab harenis, siue ab Hamonis Iouis templo uocari dicat, eandē rationē habet: qm̄ & Deus q̄ int̄ eas harenas colebat, mortalibusq; respōdebat, ab ipsdē harenis nomē a græcis inueniat. Ideoq; Criothetos a forma eius, q̄ arietino capite pingebat, eadē hęc Ferula, liquorq; eius parit̄ dictus est. Satisq; hic natale solū illi assignauit, dicens primum nasci in Lybia ad Cyrenem: mox in Libya ad Hamonem, Iouem illum inrelligens qui in templo inter Libyæ harenas colebatur. Ceteræ eius appellationes barbaræ sunt, ideoq; nunc omnibus incognitæ.

σαρκόλλα

De Sarcocolla. CAP. XCIII.
Sarcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollini Turis similis, ruffa, gustu amara. Vulnere glutinat. Oculorum fluxio nes inhihet. Emplastris inferitur. Adulteratur ammisso gummi.

Pli. li. 24. ca. 14.

BARBARI COROLL.
Sarcocolla uetustate nigrescit maxime. Melior, quo candidior. E spina reddi putant, cum quadam acrimonia dulcem.

EX M. VERG. COMM.
DInter gummi genera numeratur a Plinio Sarcocolla: eodemq; nomine arbor, & ex ea destilans gummi appellatur: quod ex ui, potestateq; sua nomen inuenit. Carnes enim, quas græci σάρκα dicunt, in uulneribus glutinat: quod eiusdem gentis uerbum κολλᾶν significat. Pictoribus idem Plinius utilissimum etiā dixit.

γλαυκίον

De Glaucio. CAP. XCIX.
Glaucium succus est hærbae quæ in Hierapoli Syriæ nascitur, folijs fere corniculati Papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. Tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usq; dum flaccescant. Deinde contusis succum exprimunt. Cuius est usus ad oculorū medicamenta. Vtpote cum inter initia refrigeret.

Pli. li. 10. ca. 19
lib. 27. cap. 10.

BARBARI COROLL.
Glaucion & in Parthia nascitur, folijs densis, minoribus q̄ Papaueris sordidioribusq; gustu amaro, cum quadam astrictione. Granum habet croci coloris. Hinc temperatur collyriū: quod medici Diaglaucion uocant, in quod recentiores Papauere cornuto utuntur, aut etiā Chelidonio maiore: ut nihil profecerit Dioscoridis attestatio in mentione Papaueris illius, cū alioquin magno periculo hac parte hallucinentur, q̄ Chelidoni & Papaueris eius natura erodendo sit, Glaucij multo mitior, & refrigerando fere. Propterea collyrium ex illo iumentorum oculis adhiberi solet, ex Glaucio humanis.

EX M. VERG. COMM.
Sunt Plinio, & Dioscoridi in Glaucij medicina & historia eadem fere omnia. Hic ad Hierapolim Syriæ, ille in Syria & Parthia nasci tradit. Ambo humilem herbam, sed ille simpliciter folijs Papaueris, hic cornuti Papaueris priuatim describit. Hic pinguioribus q̄ Papaueris, Plinius sordidioribus dixit: magno discrimine inter sordidum, & pingue. Diuersitatis ea potius esse causā, ut quod nunc legitur λιπαρότερα, certa pinguedinis significatione, tunc ἰνυπαρότερα, i. sordidiora legeretur, facillimo & lubrico, ut in Galbeano paulo ante diximus, in unius literæ figura, & sensu ad contrariā & alterutram significationem lapsu. Locus in Plinio est. 27. uoluminis ne cap. 10. Nobis aptius uisum est, Dioscoridem, q̄ Plinium sequi.

De Glutino. CAP. C.

A

Glutinum quod Xylocollan, alij Taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est & translucens. Nigrum uero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, leprasque cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida impositum, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.

BARBARI COROLL.

Glutinum, siue Gluten, Græce Colla, Præstantissimum fit ex auribus taurorum, & genitalibus. Sed adulteratur nihil æque, quibusuis pellibus inueteratis, calciamentisque etiam decoctis. Rhodiaceum uero fidelissimum, eoque & pictores, & medici utuntur. Lignosum improbatum. Contexti par est et reliqua Glutini genera. Auro Glutinum est Santerna, ferro Argilla, gris massis Cadmia, laminis Alumen, Stagnum æramentis, stagno Argentum, marmor, & plumbum. Resina, Plumbum nigrum albo, album ipsum sibi oleo. Est & Glutinum auri cum inducit ligno, Leucoporon, siue Leucophæon uocatum, ex pluribus compositum, Sinopidis pontice selibra, Silis lucidi, pix, & melini greciensis duobus mixtis, tritisque una per duodecim dies. Est & Lithocolla Glutinum ex lapidibus, sicut Ichthyocolla ex piscibus. Habetur et Gluten librarium ex simila & polhne. Nam Gluten Atticum pro gummi ex amygdala quandoque accipitur a Chymicis.

Pli. li. ii. ca. 39

De Glutino piscium. CAP. CI.

Gluten piscium, uenter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, carens squamis, & quod celerrime liquefcit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

BARBARI COROLL.

Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium. Idemque nomen Glutino eius: quod alij ex corio, alij ex uentre putant fieri. Ichthyocolla inuentum Dædali. Laudatur carens uenis, squamisque. Madescere debet concisa in aqua, uel aceto nocte & die: mox tundi marinis lapidibus, ut facilius liquefcit.

ἰχθυόκολλα

Pli. li. 32, cap. 7

B

EX M. VERG. COMM.

Notum cunctis piscium Gluten est. Indiget enim eo uita quotidie & utitur: nec possunt sine ope eius feliciter in artibus tractari multa. Ob eam causam nihil ultra de eo agitur.

De Visco. CAP. CII.

Viscum optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil, aut surfurosi concaperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. Quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. Parotidas, tubercula, cæterasque collectiones, ad maturationem perducit. Cum resina autem & cæra pari, epinyctidas in splenio sanat. Vetera ulcera, suppurationesque, quas cacœthe uocant, ex Ture mollit. Lienem cum calce, Gagete, aut Asio lapide, impositum absorbet. Cum sandaraca, aut auripigmento illitum, ungues extrahit. Mistum cum calce & uini facie, suam uim intendit.

ἰξός

BARBARI COROLL.

Viscum Græce Ixos: & Ixias frutex ipse, ut Athenæus ait. Porro Viscum illud, quod inter

Pli. li. 16, ca. 44

I ij

C uenena ponitur a Dioscoride, Galeno, Plinio, Ixiā Græci uocant, & Vlochon, siue Vlophonon: quibus nominibus Chamæleontem quoque dici constat: radicemque affirmant esse hoc genus Visci, quod interficit: unde orta dubitatio est, Viscum hoc pro Chamæleontis, an pro sui generis, aut pro fruticis ipsius radice capiamus, ex quo Viscum conficit: Paulus, & Aetius in uenenis Ixiā a Chamæleonte separant, alias & notas & medicinas reddendo. In Quercu, Ilice, Pruno syluestri, Terebintho, nec alijs arboribus adnascitur. Dioscorides addit Malo, & Piro. Copiosissimum in Quercu, Plerique putant, quod Dryos, Hyphear uocāt, Ion poeta sudorē quercus: namque quod in Abiete & Larice fit, Stelim Eubœa dicit. Hyphear Arcadia nō Viscū. Viscū porro gna bina, uel terna faciunt, & in omni arbore, excepta Ilice, & Quercu. Differentiā constituit odor uiridisque, & folium, non iocundi odoris. Viscū coloris, ut poeta ingraues, amarū & lentū, e Robore præcipuū. Hyphear uero, ad saginanda pecora utilius, quia & alimentū plus & pinguedinis in Larice et Abiete fit. Vitia purgat primū: dein pinguefacit, quæ suffecere purgationi ut Silphium. Quibus fit aliqua tabes intus, negant durare. Edendi ratio ætatis quadragenis diebus. Adhuc aliqui discrimen in hijs, quibus folia decidant & Viscū decidere. Contra inhaerere nato in æterno fronde. Omnino autē fatū nullo mō prouenit: unde Maroni dictum, Quod non sua seminat arbor.

D nec nisi per altum fimo redditum, maxime palumbis & turdis. Siue ut quidam ex Theophrasto, picis, *κίττα* pro *κίττα* legentes: cum alioquin Plautus, autore Seruio grammatico, de turdelis intellexerit: cum inquit, ipsa sibi auis mortem creat. Est autem Turdela, Turdi genus alterum, quod in Venetiā prouincia, Drexanos uulgo nominant. In Liguria priscū nomē reperiunt maiores. Turdo sunt penna subtus uaria. Græci Cossyphos modo appellant, ut quibusdam uideat. Drexanos porro, quasi Dryxanos, hoc est, quercus arrodētes uocatos existimāt. Cossyphos certe Aristoteles merulas intelligit, item Cottyphos. Palūbos Græci Phattas, siue Phasias uocant. Sed genus eorum unum, cuius fimo Viscum nascatur. Athenæus Oenadem appellari tradit: quam Theodorus noster, in Aristotele Vinaginem interpretatus est. Altitudo eius non excedit cubitalem, semper fruticosi ac uirentis. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando non fert. Viscum fit ex acinis imaturis, hoc est, uiridibus, nondum candidis, quod eis per maturitatem contingit. Hi per menses collecti, siccati, atque tuli, deinde putrefacti aqua, duodenis fere diebus, mox in profluente rursus malleo tunduntur, amissis corticibus, interiore carne lentescentes. Quidam decoquunt in aqua tulum, donec innatet. Nonnulli comanducantes acinos, expuunt cortices. Optimum est quod sine cortice est, quodque leuissimum. Quidam efficacius futurum promittunt, detractum prima luna e robore sine ferro. Viscū nihil est glutinosius, pennis maxime uolucrum ligandis, Iugladium oleo subactum, cum libeat insidias molliri. Drydes in Gallia nihil habent Viscū & arbore in qua gignatur, si modo fit Robur, sacratius, nec ulla sacra sine ea fronde faciunt. Quicquid hijs adnascitur, e coelo missum putant. Inuentu rarum, magna religione petitur, & ante omnia sexta luna. Post sacrificium & epulas, sub arbore sacerdos ueste candida, falce aurea id demetit, candido excipiente sago: taurosque duos coloris candidi, tum primū cornibus uinctos imolant, precantes ut suum donum deus prosperum faciat. Fecunditatem eo potō dari, cuiusque animalium sterili arbitrantur, contraque uenena omnia esse remedio. Fit & ex alijs quoque rebus Viscum in Syria. Ex acinis, quos ab Augusti honore, ut consilio, Sebastos appellant. Hæc Myxa ueteribus fuisse interpretor: quæ per diminutionem quoque Myxaria dicuntur. Arbuti eius ligno, cortex albus, ramis uirens, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis, candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliuæ siccatur. Hic in medicina uentrē soluit, destillationesque comprimit, & rosiones Vesicæ, & intestinorum animalia. Damascenum inde Viscum paratur, commendatissimum aucupijs, præterque aquatiliū uolucrum. Fingitur & ex radice quadam Viscum Litanæ dicti fruticis, æque ueteribus incogniti, folio hirsuto, molli: flore candido, odorato: quem sustinet umbella. Viminibus lentis ad nexū acinis ut uua, primo rubentibus, post nigrescentibus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Q uale solet filius brumali frigore Viscum, Fronde uirere noua, quod non sua seminat arbor, tale & suum Dioscoridi describitur, nulla appellationū eius addita diuersitate. Quales in secundo de causis plantarum numerauit Theophrastus, Hyphear, Stelida, & Ixon, siue Ixiā, eandem rem aliter alijs in Græcia uocantibus. Et si non deessent tunc etiam, qui in diuersis arboribus nascens Viscum diuersa appellatione ostenderent, nascique Hyphear & Stelida in abiete & picea dicerent: Viscum uero in quercu, terebintho, alijsque multis. Fuerunt etiam, qui in diuersa parte eiusdem arboris nascens, diuerso nomine indicarent: hincque Hyphear, illic

Viscum, & Stelida natum appellarent. Quæ nos, nouisse ea uolentibus legenda in Theophrasto relinquimus, & præter Theophrastum in Plinio. 16. uolumine, capite. 45. quo loco reddita ipsidem uerbis ex eo scriptore a Plinio omnia fuerunt.

De Aparine. CAP. CIII.

Aparinen aliqui Ampelocarpon, alij Omphalocarpon, nonnulli Philanthropon uocant, ramosam hærbam & quadrangulam, ex interuallis orbiculato foliorum ambitu, ut in Rubia, Flos albus, semen durum, rotundum, concauum, album, umbilici figura, asperitate uestium tenaci. Ea pastores coli uice utuntur, ad eximendos e lacte pilos. Seminis caulium ac foliorum succus, potu contra uiperarum, phalangiorumq; morsus auxiliatur. Infusa aurium dolori medetur. Hærbam cum axungia trita strumas discutit.

BARBARI COROLL.

Aparine, quam nostri & Lappam uocant, Hippocrates Philistion, & Phileterion quoq; ut Galenus putat. Non euidens, sed occultus in ea flos maturefcit, & intra se germinat semen: uelut animalia quæ in se pariunt, ut uiperæ. Nascitur in frumentario agro, inter Lentem præcipue, item pratis, hortisq; Ramosa hæc & hirsuta, quinis senisq; in orbem circa ramos, folijs per interualla, Semen subdulce, Omphacocarpon a Plinio, Galeno, & Paulo Aegineta dicitur. Nisi quis Omphalocarpon ex Dioscoride legi malit, ab umbilici similitudine, quam semen præfert. Philanthropos uero dicta est hæc a nonnullis herba, quia uelut amici solent, cõmeantium lacinijs obhæreat. Aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, Philadelphum appellatum, ex argumento, qd rami eius ex interuallo sponte cõeant, ceu amantes: post digrediantur, concipiant, atq; pariant. Huius tenuissimis uirgis reticulatim compositis, atq; ita confitis, hortorum septa impenetrabili compage fieri.

EX M. VERG COMM.

Cognitum & inuentum facilem, inter legumina & in frumentaria segete Aparinem sua descriptione Theophrastus & Diosc. fecerunt: ipsa etiam tenaci nexu prætereuntium uestibus hærens, & quale hic descripsit semen ostendens in medio umbilicatum, ad cognoscendam se, suisq; cõtemplationem nolentes etiam couertit. Persequuntur eam quatuordecim Maior & Iunior mensibus manu, messoriaq; falce agricolæ, pestem satis suis eam sentientes, nihilq; apicis & pinguibus agris frequentius nascitur. Copiosior tamen inter legumina qm inter frumenta inuenitur. Nouerunt calamitatem suam rustici. Nomen tamen, & maleficij eius causam ignorant. Et ut in similibus fit, quorum ignoratur nomen, Lappam uocant. Quia uoce non in Aparine tamen, sed in cunctis quorum matura semina uestibus prætereuntium inhiærent, ignari utuntur. Quæ sane multa sunt: & inter alia Eupatorium etiam, de quo suo loco dicemus. Ex quo factum est, ut non ætate nostra tamen, sed antiquis etiam temporibus parum certa in huiusmodi fuerit nominum ratio. Arcionq; Lappam tamen aliqui dixerint, alij Aparinem hanc, alij plures alias quarum semen aut quia asperum, amatum ue, aut cuspidatum est uestibus hæret: quasi ad faciendum genus & nomen una hæc nota satis esset.

De Alyssio. CAP. CIIII.

Alysson, alij Aspidion, alij Aplophyllon, alij Accysitum, alij Adeston nuncupant. Fruticosa hærbula est, uniuersalis, rotundis folijs fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semine quadratenus latum. In montibus & aspris locis emicat. Eius decoctum singultus sine febre potu discutit. Idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoret. Cum melle trita, uitia cutis in facie, et lætigines emendat. Cõtusa in edulio, rabiei canis mederi putat. Domib; appesa, salutaris esse creditur. Et hominibus, atq; animalibus, fascini, amuletum. Pupureo linteo circumligata pecorum morbos abigit.

BARBARI COROLL.

Alysson, distat a Rubia, folijs tantum ramisq; minoribus, ita dictum, qd rabiem canum de-

A

ἀπαρίνη

Pli. li. 27. ca. 5.

B

ἀλυσσόν

Pli. li. 24. ca. 11

D I O S C O R I D I S

C fendat. Saniem conspecto eo siccare tradunt. Autor est Aetius, quosdam existimare hanc herbam nihil differre ab Sideriti Heraclea: quæ tertia est inter Siderites, a Dioscoride monstratas. Sed & Phorion grammaticus, folio eam subpurpureo describit: quod & Siderites habet terra: ut Dioscorides est autor. Ego Alysson ab hac Sideriti plurimū differre nihil dubito. Alysson & poculi genus est, uerū scripturā separat, q; & per simplex, s; & per, u. scribitur: at p herba captum per, y; & per duplex, ff. Sunt qui Cruciale herbam uulgo dictā, pro Alyssō demonstrant. Sed interest, q; Alysson quinis per interualla folijs ostēdimus, Cruciale quaternis, unde nomē, & minus hirsutis. Exilius & huic semē q; Alyssō est, minus etiamnū, anguloso caule. Flos Alyssō candidus, Cruciali uero luteus. Cæterum impudentius falluntur, qui Alysson p ea capiūt, quæ Liliago, siue Liliarca, et Martegonia rustice uocat, folio quadatenus et flore Lili purpureo.

E X M. V E R G. C O M M.

F Ecit sibi ex re nomen Alysson, & ex pluribus quas habet in medendo uires, eam unde uocaretur elegit, quæ grauiori hominis malo succurreret. Et qm rabidi canis morsus sentire non patitur, ideo Alysson passim dicta est. Celebrauit eā sympoij sui tertio uolumine Plutarchus: numerauitq; inter eas quæ solo contactu, halituue, aut aspectu prodesse homini possunt: non tamē contra rabidi canis maleficiū, sed contra singultum. Verba eius sunt. τὴν δὲ ἄλυσον καλοῦ-
μένην βοτάνην, καὶ λαβόντες ὑς τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσελθάντες ἀπαλλάττονται λεγμενῶ. λέγεται δὲ καὶ ποιμῖνοις ἀγαθὴ καὶ ἀνὸλοις παραφυτινομένη ταῖς μάνδραις. Quæ uerbū de uerbo sic uerrat aliq;.
Quin etiam herbam quam Alysson uocant, alij in manus accipientes, alij conspicientes solum a singultu liberantur. Fertur eadem ouillo & caprino pecori salutaris esse, prope caulas et septa eorum constita. Quod ab hoc ipso primum & ultimum inter uires & remedia eius numeratur. Quemadmodum quod ad rabidi canis morsus pertinet, a Paulo Aegineta in quinto traditur, quo loco Cataplasma contra rabiem canis quoddam instituit, iubetq; decocto eius uti, his uerbis. μετὰ ἀφιψματος ἐλαισφάνον, ἢ τῆς σιδερίτιδος τῆς ἱρακλίας ἢ καὶ ἄλυσον καλοῦσι τινεῖς. Quorum sensus est. Cum decocto Saluæ, aut Hieraciæ Sideritidis, quā aliqui Alysson uocant. Ex quo dubitari cōgit, sit ne hæc sui generis herba, an Sideritidi re ipsa eadē, nomine uero tm diuersa.
D Hic propriū genus habere Alysson, separata ab illa eius historia et medicina ostēdit. Plinius hoc ipsum lib. 24. cap. ii. confirmat, Rubiæ similem his uerbis describens. Distat Eriodanum ab eo quæ Alysson uocat, folijs tm & ramis minoribus. Verūtm huic nō cōuenit, q; folio rotundo, eōtra q; in Rubiæ est, Alysson describit: & præter folia singularē caulē Alyssō tribuit. Fruticosa aut Rubiæ est, Alyssō semē est in latitudine se explicās, Rubiæ rotundū habet. Et ne lōgiore sim us, nihil qd certā similitudinē faciat nobis in Rubiæ inuenitur. Credimus ob eā causam, posterioribus his scriptoribus nō satis certas fuisse Alyssi huius historiā & notas: ex quo alij Sideritim eā crediderūt: & alij Rubiæ, pterq; iu folijs & ramis similē fecerunt. Nos Diosco, descriptione, & Plutarchi testimonio contenti, sui generis herbam antiquis fuisse dicemus.

¶ De Asclepiade. C A P. C V.

ἀσκληπιάδα

A Sclepiadem aliqui Ciffion, alij Cissophyllon nominant. Ramos emittit longos, folia Hederæ, radices numerosas, tenues, odoratas. Floris uirus graue. Semen Securidacæ. Nascitur in montibus. Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulue mammarumque ulcera, quæ cacœthe uocant, illinuntur.

E X M. V E R G. C O M M.

H Abet Cissios, & Cissophyllos, aliæ Asclepiadis appellationes, manifestam ex foliorū forma, quemadmodum & nos diximus, causam. Omnes enim qualis et ea est Hederæ folio describunt. Cur aut Asclepias primum dicta sit, coniecisse etiam difficile non fuit. Vt enim ab inuentoribus suis plures aliæ nomen inuenerunt, sic & ab Asclepio faciendū homini medicinæ antiquo autore Asclepias nominata hæc est. Non parū hoc uno argumento laudanda, et in honore habēda, cui pter ea quæ a Diosco. dicta hoc capite sunt, plures in historiā notas, & in medicina uires græcorū herbarij alij tribuerunt, Nepetæ similem caule, & toto frutice esse dicentes: & Hederæ quidē folia habere, uerū lōgiōra & lanuginosa. Habere itidē, ut hic ait, florē graucolentem, sed Rosæ figura, nasciq; nō simpliciter in montibus, uerū in aquis montibus, In medicina aut

tradiderunt posse radicem eius tantū derasam, ut nihil asperitatis habeat, in fistulas demissam callos earum absumere & implere: Nec folia tantū, uerumetiam flores maleficis mamarum, & muliebrium locorum uitij prodesse. Quinetiā eandem radicem siccata, moxq; in puluerem tufam, & cum axungia coactam, malagmatis modo impositam, inflammationes discutere, & neruos mollire. Flores præterea, foliaq; siccata, mox trita, in summa cute uulneribus utiliter inspergi. Sordida purgare ulcera, & ad cicatricem perducere, genitaliumq; uitij egregie mederi. Quæ omnia ex antiquis græcis collecta, a nobis historia & medicinæ huius scriptoris liber addita sunt, ne quid relinqueretur, quod legentibus prodesse aliqua ratione posset: Quam deinde nos Securigadam diximus, cuius semini simile Asclepiadis semen hic ait, ea est quam Theophrastus, pluresq; alij Pelecinum, a securis forma dixerunt.

De Atractylide.

CAP. CVI.

Atractylis, quam aliqui Amyron uocant, alij Cnicon syluestrem, alij Aspidion, Magi Aphedron, Aegyptij Chenon, Romani Præsepium, aliqui Fusum agrestem, alij Colum rusticam, spina est Cnico similis, folia multo longiora ferens, in summis uirgis, magna parte nuda, asperaq;. Quæ sceminae pro fusis utuntur. Capitula in cacumine spinis horrent. Flos luteus. Quibusdam in locis purpureus inuenitur. Radix tenuis, superuacua. Coma, semen, & folia cum pipere & uino teruntur utilissime contra scorpionum ictus. Percussos tradunt, quamdiu ea teneatur hærba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

BARBARI COROLL.

Atractylis aculeata est, sed & acanacea, hoc est, & conceptu & floris sede, aut etiā semine, fructuq; spinoso: laborantibus Græcis uno uerbo, tres affectus & qualitates includere: idem erat, quod Acorna, siue Acarna, nisi candidior esset, & nisi decerpta, cureq; adhibita sanguineum succum funderet. Qua de causa Theophrasto Phonos, & Androsomon quoq; uocatur ab Aetio, odore grauis, pestemq; denunciāns. Sero maturescente semine, nec ante autumnum. Quamquam hoc de omnibus spinosis dici potest. Acornæ spina, pro folio, ut Theophrastus inquit. Cneco Urbano similis, colore tantum ruffo, pingui succo. Atractylis Cnecum est syluestre. De satiuo dicitur in mentione sua. Syluestre iterum secatur, unamitior & satiuo similior: caule rectiore, ac rigido exilis. Itaq; & pro colu antiquæ mulieres utebantur: ex eoq; hanc proprie Atractylida nominabant, semine candido, grandi, amaro. Altera hirsutior, torosiore caule, quasi Sonchi, & qui pene humi serpat, semine minuto, amaro, frequenti, piloso.

EX M. VERG. COMM.

Cogimur ex Theophrasto, pluribus locis de plantarum historia, certius eam nouisse: qui primum inter genera agrestis Cnici Atractylidem numerat. Dico autem Cnicum, quem nunc medicina Carthamum, & rura nostra Crocum saracenum uocant. Suntq; post multa de Atractylide libro sexto uerba eius hæc, ἀτρακτύλις δὲ τις καλεῖται καὶ λευκότερα τούτων. Ἴδιον δὲ ἔχει τὸ φέλλον, ὅτι ἀφαιρούμενον καὶ τῇ σαρκὶ προσθερόμενον αἵματάδι ποιεῖ τὸν χυλόν. Διὸ καὶ φέρον ἔνιοι καλοῦσιν πῶς ἕκαστον τούτων. ἔχει δὲ πῶς ὁσμὴν δεινὴν καὶ φονάδου ὅτι δὲ καὶ τίλει τὸ καρπὸν πρὸς τὸ μισόπορον. Quod est. Vocatur & quædā Atractylis, candidior his: cuius foliū priuatim id habet, ut auulsum, carniq; confricatū, sanguineum reddat succū. Eamq; ob causam phonos, i. e. cædem aliqui spinā hanc uocant. Habet præterea grauē & sanguinis in cæde odorē. Sero, nec nisi per autumnum fructū absoluit. Idem libro, s. de plantarū historia a principio statim, de liquore succoq; plantarum & eius diuersitate agens, sanguineū succum Atractylidi tribuit. Quæ causa fuit, ut a quibusdā Androsomos uocaretur: quoniam & illa sanguineo succo est, ut certius in ea docebitur. Quemadmodū & Cnicos agrestis: quod a Theophrasto dictum libro sexto paulo ante te statim sumus. Cur aut præsepium (modo integra ea uox sit) Romani eā uocarent, incertū nobis est. Cur aut Colum rusticā, & agrestem Fusum, ex herbæ figura factū est: quæ glabro, nudoq; penitus caule surgens, & cum aruit in flexili duricie rigente, aliquando cubitali altitudine,

ἀτρακτύλις

Pli. li. 21. ca. 15.

B

D I O S C O R I D I S

C plerunq; autē minor, nec nisi in summo foliosa & aculeata, in maiore illa altitudine colum, in minore fusos rusticiis formis ad lanificium dedit. Vidimus nos, licetq; omnibus perastatem uidere, locis incultis & nemoribus nascentem spinis suis, in summo sic dispositis, ut impositos lanarum peniculos, sine uinculo, nexuue alio quopiam sustinere facillime possint. Numerauit eam Paulus Aegineta libro primo inter olera, carduisq; his uerbis coniunxit, τὰ δὲ ἀκύνθηλα πάντα οἷον ἐκώλυνος καὶ ἀτρακτύλις καὶ τὰ τοιαῦτα. Quod est. Aculeata uero omnia, quales Carduus, & Atractylis est. Credimusq; nos, Atractylidis nomine hoc satium Cnicum intellexisse: in cuius genere Theophrastus eam numerauit: & natura praesenti similitudine constituisse uidetur. Ob quam, ut paulo ante diximus, agrestem Cnicum hanc aliqui uocauerunt & inter eos Theophrastus quo diximus loco.

De Polynemo.

CAP. CVII.

πολύνημον

Polynemon quidam Clinopedion, alij Polygonaton, alij Iouis colum, alij Echeonymon uocant. Frutex est surculosus, folijs Origanum, caule Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus adglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur. Sed quinto die solui debet. Ad urinae stillicidia, ruptaq; cum uino bibitur. Edocuit experientia contritos in uino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quae Violentiae uocantur, magno esse praesidio.

BARBARI COROLL.

Polynemon, & Cunilae bubulae similis appingitur, odoratis corymbis, acri & dulci odore.

De Clinopodio.

CAP. CVIII.

κλινόποδιον

D

Clinopodion aliqui Cleonicon, alij Ocimoides, alij Zopyron uocant, fruticem folijs Serpyllo similem, surculosum, duum palmorum altitudine. Nascitur in petrosis. Flores Marrubij, ex interuallis speciem lescapedum praebent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menses & partus pellit. Et pensiles uerrucas, quas Acrochordonas uocant, efficit aliquot diebus potum. Alium sistit, decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt ex aqua. Alioquin ex uino.

BARBARI COROLL.

Pli, li. 24. ca. 15.

Clinopodion, non defunt, quibus herba Orbiculata uulgo dicta, Serpyllo similis etiam si non serpit, aut eadem, aut propinqua esse uideatur: quoniam orbiculato florum ambitu a Plinio tradatur. Dubitationem facit Dioscoridis adiectio, dicentis, ex interuallo Marrubij similitudine flores in ea cerni: quod quidem in ea, quae Orbiculata dicitur, non est: sed continua florum series subalbentium, acinis in summo ternis, quaternisue, radice fibris multiplici.

EX M. VERG. COMM.

Ex tridinijs suis quondam in agrum exeuntes graecorum herbarij, pedumq; lectorum suorum imaginem animo seruantes, facile inter alias quaerentium oculos fallentem, Clinopodion herbam inueniebant. Quodq; illis quotidianum, fabrica spectaculum fecerat: diligentius & speciosius elaboratum, natura locis incultis ostendebat. Nunc mutata artium & fabricae ratione, si quis nouisse id cupiat, herbam inuenisse prius oportebit: tum ex floribus eius in antiquorum lectis, pedum quibus fulcirentur formam didicisse. Verumtamen, ut illud ratione carebat (natura enim artibus exempla in cunctis ex se proposuit, neq; ab artibus ad naturam motus est) sic nostra aetate difficillimum, in tam multa florum naturae uarietate, tam multisq; eorum formis, hoc uno argumento herbam deprehendere. Et si Plinius. 24. uolumine capite. 17. non parum ad hanc rem contulerit, orbiculato florum ambitu eam describens, Cuius formae

adjectione satis descripsisse rem uidetur. Omnes em̄ nouimus, quid orbiculato, quid florum, & quid ambitu significetur: plures scilicet simul surgere flores, circulum per ambitum facere, & ex eo orbiculum describi: in quo relictis inter eos flores medijs spatijs, inane aliquid & uacuum relinquatur: quam Pedum in antiquis lectis fuisse formā, facile conijcere est. Siquidem his exemplis pictores, statuarii, architecti; sua opera adhuc exornant. Nihilq; non una hac ratione inuentum ab illis, & tractatum semper est.

De Leontopedalo.

CAP. CIX.

Leontopetalon aliquibus Leontopodion, alijs Leuceoron, alijs Leontion, alijs Doris, aut Dorideris, alijs Lychnis agria, alijs Pardale, alijs Horybethron, alijs Rhapeion, Romanis Patabelclon, aut Semen leoninū dicitur. Caulem emittit dodrātalem, aut altiore, plurimis alis concauū, & in cacumine semina duo aut tria, in siliquis ciceris modo. Flores Fremio similes, punicei coloris. Folia Brassicæ, sed Papaueris diuisura. Radicibus nigris Rapæ similibus, torosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium icibus ex uino pota. Nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

B A R B A R I C O R O L L.

Leontopetalon radice grandi. Vocatur & Dorypetron a Plinio.

E X M. V E R G. C O M M.

Descripsit Leontopetalon libro. 27. capite. 11. Plinius iisdem uerbis, Rapaeion alijs uocari dicens, folio Brassicæ, caule semipedali, alis multis, semine in cacumine in siliquis Ciceris modo. Radice Rapo simili, grandi & nigra. Nasci eam in aruis, & omnium generum serpentibus in uiuopotam radicem aduersari, nec quicq; celerius proficere. Quæ omnia ab hoc ipso scriptore multo antea dicta fuerant. Nomen a ferocissimo & generosissimo omniū animali in antiquis Græcis inuenit. Quid autē illi cum leone conueniat, non satis certum nobis est. Si nominis origo expendatur, nihil Leontopetalon erit q̄ leonis folium. Sed quā leonis partem, uerbi causa pedem, aurem, linguam, aliamue huiuscemodi folium referat, non satis pro comperto nobis est: præsertim uariantibus alijs appellationibus Leontio, scilicet Leontopodio, & Leonino semine. Quæ omnes a Leone causam nominis, sed non eodem modo habent. Siquidem Leontion leunculus est, Leontopodion leonis pedem significat: & leoninum semen causam nominis in semine, nō in folio esse ostendit. Cur autē agrestis lychnis diceretur floris figura in causā, est: quæ Anemonem & syluestre papauer dici etiā Leontopetalon fecit. Omnes enim hi flores magnitudine, colore, totaq; figura similes, aut nō dissimiles saltem inter se sunt.

De Teucrio.

CAP. CX.

Teucrion, siue ut alijs placet, Teucris, hærbæ est uirgæ reforens effigiem. Trifaginis similitudine, tenui folio, non multū a Cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Scissademq; ubertim prouenit. Recens cum posca, aut aridæ feruefactæ ius, potu lienem potenter absumit. Lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium moribus ex aceto solo, siue ficis.

B A R B A R I C O R O L L.

Teucrion hoc (ut puto) & ramis Hyssopi describitur a Plinio: furculosa, folio fabæ. Colligi florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximeq; ex Cilicijs & Pisidijs montibus commendant. Dicitur eadem Teucris. Quidam & aliam Teucrion uocarunt, de qua in Hemionitide scribendum nobis est.

E X M. V E R G. C O M M.

Miscet, confunditq; aliqui Teucriū hanc cū Aspleno, & Hemionitide. Non ob aliā, ut credimus cām, q̄ q̄ eadē potestate sunt, Oēs em̄ lieni medent: sed nullas habēt cōes alias notas, ut ex earū historia cognoscere oibus facile est. Diuersa sunt noīa, discrepant partes, seorsumq; ueteres Græci de singulis tradiderūt, Plinius, qd paulo ante diximus, uirgas Teucrij luncos uo-

A

Λευτοπίδαλον

Pli. li. 26. ca. 6.

B

τευκρίον

Pli. li. 25. ca. 5.
lib. 26. cap. 6.

C cavit, lentore & tenacē flexurā uirgarum in Teucrio contēplatus: & ex pluribus luncorū notis eā elegit, q̄ multis alijs in plantarū historia cōgrueret: nec priuatim pprieq̄ iuncēū genus faceret. Quod em̄ luncū indicat, nomēq̄ & genus illi facit. Nudus glaberq̄ furculus est. Cetera em̄ cōmunia illi cū plerisq̄ alijs sunt, sed hoc primū illi mox per eū alijs natura dedit. Dico aut̄ fo-
 liorū totis caulibus, & uirgis eius priuationē, quā in Teucrio sunt in uirgis eius pendētia, nati-
 uo lentore uiliū modo flexilibus. Ob quā naturam & formā, non defuerūt qui Teucriū hanc
 agresti Sedo & Portulacā similē dicerent, & eorū nominibus etiā indicārēt. Volumus & illud
 legentibus significare, q̄ ab hoc remedium lienosis instituitur, cum ficis ex aceto illini Teucri-
 on. &c. credere nos non simpliciter ficos, sed caricas intelligendas esse.

De Trifaginē.

CAP. CXI.

χαμαίδρος
χαμαίδρος

C Hamædryes Græcis, alijs Chamædrops, Latinis Trifago dici-
 tur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quā cum
 Teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. Frutex do-
 drantalīs, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus. Flore
 pene purpureo. Carpitur semine prægnaans. Recens in aqua decocta, po-
 tu tussibus, indurato lienī, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis au-
 xiliatur. Cit menses. Partus extrahit. Lienem ex aceto pota cōsumit. Ad-
 uersus serpentū uenena ex uino, potu, illituq̄ efficacissima. Trita digerit̄
 tur in pastillos ad supradicta. Purgat uetera ulcera cum melle. Cum oleo
 illita, caliginem oculorū discutit. Natura eius est calfacere.

BARBARI COROLL.

lib. 24. cap. 15.

C Hamædryes, quæ & Serrata dicitur, q̄ ab ea serram inuentam putent, folia habet magnitudi-
 dine Menthæ. Fit & uinum ex ea medicis.

EX M. VERG. COMM.

D Coacta breuitatis Quercus quædā Trixago est: & inde illi in græcis nomē. Neq̄ em̄ Cha-
 mædryes aliud, q̄ humilē & terrestrem Quercū significat. Ab eadem breuitate aliud Chamæro-
 pis nomē illi ab alijs factū est. Sic em̄ ex ueterū græcorū & latinorū fide legendū esse existima-
 mus. Et si hic Chamædropa uocari tradat, Plinij em̄ codices oēs ante Barbari castigationē Cha-
 mæropem, non Chamædropē uocari Trixaginē dicebāt. Eam uocē scriptoris huius lectōe ille
 emēdauit. Is etiā quē nos habemus longobardis literis scriptū latinū ueterē Dioscoridē, Cha-
 mæropa, non Chamædropa Trixaginē dici testat̄. Nec nos rationē, aut cām habemus, cur hoc
 magis, q̄ illud dici oporteat. Et si excogitāda aliqua sit, nulla uero similior erit, q̄ quoniā humi-
 serpat sic dicta quondā fuerit. Et si id recipiat, tunc Chamærops dicenda potius erit. Nos in am-
 biguo plures ueluti testes secuti, Chamæropē potius diximus. Cur aut̄ Teucrion hæc etiā dice-
 rei, cām hic ipse ondit̄ ideoq̄ a nobis relinquēda est: qui multo labore quæsitā Romanæ appel-
 lationis originē nondū inuenimus. Nihil em̄ Plinius aliud inquit, q̄ Trixaginē latine dici Cha-
 mædryn herbā. Descripsit tñ eam, & q̄ hic folia parua dixit, ille Menthæ magnitudine: & quæ
 ab alijs hāc herbā dici: & ab ea. i. ab incisuris illis, q̄s per ambitū habet, eodē quo nūc modo in-
 ferra uident̄ dentes, inuentā fuisse Serrā. Theophrastus cum lib. 9. de plantarū historia eius me-
 minisset, de notis partibusq̄ eius breuiter egit. Sed quas habet in medicīna uires multas, nume-
 rauit alias ab hoc scriptore: ideoq̄ repetēdas hoc loco a nobis: quæ huiusmodi sunt. Trixa-
 ginis aut̄ folia ruptis, uulneribusq̄ pfunt: in quē usum ex oleo trita imponunt̄. Profūt & depa-
 scentibus ulceribus. Purgat semē bilem, cōfert idē oculis, oportetq̄ tritum foliū ex oleo illis ad-
 mouere. Habet Trixago quernis similia folia, totūq̄ eius incrementū dodrantale est: q̄d a no-
 bis in Dioscor. expansæ manus mensura significatū est. Adiecit p̄terea Theophrastus odoratā,
 suauēq̄ Trixaginē hanc esse, faciliē inuētū, & ubiq̄ ex his notis cognoscendā herbam.

De Leucade.

CAP. CXII.

λευκάδα

L Eucas montana, latioribus q̄ urbana folijs, semine acriore, amar-
 riore, ori ingrato. Efficacior tamen q̄ satiuā habetur. Vtraq̄ ex ui-

no contra animalium uenena, præcipue marinorum, opitulatur.

BARBARI COROLL.

Lucas, eadem fortasse fuerit cum Leuce, ut Plinij uerba usurpem. Verum Leucadis inquit speciem, auctores non tradunt. De Leuce uero Mercuriali herbae similem dicunt, nomenque ex causa accipisse, per medium folium candida transcurrente linea, quare Mesoleucon quidam uocant. Leuce dicitur & ipsa radix, Armoracia: Itemque Androfaces. Est & arboris nomen Leuca, hoc est, alba Populi.

EX M. VERG. COMM.

Specta omnia. Siquidem Plinius nihil certum de Leucade hac tradidit: nec dubitasse tantum, sed sub hac appellatione ignorasse eam uidetur. Hic ipse etiam parum certe historiam ex his, quae modo leguntur eius tradit. Fuisse quondam certioris eius descriptionem, indicio est latinus Dioscorides, & eius præcipue qui apud nos uetustissimus codex est. In quo a necessaria diuisione caput hoc, & his uerbis incipit. Leuca duo sunt genera. Vna est montana, & altera hortua. Mox sequitur quod nunc in Dioscoride legitur, Montana lauiore, quæ fatiua folio est. Videturque hic ordo necessitatem habere, ut facta prius diuisione, Alterius generis historia, & uires tractentur. Sunt præterea in medio capite, quæ manifeste in impresso Dioscoride, & alijs graecis desint: quæ poterunt uolentes facile inuenire. Nobis paulo minus quæ pro comperto est, nullibi incolume esse hoc caput: & quod restitui in integrum non potest, quasi desperatum ulcus relinquatur.

De Lychnide.

CAP. CXIII.

Lychnis coronaria, quam aliqui Athanaton uocant, alij Acylonia, alij Ballarion, alij Geranopodion, quidam Corymbion, alij qui Taurion, alij Sceptrum, aut Maloion, Aegyptij Semeon, Magi Sanguinem Apocathemenes, Romani Genicularem, aut Balariam, Flore est albae Violæ simili, quo corollæ faciuntur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur.

BARBARI COROLL.

Lychnis æstate floret. Lucernulam Theodorus conuertit. Plinius quodam loco Flammulam cognominat, alibi Rosam Graecam. Non nisi in humidis locis prouenit, nunquam excedens quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Et hæc ab altera Græcula uocata differt, de qua diximus inter Rosas. Differt & a Lychnitide: de qua in Phlomidibus. Amerias Rhizotomus Lychnin e Veneris labro natam putauit, cum a Vulcano compressa lauir se: præstantissimamque haberi in insulis Cipro, Lemno, Strongyle, Herice, Cytheris. Lychnin hanc & Taurion dicit scribunt. Alia tamen est quæ Taura uulgo nominatur, siue Tora, flore cæruleo, folio rotundo, radice Polypodij hirsuta, & uermis nigri effigie. Venenosa herba: cui per antipathiam naturæ alia occurrit herba Antitaura, & Antitora cognomine, folio rotundo.

EX M. VERG. COMM.

Quo argumento nautis in mari sæpe uisum piscem Lucernam ueteres Romani appellauerunt, ignea per os exerta lingua, tranquillis noctibus relucens: eodem in humidis nascentem magnitudine Violæ, sed figura Rosæ, florem Lychnida, ut fertur, ueteres Graeci dixerunt. Noctibus enim hic etiam fulgere creditur, & ut nomen ex re illi factum indicat, ignis fulgore quodam uidentium oculos in se conuertere. Non aliter quæ & Felium oculi flamarum modo in tenebris fulgent, & putres in humidis caudices eodem tempore ignis speciem quandam uidentibus afferunt. Quorum & si diuersa materia sit, communis tamen omnibus causa humoris copia est. Nisi forte in Felibus, quod ab Aegyptijs obseruatum fuerat, non in humore, sed in lunæ luminibus lucis eius causa sit: ad quorum quotidiana incrementa augeantur, dilatenturque in eius animalis oculo pupillæ: & cum toto orbe mortalibus fulget id sidus, tunc etiam copioso lucis fulgore intra domesticos parietes animalis eius nobis oculus splendeat. Quemadmodum secundo uolumine in Mufela longius testati sumus. Verum tamen alterius quæstionis est, & huius, & eorum quæ paulo ante dicta a nobis sunt causas & rationes inuenisse. Nunc quod herbarium & scriptoris huius

A

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 27. cap. 11.

Mxvi

B

C interpretem deceat, floris omnē naturam dixisse satis sit. Nascitur locis humentibus hic flos, 7 Theophrasto ad extremū sexti de plantarū historia uoluminis primus inter æstiuos flores numeratus. Habet enim hæc naturæ pars sua discrimina. Nec difficile est in ea, eiusq; scriptoribus uernos, æstiuos, autumpales & hyemales obseruasse flores: & in æstiuis Lychnidem hanc, quā Plinius flāmeam aliquando ex eo quod diximus argumēto, aliquādo a gente græcam Rosā nominauit, colore purpureo, quinq; folijs tantū: & si in satia obseruauerint quidam senis florere aliquādo folijs, agrestem quinis semper. Magnitudo illi est Violæ, quā hic nō multo post matronalē uocat: eam scilicet quæ prima uer nunciat, omnesq; alios præuenit flores, & quod propriū eius est, multa uno pediculo pendet. Figura Rosæ est, folijs Rosarū modo dispositis & pendentibus. Nullū habet odorē: quod demiret aliquis: ex quo coronarius flos est, & coronarij nominis honore ab agresti distinguit: deficienteq; eo, uerisimile est solam floris spēm in coronis amatā fuisse. Ob quā causam in magno nominū & appellationū ambitu in gentibus fuit: alijs Athanarū, i. immortalē appellanibus, q; longissime a prima ætate ad extremū autumnū floret: alijs Bellaryon, quæ uox licet incertā modo habeat in græcis significationē, antiquam tamen fuisse in lexico suo Isichius indicat: Ballarin trifoliam herbam esse dicens, nec ultra quicq; de ea restatus est. Plinius lib. 21. capite. 26. radicem Lychnidis non coronariæ & satiaæ, sed agrestis Afianos Bolitē appellasse tradidit. Potuerūtq; hæc simul misceri, & in duabus uocibus quæ principij similitudinē aliquā haberēt, in diuersam penitus librariorū incuria finē euasisse. Verū ut sæpe alias testati sumus, nō multifaciēda hæc sunt: eaq; ob cām cetera a nobis relinquunt.

Λυχνίς ἄγρια

De syluestri Lychnide. CAP. CXIII.
LYchnis syluestris, Tragonoton, alias Atocion, alias Hieracopodion, aut Lampas uocatur. Aegyptijs Semura, Magis Apothemenes Taurus, Romanis Agreste Intubum. Omnia urbanae similibus. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis poto. Ictus a Scorpione subuenit. Aiunt huius hærbae appositu, scorpiones torpescere & inertes prorsus reddi

BARBARI COROLL.
LYchnidis syluestris radicē Afiani Boblitem uocāt. Hanc a nostris Accipitrinū pedem appellari scribit Dioscorides, q; Accipitrinus pes apud nostrū uulguis est, quæ Corneola quocq; dicitur, folio Salicis fere pulillo, flore subluteo, cum filiquis Ciceri similibus, & in ijs semen inficere capillos dicitur, colore rubro. Qualis autē sit Pes milui, siue Pes miluinus, dicta Columellæ inter herbas, quæ in usum colligi & reponi oportet, ipse non explicauit.

EX M. VERG. COMM.
Communes satiaæ, Coronariæq; Lychnidis agresti & rusticæ appellationes similis itudo fecit. Et quā hic agrestem Hieracopodion, id est, accipitrinū pedem uocari ait, illic satiaū Gruinū notari dixerat, nulla, aut exigua diuersitate. Credimusq; nos, foliorū hærbae, non floris notam hanc esse. Quemadmodū certa floris est, quā hic Lampada dixit, manifesta significatione a luce, fulgoreq; illo, de quo in Satia dictū longius est. Foliorū itidem, nō floris notā habent agreste Intybū, & Seris. Ceteræ a peritioribus docendæ relinquuntur. Agrestis Lychnidis tantū in medicina usus est. Nec refert, q; hic satiaū semen scorpionibus aduersari dixerit. Id enim primū & efficacissime agrestis potest. Nec Plinius aliter decreuisse creditur, & ante eum Nicander in Theriacis suis. ὅσα τὸ λυχνίος ἴσθιν. &c. Quo loco interpretis eius de agresti hac intelligi tantum iubet, unamq; hanc ὀφιοδύκτισσος καὶ σκορπιόδύκτισσος mederi.

λυχνίον

De Lilio. CAP. CXV.
GRæci Crinon Basilicon uocant, alijs Crinanthemon, alijs Calirion, Magi Martis sanguinem. Osthanes auram Crocodili, Aegyptij Simphæphon, quidam Tialon, Latini Lilium, aliqui Rosam Iconis, Syri Sasa, Aphri Abiblabon. Lilia coronamenti se dedūt, Lyria a quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alijs Susinum appellant. Neros, & priuatim uulua

A duricias emolliens. Folia hærbae illita, contra serpentium ictus auxiliantur. Feruefacta, ambustis proficiunt. Aceto condita, uulneribus optulantur. Succus adiecto melle, aut aceto, in aëreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni, ambusta sanat. Vuluam emollit. Menses ciet. Vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita, neruis præcisus, luxatiscq; medetur. Vitilignes, furfures, & lepras emendat. Vlceraq; in capite manantia expurgat. Abstergit faciem, & erugat. Teritur in aceto, cum Hyoscyami folijs, et farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum, moribus serpentium aduersatur. Ignibus sacris semen, & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ, efficacissima unguentis nascuntur.

BARBARI COROLL.

Lilium Græci Crinon, sed fruticem eius Crinoniam, quasi Liliarium, ut uiolarium, & rosarium appellant. nam Lilieta, rosæta, uioletaq; aliud sunt, ut constat. Lilium e lunonis lacte natum, Græci perhibent, resperfa terra, dum Hercule dormienti uberibus admoto, mox post factum digresso, late fluxit. Ob id Lilium a nostris lunonia rosâ dictum uideri potest. Philinus a quibusdam non uocari quod sit Lilium existimat. Ambrosiam Corinthi Nicander, & Aphrodites Charma, hoc est, quasi Veneris uolupiam cognominari a quibusdam cecinit. In Colonia, ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosiâ, Carystius, quæ nihil aliud sit q̃ Liliū, memoriae proditum reliquit. Nascitur e lachryma sua Liliū, inarescente cum defluxit, uelut Olfactum. Liliū quadruplex genus in Theophrasto. Primi, flos Vere cū Viola sepe alba, paulo postea erumpit. Hoc ab eo proprie Crinon, hoc est, Lilium uocatur. Alterū genus Liriū appellat, uere quidem omnino florens, uerū serius cum Narcisso. Forteq; hoc sit quod a Plinio Liliū trans maria nuncupatum est. Tertiū æstate floret, & Cerinthum priuatim uocari puto, q̃q; et alias res Cerinthus significat: ut inferius liquebit. Quartū genus, qd itē Liriū Græci nominat, Autumno floret: emicatq; primis hyemibus. Est & rubens Lilium, differēs (ut arbitror) a purpureo, usum a nobis Patavij in Felicis horto. Probauissimum in Antiochia, & Laodicea Syria: mox Phaselide: quartum locum obtinente: qd in Italia nascitur. Hoc genus, pprie Crinon a Græcis uocari, & florem eius Cynorhodon, autor est Plinius. Hoc & Hippocrates acceperit, cum rubentia Cynorhoda feminarum purgationibus cōmendat in uino. Lilia purpurea & artemisia, maceratis in fece uini scapis antequam serantur mense Martio, & in scrobe circumfusus eadem fece: in quem usum scapos arescentes colligunt Iulio mense, Lilia in fumo suspendētes. Caule gemino Purpurea uisuntur aliquando, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, calix herbaceus. Post æstivum & æquinoctium autumnū florent Purpurea: quorum genus unum uocant Narcissum: cui uidelicet in radice sunt folia. Calices, ut diximus herbacei, cetera eadem quæ candidis. Albo nihil est fecundius, una radice quinquagenos sæpe nutriente bulbos. Lilium Rosæ nobilitate proximum. Ideoq; lunonis rosâ dicitur. Nulli florū proceritas maior, interim cubitorum trium: languido semper collo, & oneri suo impar: candor eximius, folijs eius foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim se laxantibus, calathi effigie, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine stantibus in medio croceis. Ita odor, colorq; duplexq; alius calicis, alius staminis. Differentia angusta. Raro duplex caulis in Lilio. Singulis caulibus Lilia modo singula, modo plura sustinentur: quod & rarius est. Pandit se, uel detractum parenti, etiam si tristius & exilius. Lilio simile in Aegypti palustribus gignitur, sed folijs copiosis, colore admodū uirētib; dispositis, et quasi uno uersu cōditis, ad mulierū profluuiā, & fracturas medicis questū. Cerinthus, de qua scribere distulimus, & Rhitacē, siue ut Aristoteles, Crithacē significat: quæ & Sādaraca appellat, & a Dioscoride Cerāthemōs, libro quinto, ex arborū succo, gummi mō genita & uerno rore. Vnde Vernigini quoq; uulgo nomen. De hac & in Propole nō nihil diximus, africi statu minor, austri, nigrior, aquilonibus melior, et rubēs. Plurimū in Græcis nucibus, apū cibo aptissima dū operatur: q̃ sepe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, amari saporis, & humore plenus. Menecrates, sed nemo præter eum, ut inq̃t Plinius, autor

Pli. li. 21. ca. 5.

The. li. 6. ca. 6.

B**K**

D I O S C O R I D I S

C est, Erithacem, aut Cerinthum florem esse futuræ mellationis indicium. Est & Cerinthe quæ uocatur herba propter apes serenda, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo, mellis succum habente: cuius gramen Virgilius esse dixit ignobile. Quæ nominum uicinitas, fortasse Menecratem fecellit. Nam & Aristoteles Cerinthi florem ad hunc usum citat in libro de animalibus: quanquæ in eo non Cerinthus, sed mendose scribitur, calythrus.

EX M. VERG. COM M.

E Xigebat floris maiestas, ut longius de eo ageremus: sed tã certa in Plinio, Theophrastoquæ, et in his quæ eos scriptores cõmentationibus suis miscuerunt, historia est, ut nihil dicendũ nobis reliquũ fuerit. Nõ tacebimus tũ quid hic ait Liriũ a quibusdã Liliũ dici a Theophrasto uolumine. s. de plantarum historia, non magis Lilio quæ Narcisso tribui. Verba eius sunt, ὁ δὲ νεφριώτης ἢ τὸ λείριον, οἱ μὲν γὰρ τοῦ τοῦ οἱ δὲ τοῦ καλοῦσιν. Quod est, Narcissus uero, aut Lirium. Hi enim sic, illi eo nomine uocant. Verum certius suo loco Narcissi tractabitur historia.

βαλλοτή

B De Ballote, seu Marrubio nigro. CAP. CXVI. Alloten, nomine alio nigrum Marrubium, aut magnum uocant, aliqui Nophthan, alij Notianoscemin, alij Nospraffon, alij Nothera, alij Nochelin, aut Nostelim, alij Nophrim, alij Gnoturim, Romani Vicerariam, aut Marrubium nigrum, alij Canthurinum, Aegyptij Asphon, Magi Isionis sanguinem. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice. Folijs maioribus quæ Marrubij, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graue olentibus, Apiaastro proximis. Vnde aliqui Apiastrum eam uocauerunt. Caulibus albis, orbiculato florum ambitu, qui Rotæ speciem præbeat. Vis eius effica aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut cõdylomata reprimat. Purgat & sordida ulcera cũ melle.

Pli. li. 27. ca. 8.
lib. 24. cap. 15.

B Allote, fruticosa est herba. Nec uideo qui possim tueri Pliniũ, qui ait, Græci Porrum nigrum uocant. Et infra, Ballote inquit folijs est Porri maioribus, nigrioribusquæ. At Græci non Porrum nigrum, sed Marrubium nigrum Ballotem, sine ulla controuersia cognominant, Nec folia ei sunt porracea, sed Marrubij & Citraginis. Deceptum affinitate nominum constat Prafon, melian, pro prafron legentem. Est autem Prafon Porrum, Prafron Marrubium. Idem error a Plinio committitur in herba Stachye.

EX M. VERG. COM M.

D Eprehenderunt iam pridem & alij turpem Plinij in Ballote lapsus lib. 27. cap. 8. Porrum nigrum eam appellantis. Diuque iactatus contra eum scriptorem hic error est: quæ nulla ratione excusari in homine potest, tam apertam culpam, & ex culpa facilem criminationem habet. Id nos relinquimus, quod semel in iudicium delatum fuerit, ad nouam reuocare censuram asperius existimantes. Nec aliud bonarum artium, præsertimquæ græcarum literarum cupidus monemus, quæ nullam fore unquæ satis in earum professione illis diligentiam, ex quo in unius tantũ literarum mutatione, adiectione, detractiõneue tantum uersatur periculum: ut pro Marrubio, Porrum aliquis alios doceat. Nota omnibus modo etiam Ballote est, a foliorum similitudine Marrubium, a coloris diuersitate Nigrum dicta. Siquidem candidus Marrubio, Ballote uero niger caulis est, reliqua omnia similia & æqualia habentibus: ut ex utriusquæ historia cognouisse facile est. Hanc Marrubium, alterum Marrubium, id est, secundum aliqui manifestam indicationem dixerunt: quoniam illud prius, hoc posterius sit: non naturæ ordine, sed hominum honore & appellatione. Habet & ulceraria appellatio alia certam ex usu & uiribus causam: quemadmodum & Marrubium Cantherinum a Romanis dici potuit, quæ eo pascereur cantherij.

μελισσοφυλλον

M De Apiaastro. CAP. CXVII. Elissophyllon Græci, alij Melithæum, alij Melithænam, alij Meliphyllon, alij Erythran, Latini Apiastrum, aut Citraginem, Galli Merisimorion uocant. Id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa

herba delectantur. Cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo ante diximus, similia essent, nisi minora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent. Folia cum uino pota, aut illita, prosunt contra ictus phalangiorum, scorpionumq;. Item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest. Defectionibus foeminarum adciundos menses conuenit. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliant. Torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt. Vlcera purgant. Articulares dolores illita sedant.

Melissophyllon, siue Melinon, Apiastrum ab Igino uocari cepit, eruditissimo alioquin uiro, sed quæ omnes hac in parte damnent. Et quod magis mirere, sequantur tamē. Nam & Dioscorides, & Varro ita eam uocant. In coronamenta folio & hæc uenit. Adeo autem nullo magis flore apes gaudent, ut si perungantur alucaria eo, non fugiant, & in copia eius examina facillime contineantur. Citraginem a nostris uocari & hanc Dioscorides affirmat, ab odoris similitudine. Palladius uero q̄ recte, nescio, Melissophyllon aliud a Citragine, siue quod idem est, Citreagine uidetur intellexisse, in mentione apum.

BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 20
lib. 20. cap. ii.

EX M. VERG. COMM.

Omnes Apiastri in grecis appellationes, exceptis barbaris, latinisq;, a melle & ab apibus sunt. Satisq; indicadis his, ne tot alios numeremus, Nicæder in grecis, Maro in latinis est. Quorum alter fame pressis, aut morbo laborantibus apibus apponi iussit trita Melissophylla. &c. Alter in theriacis suis longius descripta re cecinit. τὴν ἑτοὶ μάλιστα ἔπικλειοναι βοτάνης οἱ δὲ μέλιται, τὴν γὰρ περὶ φύλλα μέλισσαι, ὅσα μὴ διλγόμεναι μέλιτος φοῖβον δὲ ἔνται. Quin etiam Plinius. xi. uolamine & capite uicelimo Melitenā uocari Apiastrū dixit. Omnibus, ut testati paulo ante sumus, mellis, aut apium ratio & significatio coniuncta est.

B

De Marrubio. CAP. CXVIII.

PRASSIONE Græcis aliqui uocant, alij Eupatorium, alij Phyllophares, alij Tripedilon, alij Camelopodion, Aegyptij Asteropen, Magi Tauri sanguinem, aliqui Aphedron, Latini Marrubium, aliqui Labeoniam, Aphri Atierberziam. Frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro. Semina in caulibus, & ex interuallis flores uerticillato ambitu asperi. Nasctur propter ædificia, & ruderata loca. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus, datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad rabitudinem redactis. Crassam e pectore pituitam, cum sicca Iri eijcit. Mulieribus a partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. Item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut a serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renescq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt. Laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. Cum uino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. Naribus regium morbum expurgat. Aurium doloribus conuenienter instillatur, per se, aut cum rosaceo.

πράσιον

K ij

C
Pli. li. 20. ca. 22

MARRUBIUM duplex, folio herbaceo, & incisuris altioribus serrato, unguentarijs, ut Theophrastus ait, quæsito ad quædam. Hoc & candidum appellauerim. Alterum folio rotundiore, uehementer squalido, ut Saluia, & obscurius serrato: quod quidẽ ego, aut Balloten ipsam, de qua diximus, aut ei ualde similem interpretor. nam & medicina congruunt in Plinio.

E X M. V E R G. C O M M.

FECIT Theophrastus libro sexto de plantarum historia Marrubij duo genera. Alterum quod magis herbaceum, magisque incisuris diuisum folium haberet: quo qui pharmaca & morborum remedia tractant, in aliquibus uterentur. Alterũ quod rotundiore & squalidiorẽ folio esset: quale in altero Saluie genere, quod Sphacelum nominant, uidet & in eo tenuioribus incisuris. Videturq; diuiso hæc in hoc tantum Marrubij genere facta ab eo fuisse. Quam uero Plinius, autore Castore, in nigrum & candidum tradidit Ballotem, paulo ante descriptam, & hoc manifeste complectitur. Nisi forte quod hic colore tantum discreuit, Theophrastus incisuris foliorum indicauit, & præter incisuras herbaceo colore & squalore: ut ex his niger color, & candidus intelligeretur. Siquidem nigredo in plantarum folijs, plenior & obscurior uiredo intelligenda est: & in squalore cinereus et albicans color in plantis plarumq; uidet. In quam partem inclinat animus nobis: nec aliud, sed aliter a Theophrasto & Plinio dictũ fuisse de utroq; Marrubio existimamus. Fuit hoc olus in multo nominum honore apud ueteres, quemadmodum multis in medicina etiam usus, præsertimq; in laxandis liene & icore, curandisq; tot alijs morbis & uitijs, quæ hoc capite a Dioscoride numerantur.

EXV

De Stachye. CAP. I. CXIX.

D

STACHYS frutex est, Marrubio similis, sed longior. Folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, Marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.

Pli. li. 24. ca. 19

B A R B A R I C O R O L L.

STACHYS, folijs colore in luteum inclinante, nec Porri, ut Plinio placet, sed ut Dioscoridi, qd & nos uidimus, Marrubij similibus: quod & in Ballore idem autor peccauit. Vidimus eam Romæ, ubi & Nauiculam, & alij Coronatam herbam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

SINOMINIS in Stachy hac ratio expendat, spicatus credetur frutex: quales pleriq; alij, & herbe quotidie uident. In frugibus em̃ primo Stachyn græci adhuc Spicā uocāt. Sed nullũ Spicę uelut gium in eo deprehendit. Hic nihil qd eo pertineat dixit. Nec Plinius lib. 24. cap. 15. de eo agens Spicę aliquid simile in eo ostendit. Græcorũ medici nihil addiderunt, pterq; amaro sapore esse Stachyn, tertiu in calefaciendo ordinem habere: nec solũ menses et secundas pellere, sed abortiuum etiã esse. Quod uero omnibus cõmune sit, Marrubio similẽ oēs fecerunt. Qua una similitudinis ratioẽ, nullam in eo Spicam conijcere licet. Habet qdem græcorum Stachys præter primam illam Spicę significationẽ plaraspq; alias. Nam & in medicina nexus, uinculiq; modus & ratio quædam Stachys dictus est. Et in nauium fabrica, alijsq; aliquot artibus nomen hoc inuenitur: sed ubiq; a Spicis translatus. Fecit rem minus certam Plinius etiam, qui contra hunc scriptorem colore in luteum inclinato folia describit, quæ hic candida tradit.

Phyllitis

De Phyllitide. CAP. CXX.

PHYLLITIS, quam aliqui Phyllin, alij Acaulon, alij syluestre Lappathum uocitant, folia promit Rumici similia, longiora, & uiridiora, sena, aut septena, quæ parte anteriore læuia cernunt, a tergo autem pensiles quasi uermiculos ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorũ ambulationibus emicat, gustu acerbo. Neq; caulẽ, neq; semẽ pfert. Folia in uino pota serpentiũ morsibus aduersant. Quadrupedibus p os infusa auxilio sũt. Et si dysetertia, aut resoluta aluus exercet, potui danẽ.

BARBARI COROLL.

Aliud uidetur genus Phyllitis esse, q̃ Phyllanthion. Est aut̃ Phyllanthion cognomento Dy-
ticon apud Democritum, ad purpuram tingendam satis celebre, nec præterea quale id sit mon-
stratur. In Theophrasto ac Plinio legitur & Phyllanthes herba, inter spinosas, sed mitior acule-
is, & ab radice tantum foliata.

EX. M. VERG. COMM.

Foliosus cespes potius q̃ planta Phyllitis est, ubiq; ad parietū radices nascens. Ob quam cau-
sam ex antiquis græcis & posterioribus latinis aliqui, non Phyllitida tantum a folijs, sed Pyrgi-
tim a turribus etiam, q̃ ad radices earum nascitur eam dixerunt. Viret diu herba, contra geli-
cidia hyemis contumax, nullo unq; prolato caule: ex quo Acaulos etiam dicta fuit. Id enim ea
uox græcis significat. Feliciq; similitudinis comparatione usi sunt, qui Rumici eam, ut est, simi-
lem uidentes, syluestrem Rumicem appellauerunt. Rigent recta in altum surgentia eius folia.
Ex quo hic interiorē eius partem appellauit, eam scilicet, qua se inuicem folia spectant multo
lauiore nitentia, extrinseca autem quā parietes & terram. Negauit hic ultra caulem, flores & se-
men ferre Phyllitim; nec nos aliter obseruauimus. Dubitandum tamen, & querendum de se-
mine est, cum copiosa, & quibus locis antea non fuerat nascatur. Paulus Aegineta nihil de ea
aliud tradit, q̃ acerbo sapore esse, ideoq; potam fluores alui compescere.

De Phalangio. CAP. CXXI.

Phalangium a quibusdam Phalangition uocatur, ab alijs Leu-
cacantha. Ramuli sunt ei duo, pluresue, in diuersa tendentes. Flos
candidus, Lilio similis, multas incisuras habens. Semine nigro, lato ad
Lenticulę dimidiatę figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, hæc
bacei coloris, dum a terra eruitur. Prouenit in collibus. Huius folio, se-
mine, flore cum uino poto, auxiliatur contra scorpionum, phalangio-
rumq; ictus. Tormina quoq; discutit.

BARBARI COROLL.

EX. M. VERG. COMM.

Phalangion, & Leucanthemon, & Leucacantham uocant. Flos Lilio rubro similis.
Omittimus quæ Paulus Aegineta libro. 6. de ea dixerit, *φαλαγγίτις ἀνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τοῖς
φαλαγγίσι θορυβῶν*. Plinius enim satis unus est idem testatus lib. 27. Huius folio, uel flore, uel
semine contra scorpionum, phalangiorumq; & serpentium ictus auxiliatur. &c. Tantaq; illi,
& tam presens contra Phalangiorum morsus uis est, ut uno hoc salutis humanæ auxilio cla-
ra inter alias plantas semper fuerit. Nec tantum illi ad gloriam nominis profuit Lilio similis &
candidissimus flos, ob quem Leucacantha dicta etiam est. Candorem enim floris utraq; ea uox
indicat, quātum a ueneno insecti illius per eam seruata homini salus. Habet Phalangites notas
ubiq; & adhuc omnes illas quæ a Diosco. & ab alijs in historia eius illi tribuuntur. Nec diffici-
le est locis incultis eam inuenire. Nosq; ex obseruatione eius, non sine ratione persuademur qd
nunc in Diosc. legitur, flores multas habere incisuras, non de floribus, uerum de folijs rectius
intelligi posse. Plures enim quales in quercu folium eius incisuras habet, idq; mediocris Betæ
quantitate est: nihil tamen in communi græcorum omnium sectione mutatum a nobis est. Eo-
dem modo quod *παχύ*, idest, crassum in cunctis legitur, *πλεῖν* latum legi debere. Plinius enim
lato semine eam describit: & hic dimidię Lentis quantitate dicit esse: pauloq; post Lente graci-
lius, quod crassitudini non respondet.

De Trifolio. CAP. CXXI.

Graci Triphyllon, alijs Oxyphyllon, alijs Menyanthes, alijs Af-
phalzion, alijs Cnicion uocant, Romani Trifoliū, aut acutum,
aut odoratum. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habēs
tenues, iunceas & nigras, e quibus ramulares enascuntur appēdiculę,
quæ in terna singulis germinationibus exeunt folia, Loto arbori simi-
lia. lis recenter enatis Rutę odor inest. Vbi autem adoleuerunt, bitu-
K ij

A

Pli. li. 21. ca. 16.

φαλαγγίτις

φαλαγγίτις

B

τρίφυλλον

C men olent. Florem ædit purpureum, semen quādamtenus latum, sub-
hirsutum, ex altera extremitate extertum, ueluti corniculum gerens. Ra-
dix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ
difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sentiunt,
fœminis quoq; uulua uitio oportunis, auxiliantur. Menfes cit, ternæ
drachmæ e semine dari debent, e folijs uero quaternæ. Contra serpen-
tium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt
aliqui totius fruticis, radices, foliorumq; decoctum fotu dolores eorum
finire, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua huiuscemodi sana-
tus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perin-
de afficitur ut a serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in
tertianis, cum uino potui dedere, & in quartanis quaterna, ut quæ fe-
brium circūitus discuterent, Radix antidotis inseritur.

Pli. li. 29. ca. 6.
lib. 21. cap. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Trifolium tribus generibus, Minyanthes, siue Asphaltis, siue Asphaltis, ut Archigenes,
maior folio; quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon cognomine. Tertium ex
omnibus minutissimum. Herba optima in prato Trifolij est. Præfagia tempestatum habet, in-
horrescit enim, & subrigitur contra eas. Sophocles pœta uenenatū id existimat. Serpentes in
Trifolio nunq; spectantur. Columella Trifolium Simoniamum, & acutum quoq; dici hoc tra-
dit, fragosis locis inueniri, longis, hirsutisq; folijs uirere, caulemq; robustiorem facere, q̃ Tri-
folium pratense.

E X M. V E R G. C O M M.

D Quæ in scriptore hoc a principio capitis huius statim numerantur Trifolij tres appellatio-
nes, Oxytriphylon, Menianthes, & Asphaltion, non satis certam in antiquis scripto-
ribus rationem habent; nec constitui ex illis facile est, sint ne diuersorum Trifolij generum di-
uersæ notæ, an eiusdem plantæ diuersarum gentiū diuersæ tñ appellationes. Nicander in The-
riacis suis unum esse Trifolium quod pluribus nominibus censeatur, his indicat uerbis. *καὶ τριφύλλον ὀπάζο. & c. τὴν ἴτοι μνιανθὴν ὃ δὲ τριπίτκλον λίσσας, χαίτην μὲν λωτῶ ῥυτκί μὲν ἴσσαν
ὀδμὴν.* Quod est, Sumito & Trifolium, quod Menianthes aliquis, aliquis uero Tripetalon uo-
cat. Pro quibus interpretis eius a Dionysio herbario Trifolium Menianthes uocari ait: habere-
q; Loto simile folium, odorem uero Rutæ cum nondum creuit: postquæ uero exoleuit, deflu-
entibus iam folijs, odore bituminis sentiri. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt. Qui, modo
integra in eo pars illa sit, non aliter de Trifolio sentire uidetur, q̃ unū, idemq; omne esse, diuer-
sisq; his nominibus ob diuersas censei causas. Nec aliud Paulus Aegineta etiam libro sexto
de Trifolio tradidit, *τριφύλλον* dicens *ἴο δὲ ἀσφάλτιον, ὃ δὲ δευτερίφύλλον, ὃ δὲ μνιανθὴς.* Quod est,
Trifolium, quod alij Asphaltion, alij Oxytriphylon, alij Menianthes uocant. Plinius contra
uicesimo primo uolumine, capite nono diuersa genera his uocibus indicari tradidit. Folio co-
ronat & Trifolium. Tria eius genera, Menianthes uocant græci. Alij Asphaltion maiore folio;
quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon. Tertium ex omnibus minutissimum.
Manifesteq; Menianthes, & Asphaltion illi idem est: Oxytriphylon autem diuersum. Colu-
mella grauis & ipse autor, lib. 7. ca. 15. de Trifolio hæc ait, Vel simonianū Trifoliū, qd inuenitur
fragosis locis efficacissimū tradit, odoris grauis, neq; absimilis bitumini, et iccirco græci Asphal-
tion appellant. Nosri aut propter figurā uocant acutum Trifoliū; nam longis, & hirsutis folijs
uiret, caulemq; robustiorem facit q̃ pratense. Quæ Plinio contraria sunt. Ille eñ Menianthes, &
Asphaltion idem facit: hic Asphaltion & Oxytriphylon. Theophrastus semp fere Menianthes
Trifoliū omne uocat. Ex his non facile censere in Trifolio est, quæ nā eius gñæ, & generū appel-
lationes q̃ndam fuerint. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, in eam partem inclinat animus,
ut duo sint Trifolij genera. Cōmune et pratense hoc, omnibus notū. Et acutioris folij alterū, qd
græci Oxytriphylon dixerunt: & hoc Menianthes & Asphaltion uocari. Factaq; illi primā apel-
lationē, q̃ flore suo se indicet: id eñ ea uox significat. Secūda uero, cū iam ab integra ætate dila-
bi cœpit, & bituminis odore cōtraxerit, inuenisse, Suum tñ unicuiq; iudiciū & arbitrium erit.

¶ De Polio.

CAP. CXXII.

A

πόλιον

Polium montanum, aliqui Theuthrion, alij Feuxaspidion, alij Achamenin, alij Ebenitin, alij Melosimon, nonnulli Belion, quidam Leontocharon uocant. Duo genera eius. Montanum, cui Teuthrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, neq; palmo altior, semine refertus. Capitulo in cacumine quadam corymborum speciem præseferente paruo, canis hominis simili, grauius olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usqueadeo ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruefacti ius auxiliatur serpentium ictibus. Hydro picis, morbo regio, & lienosis ex aceto. Stomachum male habet. Caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet. Substratum, suffitumue serpentes abigit. Illitum uulnera conglutinat.

B A R B A R I C O R O L L.

Polium carnosum, ut alia multa, folio, uestibus interpositum, arcer animalium nocentia. Cules ab eo, caprifici modo generari, Theophrastus scribit. Herba incluta Hesiodi, & Musæi, laudibus ad oia utilem prædicantur, & ad famam quoq; dignitatis perungi, tractari, coliq; iubentur. Folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cerulea spectari: quod quidam a Dioscoride Tripolij floribus ascribitur. Theophrastus certe modo Polium, modo Tripolium eandem uocauit herbam. Ideoq; a Tripolio differre quidam negarunt. Folia Polij, canis hominis similia, a radice protinus nuncq; palmo altiora Plinius existimat. Quidam folia Thymi reddunt, nisiq; molliora sunt, & lanatiore canticæ. Nulla magis herba conuenit medicamentis, quod Alexipharmacum uocant: in quod minore, ut Galenus inquit, utimur.

Pli. li. 21. ca. 7.

26. cap. 7.

Theoph. li. 1. de hist. plant.

E X M. V E R G. C O M M.

Non potest, Polium cum Tripolio diuersi generis plantas, tam multis locis miscens, defendi Plinius: nec eius scriptores auctoritate excusari, qui commentationibus suis, dissimulato hominis errore, eadē illa ut erant, adiecerunt. Contra Plinium enim scriptor hic, Theophrastusq; & quod pluris merito faciendum est, res ipsa stant. Polium siquidem uidere passim licet, nullas Tripolij notas habens. Obseruauit multo ante hæc tempora in Plinio, qd dicimus, & commentario quodam suo declarauit Leoniceus, uir nostra ætate huiusmodi doctrinarum peritissimus. Eaq; obcausam, non erimus nos in his ultra longiores. Satisq; græcarum literarum imperitis nouisse fuerit, caniciem Polio nomen fecisse, quæ in summo plantæ cacumine pendens, canos hominis capillos præfenti quadam imagine ostendit: consueuissq; Græcos scriptores, cum maioris amaritudinis indicatione aliqua uti uellent, a Polio hoc rationem & exemplum fumere: semperq; βαροδμον, quod est graue olens, appellare. Theophrastus primo de plantarum historia uolumine, quod ad seruandam rem domesticam pertineat, Polio tribuit, ut uestibus interpositum ab insectis, quæ eas erodendo dehonestant, incolumes seruet. Verba eius sunt. τούτῳ δὲ καὶ πρόσ ὅπως τούτῳ ἐν τοῖς ἱματίοις ἀγαθόν. Meminit eius & Nicander in Theriacis suis, ἀπὸ πολίου βαροδμον ὅλην γίνεσθαι ὁ ὠδὴν. Laudauitq; præcipue contra uenenata.

B

¶ De Scordio.

CAP. CXXIII.

σκόρδιον

Scordium aliqui Scorbion, alij Pleuritum, alij Dysosimon, alij syluestrem Calaminthen, quidam Chamædryn, alij Mithridation, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij Apho, Romani Trifaginem palustrem appellant. In montibus & palustribus nascitur, folijs Trifaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum Allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus. Quadrangulis caulibus, sub rubro flore. Hærbæ uim excafactoriam habet. Urinam cit. Cocta recens aridaue cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur. Ad stomachi quoq; roisiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, bis

K iij

Cnis drachmis cum hydromelite. Crassamen purulentum pectore expellit. Facit aridae farina ad ueterem tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modice praecordia carato excepta, recreat. Cum aceto acri, aut aqua, podagris conuenienter illinitur. Menses imposita mouet. Vulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrescentias in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;

Pli. li. 25. ca. 6.
26. cap. 8.

B A R B A R I C O R O L L.

Scordion, item Scordotis Mithridati ascripta est: cuius depicta manu Crateas medicus uidit, magnitudine cubitali, ramosam, folijs lanuginosis. Reperitur in Ponto, campis humidis, pinguibus. Est & alterius generis latioribus folijs, Methastro similis. Alia est a Mithridate similiter inuenta, quam Mithridation uocant. Huic folia inquit Plinius, duo a radice Acantho similia, caulis inter utraq; sustinens roseum florem. Hanc ipsam puto est, quam idem Plinius Chamaeropa uocauit libro sexto & uigesimo, ijs uerbis. Eosdem inquit effectus habet, lateris doctoribus Chamaerops, myrteis circa caulem geminis folijs, capitibus graeculae Rosae.

VERG.

Habet certas, & cum scriptore hoc cunctis alijs easdem, quibus inueniri & inuenta cognosci possit palustris Trixago notas: odorē, qui illiberalis, nec Allio absimilis illi est: & post odorem ferratam foliorum formam: quibus primo & per se dictam totam Trixaginem refert. Habet & quae numeratae a Dioscoride non sunt, in summis caulibus roseos flores, & in quibus uariant antiqui scriptores proprios & natales eius locos: censente hoc in montanis, Plinio autem in campestribus nasci herbam. Cuius ob diuersas, multasq; has notas plura fuerunt quondam nomina. Scordion, quae uox ab Allijs facta illi est: cuius odore sentitur. Scordon enim Graeci Allium uocant. Quo etiam Scordotis pertinet a Plinio dicta, & ab hoc Dysosmon mali & ingrati odoris sensum indicans. Quemadmodum agrestis Nepeta, a Plinio autem Menthastrum dicta, generis nota magis quam appellatio alia est. Si quidem Plinius, 25. uolumine capite. 6. ait. Est & alterius generis latioribus folijs Menthaastro similis. Ex quo factum est, ut quae diuersi generis nota quondam fuit, inter appellationes ab imperitis numerata fuerit. Ut autem Trixago appellaretur, similitudo fecit, & Mithridanes Ponti rex, medicinae tantopere fauens: ut inuentione eius Crateas herbarius illi adscripserit. Habet post omnes palustris Trixago Romana uox, certam ex superioribus causam. Trixagini enim similis eodem nomine dicta est. Palustris uero, quoniam ut Plinius, & hic dixerunt, humentibus locis nascitur. Conueniuntq; in hoc omnes, discrepant autē in reliquis. Hic enim *ἰσχυρὸς*, id est, montanis, Plinius campis humidis, pinguibusq; nasci dixerunt: non leui discrimine, inter campestre, & montanū terreni genus. Nobis in Plinij sententia magis inclinatur animus. Vidimus enim in incilis margine campestri agro nam tam rubete rosaceo flore, certissimo Alliorū odoris sensu. Multi in medicina usus palustris Trixago haec quondam fuit. Nosq; inter cetera diximus, purgare quae in pectore haeserunt, crassa purulenta. Non purulentas excretaiones illas intelligentes, quas Graeci empyemata noiant, sed pituita, crassosq; humores qui frigore, gelicidioq; aliquo in pectore puris modo albescentes concreuerint. Id enim significare nobis uidetur *πύχον πυώδες*.

01X119

De Tussilagine.

C A P. CXXIII.

Bechion Graeci, quidam Richion, alij Pettinam uocant, alij Pegaton, alij Pithion, alij Pagonaton, alij Chamaeleucen, alij Procheton, alij Arcophyton, alij Chamaegiron, Aegyptij Saarthan, Latini Tussilaginem, quidam Pharphariam, aut Pustulaginem, Bessli Asa. Folia ei sunt maiuscula quam Hederae, sex, aut septem a radice, subalbida a terra, superne uirentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus, flos luteus. In uere flore & caule confestim exiit. Inde nonnulli his uacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua. Nascitur in az

incenis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammacionibus illitu medetur. Arida fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi, atq; orthopncea infestantur. Pectoris uomicas rumpit. Eundem effectū præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eiicit.

BARBARI COROLL.

Bechion, siue Bechicon, duo habet genera. Syluestris ubi nascitur, subesse aquas credunt: Et hoc habent signum aquilegi. Describitq; hanc Plinius aliter, q̃ Dioscorides, folia eius tradendo superne pallida, subalbida a terra, sine caule, sine flore, sine semine. Altera a quibusdam Saluia dicitur, similis Verbasco. Hanc a Dioscoride Verbascum syluestre dici puto, ita scribente. Habetur inquit & Verbascum syluestre altum, uirgis arboreis, folio Saluie, orbibus uirgas cingentibus, ut Marrubium, floris lutei, fulgore auri. Quidam priorem Arcion, & alio nomine Chamaeleucen putant. Est autem Chamaeleuce, quam nostri Farfugium uocant, folio Populi, sed ampliore, nascens iuxta fluuios: unde Populago dicta sit a nostris. Hanc & Farfariam uocari Dioscorides testis est, a fluuiio fortasse Farfaro, quem Virgilius Farinam appellat. In Sabinis Plautus, Dissipabo inquit te ut folia Farfari. Itemq; in Penulo.

Pli. li. 16, ca. 6.

Prosternebam inquit eos, ut folia Farfari.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Tussilago illa, quam hic in totius operis præmio dixerat, falso credidisse quosdam, nec caulem, nec florem, nec semen ferre: & quam ignorantie eorum causam tunc reliquerat, legendam uolentibus hoc loco tradidit: ferre quidem illa aliarum plantarum modo testatus: sed tam breuis uitæ cuncta esse, ut obseruari facile non potuerint: quodq; obseruatum non fuerat, negatum naturæ imprudenter fuisse. Quæ si ad Hypanim fluuium, qui ab Europæ parte in Pontum influit, in animalium censu bestiolas genuit, quæ unum diem uiuunt: in plantis multo facilius eandem potuit ostendere fortunam: herbasq; aliquas esse, quæ pro lato caule statim decaluescerent, & pandente se flore deflorescerent. Qualis Tussilago hæc est, a Græcis Bechion ideo dicta, q̃ tussi & tussientibus medetur: non omnibus, sed his qui tantū tussiant, nihil autem pituitosi excrementi simul extussiant. Quod genus hic, siccam tussim dixit: Plinius ueterē nominauit. Ex quo factum est, ut Plinij uerba exscribens in Dioscoride Barbarus, quod *ἐμπύον βίχον*, id est, siccam, siue aridam tussim hic dixit, ueterem ille dixerit. Sit autē sicca & uetus tussis eadem, an inter se discrepent, medici censebunt.

B

De Artemisia.

CAP. CXXV.

ARTÉMISIA RAMOSA, Græcis quibusdā Monocotylis, alijs Toxitesia, alijs Ephesia, alijs Anactorios, alijs Sotusa, alijs Lycophryx, Magis hominis Sanguis, alijs Crysanthemom, Romanis Hærbæ regia, aut Artemisia, alijs Rapium, aut Tertana, Gallis Pona, Dacis Zuoste dicitur. Magna ex parte in maritimis nascitur. Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq; Tenuior autem flore est paruo, tenui, candido, graue olente. Aestate floret. Sunt qui in mediterraneis Vnicaulis nomine appellant, tenuem hærbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente, flauo colore. Hæc iucundiorē q̃ præcedens efflat odorem. Vtraq; excalfacit, extenuat. Feruefactæ conuenienter in muliebres desessus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;. Item ad præclusiones uulvæ, & eiusdem inflammationes. Calculos comminuunt. Remorantam urinam cient. Menses pellunt pubi illitæ. Succus uulvæ in-

ἐπερυσία

D I O S C O R I D I S

Cditus ex Myrrha eadem quæ incessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Pli. li. 27. ca. 7.
& decimo.

B A R B A R I C O R O L L.
Artemisiam, & Lachanon Basilicon, hoc est, olus Regium nonnulli uocant. Dictam putant ab Artemisia uxore Mausoli: quæ sibi hanc herbam adoptauerit, cum antea Parthenis uocaretur. Sunt qui ab Artemide cognominatam putent: quoniam priuatim medicatur foeminarum malis: quibus Artemis, hoc est, Diana præsit. Secundo generi teneritudinē tribuunt, non nisi in maritimis nascenti. Tercio minima folia florenti, cum uua maturefcit: quod quidam Bortyn, alij Ambrosiam uocari tradunt: qualis in Cappadocia proueniat.

E X M. V E R G. C O M M.
In multo nominum ambitu & honore quondam Artemisia fuit. Parthenis, id est, uirginis primo dicta, quæ uirgo Dea scilicet nomen illi dederit. Mox βασιλικόν λυγρόν, id est, regium olus. Tum ex eadem causa, Anactorium. Anactas enim Græci uocant. Ephesia a regione dicta eadem est. Quemadmodum a præfenti remedio & ope, Sozusa, id est, salutaris. Romani Regiam herbam Græcorum exemplo: & si recipiendum id sit a similitudine, Serpyllum maius dixerunt. Et hæc antiquioribus Artemisiam nomenclatura fuit. Ex posterioribus alij in Cannabis genere Artemisiam numerauerunt: congenerem illi facientes, & eodem illi nomine eam indicantes. Alij Matricariam, notum omnibus olus esse Artemisiam restati sunt. Quod non aliunde, ut credimus, quæ ex duplici eius genere factum est. Quæ enim ab hoc scriptore Monodinos, a Plinio aut simplicis caulis nominatur, non dissimili penitus figura, præsertim quæ ob singularem, quæ profert caulē, a Cannabe describitur. Quæ contra Absinthij modo fruticosa ab hoc, & ab alijs traditur, facile ob quas habet uires ad nostri orbis, & nostræ ætatis Matricariam transferri potuit. Quod & si Græcorum de Artemisia historiae oïno non respondeat, nec certo aliquo auctore confirmari possit, non reiiciendum tamē penitus est. Egregia enim in mulieribus. Dico autē nūc muliebria, quæ Græci γυναικία uocant. Longius in Acoro a nobis tractata Artemisiæ uis est. Credendūque, non aliunde quæ a matricibus posteriori Matricariæ nomē fecisse posteriores.

D
ἀρtemisia

De Artemisia tenuiore. CAP. CXXVI.
Altera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus nascitur. Cuius flores & folia contrita, Sampsuci odorem reddunt. Si quis stomacho laboret, hærbam cum amygdalino oleo bene contundat, in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum dolore cruciantur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

B A R B A R I C O R O L L.
In quibusdam exemplaribus Artemisiam hanc multis nominibus inuenias. Toxitesiam, Ephesiam. Parthenicon. Hypolysson, Anactorion, Sozusan, Lian, Leucophryca. Prophetæ Sanguinem hominis. Romani Valentiam, nonnulli Persicollentem, alij Herbam regiam, Galli Ponem, Daci Zonuffen.

E X M. V E R G. C O M M.
Desyderatur, sed sine iactura aliqua, in uetustissimis Græcorum, latinorumque codicibus hoc caput. Accreuisseque huic scriptori inutiliter multa indicat. Phrasis primū, sermonisque forma: quæ in Græcis a scriptoris huius indole longe absunt. Mox nulla eorū quæ in eo iubent, necessitate.

ἀμβροσία

De Ambrosia. CAP. CXXVII.
Ambrosia, quam Romani Caprum syluaticum uocant, quidam Bortyn, alij Apium rusticum, Aegyptij Merseon. Tenuis frutex est, ramosus, trium fere palmorum, folijs Rutæ, circa imum caulem exiguis. Cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, nunquam florem pariunt. Odore uinoso, suauis. Radice tenui, sesquipedali. Coronatur ea Cappadoces. Vis eius, reprimere ac repellere, et illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

AMBROSIA, uagi herba nominis, & circa alias quoque fluctuans. Athenienses in dedicatione Iouis Cestii, Ambrosiam in cado ferendam iuebant. Non herbam intelligentes eo nomine, sed ut Athenæus inquit, fruges omnijugas, et oleum, & latices.

EX M. VERG. COMM.

Non inter herbas aliquas fluctuans & uagum nomen tantum quondam Ambrosiæ fuit, sed quodcumque odoris, aut cibi suauitate placeret in poetis scriptoribusque alijs, eodem hoc nomine ab antiquis dicebatur, & quasi immortalitatem utentibus faceret, sic appellata illis fuit. Frequens & notum ubique nomen, ignota tamen res, & inter herbas non facilis inuentu: alijs aliter eam ostendentibus, & cum Artemisia miscentibus fere cunctis. Audent tam nostræ ætatis herbarij eam ostendere, trium dodranum altitudine, & altiorē aliquando herbarum, ut hic ait, ramofam, semine per totum caulem racemoso, sed longe maioribus quam Rutæ folijs: & quod hinc ait, nunquam florentibus racemis, lanuginosis, papposisque, nullo nec uini, nec alterius rei odore. Quo fit, ut in peregrina Italia, ut nos credimus, herba nihil pro comperto constituere audeamus. Plinius. 27. uolumine capite. 4. integrum scriptoris huius caput commentationibus suis inseruit: cum tamen non multo antea libro. 25. capite septimo de Artemisia agens, dixisset: Sunt qui in mediterraneis eodem Artemisiæ nomine uocant simplicem caule, minimis folijs, odore non inuicundo, quam quidam Botryn, alij Ambrosiam uocant. Ex quo manifeste deprehenditur, quod paulo ante diximus, uagum per multa Ambrosiæ nomen esse plantas, cibos, & pocula: eo usque, ut Athenienses hoc nomine omnigenas fruges, oleum, uinum, laticesque alios, quos Dijs in ara offerrent, Ambrosiam nominarent. Nobis inclinatur animus, ut peregrinam nostrum orbi, peculiariter Cappadociæ herbam existimemus: nam quæ a nostris herbarijs hoc nomine ostenditur, uulgaris, & ubique nascens, inuentu facillima est, præsertimque ex capitulorum racemis, quos habet pappi plenos, nunquam a nobis florere uisos.

De Botrye.

CAP. CXXVIII.

BOTRYS fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. Semen circa ramulos prouenit. Folia Cicorio similia. Tota suauem odorem spirat. Quare uestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis. Pota Orthopnoceas mulcet. Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant, alij Artemisiam.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

BOTRYN Cappadoces & Ambrosiam uocant. Alij Artemisiam. Totidem, isdemque uerbis genti suæ quondam Plinius cognoscendam Botryn tradidit, quod quibusque antea grecis Diosco. eam descriperat. Verba eius sunt. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis. Semen circa tota nascitur. Folia Cicorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur Orthopnoicis. Hoc Cappadoces Ambrosiam uocant: alij Artemisiam. Quæ collata Diosco. eandem in utroque medicina & historiam faciunt. Posteriores etiam Græcorum medici, qualis Paulus Aegineta est, nihil ab hoc scriptore traditis addiderunt. Eius uerba sunt lib. 6. Botrys δὲ ἡ ἀμφοτέρωθεν ὅτι δὲ ἀρτεμισίαν φυτόν ἐστιν ἡνωμένης ἡλικίας ἐν οἷν γόνιν πινόμενον ὀρθοπνευστικὸν ἀφελόν. Quod est. Botrys, quam aliqui Ambrosiam, aliqui Artemisiam dicunt, planta est ualde odorata. Hæc cum uino pota, orthopnoicis medetur. Sunt de Botry hac totidem, & eadē a cunctis dicta: nec nos habemus, quod eorum decretis & historiæ addamus.

De Geranio.

CAP. CXXIX.

GERANION aliqui Peloniten, alij Trica, alij Geranogeronta, Romani Vchinastru, Aphri Lescen appellant. Folijs Fremij, diuifurris longioribus, radice rotunda, dulci. Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulnæ inflationes discutit.

BARBARI COROLL.

GERANION, & Myrtido uocatur Genus primum. Geranion uera creditur a quibusdam, sed & secundum utique, si descriptionem græcorum sequare, non latinorum: ut mox docemus.

A

Pli. li. 27. ca. 4.
& 25. ca. 25.

Botrys

B

γεράνιον

C

¶ De altero Geranio.

CAP. CXXX.

Geranum alterum, aliqui Myrrhin, alij Oxyphyllon, alij Cardamomum, alij Origanum uocant, Magi Hierobryncas, Latini Gruinam, aut Pulmoniam, aut Cicotriam. Caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus, folijs maluae. In summis alijs sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

Pli. li. 26. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.
Geranion secundum medicis inutile, aliter a Graecis, aliter a latinis describitur. Dioscorides & omnino Graeci, folijs paulo candidioribus q̃ Maluae, ramofum ex interuallis. Hanc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam Galliae transalpinæ uulneribus, fistulis in potum commendant, & herbam Robertianam cognominant, coliculis rubentibus, flore paruo, subpurpureoq̃, ac cæteris notis omnibus: quæ hoc loco a Dioscoride Geranio redduntur, etiamsi ab eo medicinæ aliena existimetur. Quid enim prohibet, ignoratas eius uires fuisse olim? Nostri, ut inquit Plinius, Geranion ostendunt Cicutæ folijs minutionibus, & caule breuius, rotundo, saporis & odoris focondi. Verum hæc proprie Geranion nō est, sed Myrrhis: de qua post agemus: confusione orta, q̃ Geranion a quibusdam Myrrhis etiam dicatur: unde natum & illud sit, ut Geranion in latino Cicutaria nomen habeat: cum aliqui Cicutaria proprie Myrrhis esse uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

D

Geranion hæc est, in qua Gruini capitis imaginem in summo eius plantæ capitulo contenti Græci, nulla similitudine aptius rem indicare potuerunt. Vidimus nos alterā Geranion, paucis statim a radice prodeuntibus Maluae folijs, ut hic describit. Tum nudo surgente caule, dimidij cubiti altitudine: crassoq̃ in caulis illius cacumine, folioso inuolucro tumentē, ex quo per longitudinē ex altero latere dimidiati digiti longitudine acutus procedebat apex. Erantq̃ in folliculo illo cum uiridi colores alij plures, præsertimq̃ cinereus: tam præfenti totius colli, capitisq̃, & rostri Gruini imagine, ut aptiore pictura ostēdi a peritissimo pictore animalis eius tota ea pars non potuisset. Alteram, quæ Cicutæ folijs est, ipsi non uidimus. Obseruauimus tamen in antiquis scriptoribus, Plinioq̃ præsertim, utriusq̃ huius herbæ misceri historiam. Nec satis cognosci in eo posse, Gruino ne collo et capite utraq̃ sit, an altera tantū. Id certe ex Dioscoride collegisse facile est, Cicutæ folijs alterā earum esse: ideoq̃ Cicutariam dici, & Myrrhidam: quoniam & Myrrhis Cicutæ folio sit: quemadmodū hic quarto uolumine docebit. Cur autem priorem Romani Echinasitum dixerint, non satis pro comperto nobis est. Quemadmodū in altera per se patent Cicutaria & Gruina ex foliorum & Gruini capituli forma factæ appellationes. Longissime de utraq̃ Plinius uolumine. 26. capite. 12. agit. Poteruntq̃ in eo uolentes uideri, quam nos paulo ante diximus, utriusq̃ Geranij historia uarietatem.

γναφάλιον

¶ De Gnaphalio.

CAP. CXXXI.

GNAPHALION, alij Hires, alij Ampetocon, alij Anaxiton, alij Anaphalin, Aegyptij Semeon, Galli Gelafonen, Latini Centunculum uocant, quidam Tucularem, alij Albinum. Cuius folijs mollibus minutisq̃ pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

Pli. li. 27. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L.
GNaphalion, alij Chamæzelon uocant. Gnaphalion porro dicitur, quasi herba fullonia, siue Tomenticia. Quemadmodū & piscis quidam Gnapheus, hoc est, fullo dictus est, quoniam oēs maculas decoctū eius eluat. Hanc puto esse, quæ ab Alcæo poeta Gnaphos appellatur: aut eam quæ Hippophanes nomen habet. Nam & illa fullonibus est propria. Est apud Aristotelem & auis dicta Gnaphalus, quā miror a Theodoro prætermisam, imo uero cum altera, quæ uocatur Helea confusam ab ipso. Tomentū a nostris dici quidā putant Gnaphalion. Tomentū certe in Plinij codicibus impressis legitur, Tomentū in scriptis manu: qui tamen non Tomentū dici,

sed pro lomento esse scribit: quod & Dioscorides quoque affirmat. Etenim Creta, quia fullones in albandis & poliendis uestibus utuntur, Lomentum a nostris, Gnaphalion & Gnaphalis græce dicitur: ut in Ceruleo notauimus ex Plinij sententia. Sed & fabacea farina Lomentum est: quod Aetius Fabam nominat quandoque. Ego Tomentum potius quam lomentum dixerim hoc loco, ut tamen sciamus, Gnaphalion utramque uideri significare, tam Lomentum, quam Tomētum. Addu- coreo, quod Dioscorides Centunculum uocari hanc Romæ, prodat. Est autem Centonibus cum Tomento maxima cognatio. Nam & folia Dictamini, quod mollia esse uideantur, tomentitia, & lanæ dicuntur a Dioscoride, hoc est, Gnaphalide. Sed & pars Cucurbitæ interior, quæ semen complectitur, ab Aetio Gnaphalides esse dicitur, ob candorem cum mollicia.

EX M. VERG. COMM.

V Erisimile est, rusticam plebem diu hac usam fuisse: quemadmodum & adhuc in Alpibus, ubi frondium copia est, fieri passim uidemus. Græci enim γνάφαλον inter cætera Tomentum uocant. Est autem latinis Tomentum omne id, quo culcitæ ad molliorem & calidiorem quietem infar- ciunt: siue id lana sit, siue pluma, siue quod uoluerit aliquis excipere dis molli & fouedis calore cor- poribus nostris aptum. Sic Suetonius, sic in re latina plures alij indicauerunt. Græci etiā, ut hic ipse in Dictamno dixit, γνάφαλον quasi Tomentitia huiusmodi omnia appellant. Quam ob- causam nos Tomentum herbam diximus: & præter Tomentum, autore hoc ipso, Centuncu- lum. Est diuersum quadamtenus usum Centones, & Tomenta habent. Vulgaris herba hæc est, candidans semper, præsertimque in maturitate. Folia eius non adeo magna sunt. Flores mini- mi, & ipsi albescentes. Cum creuit, sternitur per terrā. Nascitur pingui solo, præsertimque in mar- ginibus itinerum, in hortis, & inter uites. Nullus nostra ætate usus eius est: nec quicquam in herba rum censu uilius modo, & neglectius uiret, & cum aruit minus cognoscitur.

De Typha. CAP. CXXXII.

T Ypha folium ædit Cyperidi simile, caulem album, leuem, æqua- bilem, florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod lanuginē aliqui nominant. Huius herbe flos, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

BARBARI COROLL.

D ifferre Typham a Tipha, quæ frumenti genus est, & per litteram iota scribitur, existimo: sine geniculis, scilicet modo nascens, radicibus multis, ut triticum ordeumque, folliculo multi- plici, culmo simplici, leuissima frumentorum, solo etiam gracili facile proueniens, tritico persi- milis ut Zea. Pistam ferunt, qui mutari uolunt in triticum, idque anno demum tertio procedit. Theophrastus sine folio gigni Tiphen uocatam prodidit, Orchomenium circa lacum, parte ra- dici proxima, esu præcipue pueris tenera. Idem, an diuersum genus faciat cum prædictis, æsti- mandum relinquo.

EX M. VERG. COMM.

P alustrem esse plantam Typham, satis unus testari posse uidebatur Plutarchus cap. 2. de na- turalibus causis, inter plerasque alias palustres his uerbis eam numerans. ἀλλὰ ἴλαθε τὸν λαΐτον ὃ τί καὶ τὰ λιμένα φυτόν τύφη καὶ φλίω καὶ θρύον ἀναγνῆ καὶ ἀβλαστὴ μένει. Quærebat enim, cur celesti- bus aquis magis quam profluentibus proficerent ad generationem & incrementum semina? Disputansque contra laicum quendam, qui diceret, cadentibus pluuijs aperiri terram: pulsusque il- lo apertam citius ad radices per se aquam transmittere. Cōtraria ratione a palustribus his plan- tis ratiocinabatur, ad quarum radices non transit aperta terra hymber. Numerabatque eas quas pauloante diximus. Esse autem palustrem, & præter id caulem habere enodem Theophrastus indicat: qui primo uolumine de plantarum historia, de fruticoso & farmentoso genere docens, & quales in caulibus ramulisque suis differentias hoc genus habet, totam his uerbis rem docuit, περί δὲ τὰ φρυγανικά καὶ θαμνώδη καὶ ὕλας τὰ κλύματα καὶ ἄλλας τίς ἂν λαβοῖ διαφοράς, ὃ μὲν γὰρ κάλα- μος γονατώδης ὃ δὲ βάλανος καὶ ὁ παλαιοῦτος ἀκάνθωδης. ἢ δὲ τύφη καὶ ἵνια τῶν ἑλίων ἢ λιμναίων ὁ μῦθος ἀ- διάφρακτος, καὶ ὁμαλὴ καθάπερ χοῖνος. Quorum sensus hic sit. In surculosis autem & fruticosis, in- uniuersumque Viticulis alias constituere differentias aliquis poterit. Harundo enim geniculata, rubus, & paliurus aculeati. Typha autem, & aquaticorum palustriumque aliqua nullo interce- dente nodo qui partes dissepiat, per totum æqualia sunt: qualis luncus est. Folia postremo an-

D I O S C O R I D I S

Cgulofo, odorato lunco fimilia hic fecit, qualia ea etiā sunt. Intelligitq; in lūcorū gñe Cyperū, de quo primo uolumine lōgius actum est. Quem gñe foeminino Cyperida hoc loco uocauit, qm̄ eo nomine radix eius appellatur: ut in cōmentationibus nostris tūc longius dictū fuit. Non aliā ob caussam, nisi quia radice eius tñ usus est. Et quemadmodum latini lunci radicem plantam uocant, sic gr̄ci Cyperida ex radice genere foeminino luncum ipsum aliqñ nominauerūt.

¶ De Circaea. CAP. CXXXIII.
Circaea, quam & Dircæam aliqui uocant, folijs est hortensis Solani. Agnatis crebris, flore nigro, pusillo, copioso. Semine Miliij nascente in quibusdam corniculis. Dodrantali radice, triplici serme, aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciente. Nascitur in apricis, saxis & uento perflatis. Radicis tuse triens, in sextarijs tribus uini dulcis, per diem & noctem maceratur, potuq; triduo uulvas expurgat. Semē forbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

BARBARI COROLL.
Circeam a Circe dictam, nonnulli uerisimile putant. Quæsitum est autem a nobis, quid esset apud Columellam Circea. Nunquid pro Circea deprauatus esset locus? Respōdi, non Circea, sed Cymam legendum.

EX. M. VERG. COMM.
DSunt in gr̄cis qui neutro genere Circeon hanc uocent, notam, ut ex commentarijs eorum ratiocinari licet, tunc omnibus herbam. Nunc quod uiderim, aut audierim, nulli nisi in ueterū Plinijq; præsertim commentarijs audiam: qui uolumine. 27. capite. s. non isdem omnibus cū scriptore hoc in historia notis, neq; in medicina obseruationibus eam descripsit.

¶ De Oenanthē. CAP. CXXXIIII.
Oenanthē, quam aliq Cerascomiō, aliq Leucanthon uocitant. Folia habet Pastinacæ, florem candidum, caulem crassum, palmi altitudine. Semen Atriplicis. Radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Caulis eius & folia, cū melle & uino pota, secundas eiiciunt. Radix e uino urinæ stillicidio conuenit.

BARBARI COROLL.
Oenanthē a Theodoro Virisflora dicitur, post Narcissum uere floret. Plurimum durat, si diuulsa crebro prohibeatur sementescere. Flos ei candidus in racemis, ut Labrusca: odore germi nantis uuæ, unde nomen. Nascitur locis tepidis, obseritur semine. Habetur & altera Oenanthē, inter uites dicenda.

EX. M. VERG. COMM.
Alia hæc Oenanthē est ab ea de qua quinto uolumine agetur. Illa in uitium genere Labruscæ flos est: hæc in herbarum censu a Theophrasto inter coronarias plantas & flores, qui secundi per uerflorent numeratur. Illa primo & per se Oenanthē est, uinum & florem ipso nomine indicans. Hæc, ut sit, deficientibus proprijs, indicationem & nomen floris & odoris sui similitudine ab illa facile impetrauit. Nec ideo Oenanthē dicta est, quia Labruscæ flos sit, sed q; candidus illi flos, racemi ut in Labrusca specie sit: & præter racemosum florem illum, odor qualis in pubescente uite floreque eius sentitur. Amat hæc tepidiora loca. Quondamq; ad coronas in hortis etiam serebarur: in quibus non tantum odore, sed longiore florum suorum uita placebat. Hanc Dioscorides ait Cerascomen uocari: qua uoce Staphylinum, idest, Pastinacam a quibusdam nominari dixerat: cui quoniam hæc folio similis est, ideo & nomine illius etiam indicabatur. Quid autem Cerascome significet, in Staphylino & Pastinaca quærendum est. Eandem Leucanthum uocari hic ait, manifesta a florum candore significatione. Neque enim alia eius uocis uis est. Quæ deinde hic dixit, habere Oenanthem hanc in radicibus numerosa & rotunda capita, tubera sunt, & uelut tumores quibus eā inæqualiter tumet. Plinius ad radicū copiam id retulit: radice magna, numerosa dicēs: cū tñ gr̄adi radice hic Oenanthē dicat, et in radice illa multis rotundis capitibus, quæ ad radicū copiosiore numerū, referri posse non uidentur.

Pli. li. 12. ca. 23
lib. 21. cap. 24.

De Conyza magna. CAP. CXXXV.

Conyza magna ab aliquibus Cynozematitis, alijs Danais, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinofmos, Magis Brephoctonos, quibusdam Anubias, nonnullis Hedemias, Aegyptijs Creti, Romanis Militaris, aut Deliarium, aut Febrifuga, alijs Fraginosa nuncupatur.

BARBARI COROLL.

Conyza, quæ a nostris Cunilago dicitur, et Plinio Cunila quandoque libro decimo, & a Theodoro Pulicaris, quia pulices necat. Folio coronat, & maior & minor appellata. Maior dicitur esse mascula, folio aspero, pinguiore quæ minoris, et imbricato, torosiore caule, magisque ramoso, radice lignosa: quæ a quibusdam ut herba quoque ipsa, Libanotis dicitur, autore Plinio. Manipulo eius abiecto, omnes etiam a rota domo blattæ conveniunt ad eam. Vtque genus serotinum, ut quod post arcturum germen, floremque mittat. In summa Cunilaginis appellatione, quatuor herbarum veniunt: mascula, et femina. Et quæ tertio loco ponitur foedissimi inter omnes odoris. Quarta reddit Plinius: quæ appellatur fatiua Serpyllo simile, et Cunilagine montana facta. Est et contra eius species Hippoc. ut dicitur paulo post. Cunilago dicitur et ipsum Ligusticum ab aliquibus, sed falso. At Cunile tria sunt genera siue nomina. Capitata et nostrata, quæ Satureia fit, vocamus Gallinaceam quæ Origanum, Heracleoticum: Bubulā, quæ quæadmodum a Grecis dicitur, aliud non copiamus, quæ quæ Plinius per Origanum accipe multis locis videtur, in qua significatione vocabulo eo et nos uti sumus.

A

κόνυζα μεγάλη

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

De Conyza parva. CAP. CXXXVI.

Conyzæ duo genera. Quæ parva vocatur, odore præstantior est. Maior vero frutice altior, & folijs latioribus, gravi odore. Vtiusque folia Oliuæ similia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat. Flos squalidus, lutei, aut fulvi coloris. Quin in pappum abit. Radices superuacue. Suffitu, substratuque frutex animalia fugat. Culices abigit, & pulices necat. Folia convenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vulneribus. Flos cum uino ad menses partusque eiciendos bibitur. Item contra urinæ stillicidia, arquat morbum, & tormina. Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in deflectionibus medetur uulvæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter rigoribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

BARBARI COROLL.

Conyza minor eadem femina, Hippocrati Cunilago semper mollis vocatur. Folia huius trita, mellis odorem habent, digitis tactu coherentibus. Hanc Dioscorides Libanotidem appellat, cum Plinius masculam ita nominet. Pilosiora minori folia & rami: qui & aculeati sunt. Flos squalidior, odore acriore, qui tamen grauior sit masculæ.

κόνυζα μικρά

B

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

De Altera Conyza. CAP. CXXXVII.

Est & tertium Conyzae genus, quod aliqui Paruam, alij Panion, alij Libanotidem. Magi Cronon uocant. Caule crassiore, ac molliore. Folijs quæ Paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

BARBARI COROLL.

Hippocrates Cunilaginem, siue Conyzam, præter supradictas, aliam describit. Apio crispo similem: in maritimis, sabulosisque nascentem, odoris terribilissimi, & maxime fastidiendi: quam cum

L ij

Cum melle atque uino foeminarum locis, quæ foetum non recipiant, admoueri præcipit, libro de muliebribus causis secundo.

E X M. V E R G. C O M M.

Confundit, miscetque Plinius pluribus locis cum Origano Conyzam. Nec facile est eodem nomine duas diuersasque plantas ab eo sæpius appellatas, in historiæ medicinæ gratiam & usum fecerere. Longior fuerim, si omnia quæ tam multis locis de Conyza, Cunilagine, & Cunila ab eo dicta sunt, coaceruare hoc loco cogitem. Superuacaneum id etiam fuerit, quoniam signanda non multo post & repetenda a nobis omnia, aut plura saltim ex illis erunt. Aliud itaque prius agamus, & ut nouerint omnes, non esse Conyzam Origano eandem, neque ediuerso utriusque proprias numerabimus notas: ut propositis his, quæ a Plinio miscentur certius pateant. Incipimus autem ab Origano, quam hic ait folium Hyssoipo simile habere, umbellam non comosam, uerum diuisam, & in summis uirgis semen. Et quod ad alia Origani genera pertineat. Onerida candidioribus folijs, sed magis Hyssoipo similibus esse: femine uero corymborum modo: & quæ agrestem Origanum dicunt, folia priori Origano similia habere: uirgas dodrantales, in quibus Anethi modo umbellæ sint, & candidi flores. Et hæc omnium Origanorum in hoc scriptore notæ sunt. Conyza uero, quas paulo ante diximus folium oleaginum, non Hyssoipi, hirsutum, pingueque: caules bicubitalis: flores lutei, fragiles, subamari, & qui in pappos euolent. Quorū nihil habet Origanus aliqua. Plinius autem lib. 19. cap. 7. autore herbario Crateia, Ligusticum primo seu Panaces Cunilam bubulam uocari tradit: ceteros hanc Conyzam græce appellare, & ab eodem Cunilaginem dici. Idem non multo post uolumine. 20. cap. 15. Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera. Quæ Bubula appellatur, semen Pulegi habet: utile ad uulnera comanducatum, impositumque, ut quinto post die soluiatur. Contra serpentes quoque in uino bibitur, ac tritum plagis imponitur. Vulnere ab his facta confricatur. Item testudines cum serpentibus pugnaturs, hac se muniunt. Hic ipse Plinius sequenti capite etiam ait. Est alia Cunila appellata a nostris, a græcis Origanum Heracleoticum. Totoque hoc capite nihil, nisi multiplex Cunila ab eo tractatur: manifesteque Conyza hæc Cunilæ nomine censetur, cum ait. Pulices etiam contritæ cum aqua sparæ necant. Quod priuatim Conyza habet. Poterant & alia repeti, sed ad eam quam cogitauimus rem satis hæc sunt. Nec nobis aliud modo propositum est, quam monere ex his quæ paulo ante dicta sunt, toto genere differre inter se Origanum omnem, & Conyzam omnem, Pliniumque Cunilæ nomine in utraque passim uti. Omittimus quod primum ille ait, Ligusticum, seu Panaces Cunilam a quibusdam dici. Falsum enim non multo post esse id ipse testatur. Quod autem lib. 20. cap. 15. ab eo dicitur, Cunilæ præter satiuam plura sunt genera, &c. ad Origanum manifeste pertinet: præsertimque, quod de testudinibus cum serpentibus pugnaturs eo loco tradit: si Plutarcho credimus in naturalibus causis dicenti. ἡ δὲ χελών φα-
ροῦσα τὴν σάρκα τῆς ἑχιδνῆς ὀρίανον ἐπιτίθει, quod & si idem penitus non sit, eandem tamen rationem habet. Quæ deinde statim ab hoc loco descripta ab eodem sunt. Est & alia Cunila a nostris appellata, a græcis Origanum Heracleoticum, ad Origanum similiter pertinent. Cumque plura Cunilæ genera fecisset, uni ex his omnia Conyzae huius tribuit. Tamque uagus in hoc Cunilæ nomine, incertusque est, ut nihil nos ex decretis eius certum afferre audeamus. Quod autem conijcimus, huiusmodi est. Origanum græci uocant notam omnibus herbis: & ut sit in gentibus, quibus semper & ubique non fuerunt eadem rerum nomina, eandem Cunilam uocauerunt. Testisque hic ipse in Origanis, sed multo certius in Theriacis suis Nicander dicens. κόρχον ἢ μν-
δίαντα πανάγκειον τιμονίαν, ἢν τε καὶ ἡράκλειον ὀρίανον ἀμφίπουνει. Quorum sensus est. Et corchorū clauso folio, & omnia sanantem Cunilam, quam Herculeam Origanum appellant. Nihil autem quorum duorum scriptorum, ut uidetur, certiore fide confirmari poterat. Pro compertoque est, Cunilam antiquis græcis Origanum fuisse. Potuitque Plinius eorum auctoritate Origanum Cunilam uocare. Nescimus tamen, an Cunilam, quæ si latinis est quæ græcis Conyza, misceri totiens ab eo non debuerat. Suspiciamusque nos, quod est minimum inter duas has uoces discerni (una siquidem litera uariant) causam Plinio dedisse, ut diuersas plantas eiusdem Cunilæ nomine totiens misceret: cum tamē Origanis græca uox, Conila per o, latina uero Conyza, modo hæc illi respondeat, per u, scribenda sit. In græca illa uoce certa omnia sunt: in latina facile est ratio cinari, Cunilam. siue malis Cunilaginem appellare Conyzam hanc, aut illi similem fuisse. Est enim non Plinio tantum, uerum Columellæ, aliisque scriptoribus frequens hæc uox. Pliniusque priuatim græcorum Conizam Cunilā manifeste appellauit libro decimo, capite. 70. cum ait. Non potest petris autelli polypus. Idem Cunila admota, ab odore protinus resilit. Acceptum id ab Aristotele est libro quinto de historia animalium his uerbis idem docente.

καὶ οἷτε πολλὰ ποδὶς αὐτῶν προσέρχονται ὥς μὴ ἀπέσπασθαι, ἀλλ' ὑπομένειν ἀποτεμνόμενοι. καὶ διὰ τὴν
 παύσαν προσεγγίῃ ὡς φανὶν ἐνθὺς ὁσφραίνονται ἀφ' αὐτῶν. Quod ab hoc scriptore relictum, alterius au-
 toritate & testimonio addere placuit. Et ut meminissent legentes, non posse Conyzam teretri-
 mi & grauissimi odoris herbam, cum Origanis misceri: neq; si diuersarum gentium uoces for-
 tuito concursu eundem sonum reddant, ideo eandem in illis rerum esse significationem. Fiunt
 enim in græcis & latinis multa huiusmodi: suum tamen in sua gente intellectum omnes ha-
 bent. Dicimus id, quoniam si latinis Cunila est quæ græcis Conyza, non debuerat uicinitate no-
 minis ad Origanum, quæ Conila græcis est, transferri, & cum illa misceri. Nec dicimus, p̄ cō-
 pto habere, latinam Cunilam græcam Conyzam esse. Verū illud testamur, ex quo tam mul-
 tis ea uox in usu est, in eam partem propensiores esse, & per, u, in principio scribendam: quem
 admodum cum Origanū ostendere uolumus, per, o, illam Cunilā, hanc Conilā dicentes. Pul-
 cariam simpliciter in Aristotele quo diximus loco Conyzam uertit Theodorus Gaza: factū ex
 euentu illi hoc nomine, quia, s. pulcres enecet: alioquin in nomine nulla est pulicum ratio. No-
 bis Conyzam hanc magis placuit uocare: ut quarto uolumine describam, & Psyllion appella-
 tam herbam, certius ex græco nomine Pulcariam appellemus, ψύλλα enim græcis pulex est: &
 ψάλλον herba a pulcibus uocat: q̄ insectis his similis semina habet parua, nigra, & tota pulicū
 figura. Erit ob eam causam duplex in hoc opere nobis Pulcaria, altera præcedente Conyze no-
 mine signata, altera simpliciter a pulcibus nominata. Quemadmodum tunc etiam iterum a
 nobis dicitur. Habet Conyza hæc pulcaris, quo in græcis modo leguntur, numerosas appel-
 lationes, fereq; omnes incertas: ideoq; non tractandas a nobis, præterq; Dinolimon: quæ uox
 a grauitate odoris illi facta est: & Pissam, quæ pix græcis est, a glutinoso lentore dictam: q̄d Pli-
 nius significauit dicēs. Trita mellis odorem habet digitis tactu eius coherētibus. Tria eius g̃na
 Diosc. numerat, maiorem, minoremq; & tertiam inter utranq; mediam: crassiore mollioreq;
 caule: folijs maioribus minore, minoribus uero maiore. Theophrastus alijs nominibus duo
 genera tantum Conyze facit, s. de plantarum historia uolumine, his uerbis. Conyze duo ge-
 nera, mas altera, femina altera. Differentias inter se habent, quemadmodum & alia quæ sic di-
 uidentur. Femina tenuiore folio, & constrictiore est, in uniuersumq; minor. Mas maior est,
 crassiore caule, ramosior, & folium maius, pinguiusq; habet, & præter hoc florem magis splen-
 dentē. Semen fert utraq; in uniuersumq; sero germinat & floret. Nec nisi circa, aut post arctū-
 rum. Grauis masculæ odor, feminae acrior. Quam ob causam contra uenenata utilis. Et hæc
 a Theophrasto dicta sic se habent. Quæ cōmentationibus his nostris placuit addere, ut duorū
 scriptorum concurs eademq; historia Conyze cognosceretur: & si non iisdem uerbis, neq; eo-
 dem modo ab utroq; omnia dicta fuerint. In Dioscoride autem quod ad floris colorem perti-
 net, qui duplex in cōmuni græcorum lectione legitur, μῆλινον ἢ ὑπόκιρρον luteus & subrufus, mu-
 tatum a nobis est: secundamq; illam uocem ὑπόκιρρον, quod est, subamarum fecimus, luteum
 & subruffum diuersos colores male coniungi & misceri sentientes: mox monentibus uetustissi-
 mis græcis & latinis codicibus, in quibus amarum adhuc manifeste legitur.

De Lilio syluestri. CAP. CXXXVIII.

Graci Hemerocallen, alij Hemerocatalacton, alij Crinon agri-
 on, alij Crinanthemon, alij Porphyranthes, alij Bulbum hæ-
 maticon, alij Anticantharō, Romani Bulbum, aut Liliū syluestre, aut
 marinum, Aphri Abiblabon uocant. Foliū & caulem habet Lilij, por-
 raceo colore. Flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni e-
 rumpunt, Lilij diuisura, quoties dehiscere coeperunt. Colore perq; pal-
 lido. Radix magna est atq; bulbosa. Quæ pota, aut cum melle & lana
 in pello apposita, aquam educit et sanguinem. Folia trita, mammarum
 inflammationes a partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant.
 Radix & folia igni ambustis utilissime illinuntur.

BARBARI COROLL.

Hemerocalles, Elium a Theodoro dicitur, q̄ in Dioscoridis exemplaribus deprauatis Eli-
 um marinum dici, a nostris eum florem legisset, Ego Liliū marinum, non Elium in Dioscori-
 L. ii.

A

B

ἡμεροκαλλίς

Pli. li. ii. ca. ii.

D I O S C O R I D I S

C de legendum arbitror: nam & græce Crinon a quibusdam, & a nostris Lilium idem autor uocari tradit. Coronamētis folio tantum dicata hæc est. Pallidum hoc e uiridi, & molle habet, ra dicem odoratam. Seritur semine. Antiquus grammaticus Theodorus, cognomine Panages, Hemerocalles Athenis dici prodidit, non florem, sed uellus, aut lenniscum puniceum, & uersi colorem, quo in sacris utebantur. Dioscorides & hanc & Lilium a ueteribus Crinanthemon uocari tradit. Hippocrates quoq; Crinanthemon duplex haberi significat: cum alterum ingratum esse in ædibus nostris proueniens.

E X M. V E R G. C O M M.

Serebatur quondam in hortis ad coronas Hemerocallis, æmulus cum tota planta Lilio flos. & quasi rudimentum naturæ Lilia facere condiscens: nunc totis agris, & inter segetes presertim pallore suo se indicat: longe Lilio minor, figura pene illi idem. Differt tatum, q; in Lilio floribus folia cum tota se in calathum aperuerunt, reliqua a superiore parte se inuertunt: in hoc dum deflorescat, recta diu rigent. Vnaq; hac nota maxime legentes fallere non potest. Color enim non tam diuersus: licet in Lilio candoris superbia, in Hemerocallide palloris tristitia sit: ut non similis, et paulo minus q; idem facile uideatur. Eamq; ob causam, a Lilio, Lilioq; similibus alijs floribus pleraq; appellationes inuenit. Agreste Lilium. Crinanthemon, quæ Lilio uox etiam adiecta est. Porphyranthes, & Bulbus uomitorius: quæ Narcissi nomina sequenti uolumine erunt. Lilium marinum, & Anticantharon: quæ uox aduersari scarabeis hunc florem significat, quemadmodum & Rosæ: quibus obrutum id animal perire naturales aliqui dixerunt. Breuissime Plinius libro uicesimo primo, capite eiusdem numeri de Hemerocalli hac egit: quod quæ hic dixerat, folia caulemque Porri modo uiridia habere, ille pallidum e uiridi dixit, medium Porri inter uiredinem palloremq; colorem ea ratione indicans. Nobis ex uerbis scriptoris huius rem demonstrare placuit.

De Viola alba. CAP. CXXXIX.

Asvndion

Leucoion ex Græcis aliqui Basilion uocant, Latini Violam albam, aliqui Augustiam, nonnulli Violam autumnalem, aut Passarinam. Vulgaris est notitia, sed in floribus differentia quædam. Nam q; aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteæ uero præcipui in medicina usus. Huius aridi flores seruefacti in deflectionibus, ualent contra uulux inflammationes. Et menstrua expellunt. Sanguinant oris ulcera cum melle. Cum cerato rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

B A R B A R I C O R O L.

Pl. li. xi. ca. ii
lib. 6. cap. 19.
The. li. 6. ca. 7

Leucoion, & si candidam Violam ipso nomine significat, tamen & pro lutea, & cærulea, & purpurea sæpe capitur. Hinc apud Columellam candida Leucoia, quasi & nigra quædam sint. Hippocrates certe, nigra inquit, Leucoia quærantur. Paulus, loton inquit oleum, hoc est, Violaceum, modo ex purpureis, modo ex candidis, modo ex croceis confici solere Violis. Scindum & illud est, Dioscoridem hoc loco scribere Violam, quæ græce Leucoion dicatur, a Romanis Ligustriam quandoq; nominari: etiam si codices sunt, in quibus non Ligustria, sed Augustia legatur: ut fortasse Columella in horto suo intelligat de Viola cum cecinit, Nigro comissa Ligustro.

Nam Ligustrum candidum, pro Cypri flore capitur. Cæterum de purpurea, siue nigra, seorsum post dicitur. Cærulea quæ sit, non constat, nisi quis Cyanum hæc intelligat. Est autem Cyanus flos, rosam excipiens: cuius color honorem, nomenq; dederit cæruleo. Cyanum Amaranthus excipit. Triualis, ut quæ existimauere, flos est Cyanus, in frumetario nascens agro, & hortis q; ruficorru & puellarum corollis, calice Rosarum, sed squarroso, atq; tristi, sine odore. uerum summa coloris gratia, q; Baptifecula ruribus dicatur: qm secantibus & metentibus officiat, reusa in occursum eius fallere. nam & Secula ueteres dixerunt falcem. Florum porro prima se ostendit alba Viola, nec diu exacta hyeme. Sub idem fere tempus, exit & Viola cognomine flamma, quæ Phlogion uocatur: Syluestris tantum ab aliquibus Phlox: ut errare putem, qui Phlogion eandem esse cum lutea Viola

scribere, quod quidem ex sequentibus apertissime liquebit. Theodorus flammam uocauit, colore commendabili, odore nullo, semine proueniens coronis. Non est hæc autem Iouis flos, aut quod idem est, Iouis flamma, hoc est, Diosanthos. Idque neni dubitem, facit, quod Iouis flos, licet sine odore sit, & coronarius, & obseruatur semine, tamen æstate floret, non per hyemem, ut Flammea. Plinius quoque, Iouis inquit flos, colore tantum commendatur, odor abest, sicut & illi, qui a Græcis inquit Phlox uocatur. Diximus & Lychnin uocari quandoque Flammeam, sed inter Rosas potius quam Violas. Aliud est apud Græcos Phlogis. Nam & uestis genus significat, quod nos flammeam, et flammearios opifices in Plauto uocamus, & carnem tostam, ut est apud Stratum. Violarum ergo Alba & Flammea plurimum durat. Sed satius maxima auctoritas Luteolist: qui colos in nuptialibus Flammeis quaesitus, ritu antiquissimo & foeminis totus concessus traditur: ideoque fortasse non numeratur inter principales, hoc est, communes maribus & foeminis: quoniam coloribus societas principatum dabat. Genera Lutearum Tusculana, & quæ appellatur Marina, folio aliquanto latiore, sed minus odorato: in totum uero sine odore, ac minuto folio. Calathiana, munus autumnæ. Cæteræ ueris. Proxima ei Caltha est, concolori amplitudine, uincit numero foliorum Marina, quinque folia non excedentem. Eadem odore superatur. Est enim grauis Caltha, non leuior ei, quam Scopam regiam appellant. Quamque folia eius oleant, non flores, ut inquit Plinius. Quod autem genus ei sit inter Violas Scopæ regiam, parum liquet. Dioscorides Scopam regiam Naporum generi connumerat. Plinius alio loco Sideritin, quæ latissimo folio sit, Scopam regiam a nostris dici uult. Viola odor e longinquo suauior, propinquus hebetatur. Vita longissima Candida, triennium. Ab eo tempore degenerat & minuitur: floresque assidue candidiores affert. Minor uis est recentibus. Ideoque aridis utuntur post annum. Honor Violis apud antiquos post Rosam & Lilium. Violam iccirco dictam Ion Græci putant, quod cum Io in uaccam a Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Nostri quoque Violam, quasi uitulam, imitatione græca uideri possunt, appellasse.

EX M. VERG. COM M.

Detulit candori multum in hoc flore antiquitas, nec leuem splendoris sui gratiam illi habuit, una ab eo facta appellatio tres alios colores indicans: qui in toto hoc Violarum genere a scriptore hoc numerantur, & uno excepto a cunctis passim quotannis uidentur. Leucoiorum enim nomine in græcis omnes indicantur Violæ hæc, quæ primæ flores suos profecerunt, ubi mitior & tepidior aer fuerit ab hyeme statim: ubi asperior & frigidior, postea: ubi quoque autem per uer primæ noui anni aduentum nuntiantes, pluresque non uno ramulo tantum, sed uno pediculo florentes: quæ causâ fuit, ut a quibusdam Polyphæræ inter alias appellationes dicerentur. Id enim ea uox significat. Florent hæc passim triplici colore, candido, luteo, & purpureo. Qui quartus deinde ab hoc numeratur, ceruleus in Violarum genere hoc, quod sciam, in Italia nullibi uidetur. Ex eo oborta nobis suspitio est, posse in græcis abundare eam uocem, & si in cunctis pariter legatur: is etiam quem nos habemus egregiæ antiquitatis, & fidei latinum Dioscoridem, longobardis literis scriptum, tres tantum colores illos notos omnibus numerat: quartus hic ceruleus nullus in eo est. Nec nos tantum illi deserimus, ut uinum uelimus pro cunctis alijs nobis esse, sed accedente rei naturæque & suspicioni huic nostræ hoc ueluti teste, qualiscunque ille est, non fore credidimus inutile hoc etiam legentes monere. Præsertim nullibi, ut paulo ante diximus, ostendente in hoc flore eum colorem naturæ. Alioquin oportebit, quæ primo uolumine in lasme dicta a nobis fuerunt, meminisse: & quæ longius illic de Violis docentur, in hunc locum referre: opinarique in ceruleo colore hoc, aut alijs locis nasci hunc florem. Late enim patet naturæ uis, & admirabilis eius maiestas: quæ potest multa ubique uariare, & quæ nobis, & nostro orbi negauit, alijs dedisse: aut Violarum appellatione alia etiam censerî florum genera. Quales Iesiminos omnes tunc esse diximus, modo magnitudine & forma pares & similes illis sunt: & intellexisse in Dioscoride necesse erit, florem quempiam alium cerulei coloris: qualis uerbi causa Cyanus est, sic a Græcis a colore dictus, uulgaris flos, omnibus notus inter segetes, Maio & Iunio mense nascens. Quem rura nostra florem Alysum uocant, triplici & ipsum colore, candido, purpureo, plerumque autem ceruleo. Nobis tamen in priorem illam sententiam inclinat animus. Credimusque quartum illum colorem huic scriptori temere accreuisse. Vtimumque ea ratione præcipue, quod non uerisimile est, miscuisse diuersa simul genera Dioscoridem: & cum de Leucoijs certo scilicet genere priuatim ageret, de cunctis Violis, quæ Græci *ἰα*, non *λευκόια* uocant,

L. iij.

D I O S C O R I D I S

C agere cogitasse. Obseruauimus enim τῶν ἰσῶν, id est, Violarum latius patere appellationem, pluresq; completi flores: Nigram, seu malis ferrugineam Violam, lesiminos omnes, Calathianam, & quam Græci Phloga, Plinius Flammeam uocat, pluresq; alios qui figura, quantitate, foliorum positura, aliq; huiusmodi ratione aliqua proprie dictis Violis similes aequalisue sint. λευκοῖαν autem triplex tantum hoc genus, quod solo colore differt, quodq; nos paulo ante ex Theophrasto descripsimus. Solæ enim hæ Violæ Leucoia dicuntur. Accedit & illud, q; si Cyanus in hoc genere intelligendus erit, ex qua uoce nos credimus irrepsisse eum colorem in has Violas, uidebitur temere miscuisse Dioscorides, quæ non eodem tempore florent. Illæ enim ab hyeme statim aliquibus locis, ubiq; autem & semper uere florent, Cyanus autem prima æstate tantum. Ille sponte sua in parietibus, & murorum pinnis aliquando, illi inter segetes passim nascuntur. Possunt quidem ambo in hortis conseri, sed nos simplices naturæ natales & notas, non cōacta artis opera tractamus hoc loco.

De Cratægono.

CAP. CXL.

κραταιόνιον

C ratægonum, siue ut alijs placet, Cratænon, folijs tritico simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorū. Semine Milij. Nascitur in opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum est a quibusdam, quod si bibariciuno ore, ter in die post mensas purgatos, tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante concæptum quadraginta diebus, & uir modo consimili, totidem diebus ante cōitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 26. ca. 10.

D

E st & alia Cratægon, siue Cratægonos, siue Crateogonos, quæ Theligonos uocatur. Differentia intelligitur lenitate gustus. Hippocrates Polycriton appellat: quam Cratægonon cæteri. Plinius Cratægonon, spicæ tritici similem demonstrat. Dioscorides Melampyro. Theophrastus lino triticeo, id est, λίνω τριτίκῳ. fortasse hoc intelligens, quod Plinius culmum, siue ipsam tritici. Theodorus nescio q; diligenter lini modo rustum uerit: quia πυρρόν, non πυρρινόν in Theophrasto legerit. In Theophrasto arboris etiam genus est Cratægos, siue Cratægonæ: quam Italia uocat Aquifolium: neq; magna ualde, neq; crassa, ligno robusto, uersicolore, flauo, cortice læui, ut Mespilo, folijs item Mespili, hoc est, promissis, uerum latitudine ac longitudine maioribus, nec ad eundem modum ferratis, fructu plurimum rotundo: qui mature scens sicatur, nigrescitq; gustu & succo Mespili: fereq; Mespilus syluestris fuerit, ut Theophrasti uerbis utar. Aquifoliam porro, siue Aquifolium, ipse nihil aliud ueteribus fuisse uideo, q; Illicem. Illex porro duo habet genera, minus, & prolixius.

EX M. VERG. COMM.

T ota stat gentium uulgicq; fama & fide Cratægoni in scriptore hoc & Plinio medicina: neq; in historia, quod sciam, ex antiquo illo tempore a quoquā additum illi aliquid est. Nos etiā quod præter dicta a duobus his Cratægono adijciamus, non habemus. Monuisse tamē obiter legentes inutile non erit, ideo Cratægonon a græcis dictam fuisse, q; uir, potestatemq; sua κρατὶ τοῦ γόνου, euincit scilicet, superatq; & genituræ dominatur. Potestq; humani seminis naturam ad mares concæptus cogere.

De Phyllo.

CAP. CXXI.

φύλλον

P hyllon aliqui Elæophyllon uocant. Nascitur in saxis, sed quod Thelygnon uocant, est ueluti muscus, folio Oliuæ, magis hærebacci coloris. Caule tenui ac breui. Radice minuta. Flore candido. Semine Papaueris simili, maiore. Sed Arrhenogogon cætera huic simile, solo fructu distat. Habet enim uuas deflorentibus oleis non dissimiles. Arrhenogogon potu, masculi sexus facere partus, ut Thelygonon feminei proditur. Horum Crateuas author est. Sed huiusmodi historiatienus, mihi produxisse uidetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Phyllon radice parua. Differt ab hac Phyllitis: de qua diximus. Differt & Phyllandron, siue ut alij scribunt, Phellandron: de quo nihil aliud proditum inuenio, q̄ in palustribus nascitur, folio Apij: q̄ semen eius propter calculos, & incōmoda uesticæ bibitur. Ab hoc sunt qui Phellandron, eandem esse cum Heliofelino, id est, Apio palustri censeant. Herbam quoq; illam, quæ a Plinio Silaum appellari traditur in glareosis, ac perennibus riuus, Apij folio nata, quam ad uesticæ incommoda coquendam præcipit. Sunt qui pro Phellandrio Heleofelinoq; accipi putēt. De hoc in Sio plura diximus & Lauere. Non Silaum scribi posse, cum inibi, tum in Apologia quoq; nostra ostendimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Descripsit Folium hanc, de plantarū historia uolumine Theophrastus his uerbis. *ἡνία δὲ ἵναι ὡς τὸ ἄφρονον ἢ θηλυόντιν. ἀπὸ καὶ καλοῦσι φύλλον τὸ μὲν ἄφρονον τὸ δὲ θηλυόν, ὅμοια δὲ ἀμφοῖν καὶ μορφήν ἔχοντα ὡρίμων. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ μὲν θηλυόντος καθάπερ ἰλαίας βήρυν ἀκρότατος δὲ τῷ ἄφρονον, ὁ δὲ πρὸς ἰλαία ἔστιν ἔστι φύλλα καὶ τῷ βήρυν. Μίχρον δὲ ἄσπερ ἔρχεται ἀνθρώπων.* Quorū sensus sit. Quædam præterea esse maribus, aut alterius sexus concipiendis foetibus apta, eamq; ob causam Folium aliam mares, aliam foemineos conceptus facientem dixerunt: sibi inuicem similes, & Ocini figuram habentes ambas. Est tamen alterius quæ foeminarum conceptus facit, semen muscoso flori Oleæ simile, pallidiusq; q̄ alterius, figura nuper ex muscoso flore incipientis Oliuæ, cohærens sibi, geminumq; Testiculorum hominis modo. Et hæc quidem Theophrastus eadem huic scriptori, si diligentius omnia expendantur.

De Testiculo Canis. C A P. CXLII.

TESTICVLVS Canis, quem Græci Orchin, aut Cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis, Oleæ similibus, in terra straus longioribus, angustis, læuib. Caule dodrantali, floribus pureis, radice bulbosa, oblonga, Oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur. Si minorem, foeminae, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus. Aridam uero, ad inhibendos. Et alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & fabuletis.

B A R B A R I C O R O L L.

Orchis, qui priuatim Cynosorchis, id est, Testiculus canis dicitur, inueniri solet fere in uirneis, folijs ternis, paruis, semipedalibus, radice ad formā testium hominis, alternis annis intumescere acrescente. Atq; hic mas est & foemina eiusdē nominis: quæ distinguitur internodijs, & ramofiore frutice, radice fascini. Nascitur fere iuxta mare Cynosorchis, & Satyrion uocatur, minus proprie. Aliud em̄ genus est, quod proprie Satyrion appellant, ut paulo post monstrabitur. Est & Orchis cognomine Serapias, de qua modo prodendum.

E X M. V E R G. C O M M.

Aliter potius q̄ aliud de utraq; Orchis, id est, Testiculi huius radice docuit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine. Quo loco cum de nouis, & uix credendis plantarum quarundam uiribus ageret, numerassetq; fabulosa etiam aliqua de sterilitate, foecunditateq; ad conceptus & partus agere incipiens, subiecit. *καθάπερ ἐπὶ τοῦ ὄρχιδος καλουμένου. ἀνοῖν γὰρ ὅτε τοῦ μὲν μεγάλου, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸ μὲν μὴ ἀνιρρότερον ποιεῖ πρὸς τὰς ὁμιλίας, σπινθλακτικὸν διδόνον αἰγὸς ὅτι νῦν τὸν δὲ ἰλάθω σίνεσται καὶ κωλύει. ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον σκυλλώδες, λεϊότερον δὲ καὶ ἑλαττον, τὸν δὲ κανλον, ὁμοιωτάτην ἀπὸ αὐτοῦ. Quorum summa & sensus est. Quemadmodum in ea quæ Orchis, id est, Testiculus uocatur. Qui cum duo sint, maior aliter, minor uero alter, Maior ad Venerem efficaciorē hominem facit, in lacte capræ, in montibus pastæ sumptum. Minor autem nocet illi & impedit. Habet planta Scyllaceum folium, minus tamen, & minore læuore nitens. Caulem postremo agresti Raphano, quam Græci Apion dicunt, simillimū. Et hæc Theophrastus de Testiculo herba: quam hic petrosis & fabulosis locis nasci tradidit, contra q̄ græcorum & latinorum aliqui testati fuerunt, ad mare nasci affirmantes.*

A

Pli. li. 22. ca. 16.

27. cap. 12.

Theoph. li. 9.

ὄρχις

κυνὸς ὄρχις

B

Pli. li. 26. ca. 10.

C De altero Testiculo. CAP. CXLIII.

Testiculus, qui alio nomine Serapias, Andrea authore, uocatur, quoniam radix inter pauca utilis sit. Folijs est Porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis. Caule palmeo, floribus pene purpureis. Radice Testiculis simili. Quæ illita tumores discutit. Vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas. Et illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent. Sanatq; oris putredines, & ulcera cacoëthe. Aluum sistunt e uino potæ. De hac, eadem quæ de Testiculo canis produntur.

B A R B A R I C O R O L L.
Orchis Serapias, quæ Triorchin cognominat Aetius, folium habet Scillæ, ut Theophrastus & Plinius testatur: nō Silphij, siue Laseris, ut Theodorus cōuertit, Silphiodes, pro Scillo- des in eo legens. Etenim Silphio foliū est Apij, non Scillaceū, aut Porraceū, ut Serapiadi. Spinosus huic herbæ caulis, & Apio, i. Raphano syluestri, nō ut Theodorus inquit, Piro similis.

E X M. V E R G. C O M.
Priori Testiculo cōgener posterior hic est, radicum numero diuersus, & alter ab illo dictus. Duabus em, & quales descriptæ sunt, ille nititur. Hic a Diosco. minimis Testiculis, nullo eorū de creto numero similes radices habere traditur. Ab alijs tñ Triorchis notatur: manifestio ex ea appellatione argumēto, non duabus, sed tribus testicularis radicibus niti in terra. Sic em posteriores medici appellauerūt, præsertimq; Paulus Aegineta ultimo suæ medicinæ libro, capite de sordidis ulceribus, *σαρπιδάδος ῥίζη καὶ τριόρχητος*, id est, Sarapiadis herbæ, quæ & Triorchis dicitur. Mox lib. 6. de simplicibus *ῥίζη ἢ σαρπιδάδος ἢ τριόρχητος*. Quod est. Orchis, aut Sarapias, quæ quidam Triorchin uocant. Sic etiā Aetius, sic posteriores alijs. Ex quibus uidere licet, non uiribus in medicina tantū, sed historia etiā a priore illo hunc differre. Cur aut Sarapiada hic uocari dixerit, quoniam multos habet radix eius usus, non satis certum nobis est.

C De Satyrio. CAP. CXLIIII.

Satyrium aliqui Trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici, aut Lilio similia, minora tamen, ac rubra. Caulem cubitalem, nudum, Florem Lilij effigie, candidum. Radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut ouū candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam. Quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dum concumbendi incessit cupiditas. Siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

B A R B A R I C O R O L L.
Satyrij primū genus, caule leui, radice gemina, hoc est, duplici ordine, a Plinio describitur.

C De Satyrio Erythronio. CAP. CXLV.

Satyriū Erythronion, aliqui Erythræicon, alijs Melion aqueum, alijs Entaticon, alijs Priapicon, aut Satyriscon, aliqui Satyri Testiculū appellant, Latini Molorticulum Veneris. Semine lini, maiore, duro, laui, splendente. Quod fertur, non secus atq; Scincus libidinē excitare. Cortice radicis gracili, ruffo. Intus aut album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si oīno manu teneatur radix, stimulat, Eoq; magis si bibatur in uino.

B A R B A R I C O R O L L.
Satyrium hoc notum pastoribus, quoniam arietibus & hircis segnioribus in potu datur, &

in Sarmatia equis ob assiduū laborem pigrioribus in coitu: quod uitium Profedamū uocant. In totū quidem Greci concitationē hanc uolentes significari, Satyrion, & Satyrifmon, & Satyrifasin appellant, ideo & Aristocholia genus unum, quod Polyriton cognominat. Satyrion ex facto uocari censeo. Herbam quoque illā Satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatā ex India: cuius contactu libidine durare septuagesimo coitu meminerit, nec speciem eius, aut nomen aliud reddiderit. Habēt hodieque Syri herbam simili effectu, Bucheidenque nominat, & Indi cam Satyrion: fortasse cum ea, cuius mentionē Theophrastum fecisse diximus, eandem radice candida & dura, cōmendatiore quo crassior & rugosior, & albiior, podagris utili. Est & alia Satyrifini significatio Hippocrati, pro tuberculis praelongis, qualia Satyrionū pingūtur, sub ipsas aures, quæ a quibusdam & Theres, & Pheres appellantur, ut inquit Galenus.

EX M. VERG. COMM.

Omnes Satyrī huius appellationes, aut ex colore radices, aut ex uiribus, impetūque eius ad Venerem factæ sunt. Neque enim Erythron, & Erythrococcum aliud significant, quæ rubens simpliciter, & ueluti cōcco infectum. Quæ deinde uox Entaticos sequitur, non aliunde quæ antea totū uiribus est. Græcis enim intendi, & arrigere ea uox significat. Quemadmodum Priapiscus, Satyriscus, & Satyrī Testiculus. Omnes enim a salacitate Veneris ad hanc herbam translatæ sunt. Priapum quotidie in hortis suis uidebat antiquitas ad Venerem semper paratum, & qualem in Priapēis carminibus audire adhuc licet.

De Hormino.

CAP. CXLVI.

HORMINVM satium a Latinis Geminalis, a Dacis Hormia dicitur. Folijs est Marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur. In altero nigrum, & oblongum: cuius est usus. Ad Venerem stimulant, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argema, albuginesque. Illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ hærbæ. Syluestre magis uiribus pollet. Quare unguentis præsertim gleucino permiscetur.

BARBARI COROLL.

Horminon amarum, nigrumque, nec Cumino penitus absimile, dodrantali Plinio altitudinis: medicamentis annumerandum potius, quæ inter fruges. Dictum ita, quia Venerem extimulet. Seritur cum Sesama & Irione, omninoque cum æstiuis, hoc est, cum his quæ æstate ante Vergiliarum exortum seruntur. Est & Horminiū, siue Hormienon, & Hormenion, sed illud Corrida intelligitur. Plinius huic folium Porri tradidit. Ceteri Marrubio simile fecerunt: qui error fatalis fere Plinio est, ut in Balloce & Stachye.

EX M. VERG. COMM.

Frugum generi adnumerauit aliquot locis de plantarū historia Horminon hoc Theophrastus. Idem Theophrastum secutus decimo octauo uolumine Plinius tradidit capitibus. 10. & 21. Quinetiam post hæc. 22. uolumine, capite ultimo duorum generum, & ipse Horminum fecit: alterum nigro, ut hic semine: alterum candido, contra quæ Dioscorides, qui paros dixit: quæ uoce Græci indicant, quæ nigrescunt magis, quæ quæ nigra sunt. Alij inter medicamenta, & fructes potius, quæ inter fruges numerare Horminum maluerunt. In quam partem & nos propensiores sumus. Neque enim antiquis in usu ciborum fuit, & ætate hac nostra uix ab agricolis cognoscitur. Descripserunt satis id antedicti scriptores, Cuminoque simile, præsertim semine fecerunt. Ob quam causam nihil ultra de eo nos agemus.

De Securidaca.

CAP. CXLVII.

HEdysaron unguentarij Pelecinum, id est, Securidacam uocant. Fruticosa est, folijs Ciceris. Semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur. Vnde nos

A

Spiraea

B

Pli. li. 18. ca. 17.
lib. 22. ca. ult.

Aduncus

Cmen accēpit. Amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidotis. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nascitur in fegetibus & hordeis.

Theoph. li. 8.
Pli. li. 27. ca. 12.

HEDYSARON, quoniam Peleciton a Græcis dicitur, a nostris Securidaca nomen habuit, fruticosa cauliculis, semen filiquis ternis, quaternisq; , quale Git nouimus amarum. Nascitur in fegetibus. Hac Lentem necari, Plinius, & e Græcis aliqui recentioribus existimant. Theophrastus Aphacen. Lentem uero ab Aparina, quæ Lappa fit, strangulari complexu scribit. Ita sepe fallit uocabuli similitudo, nam Græci Lentem Phacon uocant, non Aphacen. Sciebant & hoc discriminē illi q̄s dubitat: sed liberariorū culpā, ut sepe nūero cōtingit, hallucinādo suā fecere: q̄d quidē & nobis accidisse aliquibus locis hoc opere nō dubitamus, hoc em̄ est hominē esse.

E X M. V E R G. C O M M.

Nasci Securidacā in hordeacea & triticea segete hic ait. Secutusq; eum Plinius, in segetibus inueniri lib. 27. cap. 11. tantū testatus est. Theophrastus tamē octauo de plantarū historia uolumine, Lentibus noxiā & pestilentem dicens, non aliter q̄ tritico lolium, & auenā uersimile fecit, illic potius inueniendam ubi magis grassetur. Hac enim malorū, noxarūq; omnī natura plarunq; est, ut ubi maleficiū suum exercere possint, illic libentius agant, & frequentiora inueniant. Peleciton ab antiquioribus dicta in græcis diu planta hæc fuit: nec nos, præterq; in nouissimis scriptoris huius codicibus alio noīe descriptā in Dioscor. hætenus inuenimus. Is etiā quē nos egregiē antiquitatis habemus latinum Dioscoridem, Peleciton, non Hedyfarum legentibus proponit. Quo sit, ut suspicemur posteriorem hanc esse plantæ huius appellationē, & a suauitate odoris, usq; unguentariorū factam huic scriptori a posterioribus græcorū medicis accreuisse. Dico autē posteriores, qui Theophrastum, & scriptoris huius tempora secuti sunt. Paulus Aegineta utroq; nomine eam in. 6. his uerbis indicauit. Hedyfaron, quæ & Peleciton. Eius semen ante coitum ex melle appositum hic ait ἀρόσυν esse, id est, sterilitatem facere. Barbarus autē aliter penitus uertit, dicens cū melle appositū ante consuetudinē prohibere partus. Nos unam eandemq; uocis significationem semper secuti sumus: ille quod alijs locis abortiuū dixerat, hoc loco contrariō penitus sensu partus prohibere dixit.

ὄσμη

De Onosmate.

C A P. CXLVIII.

Onosma aliqui Osmaden, alij Ononin, alij Phlōnytin appellant. Oblonga folia habet, ad similitudinem Anchusæ, longitudine quattuor digitorum, & duū latitudine, mollia, in terra iacentia. Sine caulē, sine semine, sine flore. Radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte. Gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Prægnās si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

Pli. li. 27. ca. 12.

Onosma, & Oenoma, & Onoma, & Onomis, & Ononis, & Phlōitis, & Phlōmitis potius, & Hyperbaton nōcatur. Folia eius non ad quatuor, sed ad tres digitos longa Plinius scribit, strata in tetram, tria, incisaq; . Quid sit Hippocrati Oxosma, quo Lichenes tolluntur, haud comperi: nisi quis acetariam compositionem in eo uocabulo contineri censeat. Acetum sane contra Lichenas pollere nemo dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.

Reuis, & præter a Dioscoride dicta nulla est Onosmatis huius in alijs scriptoribus historia. Plinius. 27. uolumine cap. 12. eadē huic scriptori oīa reddidit. Quā solū foliorū longitudinē hic quattuor digitorū, ille triū fecit. Paulus Aegineta etiā nihil addidit aliud, q̄ a crem amarāq; esse: eamq; ob eā folia eius in uino pota enecare simul, & pellere ex utero humanos foetus.

νυμφαία

De Nymphaea.

C A P. CXLIX.

Nymphaea nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs cichorio minoribus, & longioribus. Alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex radice prodeuntibus. Flore Lilio simili, albo, & in me-

dio crocos habente. Cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat. Nigro semine, denso & lato, lenti gustus. Caulis est laevis, niger, minime crassus, ciborio cognatus. Radix nigra, scabra, clauæ similis. Quæ autumno secatur. Sicca cum uino pota cœliacis, dysentericisq; auxiliatur. Lienem absumit. Radix stomachi ac uescicæ doloribus illinitur. Vitiliginis ex aqua emendat. Imposita cum pice, alopecij medetur. Eadem contra ueneris insomnia bibitur. Siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Helide, in Anygro amne, & in Beotiæ Haliarto.

BARBARI COROLL.

Nymphææ radix dulcis: quam & in sole siccant. Nata fertur a nympha erga Herculem zelotypa, proptereaq; mortua: quare Heracleon uocant aliqui. Alij Rhopalon, a radice clauæ simili, laudatissima in Orchomeno & Marathone. Sed & in Creta quoq; ut Theophrastus putat. Bœtij Manodion, siue Madon, ut idem Theophrastus indicat, appellant, edentes semen.

Theo. lib. 9.

EX M. VERG. COMM.

Non comparauit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine Nymphæam describens, folia eius Aegyptiæ Fabæ folijs, uerum simpliciter grande folium sub aqua habere dixit. Addidit præterea, sistendo sanguini utilia esse folia eius, ideoq; trita uulneribus imponi. Quod hic non testatur uesci radice eius gentes in Orchomeno Bœtiæ, Marathone, & Creta, quibus locis copiosam nasci Nymphæam tradidit. Numeraturq; ab eo inter radices dulces, qualis Sythica est, pluresq; aliæ. Satis hic nominis causam declarasse uidetur: & si ex ueteribus fabulati aliqui fuerint, a Nympha priuatim nomen herbæ factum fuisse, quæ claua ab Hercule interfecta sit, uel ipsa zelotypia eius intabuerit, in palustrem hanc plantam mutata. Vulgaris & nota omnibus herba, qua nihil in palustribus speciosius nascatur & uiuat. Facileq; est ex folio eius, quale Aegyptiæ Fabæ folium sit ratio cinari. Hoc enim illi comparat Dioscorides. Nec præterq; figura simile illi facit. Grandius enim illud est, & quale secundo uolumine in Aegyptia Fabæ ex ueterum monumentis & historijs descriptum a nobis est.

B

De altera Nymphæa. CAP. CL.

Est & altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs antedictæ. Radice alba, scabra, flore luteo, nitente, Rosæ simili. Huius semen & radix, contra sceminarum profluuiâ efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne Peneo.

BARBARI COROLL.

Nymphæa alia caput habet Rosæ magnitudine.

EX M. VERG. COMM.

Quam habet nominis causam Nymphæa, eandem & Nymphon. Folia hæc superiori similia habet. Quod discrepat, radice color, & floris, & præter colorem floris figura est: quæ in illa Liliij, in hac Rosæ describitur. Non facile inuicem discernuntur, nisi quis a primo ex aqua earum emerfu, dum deflorescant, utranq; obseruauerit.

De Androsace. CAP. CLI.

Androsaces, sunt qui Picrada appellant, alij Leucen, alij Thalassiam. Herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs. Folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini pota, & herbæ decocto.

Androsace

M

C dagris utiliter illinitur.

EX M. VERG COMM.

Sapor Picrida, color Leucem, ortus Thalassiam Androsaces uocari fecit. Prima enim uox illa amaritudinem, altera candorem, tertia mare & maritimum significat: quæ tota fere eius historia est. Amarefcit enim, albescit, & maritimis locis in Syria nascitur: unde repetenda alia essent. Sed nimis a nostro orbe distat regio illa: ob eam causam Dioscoridis & Plinij in Androsace historia contenti, Asplenon nostro orbi cognitam, neque inuentu difficilem tractabimus.

ἄσπληνον

De Asplenio.

CAP. CLII.

AS P L E N I O M aliqui Scolopendrium uocant, alij Splenion, alij Hemionium, alij Pteryx, alij Lonchitum, alij Aturion, alij Phrygiam, aut Phrygitum, aliqui Philrodoten, Magi mustellæ sanguinem. Folijs est multis, Scolopendræ animali similibus, ab radice uirgula prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis. Nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia Filiculæ modo diuiduntur. Subter flauescencia hirsutaque, superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto feruifecta, ut per dies quadraginta pota, lienem absumat. Quibus etiam contritis, lienem ex uino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest. Singulum sedat. Calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.

D

Asplenon, folijs trientalibus, radice limosa, cauernosa sicut Filicis, candida, hirsuta. Gaudet humidis. Laudatissima in Creta, ubi & repertam Viétruius affirmat, circa Potereum amnem: qui duas urbes Gnoson & Cortynam interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis: quia herbam eam roderent, ex altera parte quæ ad Gnosum est, lienem habentibus: quia ibi herba illa non appareret. Theophrastus Hemionion hanc appellat. Theodorus Mula uertit, folio Scolopendrij, radice multiplici, mortuosas petrosasque planities anxia rem, delectari cibo eius Mulas, & ob id datum ei nomen. Forminas sterilefcere quæ hanc herbam in cibo sumpsissent, admixta Mulæ ungula, & corio, aut femine: prout alij non derma, sed sperme in Theophrasto legunt. Quod autem Scolopendrij folio describit eam, uidetur aliud genus quod Scolopendrium, siue quod idem est Asplenon haberi uoluisse Theophrastus: nisi quod ab eo Scolopendrium, & Scolopendra sumptum intelligat.

EX M. VERG. COMM.

Hemionion Athenis Theophrastus, quod multi libenter ea uescuntur, uocari Asplenon tradidit. Cretes Asplenon, quod primi in ea insula Cortynæ obseruauerint, ad Potheriæ flumi pascuntia hanc herbam pecora sua, lienes imminuere. Vulgus ubique Splenion, quod longitudine latitudinemque sua fasciole, & ut sic loquamur, emplastelli formam habet. Posteriores usque ad ætatem hanc nostram, Scolopendriam, a Scolopendrarum similitudine & figura, quam habet, foliosum magis cespitem quam plantam uocauerunt. Indicata alijs etiam appellationibus est, sed non adeo certa rei indicatione.

De Hemionitide.

CAP. CLIII.

ἡμιώνιτις

Hemionitis, quam aliqui Splenion uocant, solum emittit Dracunculi, lunatum. Radicibus coheret multis, tenuibus. Nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit. In petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.
lib. 26. cap. 7.

Hemionitis, uidetur esse quam Plinius Hermion, & Teucrion, ab inuentore Teucro uocata perhibet, uigesimo quinto historiæ naturalis uolumine, natam in asperis, austero gustu, nec florere ferere, neque semine, lienibus medentem: quæ omnia et Hemionitidi a Dioscoride tributa sunt. Nam quod

Plinius funcoſos tenues ſpargentē deſcribit, Dioſc. radice multiplici, & exili demonſtrauit: q̄ ille folijs paruis, hic folijs Dracuntij, lunæ modo incuruis deliniat, ideſt, *μνουςδία*, proindeq; non folijs paruis, ſed folijs curuis, in Plinio ſcribendum cenſeo locum eum. Inuentam ſic affirmat, cum exta ſuper eam proiecta eſſent, adhæſiſſetq; lienī, eumq; exinanīſſet, propterea & Splenon uocatam. Sues quoq; qui radicem eius ederint, ſine illo uiſcere compertos.

EX M. VERG. COMM.

Non temere penitus ſuſpicati ſunt ex antiquis & poſterioribus medicis aliqui, eandem Af pieno Hemionitin hanc eſſe: nec duplicem, ſed unam utriuſq; hitoriam & medicinam in ſcriptore hoc legi. Vtraq; enim a multis facto nomine indicatur. Vtraq; nec caulē, nec florem, nec ſemen fert. Vtraq; in petris naſcitur. Vtraq; lienes minuit: & quod in folijs alterius diſſerre uideatur, idē facile eſſe poteſt. Longitudine enim & figura non adeo diſſert a Scolopendria Dracunculus, ut non potuerit alterutro aliquid comparari: diuq; nos in ſuſpitionē hac ancipites, autoribus antiquiſſimis, & optimis græcorum medicis, præſertimq; Paulo Aegineta, ſeorſum de utraq; agentibus, ſeorſum tandem de utraq; egimus: illam Aſplenon, hanc priuatim Hemionitū uocari tradentes: congenerem illi quidem, foliorum tamen aliqua diuerſitate diſſimilē. Nec uiribus æqualem. Siquidem extenuat Aſplenos, non tamen calet. Hemionitis adſtringens inter eas ſoliorum ſimilitudo: quæ non ſatis fuiſſet, ſimpliciter lunata dixiſſe a ſcriptore hoc *μνουςδία* appellata. Habet enim id ſidus plura luminum incrementa: eademq; luna, non eadem luce ſemper fulget, ſed eſt cum toto orbe fulgens, totam illuſtrat noctem. Eſt cum utrinq; gibboſa, quam ueteres græci *ἀμφιπυρρον*, ut illam *πανσέληνον* uocant, maiorem noctis partē copioſa impleat luce. Eſt cum dimidiato globo ſplendens, *δισχόμνιον* a græcis dicitur. Eſt tandem cum a ſole digrediens uſq; ad quartam diem, non multa luce adhuc fulget: eoq; tempore græci perumq; *μῆνιν* uocant. Et in hoc lunæ interuallo Hemionitidis folia ſideri illi comparauit hic ſcriptor. Alioquin ſi lunatum ſimpliciter eius folium dixerit aliquis, incertam ex incerta eius ſideris quantitate & ſpecie figuram ſignificabit. Veritiq; nos, ne quod in lunæ amoribus fabula aliqui ſunt, nobis accideret, pluribus græcam uocem *μνουςδία* uertimus: diximufq; lunę nō dum tumentis in globum, ex Hemionitidis folio lunæ lumina deſcribentes.

De Anthyllide. CAP. CLIII.

Anthyllis, quam quidam Anthemida uocant, alij Eranthemin, alij Leucanthemon, alij Soranthin, alij Campeſtrem florem; Romani Solaftrum, duplex eſt. Quædam enim Lentū ſimillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine, radice parua, tenui. Naſcitur in falſis terris, & a ſole illuſtratis, non in ſulſo guſtu. Altera eſt folijs ramuliſque Triſagini ſimilis, hirsutioribus tamen, breuioribus & aſperioribus. Flore purpureo, odoris admodum grauis. Radice Cichorij. Pota drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibuſq; plurimum prodeſt. Tritæ, uulvæ pituitas emolliunt, cum roſaceo & lacte impoſitæ. Vulneribus medentur: quæ autem Triſaginis ſimilitudinem refert, pota cum aceto mulſo comitiales ſanat.

BARBARI COROLL.

Anthyllis, & Anthyllion, & Anthycellion uocatur. Genus eius primum in ſabuloſis. Alterum naſcitur in ſaxoſis. Eſt & in Aegypto fructus non quidem Anthyllion, ſed Anthaliō uocatus, a Theophraſto Malum Anthali, magnitudine & rotunditate Meſpili, ſine nucleo, ſine cortice, folijs Cypri: haud procul a Nilo, etiamſi Plinius ſcribat longius a flumine. Decoquit ibi hæc in Bryto hordeaceo, uehementer iocunda & dulcia, & quę bellariorum uitæ in ſecundis menſis impleant.

De Anthemide. CAP. CLV.

Anthemida aliqui Leucanthemon, alij Heranthemon, quoniam uere floreat, alij Chamæmelon, quoniam mali odorem ha-

A

B

*ανθυλλίς*Pli. li. 21. ca. 29
lib. 26. cap. 8.*ανθημίδα*

M ij

C beat, nonnulli Melanthemum, alij Chrysocomam, alij Calliam, Romanum Mallium, Aphri Asteriphon appellant. Genera eius tria, tantum flo-
re distantia. Rami palmum non excedunt, fruticosi, alis multis, concaui.
Tenuibus ramulis, rotundis capitulis, floribus in medio aureis, forin-
secus orbiculato ambitu, candidis, melinis aut purpureis, magnitudine
foliorum Rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur uere.
Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandique. Potu
& infusione pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque. Aduersus in-
flationes, & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant. Iocine-
rum nitia sanant. Decoctio earum uescicæ fouentur. Ex omnibus his ge-
neribus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cu-
ius amplitudo maiuscula est. Hanc proprie Heranthemum uocant. Ea
cui Leucanthemo nomen est, item quæ Crysanthemum dicitur, uehe-
mentius urinam ciunt. Aegylopijs illitæ medentur. Comanducata, ul-
cerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur.
Teruntur in farinam ad abigendos febrium circumitus. Flores & fo-
lia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri. Radix quoque sic-
cari, dumque ingruit necessitas, binæ partes herbe dari, modo floris aut ra-
dicis pars una, modo contra, floris partes duæ & herbae una, permu-
tatim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in uino
mulso diluto.

Pli. li. 22. ca. 21
The. li. 7. ca. 13

Anthemis, quæ & Leucanthesis uocatur, per ea quæ Chamemilon uulgo dicitur, magnis est
ab Asclepiade celebrata laudibus. Theophrastus Anthemon, & Anthemion appellat, quæ Dio-
scorides Anthesis, & Hippocrates (ut arbitror) Euanthemum. Duo genera constituit. Vnus
eius, quæ ab radice distat foliata sit. Alterum quæ caule tñ. Deslere incipit utriusque cacumi-
nibus, cum ceteræ ab imo incipiant. Flore candido, in orbem medijs herbaceo. Semini colos quoque flo-
ri. Decidere hoc sicut & spinosis, conceptaculo inani relicto. Theodorus Anthemon, per Melanthemum
uidetur intellexisse, ut qui Nigellam interpretatus sit. Reponuntur Anthemidis flores in coro-
namenta, sed collecti uere. Est & salutationis apud Athenæum cuiusdam popularis nomen An-
thema, cum illo ioculari numero. Vbi rosa, ubi Viola, ubi florens Apium?
Vbi hæc rosa? ubi hæc Viola? ubi hoc florens Apium?

EX M. VERG. COMM.

In Anthemide hac nulla est ex tam multis appellationibus, quæ non certam & rei coniunctam
significationem habeat. Omittimus quas hic ipse declarauit Eranthemum, quod uere floreat. & Cha-
mamalum, quod pomi odorem habet dici. Ceteræ etiam ex floris colore, odore uel consensu aliqua-
rum gentium factæ sunt: quæ ut interiorum, exteriorumue floris colorem magis amauerant,
sic Leucanthemon a colore albo, aut Chrysanthemon, Chrysocomenue a flauo auri colore
eam indicauerunt. Vt utrumque enim modo in scriptore hoc legitur. Quemadmodum ab odore Ma-
li quæ habet, Malanthemon. Mali enim florem ea uox significat. Libet his addere a Theophra-
sto libro de plantarum historia octauo, sapientius genere neutro Anthemon dictam fuisse. Et qui
passim in grecis modo legitur, dodrantes ramuli, in uetustissimis utriusque gentis codicibus,
duorum dodrantum altitudine herbam describunt. Nec multo post, ubi passim legitur, κλωνά-
ρια μικρά λεπτά φυλλάρια, legi oportere, non ramulos, sed foliola. Prius enim de ramis actum fuit
erat, tunc autem de folijs herbae agendum erat. Indicant id uetustissimi grecorum codices, &
antiqua Dioscoridis interpretatio: quorum ope nos quæ miscuerant alij interpretes, redire in
sua loca cõegimus: diximusque, foliolis paruis, tenuibus, numerosisque, &c. Cetera in Chama-

De Parthenio. CAP. CLVI.

PArthenium aliqui Amaracon uocant, alij Anthemida, alij Leucanthemon, alij Camemelon, alij Chrysocalin, alij Melabathron, nonnulli campestem florem. Romani Solis seculum, aliqui Millefolium, Ethrusci Cautam, Aphri Thamath. Folijs est Coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Sic catum cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atq; Epithymum, & bilem & pituitam detrahit. Suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore a calculosis, et anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insedendum in duricia uluarum & inflammacionibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

BARBARICOROLL.

PArthenij flos odorem habet Mali. Nascitur in sepibus: Matricaria dici ea multi putant. Sunt qui Corulam appellent. Nam & ipse Dioscorides testatur ab Ethruscis uocari Cautam, unde Cautula deducitur, ac deinde Corula. Sed & Leucanthemum, & Tamnacu Plinius hanc appellat. Nisi librariorum menda sit, Tamnacu p. Amaracon scribendum. Nam & Amaracus a Diosc. uocatur: nec aliter a Galeno, atq; Paulo. Celsus apud nos Pallectiu, & Muralium appellat. ut Plinius intelligit. Ego Celsum de alia Parthenio Muraliu dixisse autumo: quod non in sepibus, sed in muris, parietibusq; nascitur: ob id & Parietaria uulgo nominata, ut in Helxine docuimus. Est & Parthenis pro Artemisia: quancq; sunt qui Artemin legant, non Parthenin, castigando protinus errore medicorum: q Parthenion, de qua modo loquimur, Artemisiam esse uoluerunt. Apud Hippocratem quae sit herba Parthenion cognomento Microphyllon, hoc est, Paruifolia, dubitatur a Galeno: qui Dioscoridem pro Helxine, aut etiam Mercuriali capiendum existimasse scribit. Sed quid si eam pro Artemisia secundo genere Hippocrates intelligit, cuius minuta folia traduntur: aut etiam pro Matricaria, de qua hic agitur, quae folijs Coriandri describitur?

EX M. VERG. COMM.

Alia haec Parthenion est ab ea quam Celsus lib. 3. Perdicio uocari etiam tradit, reprimereq; simul, & refrigerare. Illa Elxine muralis, & Perdicion dicta: haec pluribus ab Anthemide inuentis appellationibus, similis congenerq; illi credenda est. Illa a Nicandro in Theriacis uenentis mederi prodita: haec sanandis suspirijs, atrae bili, calculosisq; inflammati, duratq; muliebribus locis apta. Haec Chamemalo similis, flore per ambitum candido, in medio luteo, illa Mercurialis herbae folijs descripta: & ne longiores simus, notis omnibus inter se diuersae, solo eodem nomine legentes fallunt. Fallit autem non nomine, sed re Parthenion, tam similis Chamemalo, ut pro ea sepius ab impitis carpatur. Habet enim illi similem paulominus q; in cunctis florem. Differt magnitudine, quae in Parthenio amplior undiq; est. Differt et figura, q; coloribus in utriusq; flore paribus Chamemali flos in medio tumet, & in altum erigitur: folia uero ad terram inflexa descendunt: in Parthenio folia medio exequata per ambitum stant. Nobis ex his quae diu obseruauimus, inclinatur animus, Chamemalo congenerem esse: & ut in plerisque alijs sit, nota aliqua priuatim ab alijs dispecti, quae in Parthenio hac uirosus odor est. Quemadmodum in Bomis oculo, quae uox dicenda erit, sola magnitudo, qua a Parthenio hac illa distinguitur.

De Buphrhalmo. CAP. CLVII.

Buphrthalmon quidam Cachlam uocant, alij Balsamenam, Magi Hamoran, alij Mercurij genituram, alij Aphthitis semen, aut Mnesitheum, Romani Cappacoraniā, Aphri Narat. Tenuis emit tit cauliculos, mollesq; folia Foeniculi, luteum florem Anthemide maiorem, oculi similitudine. Vnde nomen traxit. Circa oppida nascitur, et in campestribus. Flores cum carato triti, tumores duriciasq; discutit. Aiunt epotam post exitum a balneis, regio morbo correptis, colorem

M in

A

παρθένιον

Pli. li. 22. ca. 17
lib. 21. cap. 301

B

βούφραλμος

C tractu temporis reddere.

Pli. li. 25. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Buphthalmos, siue Buphthalmon, siue ut Hippocrates Buanthemon, fruticosa caulibus, qui & manduntur decocti. Flores huius maiores multo, acrioresq; sentiuntur, q̃ Anthemidis. Differt a Butomo frutice palustri, Orchomenio lacu plurimo, caule inoffensissimo, peculiari quodā leuore, folio harūdinis angulari, fructu nigro, Mali amplitudine, sexu duplici. Mas secundus, foemina uinilium ad nexus utili. Pars ab radice tenera manditur, puerorum cibo grata. Buphthalmon uero eandem esse cum Chrysanthemo uocata, puto, de qua sequenti libro Dioscorides, hæc ipsa repetit. Facitq; quod Alcman poeta, Calchan, siue Cachlan, hoc est, Buphthalmon, ita nominat, ut aureum torquem ex huius constare floribus ostendat, χρυσίον ὀφθαλμῶν ἰαδινὰν πετάλοις κάχλαν. Nicolaus Damascenus, lacum sub Alpes esse scribit. Multorum stadiorum circuitu, ubi toto fere año flores suauissimi odoris & coloris prestantissimi per ambitum uisuntur, similes Buphthalmo. Nō uidetur hæc Buphthalmos esse, quam rustici Bouis oculi, & Cortulam cognomento, foetidam ab odore appellant, pratenfam herbam, q̃ eius candidi flores sunt, Buphthalmi uero lutei, ut Dioscorides & alij testantur: etiam si cætera satis cum ea congruāt. Est & alia Buphthalmos, de qua in Cucumere syluestri diximus. Buphthalmon Dioscorides & Hæluron dici meminit. Ego & Hælurion uocari quandam stirpem lego apud Photionem; diuersa, nec ne sit, haud constat. Porro Hæluos animal est, quod nos Felem appellamus, uulgo, ut qdā interpretantur, Cattus: quod & Aegiluros quoq; dicitur a poetis. Inuenio & Chalcan uocari purpurā, & herbę genus, quo purpura tingit̃, apud Photionē grammaticum.

E X . M . V E R G . C O M M.

Quæ Solis oculi Parthenion uocari causa fecerat, per ambitū floris radiata folia, & in medio discus colore luteo, eadē similē illi Buphthalmon nominari fecit. Figura floris enim in utraq; paulo minus q̃ eadē: sola magnitudo discrimen facit. Eamq; ob causam, nomen hæc sibi a maiore maioris quadrupedis oculo inuenit, Bouisq; oculus dici uoluit: & si a magnitudine oculi simpliciter potius dicta forte aliquis non male credat, præsertim dicente hoc ipso simpliciter esse ὀφθαλμοειδῆ, quod tantum figura & specie oculi significat. Plinius tamen, 25. uolumine, capite. 8. his uerbis eam descripsit. Est & Buphthalmos similis bouum oculis. Quem nos secuti, Bouis oculum interpretati simus.

D

γλυκύσιδα
παιονία

De Pæonia.

C A P . C L V I I I .

Pæonia mas, siue Glycyfide, Græcis aliquibus Pentoboron dicitur, alijs Orobelfon, quibusdam Orobax, alijs Hæmagogon, alijs Pefeden, alijs Monogeniō, alijs Meniō, alijs Pæoniō, alijs Panthice ratos, alijs Idei Dactyli, alijs Aglaōphotis, alijs Theodoniō, alijs Seleni on, Magis Selenogonō, alijs Phthifis, Romanis Casta. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitāibus multis stolonibus. Huius duo gñæ, Mas folia luglandis habet. In foemina uero Smyrni more diuiditur. Summo caule siliquas emittit ueluti græcas nuces. In quibus quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Foeminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inheret, ut in Hastula regia. Foeminis a partu non purgatis, sicca radix datur. Ciet menses nuncis græcæ magnitudine pota. Sic uentris doloribus cum uino auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum ac uesicę dolores. Decocta in uino, aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem, uel duodecim pota in uino austero & nigro. Stomacho & erosioni bus eius esse prodest. A pueris pota, initia calculorum eximunt.

Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uuluae strangulationibus, & matricis doloribus, quoddecim numero pota, in aqua mulsa, aut uino. Nascitur in altissimis montibus, & promontorijs.

B A R B A R I C O R O L L.

Verutissima inuenta Pæonia est, auctorisque nomen retinet. Theodorus apud nos Dulcissima uocauit: quia Glycysiden Græci quoque dicerent. Nascitur opacis, syluosisque montibus. Caule palmorum duum. Inuenio & digitorum quatuor, ab eodem Plinio descripta, cute Latius subrutula, agnascens duobus, aut tribus, ferente in cacumine, uelut amygdalis quatuor aut quinque. folio nucis pinguiore, rotundioreque ac minore. Inhaerent & radicibus maris glandulae, sed plures quæ octo: quoniam non una radice nituntur. Foeminae folia myrrham redolent, & densiora sunt. Radices, fructusque legi noctibus præcipiunt: quia Picus Martius interdum facere dicitur impetum in oculos: alioquin effodientibus radicem Pæoniae, sedes procidit, si Theophrasto credimus. Confictum id ad uenditionem rei Plinius existimat. Hanc & Ephialtion uocabant antiqui, utpote contra suppressiones incuborum, fauorumque nocturnas ualentem. Seleucus Glycysiden, pomi genus, specie fici tradit, quod mulieres maxime deuitent, infatuationis metu. Ita enim μεταίσιμον interpretor. Glycysida porro dicta est Pæonia, quia acinos Mali punici similes habere uideatur. Nam Sidan, Malum punicum a Boëtis uocari, supra docuimus.

E X M. V E R G. C O M M.

VNum Pæoniae genus tantum tradidit Theophrastus libro. 9. de plantarum historia, quo loco, nisi a Plinio ipsidem uerbis redditum esset, quod ab eo traditur, non diceremus. Id huiusce modi est. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὡς ἐπὶ τὰ καὶ πρῶτον. εἶον αὖ πειρώμεν οἱ δὲ γλυκύσιδον καλοῦσι νύκτωρ καλύουσιν ὀφθαλμοὺς, ἰδὼν γὰρ ἡμέρας, καὶ ὁσθ' ἴσιν ὑπὸ δρυνοκολλήτων τὸ μὲν καρπὸν ἀπολλύων, κινδυνεύει τοῖς ὀφθαλμοῖς. Quorum sensus sit, ut Plinius etiam reddidit (uerum adijciuntur haec, & ex longinquo) Quemadmodum Pæoniam, quam Glycysidem uocant, noctu effodi iubent: quoniam si per diem fodiatur, uideatur: Picus auis, qui semen legit oculis periclitatur. Vidimus nos, renascentemque aliquot annis utramque Pæoniam obseruauimus: & ex ijs, quas habebant ambae præcipuas & certiores notas, folia scilicet, caules, folliculos, & in folliculis semina, nihil scriptoris huius historiae aptius respondere uisum est.

De Lithospermo.

CAP. CLIX.

LITHOSPERMON alij Aegonychon uocant, alij Leontion, alij Leoninum lapidem, alij Gorgonion, alij Tantalum, alij Diosporon, Romani Columbam, Daci Gonoletam, alij Heracliam. A seminis duricia nomen accipit. Folijs est Oliuæ longioribus, & latioribus. Iacent humi, quæ ab radice exiliunt. Ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine iunci. In quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. Folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, Erui magnitudine, duricia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo poto, calculus frangat, pellatque urinam.

B A R B A R I C O R O L L.

Lithospermon, herba quincuncialis, fere folijs duplo maioribus quæ Rutæ. Gerit iuxta folia singulas ueluti barbulas, & in earum cacuminibus, lapillos uelut aurificum arce, inter folia eius alternos, candore & rotunditate margaritarum: ipsi qua pediculis adhæreant, cauernulas habent, & intrus semen. Nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta, lacere, atque humi serpente auctores tradunt. Plinius uulgam, non hærentem uidisse meminit. Hanc a Theophrasto Diospyron, quasi Iouis niticum appellatam arbitror, ut in Ceraso commonui. Lithospermon, & Aegonychon, nonnulli dixerunt. Est & alia Lithospermon, nihil a supradicta differens: nisi magnitudine: ut quæ non serpat, sed arbuti modo fruticet.

E X M. V E R G. C O M M.

Theophrastus Diospyron inter segetes nascentem herbam, aut hanc, aut huic similem indicat. Fecit eadem soliditatis ratio, ut Herculeæ etiam diceretur: facili inuentu herba: tamque certis

A

Pli. li. 27. ca. 10

B

Lithospermon

Pli. li. 27. ca. 11.

M iij

Cnotis, ut nulli legentes possit fallere. Nos sæpe uidimus, sed multo minore semine, q̃ Plinius tradiderit: qui libro. 27. capite. 10. magnitudine Ciceris semina eius describit. Quæ aut nos uidimus, magnitudine grandioris Milij erant. Cætera eadem illi & naturæ sunt. Nec quicq̃ felicius in descriptione eius a Plinio dictum est, q̃ cum dixit: tantus est decor, uelut artificum arte inter folia indicantibus margaritis. Illis enim duricia, læuor, rotunditateq̃ optime comparata fuerunt. Color tamen liuescens in his seminibus est: qui in margaritis candidus passim uidetur. Sed hæc terræ, cœliq̃ bonitas uariare facile potest.

¶ De Phalaride.

C A P. CLX.

φάλαρις

Phalaris cauliculos emittit, quales Zea, e minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos. Semen candidum, oblongum, Milij magnitudine. Tunditur, & in aqua, aut uino succus ad uesicæ cruciatus utilissime bibitur. Semen cochleari mensura potum, ad eadem efficax est.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 12.

Phalaris, caulem habet longum in summo flore, qui spicaceus a nobis uisus est, inclinat, semen simile Sefamæ.

E X M. V E R G. C O M M.

Ostenderunt nobis herbarij aliquando uno tantum culmo magis q̃ caule, aut calamo, ex terra surgente Phalarim. Verioremq̃ Plinij q̃ scriptoris huius historiā fecerunt: qui thyrsum habere tenuem, longum ceu calamum eam ait. Hic tamē numero multitudinis καυλὸν πολλόν, quod est, coliculos multos illi tribuit. Cætera omnibus eadem erant. Erant & in ea quam uidimus folia alternis hinc & hinc per interualla toto caule disposita: & in summo ceruleus spicatus flos, sed raris in spica illa floribus.

D

ῥυθροδάνην

¶ De Rubia.

C A P. CLXI.

Rythrodanū aliqui Teuthrion, alij Dracanon, alij Cinnabarim, Latini Rubiam, Ethrusci Lappam minorem, Aegyptij Sophobi uocant. Radix rubra est, qua tinguntur lanae. Vna sponte prouenit. Altera feritur, ut in Thebana Galileæ, & Rauenna Italiæ. In Caria inter oleas, ut in aruis solo creditur. Hanc non sine quaestu ferunt. Namq̃ maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi. Aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo maiores. Folijs per interualla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematuruit nigrum. Radix tenuis, longa, rubra. Urinam ciet. Qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsæ. Item Ischiadicis, & resolutis. Crassam, copiosamq̃ urinam pellit, nonnunq̃ & sanguinem. Bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, succum ex uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absomit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq̃. Albæ utiligini, illita ex aceto medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 11.

Rythrodanum, & Ereuthodanum dicitur, folium Hederae, sed rotundius, serpit humi, ut gramen, locis umbrosis conspicienda, quinis per genicula caulium folijs. Laudatissima Italica, & maxime suburbana, & omnes pene prouinciæ sciant ea. Radice amara, & Anchusæ modo rubicunda, uelleribus tingendis, & pellibus perficiendis utili, præsertim Italica, ut Democrito placuisse dicunt: ob id a quibusdam appellata Byssos. Cæterum Byssos proprie Lini genus est, de quo Plinius. Honor inquit proximus Byssino, mulierum maxime deli-

chis, circa Elin in Achaia genito, quaternis denarijs stipula eius permutata quondam, ut auri. Pausanias, Byssus inquit, non alia Græciæ parte nascitur, q̃ in Elide, tanta tenuitate, ut ne Iudaicæ quidem Byssio cedat: etiamsi colore minus ruffet, q̃ Iudaica. De Byssio Iudaica pleni sunt sacrarum literarum codices.

EX M. VERG. COMM.

V Ectigal rusticæ plebi non contēnendum, tota Ethruria, Florentinoq; præsertim agro ex non multo tempore Rubia est: noueruntq; eam pueri oēs per hyemē, quo tempore a rustico omni alio opere cessant, radices eius paruo ligone in sepibus eruscantes, inuentasq; & effossas tingendis lanis utiles uendentes. Radices eam lanariæ officinæ simpliciter in gente nostra uocant. Reliqui uero uulgus, q̃ asperitate suā tractata manibus picis modo hæreat, manus Picentē noiant; nihilq; modo notius est, in sepibus, & ut passim uidere licet, umbrosis locis ubiq; nascentem. A rubore radices, quo lanæ & coria tinguntur, factum illi nomen est. Quemadmodum & a latinis ob eandem causam Rubiam dici rationari facile est.

De Lonchitide.

CAP. CLXII.

L Onchitis, quæ Cestron, aut Medusa alio nomine dicitur, latine Venerea, aut Lanceola, folia habet latioris Porri, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terrā procumbentia, pauca in caule. In quo flores ceu galericuli hiantibus comicis personis similes, nigri, & uelut e rictu albam exerentes linguam, quæ ad labrum inferius semen promat, lanceæ simile, triangulum. Vnde sibi cognomen tum arrogauit. Radix Dauci. Nascitur in sitientibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet.

BARBARI COROLL.

L Onchitis, non ut pleriq; existimauerunt, eadem est quæ Xiphion, & Phasganion. Quæ se mine cuspidaceo, radicibus prælongis.

EX M. VERG. COMM.

E Gregius & speciosus Lonchitidis huius flos est, & qualem hic describit inuerso pileolo similis, colore in purpura nigro: qui theatralis laruæ, & histrionice personæ rotunditate sua formam referat: ex cuius medio, quasi ex aperto & hiantē ore, candido colore se profert, ueluti lingua. Ob quā causam aliqui Medusam, & florem, & ex eo plantā dixerunt, Gorgonis desecto capiti similem. Qua specie in antiquis monumentis, monstri eius caput adhuc uidetur, q̃ maxime potest aperto ore linguam exerens. Cur autē Romani Veneream dixerint, non satis certum nobis est: nisi forte folijs Acoro, quæ Venerea dicitur, quādamtenus similis hæc sit. Quemadmodum quod nam lati seminis, aut fructus Porrum hic dicat: cui Lonchitidis folia a principio statim comparat. Nullum enim huiusmodi Porri genus in plantarum historia, aut medica materia auditur. Nisi forte capitatum ea uoce intellexisse oporteat.

De altera Lonchitide.

CAP. CLXIII.

A ltera est Lonchitis, quā aliqui asperam Lonchitin, Latini Longinam, aut Calabrinam dicunt. Folia Scolopendrij emittit, sed asperiora, maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest. In eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

De Althæa.

CAP. CLXIII.

A lthæa, quā alij Althiocon, alij Ibiscū uocant, in syuestriū Maluarū gñe est, cui folia ut Cyclamino rotūda, lanugine canescūt. Flores rosaceo, bicubitali caule. Radice lenta, intus alba. Althæa appellat, q̃ inter primas sit utilis, et plurib. polleat remedijs. Decocta em̃ in uino, aut aqua mullā, in potu efficax ē cōtra uulnera, parotidas, abscessus, māmārū

A

Λογχίτις

Pli. li. 26. ca. 8
lib. 25. cap. 11.
Bτρικλινία
Λογχίτις

Αλθαία

C inflamationes, attritus sedis, inflatiōes, neruorū rigores. Siquidē discutit, & excoquit, rumpit, et ad cicatricē perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uulua inflamationes, praelusionesq; in pessis subdita. Decoctum eodem fungitur munere. Onera uulua, reliquiasq; a partu extrahit. Decoctae succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. Dentium multet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, siccuq; tritum, uutiligines in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo peruncti, a uenenatis non feriunt. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca, aut uino decoctum bibitur, contra omnes uespasum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, moribus & igni ambustis illinuntur. Constat, aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

B A R B A R I C O R O L L.
Medici Althæam uocādo, ut Theophrastus inquit, Maluam syluestrem intelligunt, ab excellentia effectus. A quibusdam Aristalthæa dicitur, Anadendromalache a Galeno. Item Hibiscus, siue Ibiscus. Quod Plinius Althæam ab Ibisco separauit, in medicina usu. Ibiscus inquit, a Pastinaca gracilitate tantū distat: damnatus in cibis, & medicina duntaxat utilis: quā Græci *μαλάχην* inquit *ἀγρίαν* uocant, & aliqui Pistolochiam. Althææ folium Maluæ a Theophrasto redditur, sed grandius & pilosius, cauliculi molles, flos luteus, radix alba, neruosaq; semen Maluæ, gustus quoq; caulium, ut Maluæ.

E X M. V E R G. C O M M.
D nihil Althæa græcis aliud est, q̄ si a medendo Medicam simpliciter dicas: quibus *ἁλθῆ* in medicina pharmacum, remediumq; & *ἁλθαίνειν* uerbū mederi est. Nec aliter in Theriacis suis Nicander *ἁλθαίνετα* aliquid sæpe appellat. Hanc Palladius in Octobri mense Hibiscum dici, his uerbis testat. Althæe, hoc est, Hibisci folia. &c. Vtutq; ea, ut uerbis eius utamur, ut ex molli forte uinum fiat, Theophrastus syluestrem esse Maluam libro. 9. de plantarum historia confirmat his uerbis. *ἡ δὲ ἢ οἱ πρὸ ἁλθαίων κινεῖται δὲ μαλάχην ἀγρίαν καλεῖται*. Quod est. Et eam quam hi Althæam, illi uero syluestrem Maluam appellāt. Galenus Anadendromalachen uocauit, quā si arboream, siue arborentem Maluam. Plinius diuersis locis. 19. 20. & 21. uoluminibus, plura Maluarum genera describens, non satis certam earum historiā tradit. Nos Græcos, & hunc præsertim scriptorē secuti, præcipua duo Maluarū genera fecimus, alterū secundo, alterum tertio hoc uolumine tractatū. Non ignorantes, hæc ipsa a quibusdam iterum diuidi, & in utroq; genere satiuam, & sponte sua nascentē numerari. In priore illa hortensem, quā in cibis pro oleo reuterentur, & locis incultis nascentē: ut tunc in Maluæ cōmentationibus nostris longius diximus. In posteriore hac syluestrem esse, quā duabus illis undiq; procerior sit, altiusq; a terra erigatur, & in hortis consita arborefcit, multoq; maiores flores, nec minore ambitu Rosarū profert. Verūtamen quæ artificio & opere humano meliorescunt, diuersi generis ob id censenda non sunt. Descripsit Althæan hanc Theophrastus eodem libro. Quodq; in nullo Maluæ flore, quod hactenus ipse uiderim, aut ab alijs audierim, luteum illi florem dedit. Nec nos scimus, quomodo naturæ, & alijs scriptoribus in Malua color ille respondere possit. Ostendit quoniam nis in omni Malua natura inter ruborem & purpuram splendentē florem. Hic etiā Rhodoides, quod est, Rosæ simile dicit esse, neq; ad formā magis, q̄ ad colorē referri id oportet. Quo fit, ut peritioribus dirimendā inter Theophrastū, scriptoresq; alios tam grauē litem relinquamus.

De Alcea. C A P. C L X V.
Alcea syluestrium Maluarum generi assignatur. Folia habet diuisa, Verbenacæ proxima, caules treis aut quatuor, cortice canabino uestitos. Florem Rosæ, paruum, radices albas, latas, quinq;

aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum uino, aut aqua potæ, dysentericis, ruptisque medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Alcea caulibus foliosis. Nascitur in pingui solo, nec sicco: quam & Peristereon cognominant, a similitudine foliorum, ut conicio. Ipsam quoque Leonis caudam, qua multum pollet animal id Homero, Catullo, & Plinio testibus, appellant Græci Alcæam. Differentia in eo, ut quibusdam placet, quæ herba diphthongum non habet in penultima, Dicitur, & Cercis cauda eius. Quæque & herba quædam Cercis est, e qua radij fiant textoribus, unde & nomen.

E X M. V E R G. C O M M.

Breuis in antiquis græcorum medicis Alcææ huius historia & medicina est. Nec Plinius aliter a Dioscoride lib. 27. capite. 4. de ea agit. Nos etiam, quod illi adijciamus, non habemus. Illud tantum tacuisse nolumus, in antiquissimis latinis codicibus coniunctam superiori hanc esse, unoque capite de utraque agi. Quod fecisse congener earum natura uidetur.

De sylvestri Cannabe. C A P. CLXVI.

Sylvestris Cannabis, quam aliqui Hydrastinam, Romani Terminalem uocant, uirgas fert Althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes. Folio satiuæ, nigriore & asperiore, flore Lychnidis, subrubro semine, & radice Althææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet. Tumores discutit. Tosos articularum dissipat. Huius cortex, torquendis funibus accommodatus.

De satiuâ Cannabe. C A P. CLXVII.

Satiuâ Cannabim aliqui Cānabion, alij Schinostrophon, alij Asterion appellarunt, plantam magni in uita usus, ad robustissimos funes faciendos. Folijs mali, graui odore, caulibus procæris, inanibus, semine rotundo. Quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus instillatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Funes Cannabini præferuntur in sicco, ferulacei generis. Hæc herba optima Alabandica, plagarum usibus præcipue. Tria ibi eius discrimina. Improbatur cortici proximum, aut medullæ. Laudatissimum est e medio, quod & Mesa uocant. Secunda commendatio Milesiæ: nam quod ad præcitatam attinet Rosea, agri Sabini arborum altitudinem æquat. Seritur a fauonio ubique. Quod densior, eo semen eius, cum est maturum, ab æquinoctio autumnis defringitur, & sole, aut uento, aut fumo siccat. Ipsa Cannabis, post uindemiam carpitur, & lucubrationibus decorticata purgatur. Varro, Gellius, & Palladius, Cannabum, non Cannabim appellant. Sanè Cannabus, græce lignum illud gracile significat, in quod pileum uisibilibus, aut centonibus intexitur, ob id Samyrionem poetam fratris Cannabum uocabat, propter macilentiam, ut inquit Pollux.

De Anagyri. C A P. CLXVIII.

Anagyris, quam aliqui Acopon, alij Anagyron, alij Agnacopon uocant, frutex est arboris instar, grauis odore, folijs Agni, uirgisque, flore oleris. Semen in corniculis non breuibz gignit, subrotundum, firmum, uersicolori facie, simile renibus, quod durefcit per menses. Tenera folia tumores illitu reprimunt. Si partus hareat, & secundæ mensesque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo. Sic & spiriosis dantur, & contra capitis dolores in uino. Difficiliter parientibus adalligantur, ita ut a partu statim auferantur. Radicis cortex con-

A

Pli. li. 19. ca. 7.
lib. 20. cap. 15.

καρυάτις ἀγρία

B

Pli. li. 19. ca. 9.
lib. 20. cap. 25.

*

ἀνάγυρις
ἀνάγυρος

Coquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum, uomitiones uehementer ciet.

Pli. li. 27. ca. 4.

B A R B A R I C O R O L L.
ANagyris, odore tetro prouerbium peperit, contra eos, qui offutura sibi comouent. Dicitur & Anagyros. Hanc sunt, qui a Plauto Nauteam uocari putent in Asinaria, sed auctorem non habent. Nauteam porro herbam grauem esse scribit Festus, qua coriarij utantur: a nauis diem, quasi nauseam.

E X M. V E R G. C O M M.
Foret Maio & Iunio mensibus grato inter alios frutices per syluas spectaculo Anagyris: multoq; flore, quem flatum ex longinquo ostendit, pratercuntium oculos facile in se conuertit: & si abesset ingratus odor, quo merito spretus, damnatusq; est, antiquorum coronas primus nobilitasset. Fruticosa stirps magis q; arbor est. Nos tamen uidimus tonsura, putationeq; coactam ad legitimam arboris altitudinem crescere: nullumq; florente ea laetius spectaculum, aut syluae, aut agri, si forte confita in eis fuerit, ostendunt. Respondent naturae omnia, quae in historia a Dioscoride illi tribuuntur.

κίττα

De Cepaea.

C A P. CLXIX.

Cepaea Portulacae similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinae stillicidio, & uescicae scabie laborantibus, opitulantur. Maxime id praestat, si cum decoctione radicis Asparagi bibatur.

B A R B A R I C O R O L L.
Cepaea, quasi hortensianam uoces, radice nigriore q; Portulacae inutili. Nascitur in litorebus arenosis, gustu amara, ut inquit Plinius, etiam si deprauata in eo habetur lectio.

D

E X M. V E R G. C O M M.

Hortense ulus Cepaeam esse, uox ipsa, & Portulacae similitudo indicauit: & si Plinius libro 26. capite. 7. in harenosis litorebus nasci tradat. Nullibi in graecis, praeter q; in scriptore hoc de ea legisse memini. Non potest incognita aliter a nobis describi: capropter qualem in graecis inuenimus, eam legentibus tradimus: illud tantum monentes, scribere Plinium quae ab hoc non dicuntur, nigriore radice q; Portulacae esse, eaq; inutili: & praeter id gustu amaram, simpliciterq; cum Asparagi radice uescicae plurimum prodesse: & praeter Plinium, Paulum Aeginetam stillicidijs uescicae uilem dicere: uerum non omnibus, sed his tantum quae sunt, ut ille ait, κατὰ φύσιν, id est, opplente urinae iter obice aliquo.

ἄλιστα
ἀλματώδης

De Alismate.

C A P. CLXX.

Alisma, alij Alceam, alij Damassonion, alij Acyron, alij Lyron appellant. Folia ei Plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, connexaq; in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore, capitibus Thyrsi. Flore tenui, candido, pallecente, radicibus tenuibus, ut Veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibus. Aquosos amat tractus. Radix si drachma una, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarunt, aut a rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt. Torminibus, atq; dysenteriae, per se, aut cum pari modo Dauici, potui datur. Conuulsis & contra uitia uuluae prodest. Haerba sistit aluum. Menstrua pellit. Tumores illita mitigat.

Pli. li. 25. ca. 101

B A R B A R I C O R O L L.
Alismatis, siue Damascenij huius folia magis laciniosa, q; Plantaginis uidentur. Alioqui similiter uenosa, radicibus densis. Alterum genus eiusdem in syluis nigrius, & maioribus folijs. Plinius hanc herbam uidetur quodam loco appellasse Caucalin: sed mendosam in eo lectionem monstrauimus.

EX M. VERG. COMM.

Damasoniū Plinius, 26. uolumine, capite qnto Alisma appellat: & si corrupta illic ea uox sit. Idem, 25. capite, 9. eandem Alisma uocat: additq; Damasonion & Lyron uocari, eandem appellationem ceteris modo præponens, modo subiiciens, nec alijs notis q̃ Diosc. eam descripsi t. Quod tñ hic *θυρσίου*, quæ uox thyrsi figurā tñ significat, ille capite thyrsi ais, duo breuius forte complexus q̃ exigeret sibi rei non satis nunc certè intellectus: & thyrsi formā in caule eius, & in sumo caule capitulū. Thyrsum autē hic intelligit uirgam potius q̃ hastā frōdibus uestitā: quæ in orgijs & coetu Bacchi a comitibus eius gestaretur. Nos etiā quod a Diosc. torminibus & in- testinorū torminibus cum pari Dauco prodesset Alisma dictum est; cum pari semine eius dixi- mus ex eodem hoc scriptore, qui in Dauco semine tantū eius utitur contra tormina.

De Onobrychide. CAP. CLXXI.

Onobrychis, quam e Græcis aliqui Onobrochilon, alij Eschas- menem, alij Corion, alij Chamæpityn, Romani Opacam, alij Brichilatā, alij Loptā, alij Iocinalē, Daci Aniaffexe appellāt. Folia habet lentis, lōgiora paulo, caulē dodrantalē. Florē purpureū, Radicē paruā. Nascitur in uliginosis. Hæba suapte ui, si trita illinaē, tubercula diffi- pat. Cum uino pota, strangurias sanat. Illita ex oleo, sudores mouet.

BARBARI COROLL.

Onobrychis, radice gracili nascitur circa fontes. **EX M. VERG. COMM.** Nihil in Onobrychidis historia Dioscoridi Plinius addidit, isdem notis & uerbis, 24. uolu- mine, cap. 16. eam describens. Nihil etiā in medicina Paulus Aegineta, amboq; ex hoc scripto- re tñ eam tradiderunt. Neq; ex tam multis eius appellationibus, unam saltem cōmentarijs su- is adiecerunt. Ex eo conijcere licet, nouas esse omnes, & ex similitudine adiectas illi pro tempo- re fuisse. Nec nos quod pro cōperto cōstituere de ea ualeamus, q̃c̃q; habemus. Herbarij q̃ aliqui nobiscū egerunt, uicinitate nominis decepti, cū Onochile, quæ ab asinorū labris dicta est, mi- cent: quemadmodum in Anchusis quarto uolumine non multo post patebit. Si uocis rationē nouisse aliquis amet, nihil q̃ asini rudium Onobrychis significabit. Verum ut paulo ante dixi- mus, nihil neq; ex hac, neq; ex alijs causis de re & nomine pro comperto nobis est.

De Hyperico. CAP. CLXXII.

Hypericum alij Androsæmon, alij Corion, alij Chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur. Surculaceo frutice, dodrantali, rubente. Folio Rutæ, flore albæ violæ simili, qui di- gitis tritus, sanguineū succū remittit. Qua ex causa Androsæmon co- gnominat. Subhirsuta siliqua, et tereti, hordei magnitudine, semine in- tus nigro, resinosi odoris. Gigniē in cultis & asperis. Vrinam cit. Men- strua pellit appositū. Tertianis, quartanisq; cū uino potū liberat. Semen xxx. dieb. haustrū, ischiadicis medet. Folia cū semine illita ābusta sanāt.

BARBARI COROLL.

Hypericon, frutex est oleaceus et tenuis, acri odore, cubitali, nigro semine, cū hordeo matu- rescente, ut Plinius demōstrat. Caput hoc ad uerbū in syluestri Ruta supius a Diosc. repetitur. Reuerti consules, monemus solum duo Hyperici genera facere Pliniū lib. 26. ca. 8. Pri- mū hoc q̃d Corion uocari ait: & quartum in hoc ordine, quod mox a nobis tradet Corin- dici, ab eo traditum; contra ea quæ a scriptore hoc docentur: dicente palam Ascyron Hyperici genus esse, & Androsæmon ab Hyperico & Ascyro differre tantum, &c.

De Ascyro. CAP. CLXXIII.

Ascyrum, quod a quibusdam Ascyroides nominatur, Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, maiores habens

A

θυρσίου

B

*ὑπερικόν
ἀνδρυσάμων*

Pli. li. 26. ca. 8.

VERG.

ἀσχυροειδής

N

D I O S C O R I D I S

C ramos, rubētia folia, tenuia. Flores luteos, & fructum resinofum, Hyperico non abfimilem. Cuius attritu digiti fere cruentantur. Qua de causa Androsæmum uocauere. Vfus feminis ad ischiadicos. Potum in hydromelitis sextario, biliofa recrementa ampliffime detrahit. Sed affidue dare oportet, donec fanitati refituantur. Illinitur et ambuftis efficaciter.

Pli. li. 27. ca. 9.

A Scyron, & Ascyroides fimilia inter fe sunt, ut inquit Plinius, fed Ascyron maiores habet ramos, Ascyroides uero ferulaceos, omninoq; rubentes. Semen utriq; in caliculis nigrum, piffillum. Comæ Ascyri trita, uelut cruentata apparent.

B A R B A R I C O R O L L.

Separat Plinius Ascyron ab Ascyroide, duo eiuſdem plantæ genera faciens. 27. uolumine, capite quinto. Defcribitq; priuatim & ex proprijs utranq; notis. Hic tamen unum, quod bifariam uocetur Ascyron, ſ. & Ascyroides eſſe tradit. Nec alibi, quod hæcenus inuenerim, Ascyroides aliquod Dioſcoridi eſt. Plinij tamen hiftoria diuerſitatis huius cauſam indicat. Ait enim ille. Ascyron & Ascyroides fimilia ſunt inter fe, fed Ascyros maiores habet ramos, qui Ascyroides uocantur, ferulaceos. &c. Similia inter fe Plinius duo hæc ait eſſe, & ſola magnitudine diſſerre: quæ quoniam poteſt bonitate cœli terræq; fieri, a Dioſcoride neglecta eſt. Vnumq; genus fecit, quod forte ante ſe herbarij alij duo fecerant: quos ſecutus Plinius, diuerſam ab hoc uidetur Aſcyri hiftoriam tradidiſſe, quæ tamen una in utroq; eſt.

Androsæmon
duos uide

De Androsæmo. CAP. CLXXIII.

A ndrosæmon, ſiue ut alij appellauere Ascyron, aut Dionyſiadem, ab Hyperico, Ascyroq; diſſert: quod ſurcuſoſum ac tenue ſit. Rubentes rami, & folia Rutæ duplicia, aut triplicia. Quæ trita, uinoſo ſucco manant. Complureis alas habet in cacumine, in uerſus utrinq; digeſtas. In quibus flores puſilli, lutei, & in caliculis ſemen pauperis nigri, inſigne lineis. Huius comæ trita, resinofum odorem reddunt. Semen drachmis duabus potum, bilioſa excrementa pellit. Iſchia dicis medetur, ſed a purgatione aquam exſorbere oportet. Hærba ambuftis illita medetur. Vulneribus ſanguinem cohibet.

Pli. li. 27. ca. 9.

A ndrosæmon, non abfimile Hyperico eſt, cauliculis maioribus, denſioribuſq; ac magis rubentibus. Folia alba. Gignitur in uineis, fere medio autumno effoditur, ſuſpenditurq;. Gale nus Androsæmon duplex inquit eſt: Ascyron, ſiue Ascyroides, de quo ſupra uidelicet locuti ſumus. Alterum Dionyſias priuatim appellatum ab aliquibus. Vtriq; par effectus.

De Cori. CAP. CLXXV.

Cori

C oris, quod aliqui Hypericon uocant, frutex eſt folio Ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior palmo, ſuauiſ, odoratus, acris. Potum ſemē menſes trahit & urinas. Contra Phalangiorum morſus ex uino potum auxilio eſt. Rigoribus ex pipere, opiftotonicis ex oleo aptiſſime illinitur. Radix uino decocta, potaq; deſectis, opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandū t̃poptime coöperiri licet. Si quidē corpus totū deſudabit, ex qua re priſtinā agilitatē recuperabit.

B A R B A R I C O R O L L.

C oris ſub Tamarice naſci dicitur, folijs minus rubentibus, leniter aculeatum. Hippocrates Goren hæc uocauit, ut Galenus inquit, argumento ſeminis, q; Pupulæ ſimilitudinem præſentat: quanq; ſunt recentiores, qui Pupulam, ſiue Pupillam dicendo, herbam a Dioſcoride ſim appellatam ſignificant.

EX M. VERG. COMM.

Vndiq; totoq; corpore rubentē Corin hanc nobis aliquot herbarij ostenderunt. Dico autem undiq; & toto corpore, folijs, ramulis, & florum doliolis. Hic tamen rubere tantum folia ait. Natura Corin rubentem totam fere ostendit, uerum inæqualiter, aliquaq; parte magis: aliquaq; uero minus. Ob quam causam credimus & hunc, & Plinium ex ruboris abundantia, rubere tantum eius folia dixisse.

De Aiuga. CAP. CLXXVI.

Gracis Chamæpitys, alijs Pityforysis, alijs Orizelon, ijs qui Pontum incolunt Olocyron, alijs Bryonia syluestris, Athenis Ionía, Euboicis Sideritis, Magis Mineruæ sanguis, Latinis Aiuga, aut Cypripum, Dacis Dochela appellatur. Herba in terra repens, incurua, folijs semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis. Odore Pinus, flore tenui, luteo, uel candido, radicibus Cichorij. Folia septem diebus in uino pota, regio morbo medentur. Et quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iocineris & renum uitij. Torminosi profunt. Ea apud Heracleam ponticam, perinde atq; antidoto contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. Excerpta melle cum æris squamma & refina purgat. Apposita ex melle, uulnæ uitia extrahit. Mammarum duricias discutit. Vulnura glutinat. Ulcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet.

BARBARI COROLL.

Chamæpitys, & Aiuga, siue Abiga dicitur a latinis propter abortus. Inuenio et Ibigam uocari: quod nomen fere seruant hodieque Illyrici, nostrum uulgus Iuam. Est ubi appelleretur, ut inquit Plinius, etiam Tus terræ, tria eius discrimina reddēdo. Vnum sesquipedalibus furculis, flore Pinus, & odore. Alterum breuius & incuruū. De tertio dicemus paulo post, sua mentione. Recentiores aliam Chamæpityn nouerunt, eiusdem (ut ipsi arbitrantur) effectus, folio Saluæ rimoso, angustiore tñ, & ad radicē maiore, flore subcādidō, ac luteo, e folliculis schareg. i. cristę gallinacę similibus, sapore Pinus, in maritimis montibusq; nascentem, nigro semine: quæ non serpit. Chamæpityn Athenis, alijs Dionysiam, alijs Didoniam, alijs (qđ uerius existimo) Ioniam uocari scribunt, ut Apollodorus, & Athenæus. Item alijs Holoeyron, ut Dioscorides, & qđ nō nominauimus. Alijs Holocleron, ut Paulus. Credo librariorum culpa uariatū fuisse in uocabulo: sed res constat, satis est. Nicander Ionida quandam herbam nominat, fortasse Chamæpityn significare uoluit, pumilam & humilem eam dicendo.

Pli. li. 24. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Plinium imitanti ante nos interpretes alijs, quocūq; loco nos Piceam in hoc capite diximus, ubiq; Pinum dixerunt. Ille enim. 24. uolumine, capite, 6. Chamæpityn describens, flore Pinus, et odore esse dixit. Idem non multo post Pityusam pariter describens, Frutex est similis Piceæ ait, eandem in duobus nominibus græcorum Pityn diuersa interpretatione ostendens. Per cuius uestigia ingressus Barbarus, eadem uarietate quam Pityn primo uolumine Piceam dixerat, hoc loco Pinum dixit. Nobis quod semel primo uolumine dictum probatumq; fuit, seruare hoc loco etiam placuit: poteruntq; cupientes ex nostra Piceæ commentatione causas, rationesq; nominum huiusmodi cognoscere. Quia Piceam olent folia eius, Chamæpitys dicta herba hæc est. Quæ etiam causa fuit, ut Tus terræ uocaretur: qm̄ totius Pinorum generis resina Tus olet: hæc autem Piceam. Triplex Chamæpityos huius genus est, diuersis inter se partibus alijs, sed eodem Piceæ odore: ob quam causam creuerunt per tempora tam multæ eius appellationes, alijs plantis, alijs eas comparantibus herbarijs, & ex his, illisue notis eas describentibus.

N ij

¶ De altera Aiuga. CAP. CLXXVII.

Alterum est genus Aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, præcenuibus, coma præcedentis, flore candido, semine nigro. Hæc Pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris, caule aspo, cādido, luteis florib. semine iuxta alas. Resipit hæc Pinū. Vīm eandē obtinet, sed nō usq̃ adeo efficacem.

BARBARI COROLL.

¶ Chamæpitys secunda dictum est in prima.

¶ Chamæpitys tertia folijs scabris, caule digitalis crassitudine aspicitur.

¶ Finis LIB. Tertij.

PEDACII

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quartus,

IO. RVELLIO interprete.

D



In superioribus libris, amātissime Ari, tradidimus de odoramentis, oleis, arboribus, unguētis, animalibus, frumentis, oleribus, radicibus, succis, herbis, seminibusq̃. In hoc autem Quarto differemus de radicibus, & eis quæ restant hærbis.

¶ De Betonica. CAP. I.

κλίσρον
ψυχότροφον

Cestron Psychotrophon uocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Hæba est, caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiore, quadratū, folia Quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicē maiora. In sumis caulibus, semē ueluti Satureiæ spicatū inest. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nitē ut Veratri tenuibus. Quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus uulū malo oportunis, & ad laxandos uteri strangulatus, drachmæ unius pōdere cū hydromelite. Tres in uini sextatio drachmæ, contra serpentū morsus ebibunt. Hæba magna utilitate illatis a serpente uulneribus illiniē. Aduersus etiam uenena, drachma ex uino pota conuenit. Præsumpta ea, si uenenū hauriatur, nihil nocebit. Vrinam ciet. Aluum subducit. Medetur comitialibus, & infanis, pota ex aqua, & iocineris lienisq̃ uitijis, drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionē adiuuat, si qs ea fabæ magnitudine secundū cœnā cum melle cocto deuorarit. Modo consimili acide ructantibus, ppinat.

A Stomachicis eam manducare, & succū deuorare proderit, si postea dilu-
lutum uino sorbeatur. Datur sanguinem exscreantibus tribus obolis,
cum diluti uini, aut lactis cyatho. Ischiadicis, renum & uesicæ dolori-
bus ex aqua. Aquæ intercutem binis drachmis ex hydromelite. Regio
morbo laborantes recreat. Menses pellit, drachmæ pondere cum uino
pota. Aluum purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem
cyathis. Facit cum melle ad tabem & purulentam exscreationem. Folia
sicca, tritaq; fictili uase reconduntur.



HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileien. Patriarchæ Co-
rollariorum LIB. Quartus.

Estron a Vetonibus inuentam in Hispania, Betonicam in Gallia nominari cœ-
ptam putant. Alij Chironem, alij Comistem, prophetæ Hieracæ, Thufcia Indi-
cem, alij Pendouiam, Syri Periponion, alij Sidentin, alij Theriopauon, alij *βίαν πίαν*, hoc est,
radicem diuinam, in Italia Serratulam uocauere. Caulem habet interim cubitorū duum, a ra-
dice spargens folia fere Lapathi, ut Plinius inquit, ferrata, semine purpureo, ut idem auctor est,
seu stamine purpureo, ut Dioscorides, qui hoc dicit in altera mentione Betonicæ. Fit uinum ex
ea, & acetum medicis. Multum differt specie, non effectu alia Betonica, ut Paulo Aeginetæ pla-
cet, uniuersalis, ramulos habens Pulegij, tenuiores, & gustu fatuos, in petrosis fere proueniens.

Pli. li. 25. ca. 8.



MARCELLI VERGILII

in Dioscoridem A. N. N. Orationes abbreviatæ.

Vod forte desiderauerit aliquis, non relinquemus. A uarietate & copia remedio-
rum Cestron a grecis dictam fuisse, qui multa alia una hac appellatione indicaue-
runt. Telum primo, quod persico bello inuentum fuerit. Opus interpunctum, acue pictum.
Veneris & fœminarum ornatum, & si priuatim Cestos hic dicatur. Libri præterea a uarietate
subiecti, ab aliquot grecis hoc titulo inscripti sunt. Sic etiam Plinius aliquando Ebur Cestru,
id est, picturatum dixit. Latini ab inuentoribus cognominatâ Vetoniam semper uocauerunt.

B

De Britanica. CAP. II.

Britanica, aut Vetonica, folia habet syluestris Lapathi, sed ni-
griora, & densiora, gustu adstringentia. Radicem tenuem et bre-
uem. Caulem paruū emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole
cogit. Vim habet adstringentē. Priuatim depascentibus oris, et tonsilla-
rū ulcerib. cōmodatā. Valet etiā ad reliqua, qbus adstrictiōe est opus.

Βριτανική
βιττονική

BARBARI COROLL.

Britanica, in insulis Oceani, aut in consini Britaniæ Oceano reperta est, folia habens oblon-
ga, nigra, & radicem nigram, succusq; eius exprimitur & ex radice. Flōrem Vibones uocant:
qui collectus, anteq; tonitrua audiantur, & deuoratus, securos in totum reddebat milites Cæ-
saris germanici a morbis, quos medici Stomacacæ & Scelotyrben dicebant. Siquidē in Ger-
mania trās Rhenum, castris ab eo promotis, maritimo tractu, fons erat aquæ dulcis solus, qua
pota, dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur: quibus incōmo-
dis in Arabia quoq; Romanas legiones tentatas fuisse Augusti Cæsaris principatu, Helij Galli
ductu, Strabo refert. Sed quærent nonnulli, quamobrem Vibones dicant huius herbæ flores.
Diuinare non ausim. Ceterū Strabo auctor est, apud Vibonem in Brutijs repertū, coronis flo-
res necere, in eum quoq; locum propter flores e Sicilia migrasse Proserpinā. Propinqua est &
Viboni Petilia: quæ nomen Petilio flori dedit in Lucanis autumnali, et circa uepres nasceti: tm
colore cōmendatur, q est Rosæ syluestris: mirumq; in eo flore inflecti cacumē, nec nisi intorto
folia nasci, paruo calice, ac uersicolore, luteum semen includente. Hunc dixi ab oppido Luca-
niæ uideri appellatum. Nisi qs a Petilio Romæ luco, itemq; Petilino altero existimet. Aliogn
Petilus, pro exili capitur lucillio. De hac itaq; Britanica Dioscorides in præsentī loquitur. Est
& Cantabrica in Hispania, per eiusdem Augusti tempora a Cantabris inuenta, nascens ubiq;

Pli. li. 25. ca. 3.

Strabo lib. 6.
geographiæ.

N. iij

D I O S C O R I D I S

C caule iunceo, pedali in quo sunt flosculi oblongi, uelut calathi, & in his semen per quod minutum.

EX M. VERG. COMM.

Scelotyrbē malum, quo Plinius ait compages in genibus solui, Galenus in diffinitionibus suis his uerbis describit. Resolutionis genus Scelotyrbē est, quā recta totus ingredi homo nequit, sed aliquando sinistrum latus in dextrum, aliquando dextrum in sinistrum circumfert, aliquando crus post se trahit, non aliter quā ualde accliuēs locos ascendentes. ¶ Sequitur Britannicā in cunctis fere grecorum codicibus alterum Vettonicę caput, superstitioſe & imprudenter huic ſcriptori adiectum. Id in antiquiſſimis, quos habemus Dioſcoridis gręcos latinosq; codices, nullibi legitur. Nec uerifiſimile eſt, poſt tractatā ſemel totam Vettonicā, inter cedente alio capite, de eadem iterum agendum huic ſcriptori fuiſſe. Accedit his quod in pluriſq; alijs etiam diximus, nihil in hoc ſcriptore maiestate eius indignius, nec cui minus credere oporteat, quā ubi ſuperſtitioſum aliquod, & ad religionem noſtram pertinens ab eo docetur. Porterunt legentes quod dicimus, ex his quę alij interpretes reddiderunt, cenſere. Nobis non placuit religionem naturę miſcere, & quę tam longo interuallo diſtant in ſcriptore hoc eadem facere. Vana hominum mortalitas hæc primum inferit; mox imprudentia & ſaluſis ſtudium excipit: exceptaq; per manus diu feruntur. Niſi prudentior aliquis, quod ſapientes præcipiunt, de genere in genus non tranſeundum eſſe alios monuerit.

ΒΕΤΤΟΝΙΚΗ

De Vettonica. CAP. III.

Vettonica nascitur in pratis, & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, non æternas ambulationes, & loca sancta. Grauibz somnis resistit. Ad omnem medendi usum commendata. Radicem habet rubram, odoratā, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis uulneribus capitis indita, dolorem finit. Vulnera glutinat. Fracta ossa extrahit. Sed quotidie imponi debet, dum perſaneſcant. Dolori capitis medetur, si iure decoctū perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

BARBARI COROLL.

Caput hoc, non in omnibus codicibus inuenias. Illud mirum quibz dā, quod Plinius Bertonice folia Rumici scribit ſimilia; hoc Britanice Dioſcorides aſſignat, cum Bertonice querna potius uſantur. Nec illud minus licet mirari, quam obrem mentiōes duas Bertonice meruerit. Niſi quod duo quoq; gēna Bertonice demonſtrata nobis a Dioſcoride contenderit. Duas & Paulus Aegina Bertonice facies intelligit, effectū parili, ut prædiximus.

ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ
ΛΥΤΡΟΝ

De Lyſimachia. CAP. IIII.

LYſimachia, quam aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales, altiores ſue, fruticoſos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, ſalicis figura, guſtu adſtringentibus, flore ruſſo, aut aureo. Gignitur in aquoſis & paluſtribus. Foliorum ſuccus adſtringente ſua ui, ſanguinis reiectionem ſupprimi. Dyſentericis potui datur, aut infunditur. Menſium abundantiam ſiſtit, in peſſo. Sanguinis profluuiō ſubuenit, ſi nares ea hærbā obturentur. Vulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem ſuffita reddit. Quā de cauſa ſerpentes fugat, & muſcas interficit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 25. ca. 7.

LYſimachio, & LYſimachios, & LYſimachia uocant. Inuenit hæc LYſimachus. Folia eius uiridia, ramuli erecti, odore graui, ſlos purpureus, fruticoſuſq; ut Plinius uerbis utar. Vis huius herbe

tata, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat, Patavij demonstrata nobis est.

De Sanguinaria, seu Polygono.

CAP. V.

Polygonum Arrhen, aliqui Polygonatum appellant, alij Cynochalam, alij Heraciam, alij Asphalton, alij Chiliophyllon, alij Clema, alij Polycarpon, alij Carcinethron, alij Teuthalida, alij Myrtopetalon, alij Cnopodion, alij Zariheam, alij Pedalion, Aegyptij Telphin, aliqui Stemphin, Magi Genituram herois, aliqui Vinguem muris, Latini Sanguinariam, aut Seminalem, Aphri Chulum. Ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt. Folia Rutæ, sed molliora, planioraq;. Semine sub omnibus folijs turgescente. Vnde marem appellari uolunt. Flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare, ac refrigerare. Prodest cruentæ excreati oni, cholerae, alui fluxionibus, & urinæ stillicidio. Vrinam aperte ciet. Cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febribus per horam ante significationes. Foeminarum profluuia impositu sistit. Idem succus purulentis auribus instillatur. Facit eximie ad genitalium ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus uulneribus folia illinuntur.

BARBARI COROLL.

Polygonon, & Caligonon appellatū uidetur a multitudine seminis, propterea Seminalis in latino dicit: quæ & Sanguinalis, & Sanguinaria uocatur. Alij a densitate fruticis, alij a frequentia geniculorum arbitrantur. Quidam & Halmada noiant. Inueniunt, qui foeminam esse hanc contendant, mare aut maiorem, minusque nigrum, & geniculis densiorem. Herbarij nullam magis aridam, quam Polygonon feruat. Dioscorides Polygonon quibusdam locis uocari tradit Pedaliū. Plautus quidem ita in Gurgulione appellat odoratæ genus herbæ.

Tu Rosa, tu Crocus, & Casia es, tu Pedalium.

Aut certe unguetū nomen est in ea fabula Pedalion. Forasse uero non Pedaliū, sed Bdelliū in poetam eo legeris. Polygonon Aetius & Heliodorus, hoc est, solis herbam dici meminit, uulgo Centinodia, & Corrigiola. Proserpinacā in Plinio, sunt qui Polygonon accipiant, dicente uulgarē herbam esse Proserpinacā, eximij aduersus scorpiones remedium, & lassitudinē, si linguae subijciatur: si deuoret, uomitionē sequi salutarē, ut corrupte legat in Diosc. hoc loco, stopinaca pro Scorpinaca, siue Proserpinaca: quādo utrūque nomen Polygonon tributū uideas in eo libro, qui. L. Apuleij fuisse credit a multis. Illud mirari subit, quod Plinius eodē capi. Proserpinacā, & Polygonon, quasi diuersas herbas demonstrat, & utrūque ad anginas commendat, 27. uolumine.

EX M. VERG. COMM.

Sanguinariam Plinius Sanguinalem, Columella græcam Polygonon uocant: ille. 27. uolumine capite. 12. hic libro. 7. capite. 10. Nec fuit Romanis scriptoribus alia nominis ratio, quam ex ui & usu eius, qui sentientes sanguinē exspuentibus, cruentisque intestinorum torminibus eam mederi, ex meliore hac potestate nomen illi fecerunt. Græci contra, a seminis copia, uel geniculorum, quos habet frequentia, cognosci eam uoluerunt. Vtrumque enim Polygoni uox significare potest. Siquidem genti illi gonos, genitura, & semen: gony uero genu, & diminutiuum forma geniculus est.

De Sanguinaria Foemina.

CAP. VI.

Sanguinaria Foemina fruticat uno caule, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis, tuberibus articulorum eminulis, torulisque cingentibus. Folijs Piceæ. Radicis nullus usus. Nascitur in

N. in

C scitur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandique natura, ad eadem ualens, sed inefficacior.

B A R B A R I C O R O L L.

Polygoni quatuor genera Plinius existimat, Marem, & Fœminam, Tertium Oreum, hoc est, montanum, quod & describit eadem forma, qua Dioscorides hic Fœminā. Quartū genus Polygonaton priuatim appellatur: de quo protinus indicandum nobis est.

E X M. V E R G. C O M M.

Quotquot hætenus uidere Dioscoridis græcos codices licuit, in extrema capitis huius parte eodem intellectu, & hisdem uerbis ostendunt, fœminam Sanguinalem herbam in cunctis mascula minus efficacem, & ignauiolem esse. Plinius etiā eodem libro & capite, historiam, & medicinā eius tractās, inefficacius quā superiora (plura enim Polygoni genera ille sece- rat) hoc genus esse ait. Solus Paulus Aegineta in. 6. Polygoni uires numerās, contra & his uer- bis decreuit. τὸ δὲ τοῦ ἴσχυος ἰσχυρότερον, quod est, Fœmina autē mascula ualidior, & effica- cior est. Quo fit, ut oporteat, quemadmodū & Plinius indicat, credere diuersas ex sexu Polygo- ni notas omnibus locis, & gentibus non fuisse easdem, sed uariatis appellationibus, quæ græ- cis uerbi causa mascula Sanguinalis erat, latinis Fœmina esset: sicque ediuerso, Plinius, cuius ara- te uaga hæc nomina, etiā erant uerba, hac in primo genere sunt. Qui plura genera Polygoni fa- ciunt, hanc Marem intelligi uolunt. Idque Dioscoridi cōuenit. Mox paulo post. Necnon inueni- untur, qui hanc Fœminā esse dicāt: quod Paulō Aeginetæ cōuenit, qui Fœminā potentiolem mascula dicens, sexus notam hanc, ex aliorum indicatione tradidisse uideri debet. Eamque ob- causam, nihil in huiusmodi, nisi factō prius periculo, certū constitui modo potest: tam mul- tis locis & gentibus res aliquando, nomina autem semper uariant.

De Polygonato.

CAP. VII.

πολυγόνατον

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs Lauri, latioribus, & lauioribus, sapore mali Coronei, aut Punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorū exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incæpta a radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ uulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 12.

Polygonaton Diosc. montanū Polygonon, syluestre Plinius intelligit, etiāsi descriptio for- tasse dissonat in plerisque. Arbores inqt pene mō fruticat radice lignosa, stirpe Cedri rubicundo, ramis Sparti, binū palmorū, nigris, geniculorū ternis, quaternisque articulis, odore quodā, siue gustu fastidiēdo: quæ ne explicari quidē recte possit, ut Paulus Aegineta scribit, & eo prior Gale.

E X M. V E R G. C O M M.

Inter Polygoni genera, quæ a Plinio plura ex aliquorū historia numerantur, Polygonatos hæc referit. Nobis tamē toto genere differre hæc ab illa uidet. Iacet enim (quod præcipuū inter eas discrimē sit) & graminis modo per terrā spargitur Polygonus: Polygonatos autē cubitali, & fere semper proceriore caule erigit. Vidimus nos, quinto, & sexto deinceps foliorū ordine ad eam altitudinē surgentē: quæ a radice statim exiguis interuallis, per caulē usque ad summū uire- bant laurinīs, ut hic ait, similia. Flores ipsi non uidimus. Iampridem enim Augusto mense desce- ruerat herba, quæ nobis prolata est. Nulloque magis indicio, quā radice Polygonatum se ostende- bat: quæ longitudine pedali, colore albescente, frequentioribusque, quā in gramine geniculis tur- gebat. Utque cōiungere licuit, nihil Polygono congenerē multis hanc fecit, quā geniculorum par- similisque in utraque frequentia. Verumtamen, ut paulo ante dictum a nobis est, exceptis his, di- uersa in Polygonato, & alia a Polygono cætera nobis uisa sunt.

De Clematide.

CAP. VIII.

κλεματίς

Clematis Græcis, alijs Phyleterion, ab alijs Daphnoides, ab alijs Smyrnoides, aut Polygonoides appellatur. Læto, pinguique solo

prouenit, iuncos spargens exiguos. Folia Lauri figura & colore, multo minora. Folia cum caulibus in uino pota, alui profluuiâ, & dysenterias sedant. Subdita in pefso, cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulue medentur. Dolores dentium commanducata finit. Imposita serpentium morfibz, iuuamentum prestat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur solo inculto.

B A R B A R I C O R O L L.

Clematis hæc, siue Clematidis Aegyptia cognominatur, quoniam Aegyptus hanc maxime gignat, prælonga, tenuisq; in prouerbio usq; cessit, *ἡ ἀμαρτία ἀγυμνία*. ita nominâdo eos, qui procero & nigro sunt corpore: ut est apud Phalereum Demetrium.

Pli. li. 24. ca. 17.

De altera Clematide.

CAP. IX.

Est & altera Clematis, quam aliqui Epigetin, Aegyptij Philacrion, Romani Ambuxum uocitant. Viticulos emittit rubescentes, lentos. Folium gustu admodum acre, ac exulcerans. Repit per arbores, ut Smilax. Semen tritum, pituitam bilemq; detrahit, in aqua, aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum Lepidiodio conditur ad cibos.

B A R B A R I C O R O L L.

Clematis secunda, siue Clematidis, Smilaci, hoc est, Hederæ Ciliciæ similis effingit, genicula & ipsa, repensq; per arbores. Hanc, aut non dissimilem (ut puto) Plinius est ubi Echiten, & Laginen uocant, & tenuem Scamoneam: quia pedales, foliosos, non dissimiles Scamoneæ ramos habeat, nisi q; minora, nigrioraq; sunt folia. Inuenit in uineis, aruisq;: parat cibis, ut olus cum oleo & sale. Sic hic frutex, qui Conuoluulus a nostris dicitur, cuius flos Lilij rudioris figurâ prebet, ob id & Liliastri quoq; nomē habens: & uulgo etiâ Ligustri (q; Ligustrum proprie cyprius est) aestimatur iudicent. Nam & foliū ei pinnatū est, ut Scamoneæ, nec Smilaci dissimile, Volubilis maioris noīe. Semē nigrū, triangulū, in folliculis acinorū specie, qui numero tres habent, in uinetis, aruisq;. De hoc Plinij uerba subiicimus. Est inq; flos, nō dissimilis Lilio, in herba quā Conuoluulus uocat, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorē tantū referēs, & ueluti rudimentū naturæ Lilia facere condiscētis. Inuenio qui Periclymenon uocent Conuoluulus, atq; ita pīctam in Græcis codicibus uidi. Sed uera Periclymenon alia est, ut post liquebit. Habetur & Clematis tertia, Centunculus a nostris appellata, rostratis folijs, ad similitudinē capitū penularū, iacens in aruis. Dioscorides & Gnaphalion herbam, Centunculū a latinis dici meminit: q; non habeo compertū, eadē sit, an diuersa Gnaphalion, a tertia Clematide, quādoquidē & medicinæ congruunt: & apud nos utraq; Centūculi nomē habet. Sciendū Galenoteste, Dioscoridē hoc loco de prima tantū Clematide locutū: quæ non simpliciter Clematidis, sed Clematidis Daphnoides, aut Myrsinoides, aut Polygomoides appellada esse uideatur. De secunda uero Clematide, quā & absolute Clematidin uocari tradit, in quarti huius libri fine scriptū esse, non hic existimat. Addidere tamē librarij utroq; loco eam, quod & in alijs herbis fecere. Pamphilus duas Clematides in unū confudit. A Galenoq; ob id incessit iure. Idem uidetur & Plinius fecisse, medicinas aliquot prioris, secundæ tribuendo.

B

*

Pli. li. 27. ca. 12.
24. cap. 10.

VERG.

Fuisse quondam plures Clematidas, Plinius manifeste. 24. uolumine capite. 17. indicat. Sed exceptis duabus his, nō ueras fuisse Clematidas alias, sed sola uiticularū rōne hoc nomen uenisse, testes in græcis, hic scriptor primū, qui nullam aliam in medica materia stirpem hoc nomine describit: mox Paulus Aegineta lib. 6. his uerbis utraq; describens. Clematis, quā alij Daphnoides, alij Myrsinoides uocant, uiticulā habet longam crassitudine iunci, quem Oloschænum dicunt: folium uero Lauri. &c. Altera autē quæ arboribus Smilacis Hederæ modo aduoluitur. &c. Fuerunt qui posteriorem hanc Conuoluulum crederent. Cuius flores Lilia candore, & amplitudine æmulantes, certare cum nobilissimo flore uoluisse uidentur: quos etiam Plinius aliquando dixit Rudimentum naturæ esse, Lilia facere condiscētis, ubiq; & omnibus notissimos. Verum ex huius historia, in qua rubentes uiticulæ illi assignantur, Conuoluulo conuenire non uidetur. Tacuisse præterea de floribus, qui tam egregia specie in Conuoluulo

C florent, aliam ab illo Clematida esse arguit. Nobis inclinatur animus Smilaci congenerem Clematidem hanc esse. Non tamen pro comperto hoc decernimus. Quod autem hic ait, uocari Epigetida, humilem terrestremque significat, facta a terra, quam Græci γῆν uocant, nomine: quasi terraneam dicas, quoniam scilicet nisi alias scandat stirpes, per terram spargitur.

Πολιμαίνιον
Φιλετηρίον

De Polemonia.

CAP. X.

Polemoniam alij Phyletariam, Cappadoces Chiliodynamin appellant. Ramis exilibus, in uersus utrinque digestis. Folijs paulo quæ Rutæ maioribus, ac longioribus, Calaminthæ, aut Sanguinariæ proximis. Quibus in summis corymbi dependent, nigro semine. Radice cubitali, albicante, radiculæ simili. Nascitur in montosis & asperis. Bibitur in uino radix contra serpentes & dysenteriam. Et ex aqua aduersus urinæ difficultatem & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere relinens. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum qui radicem gestauerit, a scorpione non feriri, eumque si ictus sit, nihil molesti passurum, Dentium dolorem mansa mitigat.

Pli. li. 25. ca. 6.

BARBARI COROLL.

Polemonium, siue Polemoniā, alij Philetariam, a certamine regum inuentionis appellant. Radice crassa, nigro semine. In Plinio & Melemonii uocari herbam quandam inuenias, uomituris utilem; tamen haud certus sum, ecquid corrupta sit in ea uoce lectio.

EX M. VERG. COMM.

Officiosa certe uoluntas non deest, urgetque in Polemonia hac, ut monemus legētes. Quæ hic, & Plinius dixerūt in Cappadocia a multitudine uirium χιλιόδυναμιν, quod est, mille uires habentem uocari, in antiquissimis Græcorum & Latinorum scriptoris huius codicum, qui mihi sunt, non Chiliodynamin, sed Chelidonium manifeste legi. Non cōuellenda tamen ob id duorum scriptorum tam certa auctoritas & fides. Ob eam causam & nos ex cōmuni lectione uocem uertimus. Illud contra in dubio est, dissidentque Dioscorides & Plinius in radicis historia. Hic ait πηχάριον esse, quod est, cubitalem; Plinius, 25. uolumine capite, 6. Polemoniā describens ait, Cappadoces Chiliodynamin uocant, radice crassa: quasi non πηχάριον, sed παχάριον legerit. Nos neque in græcis, neque in latinis aliter quæ cubitalem legimus. Plinius tamē uel sic forte per sua sus, uel uocis uiciniate deceptus, pro cubitali, crassam reddidit. Nisi forte, quod hic ait, Lanariæ herbæ radici similem ad crassitudinē ille rettulit. Diximus id, quoniam non parui refert, in deprehendenda Polemonia, cubitalem, aut crassam radicem obseruasse.

Σμψυτον

De Alo.

CAP. XI.

Symphyton petræon, id est Alus, nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, Origano similibus, capitulis Thymi, surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens. Longa radice, subrussa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsæ, & potum, pulmonis uitia purgat. Sanguinem reijicientibus, & renum malis ex aqua datur. Ad dysenteriam, rubraque sceminarum profluvia in uino decoctum. Ad conuulsa uero & rupta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commanducatum situm sedat. Faucibus asperis subuenit. Vulnere recentia, enterocelascque conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum Symphyto decoctæ cōalescunt.

Pli. li. 27. ca. 6.

BARBARI COROLL.

Symphyton Petræum, nos Alum gallice uocamus, folijs paruis, ramis tribus, aut quatuor a radice. Nascitur in petris, ideoque Petræum cognominant. Symphyto autem Græci nomen imposuere, quoniam consolidet. Hanc Veneti Coroneam appellant, ut inquit Plinius, Rosæ radicis, alibi albæ, alibi nigræ.

Quæ est constipandi, consolidandiq; egregia utriq; Symphyto uis, nomen illi in græcis id fecit. In posterioribus autē latinis inconcinne quidem, sed aperta significatione Consolidam uocari eandem persuasit. Et quoniam duo saltem genera eius sunt. Alterum, de quo nunc agimus, quoniā in petris nascitur, Petræum antiquitas nominauit. Alterum uero simpliciter Symphyton, lactant tamē præter hæc nostræ ætatis herbarij plura alia Consolidæ genera se inuenisse, quæ medicis, & illis censenda relinquimus. Dioscoridem enim latinū facimus, non omniū aliorū dicta & decreta cōaceruamus: præsertim duo, & hæc tantū gēna Symphyti tractante etiā Paulo Aegineta, qui habere hoc Symphyton ait aliquid, qd incidat, ideoq; purget, quæ in pectore & pulmonibus purulēta concreuerūt: habere etiā aliquid qd adstringat, quæ ui sanguinis excreationibus medeatur: habere humiditatē, quæ sitim arceat: discutere præterea, constipareq; corpora: & ne longiores simus, ex contrarijs aliquibus uiribus constare.

De altero Symphyto.

CAP. XII.

Est & aliud Symphyton, quod aliqui Pecton, Romani Soldagium nem uocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, inanem, quasi fungosum: circa quem breui interuallante spacio, folia exeunt angusta, linguæ Bubulæ proxima, oblonga, hirsuta, caule secūdum angulos quosdam striato. Folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus. In quibus flores lutei, rutaceis similes, & uerbasci femina emicant. Tam catulis q̃ folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritum concitant. Radices demittuntur foris nigræ, intus candidæ, uiscosæ. Quarum est usus. Tritæ et potæ, cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia uulnera illitæ conglutinant. Carnes quoq; si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus, præsertim sedis, cum Sectionis folijs, utiliter illinuntur.

BARBARI COROLL.

Hoc Galenus Symphyton mega, id est, magnum cognominat, nec gustu dulce, nec odoratum, ut superius. Herbarij recentiores tria Symphyti, seu Consolidæ genera constituunt, præter Petræum: quod ne cognoscunt quidem. Magnum, de quo hic agitur. Minus, sed radice intus & foris alba, fere bulbi effigie rotunda. Minimum, florē in spicam purpureo, ac folio quidem Origani, ut Petræum, sed in humidis genitum, radice lignosa, superuacua, nec odorata, nec dulci. nec saluam ciente: quæ sunt in Petræo omnia.

De Holosteio.

CAP. XIII.

Holosteon quadrantalīs hærbuscula est, humi repens, folijs uitticulisq; Coronopæ, aut Gramini proximis, gustu adstringentibus. Radice alba, prætenui usq; in capillamentī speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad rupta in uino posita. Nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

BARBARI COROLL.

Holosteū sine duricia est herba, etiā si ab osse nomē habuit, per antistrophen uidelicet, hoc est, ex aduerso a Græcis appellata, sicut Fel dulce, folijs angustis. Nascit in collibus terrenis.

EX M. VERG. COMM.

Ex aduerso græcis Holosteon herba hæc dicta est. Toto corpore em̃ & undiq; ossēam uox illa significat: cum tamē tenerior, & fragilior ea sit, longeque ab ossium duricie discesserit. Quærendum in ea, quo nam modo trium, aut quatuor digitorum altitudine eam hic dicat a terra extolli: & an digitos per longitudinem continuatos, an ut in antiquorum palmo erant, per crassitudinē coniunctos, & sibi suppositos indicet? Nobis in posteriorē hanc partē inclinat animus. Nā quatuor digitorū per longitudinē mēsurā, alijs poterat, et debuerat uocibus indicari.

C

¶ De Stoebe.

CAP. XIII.

50169

Stoebe, quam alij Tobion, Romani Stipam uocant. Vulgaris est noticiæ. Cuius semen & folia stringunt. Quapropter decoctum dysentericis infunditur. Auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia, oculis ab ictu cruentis profunt. Erupentis sanguinis impetus cohibent.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 15.
lib. 22. cap. 11.
Theoph. li. 1.
& 6. plant.
Strabo. li. 16.

Stoeben Theophrastus & Plinius Phleon quoque dici tradidere. Pollux Phlun, cuius lanugine mulieres ad lixiuū utantur. Molle inquit Theophrastus, & plantaceum est Phleon, colore subrubido. Meminit & Aristoteles, sed a Theodoro Flauertur. Fœminā in eo accipi, quæ sit sterilis, & ad nexus utilis. Vnde Phœinas uestes in Herodoto q̄s legat & Pausania, quibus aues in Arabia Stymphalides, ut uisco ceteræ capiant: cum alia materia nō resistat earū rostris. Nam et in Aethiopia Arabiæ aduersa nasci Phleon testis est Strabo, flumine præsertim, quod Cinnamo semina determinat. Orchomenio lacu numerosum id haberi: a quo & nomen Phleos: etenim Græci φλεών, pro eo quod est fecundū esse capiunt. Hinc & Bacchū ueteres Phleona cognominabant, auctor Helianus. Partem huius herbarū teneram ab radice, pueris in cibo gratam esse. Radicem ipsam pecudum pabulo uelli copiosam, nec in profundum actam, folio & caule aculeatis. Stipam a latinis dici auctor est Dioscorides. Illud notauerim, si Stoebe idem sit quod Phleos, errare qui Stoebam pro ea herba capiunt, quæ uulgo Scabiosa dicitur, folio Erucæ hirsuto: non tamen aculeis horrente, cerulei floris, ex qua & scopæ fiunt. Sit autem Scabiosa, quæ ab Aetio Psora dicitur, cuius usitæ fumo arborum Erucæ moriantur, non habeo commentum. Photion lini genus tradit, Stypion uocatum. Alioquin Stypos inquit Piceæ caudæ est, itemque prædurum & solidum lignū quodcunque. Interdum & humilis stipes ita dicitur potis. Est & Stybion & Stybe, de qua diximus in Hyppophæe. Nam Stion calculus est marinus Hippocrati. Festus linum impositum, Dorice stupam dici meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

D

Phleon duobus locis uocari a quibusdam Stœben hanc Plinius testatus est: primum, uolumine capite. 15. his uerbis. Quædam in folio habent, & in caule, ut Phleos, quam aliqui Stœbem appellauere. Mox iterum uigesimo secundo uolumine capite undecimo. Stœbe, quam aliqui Phleon uocant. Videruntque nobis Theophrastum ubique appellare. Is enim inter aculeatas Phleon. 6. de plantarum historia numerat, & inter eas quæ folia secundum spinas proferunt: quales in palustribus Tribulus, & in arida Ononis est. Et Stœben libro primo de plantarum historia inter fruticosas, & quæ carnosum folium habent.

¶ De Volucro.

CAP. XV.

50170

Græci Clymenon uocant, alij Calycanthemon, alij Peryclymenon, alij Helyophyes, nonnulli Hepatitin, alij Milacem, alij Anatolicon, alij Dyticon, alij Merginem, Latini Volucrum, aliqui Volucrum maius. Aegyptij Oxioni. Clymenion, quod & Agonon, id est, sterile nuncupant, caulem fert fabæ, quadratum, folia Plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, Iridi, & poliporum Cirris non ab similibus. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones in potu efficax est. Cœliacos, rubraque fœminarum profluvia, refrigerando infrenat. Sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut siliquæ recentibus uulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 12.
Theoph. li. 9.

Clymenos appellata a rege dicitur, describi aliter a nostris, quæ a Græcis Plinius affirmat, hoc est, Hederæ folijs ramosam, caule inani, articulis præinctam, odore graui & semine Hederæ, syluestribus montosisque nascentem. Sterilescere pota ea etiam uiros, sextario eius in triginta dies diuiso, Theophrastus auctor est. Quod quidem Dioscorides Periclymeno uocatæ tri-

buit. Nam & descriptio nostrorum de Clymeno quā prætexit: Periclymeno fere conuenit.

EX M. VERG. COMM.

Regiae dignitatis herba Clymenos est, & ab inuatore rege sic appellata: non aliter quā & plerumque aliae a Dioscoridis, haecenus, & a Plinio diuersis locis ex antiquorum historia descriptae fuerunt. Eam pluribus indicauerunt ueteres appellationibus: inter quas ex plantae ipsius natura, notis, & antiquorum in ea observationibus factae aliquae sunt. Qualis Calycanthemos est, significat enim, quae in Calyce floreat. Dixerunt autem in floribus antiqui Calyces, in uolucra illa quae in Rosis sunt, quibus dehiscuntibus in sua folia se flores pandunt. In Clymeno autem haec calyces folliculos eos intelligebat, de quibus hic paulo post egit; Periclymenos uero, confuso mixtoque ob similitudinem cum ea quae sequitur nomine.

De Periclymeno. CAP. XVI.

Periclymenon aliqui Aeginam, alij Cylmenon, alij Carpathon, alij Splenion, alij Epetitin, alij Axinam maiorem, nonnulli Clematitin, alij Myrcinen, alij Calycanthemō, Magi Polion Veneris, Aegyptij Turcon, Romani Volucrum maius, Aphri Lanath appellant. Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea. Inter folia surculi exeunt, in quibus baccae, Hederæ similes. Flos fabae, candidus, aliquantum rotundus, et quasi in folium procumbens, semen durum, & quod difficile euellatur. Radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis propter affidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatur, drachmae pondere dat in uino quadragenis diebus, ut lienem absumat, ac molestiam discutiat. Sed urinam ciet, statim a sexto die cruentam. Orthopnoeae, & singultui prodest. Partum accelerat. Folia sunt eisdem uiribus praedita. Quae tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur. Perunctis ex oleo febrium rigores abigunt.

BARBARICOROLL.

De Periclymeno dictum est in Clymeno. Nunc Caprifolium, & Matersylua dicitur uulgo: quoniam Dioscorides Matremsyluam pro Hederæ capit, cui Periclymenon simile est.

De Tribulo. CAP. XVII.

Tribulus aliquibus Bucephalus, alijs Tauroceros, Romanis Tribulus aquaticus dicitur. Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem Portulacae, tenuioribus uiticulis, in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, praeduris. Iuxta amnes & domicilia nascitur. Est & alterum genus aquis familiare, quod in fluminibus natum comae exerit, aculeos comedes. Folijs latis & pediculo longo. Caule parte summa quae ima crassiori. Capillamenta quaedam indidem exorta spicant. Semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est naturae. Ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasque per sanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris Tribuli pota, illitaue, ictos a uisera recreat. Contra uenena cum uino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum, pulices necat. Thraces, qui ad Strymona amnem habitant, uirenti Tribulo equiscat.

C faginant, & e dulci semine & esculento panem quo uescuntur faciūt.
BARBARI COROLL.
 Tribulus, siue Tribulum, in segetibus madidis & palustribus nascitur, non excedente qui-
 na fere cubita, gurgitum altitudine, ut in Strymone amne. Capillamenta in eo quaedam inter
 se contraria, eo breuiora, quo propius ad radicem sunt, adeo, ut in ea quasi desinant, ac pro-
 cumbar, a lateribus terna & quaterna germina: ut amplissimum sit quod minus ab radice di-
 stat, et reliqua pro suo cuiusque numero. Exit a parente soboles, omnino similis folio, fructuque,
 sed gracilior. Semē nigrum, prædurum: quo cadente, ipsum se propagat. Folium habet secundū
 spinā. In semine quoque gerit aculeus. Radicē eius alij annuā, alij diuturniorē esse putāt. Duo gñā
 eius. Vni Cicerculæ folium: alteri aculeatū. Vere germinant, ferius tū: cui in folio aculei: ma-
 gisque hoc septa uillarum obsidet. Semen habēs rotundius, et nigrū in siliqua: qd alreri, hoc est,
 præcoci arenaceum & Sesamæ figura cernitur. Nihil Cicere infestius Tribulo est. Nascit & in
 hortis Tribulus. Dira res alibi, sed iuxta Nilum & Strymonē amnes, in cibos recipit. Panis ex
 eo fit prædulcis, & comprimens uentrem. Hippocrates genus Tribuli Parathalassion, hoc est,
 maritimum appellat, idem cum terrestri: quod & minus est aquatico. Ex aquatico sane panes
 fiunt: ob id & Ferrariensem Castaneam, Gallia padana Tribulum uocat.

Pli. li. 15. ca. 17
 lib. 21. cap. 16.

σαρξίφαγον

De Sarxiphago. CAP. XVIII.
Sarxiphagon, alij Sarxiphragon, alij Empetron, Romani Saxi-
 fragiam uocat. Frutex est furculosus, in petris & asperis locis na-
 scens. Coctus in uino, mox potus, febricitantibus opitulatur. Strangu-
 riæ prodest. Singultum sedat. Calculos uesciæ frangit, & urinam ciet.

Pli. li. 27. ca. 9.

BARBARI COROLL.
Axisfragum, et Saxifraga latine dicitur, item Calcifraga (si modo hæc est) quam et Plinius et
 Dioscorides alio loco Empetron appellant, Paulus Sarxiphages. Empetrū inquit Plinius, fere
 in saxo nascitur. Recentiores uires sunt. Verustate perdit eas. Lapillos qui sufferuescant, una rumpi
 affirmant. Habetur & Saxifragi genus alterum, in Adianto nobis explicandum. Corrosi &
 ambusti sunt hac parte Græci codices, nec quale sit huius herbæ folium animaduerti ullo mō
 potest: et in ipso uerborum textu, spaciolum inane uacat. Porro ueterem in Dioscoride picturā
 huius herbæ uidī, non plus folijs, q̃ Cirris minutis, per ramos ex intervallo conditis, nec fre-
 quentibus: in cacumine furculorum flocci ceu arentes potius q̃ flosculi, subrubida radice, nec candi-
 da: flosculis quoque candidis. Recentioribus de hac herba parum conuenit. Alij Tricici foliorū si-
 gurā, alij marinæ Bati similem dixere, alij Tormentillæ uulgo dictæ. Est autē (ut uolunt) Tormē-
 tilla, Quinquifolio herbæ similis, nisi q̃ septem fere habet folia, nō gnq̃. Quarti herbā, quæ flo-
 rem Caryophyllon uocatum ferat, de quo aliubi dictum est. Quinti Saxifragā eādem esse, aut
 proximam ei quæ Pimpinula, Pimpinella, & Bipēnula, & Sanguisorba ruri dicitur: qm̃ uul-
 neribus iniecta ferrū & spicula facile ac citra sensum doloris exigar. Folio paruo, orbiculato, &
 extremitatibus serrato: qd et mandī soleat, paratū oleo, sale, aceto, furculis ab eadē radice pluri-
 mis atq̃ densis, rubentibus cū radice, ut ferunt. Quibusdam locis uermiculus eruit, q̃ curatus,
 sericis præcipue tingendis, Purpuram facit incomparabilem, cæteros colōres splendore quodā
 & hilaritate superans. Inuentus, ut alia quoque multa casu, excrementis gallinaceorū, ita colora-
 tis. Nam & usus Purpuræ, ut est apud Iuliu Pollucem, ab Hercule uidet institutus, cōspecto ca-
 nis rostro, qui purpuram deuorasset, infecto. Igit Purpurissum, ex hoc uermiculo Carbasintū a
 præstanti amphitheatralium uelorum (ut arbitror) colore dicitur. Quidā Carmasintū appellat
 colorem, qm̃ uermiculus is, punica lingua Carmes appelletur, quemadmodū & Coccus. Po-
 test & ab urbe Charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse color is, quod lanas inficere Sardi-
 bus ceptū sit, ut inquit Plinius. Nā Carbatinis in Aristotelis secūdo de animalibus uolumine le-
 gendum, non carbasinis est. Sunt autē Carbatinæ, quas Catullus Carpatinas crepidas uocat,
 calciamenti genus e Caria translatum, quod hodieque uulgo sic uocatur, detractis utique postero-
 ribus syllabis, & s, litera principio adiecta, ut assolet. Nam et Carpisculus calciamentū genus est,
 ut Flauius Vopiscus ait, in Aureliani Cæsaris uita. Quidam tamen Carbasa etiamnum uocat
 boum coria: quæ Cæsar Alutas appellauit. nam, ut Suidas scribit, ubi defecissent calcei, Carba-
 tinis utebantur, ex crudis boum tergoribus recens detractis, ut illud Virgilianum.
 Vestigia nuda sinistra,

Instituere pedis, crudus tegit altera pero.

De hoc uermiculo, nihil apud ueteres inuenias. Nam Sandix indica, de qua in Aureliani Celsi ris uita legi, preciosas Purpuras fecisse, aliud tincturæ genus puto. Hieronymus in sacris literis, uermiculū, & uermiculatas uestes nominat: granū (ut opinor) Aquifoliæ significans: qd̄ autore Plinio quibusdā locis uermiculi similitudine conspicitur. Hinc deriuatum arbitror, ut Cocci nea uestis, Scoletidata, hoc est, uermiculata uulgo dicere, siue quasi q̄sq̄uilata (etenim granū Cocci, etiam Quisquiliū uocatur Plinio) a Quisquilijs opinor. Sunt em̄ Quisquilijs, ut Festus ait, quicqd̄ ex arboribus minutū cadit. De uermiculo purpureo, Democritus q̄q̄ meminit tincturis utili, sed e purpuris, ac murice, ut cōiunctio. Nam et de uermiculo Galatijs, hoc est, iligno*meminit. Pampinulę similis est, folio tantū minore, ac magis serrato & lentiussculo, quā nostri herbarij Eufragiā appellāt, minus fruticosa, flore luteolo, præcipue claritatis ad oīa uitia oculorū: ueteribus incomperam existimant: quemadmodum & illam, quæ Cartosilago dicitur a uulnerarijs. Nos Ceratophylacen uocandam putamus: quia partem oculorum Ceratoiden, hoc est, corneam defendat, salutiq̄ percussam restituat, folijs Seriphij, uel potius Roris marini, aut Lini quoq̄, capitulis arentibus, cirris subluteis.

De Limonio. CAP. XIX.

Limonion aliquibus Potamogiton appellatur, alijs Neuroides, alijs Lonchitis, alijs Rapionion, Mysijs Mendruta, Syris Meuris, alijs Lycosemphyllon, alijs Heleborosemata, alijs Scyllion, Magis lupi Cor, Romanis Viartum nigrum, quibusdā Titinabulum terræ, Gallis Iumbarum, Dacis Dacioa. Folia habet Betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura, caulem tenuem, rectum, ut in Lilio æqualem, seminibus scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura potu, dysentericis coeliacisq̄ prodest. Rubra foeminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

BARBARI COROLL.

Limonium Beta est syluestris, densioribus folijs. Aqua e radice cocta, maculas uestium, & membranarum eluit. Aliud genus est a Limonio Limania, ut in Scolymo notauimus. Limonium Aetius etiam Cynoglosson, hoc est, linguam canis uocari scribit.

EX M. VERG. COMM.

Syluestrem Betam Plinius, q̄ eius folio sit, uolumine. 10. capite. 8. Limoniam uocat. Numeratq̄ eam in Betarum censu non male, si palustrem potius, q̄ syluestrem a natalibus eius appellasset. Creditur idem a multis eandem hanc, quoniam in riguis & aquosis pratis nascitur, & ab eis nomen in græcis inuenit. 18. uolumine, cap. 6. pratensem herbam nominasse. Theophrastus in sexto de plantarum historia ad finem Limoniam gñe foeminino, inter Anemones genera descripsit syluestrem, & inter ea quæ tertium ordinem inter uernos flores antiqua ætate habuerūt. Nobis pro comperto non est, diuersum ne, an idem utriusq̄ genus sit. Hic enim floris Limonij huius non meminit. Neurodes Plinius uocari etiam Limonium ait: sed nulla ab alterutro dicta nominis eius causa est. Cur autem Potamogetona aliqui eam dicerent, in promptu causa est. Palustris enim planta, fluminibus uicina, qd̄ Potamogeton significat, merito dici potuit. Priuatim tū eo nomine alia quondā indicata est, hoc ipso uolumine declaranda. Ab Elleboro nomen illi etiam factū in græcis est, & a latinis Veratrum nigrum: qm̄ folio simile illi est Limonium: qd̄ in Elleboro describitur Plantaginis, aut syluestris Betæ. Quibus & hoc simillimū est, & eousq̄ æquale, ut palustris Beta Limonium dictum fuerit. Differunt in historia Limonij non leuiter scriptor hic, Pliniusq̄. Hic decem, et pluribus aliquando folijs in caule uirere dicit: ille undecim sæpe caulium herbam esse testatur. Quod peritiores uideant.

De Lagopo. CAP. XX.

LAgopus hæba, quam aliqui Leporis cuminum appellant, si sit aluum in uino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

D I O S C O R I D I S

C **BARBARI COROLL.**
Lagopus, quasi pes leporis dictus. Sane & similis est ei aspectu. Proinde haud probarim eorum sententiam, qui Caryophyllatam uulgo dictam rentur, in opacis montanis gigni solitam, non in segetibus, ut Lagopus. Hippocrates nominat & Lagopyron, quasi leporis tritum intelligas, furfuribus cum inaruit simillimam: folio paruo, quasi oleagineo, longiore tantu, cruentis uulneribus imponens. Hanc Galenus Leporariam inquit herbam esse.

EX M. VERG. COMM.
Discrepant grauissime in leporini Pedis herbae natalibus hic scriptor, & Plinius. Alter enim in segetibus, quae in latina manifestam ex Varrone significationem habent: alter in rariis agris nasci tradiderunt. Quae graecis sunt quadratae hortorum ad confectionem olerum dispositae areae. Nos graecorum lectionem secuti, qualem inuenimus uocem uertimus. Barbarus ex Plinio in segetibus nasci tradidit, magno inter segetes & hortorum areas discrimine. Qualis autem haec nascatur, non erit difficile leporino Padi similem Paniculam in ea obseruasse.

De Medio. CAP. XXI.
Medion aliqui Medicam appellant, alij Triphyllon, alij Clemathion, nonnulli Osmon, quidam Trigonon, alij Cybellion, alij Polyphyllon, Romani Trifolium odoratum, Aegyptij Epaphon. Medion in faxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis, caulē tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureū, rotundū, semine Cnici minuto, radicē dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quae trita, in farina, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum menstrua pellit.

BARBARI COROLL.
DMedion, Exemplaria sunt in quibus folia ei non Seridis, sed Iridis reddantur: Plinius quoque Iridis satiuæ scripsit. Sed cum satiuæ adiecerit, non de Iride, quam nemo legit satiuam esse, quando, ut inquit Theophrastus, Iris cultum nullum desiderat, sed de Seride uidetur intellexisse: cuius constat duo esse genera, satiuum, & syluestre.

EX M. VERG. COMM.
Discrepant in similitudine foliorum eius ueteres graeci. Alij enim Iridi, alij Seridi, quae Chorij genus est, secundo libro a nobis tractati, similia dicunt. Plinius quoque Iridis satiuæ dicens, scripsisse Seridis credi potest: quando satiuæ discrimen Seridi proprium sit: Iridis autem nescio an haecenus aliquando hic dixerit. Scimus quidem, syluestrem Iridem dici in plantarum censu, sed ea proprium habet Xyridis nomen, de qua mox dicetur. Nobis inclinatur animus, ut Seridis potius quam Iridis folio Medium esse opinemur.

De Epimedio. CAP. XXII.
Epimedium, ab alijs Erineos, ab alijs Tryas, a nonnullis Polyrrhizon, a Romanis Vindicta nominatur. Caulis est non magnus, Hederæ folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens. Radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mañas incrementum non sinunt. Radix conceptu adimit. Folia quinis drachmis, post menstruas purgationes quinque diebus in uino pota, praestant mulieribus ne concipiant.

EX M. VERG. COMM.
Auet quae Medio in plāta hac addita graecorum prepositio ἐπι est. Significat enim Epimedio, quod Medio accesserit. Id autem est foliorum magnitudo, quae in Medio satiuæ Seridis sunt, in hoc Fici. Ideoque Caprificum a quibusdam hic uocari eam tradit: & eadem significatione Thriada. ἐπίον enim graeci ficulneum folium uocant. Sunt tamen in quibus non ἐπίον per, i, sed ἐπιδιον per, v, legitur. Quod si recipiatur, tunc dictam intellexisse oportebit, a palustri planta, quam Thryon item graeci dicunt.

De Gladiola. CAP. XXIII.

A

Xiphion, aliqui Anaclorion, alij Phasganon, alij Machæronion, alij Arion uocant, Romani Gladiolam, quidam Genitalem. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatū, neruosumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant. Rotundo semine, radicibus geminis, una bulborum modo super alteram insidēte. Quarum inferior gracilis est, superna uberior. Nascitur in aruis. Pars superior radicis cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit. Panos cum loliij farina & hydromelite discutit. Qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiori radice ex uino pota, Venærem stimulari, & inferiore sumpta sterilefcere tradunt. Superiore quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

BARBARI COROLL.

Xiphion, a Theodoro dicitur Pugio. Florēt uere, cum Viola nigra. Falso plerique arbitrantur Xiphion eandem esse, quæ & Lonchitis. Sed illa in siccanis, hæc in humidis nascitur. Sunt & alia discrimina, quæ notari possint uolentibus. Habet hæc & radicem ad nucis auellanae similitudinem simbratam, quæ effodi ante menses oportet, & in umbra siccare. Videtur hæc & Phasganon, & Machæronion, hoc est, Ensis uocari radice, ut Theophrastus inquit, dulci, decocta, & commendata panificijs, si trita farinae admisceatur. Vnde Machæronij pastilli fortasse ortū habere, quos tertio Kalendas octobres uulgius editat. Item rotunda, & sine cortice capillata fibris, ut Gethyum. Scolopendry in herbā eam frequentes conueniunt. Est & compositionis cuiusdam in medicina uiridis nomen Machæron, ad morbos articulares, & Ischiada. Habet & Xiphias piscis, quem Gladiolū interpretantur, duo, ut inquit Aristoteles habēs rostra, sed dentibus carēs.

Pli. li. 25. ca. 11.

EX M. VERG COMM.

B

Hæc est Gladiolus illa, cultellato folio herba, cui a principio statim Iridis folia hic comparantur: princeps in hoc foliorum genere, & quæ prima huiusmodi similitudinis notam ceteris dederit: ideoque tot gladiolorum appellationibus diuersis locis indicata. Florere hanc uere cum Oenathe, nigra Viola, Helychryso, Limonia, Anemone, & Hyacintho Theoph. ait. Vocatque & ipse Xiphion, Plinius multis locis Gladiolum: quo tamen loco ex pfecto de ea agit, uolum. capite. u. Xiphion, & Phasganon græcis nominibus eam appellat. Nec de folio eius aliud tradit, quam cum primum ex terra prodit gladij ostendere speciem. Hic ultra addidit, Iridi simile esse, breuius tamen & angustius *ἡ τοῦ ἰσὸς μαχαίριον*. In quo uidendum est, an in mucronem desinens dicendum sit, an decurtati mucronis: quales cultelli aliquando in incidendi tamen usum fabricant. Vtrūque enim *ἡ τοῦ* significare ex diuersa propositionis eius ui potest: & quod *ἡ τοῦ ἰσὸς*. i. in acutum derafum est, & cui ex acumine suo ablatum aliquid fuerit: ut *ἡ τοῦ* Thucydides ait, & in græcis multa alia inueniuntur. Pro duabus deinde radicibus eius reuocanda legentibus in hunc locum erunt, quæ in Testiculis duabus plantis superiore uolumine dicta a nobis fuerunt. Nec aliter in Gladiolo hac duas inueniri radices, quam in bulbosis plerisque alijs, in quibus præteriti anni bulbis & radix inferior semper est: genitaque ex se alia cedit ipsa, donec tertio, aut quarto anno tota pereat. Auellanis Plinius eas comparauit: hic naturæ notas magis secutus, bulbos paruos uocauit. Discrepant in natalibus eius Dioscorides & Plinius magnopere. Hic in aruis, ille in Putridis: alter in genere *ἀπορραίων*, quæ qualia sunt superiore libro dictum a nobis est, posuit: alter in aquosis & palustribus. Potest tamen uterque quod uerū sit dixisse: nam possunt arua humida esse. Diosc. præterea in aruis maxime nasci dicēs, non negauit penitus posse etiā in aquosis nasci.

De Sparganio. CAP. XXIII.

Sparganion aliqui Xiphidion, alij Bolon uocant. Folia Gladiolæ, sed arctiora & in terram magis procumbentia. In summo caule pi-

σπαργάνιον

O ij

Culæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena radix cum uino datur.

EX M. VERG. COMM.

In decursu, & ueluti ad alia festinans Plinius, de Sparganio hac. 25. uolumine, capite. 9. egit: nihil ultra de ea testatus, q̄ aduersus serpentes bibi radicem eius quam Sparganion uocant, ex uino albo. Nec nos quod illi adijciamus aliud habemus, q̄ esse in græcis qui ἀπὸ τῶν σπργανίων dictam putent: q̄. f. folijs eius satis, & uilium modo lenis, pro fascijs his uterentur: quibus nutrices infantes suos uinciunt, quas græci σπργανία dicunt: & σπργανῶν uerbum, in infantum uinculis & fascijs his notissimum.

De syluestri Iride. CAP. XXV.

Euphr

XYris ab aliquibus Iris agria, ab alijs Cacos, a Romanis Gladiolus, aut Iris agrestis, a Dacis Caprus dicitur. Folia habet Iridis, latiora, & in turbinem mucronata, quorū medio caulis erumpit, crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triangulares depēdent. In quibus pureus flos, in medio puniceus. Semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubrum, acre. Radix longa, geniculata, ruffa. Contra capitis tuleria, fractaq; efficax est. Aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radices Centaurij, ac mellis quantitate. Tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias & alui profluuiā. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit, & cum aceto lienem absūmit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 21. ca. 20

D

XYris, & Xeris, aut XYrida, Galeno teste, dicitur. Scelus herbariorum quorundam aperit hoc loco Plinius, partem eius seruantium, & quarundam aliarum herbarum, & Platanis, & Iridis substituentiū, si parū mercedis tulisse arbitrat: rursusq; ut plus operis acquirant, partem eā quā seruauere, eodē loco infodit. Credo inq; ut uitia, quæ sanauerint, faciāt rebellare.

EX M. VERG. COMM.

Posteriores de syluestri hac Iride docuerunt, quod nos nunc non in agrū æstate discedentes, in sepibus uidimus: cultellato ut hic ait, folio inter uepres & saxa nascentem herbā, multo foliorū cespīte, acuminato mucrone, multo breuioribus q̄ Iridis, & ut hic ait latioribus: duobus tribusue, & aliquā quatuor caulibus, in quibus tument oblonga ueluti capitula: quæ suo tpe puniceo magis q̄ purpureo colore florēt: et cū defloruerūt, folliculos relinquētia lōgitudine digitali triquetros, in quibus tria, quatuorue semina ex oscillis suis pendent priuatim, nec aliē q̄ in Faba locis distincta: colore rubro cū maturuerūt: quæ nō sunt ipsa uere semina, sed latentium intra se seminum pericarpia & inuolucra: qualia licebit uolentibus quorannis obseruare. Saxosas fenes, & quasi macerías agrorū amat: luctaturq; inter saxa exiēs. Hos eius natales, & has plantas nos obseruauimus: poteruntq; alij ex his facillime cætera deprehendere.

De Anchusa. CAP. XXVI.

Euphr

ANCHUSAM aliqui Cantanchusam uocant, alij Libycam, alij Archibelion, alij Alcibiadion, alij Onophyllon, alij Porphyrida, alij Mydusam, alij Calyca. alij Noneā, Aphri Bunefath. Anchusa, quæ alio nomine Calyx, aut Onocliā appellatur, folia habet Lactucæ acuti folij similia, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquoersum humi sparfa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis. Quæ æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. Lato solo nascitur. Radix adstringit. Ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cæra efficax est.

Igni sacro cum polenta medetur. Lepris & uiriliginibus illinitur ex aceto. Partus extrahit, uulua indita. Eius decoctum renum uitijs, lieni & bile suffusus datur, & si febris sit, ex aqua mulsa. Siftunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentarij utuntur ad spissamenta.

B A R B A R I C O R O L L.

Anchusæ caulis, non ut aculeatarum multiserpens, sed stans. Funditur Papyri modo. Radix inficiendo ligno, cerisq; apta, præparans & lanas preciosis coloribus, Laodicea maxime. Vt Democrito placet, liquari non potest in aqua ad medicinas: oleo resoluitur: idq; synceræ expèrimentum est. Habetur & alia similis, Pseudanchusa, ob id appellata a quibusdam Enchusa, aut Doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior, & minus pinguis, tenuioribus folijs, & languidioribus, radice oleum non fundente, sed rubentem succum: & hoc ab Anchusâ disceritur. Anchusæ primum genus, Onoclea cognomen habet, & Chærospelethos in Paulo. Secundum Onochelos, siue Alcibiadios. Tertium pusilla, fereq; innominata. Quartum Lycopsos. Anchusam poetæ sunt, qui & Enchusam uocant: q̄q; Enchusa pro Pseudanchusa potius, q̄ pro Anchusâ capitur a nonnullis, ut prædixi. Hippocrates Anchusam uidetur intellexisse, cum Schelida nominauit, ut Galeno placet.

E X M. V E R G. C O M M.

Numerauit, coniunxitq; Anchusam Theophrastus libro octauo de plantarum historia Coronopodi, quam cornicis Pedem uocauimus: Chamamalo: & plerisq; alijs, quæ *ἡνικὸς* ille uocat, id est, folia per terram spargentia: quod hic ait *προκαταλασύνει τὴ γῆν*, quod est, per terram sparsa. Nicander, quod & ab hoc dicitur, Lactucæ similia ostendit. Verliculus eius est. *ἂν γὰρ ὅτ' ἄρχοις θριδακνιδία λάβο χάριν*. quod est, Lactucæ similia. Plinius inter aculeatas numerat, a cæteris in foliorum positura discrepans. Locus est. *ἢ. uolumine capite. 16.* Aculeatarum caules aliquarum per terram serpunt, ut eius quam Coronopon dicunt: & ex diuerso stans Anchusa. Stantem Anchusam dicit, quam Theophrastus *ἡνικὸς* uocauit. Nec refert, q̄ Plinius caules dixerit. in caulibus enim folia. Omnes postremo sanguinei coloris habere radicem testantur, non toto quidem anno, sed æstate tantum, quo tempore colorem illum natura in ea decernit. Ex qua tēporis nota, quod passim in cunctis græcis legebatur, *ἢ τῷ ἔρπυ γινώσκουσιν*, id est, æstate nascentem, ex antiquissimi codicis nostri fide *γινώσκουσιν* instaurauimus, & uertimus. Quod enim hic ait, eo pertinet, ut per æstatem tantum eo colore sit, tuncq; cognosci, & deprehendi tuto possit. Fuisse autem colorem ex Anchusæ huius radice in precio & honore quondam, nihilq; non eo colorare ueteres consueuisse, græci latinique passim omnes testantur. Pliniusq; quo diximus loco, Inficiendo ligno, cerisq; radice apta. Nec multo post. *21.* uolumine, cap. 20. Manus inficit sanguineo colore, lanasq; præparat preciosis coloribus. Hic ipse in rosaceo monuit unguentarios, ad bonitatem coloris Anchusam illi addere. Et ne longiores simus, nihil non Anchusæ radice sanguineo succo colorabatur. Eamq; ob causam insectis mihi scrupulus est, quod in extremo capite legitur, ad unguentorum spissationem, non ad hoc, sed ad colorem potuisse quondam pertinere. Rara hæc in alijs plantis coloris nota: eamq; ob causam diligentius in hac eruscanda. Nobis hætenus uidere eam non licuit, & præter antiquis dicta, nihil oculati testes addere illi possumus: eadem in tribus alijs eius generibus fortuna etiam utentes. Audiuimus tamen, in pascuis quæ ad Populoniæ amplissima sint, nasci herbam, quam gregibus suis noxiam pastores uident, omnibus ijs notis ab eis descripta, præsertimq; sanguineo radicum succo: sed nihil pro comperto nobis aliud de ea est.

De alia Anchusâ.

CAP. XXVII.

Est & alia quam aliqui Alcibiadios, aut Onochiles appellarunt. Hæc a priore distat, q̄ minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, florem purpureum, radices rubras, oblongas. Quæ multis sanguineum succum fundunt. In sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime Viperarum auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si quisquā mandens in serpentis os inspuat, eum necabit.

O iij

Pli. li. 21. ca. 6.
Theoph. li. 8.
plant.

B

D I O S C O R I D I S

C **A** NCHUSA Onochelos, alij Thexiam, & Archeuon, multi Enchryson: paruo frutice, radice præterq̃ messibus nigra: tunc enī sanguinea est, uiresq; habet. Folijs tritis, odor Cucumeris.

¶ De alia Anchusa. **CAP. XXVIII.**
E St & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum Hyssopo & Cardamomo pota, lassitas uentris tineas excutit.

EX M. VERG. COMM.
Q uatuor fuere antiquis Anchusæ. Tres dictæ hæcenus: & quæ statim sequit̃ cognomen Lycopsis: ceteri postremā hanc priuatim aliqui, & per se docuerint. Omnes cōmune aliquid, & in quo cōueniant habent, ideoq; cognomines: id autē maxime, rubēs radices suecus est: alioquin in medicina uires diuersæ & inæquales illis sunt. Siquidem quæ Onoclea dicitur, prima in earū censu, adstringentē, & subamarā habet radicē: ideoq; lienosis, & cū urina malo aliquo doloribus mederi dicta est. Eadem cū polentra, emplastri modo imposita, sacris ignibus accommodata credebatur. Eiusdem folia, q̃ minus q̃ radix refrigerat & siccant, cōtra fluores alui, q̃s diarrhiā uocant, quondā bibebant. Quæ uero Lycopsis dicta est, de qua mox ageť, maiore adstringendi uis q̃ illa, sacris ignibus magis accommodata erat. Quæ Onocleas, siue Alcibiadios dicit̃, maiore reliquis oibus in medendo uis uiperarū moribus in cibo, potuq; & alligata in usu erat. Quarta omniū aliarū breuior, sine nomine, maiore q̃ Alcibiadios illa amaritudinis pellendis uentris animalibus in usu fuit. Et hæc in antiquis græcorū medicis Anchusarum omniū decreta fuerunt, omnia ut uidetur ab hoc scriptore accepta.

¶ De Lycopsi. **CAP. XXIX.**
L YCOPSIS, quæ a nonnullis Anchusa uocatur, longioribus q̃ Lactuca constat folijs, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radices caput recidentibus. Caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus, flore paruo, purpureo. Radice rubra & adstringente. Nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita uulnerebus medetur, & cum farina hordeacea ignibus sacris. Sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

EX M. VERG. COMM.
P riuatim, seorsumq; a reliquis Anchusis Plinius de Lycopside hac uigesimo septimo uolumine, capite decimo egit. Nihil tamen illi tribuit, quod ab hoc scriptore acceptum non fuerit. Idem & Nicander in Theriacis suis fecit, post Anchusam Lycopsidem cum plerisq; alijs numerans. Antiquiores autē Græci Anchusæ congenerem fecerunt, secundamq; in eo censu numerabant, hic ultimā docuit: licetq; Anchusam esse non dicat, sed ab aliquibus uocari, hystoriae tamen ordo, & quæ illi tribuuntur notæ, Anchusis alijs congenerē merito faciunt.

¶ De Echio. **CAP. XXX.**
E Chion aliqui Aridam, alij Alcibiadiōn, Romani Alcibiaccum nominant. Folia habet prælonga, hirsuta, subalbida, Anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula. Cauliculos exiles, numerosos, minutaq; utroq; latere folia, in uersus digesta, nigra, in summo caule minuscule. Flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti Viperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo a serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint feriri non patitur. Folia &

semen idem præstant mnnus. Lumborum dolores sedat. In uino aut
forbitione sumpta, lac extrahit.

BARBARI COROLL.

EChios, etiam Dorias a Paulo uocatur. Plinius, Echios inquit, utriusq; generis Pulegio si-
milis est, coronata folijs: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula sunt Viperæ. Qui-
dam Echion pro Personatia inquit cœpere. Dioscorides hoc loco unum facit genus Echij, non
geminum. Sed Nicandrum uidetur sequutus esse Plinius, in theriacis dicentem, Echios duas
esse, contra bestiarum ictus utiles. Alteram humilem, folio Anchusæ spinis horrido, sed exili.
Alteram altiorē, maiore folio, flore paucio, per ambitū purpureo, capitulis Viperæ, cacumine
aspero, astrictoq; lanugine. Idem poëta paulo supra, quasi tertiam eiusdē nominis reddendo,
Echios inquit, cognomine Alcibios, herba est spinosa, coma sustinente flores, radice alta & exi-
li: quā ad serpentes, & iniici uulneribus, & cōmanducari quoq; præcipit. Folia quoq; ipsa non
multo post, eiusdē Alcibij cōmendat, quantū manu cōprehendi possit. Plinius. 27. uolumine.
Alcibios inquit herba, qualis esset, apud auctores non cōperi: sed radicē eius, & folia trita, ad
serpentis morsus bibi & imponi iubent, folia quantū manus capiat, trita cum uini meri cya-
this tribus, radicem drachmarū trium pondere cum uini eadem mensura. Ideo autē qualis es-
set Alcibios apud auctores cōperisse negat, quoniā præter Nicandri uerba illā, & pauca, &
alijs cōmunia quæ prætexui, non legitur qui descripserit. Alteram uero esse Alcibion Nican-
dro q̄ duas illas priores Echios, scilicet, ostenditur: & q̄ Echis hæc, non Echios ab ipso dicitur.
Et q̄ eandem herbam uno loco bis depingi opus non erat.

Pli. li. 29. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Duo Echij, siue Alcibij huius genera antiquiores fecerunt, præsertimq; Nicander utrunq;
his uerbis describens. ἔχθρα δὴ αἰχμὰ πικρὰ, τὴν δὲ τὸ μὲν ποὺ ἀγχοῦσιν προσοικὴν ἀκανθὴν πετάλιον
παῖρον ἐπὶ τυτθόντι καὶ ἐν χροὶ πυθμὶνα τίνιν, ἢ δ' ἐπὶ πετάλοις, καὶ ἐν καλῶσι θάλασσαν ὑφ' αὐτῆς, ὅλην
δὲ πύρεξ πορφυρίζεται ἀνθὺ βλάσιν δ' ὅς ἐστι σφιδανὸν δ' ἐφ' ὅπερθε κάρηνον. Quorum sensus sit. Esse
duo Echia, habereq; alterum spinosa Anchusæ modo folia, uerum parua, et per terram sparsa.
Alterum maioribus folijs, & purpureo flore esse, aspero, lanuginosoq; caule, capitulis Vipe-
rarum figura, quod Plinius ait. Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa: cui & capitula
sunt Viperæ similia. Nicandri interpres ex Numenij antiquissimi scriptoris Theriacis, duo E-
chij genera itidem facit: uocariq; alterum, quod breuius est, Ocimoides: quoniā Ocimo simi-
lia habet folia: Alterū uero spinoso folio, priuatim Echion. Quod primū a Dioscoride descri-
ptum est: mox autē describetur alterū, non sub Echij, sed Ocimoidis nomine.

De Ocimastro.

CAP. XXXI.

OCymoides aliqui & hanc Echion uocant, alij Scorpiuron, alij
Sparganon, alij Althæam, alij Amaranthida, alij Probathæam,
alij Elaphion, alij Antiminon, alij Porphyriada, alij Agion, alij Nemefi-
on, alij Phileterion, alij Hyænopsolon, alij Thyrsutin, alij Themutin, alij
Misopathos, Latini Ocimastrum. Folia fert Ocimi, & ramos dodrantæ-
les, hirsutos, siliquas Hyoscyamo similes, semine ut Gith nigro prægnan-
tes. Vim habet semen in uino potum, qua uiperarum, cæterarumq; ser-
pentium morsibus medeatur. Datur ischiadicis cū melle, uino, myrrha,
& pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

Ocymoides

BARBARI COROLL.

DE Ocimoides, nonnihil in Ocimo dictum est.

EX M. VERG. COMM.

Quo syluestris ad satium discrimine Menthastrum, Apiastrumq; latini ueteres dixerunt,
eadem naturæ, & nataliū analogia Ocimastrum ab iisdem dictum fuisse, uerisimile
est. Plinius tamē syluestre Ocimū cōtētus dixisse, paucis medicinā & historiam eius absoluit.
Hic in maiore honore ueteribus fuisse Ocimastrū, ex tam multis eius appellationibus indicat:
quarū plures ex alicuius partis ad alias herbas similitudine illi a gentibus per tempora accre-
uerunt.

C runt. Nec difficilius hoc tēpore quicq̃ est, q̃ earū multiplices huiusmodi rationes inuenisset, præsertim non bene semper similia inter se cōparantibus imperitiis herbarijs, aut ex una, altera ue simili parte neglectis maioribus, & quæ magis ex re sint differentijs, medicā materiam alijs, atq̃ alijs appellantibus. Cur autē Echion Ocimoides diceretur, satis superiore capite dictū est. Cur autē Scorpiuron, Sparganion, Althæa, Amaranthis, & Philetæron, quæ omnes in scriptore hoc plantæ sunt, ex earū similitudine uidendū est. Probata deinde, & Elaphios, ut cōficere licet, ouilla & ceruina herba dicta est: uel q̃ quadrupes hæ libenter ea uescantur: uel q̃ naturā docuerit, uel homines inuenierint, uenenatorū maleficia hoc remedio ab illis arcere. Porphyris mox a colore floris, quemadmodum & Augion ab eius splendore, Thyrsitis postremo ab hirsutis ramulis, quos thyrsorum figura profert.

De Erinō. CAP. XXXII.
E Rinon aliqui Hydreron, aliqui Ocymoides uocant. Nascitur apud fontes & fluuios, folijs Ocymi, sed minoribus, parte super na diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus surculis, flore candido, semine nigro, & acerbo. Folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorū fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

BARBARI COROLL.
E Rinōs herba cognominis arbori Caprifico est, ob id a Plinio inter Ficos, Caprificosq̃ red dita, non naturæ, sed gentilitatis respectu. Lac eius dulce. Galenus hanc non Erinon, sed Echion uocare maluit. Verusti quoq̃ Dioscoridis sunt codices, in quibus non Erinos, sed Echinos scriptum sit. Est & apud Hippocratem Echini herbæ mentio.

EX M. VERG. COMM.
D Secutus græcorum nomen Plinius, aquatici Ocimi huius historiam & medicinam inter Ficos libro. 2. capite octauo tractauit. Longeq̃ a congeneribus suis herbam inter arbores descripsit: contra scriptoris huius præcepta & leges, qui in totius operis procemio grauius damnauit, qui literarum ordinem sequentes, cognata a congeneribus suis diuellerent: manifestum argumento, in tractanda medica materia, indicibus librorum magis, q̃ totis commentarijs uisum fuisse eum scriptorem. Posteriores rem magis, q̃ nomen secuti, inter Ocima de eo tracta uerunt: neglectaq̃ lactei, & qualis in Fico est, liquoris una nota, ex qua Plinius Ficus id adnumerauit, ex alijs quæ multæ inter herbas describi herbam cogebant, aquaticum Ocimum, aut Ocimoides, quod Ocimo simile significat, appellauerunt. In quo habent grauissimum restem hunc scriptorem, qui inter congeneres herbas, & statim a uero Ocimoide eam tractauit. Nec si Græci a ficulnei lactis liquore eam appellauerant, ideo separanda a congeneribus suis erat. Illi enim non, quia Ficus, arborue sit, Erinon, id est, Caprificum eam uocauerunt, sed quoniam Caprificorum modo lac sectus eius caulis, & expressa folia stillant. Laudauit aquaticum Ocimum hoc contra uenenata in Theriacis suis Nicander, quod in scriptore hoc non legi, demiretur aliquis, præsertim testante id Plinio. Versiculus Nicandri est, *καλὸν δὲ τὸ ἐν ἀρπύκισιν ἔρινον*. Quod est. Et uirentis ad radices montium Erini. Tradidit Dioscles, a quo Plinius multa accepit, Ocimo simile esse: nasci prope flumina & fontes, & præter id apricis locis, & ad radices montium. Est illud etiam animaduertendum, credere nos quod in extremo capite est, finire aurium dolores instillatum succum, de lacteo liquore illo intelligendum esse. Is enim eius herbæ succus est. Nos tamen *χυλόν* inuenientes, ex instituta a principio in his nominibus a nobis lege, nihil detorsimus, incorruptam in hoc scriptore uocum, & eandem semper significationem seruantes.

De Gramine. CAP. XXXIII.
A Grostin aliqui Aegicon, alijs Amaxitin, Aegyptij An uphi uocant, Latini Gramen, aliqui Asphyllion, alijs Sanguinalem, alijs Vniolam, Hispani Apariam, Daci Cotiatam. Aphri lebal. Gramen geniculatis serpit ramulis, a quibus crebro radices spargit dulces, articulis

præcinctas. Folia dura, & ut harundinis parua lata, in exilitatem fastigiantur. Ea quæ iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu, uulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus. Calculosa etiam uelicæ excrementa comminuit.

BARBARI COROLL.

Gramini ab internodijs ramorum, & cacuminibus radices nouæ pullulant. Sunt qui & aculeatum Gramen inuehant, trium generum, Dactyli cognomine. Vnum, cuius in cacumine aculei sunt plurimum quini. Alterum Aizoo simile, Dactylon priuatim uocatum, quoniam digitis medetur. Tertium genus tenue. Nascitur in parietinis, aut tegulis. Nulla herba gratior iumentis Gramine, siue uiridis, siue in fœno siccata. Tunditur aspersa aqua. Radix adhuc tenera mandendo est. Gramen Marti consecrauit antiquitas, quod ex humano cruore procreatum crediderit. Quæque & omnis herba Gramen abusione dicitur. Quidam Saturno dicant, quod ab eo satum primo perhibent. Glaucum uero immortalitatem, huius herbae cibo consecutum, Athenæus ex Aeschionis poetæ uersibus existimat.

EX M. VERG. COMM.

Vlgaissimū inter herbas Gramen est. A capris Aegicon, a iumentis Amaxitim antiquitas nouiuit: quod capræ scilicet, & iugo, carpētisque seruientia iumenta eo passim uescant. Sanguinalium uero, quod humano cruore procreari ueteres falso crediderint. Angustijis urinæ opitulari hic ait: cōuenitque in eo antiquis medicinae auctoribus, qui inter diuretica simpliciter id numerant: ultra quod hic lapidosa etiam uelicæ excrementa frangere ait. Extrema tamen hæc pars in aliquibus græcis aliter legitur, ἰλιν, scilicet ἰλιν λίθων σπέρμι, quod est, facere Gramen ad urinæ angustias, uelicæque ulcera, & calculos frangere. Quæ omnia a Plinio. 24. uolumine capite decimonono, totidem, & iisdem uerbis reddita fuerunt.

De harundinaceo Gramine. CAP. XXXIII.

Est & harundinaceū Gramen, priore multo maius, quod iumenta nec care tradit, præsertim in Babylone. Idque iuxta uias nascitur.

BARBARI COROLL.

Alamagrostis, a Plinio Gramen simpliciter uocatur. infestum camelis. Quidam Babylo nium Gramen cognominant.

EX M. VERG. COMM.

Contraxit Plinius ad Camelos, quæ hic iumenta dixit, enecare Gramen in Babylonis regione iuxta uias nascens. Nec facile est nobis modo ratiocinari, camelos ne ille dixerit, quia multo hoc, & quasi solo ad uecturam iumento semper usa ea regio fuerit: an quia Gramini illi, & animali huic ex naturæ antipathia discordia sit. Huic idem, aut simile uidetur esse, quod a Parnaso Gramine statim hic ait: natum in Cilicia Gramen, in cibo sumptum boues exurere: facereque id alter ex interpretibus ait impositum, alter uero in Sicilia: cum tamen antiqua & uera lectio sit, ἰν ἰλινίᾳ, & ἑρρωδίᾳ, id est, in Cilicia, & in cibo sumptum. Plinius longissime de omni Gramine, quo diximus loco paulo ante longius egit: neque ab hoc scriptore adeo diuersus, ut de his ultra agere nos oporteat.

De Gramine Parnasi. CAP. XXXV.

Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat, folijs hederaceis, flore odorato, candido, semine paruo, non inutili. Radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & mirum in modum dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquat, adijciaturque piperis & turis tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in ærea pixide recondit. Decoctum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius urinam impellit. Alium, uomitionesque sistit. Natum in Sicilia Gramen, quod incolæ Cinnā appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

A

Pli. li. 24. ca. 19.

καλαμδρακίς

B

D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L

C Ramen Parnaso monte, folium habet Hederæ, densius quàm usquam fruticans, cum in reliquo orbe folia in exilitate fastigent. Succu huius excipiunt propter ubertate, qui & dulcis est. Gramen Ciliciu, hoc est, Cinna. Sunt qui & Medon uocent; nec amburi eius recentis pastu boues, sed pinguescere contendant, Nato alterutris errore, quod alij *πικραστου τοῦ βόου* legebat, alij *πικραστου*.

De Siderite.

C A P. XXXVI.

Sideritin aliqui Heracleam uocant, Magi Genituram, aut sanguinem Titani, alij Scorpionis urinam, Pythagoras Parmiron, Andreas Xanthophanea, Osthane Bcephthalmon, Aegyptij Sendionor, Romani Verternium, alij Soleastrum, Aphri Vdedonin. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quærcus, aut saluiae accedentia, minora tamen, & hirsuta. Caules ædit quadratos, palmum saepe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantumque substringentis. In quibus per interstitia, orbiculata uertebrae, ut in Marrubio spectantur. Et semen in eis nigrum. Nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui, uulnera sine inflammationis periculo iungunt.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 12. ca. 17.

Sideritin primam, aliqui ueram Achilleum cognominant, alij Sideriten. Odoris foedi cum teritur, tradunt. Nostri Sideritin eam, quæ est latissimo folio, Scopam regiam appellant, medentem anginis suum peculiariter.

De alia Siderite.

C A P. XXXVII.

D Alia Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus, folio Filicis, in ambitu utraq; parte diuiso, pediculo longo, pedunculibus e summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quod Betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis foliorumque ad uulnera præcipua.

B A R B A R I C O R O L L

Sideritis secunda, ramulos habet triangulos.

E X M. V E R G. C O M M.

Ingenue fatemur, in tanta ueterum & iuniorum diuersitate, nihil habere nos de Siderite, quod pro comperto tradere ualeamus. Quæ Plinius multis locis nunc de toto Sideritidum genere, nunc priuatim in hac, aut illa tradiderit, facile est omnibus uidisse, & cum uiderint censere. Nolumus nos labori eorum parcere: neque ingenij, iudicijque sui gloriam illis auferre. Quod autem nos in melioribus græcis obseruauimus, tacendum non est. Duo esse illis præcipua Sideritidis genera: Heracleam, id est, priorem illam; & Achilleam, quæ mox dicenda erit. Nec aliter Paulus Aegineta in. 6. tradidit. Eam Græci a ferro Sideritum dixerunt, quoniam glutinatis uulneribus apta, percipuum in bello haberet usum: quod saepe ab eo metallo in græcis scriptoribus indicat, ex eadem scilicet causa, ex qua quæ sequitur Achillea militaris etiam dicta fuit. Dubitamus nos in priore Sideritide, quo loco hic ait, habere Marrubij folia, longiora tamen, ad Saluiam, aut Quercus, &c. abutere earum notarum alteram: fuisseque ex alio Sideritidis genere ab imperitico aliquo additam. Non enim possunt Querna Saluiae folijs in cõparatione alterius coniungi: tam dissimilia inter se sunt.

De alia Siderite.

C A P. XXXVIII.

Sideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam uocat, in mactarijs & uineis nascentem, folijs Coriani, a radice numerosis, dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus. Flore purpureo, paruo, gustanti amaro & uiscido. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulnere imposita, sanguinem supprimat.

BARBARI COROLL.

Sideritis tertia, similis Achilleo est, mox prodendæ, sed candidioribus folijs, & pinguioribus, tenuioribus cauliculis.

De Achillea. CAP. XXXIX.

ACHILLEA alicui Myriomorpho nominant, alij Chiliophyllon, alij Stratiticon, alij Heracleon, Latini supercilium Veneris, alij Acron syluaticum, alij Militarem, alij Millefolium, Aphri Asterchillos, & alij Achilleam Sideritin. Dodrâtales, aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, Coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato, & uiscido. Umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. Prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta uulnæ profluuiâ in uellere. Decocto quoq; insident sceminæ fluctione uulnæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Sideritis Achilleos dicitur, quoniam inuenit eam Achilles, discipulus Chironis, qua uulneribus mederetur, & Telephum sanauerit. Alij primum Aeruginē inuenisse tradunt utilissimam emplastris: ideoq; pingitur, ex cuspide decutiens eâ gladio in uulnus Telepho. Alij utroq; usum medicamento uolunt. Hanc nonnulli Panaces Heracleon appellauere. Nostri propriè Millefoliam, cubitali scapo ramosam: minutioribus q; Feniculi folijs, uestitam ab imo. Alij uerò Achilleon esse dicunt, scapo ceruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis eleganter circumdatâ. Alij primū genus Sideritis Achilleo uerâ, ut diximus, acceperūt. Ethruria Millefoliâ uocat, herbâ in pratis tenuem, a lateribus capillamenti mō foliosam, eximij usus ad uulnera. Bonū neruos abscessos uomere, solidari ea, rursusq; iungi, addita axungia, affirmant. Achillios, et Achillion uocatur quarra Sideritis, ut dictum est: et a latinis quibsdâ Lumbus Veneris. Dioscorides Supercilium Veneris, non Lumbum dici uoluit, alterutro errore orto; q; Græci οφρύν lumbum, οφρύν supercilium appellant.

De Rubo. CAP. XL.

BATOS a Græcis, ab alijs Cynosbatos, ab alijs, Selinorition, ab alijs Syntrophos, a Magis Titani sanguis, ab alijs Ibis sanguis, a Romanis Rubus, ab alijs Sentes, a quibusdam Morabaticana, a Dacis Manthia, Aegyptijs Hæmōos, alijs Ametros appellatur. Rubus notitiæ uulgaris. Vini habet siccandi & adstringendi. Capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & sceminarum profluuiâ. Presteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmat. Oris uitij folia commanducata medentur. Cohibent ulcera quæ serpunt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt. Condylomatibus, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in Rubo nascentis, q; optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistit aluus præ maturi cibo, necnon flore in uino potu.

A

2x/100

Pli. li. 25. c. 5.

B

C. 100

P

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L

C R ubi multa genera, sed quæ magno separantur discrimine. Chamæbaton uocant humi-
lem Rubum, qui protinus q̃ paulo accreuit, retro uergit in terram, atq̃ ita radica-
tur, & Humi-
rubus a Theodoro dicitur. At Rubus inter arbores aquaticas statuitur. Rubi unum genus fert
mora, quæ & manduntur. Huius radices spongiolæ, duricia lapidis uisuntur. Alterum rosas:
de quo in Cynosbato dictum est. Flos mōri candidus, per melle colligitur. Locus Rubis con-
situs, quem nos Senticetum & Dumetum uocamus, Græci Batiam, & Apobaton appellant.

E X M. V E R G. C O M M.

C Ommune græcis Batos Ruborum omnium nomen est; quo in toto hoc genere utētes, ad
ditis notis aliquibus, species eius distinguūt. Chamæbatū uerbi causa, Cynosbatōuē, aut Idæū
batum uocantes: quæ tria sunt uniuersi generis huius discrimina. Latini mō Rubum, ut Plini-
us, modo Sentem, ut Columella appellant, Idæum rubum, uel Sentem, Canisq̃ sentem, & sim-
pliciter sentem seu Rubum: quem autore Theophrasto libro. 3. de plantarum historia Chamæ-
baton, id est, humilem & terrestrem uocauimus. Verba eius quo diximus loco hæc sunt.
ἔτι δὲ καὶ τοῦ βάτου πάλιν γένος. μάλιστα δὲ ἔχονταί τι διαφέρειν, ὅτι ὁ μὲν ὀρθοφύλλος καὶ ὁ ἄλλος ἔχειν. ὁ δὲ
ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἰσθμίου καὶ τῶν ἰσθμίου. καὶ ὅταν συνάπτη τῇ γῇ πρὸς ὅμοιον πάλιν ἐν δὲ καλοῦσι τινὲς χαμαίβατον.
ὁ δὲ ἀνδοβάτος ἐν καρπῷ ἐπὶ τρυφῶν ἔχει, καὶ παραπλάσιον τῷ τῆς γῆς. ἐν δὲ ἀνδοβῶν καὶ ὁμοῖον μῆκος
καὶ πρὸς ὅμοιον τῆς γῆς, τὸ δὲ φύλλον ὀρθώδης. Quorum sensus est, Ruborum item plura genera.
Præcipuam uero habent differentiam, q̃ alter recta & in altitudinem erigitur. Alter deorsum
& in terram uergit: & cum primum terram attingit, iterum radica-
tur. Vocantq̃ hunc aliqui hu-
mitem, seu terrestrem Rubum. Qui uero Cynosbatos, id est, canis Sentis dicitur, fructū fert ru-
bentem, puniceæ cytino similem. Estq̃ inter fruticem & arborem ineditis, puniceæ similis, folio
uitticis. Et hæc Theophrastus de duobus Rubi generibus: quorum alter primo uoluntate a Dio-
scoride descriptus est, alter modo docet. Estq̃ hic Chamæbatos, id est, humilis ille Rubus, Sen-
tis, uel Rubus a latinis simpliciter appellatus. Cuius mora extrema ætate maturefcentia, au-
bus grato, & hominibus non inuili cibo in sepibus nigrescunt. Quæ inter Romanas Rubi ap-
pellationes in Dioscoride nunc leguntur: Vaticanaq̃ dicuntur, augustiore unius Romani col-
lis, q̃ ex reliqua Italia nominis nota.

De Idæo Rubo. C A P. XLI.

Baros idæia

D

I Dæus Rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proteniat.
Est autē longe tenerior priore, ac minoribus spinis horrens. Quan-
tū & sine spinis inueniatur. Eadem præstat quæ supradictus. Cæterum
flos cum melle, oculorum collectionibus commodissime illinitur. Ignē
sacrum extinguit. Stomachicisq̃ ex aqua bibendus datur.

B A R B A R I C O R O L L.

R Vbus Idæus, in Ida, non alias nascitur, sub arborum umbra, rarioribus aculeis, & minus
aduncis.

E X M. V E R G. C O M M.

I Dæus Rubus hic dictus est, quoniam in Ida, nec alibi copiosior nascitur, tenerior, paruis acu-
leis, & aliquando, ut hic ait, nullis. Tertiū genus in superiore illa diuisione nostra faciens. A lo-
co græci appellauerunt, ob eam quā diximus causam.

De Helxine, id est, murali hærbæ. C A P. XLII.

Idæia

H Elxinen aliqui Elitim uocāt, alij Canocersæam, alij Amelxinē,
alij Eufinen, nonnulli, Amorginen, alij Sueotachos, alij Psych-
uacos, alij Psychouacos, alij Melampelon, alij Cittampelon, alij Ciffa-
methon, alij Anateramenon, Romani uolutum Lapparion, Aegyptij
Apap, alij Parthenion, alij Sideritin, alij Heracleam, nonnulli Agriam,
qdam Clibodion, alij Polyonymon. Nascitur in sepibus, uinetis, mace-
rijs, et segetibus. Folia ei Mercurialis adsunt, hirsuta, cauliculi leniter ru-
bentes, & circa eos ueluti semina aspa, adherentia uestibus. Folia refri-

gerandi spissandiq; naturam habent. Qua ex causa sanant illitu ignes sacros, adusta, condylomata, incipientes panos, tumores, inflationesq;. Succus eius cum cerusa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt aptissime illinitur. Imponiturq; podagris, cum hircino seuo, aut cærato cyprino. Veterem tussim adiuuat, cyatho hausto. Tonsillis inflammatio ne turgentibus, utilissime & gargarizatur, et illinitur, Succus in aurium dolore infusus, iuuamen præstat.

BARBARI COROLL.

Helixine duplex Dioscoridi, & omnino autoribus. Altera Partheniō, altera Cissanthemos ab Hederæ folijs uocata. Plinio item duplex, sed aliter. Altera de qua hic agitur Partheniō & Perdicij, siue Perdicadiis cognomine: qm̄ perdicæ hac præcipue uescantur. Folia tamē ei non Mercurialis, ut Dioscorides, sed mixtæ similitudinis, Plātagini & Marrubio tribuit, cauliculis densis lanas infici, semina in capitibus lappaceis adhærescentia uestibus: a quo & Helxinem dictā uolunt. Hanc Aeoliæ gentes, & Aegyptij edunt. Crassas, plurimasq; habet radices, ut inq̄t Plinius. Altera idem autor inq̄t, uerior est Helxine, cui radix foliosa, ex qua similis malo carduus seminis plenus extuberat. Seminalis Acanus a Theophrasto dictus, cuius inciso sumo uertice, lachryma erumpit iocundi saporis, Acanthica Mastiche uocata, proptereaq; adulterium ex ea fit, ut diximus. Germinat, atq; floret æstate folio, & caule, lanugines spinosas habens. Hæc Plinius. Nos hanc non Helxinem, sed Ixinem uocari credimus: ut in Chamæleonte candido dictum est: quanq̄ porro prior Helxine Perdicion, & Parthenion dicatur. Aliud tamen intelligo, Plinium secutus, Perdicion, quæ a nostris herba Vrceolaris uocatur, ab alijs Astericum, folio similis Ocimo, nigrior tantum, nascens in tegulis parietinisq;: ob id & Parietaria, et Muralium, & Muralis uulgo dicta, & Vineago: & Parthenion, qm̄ a Minerua in somno contra præcipitiā lapsusq; monstrata est Pericli Atheniensium principi, cū uernula ei charus ex altitudine cecidisset, Splachnoptes appellatus. Turtures, columbæ, gallinacæ annuum fastidium deducere dicuntur Helxina pastis, autor est Plinius. Triplex igitur inuenio Parthenium. Vnum folio Coriandri, quæ Amaracus a Galeno, Parthenium a Dioscoride nominat, uulgo Matricaria. Alterū folio Mercurialis, ut Dioscorides hoc loco, siue Plantaginis & Marrobij, ut Plinius, quæ dicuntur Helxine, ac de ipsa hic agitur. Tertium folio Ocimi, quæ Parietaria, & Muralis uocetur: de qua mirum est Dioscoridem nihil præcipere, qd̄ sciā. Nisi qs eum dicat sub Helxine hanc q̄q; accepisse: qm̄ hirsutula sit, & adhærescat uestibus, nec a Mercurialis herbæ folijs omnino multū distet, præterq̄ q̄ Mercuriali serrata leuiter ea sunt, Parietariæ non sunt. Sunt qui & Mercurialem ipsam Parthenion quoq; dicant Helxinem, ut Dioscorides in Myosotide scriptum reliquit. Etiam Alfine dicta est. quanq̄ corrupte in Theophrasto legitur Alfine, ubi Theodorus Volucris interpretatur, arbores amplexu Hederæ modo strangulantem.

EX M. VERG. COMM.

Pluribus, & inter eas aliquot plantis alijs cōmunibus Helxine appellationibus q̄ndam indicata est. Testantur in græcis id Græcorū medici, qui Helxinem primo Perdicium, Partheniū, Sideritum, & Heracleam uocari aiunt. Mox & Cissampelum. Duobusq; capitibus de eiusdem nominis herba agentes, neq; eisdem utriq; uires tribuentes, duas manifeste Helxines eodem nomine, sed diuersa natura constituisse uidentur. Præter eos Nicander etiam in Theriacis suis Parthenij primum, mox Helxines facta mentione, utranq; cōtra uenenata laudauit. *ἢ καὶ ἰδίῳ πρὸς τὴν καὶ ἑκατέρω καλῶναι.* Quo loco interpret eius, Clybatim, Sideritum, Parthenium, & Perdicium, & omnibus his unam eandemq; plantam uocari ait: iterumq; *καὶ μὴν παραδίδωμι.* &c. Iterumq; idem interpret testatus est, Parthenium a quibusdam Helxinem, et Perdicium nominari. In latinis Plinius lib. 22. capite. 17. his uerbis græcos secutus est. Helxinem aliqui Perdicium uocant: quoniam Perdicæ ea præcipue uescantur: alij Sideritum: nonnulli Parthenium. Non licet in tam concordī tot testium fide, tam multis appellationibus dictam fuisse quondam Helxinem, non fateri. Non ideo tamen credendum, unam duas esse plantas, notis & uiribus diuersas. Oportet enim in cognominibus unum esse quod primo, uere, & per se nomine illo indicetur: tum ex similitudine ad id nomen alia admitti: quæ genus suum seruantia, in parem nominis tūm societatem, cōmunionemq; adoptione illa ueniant. Esse autem duas Helxines, dissimiles naturæ inter se notæ ostendunt: & post naturam antiquiores græci, præfertimq; Paulus

C Aegineta priuati, seorsum; his uerbis de utraq; in. c. agēs ἡλξιν διὰ διὰ περδίκιον, διὰ διὰ παρθένιον, διὰ διὰ σιδερίτιν, διὰ διὰ ἡράκλειον. Δύναμις διὰ αὐτῶν ῥηπτικὴ καὶ ἀντρίμας μὲν ὑπόπτως ὑποφύχον. Quod est. Helxine sunt qui Perdicium, qui Parthenium, qui Sideritum, qui Heracleam uocent. Vis eius est absterfione purgare, & cum frigida humiditate aliqua sensim leniterq; adstringere. Et q; hæc Helxines capite hoc a Diosc. tractata ex Paulo historia, & medicina. Post quam statim idē ait. ἡλξιν καὶ κατὰ μὲν τὴν διαφθορτικὴν ἔστι δύναμις, id est, Helxine, quæ Cissampelos dicitur, discutiendi uim habet. Huius nulla est in Diosc. historia. Habent quidem impressi, & pleriq; alij codices, in fine capitis additam magis q; a principio descriptam breuissimam eius historiam & medicinam, & quæ huic scriptori accreuisse manifeste uideatur. Eam alij interpretes suis additionibus coniunxerunt. Nobis, qui opus hoc eo consilio suscipimus, ut ex meliorum fide omnia in Diosc. instaurentur, contra uetustissimos, eosdemq; optimos testes uertere ea nō placuit: præsertim discordi eius ab antiquis medicina, quam in discutiendo Paulus Aegineta, codices uero illi in soluenda alio esse dixerunt. At duæ sunt Helxinae, fatemur id quidem: non ideo tamen in Dioscoride legenda quæ illi parum conueniant, & alij discrepent. Potuit enim huic scriptori satis esse, inter alterius appellationes huius generis meminisse: aut quod in plerisq; alijs factū est, perijisse huic capiti altera hæc Helxine. Ex his duas esse Helxines rationari facile est. Alteram Mercurialis herbæ folijs, ut hic ait: ut autem Plinius, mixtæ similitudinis inter Plantaginē, & Marrubium; alteram Hederæ, in uinetis nascentem, ideoq; Cissampelō uocatam. Illam prius & perse sic dictam; hanc illi congenerem, aut similem saltem: similem q; ut nos opinamur, in tenaci uestium nexu illo. Hæc enim Helxines præcipua nota est, & unde factū illi nomen sit. Quærendum post hæc etiam, unde tot aliæ illæ appellationes ad Helxinem irrepserint: non utraq; sed ut nos credimus, priorē illā, quæ femina fert in capitibus lappaceis, uestibus adhærere. Possunt euentus eius in alijs plures esse causæ. Sed cur Perdicium dicta fuerit, nulla, præter a Plinio & Theophrasto allatam: q; scilicet semine eius perdices notissimæ aues uescunt: herbam q; fodiant, & in ea uoluntur. Iussit hoc nomine uocata uti Abfyrus, ueterinariæ medicinae græcus autor, contra iumentorum tussim. Verba eius sunt, βοτάνη ἢ ῥιζομαστὶς περδίκιον καλοῦσι. Celsus etiam secundo medicinae suæ libro, Murem herbam nominans, hanc intellexisse creditur: quoniam parietes & muros natalem sibi locum fecerit. Ob quam causam a multis alijs quorū locis Parietaria nunc etiam dicitur. Hic etiam ὑποφύχον καὶ τοίχων, id est, maceris & muris nasci ait. Sunt hæc appellationes hæc priori huic Helxinæ proprie ex diuersis causis illi assignatæ: Sideritis uero, & Parthenion alijs plantis proprie, huic uero additæ, & ex similitudine aliqua receptæ. Credimusq; nos, Helxinem ideo Sideritum dictam, q; utraq; Marrubij folio sit. At hic Mercurialis herbæ folio Helxinem describit: alij tamen, præsertimq; Plinius mixtæ similitudinis inter Plantaginē & Marrubium. Vtraq; folio aspero est. Sola enim asperitate uestes tenaci nexu hæc retinet. Vtraq; etiam inter saxa nascitur. Cur autem Parthenios quondam diceretur, nō satis modo nobis constat. Quæ hoc nomine dicta proprie fuerit, Anthemidi congener herba est, superiore uolumine inter Chamæmalum & Bouis oculum tractata. Ceteris, quæ plures in medicæ materiae disciplina sunt, addita, & ex similitudine recepta ea appellatio est. Siquidem & Artemisia Parthenion dicta est. Esse autem Parthenion Helxines appellatiōnem, non genus, manifeste indicat Paulus Aegineta: q; cum de Helxine egisset, non multo post proposita Parthenio, id tantum ait, ἡλξιναι ἢ τῇ ἡλξιν. quod est, Dictum in Helxine: quasi per se Parthenion nulla est, sed ex multis una Helxines appellatio. Vulgo fere nota Muralis, Parietariaq; hæc Helxine. Quemadmodum contra cognitu difficilis quæ Cissampelos primo: cam-q; ob causam nominata est, q; Hederæ folio in uinetis nascitur: ex qua eius natura factæ aliæ ille appellationes etiam sunt, Melampelon, & Cissanthemon. Omnes enim coniunctum sibi Hederæ nomen habent, natalis loci, & foliorum eius index. Obseruat pluribus locis in scriptore hoc a nobis est, plantarū genera, non nomina appellationibus his ab eo numerari. Factūq; id hoc loco credimus: qm sunt quæ in nominibus his utriq; generi Helxines seorsum competant: discreuisseq; eas ex his quæ hæcenus dicta sunt, non erit legentibus difficile. Adiciemus illud etiam, quam hic Polyonymon, id est, multi nominis appellatiōnem Helxines esse ait, ad priorē illam pertinere. Ea enim est quæ tam multis nominibus indicatur.

De Elatine. CAP. XLIII.

Elatine

E Latine folia habet Helxinæ, minora, rotundiora, pilosa, semper
dalis ramulis, quinis senisue, a radice foliosis, gustu adstringens

gentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluctationibus & in inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis. Eadē cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

BARBARI COROLL.

E Latine, folio Casia a Plinio describitur; cetera cum Dioscoride conueniunt. Corruptam in Plinio lectionem esse haud sum dubius, librarijs Casiam pro Helxina substituentibus: quandoquidem Elatina modo uisitur, Helxina similis, hoc est, folio Hederæ propinquo, non Casia: cuius id oleaceum est: ut in Chamælea dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Similis Helxina Elatine est, non simpliciter, sed ei quam folio Hederæ Cissampelon uocari diximus: eamq; ob causam ab Helxine statim tractata. Eam ueteres græcorum medici medicorūriter adstringere, & refrigerare dixerunt.

De Eupatorio. CAP. XLIII.

Eupatorium, siue ut alijs placet Hepatorium, aut Hepatitis, fruticosa hærba est, unum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem. Folijs per interualla Quinquefolij, aut Cannabis similibus, quinquepartito, aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum serratis. Semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agrecicatricem trahunt, medentur. Hærba, aut semen in uino potum, dysenteria, iocineris uitij, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, Artemisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

BARBARI COROLL.

Eupatorium, & Eupatoria quoq; dicitur. Regiam & hæc auctoritatem habet, folijs plumosis, modo caulis, flore candido, radice superuacua. Mauriani aliud Eupatorium demonstrat, officinis penitus diuersum figura, sed effectu par, scapo exiguo, fere cubitali, folio Centauri minoris, frutice odorato, sed flore magis, glutens ei est, radice superuacua. Passim nascitur.

EX M. VERG. COMM.

Fuerunt quondam, & adhuc sunt, magnæ inter autores & medicos litis Eupatorium, & Argemone. Nec persuaderi adhuc possunt aliqui, nō esse Argemonem Eupatorium: ex tam multo tempore, tamq; antiquæ fidei in medicina autoribus, ea multorum animis opinio insedit. Licetq; hic iam pridem in Anemone, & nunc in Eupatorio dixerit decipi pleroseq; falsoq; credere Argemonem Eupatorium esse: non desinunt tamen quotidie pro ea re uiolenter aliqui certare. Verba eius in Anemone sunt, qualia poterunt uolentes cum libuerit uidere: ea nunc etiā repetita ab eo sunt. Nosq; illorum memores, necessario locum in extremo hoc capite emendauimus: & pro Artemisia, Argemonem uertimus. Quod enim hic ait, quosdam Artemisiam hanc uocasse deceptos, alia enim est ut præmonstrauimus, in Artemisia non legitur, at in Anemone manifeste id inuenitur. Sunt Diosco. in Anemone uerba hæc. *ἔνιοι δὲ καὶ ἀνὰ μνημονοῦν ἀπορίσιν ἀπὸ τοῦ ἀργεῖος ἀνέμωνος τὴν λεγομένην ἀργεμόνην, καὶ τὴν φοιδάκ μνήμων. περὶ ἧς ἐν ταῖς μνήμωνιν ἰσορροπῶν ἀπὸ τῶν ἀνθῶν ὁ μόνον φοιτῶν ὑπάρχον πλανῶνται τὴν ἀργεμόνην ὑπατάριον ὀνομάζοντες.* &c. Quorum sensus est, qui in Anemone redditus a nobis fuit: cui & hic respondet locus. Neq; Artemisiam, sed Argemonem falso inquit Diosc. credere quosdam Eupatorium esse. Neglexerūt hoc alij interpretes, quod alioquin multifaciendum erat: ut quale uerū Eupatoriū esset aliquando cognosceretur. Vidimus nos in maioris ciuitatis nostræ Nosocomij hortis natam plantā, quæ omnibus a Diosc. traditis notis, ueram Eupatorium se ostenderet: præsertimq; semine in teram decliui, & postq; aruerat uestibus herente. Nihil in quotidiana multarū plantarū obseruatione certius antiquæ historiæ respondere aliqui mihi uisum est: furculosum genus, singularis uirga, lignosa postq; aruit duricies, plumosa undiq; aspitata, color liuens magis q̄ niger, & folia

Pli. li. 27. ca. 9.

ὑπατάριον

B

C per intervalla, sed contrarijs pediculis pendentia. Quod non penitus huic scriptori responde-
re uidebatur: comparatio tantum erat, qua Cannabis, aut Quinquefolij folijs ea comparaba-
tur. Cetera naturæ & Dioscoridi eadem omnia erant. Regiæ dignitatis herba Eupatorium eti-
am est, ab Eupatore rege inuenta. Et quoniam iecori præcipue medetur, quod græci hepâr
dicunt, ideo Hepatorium, & Hepaticis ab aliquibus dicta.

πεντάφυλλον

P De Quinquefolio. CAP. XLV.
Entaphyllon aliqui Pentapetes, alij Pentatomon, alij Pentada-
ctylon, alij Pseudoselinum, alij Callipetalon, alij Xyloloton, nō
nulli Xylopetalon, alij Asphalton, alij Pentacænon, alij Thymiatin,
Aegyptij Orphitebœcen, alij Enotron, Magi Ibdidis unguem, alij Ibi-
dis pennam, alij Hermodactylon, Romani Quinquefolium, Galli Pem-
pedulam, Daci Propedulam appellant. Ramulos fert furculaceos, tenu-
es, palmi magnitudine, in quibus semen. Folia Menthæ, quina singulis
pediculis, raro plura, in ambitu serrata. Florem ex luteo pallescentem,
interdum auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Sub-
rubram habet radicem, oblongam, Veratro nigro crassiore. Plurimis
pollet remedijs. Ius radices decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, den-
tium dolores sedat. Putrida oris ulcera, collutione sistit. Arteriæ scabriti-
cias, gargarizatu læuigat. Contra alui profluvia, & dysenterias auxilia-
tur. Item articulorum, coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in ace-
to & illita, serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores, duricias, absces-
sus, & distentiones discutit. Ignes sacros, redûuias, condylomata, psō-
rasq; sanat. Teneræ radices succus contra iocineris pulmonumq; uitia
prodest. Item aduersum uenena. Cum hydromelite autem, uel diluto
uino, & piperis exiguo bibuntur folia, contra febriū circūitus. In quar-
tana quidem quaternum ramulorum, in tertiana uero ternum, in quoti-
diana unius. Tricena quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus pro-
sunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime re-
gio morbo medetur. Illita cum melle, & sale, tam uulneribus q; fistulis
remedio sunt. Enterocelcis auxilium præstant. Quinquefolium sangui-
nis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, et san-
guinis eruptiones inciditur.

Pli. li. 25. ca. 9.
Theo. lib. 9.
de planta. h. j.

P BARBARI COROLL.
Entaphyllon, & Pentapteron in Theophrasto, Theodorus Quinq;foliam, & Quinq;pen-
nam conuertit. Acutius hanc Hermubotanem, hoc est, Mercurij herbam uocari tradit. Aegyptij
etiam Dissyphi cognominant. Daci Drocila. Itali Psyllitum, Soloram, & Thebeotin: quan-
quam corrupta puto nomina. Nam & Therumbros, & Theonestron quoq; dictam inuenio.
Radice cum recens est, rubente, nigra: cum inarescit, quadrangula: folio uitis pusillo: auge-
tur, definitque cum uite: caulibus tenuibus, crebris geniculis. Nomen a numero foliorum.
Quidam Græci Chamæzeleon, quasi fruticem terræ uocant. Commendari Quinquefolium
fraga terrestria gignendo, Plinius existimat. Ego id, qui uerum esse possit, non intelligo. Nam
herba ea quæ fraga gignit, Trifolia est, non Quinquefolia, flore candido, non luteo, in Rheti-
cis & Vindelicis alpidibus, etiamnum frequens secus uias. Hippocrates duo uidetur nouisse
Quinquefolia. Candidum, quod & herbaceum, & procerius est a terra. Nigrum, quod humi-
lius. Est & quæ Tormentilla uulgo dicitur Quinquefolio simillima, nisi q; septem, non quinq;

habet folia. Potest a nobis Heptaphyllon uocari, hoc est, Septemfolia: ex cuius radice pastil-
los theriacos (si Dñs placet) officinae pro uiperarum carne subiiciunt: quoniam uiperæ mo-
do, ut ipsi putant, nuncq̃ uiuantur.

EX M. VERG. COMM.

Nouerunt rura omnia Quinquefoliū, soloq̃ hoc nomine maxime cognitum ubiq̃ in ho-
nore aliquo est. Theophrastus, 9. de plantarū historia non Pentaphyllon tantū uocari sua æta-
te dixit, uerum Pentapetes etiam, factū ab aliquibus illi nomine a pennis auium, ut credidit
Gaza: ut autē nos opinamur, quia in quinque folia se pandit, & extendit. Fecit eadem etiā fo-
liorū forma, ut Pentatomon, id est, in quinque partes diuisum diceretur. Sic Pentadactylon, q̃
ut in hominis manu quinque digitū sunt, sic in ea planta totidem foliorū diuisiones. Pseudose-
linon dictum etiā, quod Apūū mentiat, sitq̃ illi in foliorū sectionibus illis quadatenus simi-
le. Quæ itidem illi a gentibus aliæ appellationes fuerunt, aliquā huiuscemodi causā habue-
runt. Quales Callipetalon, & Xylopetalon sunt, a foliorum specie & duricie factæ. Quemad-
modū uerisimile est, in barbaris illis latere incognitā modo nobis, ex figura, aut uiribus eius ra-
tionē aliquam. De radice, foliū eius libro, 9. de plantarū historia agens Theophrastus, addi-
dit, nigrescere Quinquefolij radicem effossā, siccatamq̃. Quod a Dioscoride ideo dictum
non est, quoniam satis fore sibi hic scriptor credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset.
Post id enim tempus medicis certo loco signatam, seruari relinquebat. Adiecit etiam Vitigine-
um Quinquefolij folium esse, non quantitate (pusillum enim est) sed colore & forma, & quasi
naturā Vitis sequeretur, augeri simul, & tabescere cum ea, caules per terram spargi graciles,
crebras, habentes, ut ille ait *κνῖμας*, non crura, sed a cruris humani forma inter duos genicu-
los interualla, quæ *κνῖμας* ille, qua diximus ratione uocat. Videndum illud etiam, quo modo
hic Menthæ, ille Vitis folio Quinquefolium esse dicat. Nobis male inuicem comparari posse
plantarum illarum folia inter se uidentur: quemadmodum & floris color in pallido albus, si-
mul & auri flauo colore dici. Hoc tamen non adeo difficile, ut illud. Videmus enim aliquando
in pallore hominis utrunq̃ colorem illum.

De Phœnice.

CAP. XLVI.

Phœnicen aliqui Rhon, alij Anchinopa, alij Phœnicopterōn, alij
Rhonstachyos, alij Osthaleu, Aegyptij Athnon nominant. Fo-
lia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam Lolio similem, ra-
mos digitorum senum, radici aduolutos, septenas octonasue spicas. In ar-
uis tectisq̃ recenter illitis nascitur. Harum uirū compos, ut in uino au-
stero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, uris
næ impetus infrænet. Sunt qui adalligatam in puniceo uellere, & suspen-
sam, sanguinem suppressere prodant.

BARBARI COROLL.

Phœnix a Plinio dicitur herba Phœnicea, inter fruges ab eo posita: quoniam a nostris Or-
deum murinum uocetur.

EX M. VERG. COMM.

Herbæ nomē fecit color, q̃ non dissimilis in ea maturis palmulis uidet. Eaq̃ ob cām Phœni-
copteros, a puniceo coloris aue dicta etiā ab aliq̃bus fuit. Nascit hæc in tegulis frequēti-
or, q̃ in aruis. Dico autē regulas nūc a tegēdo, oēm qua domus tegit, & hymbris stillicidia deriuant ma-
teriā. *στῆν* em̄ hic, non *κνῖμας* dixit: qua uoce Græci indicauerūt, quæcūq̃ familiā a celesti aq̃
tuent, siue fideles regulæ, siue ex materiā tabulæ, siue stramēta sint. Hordeū murinū Plinius uo-
cari a latinis ait: q̃ hordeaceo folio sit, & seminibus eius iter regulas mures uescant: hic Lolū
murinū, a spicæ figura: uterq̃ idē, sed diuersa rōne. Quot rāmuli, uel potius culmi illi sunt, tot
etiā spicæ. Diximusq̃ nos, sedigales culmos illos, lōgitudinē, nō crassitudinē eorū itelligētes.

De Idæa radice.

CAP. XLVII.

Idææ radici folia sunt ea, quæ Rusco. Adherent his, ueluti exigui
pampini, in quibus flos. Radix spissandi, cohibendiq̃ naturam ha-
bet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota citam aluum,

P. uij

C mensescq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

B A R B A R I C O R O L L.

Idae radix, acerbæ gustu, misceri solita luctantium in palestra pulueri, ad eam quæ repercutere tantum oporteat, ut Paulus Aegineta scribit.

E X M. V E R G. C O M M.

Radicem Dioscori. Pliniusq; herbam Idæam uocat: alter a tota natura, alter a potiore eius parte, & qua sola medicinæ inseruit, eam appellans. Peregrina Italiæ planta est, peregrinitatēq; suam natalis loci cognomine indicat. Rufco, de qua in extremo uolumine hoc agitur, omnes eam comparauerunt: cuspidatis ideo folijs herbam intelligere oportet, sed non tam solidis, rigentibusq; ramulis, ut Rufcus est: quando Helices secus folia habere hanc Dioscorides ait, Plinius uero eiusdem rei significatione pampinos.

¶ De Rhodia Radice.

C A P. XLVIII.

Radix pisa

Gignitur Rhodia Radix in Macedonia, Costo similis, leuior, inæquabilis. Quæ contrita Rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum Nardo imponatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Habetur & Radicis Cinthiæ mētio Hippocrati, fouendis feminarij locis. Inuenio & Rhodion uocari coloris genus Democrito, Italicū præferente in uellerū tinctura: fortasse id, quod nos uulgarī nomine Rosaceum uocamus. Galenus Rhizam, hoc est, Radicem ab eo dici genus quoddam fati scribit, sine caule, sine flore, sine semine, tribus dūtaxat folijs, sed proceris, & in terra stratis, digitorum duorū magnitudine, similibus Anchusæ, radicē ipsam præueniē, purgandi uiribus, sed exiliter. Alia uidet herba, quæ uocat Oxysa Plinio, etiam si folia æque terna habet: quippe quæ non purget, sed contra potius adstringat, & ad stomachū dissolutū, & Enterocleas in cibo detur. Proinde sunt, qui Oxyn putent esse, quam uulgus Tauram, & Triada, hoc est, Trinitatē, & Sphragida, hoc est, sigillum Solomonis appellauit, folio triplici, aut uno potius in terna disposito, radice capillamētis multiplici, flore cū maculis quibusdam candidis ceruleo. Est & Ophrys Plinio herba denticulato oleri similis, folijs duobus, quæ capillū inquit denigrat. Est & Mamiras herbula cuiusdam radícula, ut Paulus notat, geniculis frequentibus nodosis, albugines, & cicatrices exterens, atq; comminuens.

E X M. V E R G. C O M M.

Rosæ, quas Græci Rhoda nominant, non Rhodus insula radici huic nomē fecerunt. Quæ autem, & cuius plantæ radix ea sit, legisse me hætenus non memini. Nec integrū undiq; caput hoc uidetur. Desyderatur enim in eo aliquid: præsertimq; quo loco hic ait, Imponitur cū Nardo tenuis, & mox fronti temporibusq; inspergitur. Duplex remediij ratio docetur: ut imponatur capiti scilicet, & inspergatur ea frons, temporaq;. Verum in utroq; desyderatur aliquid, quo scilicet addito liquore inspergenda sit fronti & temporibus. *μειγμένη* enim participium, quo hic usus est, id exigit.

¶ De Equiseto.

C A P. XLIX.

ἑκινέριον

Equisetum Græci Hippurin, alij Trimachion, alij Anabasin, alij Cheredranon, alij Phædran, alij Itiandendron, alij Gis, alij Sceniosstrophon uocant. Aegyptij Pherphram, Magi Saturni cibum, Romanij Equinalem, alij Equi salicem, aut Anabasion, alij Ephydron. In risguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se farcti, rubescences, scabri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublimē Equisetum attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis eius spissare. Quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. Prodest dysentericis in uino potus. Vrinam cit. Sanguinolenta uulnēra glutinantur, tritis folijs & illitis. Tussim, orthopnceam, ruptaq; ad-

iuuat. Folij in aqua potis, diffeciones uelicae & intestinorum, enterocoe
laeque in unum coalescere, cogique feruntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Hippuris, Equisetū, & Equiselis dicitur a latinis, inuisa senescis, nascens in pratis. Est autē pi-
lus terrae, Equinae setae similis, ut nostri tradunt. Graecorum aliqui Pinū folijs nigricantē, eodem
noīe appellant. Hanc uero, quae hic describitur, folia habere pauca, tenuia, exigua, iunceas co-
mas, semen rotundū, simile Coriandro. Nasci in arbutis maxime, auctor Plinius, hanc herbam
Dioscorides a Romanis Salicē uocari tradit: de qua fortasse Verrius, homo doctus apud Festū
intellexerit, cū diceret, uirgulti genus esse Salicē: non ridicule, ut idē Festus carpit, interpretatus:
quod ea celeritate crescat, ut salire uideat: quā Graeci quique hanc & Iteamdendron, & Anabasin a Salī-
cis quadā similitudine, & a scandēdi more uocitant. Alio loco Plinius, Ventoso tractu nascit,
ingit, scanditque arbores, et ppendentē ex ramis, folio nullo cirris nūerosam, qui sunt lunci gen-
culari, radice pallida. Nec mirū sit alicui, quod folia modo pauca, modo nulla tribuant. facit hoc
& auctorū, quos secutus est, et locorū, atque temporū diuersitas. Hanc ipsam Cauēū, siue Dau-
cum uocari legas in alioque codicibus: uetusta tamen exemplaria id uocabulū non habent.

E X M. V E R G. C O M M.

Si uideat nascentē aliquis Equisetū herbam, exeuntēque ex terra aliquot diebus contēpletur,
nūcque unde futura sit equina cauda in ea intelliget: tam breui, nudo, concretoque oritur aspara-
go & scapo. Nullibi dissimiliore naturā finem, quā in hac planta a suo principio fecit. Oritur em
humani pollicis longitudine, crassitudineque in acutū fastigiata: mox procedente tēpore pandit
concretus ille scapus, pandensque se per interualla, & inter ea certis spacijs iunceā folia, & quasi
capillamēta quadā profert: quae dum augētur, undique ad terrā feruntur, eadē gracilitate qua in
equina cauda pili sunt: quā non potest ostendere, nisi cum aut uiuens prona pendet ex alto, aut
secta ad terrā inuerso cacumine descendētibz iunceis & capillatis folijs illis, totā equinae cau-
dae imaginē reddit. Nota oībz planta, & qua nulla in fossis, ppe aquas umbrosos locis frequē-
tior nascit. Anabasin ab ascendendo aliqū eā dixerunt: quā infirma alijs stirpibus libet hærere.
Charadrānon itidē, quod in fossarū faucibus, quos Graeci χαράδρας uocāt, ortus & uita illi sit. Nec mi-
nus Ephedrom ob eandē cām, nihil em aliud, quā ἐν τῷ ἑδατοῖ, i. in aqua Ephedron significat.
Vocauerūt aliqui etiā Schoeniosrophon, quod iunceā eius folia illa non aliter, quā Cannabis, aut
Linū in funes texunt. Graeci Salicem arborē, & Romanī Salicē equinalē ob hanc ipsam causam
uocauerūt. Plinius lib. 18. cap. 27. inimicā senescis & inutilem pratis dixit: mox lib. 26. cap. 14.
iterum de ea agens, non cōuenire inter graecos, nec cum graecis latinos ait. Vulgaris tamē de-
scripta a Dioscoride hoc loco herba est, oībz locis cognitu & inuentu facillima.

De altero Equiseto.

CAP. L.

Alterum Equisetū, quod aliqui Equition, alijs Chedran, alijs Gy-
non appellant. Caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanī. Co-
mis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum a-
ceto tritum, uulneribus remedio est. Eademque fungitur facultate.

B A R B A R I C O R O L L.

Sciendum Hippurin uocari & piscem quandam, siue Hippurea: quem aliqui etiam Cory-
phaenem cognominant. Differt ab hoc, qui uocatur Hippus, ab Epicharmo dictus Ispidion,
siue ut legunt aliqui, Ispidion.

Differt a priore Equiseto posterior hanc solā comarum breuitate, candore & mollicie: quae
maiores in hac, quā in illa notae sunt: ideoque facillimae utraque cognitionis: desiderat solū, cui
aequalem hic caulem eius dicat, congeneris ne sibi antedictae, an alterius plantae alicuius? In-
certum id est. Igitur em hic tantū ait, eamque ob cauillam uitij nota signatus locus a nobis est.

De Cocco, seu Infectorio.

CAP. LI.

Coccum quo infectores utuntur, frutex est surculosus, paruus, cui
grana ceu lentes adhærēt, quae electa congeruntur. Optimū gi-
gnitur in Galatia, et Armenia. Deinde Asia, & Cilicia. Vltimus ex omni-
bus Hispanicus. Vis huic spissandi, Vulneribus neruisque praecisis, con-

A

Pli. li. 26. ca. 13.

B

VERG.

κοκκος βαφικος

D I O S C O R I D I S

Cuenienter ex aceto illinitur. Nascitur quoque in Ciliciae Quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum uocitant.

Plin. li. 9. ca. 41.
B A R B A R I C O R O L L.
Differt Coccus Baphica, hoc est, granum tinctorium, a Cocco Gnidio, siue Grano Gnidio, ut apertissime constabit Galenū, & utriusque notas contemplantibus. Magnitudo huic, id est, Gnidio Grano, piperis maior, uis ardens, rotundum, rubensque est colore Cocci. Frutex, qui hoc ferat, Thymalea, siue Chamælea dicitur. At qui tinctorium granum gignit, aut priuatim Coccus dicitur, ut Dioscoridi placere uideo: aut Illex est Aquifolia. Granum inquit hoc Plinius, rubens est, primumque ceu species frutices paruos Aquifoliae Illicis. Quisquiliū uocant, Pensionē alteram, tributi pauperibus Hispaniæ donati. Est enim Illex gemina, ut Columellæ placet. Minor, apibus quæ sita, & prolixior, ab oibus improbata mellificio. Omnes inquit Plinius, roboris dotes, Illex solo prouocat Cocco. Granum hoc Galatiæ, aut circa Emeritā Lusitaniam in maxima laude inquit habebatur. Gignitur & in Africa, & Pisidia. Pessimū in Sardinia. Est autē genus ex eo inquit in Africa fere, & Asia nascens, celerrime in uermiculū se mutans: quod ideo Scolerilon uocabant: improbabantque Limaci parue similes: culici, ut Dioscorides affirmat, & Pausanias: qui fruticem hunc in Locride copiosum ad Ambrysom Rhamni amplitudine, præterea Lentisco similem, nigriore tantum, & molliore folio describit. Fructu Solani quidem specie, sed Erui magnitudine. Colligendum præcipiunt antequam uermiculus is nascatur. Galatæ, qui supra Phrygiā sunt, gentilitur Liyg uocant. Eum fruticē Iones & Græcia tota, Coccū. Anniculo itaque Grano, succus ad pigmenta languidus. Quadrimo euanidus. Ita nec recenti uires, nec senescenti. Colos inter Principales, Imperatorij tantum paludamentis dicatus: qualis in Rosa micat, & quo nihil aspectu gratius, & in purpura Tyrias, Dibaphasque, aut Laconicas: etenim Tyrio primum tinctas, mox & Cocco tingere mos erat, aut contra, ut fieret Byssinum. Nam & tertio, & quarto, & quinto saturabantur. Vnde nota illa uestium, monocoros, dicoros, tricoros, tetracoros, pentacoros in uitis principum. Sit autē granum Tinctorium, an Phœnicobalanus, atque Palmula, quod Hippocrates Phœnition Coccon, quasi granum puniceum uocauit, æstimaturis relinquo. Illud quoque hoc loco referendum est, Coicina quædam legi apud Græcos texta, quæ nostri ceu Coccina legentes, in Strabone rubra, conuerterunt. Cæterum Coicina dicuntur a Coice frutice in Aegypto textili: cuius mentio & apud Theophrastum est. Coix inquit, folio Harundinis angulari, ad nexus utilis, a quo & fiscellæ genus Coix attice, ut inquit Pollux, quod dorice Cois dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.
Coccum nasci in Illice Theophrastus lib. 3. de plantari hist. dixit, καὶ ἡ πρῶτος τοῖς φοινικαῖν κόκκον. Et Illex puniceum Coccum. Quæ Plinius secutus lib. 24. cap. 4. Coccū Illicis ait. Idem tamen multo antea lib. 16. cap. 9. dixerat, Seruato Illicis genere, priuatimque ceu species frutices paruos Aquifoliae Illicis. Ex quo genere hic fruticem paruū, furculosum dixit: qualem & nostra ætas in legendo Cocco, in Romanorum prouincia quotidie uidet. Barbarus, quæ græcos codices secutus fuerit, quos nos etiā uidimus, in quibus non legeretur μικρὸν, eam reliquit partē. Nos ex alijs græcis, Plinijque historia admoniti, eam seruauimus uocem. Paruos enim frutices ille ait, quæ hic ὁ μὲν οὐκ ἐστὶ μικρὸν φρυγανώδης dixit. Quod autē Dioscorides ait, hæere Coccū fruticibus his ὅς φασιν, id est, lenticularū modo, non ad formā Grani, sed hærendi modū referendum est. Nota modo, & vulgaris res, quæ etiā ex alijs nationibus laudetur. Quod postremo hic ait, in Cilicia nascentē in roboribus Coccum, minimis cochleis simile, ab incolis mulieribus ore auelli, aut excipi, parum certā & uerisimilem nobis habet historiam: neque intelligimus, in quē usum id fieri opus fuerit. Corruptum credimus esse locum, & pro illo τῷ σέματι, quod ore significat, aliter quondam legi potuisse, pertinereque ad tempus, quo legendus Coccus esset.

De Tragio. CAP. LII.
TRagium nascitur in Creta tantum insula, Lentisco simile, & semine, folio & ramis. Singulis tamen minoribus. Succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaque illitu spicula e corpore efficiunt. Omnia quoque corpori impacta, euocant. Pota stranguriæ medentur. Calculos uesicæ frangunt. Menses trahunt. Modus in sumptibus

ne est, drachma una. Fama est, syluestres capras sagittis confossas, eius **A**
hærbæ pabulo spicula excutere.

BARBARI COROLL.
T Ragon alij similem Terebintho faciunt, alij Iunipero per omnia: succo lacteo, qui spissatur in gummi, nascentem non alibi, q̃ in maritimis Cretæ. Dicitur & Tragonis.

EX M. VERG. COMM.
P Eregrino Italiæ, gentibusq; alijs frutici nomen in Creta insula tantū caprinum pecus fecit, ob eam quam hic in extremo capite caussam reddidit. Plinius Terebintho primum lib. 17. capite. 21. mox Iunipero. 27. uolumine, ultimo capite similem fecit. Ex qua hominis diuersa eiusdem rei historia facile est consicere, modo hos, modo illos delibasse eum auctores: ideoq; multis locis non esse earundem rerum eandem illi historiam. Idem liquorem eius lacteum esse, & in maritimis nasci dixit. Nos in peregrino, & ob id incognito frutice nihil habemus aliud, quod monere legentes ualeamus.

De alio Tragio.

CAP. LIII.

E St & aliud Tragium, quod Tragoceros aliqui uocant, alij Scorpi on, alij Garganon, Romani Cornulacam, Daci Saliam, Aegyptij Sober, Aphri Achæosim. Folia Scolopendrij habet, & radicem syluestris Rhaphani, tenuem, candidam. Quam crudam, uel coctam esse, dysentericis prodest. Folia autumnno, hyrci uirus olent: exinde sibi Tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

BARBARI COROLL.

T Ragon hæc minor est priore, nec in Creta solum, ut illud, sed multis locis nascitur, ut **B**
Galenus inquit.

EX M. VERG. COMM.

P Riori posteriorem hanc Tragion cognominem tantū faciunt Galenus, Paulus Aegineta, Græcorumq; alij herbarij omnes, & medici: neq; immerito. Siquidem foliorum figura differt, quæ in hac Scolopendrij, in illa Lentisci sunt. Differt natalibus: q̃ illa natium sibi solum habet Cretam insulam, hæc ut Paulus Aegineta ait, *φύεται πολλάχόθεν*, quod est, multis locis nascitur. Differt postremo uiribus: quæ in illa *ἰακτιναι*, id est, extrahendi sunt, in hac adstringentes: ideoq; fluidis affectionibus cunctis accommodata. Accedit his, q̃ hæc amarioris sapore est, qui in illa non sentitur. Cur autem illi idem factum a gentibus nomen fuerit, hyrcinum foliorum uirus fuit. Hanc ipsam Dioscorides Tragocero, id est, hyrcinū cornu dictā testatur. Facileq; est ex græca hac uoce, Romanā illam Cornulacā, quæcunq; ea est, factam fuisse. Scorpij deinde appellatio male ex Trago, quæ mox dicenda est, ad hanc translata fuit.

De Trago.

CAP. LIIII.

E St etiam hærbæ Tragos, quam aliqui Scorpion, aut Tragonon **tragos**
uocant, maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, ruffis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum grana decem ex uino pota, coeliacis, & scemnis fluctione uulua laborantibus auxiliantur. Tunduntur a plerisq; & in pastillos digeruntur, quibus utuntur.

BARBARI COROLL.

T Ragon Asia fert, ueprem ut Plinius dicit, sine folijs, racemis rubentibus, ad medicinæ dumtaxat usum. Hanc & in litoribus nostris gigni modo perhibent herbarij; Iunco marino si milem: a quo & Iuncum marinū multi uocant eam. Tragos alia est, quā nos Hyrculū uocauimus inter Nardos. Item alia Sitodes, hoc est, cerealis cognominata, inter frugesq; dicta.

EX M. VERG. COMM.

P Eregrina & hæc Italiæ planta est, si Plinio credimus, qui natale solū Asiā illi assignauit.

D I O S C O R I D I S

C duobus locis, eam describens. 13. uolumine, primū capite. 21. mox. 27. capite. 12. Quæ poterunt uolentes certius in eo uidere. In luncorum genere aliqui eam numerāt, nec dissimilem marino luncō in aliquibus faciunt. Plinius Veprem uocat, sine folijs, ramis rubentibus, semipedem altam, fruticosam, racemis rubentibus, grano tridici, acuto cacumine, in maritimis nascentem. Quæ eadem fere huic scriptori historia est.

De luncō. **CAP. LV.**
Oxyfchinos aliquibus Schinos læuis, alijs Oxypternos, alijs Solis superciliū, Romanis luncus marinus, aut Manualis dicitur. Duo eius genera. Vnū læuis nominati. Alterū acuti, qui in mucronem fastigia tur. Cuius etiā duo assignant genera. Vnū sterile. Reliquū fert semen nigru, rotundū, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est luncus, qui uocatur Olofchinos, prioribus carnosior, asperiorq;, qui similem fructū in cacumine parit. Semen utriusq; tostum, ex diluto potum, si sit aluū, & rubra fœminarū profluuiā. Vrinam cit. Capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia, tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorū morsus. Aethiopici lunci semine somnus allicitur. Sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

BARBARI COROLL.
Inco palustri, Græcos ad funes usos nomini credamus, quo herbā eam appellant, unde funambuli Schoenobatae ab ijs dicantur. Qui nauigauere in Indos Alexandri milites, luncos lapideos uidere per littora simillimos nostratibus. lunci uterū turgentem quodā cacuminis callo præferunt; mox coherencia quædā, uelut oua pariunt, pediculis circa spicaceis, in quibus uascula rotunda, leuiterq; hiscentia, & in ijs semen nigrū cuspidis effigie, non dissimile Asterisco, dumtaxat exilius, radice longa: quæ crassior multo sit, q; maribus cognominatis. Caput huic Cepis, et Gethyo simile, in tegumētis modice rubentibus. luncus palustris, hoc est, Schoenos Helios, in multa gña concidit. Oxyfchinos proprie est, quæ marinum luncū uocamus. Sterilem masculū existimāt, fœcundū fœminam. Is qui semen nigrū habet, Melancranis appellatur, quasi luncus atriceps, Melancræna dictus Straboni. Vnde funditoribus Balearicis, Amenta, quod & Phileta meminit. Hic sine alijs generibus nascitur ex suo semine: sicut is quem marem noiamus, ex semetipso, cacumine in terrā defixo. Nam Oxyfchonen, & Holofchonen, eodē cespite, contēplatum se Theophrastus, & admiratū scribit. Omniū radices singulis annis inter mori tradunt. Holofchonen Mariscū a magnitudine (ut puto) nostri uocant; quæ admodū & Mariscas ficus: auctore Festo, quæ Græci Busyca, hoc est, grandiores & fatuas ficos. Ob id & Sycomora esse quidā Mariscas uolunt. Hic & ad tegetes, ut Plinius inquit, & cetero uitalia utilissimus, quoniā mollis carnosusq; sit. Vfus omniū ad nassas marinas, nexus elegantia, lucernarū lumina, p̄cipua medullæ amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, ut inciso uentre, impleat pene unciarū latitudinē: in Aegypto uero cribrorū longitudinē, non alias utiliorē: ob id cribrū significatur, luncū effigiant, ut inquit Horus. Idem auctor, in Aegypto scribi luncis, nec aliter, affirmat. Videtur aut palustris luncus idē cum Scirpo esse, nec in fructu inquit Plinius, nec in uepriū cauliumue, neq; in herbarū alioque ullo q; suo gñe numerentur iure. Scirpi fragiles, palustresq;, ad tegulū & tegetes, e qbus detracto cortice candelæ luminibus, & funeribus seruiūt. Firmior quibusdā in locis etiā rigor. Namq; ijs uelificat, non in Pado tantum nautæ, uerū in mari piscator Africo, p̄postero more uela intra malos suspendēs. Et mapalia sua Mauri tegūt, p̄ximeq; æstimati, hoc uideant esse, quo papyri usu. Ob id etiā sunt apud nos, qui Scirpos interpretentur, q̄s Græci Biblos, id est, papyros uocant. Sed fruticosi gñis sunt Papyri, enodes, & sine fronde Scirpi, leues, proceriq;, ut Festus ait: unde prouerbiū quoq; natum sit, Nodū in Scirpo quæri. Habent Græci & alterū ex lunci nomine prouerbiū ὁ ξυρίων φεύγει. ἢ μισαίνων, hoc est, Fugit funiculū rubrica tinctū. Contra reos desidiæ, q̄ Athenis qui nō in tēpore ad concionē uenissent, rubricato fune in foro cōprehensi notabant, & multa Vestras schoeno delibutas, schoenicolas sordidas,

Quantū & rubricatās, hoc est, fūco litās intelligi uult eas. Est & in uerbo Schoenicola adagiū, *χίονος ἀντρίπυλον*, & ut sint quales Græci *χίονος* uocant, hoc est, spartū rodentes: qd itē de inerbis & nugarijs, ut Varroni placet, & alienum laborem frustra consumētibus, usurpāri solet. Notum est argumentum illius Oeni, de quo multa in castigatione Pliniana diximus. Scio qd dam intelligere, non Schoenum, id est, Spartum, sed Lentiscum, hoc est, Schinum rodi ab segnibus: quia prouerbiū id contra eos dici scribant auctores, qui nimio se comendi studio superfluant, ac dentibus extendendis & fricandis incubant: qualis in Lentisco Mastiche uis redditur. Sed schoenotroges tamē in omnibus Græcis codicibus, non schinotroges legas. Sunt q Schoenotroges a Scilla dictos putent, quā & Aristophanes, & alij Schoenon quoq; appellant, & dentibus prodesse constat. Vnde Schoenida Venerem cognominatam Lycophronij sunt qui credant, qd cibo eius accendatur libido: ut Schoenotroges, & Schoeniculas hinc quoq; dici meretricēs autumare liceat. Vel forte Schoenidas *ἀπὸ τοῦ σχοίνου*, quasi tabernicolæ. Nam & Alicarias, & Prostibulas uocabant, qd circa pistrinulas & stabula uersarentur, ut ait Festus. Scenicolas ab unguento ait pessimo uocatas, quod Græci Schem dicunt. Habetur & luncus Euripice uocatus, & Triquetrus, & Odoratus, in suas quicq; mentiones adeundi.

Euripicem non desunt qui Tropicem appellent inter recentiores: quorum pleriq; ut eruditionis suæ periculum faciant, multis partibus rei latinæ officiant.

De Lichene. CAP. LVII.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur. Asperginosis petris adhæret, ut muscus. Qui illitus sanguinis profluuia sistit. Inflammationes arcet. Impetigini medetur. luvāt regio morbo correptos, cum melle illitus. Oris & linguæ defluções inhibet.

BARBARI COROLL.

Lichen, siue Lechen est Muscus, de quo hic. Itēq; herba alia nascens in petrosis: nomine utriq; inuenio, quoniam contra lichenas, remedijs omnibus anteposuntur. Folium herbe unum ad radicem satum, caule uno paruo, longis folijs dependentibus. Vtramq; recentiores herbarij Epaticam appellant. Appuli herbam, cuius unum ad radicem folium haberi diximus, Iecorariam, siue Ficatellam cognominant, folio succi pleno, & crasso: ita nominatam, quia iocinoris fibræ similis aspicitur. Diuersa est eodem nomine apud nos, in littore passim nascens, & olitorio foro, leuiorū tempore uenalis, hederaceo fere folio, flore purpureo, Lilij pusilli effigie. Cōuoluit herba se quibus appropinquat. Solutū aluum cocta, & cruda oleris modo accepta. Sunt & Lichenes sui equis calli, de quibus secundo libro dictum.

EX M. VERG. COMM.

Eodem nomine malum, & mali remedium græci appellauerunt. Lichen enim impetigo simul, & qui impetigines sanat, herbosus in petris herens Muscus ab eis uocatur: magno argumento, nullo magis præsidio contra eas usuros esse hominēs. Sciendum tamen, proprium habere genus hunc Muscum ab eo, quo muscantur in torrentibus lapides diuersum. Hic enim in aridis nascitur petris, crassior aquatico illo, & procerior, umbrosis plerumq; locis, in saxosis rupibus herens. Vis illi est, ut ueteres græcorum medici decreuerunt, extirpando purgare, medicoriterq; siccare, & refrigerare. Idem, quasi pro comperto illis non esset, de cōpescendis sanguinis eruptionibus, in scriptoris huius fidem id reiecerunt.

De Paronychia. CAP. LVIII.

Aronychia alijs Adocetos, alijs Neuras, alijs Phrynion, Romanis Bouinalis, exiguus frutex in petris nascens, Peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita Paronychijs atq; duricij remedio est.

BARBARI COROLL.

Hanc, & Neurada cognominari docent auctores. Quid aut sit Neuras muliebribus malis quaesita Hippocrati, non liquet planē, *ἀπὸ τοῦ νεῦρον νεῦρον καὶ ἀλυσσὸν καὶ ἐμύρρον*. Nisi quis (quod & fere affirmo) non Neurin, sed Nerin, hoc est, Nardum montanum legat.

EX M. VERG. COMM.

Fecerunt & huic nomen abscellus, qui ad radices humani unguis sunt, Paronychia a græ-

A

luxiv

B

Pli. li. 26. ca. 4.

παρὼνυχία

Q

Cis dicti. His em praesenti remedio herba est: eamq; ob causam honoris huius praegatiua, ab antiquioribus herbarijs & medicis ornata, nec alio nomine quondam in uetere medicina cognita est. Describunt, effigiantq; eam nostrae aetatis herbarij, petrosi locis nascentem, ut hic etiam ait, folijs latifoliae Lauri: duobus, aut cum pluribus quatuor ramulis: inter quae spicatus flos exit, crassitudine pollicis & longitudine, colore inter flauum & luteum.

¶ De Chrysocome.

CAP. LVIII.

χρυσοκομη

Chrysocome, alijs Chrysitis, alijs Chrysanthemon, nonnullis Amaranthon, alijs Diospogon, Aphris Dubath, uel Buchumath, Romanis Iouis Barba, appellatur. Palmi altitudine fruticat. Coma specie corymborum, Hyssopo simili. Radice hirsuta Veratri nigri modo, tenui, Cyperum aequante, gustu non iniucundo, ex austero dulci. In petrosi opacisq; nascitur. Radix excalfacit et adstringit. His conueniens, quos iecur, aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes uuluae, decocta cum hydromelite assumitur.

BARBARI COROLL.

Chrysocome sine folijs, sine semine, solo scapo, comas habet, fulgore auri, unde nomen. Vocatur & Diosgenia, hoc est, Iouis barba.

EX M. VERG. COMM.

Quod haecenus in Plinio, latinisq; alijs legerim, nulla inter flores, herbasue Iouis Barbae nomine planta numeratur. Inter arbores quidem, is. uolumine, cap. 19. a Plinio his uerbis arbor describitur. Odit aquas, & quae appellatur Iouis Barba: in opere topiario consilis, & in rotunditatem spissa. Inter flores autem in Violarum genere. 21. uolumine, cap. 10. & 11. Iouis flos apte ab eodem uocatur. Coronat folio tantum Iouis flos. Pauloq; post. Succedunt illis aestiui Lychnis, & Iouis flos, & alterum genus Lilij, &c. Quinetiam. 27. uolumine, ca. 4. idem Plinius aut eundem, aut alium in Violarum tamen genere florem Iouis Flammam uocat. Quasi flos quem Iouis Flammam appellauimus in Violis. Dicimus autem alium, aut eundem eo nomine significari a Plinio florem: quoniam Theophrasto diuersi flores sint *Διοσκοριδιος*, & *φωσφ*, id est, Iouis Flos, & Flamma. Plinius autem saepenumero huiusmodi miscet, & in tanta naturae uarietate non semper illi respondet. Quae haecenus dicta a nobis sunt, ut ostendatur, quod in Diosco, nunc legitur Iouis Barbam dici, a Romanis Chrysocomon, in antiquis non inueniri. Plinius em int arbores manifeste Iouis Barbam numerat, seorsumq; a Iouis flore, & flamma Chrysocomem describit. Negat habere latinam appellationem. Quodq; magis animaduertendum sit, Iouis florem, flammamq; inter Violas censer, & sine odore esse: quod & Theophrastus itidem testatus est. Cuius floris nota, omnibus figura est longe a corymbis diuersa, quibus hic & alijs omnes Chrysocomem florere dixerunt. In Violis em singuli flores singulis pediculis, & aliqui ramulis nituntur: in corymbis uero uno pediculo plures. Illi singulares, & plerumq; grandiores: In his acruus magis, & ueluti grumus florum q; flos aliquis est. Licetq; in utroq; genere discrimina haec passim uidere. Ex his constituendum est proprium, & aliud a Violis genus habere Chrysocomem: quam Plinius Chrysitin uocari etiam ex eo ait, q; comantibus fulgore auri corymbis floret. Et haec tantum plantae huius legitimae appellationes sunt, caeterae falso, & ab imperitis illi accreuerunt. Qui enim potest Amaranthos, aut Chrysanthemos dici flos, qui auri fulgore comantibus corymbis splendet? Cum Amaranthus spica uerius purpurea, q; flos sit, & Chrysanthemos alius undiq; a Chrysocome describatur, quemadmodum non multo post a Dioscoride tradetur.

¶ De Chrysogono.

CAP. LIX.

χρυσογονον

Chrysogonon, aliqui Chrysospermon uocant, alijs Daspin, alijs Origanum, alijs Arcophthalmon, Romani Arilariam. Dense fruticat, quernis folijs, flore coronarij Verbasci. Radix ut Rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra, quae trita cum aceto, atq; imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

EX M. VERG. COMM.

Quale Chrysogonon hoc sit, & unde factum illi nomine sic appellei, nulli legiſſe me mini. Cæteri etiam græci, præſertimq; Paulus Aegineta, quo libro omnem numerat medicam materiam, Chrysogoni huius ad medicinam nulli meminit, Plinio itidem nulla inter plantas Chrysogoni uox est: ſimilem tamen Chryſocomæ, & alijs a colore auri appellatis nomen facit. Et ex quo hic ipſe ait Chryſospermon a quibusdam etiam uocari, conijcere licet, non in flore, ſed in ſemine auri colorem eſſe. Idem enim Chrysogonon, & Chryſospermon eſt, aurei ſcilicet ſeminis herba. Satis ex hiſtoria eius patet, qualis hic frutex ſit, & qua notarum ob ſeruatiōe deprehendi poſſit.

De Helichryſo. CAP. LX.

Helichryſon quidā Chryſanthemō, nonnulli & id Amaranton uocant, quo Lymphas coronant. Ramulū habet candidum, uirentem, rectum, firmum. Folia intercedentibus ſpacijs anguſta, Abrotono ſimilia, comam aureæ lucis, in orbem, umbella rotunda, ueluti ſiccis corymbis dependētib; radice tenui. Naſcitur in aſperis, & torrentium alueis. Contra ſerpentiū iſtus, coxendicum dolores, urinæ ſtillididia, ruptaq; coma e uiño pota opitulatur. Ciet meſes. Sanguinem concretum uentris ac ueſicæ abſumit, pota cum mulſo folia. Ieiunis, trium obolorum pondere, ſiſtit deſtillationes, data in uiño albo diluto. Veſtib; inferitur ut eas ab erodētium iniurijs tueatur.

BARBARI COROLL.

Helichryſos, & Heliochryſos a Theodoro Aurelia uocatur, ad ſolis reperiſſum, comantibus in orbem ſolijs fulgore auri, a quo nomen. Alij a uirgine Ephesia, quæ hoc flore prima coronauerit Dianam. Coronari eo & Deos Ptolomæus rex Aegypti diligentiffime curauit. Veſtes odore cōmendat non ineleganti. Exiſtimationem & gloriam parere coronatis flore credit, ſi unguento ſe perfundant ex auro, quod Apyron, hoc eſt, ignem non expertum uocatur. Flores cum Viola nigra uere. Flos auri modo fulget, radix ſummo terræ corio innixa folio cædido, caule tenui & duro, non ut Theodorus inquit, ſemine, qui carpon, non caulon in Theophrasto legerit. G A L E N U S hanc Amaranthi nomine ſignificat, nec aliter uocauit, ob id corymbos eius nunq; marceſcere, Plinius ſcriptum reliquit. Philoſtratus ex Amarantho coronari ſepulturæ quoq; ſolitas affirmat, idq; Theſſalos inſtituiſſe primos ad tumultum Achillis.

EX M. VERG. COMM.

Helichryſum Plinius in hiſtoria pluribus locis, in medicina lib. 21. ca. 25. Heliochryſum eandem aurei floris plantam appellat. Habetq; utriuſq; uocis certam primum ex natura cauſam, tum ex græcis ſcriptoribus, Poetas, Theophrastumq; autores: quorum illi Helichryſum, hic uero ſemper Heliochryſum in plantarum hiſtoria nominat. Diuerſitatis huius cauſa eſt: q; Helichryſum uocant, a quoſis & paluſtribus locis, quæ græci ἡλὶς dicunt, naſcentem florem indicant: qui uero Heliochryſum, quoniam ἡλίου Sol græcis eſt, ad ſolis reperiſſum aurea luce fulgentem ſignificant. Quæ illi natura eſt, non aliter q; multis alijs, quæ accedente ſolis luce, colores ſuos uariant, et eos qui non ſint habere uidetur. Quod hic ſignificauit, dicens χρυσοφάνη, id eſt, quæ aureo colore & luce ſe oſtendant. Sunt tamen qui utroq; modo enunciatum hunc florem a paluſtribus locis dictum fuiſſe uelint: neq; ἡλίοχρυσον, in qua uoce Sol eſt, uerum ἡλιδόχρυσον, in qua paluſtres loci audiuntur, ſcribendum eſſe. Quibus literis in Theophrasto ſcripta etiam nunc ea uox plerumq; inuenitur. Sed nos in melioribus obſeruauimus, a Sole id nomen factum. Acceditq; naturæ cauſa, quæ illi eſt, ut Plinius ait, ad ſolis reperiſſum aurea luce fulgere: quodq; hic ait χρυσοφάνη, id eſt, aureo colore uideri. Cuius euentus nō niſi in Sole cauſa eſt. Chryſanthemon eundem hic uocari a quibusdam ait ab eodem auri colore, ſed ex alio flore: de quo mox dicetur accepta appellatione. Quod ſola nominis, & coloris ſimilitudo fecit. Ad didit præterea, Amaranthum ab aliquibus Helichryſum etiam dici: non quia ſpicatus flos ſit, qualis eſt qui proprie Amaranthus dicit, de quo in Chryſocome dictum paulo ante eſt, ſed ab eadem longioris ſine detrimento uitæ natura. Quæ enim proprie Amaranthus a græcis nominata eſt, ſpica, ut præmoſtrauimus, uerius q; flos eſt, colore purpureo, ſine odore, auguſto men-

Q ij

C se proveniens, in autumnum durans: & qui, quod mirum sit, postq̃ defecere cuncti flores, m̃a defactus aqua reuiuiscit. Ideoq̃ antiquis hibernas faciebat coronas. Summa tamen eius natura in nomine est, ἀπό τοῦ μὴ μαρμεύειν, id est, q̃a nō marcescit a gr̃cis appellari. Ex qua nature ui, hic etiam ob similitudinem aliquam Helichrysum uocari ait, quia scilicet corymbi eius nunquam marcescunt; eamq̃ ob causam Deorum simulachra ad longioris temporis ornatum hoc flore antiquitas coronabat: quod cunctis gentibus adeo tunc cōmune erat, ut hic inter notas eius dixerit esse Helichrysum, quo Deorum imagines in templis coronantur. Galenus Amaranthi nomine, ob eam quam diximus causam, semper hunc uocauit: quemadmodum & spicam illam purpuream: ideoq̃ diligentius ex uiribus & usu in medicina discernendus in eo uterq̃ hic flos erit. Florere Helichrysum Theophrastus uere ait, una cum Viola nigra. Estq̃ locus ad extremum sextum eius de plantarū historia uolumen. Idē longius lib. 9. de eodem egit. Quē item a Plinio quoq̃ reddita lib. 21. cap. 11. fuerunt. Et quorum sit sensus. Gratiam, & uitæ gloriam sibi etiam acquirit, qui Helichrysi flore coronatus, unguento ex auro quod ignem non sentit se insperget. Habet autem Helichrysus florem auri colore, candidum folium, coliculum tenuem & durum, radicem in superficie terræ, eandemq̃ gracilem. Vtuntur ea cōtra morsus uenenatorum in uino. Vtuntur & ad ambusta, cinerem eius melle excipientes.

De Chrysanthemo. CAP. LXI.

χρυσανθέμων

Chrysanthemon, aut Chalcas, aliqui Chalchitū uocāt, alij Chalcanthon, alij Chalcanthemon, alij Buphthalmō, Romani Acanthan, Etrusci Garuleum, Aphri Churfeten. Hærbæ est tenera, fruticosa, leuēs proferens caules, & multifida folia, flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde nomen traxit. Propter opipida nascitur. Cuius caules oleris uice manduntur. Flores cum caratō triti, stēatomata discutere produntur. Regio morbo correptis, colorem breui reddit, si sequente longo balnei usu, post exitum ebibatur.

BARBARI COROLL.

Chrysanthemos, nec forma, nec uiribus a Buphthalmo superius indicata differt: uerba tantum mutata sunt, eodem manente sensu; ut ne Dioscoridis quidem caput suspicietur aliqui. Illud notauero, a Dioscoride quidem uocari hanc etiam Chalchitū, sed an sit eadem quæ Plinio Chalceon in uineis nascens, & iocineri trita imponi iussa, nescio.

EX M. VERG. COMM.

Nos aliquando cogitauimus, quasi nulla esset Chrysanthemus, aut si sit, eandē Buphthalmō esse, nullam capitū huius habere rationē: & q̃d nullū in re esset, nullū in labore hoc nostro etiam fore. Sed in contrariā traxere partē Chrysanthemī primū nomē, q̃d a Buphthalmo aliud Diosc. & Plinio est. Mox quē in Chrysanthemo alia a Buphthalmo sunt; habere. scilicet caules eius leuorē, folia incisuris diuisa, nō ut illa Fœniculi figura, & capillata. Postremo, olerū mō in cibos admitti: quod Buphthalmo neq̃ a scriptore hoc, neq̃ ab alijs tribuit: et q̃d in medicina relinquēdū nō est, Buphthalmi folijs cū cera sanari duricies tumoresq̃, Chrysanthemo aut priuatim Stēatomata. Accessit his etiā, q̃ nobis est pbatissimē & antiquissimē fidei gr̃ecus Diosc. multa toto hoc capite diuersa habet. Quā em̃ ceteri codices a Romanis Acanthā uocari Chrysanthēmō ostēdunt, ille Caltrā habet. Et quæ illi πολυγυδία φύλλα, hic προχιδία. Quodq̃ in floris pictura passim legit̃, ὁ ὀφθαλμὸν μιμνῶν, in eo non est. Sic etiam in medicina & remedijs, q̃ soli flores selē suffulsi mederi dicunt̃, in eo folia & flores legunt̃. Tantaq̃ est uarietas, tantaq̃ ex uarietate suspicio oritur, ut esse Chrysanthemon a Bouis oculo aliā credamus: et quē ex Bouis oculo illi ac creuerint, ab imperitis & ex similitudine diuersas plantas miscentibus, accreuisse. Variant em̃ in sermonis ductu, rerumq̃ serie scriptoris huius exemplaria: & quo antiquiora sunt, eo certiorē coniecturam faciunt, fuisse q̃ndam per se, & adhuc esse, Chrysanthemon a Bouis oculo diuersam. Accedit his Plin ius etiam uicesimo sexto uolumine, capite octauo, Chrysanthemum priuatim nominans: perisseque huic capitū quæ propria Chrysanthemī erant: successisseque illis ex Bouis oculo, quæ eius propria erant, facile crediderit aliquis. P. L. I. N. I. V. S. enim Chrysanthemo ad uesticæ uitia utitur, quorum nulla in hoc capite inter alia Chrysanthemī remedia ratio habita est. Qualia obseruari a nobis hæc potuerunt, talia etiam docentur. Cupimus tamen cuncta a nobis hoc capite dicta, suspiciones, coniecturasq̃, nō decreta haberi.

Nec enim alio consilio dicta longius a nobis fuerunt, quæ ut labore hoc nostro, quicumque is est, ad ueritatis eruscationem cæteri facilius proficiant. Qui illud etiam meminerint, credere nos cunctas Chrysanthemum adiectas appellationes, a uoce illa Chalca incipientes, alterutram habere rationem & causam. Aut enim ob luteum medium floris colorem, a simili & concolori æris metallo, quod greci chalcon dicunt, factæ fuerunt: Aut, quod nos magis probamus, quoniam Buphthalmo pariter, & eadem Chrysanthemos Chacra a quibusdam credita & dicta fuerit, ex eo nomine cæteræ illæ omnes Chrysanthemi appellationes, corruptæ tamen fluxerunt.

¶ De Agerato. CAP. LXII.

Ageraton fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano non dissimilis. Umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, Helichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. Huius uisæ nidor urinam cit, & uulvæ duricias emollit.

EX M. VERG. COMM.

In latinis sub hoc nomine nulla, quæ nota nobis sit, plantæ huius historia est, Greci uires discutiendi habere eam tradiderunt: & præter id, leniter inflammationes arcere.

¶ De Verbenaca. CAP. LXIII.

Verbenacam rectam, Greci Peristereona uocant, alij Trigoniō, alij Bunion, alij Hierobotanē, alij Philrodoten, Aegyptij Pemsepe, Magi Iunonis Lachrymam, nonnulli Mustellæ sanguinem, alij Sanguinem Mercurij, Romani Cristam gallinaceam, alij Pheriam, alij Trixalidem, alij Exuperam, aliqui Herbam sanguinalem. Nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbæ circa hanc per quæ libenter nersari soleant, Palmi altitudine, & interdum amplius adolefcit. Folia e caule prodeunt incisa, & subalbida. Ea singulari ramo, radiceque sola constare sæpius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosa ceo imposita, uuluarum dolores finire putantur. Ignem sacrum illita ex aceto reprimunt. Putrida ulcera cohibent. Vulnera glutinant. Vetera: quæ ex melle, ad cicatricem perducunt.

BARBARI COROLL.

Peristereon a Grecis uocata, quod columbæ in ea mansit. Item Peristerium, unde Columbaris uocatur. Itæ Lucinia, & Lufrago, & Militaria. Sunt qui Petonomō a uoluerū pastu noient, & a colorū uarietate Panchromon, a nostris Verbenæ, & Verbenacæ, siue (ut arbitror) corrupte Verminacæ dicitur. Item Ferraria, non feria, etiam si Dioscorides ita noiasse uideatur: quandoquidem secundum huius herbarum genus ab ipsomet Dioscoride Sideritis appellatur. Hac & Iouis mensa uerebatur. Verbenam porro & sagmina, Romani, hoc est, gramen ex loco sacro, præsertim ex arce Capitoli, cum sua terra euulsum, in publicis remedijs, & in sacris legationibus, cum ad hostem clarigatumque mitterentur, ferebant: coronatis ita fecialibus & patre patrato, uel fœdera facturis, uel bella indicturis. Sed omnes quoque frondes sacratas, purasque per abusionem Verbenas uocabant. Dioscorides duo facit genera, rectum, & supinum. Plinius marē, & foeminam. Mari caules reddendo plures & tenues, itemque cubitales & angulosos: demum quæcumque Dioscorides supinæ, nisi quæ rariora mari folia quæ foeminæ adijcit. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus tradunt. Vtraque fortunæ galli, & præcunt responsa. Hac perunctos, Magi putant impetrare quæ uelint, amicitias conciliare. Colligi circa canis ortum debere: ita, ut ne luna, aut sol cōspiciat, fauis ante & melle terræ ad piamentū datis: circūscriptam ferro effodi, sinistra manu, & in sublime tolli. Siccare in umbra separatim folia, caulem, & radicē. Vtriusque generis in planis aquosis nascitur. Diuisuræ foliorum utriusque similes quidem omnino quernis, sed maiores. Rectum erui præcipitur, sole arietis signum meante. Non quidē ad omnia, sed ad me-

Q in

A

ἀγράτον

περίστερον

B

Plin. li. 25. ca. 9

Cdicamentum illud, quod propterea Criogenes pastillas dicitur.

EX. M. VERG. COM. M.

Pli. li. 22. CR. 3

Nvlla in toto herbarum censu Romanæ nobilitatis plus habet q̃ Verbenaca. Vna enim hac domus purgabat, lustrabatur familia, & Iouis mensa ad sacrificium & epulas uerebatur. Vna autoribus Romani imperij, conditoribusq; imensum quiddam dedit. Non aliunde sagmina in remedijs publicis, & in sacris legationibus Verbenæ, q̃ ex hac genti illi fuere: qua corona ti ad hostes clarigatūq; mitterent: ideoq; sacra Herba uulgo dicta, & cognita. Romani Verbenacā, q̃ sola & p se uerbenas faceret, dixerunt, Gentij iura, & publicæ utilitatis causā secuti. Greci, quibus nulli feciales erant, nec idem in legatis ritus, naturam contemplati, Peristereona nominauerunt, a columbis, ut hic ait, facto nomine: q̃ hæc auis libenter inter eam uersetur.

ispa porden

De supina Verbenaca. CAP. LXIII.

Supinam Verbenacam aliqui sacram Hærbam appellant, alij Eriogenion, alij Chamalycon, alij Sideritin, quidam Curitin, alij Persephonion, alij Iouis colum, alij Dichromon, alij Callesin, alij Hipparison, nonnulli demetriada, Aegyptij Penphtheuphtham, Pythagoras Erysisceptron, Romani Cincinallē. Ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia Quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus castio. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitaue, aduersus serpentes pollent. Eadem drachmæ pondere cum turris obolis tribus, in uini ueteris hemina, quadragenis diebus ieiunore, contra regium morbum bibuntur. Veteres tumores, & inflammationes mitigant. Sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta tonsillarū crustas abrupit. Oris nomas gargarisatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, lætiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a terra geniculum, cum folijs circumdantibus, quartanis quartum. Sacram uocant hærbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

D

BARBARI COROLL.

Peristereon hyptios, hoc est, supina, frequentior est q̃ superior. Latissimus est quorundā error, existimantium Verbenam & Peristereon priorem esse: quam olitores Sclaream modo uocant: de qua ueteres nihil dixisse (quod sciam) uehemēter miror. Folium ei Betæ lanuginosum, serratumq; in modum cristæ: flos spicaceus, e ceruleo purpureus, odorata tora, & utilis. Nisi quis hanc Alektorolophon, id est, cristam gallinaceam interpretetur. Alektorolophos inquit Plinius, folia habet similia cristæ gallinacæ plura, caulem tenuem, et semen nigrum in siliquis. Mutat colorem, sed ex nigra albicare incipit, & intumescit, ac exit. Vtilis tussicibus & oculorū caligini. Solidum semen conficitur in oculum, nec turbat, sed in se caliginem contrahit. Hec Plinius. Hoc quidem ipsum facere uidetur semen eius, quam uocant herbarij Sclaream. Folio cristæ simili, ac nigro semine: uerum non in siliquis, sed in folliculis, siue capitulis post florem. Nisi quis siliquas in Plinio pro uasculis quibuscunq; accipiat.

EX. M. VERG. COM. M.

Superiorem Verbenacam greci, q̃ recto caule riget, Rectam: hanc q̃ deiectis in terram ramulis quasi iacet, Supinam uocauerunt. Nec solum inter eas hoc discrimen obseruatum ab illis est, sed, ut ex utriusq; historia licet eognoscere, plura alia sunt quibus inter se disconueniant: præsertimq; numerus, & longitudo ramulorum. Quod idem ambabus est, & quod cognominæ eas fecit, foliorū figura, & in folijs pares incisuræ sunt. Vidimus nos, quā nunc rectā Verbenacam dicunt, multo maiore altitudine q̃ dodrantali: contraq; Supinā longe brevioribus q̃ cubitalibus uirgis: & in utraq; q̃d in scriptore hoc nō legit, quadragulis ramulis: Rectā itidem singulari caule, sed non singulari radice: nisi hic unam eius radicē forte dixerit, quæ crassiora

his est: cæteras uero fibras & capillamenta magis q̄ radices esse uoluerit. In utraq; autē quod paulo ante diximus, eadem serrata, & quernis similia folia sunt. Visæq; nobis plantæ hæ sunt magis ad Plinij, q̄ ad scriptoris huius picturam accedere.

De Astragalo.

CAP. LXV.

Astragalum aliqui Chamæscen, alij Gatalen, alij Onyca uocant, Romani Pinum triuiam, aut Ficum terre, aliqui Glandulam, alij Thium, alij Nonariam. Astragalus paruus in terra frutex, folijs & ramis lupino similis, flore purpureo, paruo, radice rotunda, Rhapsani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, uelut cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in uentosis, opacis, & in uallibus. Eo Memphis Arcadiæ scætet. Aluum sistit radix in uino pota. Vrinam mouet. Vetustis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur. Sanguinem supprimit. Aegre propter duriciam tunditur.

Astragalus

BARBARI COROLL.

Astragalus aliter a Plinio describitur, folio longo, incisuris multis, obliquis circa radicem, caules terni, aut quaterni, foliorū pleni, flores Hyacinthi, radices uillosæ, implicatæ, rubentes, præduræ. Nascitur in petrosis, & Arcadiæ Peneo, siue ut Galenus & Paulus, Phæneo. Colligitur exitu autumni, cum folia amiserit. Siccatur in umbra.

Pli. li. 16. ca. 7.

EX M. VERG. COMM.

EX Arcadia, si forte adhuc nomine hoc illic cognoscitur, Astragalus repetenda. Italiæ enim aut nulla, aut tam rara modo est, ut a nullo cognoscatur. Nomen illi, ut uidetur, radix fecit rotunda, duraq;: & ob id animalij talo similis. Id enim Astragalus græcis est: a quo quibus pueri quondā luderent, non cubi, tesserae uel dicti sunt, sed tali: quibus Ganymedem & Cupidinē Apollonius finxit in cælo colludentes: & Plinius Astragalizontas Polydetti opus appellauit, in quo si Apollonij carmen lib. 3. in Medæ amoribus diligenter aliquis, ludicq; genus obserua uerit, uictoriae præmium potius q̄ fortunæ & ludi instrumentum Astragalos esse intelliget. Locutus in eo poeta uidendus his, qui in antiquitatis cognitione diligentiores haberi uolunt. Cur autē Astragalum hanc Chamæscen Græci, Latini uero Ficum terræ dixerint, in Chamæscen certius intelligitur. Radicis enim similitudo, cognomines, diuersas alioquin plantas, fecit. Vocant præterea ab eadem rotunda crassitudine Romani Glandulam, manifesta rei indicatio. Nasci eam nos in Phæneo Arcadiæ, non in Memphi diximus: quoniam nulla est Memphis Arcadiæ. Et Plinius in Phæneo prouinciæ eius oppido nasci testatur: & præter Plinium uetustissimi & optimi græcorum codices in Phæneo adhuc habent.

B

De Hyacintho.

CAP. LXVI.

HYacinthum aliqui Heloniam, alij Porphyranter, Romani Vascinum, alij Vlcinū uocant. Folia habet Bulbi, dodrantalem caulem, minimo digito tenuiorem, hærbaceum, comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam, radicem bulbaceam. Quæ ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Sistit aluum. Pota urinam impellit. Phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitur. Regium morbum emendat, cum uino potum.

Hyacinthus

BARBARI COROLL.

HYacinthi, cū Viola nigra eripunt uere, sed ante Rosam, ut fere oīa, quæ in coronas a mōtib; petunt. Exeunt & cū Gladiolo, sed eximie in Gallia, ubi & Hyacinthū eo tingit. Nā colos in ueste Hyacinthinus, nō ex hoc tantū Hyacintho, ut fere credit, sed e Viola, q̄ syluestris Hyacinthus quoq; dicit, traxisse nomē uidet, Plinio utiq;. Nisi q̄s in eo Ianthinū malit, q̄ Hyacinthū legere, ut Martialis, Coccinea famosæ donas, & Ianthina mœchæ.

Pli. li. 21. ca. 11.

Q uij

C De quo in castigatione Pliniana diximus, Hyacinthi & albi & ferruginei, hoc est, cerulei uisum tur. Nam & lapis frutici cognominis ceruleo nitore fulget, ut Solinus inquit, ut qui colorē cœli dixerunt Hyacinthinū, de ceruleo uideant accipisse. Porro tam syluestres, q̄ urbani plurimū durant. Comitatur florē hunc duplex fabula, luctum præsens eius, quē Apollo dilexerit, aut ex Aiæis cruore editum: ita discurrentibus uenis, ut græcarū literarum figura ea legatur inscripta. Pausanias florem qui natus sit extincto Aiæe apud Salamina, credi refert editum primo, nec Hyacinthū, sed literis Hyacintho similem uideri ex cædido rubentē, ac Lilio minorē. Idem auctor Cosmofandalon dici florem apud Hermionenſes Trœzenjſ confines, quem ipse Hyacinthū uidetur interpretari. Eo flore coronatos festa, quæ Chthonia uocāt, agere. De Cosmofandalis & Cratinus & Clearchus. Palladius Hyacinthum, & Irim, & Gladiolum a similitudine foliorum uocari dicit. Qui Seruium grāmaticum accusant, q̄ Hyacinthum esse dixerit, quē Virgilius Vacinium in carmine uocari, Dioscoridem accusant, affirmantem Hyacinthum a Romanis Vacinium appellari. Plinius quoq̄, Vacinia inquit, aucupjſ Italiæ ferūtur, Gallia uero etiā purpurea tingendis seruorū uestibus. Item alibi. Transalpina Gallia herbis Tyrium atq̄ Conchylū tingit, omnesq̄ alios colores. Item alibi. Mire inquit Hyacinthus in Gallia pro uenit: quo ibi pro Cocco Hysginū tingitur. Est autē Hysginus color, a quo Græci uestes Hysginobaphes appellant, hoc tinctas colore. Quo fit, ut reſcēſerit grāmaticus hac parte, Vacinium Maroni pro Hyacintho acceptum fuisse. Nec obſtat, q̄ nigra dicat pœta: quando purpuream quoq̄ Violam, est ubi auctores nigram uocare soleant.

EX M. VERG. COMM.

Palladius primo sui operis uolumine, capite. 37. Hyacinthum cum Iride his uerbis miscuit, Hyacinthum, qui Iris, uel Gladiolus foliorum similitudine dicitur. Obijciat forte mihi hoc loco aliquis, non esse multum Palladio tribuendum, nec posteriori scriptori, & qui degenerante iam declināq̄ latini sermonis candore scripserit, contra antiquiorum dicta fidem habendam. Multa enim in eo sunt, præter multa etiam contra Romanorum uocum proprietatem, dignitatēq̄. Fatemur id nos, concedimusq̄. Non tamen adeo negligendus scriptor, nec tam longo intervallo ab antiquitatis candore illo distans, ut non uestigia saltem in eo, & coniecturæ aliquæ superſint, quibus deprehendi antiqua ueritas possit: accedentibus præsertim meliorib, & antiquiorum scriptorum testimonijs aliquibus, & rerum necessitatibus. Cogitandum illud etiam in nominum mutationibus, quæ quotidie a generibus fiunt, sic plarunq̄ priora nouis cedere, ut aliquæ semper superſint in nouitate uetustatis reliquæ: aut mutationis saltem causæ in illis intelligantur. Neq̄ ut inquit Hesiodus, penitus uanam perire famā illam, quam, ut ipse ait, multa famigerant gentes. Isq̄ ego sum, qui non facile persuadeat, quæ de Iride & Hyacintho dicta a Palladio eo loco sunt, temere penitus dicta existimari debeant: sed ut in huiusmodi sit, mutata penitus nominis potius, q̄ rei æstimatione, quod fuerat commune Iridi & alteri flori, Hyacinthi nomen aliquando, quo tempore ille scribebat, ad solam Irim contractum fuisse. Vtorq̄ ad hanc rem huiusmodi coniecturis, Columellæ primum auctoritate: qui eo quo diximus libro & capite de Apium passionibus agens, & quibus floribus præcipue gaudeant, & generosum mel conficiant, inter cætera Hyacinthum numerauit: addiditq̄, celestis numinis: quæ duæ uoces in graui scriptore non aliam ut credimus habent rationem, q̄ ut Hyacinthum, quem ille Apibus circa aluearia conſeri iubebat, ab alio, uulgariq̄ Hyacintho, & inutili Apibus, ea honoris nota diſtingueret: appellasq̄ Hyacinthum celestis numinis, quem Palladius dixerat, Hyacinthus qui Iris & Gladiolus dicitur. Neq̄ immerito maleue Irim Hyacinthum celestis numinis dixisse credi potest: quando Iris celeste numen est Iunonis nuncia, & inter celestia phænomena ex admiratione hominum diuinitatis particeps. Nec aliud, iudicio nostro, intellexisse ea nota Columella uidetur, q̄ non esse simpliciter Hyacinthum circa aluearia conſerendum: sed Hyacinthum celestis numinis, id est, is qui a celestis numinis nomine etiam indicatur. Ratiocinariq̄ (si sic intelligendus Columella sit) oportet, cōmunē Hyacinthi quondam nomen, & Iridi & Hyacintho priuatim dicto fuisse. Nec tantum duobus his floribus, sed figura Iridi similibus, licet colore diuerso plarisp̄ alijs. Quod ex eodem Columella in carmine suo manifeste cognoscitur, cū ait, Nec non uel niueos, uel ceruleos Hyacinthos. Quo colore flores Hyacinthi nomine indicari proprie non possunt. Siquidem purpureo flore Hyacinthus, non candido, aut ceruleo est. Credimusq̄ nos, in Hyacinthis quondam euenisse quod in Violis: in quibus quemadmodū in lasme primo uolumine testati sumus, figura, florisq̄ forma, non color genus faceret. Sed hoc latius patet, q̄ res nostra modo exigit.

De Papauere erratico.

CAP. LXVII.

A

MHNH fida

Papauer erraticum, quod Rhœam uocant, nonnulli Oxytonon, Romani Papaueralem, Aegyptij Nanti, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. Folia Erucae, aut Origano, aut Cichorio, aut Thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra. lunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris Fremij, puniceus, interdum albus, oblongum caput, sed q̄ Fremij minus: semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq; aut sex, in uicini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersuolus est. Semina acetabuli mēsurā ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt. Ad idem præstandum mellitis rebus, & dulciarijs ammiscetur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorundem foru & perfusione, somnus allicitur.

BARBARI COROLL.

Papauer Rhœas, hoc est, erraticū, capite, ut Theophrastus inquit, unguis pollicaris amplitudine. Legitur uiridiusculū ante messē ordeī. Hoc & satiuus ascribitur: q̄q̄ inter syluestria & satia melius fortasse, quasi medium constituas, quoniam sponte quidem, sed in aruis nascatur. Admonendi tamen sumus, Rhœadis cognomento non hoc tantū Papaueris genus uenire solitum, sed & alia duo syluestria, ut mox liquebit: hoc quoniam flores eius breui decidant, illa quoniam fluat ex ipsis, conuulnato scapo succus lacteus, Opion appellatus.

EX M. VERG. COMM.

Comparatur in scriptore hoc inuicem Papauer erraticum hoc, & Anemone, de qua secundo volumine a Dioscoride, & a nobis actum longius est. Et ut in similibus sit, quorū reciproca notæ sunt, Papaueri huic eadem dicta & credita Anemone est, Anemoneq; contra Papauer hoc, illa agreste nigrumq; Papauer, & Meconium uocari dicta est, hoc manifeste syluestri Anemone simile dicitur. Præsentī nec negligenda dubitatione, quales duo hi flores sint, quibus locis inueniendi, quibusq; nominibus priuatim indicandi, & quod tota hæc res modo exigit, quod dñā Papauer hoc erraticum sit. Diximus in Anemonēs cōmentationibus nostris longius, quæ tunc pro illa dici potuerūt. Inter quæ præcipuū illud fuit, non uideri nobis, priuatim Anemonēs uoce, rubrū Papauer (sic em̄ modo erraticum hoc appellamus) indicari posse: quoniam quæ de Anemone in antiquorum cōmentarijs legeretur, rubro Papaueri non omnia competere: ideoq; credere nos, aliā ab illo Anemonē esse. Vsq; post multa alia ad eam rem sumus capitū huius, & in eo erratici Papaueris historia & descriptione. Quæ tota eius esse floris manifeste cognoscitur, qui rufū colore, & aliquādo candido, paucissimis folijs, sed his amplioribus, quocunq; pulsu & iniuria deciduis, in triticea & hordeacea segete, Maiō præsertim mēse floret. Nihil enim naturæ exemplari illi in hoc scriptore deest, qui multa breuitate complexus omnia est: deciduū protinus florem, uernos ortus, natalem locū, arua & segetes, & quæ alia illi ab eadem natura accepta adscribuntur. Quodq; animaduertat aliquis, sponte sua nasci: cum præterq; Papauer omne satiuū sit. Quod solum afferri contra possit: crediq; utilius, aliquod Papaueris hoc genus esse illud est quod hic ait. Quo tempore etiam colligitur, cuius laboris & operæ nulla est in erratico hoc nostra ætate ratio & usus. Sed non est ex usu hominum ratio in natura accipienda. Mutatur enim quotidie quæ homines agunt, placuitq; quondam quod nunc in nullo honore est: rursusq; multa in honore modo sunt, quæ futuris seculis, aut nulla, aut inutilia habebuntur. Præterea si seruandum semen eius ad medicinam & dulciora fuerat, tunc legi oportebat cum maturuisset. Meminisse illud etiam necesse erit, cum ab Anemone diuersum Papauer hoc ostēdere aliquis cogitabit, in toto Papauerum genere florem in purpureo candidum esse, abundareq; in eo candorem, in hoc autem rufum, aut album colorem totum esse: in hoc oblongum caput describi, breuiusq; & minus q̄ in Anemone. Quod si recipiendum est, manifeste indicat, Papauer hoc in aruis, & in segetibus nascens illud esse. Nullum em̄ inter Papauera omnia minore capitulo est, Quod intelligens Theophrastus, ma-

Pli. li. 19. ca. 27.
19. cap. 8. 20.
cap. 18.

B

Cognitudine humani unguis esse dixit. Meminerit etiam, in Anemone plures numerari colores: in hoc autem duos tantum, rufum, & candidum: & ne longiores simus, plura alia inueniet discrimina, quae collata inuicem, duorum florum duplici historia facillime deprehendentur. Nos interim ex Theophrasto libro nono de plantarum historia, monebimus iisdem notis, omnibus idem hoc Papauer, & his uerbis describi. *ἡ τῆρα δὲ μέγαν φοῖτον καλονομένη, παρομοία κίχου ὅτι οὐκ ἔχει ἰσθμὸν, ὡς οἱ ἄλλοι, ἐν ταῖς ἀρούραις δὲ φύεται, καὶ μέγιστα ἐν ταῖς κριθαῖς. ἄνθος δὲ ἔχει ὑπερόν, καθὼς δὲ ὁ σπὴν ὄνυχας τοῦ δακτύλου. συλλίγεται δὲ πρὸ τοῦ θρίσιμου τῶν κριθῶν ἰμχλωροτέρα δὲ μέλλον.* Quorum sit sensus. Alterum uero Papauer, quod Rhœada uocant, syluestri Cichorio simile est: eamque ob causam comeditur. Nascitur in aruis, maximeque inter hordea. Florem habet rubentem: uasculum quantitate unguis digiti. Colligitur ante demessum hordeum uiridior adhuc. Non potest Theophrasti historia hac aptius quicquam ad hanc rem excogitari. Cur autem Graeci Rhœada Papauer hoc nominauerint, causam hic attulit: Quia protinus folia illi decidant, non plantae, sed floris. Nihil enim minus hoc flore tenax est: & ἀπὸ τοῦ εἶναι, quod est fluere, φοῖττα Papauer hoc dictum fuit. Latini, ut hic inquit, Papaueralida diminutiva in graecis forma appellauerunt. Sed haec posterior uox est, & in latino nomine a graecis formata. Plinius erraticum Papauer uocauit, eadem ratione qua cetera in plantis erratica a latinis dicta fuerunt, sponte sua passim, incultisque locis, & nullo humano opere nascentia. In comparatione foliorum deinde, credimus abundare insertas imprudenter ab aliquo plantas aliquas. Theophrastus enim syluestri tantum Cichorio comparauit.

De Papauere satiuo. CAP. LXVIII.

Papauer satiuum aliqui Chamæscycen, alij Oxytonon appellant, Romani Papauer, Aegyptij Nanti. E satiuo genere, quoddam hortensium est, cuius semen in panem densatur, qui sanis in usu sit. Eo etiam ex melle pro Sefama utuntur. Thylacitin uocant. Capitulum habet longum, & semen candidum. Syluestre uero, caput insidens, demissumque, & nigrum semen. Quod Pithitis nominatur. Nonnullis tamen & ipsum Rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas ualentius, multo his longius, productiore capitulo. Omniū in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra uigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus ammitti, ignibus sacris, & inflammationibus profunt. Tunduntur quoque uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque in aqua coquuntur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriae fluctuationibus, & coeliacorum affectu, doloris leuamentum praebet. Efficacius tamen redditur, addito Hypocystidis succo, & Acaecia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra citam alui, & foeminarum profluvia. In peruigilijs fronti, temporibusque illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturque. Sumptum Erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit. Tussi atque coeliacorum ualitudini auxiliatur. Verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis, cum rosaceo perfusum efficax est. Aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. Inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit. Igni sacro, & uulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulierum.

eris, & croco. Somnum accersit, subditum sedi pro Balano. Optimū habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumosum, quod inter colandum non ut cera cōeat, & in sole diffundatur. Dein ad mortū luscernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris uim conseruet. Sed Opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit: lactucæ vero succo fictum exiliter spirat, & asperius spectatur. Gūmi uitiatum, splendet, & infirmū est. Nec desunt qui eo dementiae deuenierint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur, ad oculorum medicamenta, dum mollius, atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus auctor est, usum eius damnauit, oculorū lippitudinibus, & aurium uitij infundi uetans: quoniam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illi tose eo, protinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum dumtaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret: alioqui nobis, ut noxiū interdicat. Quæ cōmenticia esse, experimentoprehenduntur. Siquidem effectus uiriū huiusce medicamenti, fidem faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quo nam modo is excipiatur succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo expriment, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id Meconium uocatur multum Opio ignauius. Porro Opij faciundi ratio hæc est. Cum ros in eo exaruerit, cultro circumdante asterisco, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeuntem, digito in concham abstergere. Nec multo post redire, ut concreta inueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pile teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

BARBARI COROLL.

Satiū omne magis rotundat capita: id syluestri longū, ac pusillum, ad effectus oēs ualentissimum. Optimū in siccis, & ubi raro pluit. Papaueris satui tria fecere gēna. Candidum, cuius semen totum in secunda mensa, cū melle tragematis loco edebatur. Hoc, & panis rustici crustas, ouo affuso cōmendabat. Alterum nigrum, cuius scapo inciso lac exprimitur. Tertium Rheas, de quo diximus: q̄q; nisi maturuisset, edomitum existimari nullo modo posset. Galentis & Dioscorides Papaueris genera sex enumerant. Rheada, Ceratitin, Aphrodes, Satiū, siue Thy lactin, & duo alia syluestria. Capite sessili unum: oblongo alterum: quæ & Rheadas uocant alii: propterea q̄ e duobus ijs quæsitum lac, scapo inciso fluat. Differt Meconit ab Opio, si proprie loquaris, sicut apud nos succus a lacte, qd & sapor, & lachryma quoq; dicitur. Succus & Meconion uocat, qui decocto, uel crudo Papauere, ut in ceteris exprimit. Lac uero & Opion, quod caule inciso manat e Papauere nigro, ut Diagoras suadet, cum turgescit, ut lollas cum deflorescit. Incidi iubent sub capite & calice: hec in alto genere ipsum inciditur caput. Humor, hic, & herbæ cuiusq; lana excipitur: aut si exiguus est, ungue pollicis, aut lactucis, & postero die magis, quod inaruit pastilli siccantur in umbra. Accenditur syncertū difficiliter, et crebro extinguit. In aqua innatat nebula. Aestiuo sole sudat, et se diluit, donec simile recenti succo fiat. Confictum in posca cōst. Mnesides optime seruari putat, Myoscyami semine adiecto. Alij in Faba. Adultera hoc Alexandrij. Thebanū Opium celebrari ad multa uideo: p̄sertim in collyrijs duobus, q̄ Lynceus, & Proteus, ab Aegineta Paulo co-

Cognominatur. Sicut Hermolaus & Antoninus, ab Aetio, in quæ non Opiū modo, sed Acacia quoq; poscit ad repercussum. Achæicū quoq; Asianūq; Opiū auctores Græci noiant.

De corniculato Papauere. CAP. LXIX.

ΜΑΚΩΝ ΚΙΡΑΤΙΤΙΣ

Papauer, Ceratidem, id est, Corniculatum, aliqui Paralion, alij syluestre Papauer, alij Thalassion, Romani Fabulum marinum, Aphri Sisimacam uocant. Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, in ambitu syluestrium Papauerum more ferrata, caule non dissimili, flore luteo, calyculo Fcenogræci, in corniculorum modum inflexo. Vnde nomen mutuatur. Semine Papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanat. Prodest his, qui crassa quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulla posito. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq; Argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergunt. Sunt qui Glaucium, hoc Papaueris genere facitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Qui hoc Papauer hauserit, non alia accidet, q̃ qui Opium ebiberit. Cui eiusdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radice bibitur cum uino, sanatq; dysenteriam.

EX M. VERG. COMM.

DPapauer ceratidis, siue ceraticon, hoc est, cornicularium, syluestre est, cubitali altitudine, folio Verbasci nigri, minus atro. Radice breui & corticosa. Tempestiuum messibus. folia huic minora & tenuiora, q̃ cæteris syluestribus. Nascitur & nitroso loco, & Glaucion a quibusdam appellatur, haud proprie.

EX M. VERG. COMM.

VNus satis Theophrastus est, ut cornicularis Papaueris huius historiam, & tot nominum eius in græcis rationem intelligamus: qui, 9. de plantarum historia inter agrestia numeratum his uerbis descripsit. τὴν τὴν τοὺς πολλοὺς ὡς φέροντες τὸν μέλαινα ἔχον, διὰ μέλαν. τοῦ δὲ καυλοῦ τὸ ἑλκὸς ὡς πικρὸν. ἴσα δὲ βραχὺα καὶ ἐπιπλάσις ὁ δὲ καρπὸς καμπύλος. ὡς τὴν κερτίαν. εὐλόμεται δὲ πρὸς πυροτομία. δύναται δὲ καθαίρειν τὰ καλὰ. τὸ δὲ φέλλον ἔρριμα προβάτοις ἐσθαρῶν. φέται δὲ παρὰ τὰς θάλασσας ὡς ἐν τῇ περὶ τὴν χώρα. Quorū summa & sensus est. Huius foliū nigro Verbasco simile, minus tamen nigrum. Caulis altitudo cubitalis est. Radix breuis, & in summa terra hærens. Fructus inflexus, siliquis, quas Græci Ceratia uocant, similis. Carpitur per messem. Aluum purgat. Pecoris albugines foliū exterit. Nascitur ad mare petrosis locis. Ex his dubitauerit merito, quæsieritq; aliquis, ceratide ne hoc Papauer a cornuū figura simpliciter, ut hic ait Græci nominauerint. An ut in Theophrasto auditur, a ceratijs, quas latini siliquas græcas dixerūt, de qui bus primo uolumine actū a nobis est, quæ & ipsæ inflexæ sunt, & cornuū figura per longitudinem incuruātur. Multifacienda scriptoris huius auctoritas, aliorūq; omniū, qui eum secuti, corniculis fructū eius comparauerūt. Non spernendus etiā Theophrastus grauis auctor, & in disciplina plantarū cunctis alijs merito antefendus. Nobis in Theophrasti sententiā inclinat animus. Et si nullū in re discrimen sit, nec si cornibus, aut ceratijs cōparauerit Papaueris huius fructū aliquis, diuersam rem ostēderit. Ambo em̃, cornua scilicet, & ceratia in longitudine pro ducta inflectuntur: nec siliquæ illæ aliunde, q̃ a cornibus ceratia a græcis dictæ sunt. Ex eodem Theophrasto nouerit aliquis, etiā agreste Papauer hoc recte dici, cōmuni tamē agrestibus alijs appellatione. In eorum em̃ censu est. Nec minus quoniā ad mare nascitur Paralion: Id enim ea uox significat. Quā naturæ, nataliūq; eius notā secuti Latini, Fabiolū marinum uocauerunt: quoniā ad mare nasceretur, fabaceisq; siliquis in longitudine similia uascula sua ferret. Habere hoc Dioscorides ait folia λευκά, id est, candida. Barbarus quasi qui non λευκά, id est, candida, sed λευλά, id est, tenuia legeret, folia habere tenuia id dixit. Nescimus nos, an ex suorum codicum

lectione sic uerterit, tan potius a Plinio in ea re monitus, candorem ad tenuitatem transfulerit. Verba Plinij sunt. 20. uolumine, capite. 13. Folia minora, tenuioraq; q̄ ceteris syluestribus. Nos communem omnium quorquor uidimus græcorum codicum fidem secuti, candido colore folia eius esse diximus. Indicare id Theophrastum opinati, cum ait, folio esse hoc Papauer Verbasci nigri, sed minus illo nigro. Sentimus quidem leui argumento hoc niti. In ambigua tamē re, monuisse omnia inutile non fuerit.

De spumteo Papauere.

CAP. LXX.

Alterum Papaueris genus, Aphrodes, id est, Spumeū uocatur, ab alijs Heraclium, caule dodrantali, folijs admodū paruis, Radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota. Radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitiōe expurgat. Priuatim huiusmodi purgatio, comitialib. pdest.

BARBARI COROLL.

Papauer hoc Heracleon, siue Aphrodes, hoc est, Herculeum, & Spumosum dicitur: cuius folia herbæ Radiculæ, quam Græci Struthion uocant, similia sunt Dioscoridi, Theophrasto, q; ut multi censent. Et quoniam Struthion etiam passerē significat, Plinius hac parte, folijs inquit, si procul intuearis, speciem passerum representatibus. Verba porro Theophrasti hæc sunt. Papauer, inquit Heracleon φύλλον ἔχει οἷον τραχὺν, ὃ τὰ λίνια λευκαίνουσιν. hoc est, folium habet quale struthos, quo lina candefaciunt. Plinius hæc non de Radicula, ut dixi, quæ lanis demum lauantis aptissima est, curans eas, & conferens candore molliciaq; ut tradit ipse Plinius. 19. libro, sed de passeribus intelligit. Ex ipso autem Papauere lina inquit splendorem trahunt. Quia tñ Plinio contradicere non prius audeo, q̄ si possum, contempler oculis, passerum, an Radiculæ speciem Papauer illud præbeat, uerbum Græcum posuimus in latino: ut liberum esset exsisturis arbitrium. Semen huic spumeum, Æstate tunditur in pila. Vtilissimum hoc, medicamentum nobili, quod Diacodion, & Asteriacen uocant. Etenim capita Papaueris, & Codias, & Asteriscos Græci appellant. Quin & humanum caput Pœtæ interim Codian uocant, ut inquit Polux. Fit autem huius Papaueris, aut cuiuscūq; syluestris capitibus. 120. in aque celestis sextarijs tribus, biduo maceratis, in eademq; decoctis. Deinde siccatis, iterumq; cum melle coctis, ad diuidias partes uapore tenui. Addidere postea drachmas senas croci, hypocistidis, turis, acacię, & passii cretici sextarium. Aetius Papauer hoc (ut arbitror) intelligit, cum Mecaphroditon commendat, herbam contra uiperas in potu præbens, fortasse quia uomitionibus probetur.

EX M. VERG. COMM.

Heraclium uocari Papauer hoc tantum Theophrastus eodem libro testatus est. Nec nos sciimus, ab Hercule ne sic uocatum fuerit, an ex tam multis quæ toto orbe aliquando fuerunt urbes Heraclia aliqua, ad quam frequens, aut speciosum Papauer hoc nasceretur, nomen illi fecerit. Plures alijs a candore & raritate spumæ, quas habet notas, Spumeum nominauerunt. Theophrasti historia de eo hæc est. ἡ τῆρα δὲ μῆκων ἡράκλεια καλεῖται, τὸ μὲν φύλλον ἔχει οἷον τραχὺν ὃ τὰ λίνια λευκαίνουσι, ὅσον δὲ λευκὴν ἐπιπόλαιον, τὸν δὲ καρπὸν λευκόν. καθάραι ἀνω ταῦτα ἢ ῥίζα, χρῶνται δὲ τινεὶ πρὸς τοὺς ἐπιλήπτους ἐν μαλινράτῃ. Quod est. Aliud etiam Papauer Heraclium uocatur, folium habens Struthio, id est, Lanariæ herbæ, qua linteæ dealbantur, similem: Radicem eadē in superficie terræ. Fructum itidem candidum. Purgat per superna radix eius. Vtuntur ea aliquando comitiales in mulsa aqua. Quæ non ideo dicta a nobis sunt, ut quæ parū feliciter Plinius ex Theophrasto in hoc Papauere reddidit, redargueremus: iam pridem enim a Leonicensi, & ab alijs deprehensum id est, sed ut concordem antiquorum duorum scriptorum in hac planta historiam & medicinam ostenderemus: simulq; moneremus, quæ mutata ex communi lectione a nobis fuerit, autore Theophrasto mutata fuisse: nec illud etiam relinqueremus, accedere nos eorum iudicio, qui Plinium in descriptione Papaueris huius redarguunt, nec posse a quoq; in tam manifesta re satis defendi.

De Hypecōo.

CAP. LXXI.

Hypecōon, aliq̄ Hypopheō uocat. Nascit̄ in segetibus aruiscq; folijs Rutæ, exilibus ramis. Natura eadē quæ Papaueris succo.

R

μῆκων ἀφροδῆς

B

ὕπεκοον

D I O S C O R I D I S

EX M. VERG COMM.

C DE Hypecō sunt inter latinos Plinio omnia eadem. Nasci in segetibus enim ait Rutæ folijs, & eandem Papaueris succo naturam illi esse.

Hyoscyamus

H De Apollinari, & Hyoscyamo. CAP. LXXII.
 Hyoscyamon, alij Pythonion, aliqui Dioscyamō uocant, alij Adamantha, alij Adamenon, alij Hypnoticon, alij Emmanes, alij Atomon, nonnulli Dithiambrion, Magi, Pythagoras, & Ostanes, Zoroastres Tiphomon, alij Raponticam, Romani Apollinarem, Aegyptij Saphtho, Etrusci Sabulum, Galli Bissinuntiam, Daci Dieli-
 am. Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. Flores e latere caulis ordine prodeunt, tanq̃ punicorum Cyti-
 ni, scutulis septi seminum plenis, ut Papaueris. Tres eius differentiae. Vna semine nigro, floribus pene purpureis, smilaceis folijs, cytinis p̃duris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut Irionis. Flores lutei, folia & siliquae simplices. Ambo insaniam gignunt, & soporem. Ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris, seminisq̃, in maritimis rudribusq̃ nascens. In cuius deficientis uicem, ruffum usurpari oportet. Niger ut deterrimus, improbatur. Recēti semine, caulibus folijsq̃ tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usq̃ prorogatur. Nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam separatim ex sicco semine, in aqua calida tuso, et obtrito. Succo autem liquamentū praestantius, & magis dolores finit. Contusa herba, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collyrjs quae doloris sensum auferunt, comodissime inferi solent. Contra acutas, calidasq̃ fluctiones, dolores aurium, atq̃ uuluae mala profunt. Cum farina autem, aut polenta, oculorum, pedum, caeterarumq̃ partium inflammationes placant. Semen eadem praebet. Tussi, destillationibus, oculorum fluctioni, & doloribus, efficax. Contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum Papaueris semine & aqua mulsa bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, mammisq̃ tumentibus a partu, tritum ex uino illinitur. Alijs quoq̃ cataplasmatibus, quae doloris leuamentum praestant, ammisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissime imponuntur. Recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur. Cum uino ter quaterue pota, sanant algidas febres, quas Hepialos uocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, meridiocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

BARBARI COROLL.

A Lter Dioscorides (ut Galenus inquit) Hyoscyamon apud Hippocratem uidetur interpre-

tatus, id quod ille *κίσμος κάρπων*, hoc est, fabæ semen appellauit. Hyoscyamon uero Græci uidentur appellasse, hoc est, fabam suillam, propterea, quod, ut Hælianus ait, pastu eius herbæ, resoluuntur & conuellantur apri. Sed remediū nouere. Aquas enim statim adeūt, et caneros uenant, atque ita protinus salutē restituntur.

EX M. VERG. COMM.

Hæce est Hyoscyamos illa, contra cuius maleficium hic ipse scriptor pluribus remedijs. uolumine pugnabit. In qua non male damnauerit aliquis naturam, quæ humanæ menti noxiā, & in furorem homines agentem herbam, tam sagaci artificio, contra cœli iniurias omnes munierit & ornauerit. Nec minus etiā demirabitur gentes, quæ tam multis, tamque honestis appellationibus, optabilem ignaris & admirabilem fecerint plantā, quæ alioquin ob eam quæ diximus causam, ableganda ultra Sauromatas fuerat & glaciale Oceanum: ut aliosis locis illic nascens, ante maturum semē tota aliquando periret. Nisi forte contra uota hæc nostra intulerit aliquis, tam grauem noxam non minore bono eam rependere; optandamque in orbe nostro plantam, quæ tam efficaci remedio contra dolores, quibus tota aliquando perit uita hominis, pugnet. Nec quia menti noceat, ideo doloris lenimenta quæ habet, abijcienda. Parum sapienter enim, quia malo coniunctum sit bonum, ex altero utrumque damnatur: cum liceat distrahis in diuersa contrarijs malo prudenter carere, bono autem feliciter uti. Quod in Apollinari herba, præsertim faciendum. Quam Græci Hyoscyamon, id est, suum Fabam ideo uocauerunt, quod ut in historia sua retulit Helianus, pastu eius conuellantur sues, præsentis mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Alij, ut fit, in desyderio salutis, & suauiore uoluptatis sensu, cum ope eius a dolore ad indolentiam quasi diuino quodam beneficio restituti fuissent, non ultra Hyoscyamum a suis, sed a Ioue Dyoscyamum, id est, Iouis Fabam dixerunt. Vbi eadem nominis ratione illi etiā sunt, qui a medicinæ autore deo Apolline, Apollinarem herbam, & Phythionem eam dixerunt. Phœbeum enim & illud a Pythone nomen est. Fuerunt contra, quæ a maleficio eius Emmanes, id est, in insaniam & furorem agentem eam nominauerint: & a somno quem facit Hipnoticon. Somnificum enim ea uox significat.

De Psyllio.

CAP. LXXIII.

Psyllion aliqui Cataphysin, alij Cynocephalion, alij Chrystalion, alij Cynomyam, alij Psyllerin, alij Sicelioticon, Siculi Comidijn, Romani herbam Pulicarem, aut Silbacium. Aphri Vargugum appellant. Folijs Coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus, sarmentosa in totum herbula, ramis dodrantalibus. Coma a medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis, semine duro, nigro, pulicum simili. Vnde & nomen. In aruis et incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens. Articuli morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum Rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur. Siquidem uehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum, calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si uiuens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida ulcera, & quæ cacœthe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluctione laborantibus, ex melle prodest.

BARBARI COROLL.

Psyllium, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, flores canino capiti, ut Plinius non dissimiles, ob id Cynocephalion uocatur, & Cynoides. Corrigendum enim locum in Plinio putamus, ubi non floribus, sed folijs canino capiti similibus describitur.

R η,

401107

Pli. li. 26. ca. 10
& 9.

Cur. Alioquin in exemplaribus manu scriptis, floribus, non folijs. Semen in bacis effigie pul-
cis: unde nomen. Prouenit in uitarijs. Mendosum & illa quoque parte Plinium existimo, cum
dicit, Psyllibus lacteum succum esse, qui densatus in gummi, & sumptus cum melle, uomitio-
nes faciat, praesertimque bilem trahat. Quid enim sint Psylles, non comperi.

E X M. V E R G. C O M M.

Reuocanda in hunc locum quae superiore uolumine de Conyza constituta fuerunt. Cau-
dumque legentibus, quoniam duae Pulicares herbae in hoc opere nobis sunt, ne difficili utriusque
intellectu, earum simul nomina misceantur. Illa enim Conyza Pulicaris, haec simpliciter Pul-
caris dici tunc iusta est. Cur autem diuersas eodem indicauerimus nomine, non leuis fecit cau-
sa. Non poterat huic ex graeci nominis ratione nota haec deesse. Graeci enim a Psyllis, quae pul-
ces in ea gente sunt, Psyllion, id est, Pulicarem uocauerunt. Non poterat graeca uox etiam aliter
uerbi. In illa coequebat omnium haecenus scriptorum consensus, qui Pulicarem eam in commen-
tarijs suis passim uocauerant, a pulicibus pariter indicare. Accedebat deinde his, quod utraque cau-
sam aliquam cur sic uocari posset ostendebat. Illa, quod haerentes sibi pulices enecat: Haec, quod semi-
ne, ut Plinius ait, puliceo est: & si uerum sit quod hic ait, uiridem in domum illatam pulicem ge-
nerationem prohibere. Descripsit hanc Pulicarem Plinius lib. 25. cap. 9. Pluresque & ille ex adie-
ctis his appellationibus numerauit, Crystalion, Sicelicon, Cynomyam, & Cynoides. Quam
aliquae non satis certam modo causam habent: aliquae a uiribus notisque eius factae sunt. Qualis
Crystalion est, qua indicantur quia ei uti sunt crassescendi densandique uim quam ea habet. Cry-
stallum enim glaciem graeci uocant: quae in lapidis duriciem coacta, densataque frigore aqua est.
Illi simile aliquid Pulicaris huius herbae liquor habet, ut ex eius in scriptore hoc historia, & ex
Plinio patet. Retulit idem Plinius, folijs canimo capiti (modo integer locus ille sit) non dissimi-
libus esse: contraque hic, qui Cornicis pedi herbae comparauit. Quo fit, ut uirtutum in Plinio suspit-
cemur. Nec tamen habemus unde Cynocephalum, & Cynomyiam, in quibus uocibus ex ca-
ne aliquid est, dictam fuisse significemus. Sicelicam deinde a Sicilia uocatam, congere facile est.
Sarmetosam, quam hic *χερσίδης* Plinius esse dixit. Nos Feni modo foliosam furculosamque poti-
us diximus: longo interuallo distare latinorum sarmenta, a graecorum *χόρυς* scientes: qua uo-
ce illi significant omnes quae ad Fenum in pratis nascuntur herbas. In uiribus eius etiam non pa-
rum uariant antiqui scriptores. Hic mollire, adstringere & refrigerare eam dixit. Plinius illi ad
refrigerandum & discutiendum ingentem uim assignauit. **P A V L V S A E-**
gineta in secundo ordine refrigerare, & praeter id medias habere, in sicando & humando ui-
res testatus est. Quae quoniam non sunt omnibus eadem, signare legentibus placuit. Quem
admodum, & quo loco corruptae, nec bene respondentis lectionis notam adiecimus, legentibus
monemus: uideri nobis, quod & Plinius indicat, praecipui a scriptore hoc, contra capitis dolo-
res ex aceto, aquaue, aut rosaceo fronti temporibusque imponi semen. Mox in alijs affectioni-
bus, intestinorum ramicibus uerbi causa, aut procidentibus umbilicis habendum in duabus
aqua hemiuis tritum idem semen: & cum aqua, ueluti in gelu & glaciem densauerit, quod ut
eius fore intelligendum est, tunc concreto seminis eius diluto illo antedicta uitia inungere. Sed
parum certus in scriptore hoc sensus hic est. Cui etiam in antiquioribus & melioribus graecis de-
est quod ultimum in hoc capite, & ab eo loco legitur, Eadem in feruente aqua dimissa, &c.

De Hortensi Solano. C A P. LXXIIII.

ερσίδης χερσίδης

Hortensium, seu urbanum Strychnon, Romani Solanum uo-
cant, alij Cacabulum, Aegyptij Allelo, Galli Scubulum, Aphri
Astrismunim. Frutex eibis idoneus, exilis, pusillus, multis concavus a-
lis, folio nigro, maiore quam Ocimi, & latiore, fructu rotundo, uiridi, qui
post maturitatem nigricat, aut fuluescit. Herba innocentis gustus. Na-
tura ei refrigerandi. Quare folia ulceribus quae serpunt, & ignibus sa-
cris, conuenienter cum polline polentae illinunt. Aegilopia, capitique dolo-
res, trita & imposita sanant. Aestuantis stomacho auxiliantur. Paroti-
das, cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem
sacrum, atque ulcera quae serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spu-

ma, ad ægilopas cum pane, infantium adustioni, quam Syriasm uocat, cum rosaceo perfusus proficit. In colyrijs, aque uel oui uicem exhibet, contra acutas fluctiones, suffusionesq. Aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantia sistit, in uellere subditus. Succus fuluo galinarum in domibus oberrantium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio.

BARBARI COROLL.

Strychnon, siue ut Galenus Trychnon, satium, quod & melan, hoc est, nigrum cognominant, a nostris Solanum dicitur, familiare cibis, in Aegypto maxime. Nihil mali corporibus esse prædicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. Flos huic est candidus, acini, siue poma potius herbacea, & quadamtenus aculeata, in quibus semen. Hoc Romæ uidimus in horto oratoris Galli.

Pli. li. 21. c. 31

EX M. VERG COMM.

Vesicarias in Theophrasti plantis Gaza Strychnos duas appellauit: sopores alteram, furores facientem alteram: quæ huic scriptori in quatuor eius generibus postremæ sunt. Videturq. ex Plinio uolumine. 21. cap. 11. comune id nomen omnibus fecisse: cum tamē Plinius secundus eius genus tantum cognomento Halicacabum, Vesicariam uocet: causamq. afferat, quod uesicæ & calculis prosit: in qua uis subscribentem sibi habet hunc scriptorem, qui *δυσιτηκόν* ait Strychnon eum esse. Verum tamen dubitari facile potest, an alia nominis eius causa quondam fuerit, qualis in eo mox a nobis dicitur. Vesicarias, ut præmonstratum est, Strychnos omnes ille dixit. Celsus contra, ultimo secundi libri capite, cum numeraret quæ reprimunt simul & refrigerant, post multa his uerbis Solanum Strychnum uocauit. Siser, apiū, solanum, quam Strychnum græci uocant, hanc intelligens, cui & a Dioscoride præcipua in refrigerando uis assignatur. Nosq. latinæ rei antiquum autorem secuti, Solanum, non uesicariam Strychnum hortensium, siue satium diximus, quæ nigris folijs & in extrema maturitate nigro semine ab hoc & ab alijs describitur, pingui cultoque solo proueniens: cuius nostra ætate nullus in cibis usus est: & si hic hortense, satium, edendo esse & in cibo innocens dicat. Quibus conijcere aliquis merito possit, fuisse quondam in sanitate aliquem eius usum. Solani huius. 9. de plantarum historia Theophrastus duo tantum facit genera, *πνύδι καὶ μενιόν*, id est, quod soporem, & quod furorem gignit. Suntq. de utroque multa ab eo dicta, quæ suis locis ex eius historia a nobis repetentur. Cæteri omnes, autore ut nos credimus Dioscoride, quatuor Strychnos deinceps numerauerunt, Satium, hortensemque hunc, & cibarium: quem omnes nigrum a colore fructus uocauerunt. Mox Halicacabum cognomento, quem priuatim nos Vesicariam a Plinio uocari credimus, rubente fructu, uuae acini figura. Tertium somnificum, quem fruticosum describunt. Postremo insaniam facientem: diuersis in medicina etiam uiribus, quæ ab hoc scriptore statim patebunt. Obseruauimusque nos, ad refrigerandum præterque usum Solani fuisse, & ex tam multis eius generibus Hortense ad eum usum maxime probasse antiquos. Cæteris enim maleficij periculum magis quam remedium inest. Facilis cognitu herba, nunquam deceptura incautos, si quas habent totius generis discretas folijs, fructu, coloreque notas diligentius obseruauerint. Vtutur hortensis huius Solani succo Paulus Aegineta in primo ad refrigerandos in infantibus capitis ardores, quos Græci Syriasm uocauerunt.

B

De Vesicaria.

CAP. LXXV.

Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabō, id est, Vesicariam, aut Phyalida uocant, folijs antedicto latioribus. Cuius caules posteaq. adoleuerunt, humi prosternuntur, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, leui. Quo coronarij utuntur, & corollas faciunt. Vim usumque hortensij Solani habet. Verum cibis nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine poto. Et urinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem ualens.

στρυχνος ἀλκαδων
βίον

R iii

D I O S C O R I D I S

BARBARI COROLL.

C Strychnon Halicacabon folijs Ocimi describitur a Plinio, commendatum quidem & hoc est
his ab aliquibus, licet hortense præferatur. Radicem Halicacabi bibunt, qui sunt uaticinandi
callentes, qui furere ad confirmandam superstitionem aspici se uolunt. Aspidum natura in tā
tum aduersa hæc herba est, ut radice propius admota, soporentur.

EX M. VERG. COMM.

Coronaria, quod hic, & Plinius testantur Vesicaria hæc quondam herba fuit. Damnarunt
tamen ambo eius in cibis usum, nec ad coronas amasse ueteres aliud in ea uidentur, q̃ ueslicas,
folliculosq; illos qui per ambitum capitis ex coronis pendentes, grato spectaculo ruberent, tur
binati, grandæq; & liliaci fistri, ex quo crepitacula pendeant, imaginē reddentes. Nascitur Ves
ficaria hæc multa in uineis, in Italia herba uerius q̃ frutet; p̃fertq; Veslicas illas Septēbri mense
colore primū uiridi, mox paulatim rubescēte, turbinatas ut Plinius ait; semen Ciceris magnitu
dine intra se claudentes, rubro colore, nec nisi extremo Autumno maturefcens: in nullo nostra
ætate honore, aut usu. Veslicariāq; nos credimus a ueslicis his potius, q̃ quia prosit ueslicæ. Et
si Plinius id testet dictā fuisse, ἡ τῶν φανῶν. etenim ex ueslicis folliculisq; his factum illi nomē est.
Nec aliā herbā intuentibus uidebitur: tam similes animalium ueslicis folliculi illi sunt.

De Solano somnifero. CAP. LXXVI.

SOLANVM somniferum e Græcis aliqui Diricion ap
pellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada,
Romani Apollinarem minorem, alij Vlticanam hærbam, aut Opsa
ginem, Daci Cycolidē, Pœni Cacabum. Fruticat multis ramis, densis,
lignosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, Cotoneæq; mali si
miliū, plenis, flore grandī, rubro, fructu in folliculis crocato, radice lon
ga, subrubro cortice uestita. Nascitur in saxis non procul a mari. Radi
cis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet,
Opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim,
hydropicis dantur. Si quid numero adijciatur, alienationem mentis fa
ciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis in
seritur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus
in uino, si in ore contineatur, dētium doloribus auxiliatur. Radicis suc
cus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

BARBARI COROLL.

Strychnon Hypnoticon, id est, soporiferum, ab alijs Morion, ab alijs Moly appellatum, Co
ronarijs in Aegypto expetitur, inuitante similitudine florum Hederæ. Velocius hoc ad mor
tem q̃ Opium. Inuenio & Strychnen, & Eubepaton, & Callion uocatam: nostri Vesicariam,
a folliculis, uel quia uesicæ profit & calculis. Theodorus omnes Strychnos Vesicariasappel
lat. Radix huius sanguinis modo rubra Theophrasto candida, cum inarescit. Semen coccineū,
folia mali Coronei, Lactuæue caprinæ: sed hirsuta, magno cespite, in rupibus sepulchre
tisq; nascitur. Genus hoc Dioscorides libro primo Alicacabū uocauit. Eademq; ad uerbū fere
scripsit, quæ nunc in soporifero leguntur. Sed Alicacabus tamen uera est, quæ proximo capi
te superius descripta est, ut Galenus inquit. Laudat hoc a loco * ad fruendū, & Tamariso.

De Manico Solano. CAP. LXXVII.

Strychnon, siue Solanum Manicon, aliqui Persion, alij Thryon
appellauere, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron, quidam
Orthogyon. Huic folium Erucae simile, maius aliquanto, satis ad spi
nam, quam pæderota uocant, accedens. Caules a radice eximios emitt
it, decem aut duodecim ulnarum altitudine adolēcentes, caput in

σπύχρον ὑπνογι
νός

The. li. 7. ca. 14

σπύχρον μανικόν

acumine Oliua maius, & latius, & ut Platani pillula, hirsutius. Flo- **A**
rem nigrum. Postq̃ eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, dens,
aut duodenis acinis constans, similibus Hederæ corymbis, ut uua mol-
libus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in mon-
tibus uento perflatis, maritimis foueis, & uagis. Radix drachmæ uni-
us pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq̃ non iniucun-
das obuersari. Sed duplicatus hic modus, ad treis usq̃ dies, mentis alie-
nationem affert. Triplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copio-
sius pota, & uomitione reiecta.

B A R B A R I C O R O L L.

Strychnon Manicon, infansiosa herba: quā & Doryon, siue potius Dorycnion uocabāt: quæ
cuspides in plijs eo tingerent, passim nascente. Alij Perisson appellabant, foliū Eruce maiuscu-
lum, capite Gethyi maiore pilosioreq̃, ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pul-
cherrimos affirmas. Hoc & coronarijs placebat. Erythron dicebāt, & Neurita qui nequiter oc-
cubabāt, ut inquit Plinius. Frutex est surculosus uerius q̃ herba, ut Plinius tradit: folliculis mā-
gnis, latisq̃, ac turbinatis, grandi intus acino: qui maturefcit Nouembri mense.

De Dorycnio.

CAP. LXXVIII.

Dorycnion Crateuas Halicacabon, aut Caleam uocat. Frutex **λεπκνιον**
Oleæ nuper prodeunti similis. Nascitur in petris non procul a
mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleæ similibus colore, minuscu-
lis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido, siliquis in cacu-
mine ceu Ciceris, densis, rotundis, quinis intus, aut senis seminibus, **B**
exigui Erui magnitudine, læuibus, firmis, uersicoloribus. Radix ad
digni crassitudinem & cubiti longitudinem adolefcit. Id somniferum es-
se constat. Copiosius haustum mortem adfert, Nec defuere, qui dice-
rent, semen in amatoria expeti.

B A R B A R I C O R O L L.

Dorycnion, siue Dorychnidiō, tam per, c. q̃ per, ch, etiā pro Strychno Manico acceptū a
quibusdā ueteribus inuenio. Dioscorides & Galenus, uidentur aliud ab eo genus existimasse.
Dictum fortasse ita, q̃ cuspides telorū inficere mos esset illo, ut in Manico Strychno diximus.
Dorycnio gustus lactis est, & confracto emanat.

De Mandragora.

CAP. LXXIX.

Mandragorā aliqui Circeum, alij Xeranthēs, aliqui Antimnion, **μανδραγόρα**
aut Antimion, alij Bombochylon, nōnulli Minon, Aegyptij
Apemum, Pythagoras Anthropomorphon, alij Aloēten, alij Thrida-
ciam, alij Cammaron, Zoroastres Diamonon, aut Archinen, Magi He-
mionos, aliqui Gonogeonas, Romani Caninū malum, alij Terrestre mā-
lum, quidam Antimelon, nōnulli Dirceam, alij Circeam uocant, quō-
niam uideatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. Niger,
quæ scemina existimatur, Thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac
minoribus q̃ Lactucae, graueolentibus, in terra sparsis. Mala gerit luteis
ouorum similia, pallida, odorata: in quibus semen uelut pyrurum.
Radicibus inhæret binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, in- **R iij**

D I O S C O R I D I S

C tus albis, carnofis, ingētibus. Verum is Mandragoras caule uiduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Norion uocitatus. Huius folia magna, alba, lata, læuia ut Betæ. Mala q̄ alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucunde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, aliquantum opiliones foporantur. Radix alterius similis, maior, & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radicis tuso, & prælis subiecto, qui terendo coactus, fictili reconditur. Malleis quoq; succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defæcatum ius feruant. Cyathosq; uno utuntur, in peruigilijs, & doloribus, & ante sectiones, uftionesq; nē sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut Veratrum, per uomitiones bilem atram, pituitamq; extrahit. Verum potu largiore, uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pefsis quoq; emollientibus, ammiscetur. Semioboli pondere inditus, menses & parus expellit. Subditus pro Balano, somnificus est. Radix ebur emolliore fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit, & ad accipiendam quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas ulcera citantur, cum polenta illinuntur. Duricias omneis, suppurationes, strumas, & tubercula discutiunt. Stigmata sine exulceratione delent, si quinis senisue diebus sensim perfricentur. Folia feruantur in murijs, eisdem ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentum icubus ex melle aut oleo medetur. Strumas atq; tubercula, cum aqua dissipat. Articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cortice radicis ad hunc modum. Ternæ minæ in uini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut amburi debent, ut ante dictum est. Siquidem nullo tunc afficiuntur dolore. Sed ueterno quodam pressi, torpescunt. Mala foporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur, Item expressus ex eis succus. Nimio tamen odore percussi, obmutescunt. Semen malorum potum uulvas purgat, appositumq; cum sulphure ignem non experto. Rubra fceminarum profluuiâ sistit. Scarificatis multiphariam radicibus, erumpens lachrymâ, cauo uase recipitur. Est autem lachryma lacteo succo efficacior. Sed non ubiq; ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Alium tradunt esse Mandragoram nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi Mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, in orbem circum radicem. Quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassius dine æquat. Tradunt eam in pane, offa, obsonioue drachmæ pondere deuoratam, non memoriam modo, sed usum quoq; rationis interciperi.

Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sensus impos, A
ternis quaternisue ex quo data est horis. Hac medici utuntur, cum scin-
dendi, urendiq; necessitas adest. Antidorum esse uolunt radicem cum
Manico Solano potam.

B A R B A R I C O R O L L.

M Andragoræ fructus niger, sapore quodā uini, effigie ouis: non ut Theodorus putat, racē
mi *βερρυχόδαν*, aut *βερρυόδαν*, pro eo quod erat *ουινός* in Theophrasto legens. Fœminæ folia
hirsuta, radices carnosæ, teneræ, cubitales fere. Mala hæc fert Auellanarū hucū magnitudine.
Mas Arsen, & Hypoplomon quoq; dictus, folio latiore, ut Lapathi satiuæ. Cauent effossurū
contrariū uentū, tribus circulis ante gladio circūscribentes, ad occasumq; spectantes. Succus
non ubiq; inueniit, sed ubi potest. Circa uindemias queriit. Odor grauis eius, sed radice & ma-
li grauior. Succū excipiunt deciso caulis cacumine. Adeo caulē habere non dubitant, etiam si
Dioscorides id negat. Hic & hirsutus fœminæ tribuit. Foliorū succus Rosetidorū pestis est, ut
ingit Plinius. Mandragorā condamati frigoris uenenū esse, nemo non scit. Inuenio herbæ no-
men Andraclon, a similitudine uirili dictæ. An eadē hæc sit cum Mandragora, nō legi. Sed est
cur esse sentia: quippe cum & Anthropomorphon dicat. Nisi quis Andraclon, quia frangat, &
occidat hominē, dictam putarit: cuiusmodi uim multæ habent herbæ. Nam & annus uitæ. 67.
ut est apud Maternū, Andrades uidet appellatus: quia duplici rōne climatericus sit, & maxie
fragat hoies. Alioq; ab hois effigie Andricelon potius, q̃ Andraclon dici potuisset. In quo &
illud notandū, Andricelon apud Græcos, ut Aristoteles, & Iulius pollux testant, coloris genus
est, quē nos Purpurissum dicimus: atq; ita placuisse, Theodoro quoq; nostro liquet.

Pli. li. 27. ca. 17.
Theoph. li. 9.
cap. 9. 11.

De Morio Mandragora nihil habeo qd addi possit ijs, quæ a Dioscoride notant. Sed quo
nā mala Terrestria & Canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentē subeunt quæ uulgo
Melenzana uocamus, hoc est, ut ipse puto, Mala insana: de quibus nihil ueteribus scriptum
fuisse, iam desino mirari, q̃ multa huiusmodi repio. Sicut hercle multa quondā fuere, quæ mo-
do uel ignorant, uel certe non habent. Mala ergo insana e frutice uulgari sunt, passim nascēte,
ut melones, & cucurbitæ. Pari quoq; cultu, folijs prope siculneis, flore oblongo, specioso, can-
dido. Manditur uulgo pomū ex oleo, sale, pipere, Fungorū modo coctum.

E X M. V E R G. C O M M.

QVI Mandragoram quotidie circūferunt Agyrtæ, iactantq; tanto periculo effodi huma-
na forma, ignaræ plebi eam ostendentes, ex uno (ut nos credimus) Pythagoræ no-
mine, eius Anthropomorphos mēdacijs sui occasione arripuerunt. Neq; enim uox illa aliud, q̃
humane formæ plantā significat. Accessit & Pythagoræ Columella, qui ex eadem ueluti no-
minū superstitiosa ostentatione, in carmine suo cecinit. Quāuis semihominis uesano gramine
facta, Mandragoræ pariat flores, mœstamq; Cicutam. &c. Non defuerunt illis etiam in iactan-
da cū foditur Mandragoras religione, Theophrastus in Græcis, in Latinis uero Plinius. Quos
non puduit, in tanta rerum grauitate quas scribebant, ne quid cōtra cōmunem sensum dixisse
uiderentur, populares, & sine ratione ritus huiusmodi posteris tradere. Quæ autem Theo-
phrastus pro Mandragoræ fossura docuit, huiusmodi sunt. περιγράφει δὲ καὶ τὸν mandragόραν
ὡς τριῶν ἑξῆς, τριῶν δὲ πρὸς ἑαυτὴν βλάπωντα. τὸν δὲ τριῶν κύκλῳ περιγράφει καὶ λίγην ὡς πλῆθος
πρὸς ἀποδοτικόν. Quorum sensus sit. Circumscribunt & Mandragoram gladio ter: secantq; ad
occasum, spectantes. subent & alium saltatē tripudio circumagi: multaq; de Veneris usu &
re dicere. Plinius lib. 27. cap. 11. pleraq; eadem Theophrasto, & his non dissimilia quædam. Ca-
sum fossuri contrariū uentum, & tribus circulis ante gladio circūscribunt: postea fodiūt, ad oc-
casum spectantes. His auctoribus, & quāsi per manus translata huiusmodi supstitutione, uerifi-
mile est, utanis periculorū, religionisq; & humane formæ mēdacijs celebrari nūc etiā Mandra-
gorā. Cum tñ id potius querendū fuerit, cur a sapiente illo Samio honestiore hominis nomi-
ne indicata fuerit. Neq; em̄ uerisimile est, quia bina radice, & hominis crura imitante nitatur,
plerunq; in terra sic dictam ab eo fuisse: trinis em̄ aliquādo hæret, multaq; aliæ stirpes huiusce
modi bifida radice diuisione uidetur. Abstrusiorē ex religione, cuius ubiq; magnus ille auctor
erat, causam habuisse id nomē oportet. Nos illud ignoramus, relinquiturq; inueniendū peri-
tioribus & docendū: neq; hoc tantū, sed tam multas appellationes alias, quibus Mandragorā
antiquitas indicauit. Quæ em̄ inter eas notiores sunt Circeon, & Thridacias, ab hoc ipso scri-

B

Cprore declarare, & per se satis patet. Sunt toto hoc capite aliqua perse, & quoniam non sunt nobis cum alijs eadē, legentibus aduertenda. Quale est, qd hic ait, poma Mandragorae ouorū uitelis similia esse, a Plinio Auellanae nucis similitudine describi, non leui inter utraq; formā, colorēq; diuersitate. Theophrastus, de plantarū historia, nisi uisū in lectione eius sit, qd suspicamur, contra utrūq; uidet de pomi huius colore, & magnitudine tradidisse. Verba eius sunt. Ἰδὺς δὲ ὁ καρπὸς τοῦ μανδραγόρου, τὸ μέγεθος καὶ σχῆμα δὲ καὶ ἐνὸς ὕψους τῶν χυμῶν. Quod est. Priuatim uero Mandragorae fructus, quia niger, acinosusq; & sapore uinosus est. Colore nigrū, acino uisū æquale, & uinoso sapore pomi Mandragorae Theophrastus describit. Hic autē ouorum uitelis, qui orbiculati sunt, cōparat: & ὀφθαλμοῖς, id est, pallida dicit: quā descriptionē natura magis confirmat. Discrepant non leuiter etiā idem auctores: qd hic utrunq; Mandragorā caule carere ait, Theophrastus contra eodem loco cum Ferulam descripsisset, subiecit. τῶν δὲ ἄλλων τὰ ἴδια ὁμοιότερον τοῦτο, τὸν καυλὸν ἔχει κατὰ πῖρ ὁ μανδραγόρας καὶ τὸ κώνιον. Quorū uerborū sensus est. In reliquis aliæ quidem similiorem huic caulem ferunt, qualis Mandragoras est, & Cicuta. Plinius etiā quo diximus loco idem testatur dicens. Succus fit & e malis, & e caule deciso caucumine. Palāq; ambo hi caulem Mandragorae tribuunt, quē Dioscorides penitus aufert. Non aulim ego inter tam graues auctores tertius ueluti arbiter censere. Sensus id faciet: poteruntq; uolentes uel a peritis audire, uel ipsi totam Mandragorae naturā obseruare.

De Aconito.

CAP. LXXX.

ἀκόνιτον

AConitum aliqui Pardalianches, alij Cammoron, alij Thelyphonon, alij Myoostonon, alij Therophonon uocant. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulem palmo altum. Radix scorpionis caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentque. Qui rursus Hellebori contactu excitantur. Oculorū medicamentis leuandi doloribus gratia adijcitur. Enecat pantheras, fues, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

Theoph. li. 9.
cap. 16.
Pli. li. 27. ca. 2.

B A R B A R I C O R O L L.

AConiti primū genus Pardalianches, & Thelyphonon, siue potius Theriphonon cognominatur. Ceterū Theophrastus simpliciter, & sine Aconiti mentione Thelyphonon, & Scorpion, a radice similitudine uocauit, geniculatū tradens, graminis modo, locis umbrosis, & cetera quæ hic a Dioscoride tradunt. Hoc solum genus a Plinio demonstratū est, hirsuta leuiter eius folia prodendo. Vocatur & Myoostonos: quoniam e longinquo mures odore necat. Inuenio & Myephonon uocari genus herbae, quā & Sciaida quidā noiant: nec quæ sit ea docent, præterq; qd Phantias in lib. de stirpibus, hæc habet uerba. Pileari forma sunt, semen Anisi, Feni culi, Coriandri, Caualidis, Cicutæ, Pastinacæ, Sciadis, quā & Myephonon uocat. Plinius & Theophrastus, Myophonon, cui neruosus est cauliculus. Aconitū porro Theophrastus in Creta, & Zacyntho nasci maxie putant: de Lycoctono (ut arbitror) locutus. Sed optimū in Ponto circa Heracliam, ubi monstrat Hercules ad inferos aditus, quasi ex spumis cerberi canis ortum. Hoc a Thelyphono, ut testatus modo sum, differre arbitror. Constat enim folio syluestris Intubi: qd Aetius non Seridis (id enim significat Intubū) sed Iridis syluestris accipit. Radice nō nucis, ut Theodorus transtulit, sed Gāmari marini speciei: quoniam Caryas pro Caridas, uel Carabidas legisset. In quo notandum, Carabos, qui & Grapsæi sunt, interim pro locustis, interim pro Gāmari a ueteribus acceptos: ut Athenæus auctor est. Carides uero Squillæ sunt, quas & Curidas, & Coridas, & Colybdenas quidā uocant. Etiam si marini genitale, Nicander Colybdenā putauit. Aconito sane breuis herba, nec superfluens, sed ut Frumēto. Semen ei tamen in spica non est. Nascitur ubiq; nec tantū in cauitibz nudis, quas Aconas uocant, unde Aconitū nōnulli uolunt appellatū. Alij quia in petrosis parte plurima nascenti, nullis iuxta puluis esset. Alij a pago, siue oppidulo, siue portu Periadynorū ad Heraclia ita noiato. Alij quoniam uis eadē in mortē esset, qd cotibus ad acie ferri decutiendā, statimq; admota uelocitas sentiretur. Fructū eius & foliū nihil nocere prædicat. Vim mortiferā in radice haberi. Ad erodendā uti ea medicos: pparari uero posse, ut tollat biennio, aīo, mēlibz sex, tribus, duobus, uno (rōne etiā pīoribus occulta) miserius perire, qd potō eo diutius uitā extrahant. Differri, celerariq; sumēti

bus exitiū, prout sero, aut ocus collectū fuerit. Debellari pestē eam nō alia radice, ut quidā ex promptere, sed aut uino, aut melle successu raro. Alioqñ reperto in uisceribus ueneno, ceu pari inuēto, nō perimit, sed colluctat cum eo tantū. Ita duo uenena cōmoriunt, ut anīal superfit. Omniū porro uenenorū ocyssimū esse Aconitū, ut tactis quoq; genitalibus fœminini sexus animalī, eodem die mortē inferat, quō modo interēptas a Calphurnio bestias dormiētes uxores M. Caelius obiecit. Fugitiuos eo in uinculis uti solitos, desponso animo Aconitū seruanti- bus, instituta capitis pœna. Quod autē sit herbæ genus Acontias uocatū, non reperi. Etem ut Athenæus inquit, grāmatorū mos est, poētas, & auctores alios enarrantū, cum qd huiusmōdi occurrerit, quali cōnuendo præterire, nihil aliud testantes, q̃ aut lapidis, aut animalis, aut floris genus esse. Quo fit, ut parū fidei grāmatis in hac eruditōis parte semper habuerim. Aconitū inuenisse prima dicitur Hecate, uenenorū insigni crudelitate fœmina, quæ Persam patrem, Solis filium, perinde crudelissimū, ueneno sustulit, auctor Diodorus. Propterea q̃ Ouidius in Metamorphosi cum herbā dixit Hecateida, uidetur Aconitum accepisse.

BARBARI COROLL.

Contra Grāmatorum omnium decreta, Poëtarumq; fidem, quorum illi rationem nominis secuti, ἀπὸ τῶν κινῶν, id est, a cautibus, in quibus nascitur Aconitum, dici passim testantur, hi, præsertimq; Naso in Transformationibus suis cecinerunt. Quæ quia nascuntur dura, uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Theophrastus, 9. de plantarum historia ubiq; nasci Aconitum testatus est: neq; a cautibus, quas Græci Aconas uocant, nomen illi factum fuisse, sed ab Aconis Periadynorum pago, qui ad Heracliam Ponti est, Aconitum uocari. Amare quidem, & nasci plerunq; in petrosis, non tamen a petris nomen inuenisse. Verba eius sunt, quo diximus loco. *φύται δὲ πανταχοῦ καὶ οὐκ ἐν ταῖς ἀκόνιας μόνον ἀλλ' ἐν ἑξὶ καὶ προσηγορίαν. ἀντὶ δὲ τῆς καμνίας τοῦ περιανδύοντος, φησὶ δὲ μάστιγα τοῦ πετρώδους τόπου.* Quorum sensus ille est, quæ paulo ante diximus. Duo hic scriptor Aconiti genera eodem nomine tradit. Theophrastus tamen eodem de plantarum historia uolumine, alterum hoc quod modo docetur simpliciter nomine Thelyphoni tradidit. In his, ut uidetur Theophrasto, & huic, omnia fere eadē sunt. Discrepant tantū, q̃ hic Aconitū, ille Thelyphonō primo uocat nomine: neuter tamē manifestā nominis eius aliquā indicat causā. Quo fit, ut suspicari aliquis possit, in utroq; corruptā esse hanc uocem: nec Thelyphonon, quod est fœminas, sed Theriophonon, quod est, bestias enecās, quas multas in capitis sine hic numerat, legendum esse locum. Nisi quod Theophrastus ait, plantæ huius radicem genitalibus omnium quadrupedum indicat, eadem die eas enecare, de fœminarum genitalibus intelligendum tantū sit. In quā partem inclinat animus nobis: dicente Plinio lib. 27. capite. 2. tactis quoq; genitalibus fœminini sexus animalium, eodem die inferre mortem. Quod magis adhuc miretur aliquis, sciens neq; in altero Aconito huiusmodi aliquid testari Theophrastum, Plinius quo diximus loco, tractata simul utriusq; rei historia, unū tantum uidetur Aconiti genus fecisse, eiusq; appellationes aliquot palam indicasse: Pardalianchesq; ab enecandis Pantheris uocari ostendisse, cum ait, Tangunt carnes Aconito, necantq; gustatu earum Pantheras: nisi hoc fieret, repleturas illos situs: ob id quidam Pardalianches uocauere. Thelyphonon etiam, ut diximus, quoniam fœminini sexus animalia enecet, Myconon alij, ab enecandis muribus, quoniam e longinquo mures odore enecet. Cammaron, a radicis flexura, quam Carydi, id est, marinæ Squillæ similem habet, quam in historia eius hic scorpionis caudæ similem fecit, & Alabastrorum modo splendere ait.

De altero Aconito.

CAP. LXXXI.

Est & alterum Aconitum, quod aliqui Cynoctionon, alij Lycopodium non appellant, alij Cyamon leucon, Romani Colomestrum. Huius genera sunt tria. Vnum, quo utuntur uenatores: alia duo in usum suum uertere medici. E quibus tertium, quod Ponticū nominatur, magna ex parte in Italia montibus Iustinis exilit: a priore distans, quoniam folia faciat effigie Platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora. Caulē Filicis, læuē stylū, cubitali altitudine, aut ampliorē. Semen in siliquis oblongis recondit. Radices in modum Squillæ piscis scirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem lyporum utuntur.

C Infertæ liquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enecant.

Pli. li. 27. ca. 3.

H **B A R B A R I C O R O L L**
Vius Aconiti neq; formam, neq; medicinas Dioscorides exequitur. Librariorum (ut arbitror) culpa fuit: tria capita scribentium, cum duo tantum Aconiti summa genera dicantur, Galeno teste, Pardalianches, & Lycoctonon.

De Lycoctono, cuius species treis haberi constat, in primo Aconiti genere differui, Theophrastum & Plinium secutus. Lycoctonos dicta est, quia lupos enecat. Habent & nostri rustici ad eundem usum Lupariam uocant, folio uitis, multas habente diuisuras, & maculas candidas, flore oblongo, luteo. Aetius, Aconitum inquit sunt, qui Aconitomon, & Irin syluestre, & Pharmaciaden uocent, radícula fere graminis.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vale Thelyphionon Aconitum descripsit Theophrastus, satis superiore capite dictum a nobis fuit, superest modo alterum hoc. Quod quale in scriptore hoc sit, parum nobis constat. Dicimus autem quale, integrum ne, an corruptum & decurtatum. Demiramur enim nihil quod ad hominis salutem, aut maleficium pertineat in eo tradit: præsertim docente multa Theophrasto de maleficio eius & remedijs, & præter Theophrastum Paulo Aegineta eandem priori uires illi decernente: priuatimq; lupos enecare, quemadmodum illud Pantheras: ideoq; Lycoctonon hoc, ut illud Pardalianches seorsum uocari: & præter hos Plinio libro. 27. capi. 3. unum tantum genus utriusq; nominibus indicat, multoq; aliter q; Theophrastus, qui, de plantarum historia alterum hoc Aconitum his uerbis descripsit. Nascitur ut ferunt Aconitum in Creta, Zacynthoq;. Plurimum autem & optimum in Heraclia Ponti. Folium habet Intibi, quod uocant Cichoriū, figura. Radicem figura coloreq; maris Squillæ similem: & in hac localem uim esse. Contraq; foliorum & seminis nullas ad mortem uires esse. Herba autem semen est non surculosa materia. Breuis tamen herba ipsa, nec quicq; egregium habens, tritico similis, non tamen semen illi in spica maturescit. Non uescitur Aconito ouis, nec aliud quidpiam animal. Adiecit his alia quædam scriptor idem, quæ uolentes relinquimus: ne ultra q; opus sit legentes remoremur. Monemus tamen, in cognoscendis illis non fore inutile eorum laborem. Nobis enim satis est, pro

D Aconiti historia breuiter hæc signasse: ut quod paulo ante diximus, cunctis certius fieret, non cōuenire penitus in Aconitorum historia Græcos, Latinosq; antiquos scriptores. Qui tamen omnes, excepto Plinio, duo eius gna fecerunt. Alterum quod Pardalianches a Theophrasto, Thelyphionon priuatim dictum est. Alterum, quod Lycoctonon: illud ab enecandis Pantheris, hoc a lupo. Ethæc auctore Paulo Aegineta cognomina utriusq; & notæ quondam fuerunt. Siquidem ait. ἀκόνιτον τὸ μὲν παρδάλιαχος σκεπτικὸς καὶ διληκτικὸς διδύμιος ἐστίν: ὅθεν μὲν αὐτὸ οὐδὲν πλεον ἐφαδεν μὲν τὸ ἐπὶ τῶν σκεπτικῶν διδύμων σκεπτικὸν χρῆσθαι αὐτῷ, τὸ δὲ διληκτικόν τινος αὐτῷ ἐν τῷ προτέρῳ διδύμῳ ἰδίως τοῦ λόγου, ἀναίρηται ἵνα μὴ τοῦ παρδάλια. Quod est. Et Aconitum quidem cognomine Pardalianches exedentem, & localem uim habet. Eamq; ob causam intus cauendum est. Foris tamen in carnibus, quas exedi oporteat, uti licet. Quod uero a lupo Lycoctonon dicitur, eandem priori uires habens, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat. Et hæc pro altero Aconito hoc ex Theophrasto & alijs inuenta, & obseruata hæcenus a nobis fuerunt.

¶ De Cicuta.

C A P. LXXXII.

κώλυσις

C Onion aliquibus Aegynos, alijs Ethusa, alijs Apolegusa, alijs Dolia, alijs Amaurosis, alijs Paralysis, nonnullis Aphron, Quibusdam Creidion, alijs Coeten, alijs Catechomenion, alijs Abioton, alijs Absēudes, alijs Ageomoron, alijs Timoron, alijs Polyanodinos, alijs Dardanis, alijs Catapsyxis, Ostani Babathy, Aegyptijs Apemphi, Romanis Cicuta appellatur. Caulem ædit geniculatum, ut Fœniculi grandæ, in cacumine ramosum, folia Ferulæ, angustiora, graui odoratu. Vmbellæ in summo prodeunt, flores quoq; albicantes, & semen Aniso candidius. Radice non alta, concaua. Cicuta lætale uenenum inest, suaq; uire frigatoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusq; semina & comæ siccescant, qui sole densæ

tur in pastillos. Præcipuus ad medendi rationem usus est aridi. Misce
tur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur. Ignis sacros, &
ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Hærbæ cum coma trita, & testibus
circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit. Sed genita-
le resoluit. Lac puerperarum mammas apposita, extinguit. In uirginita-
te mammas cõercet, & increscere non patitur. Pueris præstat, ut eo-
rum testiculi cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima uis Cræ-
ticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

B A R B A R I C O R O L L.

Cicutæ Græce Conion, inuisa & hæc, publica Atheniensium pœnâ. Semen habet noxium.
Caulis eius uiridis: & urit plerumq; ut in Platanis. Lewis hic est, & geniculatus, ut Harundo,
nigricans, altior sæpe, binis cubitis. Hinc & spaciū, quod est inter cannarū, ut Seruius exi-
stimat, genicula, Cicutā uocari a Marone. Folia Coriandri tenuiora. Semen Aniso crassius. Ra-
dice nullius usus, ut Plinio uidetur. Semini & folijs refrigeratoria uis. Quæ si enecat, incipiunt
extrema corporis algere. In uino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs, flo-
ribusq;. Tunc em maxime tempestiuus est, & melior. Semine trito expressus, & sole densatus,
nocentior q; semen ipsum, ut in Thapsia: cum in reliquis contrā sit, necat enim sanguinem ex-
pissando. Hæc altera uis est, & ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad dissol-
uenda medicamenta utuntur illo pro aqua. Fuerit autem Cicutæ herba, cuius gustatu exerci-
tus M. Antonij cum famē laboraret, pene sit extinctus in Parthia, non traditur: alioquin reme-
dium, ut Plutarchus ait, in uino tantum erat. Plinius quoq;, Maxima inquit Cicutæ uis terræ
Parthorum. Mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ. In Græcia uero Megaricæ, deinde Atticæ. Thra-
syas, & discipulus eius Alexias, & hanc, & cætera uenenâ temperabant, ita, ut sine aliqua offen-
sione, aut tæbe tollerent, in quantum uis tempus dilata morte. In Cicutâ præcipiebant, ut e Su-
sis, aut prægelidis opacisq; locis ad hunc usum reponeretur. Chij, ut Theophrastus scribit, non
tærebant eam, ut cæteri cum tegmine, sed hoc detracto, tussam & tenui cribro emissam, ex aqua
propinabant. In Ceo insula mos fuit, ut sexagenarij senes, conuocatis necessarijs, solenni sacri-
ficio Cicutam epulati, & coronati biberent. Strabo autor, ut fere in Theophrasto non Chios,
sed Cios legendum putem. Cui consuetudini se Valerius quoq; maximus secundo libro, in-
terfuisse tradit, in eius insulæ oppido Iulide. Cicutam sunt qui etiam Ephemeron, a celeritate
interitus uocant, ut Photion autor est. Recentiores Cicutæ duo faciunt summa genera. Aqua-
tica, frigentis naturæ. Terrestris, calidæ. Terrestris duo item genera. Maius, et Minus. Sed quo-
niam autorem nullum proferunt idoneum, uereor ne (ut fere solent) hallucinati fuerint. Alio-
quin Cicutæ similem diximus esse Myrrhin herbam, ob id Cicutariam a nostris appellatam, ca-
lentis ingenij. Nam uerba illa Plinij, Caulis inquit Cicutæ uiridis, & urit plerumq;, ut in Plata-
nis, quia sensum nullum commodiorem habent, correximus ex Theophrasto ad hunc modum.
Caulis Cicutæ uiridis, e Suis plerumq; Athenas perlatus. Quanc; Cicutæ uis est & illa (si Cel-
so credimus libro quinto) exedendi corpora: ut forte seminibus & folijs frigida sit potestas, cau-
li feruida. Illud uero minus tolerabile, q; Mauritani, uel eorum interpretes, illud Rutæ genus
syluestris, quod Dioscorides & Plinius Armala uocari scribunt, ipsi pro Cicutâ capiunt. Sunt
qui (quod Galenus ait tertio libro *ὑποκρίων*) Cicutam Sturno cibum, homini uenenum esse, cõ-
uerterint. Hyoscyamum esse Turdo cibum, homini uenenum: quo nihil esse potest fœdius, in-
peritius, absurdius.

E X. M. V E R G. C O M M.

Averunt Cicutæ famam Athenienses, succo eius ad mortem in publicis & capitalibus iu-
dicijs utentes. Alioquin indigna erat herba, quæ in omnium poetarum carminibus & sapienti-
um cõmentarijs inueniretur. Vulgaris, ubiq; fere nascens, & homini præcipue noxia. Sed hæc
est omnium fortuna rerum, ut aliquando ex usu gentium honorem, & quam possunt gratiam
inuenierint. Factum id tunc in Cicutâ est, quæ neglecta modo & incognita multis iacet. Muta-
tæq; leges, & pœnarum in sceleribus rationes, pœcõri herbam relinqui cõegerunt, quæ quondã
malo hominis fato nascebatur. Et ut testatus Theophrastus est, in quotidianos usus ex Suis
frigidissimisq; alijs locis maiore diligentia repetebatur. Non erimus ob eam causam nos in e-
ius historia longiores. Quod enim satis sit, ab herbarijs omnibus cognoscitur, Fœniculi caule,

D I O S C O R I D I S

C folio Ferulae, alijsq; a Dioscoride descriptis notis.

De Taxo. CAP. LXXXIII.

Phila

Smilax a Graecis, Taxus a Latinis appellatur. Arbor Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura. In Italia & Narbonensi Gallia Hispaniae cotermina nascens. Auiculae quae Italicae Taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint easdem homines, alui profluuium corripuntur. Narbone tam praesentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, laedantur, & saepenumero moriantur. Quare de Taxo haec traduntur, ut ab ea caueamus.

BARBARI COROLL.

Pli, li, 16, ca. 110

Smilax, siue Taxus, est ubi a Theophrasto & Dioscoride Milos appellata sit, folio aeterno, extremitatibus & lateribus sinuato, ut Quercus & Paliuri, & omnino Ilcis, molliore tantum profundioreq;. Differt & materia ab Ilce, q; soluta & tenera in operibus est Taxo, praesertim in Arcadia: ubi & nigra est ac punicea. Flauet in Ida, tam similis Cedro, ut imponat mercantibus, praesertim medulla. Germen ei maxime serotinum. Floret paulo ante solstitium. Fructificat a uergiliarum obitu. Facillime augetur, procera, similis Abieti, minus excelsa, sed alijs crebrioribus. Folium quoq;, ut scribit Plinius, Abietis, sed pinguius, ac minus uirens. Strigosa, tristis & dira: nullo succo, baccifera. Radices ei graciles, per summa cespitum breues. Circa Idam rara. In Macedonia et Arcadia frequentior. Rotundo fructu, et paulo ampliore q; Faba, colore ruffo, tactu molli, ueterinis lactifero, non item ruminantibus. Sunt qui eum quoq; mandant suauis cibo, & innocentem praedicent. Umbrosissimis locis prouenit. Fumus ex eo mures perimit. Mari fructus, ut Plinio uidetur, noxius, locale quippe. Baccis, in Hispania praecipue, uenenum inest. Vasa etiam uisitoria ex ea uinis in Gallia facta, compertum est mortifera fuisse. Sunt qui Taxica hinc appellata putent, quae nunc Toxicia uocantur, quibus sagittae tinguntur in Arcadia, ueneni uel praesentissimi. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus aereus adigatur. Conglutinamenta, siue subscudes, ex ea serinijs & subfellijs parantur. Nunc et arcus, & scorpiones. Nec Taxus uulgo, sed literae prioris immutatione, Naxus, & Naxius quoq; dicitur: quod nomen & Dioscoridi fuisse cognitum uideo, ubi uenena libro sexto numerat, eodem loco, non Taxum, sed Toxum a Romanis dici credidit. Nec Thymalon, ut hic, sed Thymilon scribendum: quod & Aetius quoq; sequitur. Paulus Thymion. Galenus Taxum etiam dici Caeton inquit. Paulus Caeton spinae genus esse, quam Dioscorides libro sexto uocauit Axon, cuius pappi recentes, in cibo sumpti strangulant, in quibusdam exemplaribus Ixiae nominati. Verisimile est hanc esse Caeton, de qua Theophrastus & Plinius loquuntur. Caetos inquit, Siciliae tantum nascitur suae proprietatis, cuius in terra serpunt caules e radice, lato folio, & spinoso, quos uocant Caetos, nec cibo desquamatos fastidiunt, gustu amariusculo. Sed & seruati sale uescendo sunt. Vnum caulem rectum habent: qui Pernix dicitur, eiusdem suauitatis, sed uetustatis impatientem. Semen ei lanuginis, quam Pappon uocant: quo detracto & cortice, teneritas cerebro Palmae similis relinquitur. Vocant Scalam, siue ut Plinius Ascalia. Alii bi Plinius, Sunt inquit & ceduae Palmarum quoq; syluae, quae minantes, rursus ab radice succifae, dulcis medulla earum in cacumine, quod Acrum appellant, exemptaq; uiuunt, quod non aliae. Vocantur autem Chamæriphe etiam a Theophrasto, folio latiore ac molli, ad utilia utilissimo, copiosae in Creta, sed magis in Sicilia. Nunc uulgo Siculum Romanumq; Ciphilionem, mercatu eius frequenti nominat. Aliqui Palmidium ab quadam Palma spadicum similitudine, ut ex quibus scopae fiant. Margyllion Hispaniae modo appellant credo, quia bacculas rubentes, margaritis similes ferant, Dumulos uocatas, quibus filo immissis, feminae supplicationes praefectq; suas numerant. Plinius quodam loco, Margarides inquit Palmae breues, candidae, rotundae, acinis q; balanis similiores: quare & nomina inquit a margaritis accipere. Diuersum tamen genus hoc ab Hispano illo fecerim, q; in meridiano tantum orbe Margarides nascuntur, et quidem una tantum eius arbore in Chora, ut idem Plinius affirmat. Iam hoc quod dixi Palmidium uocari, non Siciliae modo peculiare, sed Aegypto, & Hispaniae. In Italia quoq; nasci perhibent, non procul Terracina. Mirum quod traditur in Aegypto, ipsi etiam Palmarum quorundam innasce truncis, sed minoris operis ad mandendum. In orbe reliquo duorum generum, sed eodem cespite proueniunt, mas & femina, Sexum distingui semine, quod Pappon, ut dixi

mus appellant. Fallit hoc imprudentes, opertum cortice multiplici, tunicis ferrugineis interue-
stientibus. Cortex Folij modo in latum ex angusto panditur, & armatur aculeis. Ideoq; latū &
spinosum a Theoph. dictum est. Ex huius crassitudine in Aegypto charta mō tingitur uilis, ad
contendas inuoluendasq; segestriū usumerces. Ex tunicis quas intercursare diximus, in eadē
provincia, funes, rudentesq; neuntur. Caulis ipse cēdius quorannis, aliōquin adolescit crassi-
tudine in tantum, ut arboris iustæ truncum æquet ambitu.

EX. M. VERG. COMM.

Cecinit quondam Maro primus idē, maximusq; Bucolici carminis latinus autor, Iunipe-
ri tolet esse grauis cantātibz umbra; monuitq; pastore, s' sub spinosam, densioriq; umbræ arbo-
rem uocandas homini non esse musas. Mox pro Apibus præcepit, Et tua Cyneas fugiant exa-
mina Taxos: nullibi quæ maleficij dispensatione. Siquidem Taxos fugisse potius q̃ Iuniperos
homines oportebat: si ut hic, & alij tradiderūt, lætalis homini earum umbra est. Plinius. 16. uo-
lumine, cap. 11. de ea ait. Et esse in Arcadia tam præsentis ueneni, ut si qui dormiant sub ea, cibū
ue capiant, moriantur. Et præter Plinium Plutarchus sui Symposij tertio cōmentario, quo ca-
pite querit, Si in conuiuio florum coronis utendum sit, ἱσποδοὶ γὰρ οἷον καὶ σμυλᾶκος ἀποκτείνουσι τοὺς ἑγκαταδραπνήτας ὅταν ὄρνῃ μάλιστα πρὸς τὴν ἀνδρῶν. Quod est, Ferunt enim & Smylacis um-
bram, in ea dormientes perimere, quo tempore præsertim ad nouos flores turget. Contraxitq;
umbræ eius noxam ad id tempus maxime Plutarchus, quod ab re nō est, ob eam quā ille tra-
didit causam, dicens ueluti telis, sagittisq; aliquibus uulnerari cerebrum halitū florum per na-
res attracto: qui cum in hac arbore semper lætalis sit, in noua florum productione, ob acriore
maiorēq; eius copiam magis nocet. Descripsit Plinius quo diximus loco arborem longius:
Barbarus etiam in Corollario suo, ex græcis latinisq; scriptoribus omnem eius historiam cō-
legit: & præter eos uulgaris, notaq; cunctis nunc etiam arbor est. Quæ una tantum mutata lite-
ra p. Taxo, Naxus nobis uocata. Durissimę materię arbor, & ob id in fabrica expetita, ad ea quę
diuturniora futura sunt. Balistæ, arcusq; nunc etiam ex ea fiunt. Sed quondam in frequentiore
eius teli usu, & ipsa in maiore usu fuit. Fluores alui baccas eius uescientibus fieri, hic scriptor ait:
ex eademq; causa Maronē nos credimus monuisse, fugiendā Apibus esse arborem: ne cita aluo,
cui malo obnoxia perirent. Quia enim ui homini nocet, eadē illis nocere credendū est.

De Apocyno. CAP. LXXXIII.

Apocynon aliqui Cynanchon appellant, alij Pardalianches, alij
Cynomoron, alij Cynocramben, alij Cynoctonon, alij Phaleō,
alij Cynanchen, alij Oligorō, alij Hippomanes, alij Onistia, alij Ophi-
oscorodon, alij Cynaricam, alij Elaphoscorodon, Magi Paralyfin, Ro-
mani Brassicam rusticam, aut caninam. Frutex est paruis uiticulis con-
stans, male olentibus, fractu fere inuictis, folio Hederae, molliore tamē,
& per extremum acutiore, uiscoso, graui odore. Id luteo succo turget.
Siliquæ ceu Fabarum, digiti longitudine protenduntur, semine intus
albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uul-
pes, & pantheras enecant in cibo data, & ptinus eorū coxas resoluūt.

BARBARI COROLL.

Apocynon, semine acuto, diuiso, lanuginoso, graui odore, uirgis minus longis q̃ Hedera.
Quadrupes necat, si uescantur, omnes. Est & uenenum hominibus. Dicitur & Cynocram-
be a Galeno, ab aliquibus Hippomanes. Quāq; & uirus defluens ab equarū inguinibus quo
tempore amoris insania feruntur, Hippomanes appellant. Apud Hesiodum certe Hippoma-
nes herba est, quam edentes equi, aguntur in furorem. Dicitur & Capparis Hippomanes. Est
& saltationis genus apud Comicos Apocinon, sed scriptura distinguitur.

EX. M. VERG. COMM.

Inutilis medicinæ huic scriptori Canina Brassica est. Posteriores tamen græci calidam, sine sic-
candi ui eam descriperunt. Eamq; ob causam emplastri modo impositam, discutiendi uim ha-
bere. Plinius præterea li. 24. capite. 11. Suspiriosos, pleureticos, & omnes lateris dolores ex aqua
semen eius sanare testatus est. Quo loco hīdem notis, & paulominus q̃ hīdē huc scriptori uer-
bis eam effigauit. Canes, & omnes quadrupes necare in cibo datam Diosc. pariter testatus.

S ij

ἀποκύνων

Pli. li. 24. ca. 11

C Quæ nominis frutici huic præcipua causa est. Pluresq; ex appellationibus eius non aliunde q̃ ex eo usu causam habent. Dico autem, ex eo usu: quoniam sæpe fita uenatoribus, & alijs quibus syluas, aut alias domos ingredientibus adlatrari incòmodum fit, ut cum odisse canes in cœperint, uenenato aliquo cibo eos interceptant: quale Apocynon hoc est: quod Paulus Aegineta in. 9. ait ideo Cynocramben, id est, caninam Brassicam, et Cynomoron, id est, canum mortem uocari, q̃ eos celerrime enecat: eadem q̃ uī maleficium & letalis homini sit. Quod pariter indicat Apocyni uox: nihil aliud græcis significans, q̃ qd abesse canes facit. Quæadmodū Cynagos, qd canes angit & stragulat: & Cynoctonō, qd canes enecat. Quæ oēs eiusdē rei indices uoces, eadē hñt causā. In ceteris nō tā facilis nob, intellectus ē, ob eāq; cām pitioribus relinquunt.

N **De Nerio, seu Rhododendro. CAP. LXXXV.**
N **E R I O** N aliqui Rhododaphnē, alij Rhododendrō, alij Spongiō, alij Hæmostarin, Romani Rhododendrō, Lucani Iemanen, Aegyptij Scympham, Pœni Rhododaphnem appellauerunt. Frutex est uulgaris noticiæ, longioribus q̃ Amygdala folijs, asperioribusq; flore in Rosam conformato, fructu Nuci græcæ simili, corniculato, qui parestactus quandā floccorum speciem ostendit, Hyacinthi pappos representantē. Radice longa, acuta, lignosa, gustati salia. Nasctur in amoenis, maritimis, amnibusq;. Flores & folia mulis, asinis & quadrupedum plurimis uenena sunt, hominum uero contra serpentium morsus præsidia. E uino pota, eo magis Ruta addita, imbecillæ etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maderint, moriuntur.

B A R B A R I C O R O L L.
N Erion Sabina quoq; herba dicitur. Sempiternum fronde, caulibus fruticosum. Mel insanum e Ponto contrahitur, Rhododendri flore, quo scatent syluæ. Hoc nomen quidem apud nos inuenit latinum, ut Plinius irradit, Galenus hanc intelligit, quoties Rododaphnen nominat, aut Nerion, duobus eam locis prodens. Photion Rhodoniam quoq; dici meminit. Quodam tamen Rhodoniam interpretatos inquit fuisse uitam, flauas uuas ferentem. Dioscorides Rhododaphnen a quibusdam uocari Spongon scribit. Actius Spongitum herbam dicendo, proidentia sedis utilem, quid intelligat haud scio.

E X M. V E R G. C O M M.
Fecerunt græcis Rhododaphnē Rosæ flos, & Lauri folium, quæ fruticis huius præcipue notæ sunt. Fecit idem Rosæ flos & arbor eidem genti Rhododendrū. Sic enim fruticem hunc etiam uocarunt. Pliniusq; hac sæpius q̃ illa pluribus locis uoce usus est. Nec refert q̃ hic Amygdalæ folijs folia eius comparauerit. Lauro em̃ & Amygdalæ non dissimilis magnopere foliorū figura est: longa eiusdem ferelitudinis & in cuspidem acuminata. In cæteris eius appellationibus parum certa nobis ratio est: ideoq; indescriptæ relinquuntur.

De Fungis. CAP. LXXXVI.
Fungorum differentia duplex. Aut enim mandūtur, aut perniciosales sunt. Multis de causis uenenosi gignuntur. Si enim clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arbore sue, quæ pariunt noxios fructus, erumpat. Continent nescio quod strigmentum, concretamque pituitam, terraque eruti q̃ celerrime computrescunt, atque marcore uitiantur. Sed qui ueneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. Larcius tamen sumpti, nocent, & ægrius concoctū strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida

muria, aut feruefactæ Satureiæ, aut Origani iusculum. Debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægre dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

BARBARI COROLL.

Fungi cortice, medulla, neruo, uena carent, pediculo admodum æquali: quanquam quæ ex his Pezicæ a græcis uocantur, nec pediculum, nec radicem habent. Fungos græci Mycetas uocant: nec distinguunt. Quanquam Paulus etiam Boletos cognouit, Bolitas appellando: quibus & priuipatum inter Fungos dedit, sicut secundum locum his qui Amanitæ nominantur. Sunt & Egitæ, sed industriæ fermento in ipsis Populi nigrae truncis diluto aqua, protinus coalescentes. Quorundam facile noscuntur uenena, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, rimosa stria, pallide per ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdam, sicut & Nitri similes, ueluti guttas in uertice albas ex tunica sua gerunt. Voluæ enim terra ob hoc prius gignit. Ipsum potum hæc primo nascente, mox crescente in pediculo corpus absument, raroque unquam gemini ex uno pede. Origo prima elimo, & acedente succo madentis terræ, aut radicis ferme glandiferæ. Initio spuma lentior: dein corpus membranæ simile: mox partus, ut diximus. Deprehendisse perniciæ, nisi agrestes possunt, atque qui colligunt. Caligaris clauus, & rubigo ferri, aut calyx uenenatos faciunt. Boletis ortus occasusque includitur septem diebus. Fungorum lentior natura, & numerosa genera, nec nisi ex arborum fere pituita. Tutissimi qui rubent, callo minus diluto quam Boletis rubore. Mox candidi, uelut apice flaminis, insignibus pediculis. Tertium genus suillis ac comodatum uenenis. Quidam discreuere arborum generibus, Fico, Ferula, & gumiferis. Non ite Fago aut Robore, aut Cupressu. Omnium colos liuidus. Sed his aberit argumentum ueneni, quod similiores arbori Fico fuerint. Noxij erunt Fungi, qui in coquendo duriores fiunt. Innocentiores, quod nitro addito coquantur, si utique percoquantur. Imbribus proteniunt omnia hæc. Siccant pendentes suilli luncu transfixi, quales a Bithynia ueniunt, Succinets nouaculis, & argenteo apparatus Fungos ipsæ suis manibus delicias coquebant: unde Græci hos Deorum cibo nasci dicebant, ut Tranquillus in Nerone meminit. Porphyrius, non cibum, sed filios Deorum Fungos & tubera uocabant, quia puenire uiderent sine semine. Nata forte diuersitas, quod uerbum *θεοσπορος*, & eum qui alit, & eum qui alitur significat, accentu modo comente. Porro Deorum & cibus & alumni ideo uideri possunt, quoniam & eos quorum pater ignotus est, filios terræ dicimus: quod quidem & Cicero in quadam ad Atticum epistola confirmat de Lica. Recentiores alia quoque nomina, uel genera dedere. Ouatros, ab oui similitudine. Spongiolos, a spogia. Digitellos, a digitis. Porriginosos, a porrigine. Pezicas, quasi sessiles & pediculis carentes. Lacinia priuatim dicuntur e castanea, magnitudine spectabiles, ut singuli sufficiant. Innocentissimi sunt e rubis & carduis uere nati, rotunditate dufili, quos inde Prunulos, & Spinulos appellant, & Cardeolos. Orii & e saxo, i. lapide Lyncurio, siue Lyncæo, uulgaris uoce dicto Fungus, admirabili natura. Præciditur hic in esum, & alius subnascitur anno toto. Pediculi pars relicta duratur in silicem, atque ita semper crescit lapis, restibili focunditate: nec credidimus, antequam domi natos ita menducaremus. Nouum et hoc uita sibi comperit in uicem multa perdit: quanquam est ubi Plinius hoc innuat, ut in castigatione Pliniana. 20. secundilibri diximus. Sunt & ignarij quidam Fungi, & quibus strigilium uice tostrina utitur.

EX M. VERG COMM.

De tota Fungorum natura, quos tantopere ad cibos & ganeam mortalitas expetit, breuissime & uno carmine decreuit Flaccus, cum in Sermonibus suis cecinit, Præfibus optima Fungis natura est: alijs male creditur. O sapientem poetam, qui dum ganeam, multosque eius saporis didicisse uideri uult, humanæ uitæ tam utiliter consuluerit. Græcorum medici etiam, exceptis Boletis, & quos Paulus Aeginera suorum, ut nos credimus, temperorum nomine Amanitas uocat, omnes una sententia damnauerunt, frigidos, pituitosos, & crassioris humoris inter cibo constituentes. Plinius tamen. 22. uolumine eiusdem numeri capite, proximoque illi longioris historia, bonitatis eorum, uitæque, & totam naturam profecus est. Quæ poterunt uolentes certius in eo cognoscere. Fuerunt medicorum & sapientiorum de Fungorum natura & ui decreta quæ paulo ante dicta sunt. Poetæ tamen Boletos præcipue laudarunt. Et inter antiquos medicos Paulus Aeginera primo uolumine de Fungis, Boletisque sic dicens. *ὅτι ἡ μικρὸς ψυχροῖτε ὑπὸ τοῦ*

DIOSCORIDIS

Cοι δὲ ἀμαυρίται δυνάστες ἴσι τὰς ὥρας. τῶν δὲ ἄλλων μυκήτων ἀπὶ χροσθαί δει. πολλοὶ γὰρ ἐξ αὐτῶν θανάσιμοι. καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ βουλῆται ἀνιθότροποι ἰσθίμονοι κινδύνον παραίτιος πολλὰκις γίνονται. Quorum sensus est. Fungi uero frigidi, picuitosi, & mali succi sunt. Omnium minus nocetes Boleti sunt. Ad summum elixi. Qui uero Amanites dicunt, secundum post Boletos ordinem habent. A ceteris abstinent dum est. Plures enim eorum mortiferi sunt. Quinetiam Boleti ipsi si minus elixi comedant, periculi, mortisque causam habent. Et hec per Fungorum maleficio, tutoque usu satis sint. In quibus uidendum, sint ne Pauli Aeginetæ Amanites, Flacci pratenfes. Boletos enim credimus nos ἀπὸ τοῦ βόλου .i. a bolo dictos fuisse.

De Colchico. CAP. LXXXVII.
Colchico aliqui Ephemerum, Romani agrestem Bulbum uocant. Autumni exitu florem ædit Croci, candicantem, ab eo tempore folia Bulbi, sed pinguiora, caulē palmo altū, ferentē ruffum semē, radicem foris e nigra rufescentē, quę delibrata, cādida et mollis spectat. Lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenit. Bulbus mediā habet rimā, fissurāque, qua flos erupit. Plurimum in Messenia, et Colchis enascitur. Ea comesta, Fungorum more, strangulando enecat. Hanc autē depinximus, ne a quocunque imprudenter pro Bulbo deuoret. Miram enim incautis uoluptatē affert. Remedia sunt eadem quę Fungis. Bubulum etiam lactipotum auxiliatur. Itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Pli. li. 29. ca. 10
& li. 25. ca. 11

BARBARI COROLL.
Colchicon, & Ephemerum, de quo mox prodetur, Hermodactyli genera a neotericis uocantur. Galenus & Paulus Ephemerum duplex faciunt, Dioscoridem sequuti. Vnum delibutorum ueneni uis, de quo hic. Alterum quod Irin syluestrem cognominant, de quo proxime dicemus. Colchicon sane haberi modo passim prædicat, Ephemerum nesciri. Hermodactyli porro, ex quibus pilulę ad podagras tantopere commendantur, ab Actio & Paulo, quinque foliū sic, an Ephemerum, parū mihi constat, Alioquin recentiores per Ephemerum accipiunt. Dioscorides quinque foliū Hermodactylō quęque dici, & morbis articularibus, et coxæ dicitur conuenire prædit, Ephemerō minoribus.

EX M. VERG. COMM.
Misceri in antiquis scriptoribus inuicē Colchicon, et Ephemerō aliqui crediderunt, Nican-drum in Alexipharmacis suis dicentem audientes. ἢν δὲ τὸ μυστικὸν χολχιδίος ἰχθυόμενον πῦρ. καὶ τοῦτον ἀλεῖται ἐφήμερον. Quod est, Si uero Colchidis Medææ infestum ignem poculum illud hauserit Ephemerum. Mox Plinium inter uenena Colchicum, & inter medicas herbas Ephemerum numerantem. Quinetiam hunc ipsum hoc loco priuatim de utroque agentem, & inuicem utrumque Colchicon et Ephemerum uocantem. Post hos Paulum Aeginetam, Ephemerum in quinto inter uenena constituentem: mox iterum in. 6. Ephemerum his uerbis describentem. ἰχθυόμενον ἐν θαλάττειον ὄν. ὅπερ ἰσθίον καλεῖται. Quod est, Ephemerum non quod noxium & letale, sed quod agrestem Irin uocant. Et ne longiores simus, in cunctis græcis modo ueneni, modo utilem dentibus & tumoribus herbam Ephemerum inuenientes, præsentī & periculosa semper dubitatione. Nisi cognouerit aliquis duō quōdam Ephemerī genera fuisse: alterum quod Colchicon a natali solo diceret, flore albicante, crocinio simili: radice bulbi, sed pinguiore: caule dodrantali, notisque alijs quę a scriptore hoc in historia eius numerantur. Quod Colchicon Plinius simpliciter nominauit lib. 29. cap. 10. & Paulus Aegineta in quinto Ephemerō: cuius uerba sunt. τῶν δὲ ἰχθυόμενον λαβοῦσι ὁ ἴσθιος καλοῦσι καλχιδόν διὰ τὸ ἐν χολχίδι φέσθαι. Quorum sensus est. His autem qui Ephemerum hauserint, quid quidam quia in Colchide nascitur Colchico uocant. Quodque hic idē scriptor in sexto inter uenena, nō Colchico, sed Ephemerū uocabit, quod loco cū hic plantā descripsisset, maleficij eius & ueneni notas remediaque: certius illic docet. Alterū quod simpliciter Ephemerū dicitur innocens, & ut paulo ante nos diximus, dentibus & tumoribus utile. Cuius meminit Plinius lib. 21. cap. 11. his uerbis, Ephemerō folia habet Lilij, sed minorā, caulem parem, &c. Quod hic ipse scriptor mox describet. Et ut rem totam absoluamus: quod Paulus Aegineta in. 6. descripsit, habereque ait repercutiendi discutiendique vires, esseque Ephemerum duo: & qualia nos diximus ueneni alterū, innocens alterū, satis idem Paulus Aegineta indicat: qui de innocente hoc agere incipiens ait, ἰχθυόμενον ἐν τῷ θαλάττειον. Quod est, Ephemerum nō quod noxium & letale, &c. Manifesto ex ea propositione, diuisioneque argumento, duplex eius genus

esse, alterum qđ ueneni, & alterū quod remedij rationem habet. Factum ideo est, dum in anti-
quis græcis uaga appellatione utrūq; Ephemeron dicitur, ne sine causā crediderint aliqui, mi-
seri inuicem Colchici, & Ephemerī appellationes. Verumtamen quantum similitudo aliqua
nominis cōmunionem in illis fecit, tantū natura utribus ea disereuit: eamq; ob causā in ue-
terum scriptorum lectione obseruanda diligentius ea uox erit, ut noxium ab utili, & uenenum
a medica materia secerari possit. In quo non parū proderit, de quo agatur, & quomodo obser-
uasse. Fuerunt qui maleficum illud Ephemerū dictum putauerint, qđ hausto eo, una tantū die
superstites sint, qui id hauserunt: & a similitudine eius, deinde alterum illud. Nos tamen pro-
fiteri non audemus, utrius similitudo alteri nomen fecerit.

De Ephemero.

CAP. LXXXVIII.

Ephemeron aliqui syluestrem Irin appellant. Folia habet Liliij, sed
tenuiora, caulem parem, florem candidum, amarum, semen mol-
le, radicem unam, digitali crassitudine, longā, adstringentem, odoratam.
Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decoctio
colluantur. Folia in uino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quæ
nihil adhuc humidi contraxerunt.

BARBARI COROLL.

Ephemeron folijs Liliij, minoribus, semine superuacuo: dictum ita, quod intra diem iugu-
let, ut Theophrastus putat. Sed illud alterū genus est, & Colchicon proprie crediderim, folio
Ellebori. Radicula omnibus nota. Seruorū in desperatione confugiū. Hoc ipsum Colchicon,
& Plinius Ephemerī appellatione intelligit, quotiens medicinas contra Ephemerū impactum
cōmemorat. Ephemero radix longa, non ut Colchico rotunda. Quidam Ephemerū uocabu-
lo delibutorij ueneni compositionem quandam capiunt, ut Aetius testatur.

EX M. VERG. COMM.

Satis in Colchico superiore capite de Ephemero hoc dictum a nobis fuit. Querendum mō-
do superioribus relinquimus, sint ne quos medici & herbarij nunc Hermodactylos uocant. E-
phemeron hoc, an Colchicon, illud paulo ante descriptum. Nihil enim modo superest, qđ mo-
nere legentes, dicere Barbarum, habere Ephemeron hoc florem ceruleum, quē nos candidum,
ex cōmuni, eademq; omniū quotquot uidimus codicum lectione, Plinium ut uidetur in floribus
eius colore, potius qđ Dioscoridem, quē uertebat, secutus ille est. Sunt em̄ in historia Ephemerī
huius Plinij hæc uerba. Ephemeron folia habet Liliij, sed mindra: caulem parem, florem cerule-
um. At hic ἀνθὸν λευκὴν αἶτ, quæ uoces nisi ad candidū colorem trahi nōn possunt. Signasse hoc
etiā placuit, ut qbus auctoribus qđ diuersum sit uterq; nostrū uerterit, legentes sciant.

De Alsine.

CAP. LXXXIX.

Alsinen aliqui Anthyllion, alij Myortochon, alij Myrtosplenon,
Romani Muris auriculam, Pœni Labatholabat, nonnulli Myos-
ota uocant, quoniam musculorum aures folia imitantur. Lucis, opacisq;
gaudet, unde Alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ Helxine, nisi folijs mi-
nor, minusq; hirsuta esset. Cum teritur, odorem Cucumis reddit. Vim
refrigerandi adstringendiq; obtinet. Oculorum inflammationibus cum
polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emēdat
omnia quæ Helxine, id est, Muralis hæba.

De palustri Lente.

CAP. XC.

Lens palustris, quam agriam aliqui, alij Epipteron, Romani Vi-
peralem uocant. Inuenitur in aqua non fluente, muscus Lenticu-
læ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectioni-
bus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta, Glutinat &
procidentia puerorum interanea.

A

ἐφίμπερον

Pli. li. 25, ca. 13.

B

ἐλσίνα

φάκος ὁ ἐπὶ τῶν
τελευμάτων.

C L B A R B A R I C O R O L L

Lens palustris, Phacos Epitelmato a Græcis uocatur, sine radice, sine folijs, etiam si id quod in ea fructificat, simile folio conspicitur, minus habili humore, quæ ut in eo folium constari possit. Quidam genus aliud, non quidem in aqua nascens, sed in uliginosis dilutis, maius et rardunt, carens folio, Agriam Phaceam, hoc est, syluaticam Lentem uocantes.

E X M V E R G C O M

Quæ admodum in cognomine legumine secundo libro illud describens Dioscorides *καὶ ὁ ἰσθμίου*, id est, Lens quæ comeditur dixerat, ut ab hac, & ab Elediphaco eam separaret: eadem ratione de palustri hac docens, *φακός ἐν τῶν πελάγεων*, quod est, Lens quæ in lacustribus inuenitur, dixit. Cognomines enim, sed natura diuersæ, separari discrimine aliquo debuerat. Id acceptum est in illa ab usu, in hac a natalibus. Secutiq; posteriores omnes hunc scriptorem, in discriminibus his sunt. Muscum, non herbam hic dicit inueniri, in aquis non fluentibus. Vnaq; uoce illa satis naturam eius indicauit. Fluitat enim in summa aqua Lentis figura, a cuius similitudine nomen inuenit.

C De Semperuiuo, seu Sedo magno. C A P. XCI.

Alzoon maius, aliqui Aithales, alij Ambrosion, alij Chrysispermion, alij Zoophthalmion, alij Bubophthalmion, alij Stergethron, alij Aeonion, alij Aichryson, alij Olochryson, nonnulli Chrysanthemon, alij Protogonon, alij Boron, alij Notion. Magi Paronychiam, alij Chrysitin, Romani Ceriam cuspiam, aut Iouis caulem nominant, alij Lepetes, alij Sedum maius, Aegyptij Pamphanes. Semperuiuum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia uireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirescentes, Characiæ Titimali modo insecti, folia carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem: ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis. Supra domicilia etiam seritur. Eius uis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus cum polenta, aut rosaceo perfunditur. Datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluuium. Teretes tineas potus in uino excutit. Subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uicio conceptis inungitur.

Pli. li. 25. ca. 13.
lib. 28. cap. 17.
lib. 26. ca. 8. 11.

B A R B A R I C O R O L L

Alzoon maius, aliqui Iouis caulem, siue oculum, alij Digirellum, alij Spegeton, siue Hypogelson, quod in subgrundijs fere nascitur, Aliqui Amerimnon a sollicitudinis depulso. Sunt qui Trithalles a terno flore. Sunt qui Aethalles, ab æternitate. Sunt qui Erothales, & Erogetton, a uerno tempore, aut quoniam amatorijs conueniat. Latini & Sedum maius. Atq; Sadum. Opilius Aurelius Sefuiuum. Nonnulli Semperuiuum. Vulgus Auricularem. Huic crassitudo caulis plus quæ pollicaris: folia carnosa, larga, succo, leuia, oblonga. Sedum herbam fuisse putant eam, quæ Glaucio immortalitatem dederit, Marino Deo. Fuit & alter Glaucus in fabulis, qui Dracone medico monstrante, contactu herbæ, cuius non redditur nomen, reuixerit sub Minde.

E X M V E R G C O M

Viret ubiq; Sedum in tegulis, nec alibi nunc facile inuenitur, inuasitq; iam pridem aliquibus locis plebis animos indigna coelo opinio, non percuti fulmine domum, in cuius tegulis uireat Sedum, frigoreq; suo placam celestibus illis ignibus aduersari. Quod minus miretur aliquis, memor, ob eam causam Laurea semper contra easdem iniurias munisse caput Romanos Cæ-

fares. Sed ignaui, nihilq; timēdi ignes illi erunt, si tam exiguae plantae frigore mortalis fiet flammam illarum fulgor. Non tanta coelestibus infirmitas est: nec contra Iouis tela, quibus poete uti Deum ad poenam sinxerunt, tam facile praesidium mortalibus est. Inuenit natalem locum sibi Sedum, in quo procul ab alijs plantis caelo propinquior, & foli, cuius radios non timeret, copioso succo ipse abundans, eodemq; frigidissimo terrae humore ad uitam non indigeret. Non aliter q̄ qui in meliore fortuna sibi ipsis, ut Lucretius cecinit, ualere & uiuere possunt, nec aliorum ope ad uitam indigent, & ab aliorum iniurijs per se tuti, iocundo animi sensu, pereuntes ubiq; alios contemplantur: non quia factari quēq; sit dulce uidere, sed quibus ipse malis careas, quia cernere suaue est. Quae Sedi fortuna semper fuit: uirensq; ipsum in tegulis, aeterna uita pereuntes quotannis tota terra nunc aestu, nunc frigore, nunc alijs coeli & naturae iniurijs plantas alias spectat. Ob quam causam in tanto nominum ambitu ueteribus fuit: praefertimq; graecis, qui non contenti a uitae aeternitate Aizoon, & Aeonion uocasse, tot alijs similibus appellationibus id ornauerunt.

De minore Semperuiuo.

CAP. XCII.

A Izoon paruū, alijs Petrophyes appellant, alijs Brotion, alijs Theobrotion, alijs Crobysson, alijs Chimierinen, alijs Cerauniam, Romani Vitalem, alijs Semperuiuum, Aegyptij Enjeltam. In petris, parietinis, & macerijs, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis, caule a medio emicante, palmū alto, umbellam haerbidosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus praedita sunt. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui Aizoon paruū, alijs Petrophyes, alijs Aizoon syluestre, Romani Semperuiuum minus appellant. Tertium uidetur Semperuiui genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephion uocauerunt, Romani Illecebram, pusillis crassioribusq; folijs, hirsutis, Portulacae proximis. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia strumas discutit.

BARBARI COROLL.

Aizoon minus, Herideis, & Heristhales, & Chrysothales uocatur, a quibusdam Treles, siue Trithales, quia ter floreat. Hoc in muris, parietinisq; nascitur & tegulis. Fructuosum a radice, & sursum usq; ad cacumen: folijs angustis, furcatis: radice inuili. Vermicularis uulgo dicitur. Sunt qui Iessitin, ut Plinius, aut Hysitin, aut Isoteos, tribus enim modis scriptum inuenitur, forteq; Gessitin melius. Quando & maius quoq; Aizoon Hypogessum dici ostendimus, hoc est, Subgrundiarium.

Tertium genus Aizoi Andrachne agria, hoc est, syluestris Portulaca dicitur: de qua etiam superius iisdem uerbis a Dioscoride scriptum est.

De Veneris Vmbilico.

CAP. XCIII.

Cotyledon aliquibus Cymbalion, alijs Scytalion, alijs Cepos Aphrodites, alijs terrae Vmbilicus, alijs Stoechis, alijs Stergethron, Latinis Vmbilicus Veneris dicitur. Folio est in acetabuli formā tornato, ineuidēter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest, radice Oliuae modo rotūda. Succus cum uino circumlitus, instillatus ue, asperam carnis excrescentiā, constringentē os uuluae, reprimat. Inflammationibus, sacris ingnibus, strumis, pnionibus illitu auxiliat. Stomachi ardorē refrigerat. Folia cū radice comesta, calculos frangunt: urinā cient.

ΚΕΤΥΛΙΔΩΝ

C Hydropicis ex melle dantur. Hærbæ utuntur ad amatoria.

Plin. li. 28. ca. 13.

B A R B A R I C O R O L L.
Cotyledon paruula herba, cauliculo tenero, folijs pinguibus. Nascitur in maritimis, petiolisq; uiridis. Non est hæc, ut quidam rentur ea, quæ uulgo Cimbalaris appellatur. Etiam si Cymbalion a Dioscoride uocetur. Est autē Cimbalaris herba, foliotenus anguloso, hederaceo, flore paruo, purpureo, in muris terræ nascens. Quam quidem nonnulli genus alterū Capni dictæ faciunt, ut in Capno testati sumus.

E X M. V E R G. C O M M.
Rara, & nescio an in toto plantarū censu, similis inuenienda alia, orbicularis, & concaua foliorum in Umbilico Veneris figura, nomē illi in græcis Cotyledonis, in latinis uero Umbilici fecit. Licetq; Plinius græca uoce Cotyledona semper uocet, res ipsa tamen, & Apuleius in cōmentariolo illo de herbis, uerisimilem, temporibusq; illis congruā eam appellationē indicat. Persuademurq; facile nos, & his, & alijs indicijs, fuisse græcæ Cotyledonis Romanā appellationē Veneris Umbilicū: quales in plerisq; alijs ea gens habuit Capillum Veneris, Supercilium Veneris, & plerasq; alias. Libenter em ab ea Dea, quæ totius generationis symbolū in gentiū religione quondā habuit, & quæ leporibus & blanditijs uitæ præfecta esset, ad naturæ partes, quæ grata, aut utili aliqua specie nascerentur, nominū auspicia ueteres Rōmani sumpserunt. Ex qua obseruatione, uidentes in græcorum Cotyledone circumacta in orbem folia, leni in concauitatē descensu, humani Umbilici formā describere, Umbilicū primo: mox ut rei maiestatem aliquā adderent, Veneris Umbilicum uocarunt. In orbem enim circumagitur, & in concauitatem descendit hominis umbilicus. Eadem, sed non tam honesta ratio fuit in Umbilico terræ. Adiecit hic etiam *ὑπὸν ἡ ποδὶ τῆς*, id est, Veneris hortū dici Cotyledona. Idq; Apuleius ille etiā testatus est. Significat autē *ὑπὸν* græcis in cōmuni significationis æstimatione hortum: eamq; ob causā nos Veneris hortū uertimus. Oborta tamē suspicio nobis est, posse *ὑπὸν* hoc loco non hortū indicare, sed tonsuræ, & ornatus capitis, capilliq; antiquā in Perside rationē, qua forte Venus a pictoribus fingeretur: & quoniā circumageretur in ea ante frontē in orbem capillus, ideo aliqui non ab Umbilico, quæ pars in homine, præsertimq; femina saluo pudore ostendi non potest, sed a capite honestiore & aperta cunctis parte appellare maluerint. Hoc em nos magis probamus, q̄ si ea uoce significari etiā moneamus mulierū *τὸ ὑπὸν*, i. pubem, quod græcorum grāmatici docent. Fuisse autē græcis *ὑπὸν* tonsuræ genus, in eius gentis scriptoribus notissimū est. Suspicio tamē coniecturaq; non decretū hoc sit. Eadem causa fuit, cur Cymbalion a cymbalorū consimili forma etiā diceretur. Concaua em pariter & rotunda cymbala sunt. Contra autē Scytalion non satis certā habet rōnem: nec nobis rōcinari facile est, quomodo Scytale, quæ longior erat, ad rotunditatē per similitudinē transferri potuerit.

De altero Veneris Umbilico. C A P. XCIII.
Est & alterum genus eiusdem, Cymbalion aliqui uocant, pinguis folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem ambitum oculi describentibus, ut in maiore Semperuiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina Hyperici, radice maiuscula. Facit eadem quæ Semperuiuum.

B A R B A R I C O R O L L.
Cotyledon secunda, caule longiore, sed pergracili, gustus asperrimi. Huius usu Hippocrates in cibo foemininū sexum concipi, sicut priore masculinum prodidit.

E X M. V E R G. C O M M.
Non est quod in altera Acetabulo hac legentes moneamus. Satis enim per se patet historia eius, a Plinio hīdem uerbis tradita. In medicina autem & remedijs eadem illi omnia quæ maiori Sedo hic tribuit, & ex eo repetenda sunt.

καλὴ φη

De Vrtica. C A P. XCV.
Acalyphen aliqui Cniden, alij Adicen, Latini Vrticam, Aegyptij Selepsion, Daci Dyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui Cniphen, Romani Vrticā mollem uocant. Duo eius genera.

A Syluestris asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs, semine Lini, sed minore. Altera non æque aspera, minuto semine. Folia utriusq; illita, canis moribus addito sale medentur. Gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt ad profluuiâ narium cum succo trita, et naribus indita. Menses ciunt, eadem recentia detrita cum Myrrha, & imposta. Procidentes uulvas, contactu resiliire cogunt. Semen potu ex passo, Venerem stimulat. Vuluam aperit. Cum melle delinctum, orthopnoeæ, & lateris & pulmonu inflammationibus prodest. Thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis ammiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt. Urinas mouent. Inflationes discutunt. Decocta cum ptisana, uitia pectoris extrahunt. Mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uuam, gargarisatus succus reprimat.

B A R B A R I C O R O L L.

V RUCA, ex oibus aculeatis generibus notissima est. Acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus. Sæpe altior binis cubitis. Mitior Fœmina est. Inter syluestres, quæ dicitur Cænaria acrior, caule quoq; mordaci, fimbriatis folijs: quæ uero etiâ odorem mittit Herculanea uocatur. Semen omnibus copiosum, nigrum. Mirum, sine uillis spinarum, aculeis lanuginem ipsam hœreant, & tactu tantum leui, pruritus, pustulasq; adusto similes existere. Notum est remedium olei. Sed mordacitas non protinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi foliis roborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere, non ingrato, multis etiam religioso in cibo est, ad pellendos totius anni morbos. Syluestrium quoq; radix omnem carnem teneriorem facit simul cocta. Quæ uero ex his mitissima, & folijs non mordentibus, Lamium, siue Anonitum uocatur, a quibusdam Vrtica iners, & mortua. Album hæc habet in medio folio, sacris ignibus utile. Quidam e notis discreuere genera temporibus, autumnale appellando, & reliquis ad eandem rationem. Celebrat & marina cognomine Plinius ad uescicæ uitia. Condit laudes Vrticæ Phaniæ physicus, utilissimam cibis coctam, inueteratq; professus. Si quadrupedes foetum non admittant, Vrtica naturalia earum fricanda monstrant. In Oeta monte, sterilius, nec iniuri se patientium caprarum ubera terentes ea, lac eliciunt. Ex Vrtica in Aegypto fit oleum. Semen colligi mellebus oportet. Alexandrinum maxime laudatur ad omnia. Vrticam Hippocrates Nidam uidetur appellasse, cum alij Cnidam uocent. Est ubi Clidam legas corrupte, ut cenfeo: nisi aliud genus sit. Grana inquit Clidam sexaginta, clysteris uuluis injiciantur, quas bilis infestauerit.

E X M. V E R G. C O M M.

V RUCA nihil in censu olerum inuisus nascitur, igneo pruritu urens: & inde factio nomen. Vesciebantur nihilominus ea antiqui. Suntq; eius in cibo usus, testes antiqui in latinis poetis: quibus iocundum erat Ocimo se & Vrtica recreare. Vbiq; & omnibus tam nota herba est, ut nihil monere in ea opus sit. Præterq; a Græcis Cnidem, ab eorum uerbo κνίδω dictam fuisse. Significat id cum dolore pungi, uexariq;. Vocauit Acalyphas etiam Aristoteles in mari Vrticas tactu eadem in urendo ui. Medetur ea multis in humano corpore morbis, plurimisq; sciat remedijs. Eamq; ob causam non minus ad medicinam, q; ad cibos medicis & olitoribus curanda.

De Galiopsi.

C A P. XCVI.

G A L I O P S I S, aut ut alijs Galeobdolon, uel Gallephos, Aegyptijs Aetopi, Latinis Vrtica labeo dicitur. Frutex in totum caulem & folia habet Vrticæ, lauiora, & quæ grauem odorem trita reddant. Flore purpureo, tenui. Nasctur circa sepes, edificia, ac semitas, ubiq;. Folia, caules, semen, succusq; duricias & carcinomata dissipant. Strumas,

Pli. li. 21. ca. 25.

Bl.

20210410

D I O S C O R I D I S

C panos, & parotidas discutunt. Oportet bis in die tepidū ex aceto catapla-
sma imponere, & eius decocto fouere. Ad putrescentia, gangranas, &
nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Lege Plin. lib.
27. cap. 9.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

T Otam Galiopsis huius medicinam & historiam hīdem huic scriptori uerbis prosecutus
27. uolumine, capite. 9. Plinius est. Discrepant solum, q̄ Plinius Galaetobdalon uocari ait,
quam hic Galeobdolon dicit: & nihilominus lactis, candoriste in ea nihil est, quod Pliniana
illa uox significare uidetur. Ignoramus & illud etiam, quod hic Vrticam Labeonem a Ro-
manis dici testatur.

De Galio.

CAP. XCVII.

γάλιον

G Alion, siue ut alijs Galacion, aut Galerion, nomen ex eo tra-
xit, q̄ in contrahendo lacte, coaguli uicem impleat. Ramulū, fo-
liumq̄ habet Aparinæ simillimū, rectum: florem in cacumine luteum, te-
nuem, odoratū. Flos igni ambustis illinitur. Sanguinis profluuiā sistit.
Carato rosaceo Galion ammiscetur, insolatū usq̄ dum albescat. Lassiū
dines reficit. Radix Venerem concitat. Nasctur in palustribus.

EX M. VERG. COMM.

D

L Acteo, non luteo flore Galion hanc posteriores aliqui tradiderunt: testati nomen illi lactis
candorem, qui in flore sit, nō in coagulando lacte uim eius, ut hic ait, fecisse. Describuntq̄ cam-
binis folijs, per interualla toto caule usq̄ ad summū uestitam, Lauro similibus. Verumtamen
scriptori huic, græcisq̄ alijs in historia eius magis credendū: præsertim his uerbis docente eam
in sexto sui operis Paulo Aegineta. γάλιον ὀνόμασθαι μὲν ἀπὸ τοῦ γάλα πηγνύν, παραπλάσιον δὲ τοῦ
ἀπαρίνου, εὐκριντοῦν τὸ καὶ ὑπόδριμν, τὸ δὲ ἄνθος αὐτοῦ πρὸς ἀμύρραγιν ἐρυθρὸν καὶ πρὸς πυρίκνυτα. Quo-
rum sensus est, Aui coagulandi lactis dictum Galion est Aparinæ simile. Siccandi uim, medio-
cremque acrimoniam habet. Flore eius ad ambusta, & sanguinis ex naribus eruptiones utun-
tur. Et hoc solum est, quod pro Galio hac dici a nobis possit. Poterit ex notis suis cognosci,
& a pastoribus sicubi pro coagulo lactis ea utantur.

De Senetione.

CAP. XCVIII.

ῥιγέρων

Rigeron a Græcis uocatur, a Latinis Hærbulum, aut Senetio,
alias Erechites. Cauliculo est cubitali, subrubro, folijs continuis
is, diuifura Eruch, sed minoribus multo, luteis floribus, qui celeriter disse-
cti, uanescunt in pappos. Nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores ca-
pillorū ritu uere canescant. Radice superuacua. Nasctur maxime in ma-
cerijs, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerāt. Quare illita cum
uini modico, uel per sese, testium & sedis inflammationes sanant. Quin-
& ex manna thuris medentur, cum reliquis uulneribus, tum hīs quæ ner-
ui acciperunt. Illitū cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum res-
centes epoti, strangulant. Totus caulis si coctus in passo potui datur, sto-
machi dolores a bili contractos, persanant.

Theoph. li. 8.
plant.

BARBARI COROLL.

Rigeron, a nostris fere Trissaginis specie describitur, & cum mollicia nasci fertur in tegu-
lis, murisq̄, cauliculis subrubentibus, lanugine qualis est spinæ, inter diuifuras capitis excun-
te. Ob id Galli Xuseam, Callimachus Acanthiden, alijs Pappum uocant. Nec deinde Græcis
de ea constare Plinius affirmat, alios Eruce folijs, alios Roboris, sed minoribus multo dixisse.
Item radice alios superuacua, alios neruis utili, alios potui strangulante. Nec desuere qui alterū

genus facerent, nec quale esset demonstrarent: dantes contra serpentes bibendā, edendam uero comitialibus. Aggredimur medicinas, quia notæ defunt. Nicander uidet aut hanc intellexisse, cum Geraon pogona dixit, nam & nos Senetionem uocamus, aut Tragopogoni similē herbulam, quæ uulgo Barba senis dicitur, aut Chrysocomen, quam & Iouis barbā appellamus. Quamq; & Arbor quædam est quæ Iouis barbā dicitur, in opere topiario consillis, & in rotunditatem spissa argenteo folio, aquas odit, ut Plinius describit, nec adijcit plura.

EX M. VERG. COMM.

Romani Senetionem eam uocauerunt, facilem inuentū & cognitū herbam, quæ urbani, et in agro agentes passim in acetarijs utuntur. Nasci eam hic ait ad radices parietum, & in eorum rimis, iuncturisq;. Verumtamen in cultis locis, et aruis copiosa etiam inuenitur. Theophrastus de plantarum historia, inter *κισσώδεις* eam numerauit. Sed uidendum in eo, Cichoriodes ne ille plantas eodem modo semper & ubiq; appellet. Eran satiuo Intybo, aut erratico similes earum nota significet. Si Senetionis in scriptore hoc historia expendatur, in qua exigua & longe exerceat minora eius folia describuntur, erratico Intybo similia intellexisse oportebit. Sin contra Cichoriodes Theophrasto erit, quod longo & lato folio, & ob id satiuo Intybo simile, aliā comparationis & similitudinis rationem in eo inuenisse opus erit: aut in alterutro diuersam suspicari plantam. Quale non multo post in hoc capite etiā erat. Quo loco scilicet passim, & in cunctis fere legebatur, *ἢ ἐν οἴνῳ*, id est, in exiguo uino. Non enim sic legendum erat, sed in dulci uino. Quod uetustiores, & meliores greci habebant.

De Thaliastro. CAP. XCIX.

Thaliastron folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem Rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

BARBARI COROLL.

Thaliastron, cauliculus habet crassitudine Papaueris: ut inquit Plinius, Rutæ ut Galenus: cubiti, ut Dioscorides, librarijs similitudine uocabulorum deceptis. Nos Rutæ, Galenum secuti uertimus.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio & huic de Thaliastro, excerptis paucis, eadem omnia. Hic Rutæ coliculū, ille Papaueris habere ait. Ille ulceribus cum melle, hic simpliciter concisa eius folia mederi dixit. Hic contra diutina ulcera, ille ulcera simpliciter sanari eo præcepit. Paulus Aegineta de eo tantum ait, Siccandi sine erosione uim habet Thaliastrum. Diutina enim ulcera ad cicatricem perducit.

De marino Bryo. CAP. C.

Marinum Bryon, aliqui Balaryin, alij Iranen uocant. Nascitur in scopulis testaceisq; haud procul a mari, gracile, capillaceū, caulis expers. Præcipua ei spissandi uis, & collectiōes cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

BARBARI COROLL.

Bryon Thalassion cognominatur, ut a Bryo differat in arboribus nascente: marina herba hæc, sed in terra tantum nascitur & scopulis: folio herbido ac lato, nec Lactucæ dissimili, rugo flore tantum, uelut contracta, sine caule: sed ab ima radice principio alio atq; alio, plusculis exentibus folijs.

EX M. VERG. COMM.

Non facile persuadeor, esse Bryon hoc loco a Dioscoride tractatum, idem a Plinio libro ericifolios secundo, quæto capite descripto. Hic enim capillatum esse hoc suum dicit, ille Lactucæ folijs, quæ grandia & latiora sunt suum describit. Quæ itidem alia in historia huius traduntur. Omnia Musco magis q; herbæ congruunt. Capillata species, gracilitas, natales in faxis & piscium testis. Ob quam causam nobis Muscum uertere potius, q; herbam intelligere placuit. Cætera utrisq; eadem sunt, ideoq; a nobis ulterius non tractata.

A

θαλιastroν

B

βρυον θαλασσιον

Pli. li. 32. ca. 50.

T

C

φύκος θαλάσσιον

De Fuco marino. CAP. CI.

Fuci marini generibus, quoddam latum. Et alterum sublongius, & rubens. Tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratorium, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatis efficaciter utilem. Verum ipsi uti humidis conuegit, priusque exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc Fuco quidam putant mulieres suum colorem mentiri. Cum tamen sit radice eiusdem nominis, qua sese fucant.

Pli. li. 17. ca. 35

BARBARI COROLL.

Phycos non habet alia lingua nomen: ut Plinio uidetur. Etiam si Fucus inde apud nos dictus esse uideatur: quoniam Alga inquit herba sit potius, hic autem frutex: quanquam est ubi maris Algam uocat & Fucum marinum Lactuque similem: qui conchilijs subternitur. Genus ei triplex. Vnum folio lato, uiridi, ob id Prasson uocatum, ab aliquibus Zoster: radice foris pilosa, intus squamatum compacta, prælonga, & crassa, ut Cepis, & Gethyo. Alterum simile Foeniculo: nec uiride, sed pallidum, sine caule: rigens tantum, atque stans: & eo Copten a duricia uocatum. In testis fractis, saxisque nascitur terra, ut mari tamē alluatur. Nam superius inuadit haud procul litore. Extra Herculis columnas magnitudine mirabili. Latitudo quæ manu comprehendi nequeat. Fertur hoc, fluctu extrinsecus in nostrum mare, Prasson ut diximus uocatum: quæ pari fronde sit. Annuum esse traditur. Vtrumque præcipiti uerno enasci, per æstatem uigere, autumno flaccescere, emori hyeme. Tertium graminis simile est, radice longa, obliqua, geniculata: caule harundinis, longe minus quam cetera. Alij breuius tria genera folio distinguunt. Primum lato. Secundum longum, quod & rubens sit. Vltimum crispum: quod & Pelagion, & Cretense nominatur: quæ spongiarum uirescentes, natiua ex alto id petant. Circa Cretam in petris copiosissimum & præstantissimum: quo & renias, & lanas, & uestes inficiant, prouocante purpuras, quæ diu recens tinctura est: ita colore alligatæ, ut elui postea non possit: ob id & Pseudoconchylium a Democrito uocatur, & flos, siue Coccus marinus, & a Strabone in Arabico sinu Minium, hoc est, ut Nicander utitur, Bryon, Muscique. Laudatissimum a parte aglonis, quemadmodum & spogia. Phycos autem marinum, siue Thalassion cognominatur, ut a phyco, id est, fuko metallico distat. Refrigeratis apud Galenum est nature metallicæ, & Cerussæ proximè uiribus, etiam tenuitate penetrandi uincens: de quo nihil Dioscoro. In Aristotele de animalibus, Littoralem herbam, hoc est, quæ littus oleat, uidetur intellexisse Theodorus, cum uertit Lintum, id quod ille ὀστρακὴ uocat. Fieri tamē potest, ut littus ipsum, & odor eius in eo uocabulo accipiendus sit.

EX M. VERG. COMM.

Vocauit hoc Plinius plerumque Phycum, aliquando tamen maris Algam. Ideoque nos utroque nomine caput hoc inscripsimus, & si autor ille dixerit libro. 13. quo diximus capite, non habere Phycos alia lingua nomen, quoniam Alga herba sit, ille autem frutex. Nos tamen & Plinius, qui Algam maris aliquando uocauit, & aliorum auctoritatem secuti, non ueriti sumus Algam etiam nominare. Quod deinde hic ait, Nicandrum contra uenenata Puniceo uti, sic in eodem poeta se habet. ἵπτι κρη, ποικίλον δὲ κατὰ κάλλος φῦκος.

ποταμογέτον

De Potamogetone. CAP. CII.

Potamogeton alias Stachyites, apud Aegyptios Etheuchis, Latine Fatalis dicitur, folium Betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat. Folium pruriginibus utile. Et contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur.

BARBARI COROLL.

Potamogeton Castor hanc aliter nouerat, tenui folio, uelut equinis fetis, thyrsis leui & longo, in aquosis nascentem: cuius radix strumas tollebat. Potamogeton aduersatur crocodilis. Itaque secum habent eam, qui uenantur eos.

EX M. VERG. COMM.

Congrua, et in antiquissimis Græcis a nobis inuenta Potamogetonis appellatio, Betæ foliū etiam est. Nos etiam Fontinalem emendauimus, qd in omnibus fantalis legebatur. Naturā em herbe oēs hæ uoces sequunt. Quemadmodū & Stachytis, quasi spicata, ob caulē quem ex se mittit, floribus & semine spicatum. Græci aut Potamogetona a fluminū uicinitate prope quæ nascit appellauerunt. Vbiq; in aquosis nascitur Betæ foliū hoc, oleris eius egregia similitudine, in cuius folijs maculæ quædam ueluti puncta intercurrunt colore inter puniceū & luteum.

De Stratiote. CAP. CIII.

Stratiotes in aquis nascens, aliquibus fluuiatilis Stratiotes nuncupatur, Aegyptijs Tibus, Magis Acluri sanguis. Aquis supernatat, & sine radice uiuit. Vnde cognomentum traxit. Herba Semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit a renibus, pota sistunt. Vulnera quæ inflammationem minantur, intus mescere non sinunt. Ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

BARBARI COROLL.

Stratiotes geminus est. Aquaticus: de quo hic agitur. Et Terrestris, Millefolij cognomine, de quo statim post dicitur. Est autem Stratiotes aquaticus, herba Militaris, in Aegypto tantum nata inundatione Nili. Diuersam ab hac Militarem aliā existimo, quam alij eandem quæ & Lactoris, aliqui similem dicunt. Est autem Lactoris nota uulgo, ut inquit Plinius, plena lactis: qd degustatum, uomitiōes concitat. Hæc & Lactaria, & Anabula nunc dicit, Oleæ folio, sed minore flore luteo. Sed an una aliqua sit hæc ex ijs quæ Tithymali nominant, cōsyderandū relinquo.

EX M. VERG. COMM.

In Aegypto & Nili inundatione nasci tantū Stratiotem hanc, testati omnes alij sunt. Hic, qd non ab re miretur aliquis, in homine qui diu illic fuisset in aquosis, simpliciter prouenire. Nullus etiam, quod hætenus legerim, causam hominis reddidit, aut ratione aliqua indicauit. Nec quomodo a castris & militia ad herbam id nomen transierit, docere nos audemus. Stratiotes enim græcis miles est. Obseruauimus tamen in antiquis græcorum lexicis, non eadem militi penitus uoce eam scribi, sed in quinta græcorum nominū declinatione & fæminino genere Saratōrida. Quod licet multifaciendum non sit, in re tamen quæ legentes suspendere posset, non penitus inutilem hanc etiam fore diligentiam credimus. Descripsit Stratiotem hanc Plinius libro 24. capite. 3. iisdem fere huic scriptori uerbis. Variant tantum, qd sanguinis ex renibus fluentis remedio eius ille masculum tus addit. Verba eius sunt. Sanguinem quoq; qui defluit a renibus, pota cum ture masculo, mirifice sanat. Quod negligendū in scriptore hoc non est, præsertim congrua turis ad hanc rem ui: & quod uerisimile est, Pliniū cætera omnia eadem huic scriptori docentem, ex eodem fonte etiam illud haussisse. Nec rarum difficileq; est, scriptoribus a librarijs aliquid aliquando perijisse, & Dioscoridi posse id hac parte deesse.

De Stratiote Chiliophyllo. CAP. CIIII.

Stratiotes Chiliophyllos, exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. Folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre Cuminum simulant, præsertim breuitate, atq; scabritia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modū Anethi, flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipue circa semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

EX M. VERG. COMM.

Ostendunt pro Millefolia Stratiote ætatis nostræ herbarij colicolum breuibus & exiguis folijs undiq; uestitum. Respondentq; historiæ huius omnia, exceptis umbellis illis, quas hic dicit Anethi modo in summo eius esse. Quas em nos uidimus, flores magis longiusculis pediculis

A

στρατιώτης

Pl. li. 24. ca. 4

B

στρατιώτης χιλι-
όφυλλος

Tij

Cependentes q̄ umbellæ sunt; pediculosq̄ illos credimus nos esse quæ hic καπρία .i. festucas vocat, & q̄bus umbellâ sustineri ait; sed singuli potius flores q̄ in umbellam plures congesti sunt. Cetera ut diximus, historiæ huius egregie respōdent. Nulla est, quod meminerim modo, Strationes Millefolia hæc Plinio, neq̄ hoc nomine descriptam in eo nos inuenimus. Græci tñ omnes utrūq̄ hoc genus constituerunt, n̄sdemq̄ huic scriptori notis discreuerunt, Strationem aquaticam, & terrestrem; Millefoliā .f. hanc, frigidamq̄ & humidam priorem illam, posteriorem uero hanc præter humorem & frigus habentem aliquid quod adstringat, describentes.

De Verbasco. CAP. CV.

Phlomon Græci, Latini Verbascum uocant. Differentiam duplicem habet, nigrum, & album: in quo mas, & scemina intelligitur. Scemina igitur folia sunt Brassicæ, pilosiora multo, & latiora, candida, caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus, flores albi, aut ex luteo pallescentes, semen nigrum, radix longa, acerbæ, crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Verbascum qui mas appellatur, oblongius, albis folijs & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq̄ constaret folio. Syluestre folia fert Saluæ, altas uirgas, & lignosas, & circa eas ramulos quales Marrubium, flores luteos, auri æmulos. Sunt & Phlomidæ duæ hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem Thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, crassis, pinguibuscq̄, apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuiō conueniēter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxilia tur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum, cui flos aureus, capillos tingit. Et quocunq̄ abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcera, ex uino & melle illinuntur. Cum aceto quoq̄ uulneribus medentur. Contra scorpionum ictus auxilio est. Syluestris folia, ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius quam sceminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 25. ca. 9.

Verbascum, siue Phlomos, siue ut Galenus Plomos, etiam in nūte nasci posse creditur. In albo aliqui Marem, in nigro Sceminam uolunt intelligi. Caulis Verbasco erectus, Semen inuile. Tertium porro genus non nisi in syluis inuenitur, cui herba quæ Romæ Blattaria dicitur, cā est similis, ut sæpe fallat pro ea capta. Est autem Blattaria folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo: hinc forte natum, ut Dioscorides Verbasco syluestri Blattas contrahi prodiderit. Medicinæ huius capitis sequenti mentione collocantur.

Phlomidæ, distinguī genera hæc pene superuacuum est, cum sint eiusdem effectus omnia. Thryallida uero & Lychnitis ex argumento appellant: quoniam ad lucernas conueniunt: proinde ipsa luminū lychnia Græci, & Phlomos, & Thryallidas quoq̄ uocant: ut inquit Pollux.

VERG.

Quale Verbascum omne sit, & quibus notis totius gñæ cognosci possint, satis ex historia Dioscoridis patet. Plinius etiam lib. 25. ca. 9. nō minus in cognoscendis his præsidij legitur gentibus asseret. Paucis enī mutatis, eadē ambobus oia sunt. Paulus Aegineta etiam post hos multiplex Verbasci esse testatus, & inter ea quam græci θρυαλλίδα .i. Thryallim uocant, utriusq̄ decreta uidetur confirmasse. Longius ob eam causam de Verbasco nō agemus, præsertim uulgari & nota omnibus herba: & in cuius genere quæ scemina dicūt, flore candido, aut pallescente, semine nigro, radice longa, & ut hic ait θρυαλλίς est, sub omni in Chama...

De Aethiopide. CAP. CVI.

Aethiopis folia habet Verbasco similia, perq̃ hirsuta, densaq̃ in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem Apiastro, aut Arctio, multis concavum alis: semen Erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccae nigrescunt duranturq̃ ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Mefenia. Auxiliatur purulētis excreationibus, Ischiadicis, pleuritidis, arteriæ scabricijs, decocta radix & pota. Quin & cum melle, eclegmatu uicem præbet.

BARBARI COROLL.

Aethiopis, caulem habet concavum, semen candidū, radices plenas, molles. Quæ ex Aethiopia uenit, eximia est, illico proficiens. Colliguntur radices autumnō, siccantur in Sole aliquot diebus, ne situm sentiat.

EX M. VERG. COMM.

In Aethiopia probatissimam nasci Aethiopidem hanc, testati alij sunt. Neq̃ ab re forsan, qm̃ consueuerint homines multa simili ratione indicare. Hic tñ non magis in Aethiopia q̃ alibi nasci tradit. Ex eo non male aliq̃ suspicabitur a colore, qui in radicibus eius cum aruerunt uidet̃, uocari sic potuisse. Sunt enim nigri Aethiopes: quales hic eius radices esse dixit. Hoc nos tantū conijcimus, illud autem testantur ex ueteribus aliquot. Eamq̃ ob causam nos magis illud probamus: quoniam non est par pondus suspicionis & testimonij. Egit de ea Plinius, 27. uolumine, capite tertio, ijdemq̃ omnibus notis indicata ab eo est. Videndum in eo tamen, sit ne hæc illi eadem quam, 26. uolumine, ca. 4. inter magicas uanitates Aethiopida parit uocat: monetq̃ polliceri & iactare magos, cōiecta Aethiopide herba, amnes & stagna siccari. Addidimus nos locis in q̃bus ea nascit̃, Mefene, s. & Ida, eorū locorū regiōes: ut certius historia eius oīs pateret. Plures em̃ Idæ mōtes sūt, & Plinius ad Idā Trōadis cōtraxit. Mefene aut̃ antiquissima Arcadię ciuitas est, lubrico nomine ad Messanā Siciliæ, ideoq̃ certiore indicatione signata a nobis.

De Arctio. CAP. CVII.

Arcion alij potius Arcturon uocant. Similis est Verbasco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt, caule longo, molli, semine Cumini, paruo, radice tenera, alba, dulciq̃. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. Ambusta, pernionesq̃ fouentur eodem. Bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam e uino.

BARBARI COROLL.

Arcion nascitur in petrosis. Ab Vrsō nomen obtinet: aliud omnino q̃ quæ uulgo Branchia uersina dicitur, ueteribus om̃issa, etiamsi Ebisci modo suppuratoriam uim habet, folijs tā diuersis, ut singula eorum multa esse uideantur, radice glutinosa, multiplici, subalbida.

EX M. VERG. COMM.

Animaduertit, docuitq̃ iam pridem Nicolaus leonicenus, miscere Plinium uicinitate nominis, ut creditur deceptum, Arcion, quam mō uertimus, cum Arcio, quæ uertēda mox erit, Personatamq̃ appellare: cum tamen Arcij, non Arctij propria sit Personatæ appellatio. Nouis seq̃ id ex scriptoris huius historia facillime omnes possunt. Diuersæ enim plantæ sunt, diuersis notis & uiribus descriptæ. Ideoq̃ græcorum medici & herbarij omnes priuatim, seorsumq̃ utramq̃ descripserunt: & alteram folio Cucurbitæ, alteram Verbasco similem fecerunt.

De Personata. CAP. CVIII.

Arcion alij Prosopida, alij Prosopion, alij Aparinen. Latini Personatam, aut Lappam appellant. Folia habet maiora etiā Cu-

A

Aethiopia

Pli. li. 27. ca. 3.
& li. 26. ca. 4

B

Aethiopia

Pli. li. 27. ca. 5

Aethiopia

Curbitis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulem albicantem, quamq̃ & interdū uidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Hęc drachmæ unius pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. Trita dolores in artubus, astrictius uinctis illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

Pli. li. 25. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Arcion, siue Profopites, Personatam quidem in latino sonat, sed pro Petasite tamen capitur a Plinio dicente. Folio Personatę nullum est latius, grandes lappas ferentis: quas non in Arcio, sed in Petasite cernimus. Petasiten interpretor, quam uulgo Bardanam, & Lappam maiorem uocant: Arcion, quæ Vngula caballina dicitur. Plinius differentiam in nomine tenuem constituit. Petasiten Personatam, Arcion Persollatam appellado: Persollatam inquit, quam nemo ignorat, Græci Arcion uocant: folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq̃ & crassiora, radicem albam & grandem. Quæ omnia fere cum Dioscoridis Arcio conueniunt. Nominatur & Persoluta, siue Persolyton a Plinio herbæ genus Aegyptiæ, in hortis feri coronamenti solitum duobus generibus, mas, & foemina: inhiberi subdita ea, Venerem uirorū maxime prodendo. Illud comonuerim, maiora esse Personatę, hoc est, Petasitę ac Bardanę, q̃ Persollatę, hoc est, Arcię & Vngulæ caballinæ folia: radicem Personatę candidam, digitali crassitudine, fastidiendi odoris, Persollatę brachiali, & odoratam, flore in spica purpureo. Galenus & hanc, & superiorem eodem Arcię nomine appellat. Quod autem Personata sit, quam Lucius Columella Personam uocari scribit, ne dubitem, facit, quod utilem pecori, quod Vipera mordet, scarificationi superpositam commemorat: quod & Plinius probat, & propterea a nonnullis Echion, quasi Viperariam tradit appellari.

E X M. V E R G. C O M M.

Personatā hac utebantur quondam ad personas tota Græcia & Italia gentes omnes, quod tiens in Theatris, alijsue locis, qui cognosci a populo nollent, egisse quidpiam uolebant: facili, sed non toto anno ad eam rem ex incultis & pinguibus locis apparatu. Extrema siquidem hyeme, quo tempore nunc expletis totius anni uoluptatibus, ludis & epulis, a ieiunio & cinere, aliam uitam, & alios mores Christiani auspicantur, amissis per gelicidia folijs nullus potest hic eius usus esse. Maio, Iunioq̃ mensibus frequentem fuisse palilibus & floralibus uerisimile est: tribus decerptis folijs, quorum uno frontem, duobus alijs utrinq̃ malas uestirent, relictis inter eorum spacia liberis uidendi, spirandi, loquendiq̃ meatibus. Est enim foliorum Personatę tanta amplitudo, ut longe maius quàm humana facies est, tribus uestiri spacium possit. Neq̃ immerito hic Cucurbitarum folijs comparauit. Figura enim illis responderet, & si pinguiore loco nascantur, magnitudine etiam superant. Causaq̃ hæc est, cur græci etiam ab eodem personarū usu Profopida, & Profopion uocauerint. Neq̃ enim uoces illæ aliud q̃ personam indicant. Fuerūt præterea, ut in hoc scriptore legitur, qui in græcis Aparinen, in latinis uero Lappam uocauerint: quoniam illi congener est. Nascitur ubiq̃ Personata: & quoniam desierunt uti ea ad personas, ob eam quam diximus causam Christiani, nec alios habet in sanitate usus, parum hoc nomine nunc cognoscitur.

C De Petasite. CAP. CIX.

PETASITES PEDICVLVS cubito maior, crassitudine pollicis, a quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu Fungus dependet. Contra phagedænas, & ulcera quæ cacœthe uocant, efficaciter illinitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Petasites, dicta uidetur a Petaso, pileum significante apud Græcos: unde Petasati, hoc est, pileati. Apud Catullum enim ita Castor & Pollux dicuntur. Nec aliud in Mercurio Petasus est q̃ galerus: quamq̃ Lactantius grammaticus, & alas & talaria contineri credidit in ea uoce, quæ si petasum pro pinna capiant: cum legendum sit non petasum, sed petalon quo cunq̃ loco pinna significatur. Ita enim Græci etiam frondem uocant, ut est apud Iulium Pollucem. Multo s deceptus corruptus in Plinio locus. Alcámenes inquit Phidias discipulus, æreum petasum sciebat, qui uocatur Encrinomenos. Alijs petalon, alijs petasum legentibus: cū legendū sit, pentathlos.

quæ nostri Quinquersione uocant, ut est apud Festum: quod & codices manuscripti, & primis impressi formis habent. Quod genus & Myronis, & aliorum operibus ascribitur: ut eodem capite Plinius indicauit. Petasiones porro dicimus, quas Græci Pternas, & nostri Pternas uocant, ut Athenæus inquit. De Petasite multa proxime diximus, credentes hanc latine Personatiam uocari, & Græce a quibusdam Echion, ut ait Plinius: nisi quis non Echion, sed Arcion scribi, propter similitudinem cum Arcio, contenderit: cui non contradico ipse.

EX M. VERG. COMM.

Græca uox Petasus est, Mercurij, & Augusti Caesaris usu in antiquis scriptoribus celebrata. Vterque enim Petasus describitur. Sed alter, dum coelo precipitem se mittit, aut similis: Alter, dum per diem in sole est, radiosque eius munito capite Petaso hoc toto anno uitat. Est enim Petasus Galerius, cuius forma inter Græciæ ruinas in Mercurij imaginibus adhuc uidetur, ex Homeri & Maronis uersibus descriptis, antiquitatis studiosis nota. Ornauit eadem uox herbam: uocantque Græci Petasiten, quasi Galeritam herbam, in qua folium pediculo superpositum non aliter in medio, quam in Fungis passim uidetur hæret.

De Epipactide.

CAP. CX.

EPIPACTIS ab alijs Elleborine, aut Borion uocatur. Parua hæba, fruticosa, exiguis folijs, locineris uitij utilis, & contra uenena pota.

BARBARI COROLL.

Epipactis, siue quod idem est, Elleborina inter frutices Asiæ, Græciæque a Plinio reponitur.

EX M. VERG. COMM.

Eregrina Italiæ, auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam, u. uolumine, capite. 20. numerauit. Non satis ut cognosci nostra ætate possit, nec cur Elleborinen uocauerit eam antiquitas descripta. Si nomen ipsum tantum expendatur, non ab re fuerit Elleboro similem, aut congenerem credere. Si contra Theophrastum aliquis audiat libro. 9. de plantarum historia, pro candido Veratro de ea sic tradentem. *μίσγεται δὲ πρὸς αὐτὸν φάριν. ὅπως ἐν αὐτῷ οὐ τὸ τῆς ἑλεβορίνης σπέρμα. τοῦτο δὲ ἐστὶ ποάριον.* Quorum sensus est. Miscetur autem in Ellebori poculo, ut uomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis inquit hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tam quia Elleboro congener sit Elleborinem dici, sed quod Ellebori uim augeat, coniunctaque illi faciliore uomitiones faciat. Vtraque enim ex Theophrasto colligi caussa potest.

De Capno, seu Fumaria.

CAP. CXI.

CAPNON, aliqui Corydalion, aut Corion uocant, alij syluestre Corydalion, alij Capnon in hordeis, alij Capniten, alij Maritaren, alij Capnogorgion, alij Chelidonion micron, alij Peristerion, alij Cantharida, alij Chalcocri, Romani Fumariam, Aegyptij Tucin. Fruticosa herbula est, prætenera, Coriandri similis, folijs candidioribus, undique numerosis, cineracei coloris, flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemque. Vnde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata hæba, biliosam urinam trahit.

BARBARI COROLL.

CAPNOS, siue Capnion, hoc est, Fumius, duplex. Alia hic descripta nascens in hortis, & segetibus hordeaceis: alia & nomine & effectu similis, quas pedes Gallinæcos uocant. In parietibus & sepibus genita, ramis tenuissimis sparsisque, flore purpureo, ut inquit Plinius: quæ nonnulli modo Cimbaletem uulgo dictam, nescio quæ recte interpretantur, folio Hederæ prætenui: ut in Coryledone comonimus. Hanc autem Capnion, quæ nascitur in sepibus Chelidoniam Phragmitem uocare moris est Actio, ad exinanitiones partium in iocinore curuatum utilem dictam: ut puto, quoniam succo discuit caliginem, ut Chelidonia: & ob id in medicamenta oculorum additur: ut in Collyrium Mareiani, eam Chelidoniam Capnitida cognominantis. Quod si eadem probetur esse cum Cymbalari, ut quidam coniiciunt, etiam illa similitudo confluet, quod

T. III.

A

ἐπιπᾶκτις

Pli. li. 17. ca. 20.
Theoph. li. 9.

B

καπνίος

Pli. li. 25. ca. 17.

C folium Hederae habuerit, quale Chelidonio minori contigit. Propterea considerari cupio, nunquid non similis, sed eadem omnino sit Capnos haec, cum Chelidonio minore. Multa certe paria comperio. Ceterum ex eo quod Capnon Plinius a nostris Pedes gallinaceos uocari scribit, magnus plerisque inuasit error, existimantes Capnon a Dioscoride monstratum non aliud genus esse, quam quae uulgo Sanguinaria, & galli Crus dicitur. Pudenda & poenitenda inscitia: nisi frons attrita multis esset. Quandoquidem ea quae galli Crus uocatur, Gramini est tam similis, ut ab eo forte non admodum seiungi possit: nisi quod folio minore cernitur, & fibris potius quam radice nititur. Id autem quod in utroque summo frutice Trifarin, gallinacei Pedis imitationem habet, candidius in hac quam in Gramine conspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Fumariae herbae notissima res Fumus nomen quondam fecit: haud sane, quia triciniorum parietibus eorumque cameris inducta, nigredine noceat: aut quia, ut poeta cecinit, suspensam exploret duretque ad fabricam materiam, sed quoniam uis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in Fumo est: ob quam causam Flaccus lachrymosum in carmine suo Fumum appellauit: & Aristophanis seruus, in scenam redisse se dicebat, Fumo coactum, nec potuisse domi cum ceteris esse, ὅτι ἰδαντε τὰ βλεφαρὶ ἀνθρώπου, quod est, quoniam eroderet palpebras eius & oculos. Quod maximum a Fumo huic parti redium est: cui potens idem Fumariae herbae succus a Fumo indicata in graecis fuit. Nec tantum Capnon aequali Fumo appellatione eam uocauerunt, sed Capnitim etiam, id est, Fumariam dixerunt. Quemadmodum a similitudine Coriandrum, quae uox in scriptore hoc multifariam creuit. Alijs simpliciter Coriandrum, alijs agreste Coriandrum, alijs diminutiuam forma Coriandron uocantibus. Nasci hic in segete hordeacea ait. Plinius tamen adiecit, & hortis: nec male, quoniam frequentior in hortis, quam in segetibus inueniatur.

De Loto urbana.

CAP. CXII.

λωτός ὕμνος

D

Lotum urbanam, alij Triphyllon, alij Libyon, alij Tripodion, alij Tribolion uocant. Nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasque caligines discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Strabo, lib. 3.

Lotus satiuus, non nisi post annum ex semine suo nascitur. Est & Lotus syluestris. Itemque Lotus Aegyptia, herbae omnes: de quibus paulo post agendum nobis erit. Nam de Loto arborem diximus. Quae sint in Columellae horto Lotae Phrygiae, luminibus gemmantibus, haud scio reddere. Apud Hesperios Aethiopes nasci tradit herbam Lotum uocatam Artemidorus, quae uelentes, quilibet fistuloso & squalenti tractu suum arceant: ob id & Lotophagi Aethiopes, ut inquit Strabo, nominati sunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine de arbore, quam ueteres Romani Celtim uocabant, Loton a graecis dictam: ex cuius materia fistulae quondam fiebant. Dicendum de herbis hoc loco, quarum prima satiuus Lotus est, in hortis quondam uiuens, & in delitijs habita: quoniam ampliore longiorisque uitae folio in hortis tota aestate uireret. Plinius foliato caule eam tradidit, & antiquiores poetae inter herbas Deorum uoluptati nascentes numerauerunt. Quae omnia hic uariatione tantum indicauit, in paradisis & hortis nasci dicens. Qui deprehendisse eam se iactant, humilem ostendunt herbam, in pratis nascentem, numeroso folio, Trifolio paulo minus quam undique simili. Discrepat, quod in Trifolio longiora, minora, & acuminatiora folia sunt: in Loto triquidam numero, sed longe maiora: nec in acutis ut in illo desinentia, uerum paulo minus quam in orbem circumacta. Quae si satiuus Lotus sit, uulgaris, & cognitu facilis herba est. Fecit trium foliorum eius numerus, ut Trifolium & Tripodium diceretur.

λωτός ὕμνος

De syluestri Loto.

CAP. CXIII.

Syluestris Lotus, quam aliqui Libyon, alij Triphyllon, Romani Trifolium minus appellant. Plurimum in Libya gignitur, caule cubitali, & saepe maiore, alis multis, folijs Trifolij pratensis, semine Foenigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringentis.

diobtinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. A
Trita per sese, aut cum Maluæ semine, in uino aut passo bibitur apus-
me contra dolores, qui uescam male habent.

BARBARI COROLL.
Lotus syluestris inter aculeatas (ut putō) constituitur, caule foliato, ut Crepis ab rā-
dice. Quæ sit Crepis nondum comperi. Crepulam certe dici quæ sit Acanthos topiaria,
Dioscorides affirmat.

Pli. li. 31. ca. 16.

EX M. VERG. COMM.

Similior communi Trifolio Lotos hæc q̄ antedicta est, facilis inuentu inter nos etiam her-
ba: & si hic plurimam nasci in Libya testetur, ideoq; Libycam a quibusdam dictam. Longo
enim & acuminato folio, quali Trifolium passim uidetur hæc est. Ideoq; a Romanis, ut in Dio-
scoride legitur, Trifolium minus appellata. In qua uoce uitium esse oportet. Quoniam non po-
test nostrati Trifolio respondere duorum cubitorum altitudo, & minus uocari. Nouimus em̄
omnes Trifolium: ratiocinariq; facillimum est, falso minus Trifolio nostro dici aliquid quod
hic cubitale sit. Verustiores Dioscoridis latini codices non minus, sed uirus habent. Quæ uox
certum non habet intellectum: nec nos augurari aliquid in ea re uoluimus: ob eam causam
quale in alijs erat, tale relictum a nobis etiam est. Folia Loto huic Dioscorides ait simpliciter
pratenſi Trifolio similia esse: non ut Barbarus uertit, Loti trifoliæ. Non animaduertit ille,
quis in uerborum cursu in Dioscoride esset. Neq; enim pratenſe Trifolium Loto ille uocat,
sed Loti huius folia pratenſi Trifolio similia esse testatur.

De Cytiso.**CAP. CXIII.**

Cytisus, quem aliqui Telinen, alij Lotum magnū, alij Triphyl-
lon, Romani Trifolium maius appellant. Frutex est albus in to-
tum, ut Rhamnus, ramos spargens cubito longiores, folia Fcenigraci,
aut Loti trifoliæ, minora, dorſo medio prominente. Ea digitis trita, Eru-
cam olent, gustataq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter ini-
tia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet.
Nonnulli quod apes alliciat, prope aluearia serunt.

B

BARBARI COROLL.

Cytisus, siue Cytisum, Hederæ modo uincit & strangulat sata. Contra Cytiso pestis Ali-
mon. Densa Cytiso medulla, Ebenumq; prouocans. Non ex alio pabulo lactis maior copia,
aut meliori: in commodum tamen tantisper dum floret, ut inquit Aristoteles, quoniam sit u-
rentius. Perq; modica eius herba quadrupedes pinguescunt: ita, ut iumēta etiam ordeum sper-
nant, nec aliud minoris impendi est. Vel mediocri solo prouenit. Seritur semine & caule. Per-
ficiatur triennio. Florere definit uerno æquinoctio, cum & metitur. Aspectu, si quis breuiter
exprimere uelit similitudinem, angustioris Trifolij. Frutex hic in Cytro insula inuentus, in-
de translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casei prouentu: ut mirum
sit, rarum esse in Italia: æstus, alioris, grandinum, niuisq; omnis demum iniuriæ sine no-
xapaciens. Intactum quoq; hostibus, propter nullam gratiam ligni, ab Antinomacho Athe-
nensi magnis laudibus extollitur. Apium examina Cytiso eliciuntur: quamq; Democritus
& Aristomachus eas prædicent, nunquam de flore Cytisi pabulum contingere. Columella
Cytisum, & Zeas, & Carnicin, & Trifarum uocari scribit. Et esse geminam: hoc est, sati-
uam, & alteram suæ spontis.

Pli. li. 3. ca. 24.

EX M. VERG. COMM.

Quod tacendum huic scriptori non fuerat, lactis copia est, quā in homine facere Cytisum
testari omnes sunt. Columella ultimo septimi libri capite, his uerbis ad copiam la-
ctis Cytisum laudat. Mulieres quidem, si lactis inopia premuntur, Cytisum, in qua macerari
oportet: & cū tota nocte permaduuerit, postero die expressi succi ternas seminas permisceri mo-
dico uino, atq; ita potandū dare. Sic & ipsæ ualebunt, & pueri abundantia lactis confirmabun-
tur. Plinius itidem lib. 31. cap. 24. de Cytiso hæc ait, Quin & nutritibus in defectu lactis aridū.

Cappin aqua decoctum potui eum uino dari iubent, & firmiores, celsioresque infantes fore. Paulus Aegineta etiam comā Cythi iubet præcordijs prægnantium, contra uomitiones ex uetere uino imponi. Nec minus quā Malua discutientis & tepida naturæ esse. Notissimus quondā frutex hic omnibus agris confusus, & quo maioribus, eo citius eum comprehendētibz. Nunc quod sciam, nullibi in Italia est: aut si sit cognitus, sine honore iacet. Prima eum mortalibus ostendit Cythius ex Cycladibus una: & ex ea omnem peragravit Græciam & Italiam, ubique carus & in honore habitus. Post quod tempus in antiquum & natale sibi solum reuersus, non paruum antiqua amantibus desiderium sui reliquit.

Λωτός
αἰγυπτία

De Aegyptia Loto.

CAP. CXV.

Est & in Aegypto Lotus, quæ aquis provenit, plana irrigantibus, caule Fabæ, flore paruo, candido, Lilio simili: quem trahunt occidente sole comprimi, occludique, ad ortum autem aperiri. Adduntque, caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale Papaueris, maximum, & intus grana ceu Milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotos hæc habet, mali Coronei similitudine, quæ cruda coctaque manditur. Decoctaque lutei oui speciem exhibet.

Plin. lib. 21, ca. 17.
lib. 22, cap. 21.
lib. 21, cap. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

D

Lotus herba Aegyptio uernacula est, Caule fabaceo & petasato: folijs densa congerie stipatis, breuioribus tantū, gracilioribusque: flores ei similes, ut Theophrastus ingit, Lilio: ut Dioscorides, hordeo. Librariorū in alterutro culpa, Crinon, pro Crithe, cōtrarie scribentū. Copiosi ij & in se facti, comprimētes se ad occasum solis, aperientesque ad ortū per uices, donec perficiantur capita, & flos ipse decidat. Fructus in capite Papaueris incisuris, omniq; alio modo, nisi quod crebriora intus grana, Radicem Corsion uocant, opertā nigro cortice, qualis & castaneas tegit: interius candidū corpus: quod decoctū cibo gratius est quā crudū, siue aqua, siue pruna. Nec aliūde magis quā purgamētis eius sues crassescunt. Illud sciendū, auctore Theophrasto, genera huius plura inueniri, distincta flore, fructu, caule, folio, ut nomē fere tantū cōmune habeant, ratio naturæ tota dissentiat. Loton qui arborem putant tantū esse, de qua uolumine primō diximus, uel Homero coarguitur, qui inter herbas subnascentes, Deorū uoluprati Loton primā nominauerit. Est & Lotometra, quæ fit ex Loto sata: ex cuius semine, simillimo Porri, atque Milio, panibus in Aegypto pastoralibus maxima aqua, lacteue subactis, negatur quicquam esse salubrius, aut leuius, dum caleant. Refrigeratus maiore negotio concoquitur, sique ponderosus. Eos qui uiuāt pane illo, nec Dysenteria, nec Tenasmo, nec alijs in uentre morbis infestari prædicant. Incolæ & capita ipsa Loti aceruata putrefaciūt: mox separant a putaminibus, lauando, & siccata tundunt: eoque pane utuntur. In Euphrate scapus & flos usque in medias noctes a uespera mergitur, ut ne dimissa quidē manu cōprehendi possit. Vertitur deinde, paulatimque subrigitur, dehiscēte flore ad solis ortū, ut plane a terra absit alte. Hanc Loton in coronas uenire diximus in Myrto: propterea Cratinus eam Stephanonia uocauit: & si Attici omnia folia eea Stephanomata solent appellare. Antinōias uero dicta ab Antinoo: qui e Bithynia fuisse dicitur, per diui Adriani fere tempora, qui & memoriā uiri coluit. In Aegypto, ab eius nomine uocata, delubris etiā in honorem eius dicatis, apud maritimos in Arcadia, quod crimen inde Bithyniam habuisse crederetur. Vt illud tamen quod diximus aliubi, sciamus, Lotum non quæ ceruleum, sed quæ similem Rosæ florem edat, inuentu rarum, Antinōium proprie uocatum, in assentatiōem Adriani principis, poëta Alexandrino: qui finxisset e leonis cruore, quæ Adrianus crassantem in Libya necasset, editum, & Antinōion dicendum, alimentis annuis ex musæo constitutis. Huius rei partim Athenæum, partim Paulaniam auctores habeo. Diminutua in Paulo forma, Lotarium rubens legi ad psoras utile. Nisi quis non de Loto Aegyptia, sed de syluestri potius accipiat. Pastillus est, siue orbiculus apud eundem Paulum Dialotarion uocatus, ad genitalium, sedisque uitia.

E X M. V E R G. C O M M.

Longissime Plinius lib. 11, capite. 7. & 8. supra decimū de Loto egit: nihil tamē non a Theophrasto antea dictū retulit, Cuius longior etiā quā Plinij de Aegyp̄tia hæc Loto historia est. Mul-

ta tamē reliquit, quæ nouisse pro Dioscoride necessariū sit, Eamq; ob causam, nos quæ a Theophrasto dicunt, iisdem uerbis repetemus, non græcis (longius em̄ id esset) sed qualia in decursu uertere licebit. Ea huiusmodi sunt. Quæ uero Lotus in Aegypto appellatur, plurima in campis nascit̄, cum inundata fuerit regio. In ea caulū natura eadem quæ Fabæ Aegyptiæ: similiter & foliorū: quæ ille Petasos, quasi galeros uocat: uerūtamen minora ea, & tenuiora sunt. Nascitur Lotus Aegyptia Fabæ Aegyptiæ similiter. Candidū habet florē. Cuius folia sunt angusta, longitudine liliorū folijs similia. Nascit̄ numerosus, densus, & sibi inuicem confertus flos ille: cumq; sol occidit, claudit̄, simulq; uasculū sub aqua condit; mox oriente sole aperitur, & supra aquā emergit: agitq; id, donec uasculum perficiatur, & flos defluerit. Vasculi magnitudo est quāta maximi Papaueris, & eiusdem Papaueris modo incisuris intus diuisum. Verū in Loto crebrius semē est, Milio simile. Ferunt in Euphrate hoc amplius uasculū, & flores uespere usq; in medias noctes mergi, descēdereq; altius. Neq; em̄ demissa manu inueniri potest. Cum uero illucescit, rursus furgit, subrigiturq; & ad exortū solis supra aquā apparet, ac florē patefacit: patefactoq; etiamnum exturgit, ut plane absit ab aqua. Coāceruant in unū uascula hæc Aegyptij, putrefaciūtq;: tum putrefactis, cortice in flumine lauantes, semē auferunt: siccātq; & totum in panē pinfunt: eoq; utunt̄ cibo. Corfion uocat̄ Loti radicē hanc: ea rotunda est, magnitudine Coronei mali, cortice nigro, foris uestita quali in castanea nuce est: intus candida: quæ rosta elixaq; utellīs ouorū similis sapore est, gustu suauis. Estur eadē & cruda. Et hæc Theophrastus. 4. de plantarū historia pro Aegyptia Loto. Ex quibus intelligent facile omnes, male in Dioscoride legi, similē hordeo esse: nec sic, sed Lilio uertendū fuisse, cui manifeste Theophrastus eum comparat. Et Plinius ait. Flos qui cādīdus est, &c. quo colore Lilia sunt. Accedit his, quod parū uerisimile est, tam grandis plantæ, & quæ *κωλιά*, id est, papaueraceum uasculum fert, flores hordeaceis similes esse: qui nulli fere sunt. Barbarus in Corollario suo suspicatus id est: & nihilominus in Dioscoride suspiciōē illam penitus neglexit. Facilis & lubricus in græcis lapsus fuit, a crithe, quod hordeum, ad crinon, quod Lilium significat.

De Millefolio.

CAP. CXVI.

B

μυριόφυλλον

MYriophyllon, alij Melphyllon, alij Stratioten, alij Achillion. Latini Millefolium uocant, aliqui Supercilium Veneris, Galli Beliocandas. Caulis est tener, indiuiduus, unica nixus radice, plurimis folijs, Fœniculo similibus. Vnde nomen accepit. Caulis flauescit, prædensus, ac ueluti ex industria delimatus. Nascitur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione uindicat: si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. Præcipitatis cum aqua & sale datur.

BARBARI COROLL.

MYriophyllon, q̄q; fere Millefoliam significat, alia tamen uidetur esse ab ea, quæ inter Siderites, Achilleon, & Millefolia cognominatur: itemq; ab ea quam in Ethruiria Millefoliam uocari diximus: & ab ea quæ Militaris. Alioqui Græci hanc Myriophyllon, illas uero Chilio phyllon appellare consueuerunt.

Pli. li. 24. ca. 16.

EX M. VERG. COMM.

Millefolium Plinius græcā Myriophyllon uocat: haud sanē, quia in græcā uocē certaeius numeri uis & significatio sit, sed q; aptius non poterat in latinis nomen fingi: nec referebat, in re incerta mille potius q̄ decem milia, infinitaue folia illi tribuisse: quod mutato tantum accentu in græcis *μύρια* significant. Quemadmodum nec male penitus dixerit aliquis, mille, pluribusue, aut infinitis pilis constare hominis supercilium. Ex cuius similitudine Veneris supercilium hæc ipsa etiam uocata a plerisq; fuit: quoniam scilicet quemadmodum minuti, densiq; pili eam hominis partem uestiunt: sic Millefolij huius coliculos, minuta densaq; uestiunt folia. Quæ licet hic Fœniculo comparauerit, non tamen eadem longitudine sunt. Huius enim breuia admodum, Fœniculi uero longiora, & quasi capillata. Quod comparatur, copia & exilitas eorum tantum est. Eadem ratio Stratioten, & Achilleam uocari fecit. Breuius enim & numerosis illæ etiam folijs describuntur, & sunt. De Stratiote non multo antedictum in hoc ipso scriptore a nobis fuit: & de Achillea longe prius, repetendaq; legendibus ex illis comparatio ad hanc est.

C De Myrrhide. CAP. CXVII.

MYRRHIS, quam alij Myrrham, alij Conilen uocant, simillima est Cicutæ, caule folijsq. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuavis. Quæ pota in uino, phalangiorum moribus auxiliatur. Cit mēstrua & partus. Subuenit & phthificis cocta in sorbitione. Aiunt quoq. eandem bis die, terue potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Pli. li. 26. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

MYRRHIS, & Myrrha, siue Murrha, ut ego arbitror a nostris appellata, nōnulli Smyrin. Florem habet Cicutæ: cui & cætero simillima est, minor tantum & exilior. Hanc sunt qui Chærephyllon, siue Chærefolium modo nominatam, & in hortis passim nascentem intelligant. Plinius Chærefolium aliud uidetur genus accepisse: cum inquit, feri æquinoctio autumnus Chærefolium: quod Pæderota Græci uocant, acerrimum sapore, igneque affectus, ac saluberrimum corpori. Quæ uerba hæc postrema de Sinapi dicta uideri possunt, de quo statim auctor idem loquitur. Columella horto suo, breue Chærephyllon appellat. Myrrhis proprie Cicutaria latine dicitur, ut in Geranio testati sumus. Inuenio & Mylam genus herbæ, cuius radix paruo bulbo similis dicitur, cōtrahendi effectum uuluis appositam cum farina Lolij. Miror hanc in Dioscoride nusquam legi, cum tamen & Hippocrates id prodat, & Galenus medicinas eius a Dioscoride accepisse fateatur. Aetius radicem syluestris Lapathi, Mylen appellatam prodit, utilem decocto in mobilitate, & dolore dentium.

E X M. V E R G. C O M M.

D

VERISIMILE est a Myrrhæ odore Myrrhida, & Myrrham dictam fuisse quondam quā modo tractamus herbā. Nullus tamē, quod hactenus intuerim, aperte id testatus in græcis aut latinis est. Odorata tamē radice ab hoc, & a cunctis alijs describitur. Potuitq. illi ab ea nota nomen hoc factum fuisse. Cicutæ similem oēs tradiderūt. Eamq. ob causam crediderūt aliqui Cicutariā nūc eam dici. Purgare eam *ῥιζὴν ὀνίτιον* Dioscorides ait: quæ uoces tā notas in græcis, & in commentationibus his nostris significationes habent, ut longius dixisse de eis nō oporteat. Quod tantū monemus illud est: factū fuisse, dum alter ex interpretibus Pliniū nimis q̄ in scriptore hoc opus erat amat, & sequit, pro græcorū lochijs, partus uerterit. Plinij uerba sunt. Cit mēstrua, & partus cū uino: cum tñ lochia nihil ad partū pertineant: modo partus, qd̄ in cōmuni signifi catōis æstimatiōe habet significet. Sintq. Lochia secundarū, & deinceps a puerperio fecundarū purgationes: quæadmodū, ni fallimur, in Aristolochia diximus. Idē sup̄iore cap. de Millefolio caulē eius indiuiduū uocauit, quē ille *μυρρὴν*, non qui diuidi nequeat, sed qui singularis nō numero fusus a radice surgit. Hæc nos leuia quidē, sed interpti non contēnenda signamus.

μυρρὴν

C De Myagro. CAP. CXVIII.

MYAGRON aliqui Melampyron uocant. Herba est surculacea, folijs Rubiæ, pallidis, tripedantæ. Semen oleosum, collo simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq. uirgis ad lucernarum lumina utunt. Hoc pingui, scabricias corporis læuigari, atq. expoliri constat.

Theoph. li. 8. de plant.

B A R B A R I C O R O L L.

MYAGROS, siue Melampyros, herba ferulacea, ex cuius semine oleum etiam fit. Paulus Aegineta præter hanc genus aliud facit herbæ, quam Myaron appellat, & Melampycnon: eiusdem per omnia cum Myagro naturæ. Vt libroriorū fortasse culpa euenit, Myaron, pro Myagro, & Melampycnon, pro Melampyro scribentium.

E X M. V E R G. C O M M.

SI Melampyro eadem Myagros est, quod Græci omnes testantur, binominē herbam facientes, in triticea segete nasci, auctore Theophrasto constituendū est, qui. s. de plantarum historia, uolumine Sicilia Melampyrū priuatim assignat: & contra q̄ in Avena & Lolio fit innocente, & Tritico nihil officientem describit: nec uox aliud indicat, q̄ nigri coloris Triticum. Quemadmodum forte Myagros, quod mures uenatur & perimit: in illo niger, in plerisq. seminibus color rem certam facit. In hoc rarus euentus, præterq. ex historia consueti non potest. Quæ no-

bis nulla est: nec nos nisi ex uocis significatione rei coniecturam hanc facimus.

De Oenagra.

CAP. CXIX.

Oenagra, siue Oenothera, aut Onuris. Frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, Lilio non dissimili, flore roseo, magno, radice candida, pusilla, cum siccata est uinum olente. Nasctur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. Illitū quoq; tetra ulcera mulcet.

B A R B A R I C O R O L L.

Oenagran, & Oenagron, & Oenotherā, & Oenotheram, & Onuthuridā, & Oenotheridē uocamus; aliqui Onear. Sit hæc & quæ dicitur Oenuttra, quæ corui & canes inebriantur, ut Helianus inquit, non affirmarim.

E X M. V E R G. C O M M.

Discrepant non leuiter in radice Oenagræ historia Theophrastus & Diosc. Candidā hic, ilerubentem tradit. In reliquis eadem ambobus omnia. Et Theophrasto huiusmodi sunt. Radix Oenotheræ mitiores & hiliores mores facit in uino pota. Habetq; folium Amygdalæ simile, uerum tamen latius. Florem rubetē ceu Rosam. Ipse grandis, ut inter frutices est. Radix illi grandis & rubens, quæ siccata uinum olet. Amat mōrāna loca. Ex his multa in impressis scriptoris huius codicibus emendare licuit. Primumq; non γλυκύτερα; id est, dulciora eius folia, sed πλατότερα; id est, latiora legi oportere: Mox in radice non μικράν, id est, paruam; uerū μακράν, i. longam. Nomen illi ab euctu factum. Quodq; Theophrastus ait, mitiores & hiliores mores facere, eodum pertinet quo hic ait, potu diluto eius leniri ferocientium omnium animalium feritatem. Nomenq; id significat, siquidem οἰνάγρα, & οἰνόθηρα, siue οἰνόθηριν ex eadem ui capiendi, tenendi & domandi uoces sunt. Significatq; οἰνάγρα quemadmodum & podagra, aliq; huiusmodi, quæ uino capiat, uenetur & domet. ἀγρίων enim in uenatione capere est; nec minus etiam θηρίων, a quibus uerbis græci transferentes multa huiusmodi finxerunt. Et inter cætera οἰνάγραν hanc, & οἰνόθηραν. Egit de ea Theophrastus cum numeraret quæ diuersis locis uina, aut uinosa alterutram hominis partem, corpus, s. aut animum mouent. Videturq; Theophrastus non tantum ad mulcendam brutorum feritatem uim illi esse ostendere, uerum inter homines etiam uelut inducta non ebrietate, sed quam græci οἰνωσιν uocant, tristitiæ ex uino remissione, usum eius quondam fuisse. Hic tamen ad ferocientia tantum animalia contraxit. Neq; abne, quando in iuuenorum domitura Columella præcepit eorum tergora tractare, & respergere mero: quo familiares bubulco fiant. Idemq; a mellarijs etiam in apibus seruari. Rationem ex natura uini colligere facile est. Theophrastus etiam quo diximus loco, eā breuiter reddidit. Non male in ferocia & tristitia hominis, sine ebrietate & poculorum sumptu radice Oenagræ huius uteremur, si quemadmodum inuentu, sic cognitu etiam facilis esset.

De Crifio.

CAP. CXX.

Crifion aliqui Buglossum magnum uocant, Romani Spinam mollem. Caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis, anguli spinosi, per interualla molles, folia Buglossis similia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata; cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uariæ cum sedare, Andreas scripsit.

B A R B A R I C O R O L L.

Crifion potius, q; ut quidam legunt Crifion, a uaricibus dicta est, quibus utilis existimatur: ita enim Varices ab Hippocrate dicuntur, quas Aristoteles Ixias uocauit. Huic herbæ similis est quæ Hircina lingua uulgo dicitur, sed caule tamen rotundo, non anguloso ut Crifion. Nec dissimilis huic uidetur quam Porraginem, siue Borraginem olitores nostri uocant, flore interim purpureo, Crifion iuterim ceruleo: quæ si Crifion non est, mirum quam obrem sit indicta ueteribus, quæ sit & uulgarissima, & cibo gratissima: nisi quis Buglossæ generibus contribuat.

V

A

οἰνάγρα

B

κρίσιον

Pli. li. 27. ca. 82

C
ἀστὴρ ὑπὸ τῆς

Aster ab aliquibus Bobonion appellatur, ab alijs Astericos, a
 alijs Asterion, quibusdam Hyophthalmon, Romanis Inguina-
 lis, Dacis Rathibis. Cauliculus lignosus, florem in cacumine habens
 purpureum, lutumue, & in ambitu diuisum Anthemidis modo capi-
 tulum, pusilla in eo circa caulem folia, stellæ modo radiata, oblonga,
 hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, procidua se-
 di, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex a-
 qua bibatur, anginis, et pueris comitiale malum sentientibus opitulari.
 Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos si-
 nistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore libe-
 rat. Stellares huius radij noctu splendent: quapropter qui ignari antea
 non uiderunt, esse inane simulacrum arbitrantur. Medijs faxis & aspe-
 ris exit. Inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hæc de
 ea refert, si uiridis cum axungia uetere tundatur, contra rabiosorum mor-
 sus,urgentia guttura proderit. Suffitu quoq; serpentes fugat.

BARBARI COROLL.

Aster Atticus, siue Inguinaria, folijs oblongis duobus, aut tribus, passim in uepribus na-
 scens, ut Plinius scribit, Argemontion a quibusdam uocari dicens. De hac Galenus bis uideretur
 scripsisse medicinas, uno loco Astera Atticon uocans, altero Bubonion. Qualis autem Paula-
 nia sit herba, quæ in Mycenensi agro ad Iunonis sanum Asterion uocatur, a flumine terram il-
 lam rigante, quia in ripis nascitur, cuius folia Iunoni sacra in coronas sibi neſciunt accollæ, non
 comperi. Est & alius Aster, nunc uulgo Stella dictus, folio fere Vitis, seu Maluæ potius erra-
 ticæ, ad radicem maiore, pluribus, sed minoribus diuisuris: florem fert in modum stellæ, in lu-
 teo uiridem, pusillum, & herbæ suæ similem. Ad herniam puerorum, & uulnera commen-
 dant hanc. Eius decoctum quæ uirgines uideri uolunt, insident. Veteribus dicta Indicta sit,
 haud scio.

EX M. VERG. COMM.

Tanta, tamq; presens contra inguina, eorumq; dolores uis Inguinalis herbæ est, ut adalliga-
 ta solum in eo malo, medicinam faciat. Idq; grauissimi Græcorum medici testati sunt, Galenus,
 Paulus Aegineta, Plinius etiam, & hic ipse, cui non minus curæ fuit hæc inuenire q; docere.
 Sit ergo illi Asteris nomen, a foliorum in floribus figura, & situ: sint & Asteriscos, & Asterio.
 In cunctis enim stellæ uis & significatio est, quam græci astera uocant. Solaq; hæc nominis hu-
 ius causa habeatur. Non quia noctu & in tenebris stellarum modo fulgeat, ut posteriores græ-
 ci etiam crediderunt: quorum aliqui inutiliter in extrema capitis huius coronide addiderunt,
 quæ in alijs interpretibus leguntur ab eo principio, Nascitur autem media inter petras. &c.
 Omnia enim ex eo loco, usq; ad reliquum caput, ex hac opinione illi accreuerunt. Nos ea re-
 iecimus, nullibi in antiquissimis & optimis græcis, latinisq; inuenta. Quodq; nec Plinius hu-
 iusmodi aliquid non relicturus, nec Paulus Aegineta, nec Serapion, nec antiqua huius scri-
 ptoris interpretatio ostendunt. Acceditq; his omnibus, ut cum superstitiosum aliquid, aut qd
 ad religionem nostram pertineat, in hoc scriptore legitur, persuaderi non possumus, eius esse:
 ut sæpe alias testati sumus. Aster itaq; id est, stella, ob eam quam prius diximus causam dicta
 herba Inguinalis est. Adiecerunt illi, ab Atheniensium agro notam ueteres græci, q; illic ob so-
 li tenuitatem frequentior, aut melior forte nasceretur. Bubonios eadem ab isdem græcis de-
 inde dicta est, quoniam Inguinibus, quæ bubonas illi appellant, tam presenti remedio mede-
 tur, ut adalligata tantum medicinam in eo malo homini faciat. Hyophthalmos postremo, quasi
 suis oculis: q; totus eius flos animalis illius oculum referre uideatur. In quo animaduertendū
 est, quod hic ait, habere Inguinalem herbam purpureum & luteum florem, ad diuersas floris
 partes referendum esse. Sunt enim in eo purpurei coloris folia. Quod uero medium inter ea so-
 lia capitulū est, Chamæ mali tm̄ lutescit. Et hæc pro nominum & florum historia satis sint.

De Isopyro. CAP. CXXII.

Isopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quod est Aniso simile, in pampinos torquet. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, Melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris uitia, semen ex aqua mulsa bibitur. Hepaticis & sanguinem excreantibus utile.

BARBARI COROLL.

Isopyron, & Phasiolos, & Phasilon quoque dicitur. Alia uidetur herba esse quam Theophrastus Ision uocat. Theodorus more suo, Aequum. Duplici fastigio, nigrum, & candidum. Flos, fructusque illis pro ratione discriminis, niger, aut candidus: quaque & medio inquit colore fructus quandoque cernuntur, & flores in purpuram inclinantes, uirgis & folio tenuioribus atque leuioribus. In Aetio Ision dici herbam quandam uideo, cuius cibo pituita detrahitur: nec satis animaduerto an eadem sit cum Isio. Alexander quoque in problematis, si locus memoria non excidit, Ision herbam inter olera dinumerat.

Pli. li. 27. ca. 11.

EX M. VERG. COMM.

Qui Isopyron hanc deprehendisse nostra ætate uideri uolunt, herbam a radice statim foliofam ostendunt, & ex medio surgentem colicolum: in quo antequam in ultimū cacumen desinat, quod florem & sub eo plenum seminis uasculum sustinet, utrinque uolutæ duæ se spargunt phaselorum cirris & clauiculis similes: quas hic *διπλῆς*, ut in uitis uocat: folijs quadamtenus rubentibus, contractionibusque Plantaginis, sed eadem latitudine, & in aliquibus maiore. Quod fit, ne credamus Isopyron scriptoris huius eam esse: si Dioscoridi, Plinio, græcisque alijs credendum est, qui omnes Anisi folio eam describunt. In cæteris non dissimilis species diligentiam eorum probat. Nobis in neutram partem inclinat animus, & quale a græcis traditur, Isopyron tale redditum a nobis etiam est.

B

De Viola purpurea. CAP. CXXIII.

Violam purpuream, aliqui Dasypodion, alij Priapæion, alij Ion syluestre, alij Cybelion, Romani Violam purpuream uocant. Folium habet Hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile. Cauliculus a radice prodit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissime stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidenti. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

BARBARI COROLL.

Violam, Græci Ion pro flore, Violarium Ioniam, pro frutice appellant. Nicandee in georgicis Ion uocatam credit Violam, quia nymphæ quædam Ionæ, florem eum Ioui primum dedere muneri. Nascitur uitis modo e supernis: quasi e puppi dicas, non prora, ut Ruta, Sisymbrium, Serpillum: eoque omnes Phrygana, hoc est, fursuli siue cremia Violæ dicuntur: excepta nigra: quæ hoc capite describitur. Viret hæc perpetuo, & ut quidam ferunt, si certo genere colatur, anno toto. Serit plantis ut olus. Vere floret, post Leucoion, & ante Flammæam. Cui Ion Græci dicunt, nigræ, seu purpureæ fere intelligunt. Humilis hæc, & latiore folio, statim ab radice multa carnosio exeunte, sine ramis: ob id uulgo loripedem Violâ uocamus. Hæc nomine a cæteris distinguunt, solè la appellatæ Græcis: ut ab ijs Ianthina uestis, et Viola cea diceretur. Alia Violarum genera in Leucoio reddidimus. Violas sarranas, a colore, cum purpureis easdem esse apud Columellam arbitror. Purpureas, Vaccinia et Hyacinthum dici, Seruius grammaticus existimat. Dioscorides quoque Hyacinthum latine Vaccinium appellari scribit. Admonendi sunt qui hæc legunt, purpureas Violas duorum generum haberi. Alias inter Loripedes siue sessiles, de quibus hic agitur: alias inter Leucoia, odoratasque omnes esse. Sed & candidarum quoque gemina hæc discrimina cernuntur. Aliæ Loripedes: alia Leucoia. Leucoia intelligo, quas Mauritania Cheiri appellat: Loripedes, quæ uulgo Claudæ nominantur, & Maurice Senephigi.

V ij

C

Quæ ferrugineos Hyacinthos, & nigra Vaccinia uocari a latinorum poetis fecit nigricans purpura: uel, ut aptius loquamur, in nigro purpureus color: eadem Theophrasto, grecorumque alijs scriptoribus causa fuit, ut Viola, quæ nunc tractanda a nobis est, nigra dicere tur: tam frequenter, receptoque passim in ea coloris discrimine huiusmodi, ut multis locis Theophrasti in plantarum historia nihil certius intelligatur: ubique *μύλαν* *ἴον* dicenti Violam, quæ nigricante purpura, ad murorum radices, hortorum marginibus, & sepibus florens prima, aut cum primis aduentum Veris mortalibus nunciat: nota uulgo, & ubique inuentu facilis: quæ toto anno uiuat, & flores tenui quidem, sed longiore coliculo altius a terra inter folia erigat. Quæ hic merito Hederæ comparauit: quoniam proxime ad eam figuram accedunt, Murariæ Violam a latinis uocari in Dioscoride legitur. Nescimus tamen quæ uetusta ea uox sit: sed quæcumque ea est, naturæ eius respondet: quoniam ut diximus, ad murorum radices, umbrosis locis frequens & speciosa nascitur. Eadem causa fuit, cur syluestris Viola itidem diceretur: quoniam in locis non cultis nascitur: nec uiolaria in hortis ut cæteræ illi cognomines habet. Potuit quidam etiam religione aliqua, & numinis gratia commendari: ideoque Cybelios Viola ab antiquissima dea Cybele dicta, laudem potius quam nomen id inuenisse. Sed nobis nulla est eius nominis certa ratio, aut coniectura. Quemadmodum & reliquæ aliæ penitus ignotæ. Nisi Priapeios non dissimili ratione, quæ Cybelios ab antiquo ruris & hortorum numine dicta fuerit. Descripsit eam Theophrastus libro sexto de plantarum historia, dixitque: *προερεισφύλλον καὶ ἀνφυλλον ἴον καὶ ἄνθη φασὶ δυνάμειν διόλου φέρειν τὸ ἄνθος ἰὸν τροπῶ τινὶ διακρίνεται*. Quod est. Exire & uiuere folia eius in radicis capite tantum. perpetuamque uiuere fronde. Id enim uoces illæ duæ significant. Facileque est uidere foliosum Violæ huius cespitem, nullis caulibus, aut ramulis a terra surgentem, quod cæteræ habent Violæ: nec æstu anni arescere, aut hyeme, quod aliæ patiuntur, sed post amissos flores, uiuentibus folijs medicinæ toto anno etiam inseruire. Adiecit præterea, testari quoddam, posse hanc Violam continue toto anno florere, si aliqua ratione curetur: quam tamen ille non retulit, nec quibus locis id excogitauerint homines. Adiecit eodem libro idem scriptor, dicit ferre hanc a reliquis Violis in reliqua natura, præcipue autem *ἔνι πλατύφυλλον καὶ ἰγνύφυλλον καὶ στερόφυλλον ἴον*, quæ scilicet latiore folio quam reliquæ Violæ sit: intelligitque reliquas Violas Leucoia ab omnibus appellatas: eodemque folio sit *ἰγνύω*, id est, terrestri, quod a terra non surgat: & præter id carnosum & pingui. Quæ omnia longius forte dicta aliquibus uidebuntur. Sed nos rerum certitudini consulentes, obscuriores breuitate nolimus fieri. Quo consilio, in Violæ huius signando colore, a principio statim usi sumus: & contra aliorum interpretum editiones, nigram, non purpuream Violam proposuimus. Ne si purpuream diceremus, miscerentur diuersi coloris congeneres flores. Sunt enim in Leucoiorum genere purpureæ Violæ, quas Columella Sarranas ab eadem purpura, & Sarrano ostro appellat, in censuræ earum & ordine quæ furculosæ sunt: in parietibusque & hortis nascuntur, aliter quam hæc dispositis in flore folijs, & plures uno pediculo pendentes: quæ proprie & uerius Purpureæ uocantur. In illis enim uera est purpura, quemadmodum in his in nigro purpureus magis color quam purpura. Et hæc pro notissimi floris historia satis sint. Quibus adiciemus, mutasse nos titulum capitis huius, & de nigra Viola inscripsisse: quoniam res id exigebat: & in melioribus græcis, aut nulla coloris nota addita fuerat, simpliciterque de Viola caput inscribatur: aut *ἴον μύλαν* in aliquibus legebatur.

D

De Cacalia. CAP. CXXXIII.

κακάλια

Cacalia quæ Leontice uocatur, folia fert magna, alba. E quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens Robori, aut Oleæ similem. Radix in uino madefacta ut tragacantha, delinctu, aut manducatu per se tussibus, scabrics arteriæ medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cum cæratō illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Pli. li. 27, ca. 9.

BARBARI COROLL.

Cacaliā putant esse, cuius semen a Plinio margaritis minutis simile redditur: dependens inter folia grandia, in montibus fere nascentem. Hanc Galenus Cancanon uocauit. Differt ab hac Acacalis, item Caucalis: de quibus ante dictum est. Paulus Cacaliā, non Cancanum, sed Cancano similem esse tradit.

EX M. VERG. COMM.

Cacaliam descripsit Plinius. 25. uolumine, cap. 9. Leonticemq; uocari & ipse ait. Minutis margaritis simile habere semen, inter folia grandia pendens: nataleq; illi plarumq; montes esse: nec ultra in historia eius quicq; tradidit. Nos uero descriptum ab eo florem fuisse optabamus: ut quod in antiquis grecis hoc capite uariat, certius constitueretur. In cunctis enim, uno excepto, q; nobis uetustissimus & probatissimus codex Diosco. est, legitur. *ἄνθος ἔχων τοῖκος ἀπὸ τῆς ἰατρίας*. Quod si uerbum de uerbo fiat significat, florem habens quercui, aut oleæ similem. Eamq; lectionem secuti cæteri interpretes, Querno, aut Roboris flori simile fecerunt. Nos musco, aut oleæ uertimus, ueterum & meliorum codicum fidem secuti: in quibus ut nos credimus, antiqua & uerior lectio est. *λευκὸν ἄνθος ἔχων τοῖκος βρύω ἢ ἰατρίας*. Quod est ut nos diximus, flore candido, musco, aut oleæ simili. Sumusq; ad hanc interpretationem, præter grecorum fidem, latinorum etiam, antiquissimis monumentis usi: inter quæ longobardis literis scriptus Diosco. nobis est, in quo manifeste Bryo similis legitur. Est autem grecis Bryon, qui in torrentibus, aut arboribus concreuit muscus. Cui in comparatione respondent oleagini flores, qui passim a cunctis muscosi dicuntur. Quæ ratio etiam nos monuit, muscum magis q; quercum, aut robur hoc loco uertere. Nihil enim muscoso Oleæ flori simile habent querni, aut robustei flores. At contra bene ad tertij floris similitudinem alternantur muscus, & oleagini flores.

De Bunio Napi genere.

CAP. CXXV.

Bunio aliqui Aton, alij Actinen, alij Anemosphoron uocant. Magi Paradacry, Aegyptij Ersonen, Romani Scopam regiam, Aphri Zigar, nonnulli Thepso. Caulem ædit quadrangulum, digiti longitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia prope radicem Apio similia, longe tenuiora, coriandrinis proxima: flores Anethi: semen odoratum, Hyoscyamo minus. Vrinam ciet. Excalfacit. Secundas euocat. Lienis, uesicæ, renibus utile. Tam humidi, q; sicci, expressiq; succi caulib. folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua mulsâ.

EX M. VERG. COMM.

Alterum, & primum in diuisione Naporum genus Bunion hoc facit: describiturq; a cunctis q; idem huic scriptori notis & uiribus. Non tamen in sanitatis usu receptum a gētibus, ut alterum & secundum illud est. Quod sceminino genere Buniada greci uocant, secundo uolumine a Rapis statim, quasi eiusdem illis generis, ab hoc scriptore tractatum. Vtriq; radix crassior, sed contra q; in Rapis acuminatæ longitudinis: huic etiam exilior q; Buniadis, & minor. Egit de eo Plinius lib. 20. cap. 4. cum de reliquo Naporum genere ageret: Nomen ambobus factum aliqui tradiderunt. *ἄνθος τῶν βονίων*. Vocant autem greci inter alia Bunos, tumentia, & quæ in amplitudinem creuerunt: quæ Naporum radices forma est. Cur autem in Diosco. legatur, Scopam regiam Bunion a Romanis dici, ignotum nobis est, nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non furculosam naturam, non usum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum rationem indicet aliquam. Ignotæ aliæ appellationes etiam. Sola Arction ex similitudine facta est: quam nos Pauli Aeginetæ autoritate instaurauimus. Non legitur in Barbari æditiōne hoc caput. Nec nos scimus, relictum ne a librarijs imprudenter in excubendo fuerit: an potius quia de Napis secundo uolumine actum fuerat, ratus abundare, uolens ipse & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Bunio ab eodē est. Verumtamen autoribus grecis omnibus recipiendum, & cum cæteris uertendum fuerat. Qui enim de Pseudobunio agi mox poterat, nisi de uero Bunio actum prius fuisset? Verè enim alicuius oportet falsam & mentientem in plantis esse. Calido temperamento Bunion esse, Paulus Aegineta decreuit: ideoq; urinam, & menses ciete.

De Pseudobunio.

CAP. CXXVI.

Pseudobunio palmi altitudine fruticat, in Creta, folia, ramulosq; Napi ferens, acri gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua. Illi quoq; cum sa-

C le & uino, tepentes, anginam discutunt.

EX M. VERG. COMM.

Q Vale Pseudobunion sit, præter Dioscoridem, Plinium, cunctosq; alios, qui omnes Na-
po similem tradiderunt, nomen ipsum etiam indicat. Neq; enim mentiri ueram Bu-
nion, nec fallere carpentes posset, nisi similis illi esset: eaq; similitudine fallens, falsum & men-
dax Bunion a græcis dictum est. Monere aliud legentes in eo non oportet. Peregrina enim lia-
liæ herba, & ex Creta repetenda est.

De Chamæcisso. CAP. CXXXVII.

χαμαίσσος

C Hamæcissos, alio nomine Chamæleuce, alio Cissos acarpós, aut
terræ Corona, aut Selinitis, Latine Hædera pluuiatica dicitur.
Folio est Hæderæ, tenuiore, longiusculo, ramulis quinis senisue, dodran-
talibus, foliosis, flore Violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu
supra modum amaro, radice tenui, candida, inutili. Nascitur in cultis. Bi-
bunt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tri-
bus, tricenis, quadragenisue diebus. Eodem pota modo senis aut septe-
nis diebus regium morbum purgant.

BARBARI COROLL.

C Hamæcisson uocant Hæderam, non attollentem se a terra. Spicata est Triticii modo hæc, et
Cissos Epigeos, id est, Hædera terrestris appellatur.

EX M. VERG. COMM.

D

Similem tantum, non congenerem Hæderæ Chamæcisson sua appellatione græci fecerunt:
licetq; terrestræ, & humi serpent. Hæderæ ea uox significet, non tamen Hæderam intelligere o-
porteret, sed herbam cultis locis nascētem, hederaceis folijs, neq; his tota figura. Fastigiantur em
in longitudinem: quod in Hædera non fit. Spargit per terram ramulos hæc suos, non plures qn
q; aut sex: quemadmodum omnes tradiderunt. Nullos fert corymbos: ideoq; sterilis Hædera a
plerisq; dicta quondam fuit. Eadem terræ Corona quondam uocabatur: quoniam ramulos su-
os per eam spargens, folioso ueluti ferro terram coronare uidetur. Eam ob floris colorem Plini-
us ait Violam albam existimari posse, cum floret. Cæteri lutei coloris florem illi assignant. Nec
male forsitan: quando Leucoiorum uox, quibus flores eius hic comparat, nō album magis q̃
reliquos eius floris colores indicat. Eamq; ob causam nos, seruata græcorum uoce, uertimus,
Violis quas Leucioia dicunt, similes eius flores esse.

De Chamæleuce. CAP. CXXXVIII.

χαμαίλευα

C Hamæleuce lumborum doloribus propicia est, hærbā uirens,
incuruis folijs, surculisq; flore rosaceo.

BARBARI COROLL.

C Hamæpeuce, non Chamæleuce, ut fere habent codices, legendum arbitror: quoniam Cha-
mæleuce Populago sit, & Bechion, Chamepeuce uero Laricis folio similis ostenditur: unde no-
men quasi Larix pumila.

EX M. VERG. COMM.

Nulli inueniuntur in græcis antiqui scriptoris huius concordēs in hoc capite codices, duo
saltem: tam male & infelicitè actū cum illis etiam in bonis artibus, ex multo tempore est. Sed
Chamæleucem alius tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucem habet.
In alijs nullum est hoc caput: in quibusdam cum Buglosso, quæ sequitur, & in extrema eius par-
te Chamæleuce miscetur. Et præter id, alijs breuissime rem, longius alij absoluunt: tam confu-
so intellectu, & rei inconstantiā, ut quid reddendum nobis esset diu dubitauerimus. Accessit
tandem anxij animo Plinius, monuitq; libro utcesimo quarto, capite, 5, in ancipiti Chamæ-
peucem potius legendum esse: qm̃ quod hic ait ποικίλον ὄσφρον ἄλγυματι ἐν ὀδοντοῖς πινόμενον, il-
le dixerit, lumborū & spinæ doloribus propicia est, eodem rei sensu & uerborum ductu. Veri-
simileq; est, ex his quæ Plinius eadem Dioscoridi reddidit, Chamepeucem legisse, & hanc fuisse
se eius ætate capitis huius lectionem. Chamæleuces enim aliæ uires, & alia remedia sunt. De-
scripsitq; idem Plinius eodem loco Chamæpeucem Laricis folijs. Suspendit animo nos tan-

tum Paulus Aegineta libro sexto nullibi tractata Chamæpeuce, Chamæleticem describens: tamq; in tertio ordine calefacere, in primo autem siccare dicens: quo fit, ne pro comperio constitutere aliquid audeamus. Multis em̄, iisdemq; magnis indicijis, & auctoribus pugnat: nosq; in tanta uarietate id elegimus, quod latini scriptoris, saltem deficientibus, græcis auctoritate se tueretur. Id certe non tacebimus, uideri nobis non esse integrum Dioscoridis hoc caput. Quale etiam est quod statim sequitur, Buglossum.

B De Buglossio, seu Lingua bubula. CAP. CXXIX.
Buglossum Magi Aelurigonon, Osthane Tranochi, Aegyptij Befor, Romani Linguam bubulam, alij Libanium, Pœni Anaph uocant. Nascitur in campestribus & uaporosis, Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice tritam, potamq; contra tertianos rigores prodesse, quæ quatuor ad quaternos. Ea in uino decoquitur. Herbam abscessibus utilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, animi uoluptates auget.

B BARBARICOROLL.
Buglosson, & Buglossos, & Buglossa dicitur. Cato Linguam bubulam appellat: utilem in fitionibus obtegendo cortice, ne imber in librum permanet.

Pli. li. 25. ca. 5.

EX M. VERG. COMM.

Diximus non multo ante in Cirso, quid alij de ea & Buglossio hac nostra ætate sensissent: diximus etiam, quid nobis in ea re magis placeret, & quibus coniecturis mutata inuicem duarum herbarum nomina crederemus. Polliciti præterea sumus, in Buglossio hac addituros esse aliqua. Quæ nulla modo alia sunt, q̄ propensiores continue in eam partem fieri, ut credamus, quam ueteres Buglosson dixerunt, nostræ ætatis Borriginem esse. Vt uimurq; ad eam rem hac etiam coniectura: q̄ M. Cato. 40. capite operis sui de re rustica, insitione arborum docens, cum insituisse quatenus, & quomodo furculos inseruisse & circumligasse oporteat, addidit. Insuper Lingua bubula obtegito si pluat, ne aqua in librum permanet: eam Linguam insuper librum alligato, ne cadat. &c. Verisimileq; est, in operiendo truncæ & insitæ stirpis rotunda sectione, rotundiore potius q̄ longiore folio uti præcepisse. At Borriginis tale est. Eius uero quæ nunc Buglossus habetur, longa folia sunt: ideoq; operiendæ rotundæ stirpi minus apta. Scimus quidem, non posse, nec debere rem certâ docentes, tã incertis & ambiguis uestigijs niti: potuissetq; antiquos insitores illa etiã uti: quoniã satis esset insitæ stirpem quocunq; operimento a pluuia defendere: & quod primũ inferenti se obtulisset, luto, palea, alijsq; huiuscemodi uti. Non tamẽ negligendũ, qualecunq; id fuerit, ignotæ rei uestigiũ. Nec nos alio consilio id retulimus, q̄ ut haberent legentes, hanc etiã eruscandæ ueritatis ausam: scirentq; antiquæ Buglossi, quæ Cato, oēsq; alij a boum Linguis, quas imitat, bubulam Linguam dixerunt, hunc etiam fuisse in rustica re usum. In urbana autẽ præcipuũ, quod in scriptore hoc postremũ est, deiecta in uinum Buglossi folia, uoluptates animi, & læticiam augere: neq; ultra hunc usum Buglossio aliud faciendum ab antiquis scriptoribus tribui. Plinius. 25. uolumine, capite. 8. sic de ea egit. Iungitur huic Buglossos boum Linguæ similis: cui præcipuum, q̄ in uinum deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosinon. Mox. 16. capite. 12. Buglossio inarescente, si quis medullam e caule eximat: dicatq; ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt a febre liberari. Quod amuleri potius q̄ medicinæ rationem habet. Paulus itidem Aegineta in sexto de Buglossio hæc tantum monet. *Βουγλωσσον ὑγρόν τε καὶ θερμόν ἐστι τῆς κρύου. ὅθεν τῆς εὐνοίας ἐμβολήσῃ. ὁ ὑποφρονισμὸς ποτὶν λέγεται.* Quod est. Humidum calidumq; temperamento Buglossum est. Eamq; ob causam uino iniectum, læticiatui animi facere dicitur. Nec ultra hæc quicquam de Buglossio tradidit. **GALENVS** etiam nihil dictis ab alijs aliud addidit, quæm tussibus & faucium asperitatibus utilem esse. Nullusque non ex antiquis, læticiæ & uoluptatis spem in Buglossi usu legentibus proponit: quod in Borragine nunc passim fertur. Verisimileq; est, quali per manus traditam seu opinionem, seu famam ad nos peruenisse, & adhuc seruari. Non utimur ad hanc rem populari omnino sensu, & iudicio plebis: non tamẽ negligimus penitus. Quodq; nos magis urget, Cursi historia est, in

V iij

C quæ flores ἀκροπόρφυροι, id est, in summo purpurei describuntur: qui color proprius floris eius est quæ Buglossum nunc passim uocant. Vrgent longiora folia quæ in Borrachine decurtatæ rotunditatis sunt. At dicet aliquis: bouum Linguis similior nostræ ætatis Buglossus quæ Borrage est. Non negamus id. Verumtamen illud etiam monemus, nescire modo nos quæ fuerit antiquis Græcis comparationis huius ratio: & quid nam bouum Linguae illi comparauerint: uerbi causa asperitatem, latitudinem, colorem, longitudinemue. Pro nostræ ætatis Buglossio longitudo præcipue & color est: pro Borrachine contra tam multa hæcenus numerata indicia, quæ diligentius cæteri etiam excutient. Nos enim pro deprehendenda ueritate, cogitanda alijs hæc tantum proponimus. Nec laboramus pro re (cunctis enim nota est) sed pro medicæ materiæ antiquis nominibus & historia: quæ a posterioribus græcis toto hoc capite male habita est. Credimusque nos, ex obseruatis hæcenus, non esse Dioscoridis quæ a principio capitis longius legunt, usque ad, Verbasco familia habere folia. &c. Quæcunque enim a Serapione, antiqua scriptoris huius interpretatione, & aliquot græcis Buglossio huic tribuunt, nulla alia sunt, quæ Verbasco familia habere folia. Folio in terrâ deciduo esse: eodemque aspero, & uigriore bouum Linguae simili: idque in uinum coniectum, læticiâ augere credi. Cætera nulla in antiquioribus græcorum codicibus & latinis scriptoribus sunt. Et Plinius, quæ nunc in scriptore hoc legunt, dandam esse scilicet Buglossum hanc quæ tres caules protulerit, ad tertianas: quæ uero quatuor, ad quartanas, non Buglossio, sed Cynoglossio tribuit. Verba eius sunt lib. 2. capite. 3. Lungitur & Cynoglossos caninas imitans linguas: aiuntque, quæ tres thyrsos feminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse: quæ quatuor, ad quartanas. Accedit his etiam carpenti Buglossum hanc Iulio mense præceptum: quæ hic scriptor Romana uoce ἰσίδιον uocat: quod in græcis antiquis scriptoribus nunquam, aut raro inuenitur. Dico autem antiquos, nondum penitus oblitterata græcorum re: quoniam post Cæsares Romanos, latinis mensuræ appellationibus potius, quæ græcis, suadente id fortuna eius gentis & maiestate, usi omnes sunt. Quodque coniunctum huic est, non consueuisse Dioscori, temporis notas ex mensibus accipere, sed ex anni tempestatibus: uerbi causa, solstitijs, uere, autumno, hyemeque, & æstate. Scimus medicinæ hæc nihil, aut parum conferre. Sed nos herbaria tractamus: conamurque in hoc scriptore, minus corruptâ, saltem latinis eam reddere: quoniam integram in tanta posteriori incuria & imperitia impossibile est. Effugerat pene nos quod ad Buglossum & Borrachinem, earumque notas adhuc pertinet. Id huiusmodi est. Cirsij Buglossio hic familia esse folia dixit, mediocriter hirsuta, longioraque, & albescentia, in extremis aculeata: Buglossi autem φύλλον χαμαιπυτίον, τραχύτατον καὶ μέλαντιρον, quod est, folium in terram deciduum, alperumque, & nigrius. Conferatur nunc cum naturæ exemplaribus utriusque historia, carptasque ex horto Buglossum & Borrachinem diligentiùs contemplantur. Mihi sane prior illa Cirsij historia nostræ ætatis Buglossio respondere, posterior autem Borrachini uindicetur. Sunt enim Buglossi folia longiora quæ Borrachinis. Albicant illa, hæc contra nigricant. Illa surgit, & per se stant in altum nitentia: Borrachinis in terra iacent. Esiq; illi proprium quod hic ait χαμαιπυτίον, id est, humi stratum folium.

D

De Cynoglossio.

CAP. CXXX.

κινύγλωσσον

CYnoglosson, alij Phyton, alij Caballation, alij Splinicion, alij Scolymon, Romani Linguam canis, aut caninam appellant. Folia latifolia Plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa. Caule uacat, & humi sternitur. Prouenit in sabuletis. Folia cum sullo adipe ueteri, medentur moribus canum, alopecij, & ambustis. Emollit aluum, decoctum hærbæ ex uino potum.

BARBARI COROLL.

CYnoglosson, topiaris operibus gratissima est: dicta, quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia, & quæ ferat lappas minutas.

EX M. VERG. COMM.

CANIS Linguam herbam nouit Etrusca omnis rustica plebs. Vitur enim ad ulcera, & minora uulnera. Ostenditque eam sine caule, & paulo minus quæ cunctis iisdem huic scriptori notis, Nascitur plerumque inter uites, uiretque tota hyeme. Nos eam sæpe uidimus folioso cespite, radice pollicis humani crassitudine, albicante colore, & supercurrente asperitate: quam credi-

mus hominis & comparationis ad caninam linguam causam fuisse. Est enim cani qualis placentia alijs animalibus, Scobinae modo asperior lingua.

De Phyteumate.

CAP. CXXXI.

Phyteuma folia habet Radiculæ, copiosum semen, perforatum, radicem paruum, per summa terræ nitentē. Quam ad amatoria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt.

BARBARI COROLL.

Phyteuma negat se descripturū Plinius, quasi superuacua, & ad amatoria tantū uilem.

De Leontopodio.

CAP. CXXXII.

Leontopodion aliqui Zōonychon uocant, alij Aetonychon, alij Cemos, alij Damnamenē, alij Idiophyton, nonnulli Phytobasilā, alij Crossion, alij Crossophthoon, Magi Sanguinē Crocodili, alij Crocomerion, Aegyptij Daphnōenen, Romani Minerciū, alij Palladiū, alij Flāmulam. Digitalis est hærbulā, folia ferens angusta, longitudine ternū quaternūue digitorū, hirsuta. Quæ iuxta radicē spissiore flocco canescūt. Capitula in summo caule, quasi dissecta, flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat. Radice parua coheret. Quam tradunt appensam ad amatoria proudesse, & tubercula discutere.

BARBARI COROLL.

Leontopodion, si amatorij tantū nascitur, diuersum uidetur a Leontopodio, de quo Plinius ita scribit, ut ab eo aluum sisti, bilem purgari prædicet, semine lymphatica fieri somnia, campetris & gracili solo nasci, Lithoron & Coripetron ab aliquibus uocari: nisi de hac loquutus intelligatur, cum dixit, Silebitur a nobis & Cemos: cum sit usus eius inquit ad amatoria dumtaxat. Quandoquidem Leontopodion & Cemos uocari Dioscorides hoc loco testis. Cemos autem uidetur appellata, ex floribus siue calycis figura: quoniam Pyxidecula Athenis ita nominabatur, per quam suffragia in subiectum uasculum, quod Caddiscum uocabant, demitti consueuerant: quod & Venetijs hodieque seruatur. Pollux auctor. Leontopodion hanc, & in uetustissimo Dioscoride appictam uidimus: simillimam herbarum quam uulgus ex nostra consuetudine Calendulam appellat, ut eadem omnino esse uideatur: Leonis habere nomen uerisimile est, & illam quam ita carmini suo Columella inseruit, Et hiantis saeva Leonis

Ora feri.

Et alibi.

Oscitat & Leo.

Nec præterea quid de ipsa prodam, habeo.

EX M. VERG. COMM.

Esset Leontopodio eandem Camon, de qua Plinius. 27. uolumine, capi. 8. negauit se quicquam scripturum, quoniam ad amatoria tantū usus eius esset, pro comperto nobis est. Vidimusque nos antiquissimos & optimos græcorum codices, in quibus non Leontopodion, sed Camos capitulis huius titulus est. Habemus & uetustissimū longobardis litteris scriptum latinum Dioscori. In quo pariter non Leontopodion, sed Camos est: ipsidemque omnibus hoc capite alijs, sola in græcis & latinis tituli capitulis, & plantæ appellationis diuersitas est. Magno argumento, non differre Leontopodion a Camo, nisi sola appellatione. Profuit plantæ huic binominē esse. Perisset enim tota, nisi amisso altero nomine superfuisset alterum quo indicaretur. Infamis amoris ueneficijs ea quondam fuit. Credimusque nos, Camon dictam, quasi frænū. Est enim *κνῆμος* græcis inter cetera reticulatum, aut ex uiminibus textum fræni genus. De quo quotidie in Plalmo auditur: In camo & fræno maxillas eorum constringe: quo quemadmodū uinciuntur iumentorum ora, sic in amore amantiū animi retinerentur: eoque nomine magis que Leontopodij nomen ab his qui pro religione, bonisque moribus amoris ueneficia hæc odissent, exagitata, appellatio nem eam in posterioribus amisit. Seruata tamē illi a diligentioribus altera est, auctusque nomi-

A

PHTVMA

ΛΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΝ

Pli. li. 27. ca. 8.
lib. 26. cap. 8.
25. 13.

B

D I O S C O R I D I S

C num eius numerus. Sed cuncta nostra ætate parum certam habent rationem. Nec cur Mineruium, & Palladiū a Romanis dici Leontopodion in Dioscoride legat, dicere nos audemus.

ἐπὶ πύλαις

Hippoglosson aliqui, & id Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam uocant. Frutex est folia habens Rusci figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas e folijs exeuntes, Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit, Malagmatis radix succusq; ammiscetur.

Valerius

Hypoglosson, & Hypoglossa, dicitur, acinos fert rubētes Rusci modo. Vidimus & hanc. Corollæ genus Hypoglottidas uocari diximus in Myrto, aut ex hac herba, aut e Lauro Alexandrina, quam & Hippoglottida appellabant. Hippoglossis dicitur & morbus linguæ Hippocrati: quoties tumore obduruir, ita ut salua deuorari nequeat.

Rusci, quæ syluestris Myrtus est, folia habere Hippoglosson omnes testantur. Ea non adeo grandia sunt, & præter id in cuspidem acuminata desinunt: eamq; ob causam, siue magnitudinem, siue equorū linguæ figurā in ea uoce intelligas, nulla in folijs ratio eius erit. Nec h̄ etiā, ut in Plinio adhuc legitur, græcam præpositionē hippo, coniunctā linguæ, a græcis fuisse credideris, scriptori huius historiæ respondebit. ἵπ' ἄκρον enim, id est, in summo linguas exire hic ait, παρὰ τοῖς φύλλοις, id est, secus & secundum folia. Quæ hic intelligit in caule suprema: qui desinens non folia profert, sed conferet lanuginis potius q̄ foliosæ comæ in latitudine se aperiens inuolucrū: non aliter q̄ in spicatis aliquibus feminibus & floribus fit. Differt tamē a Spica: q̄ rotundæ quatuorue plerūq; angulis Spicæ surgunt: in hac q̄d ultimū in caule exit, in latitudine se explicat. Et quoniā humanam linguā imitatur, ideo factō a græcis nomine, Hippoglosson, quasi grandis lingua dicta est. Et hæc nobis origo nois & caussa est. Quæ licet historiæ Plinij diuersa forte aliquibus uideat (ille em̄ ait. Et in ijs ceu linguas folio paruo exeunte de folijs) meminerint tamen oēs, sequi nos græcos scriptores. præcipueq; hunc: & in uertēdis uocibus eius quā debemus fidem illi præstare, qui ἵπ' ἄκρον παρὰ τοῖς φύλλοις prodire linguas ex Hippoglossō dicens, q̄d est, in summo & secundū folia, nō ex folijs, sed ex summo caule, qua parte desinūt folia exire ea dixit. Id enim ἵπ' ἄκρον aperte significat. Cæteræ appellationes ex similitudine aliqua, uerū importune illi accreuerunt: ideoq; non tractandæ a nobis.

ἀντίρρινον

Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam appellant, hærbam caule & folijs Anagallidi similem, flore albæ Violæ, purpureo. Ideoq; syluestris Anagallis nominata est, semine uitulinarium. Tradunt perunctos ea, cum Cyprino oleo, aut Lilino, uenustiores fieri: nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

Antirrhinon, & Anarrhinon, & Antirrhizon, siue Anarrhizon. Similem Lappæ tradunt. Quidam Lino, ut arbitror corrupta lectione, pro Aparina. Radice nulla, siue minima, flore Hyacinthi, Plinio. Galenus hanc & Bucranion, hoc est, bubulum, aut uitulinum Caput dici meminit.

Plures in græcis Anarrhinon, q̄ Antirrhinon uocant, a uitulorū naribus, quarū figura semen est, factō nomine herbam: quæ folio paulo minus q̄ hederaceo tota figura est: flore qualis Viola purpurei coloris, ut nostræ ætatis herbarij ostendunt: qui deprehendisse nobis eam uident. Multifaciendū, & in honore habendū Anarrhinō hoc erit: si quod hic, Pliniusq; & ante eos Theophrastus testati sunt, ad gratiā & uenustatē homini proficiat. De eo Theophrastus libro. 9. de plantarū historia his uerbis egit. Ἰνδικίαν γάρφαριν αὐτὴ ποιεῖν τὸ ἀντίρρινον καλοῦσθαι. τούτῳ δὲ ὁμοίον ἐστὶν ἀπαρίνη. ἥ ἐστὶ ἀπὸ τοῦ ὕπτιον ὁδὸς κατὰ τὸν ὁδὸν ἔχει τὸνδ' ἀπὸ τούτου ἀντιρρῖνον ἠνολογῆναι. Quorū sit sensus. Gloriā enim ferunt continue Antirrhinon facere. Aparine simile id

est. Radicem non habet. Semen vituli naribus simile: & qui eo unguntur, ad gloriā proficere. Quæ oīa iisdem fere uerbis a Plinio reddita sunt. 25. uolumine, capi. 9. Discrepant tamē Theophrastus & Dioscorides aliquatenus. Ille πρὸς ὑψηλὴν καὶ ὑψηλὴν facere Antirrhinon dixit. i. ad gloriā & honorem: hic ὑψηλὴν fieri eo perunctos, qd ad gratiā tantū pertinet. Plinius uenustiores fieri dicens, Dioscoridē potius q̄ Theophrastum secutus hac parte est. Comparauit Plinius etiam Anarrhini flores Hyacintho, non purpureis Leucoijs: magnitudinē eorum seruato colore indicans. Sunt enim Violis illis minores: ideoq̄ Hyacintho similiores.

De Catanance.

CAP. CXXXV.

Catanance aliquibus Dānamete, alijs Dionysias, alijs Thyrsion, alijs Demos, alijs Cemos, alijs Crotion, Magis Archaras, alijs Arcopus, Romanis hærba Filicula, alijs Datisca, Dacis Caropithla dicitur. Ex eo genere una folia Coronopi habet longa, radicem lunci modo prætenuē, capitula sena, septenaue, in quibus Erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem unguis milui exanimati. Altera mali parua magnitudinē explet, radice exigua, colore, figura & magnitudine Oliuæ: folijs mollibus, diuisis, humi prostratis. Semen ut cicer in ramis dependet, multis foraminibus pertusum. Vtramq̄ uarrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

BARBARI COROLL.

Catanance, Thessala est herba. Huius secunda specie ab herbarijs nostris inuenitur Bistoria nomine.

De Tripolio.

CAP. CXXXVI.

Tripolion aliqui Pychen, alij Merida, alij Potamogitona, alij Strachyten, Romani Callium marem nominant. In marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq̄ dimittit, neq̄ in mari, neq̄ in sicco. Folio Glasti latiore, arido: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradūt, flores colorem ter in die mutant. Mane candidi, meridie purpurei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odorata, callidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urināq̄ per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

BARBARI COROLL.

Tripolium, ab aliquibus eadem existimatur quæ Polium, errore manifesto, ut ex eorū descriptionibus apertissime cognosci potest. Radix crassa Tripolio.

EX M. VERG. COMM.

Animaduertit multo ante nos Nicolaus Leoniceus (cuius diligentia, iudicium & ingenium nuncq̄ satis a quoq̄ laudabitur) uicinatē nominis decæptū Plinium, Tripolium quod nunc tractamus, cum Polio iampridem dicto miscuisse: & quæ alterius erant, alteri tribuisse. Quod nos modo relinquimus, dictis ab eo id tantum adijcētes, non solum miscuisse ea Plinium, uerum in Theophrasto plantis Gazæ eiusdem lapsus causam & auctorem fuisse. Qui in eo Tripoliū legens, plus latino scriptori, quod miretur aliquis, q̄ græco græcus homo detulit. Quodq̄ in Theophrasto erat Tripoliū, Polii uertit. Theophrasti. 9. de plantarū historia uolumine ad finē, uerba hæc sunt, καὶ ὅς δὲ καὶ φέρει τὸ τριπόλιον καὶ ἰσόδον καὶ μονοκλὸν ἰσὶ πάντες πρῶτος ἀνοδὸν χρεῖματ' ἔχει. &c. Ille autē uertit. Adde Polii. quod Hesiodo & Musæo auctōribus, ad oēm rem seriā, magniq̄ faciendā perutile prædicat. Elseq̄ Tripoliū, non Polii in Theophrasto legendū, multa indicat: p̄sertimq̄ qd p̄cedit de Periap̄tis, & Alexipharmacis. i. amuletis ab eo dictis. Poterāt utriq̄ qd dicimus multa ostendere: qd scriptor hic. i. & quod Theophrastus testatū sunt: sed oīm euidentissime nomē. Neq̄ enī Tripoliū uox aliud, q̄ quod ter uersat, mutaturq̄ significat. Quæ rara, & miraculi instar in eo uis est. Fueratq̄ hoc magis in Theophrasto & alijs opandū, q̄ quod ille ait, ἀλλὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ ὑψηλότερα, τὰ, τὰ τῶν τριπόλων καὶ ὅλων τῶν ἐσθίων.

D I O S C O R I D I S

C φαρμάκων λεγόμενων τοῖς πτωχμοσι καὶ ταῖς οἰκίαις καὶ ὅς δὲ φασὶ τὸ τριπλίον καὶ ἡσίδιον καὶ μουσαῖον ἵσταν πρῶτα συνουσίαν χρίσαντες ἵναι, διὰ καὶ ὀφύλουται αὐτὸ νύκτωρ ἐκκεῖν περὶ αἰνῶναι. &c. Quorum sensus est. Illa autē minus credibilia, & fatui hominis erunt, quæ de amuletis, & quæ ueneficiis auersantur, tam corporibus, q̃ domibus alligata & apposita. Quemadmodum auctoribus Hesiodo & Musæo, dicunt Tripolium ad omnia quæ digna studio fieri, utile esse. Eamq; ob causam, noctu erecto prope tabernaculo, effodiunt. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Coloris autē mutationem, cuius causam docuisse decebat, ad eas referri causas, ut credimus oportet, quæ ab eodem de conversione foliorum, claudenibusq; se & desiccentibus floribus quibusdam referuntur. Quorum omnium una in sole causā est: ab eoq; credendum, fieri in Tripolio tertiam per diem coloris mutationem. Quo enim plus, minusue humoris impetu solis ex flore exsuctum fuerit, eo obscuriore, dilutioreue colore fieri credendum est: mixtionibus enim, exceptis primis, ceteri colores constant.

¶ De Adianto.

С А Д. СХХХVII.

Ἐλίκωνται

A De Adianto. C A p. CXXXVII.
Dianton, alij Polytrichon, alij Callitrichon, alij Trichomanes,
alij Hebenotrichon, alij Argion, alij Corion enygron, Aegyptij
Epier, Romani Cincinalem, alij terræ Capillum, alij Supercilium terræ,
Daci Phithophthethela uocāt. Pusilla gerit folia, similia Coriandri, serra-
ta. Cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum
alti, folijs filicis, admodū exilibus, radice superuacua. Neq; caulem, neq;
fructum, neq; florem profert. Decoctum hærbæ potū prodest, spirandi
difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusus, & uring difficili. Calculos frā-
git. Aluum sistit. Serpentū morsibus auxilio est. Contra stomachi flucti-
ones in uino bibitur. Secundas ciet & menstrua. Sanguinis reiectiones
inhibet. Contra serpentū morsus crudū illinitur. Alopecias densat. Stru-
mas discutit, furfures in facie, & manantia capitis ulcera ex lixiuio emendat.
Defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut
hyssopo, uinoq;. Decoctum eius cum lixiuio & uino infusum, idem præ-
stat. Coturnices, & Gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorum addi-
tum. Seritur gratia utilitatis pecorum. In speluncis, umbrosis, & palustris-
bus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Theoph. li. 7.
de plār, ca. 13.

B A R B A R I C O R O L L.

Adianton, Capillus Veneris a Theodoro dicitur, frutex topiarius. Aestate uiret, bruma non marcescit. Nomen ei ab euentu, q̄ folium eius perfusum merfumq̄ aqua, simile tamen sic-
eode uidetur. Radice tam parua, ut possit nulla existimari. Locis opacis prouenit. Perdices in
bellum armantur, huius herba cibo. Callirichon, & Polytrichon a capillo dicitur, quem cin-
git, crispum, densumq̄ faciens. Dicitur & Saxifragum: non tam quia nascitur in faxis, q̄
calculos mire frangit: sed nigrum magis: quod & breuius est: & Trichomanes priuatim ap-
pellatur: de quo statim indicabitur. Adianton candidum est, & maius nigro, & Polytrichon
proprie cognominatur, & ab Hippocrate Calliphyton. Etiam si est ubi Calliphylon scribitur.
Folia utriusq̄. Filicis inferiora, aspera, ac fusca sunt, contrario inter se positi frequentia. Vm-
brosas petras, specus, & manantia saxa diligit.

E X M. V E R G. C O M M.

Coronat interiores puteorū parietes, & fontū margines Adiantum: & quasi sitiens, quas tamē odit & respuit, pronus quærit aquas. Non aliter quā qui opes sedulus continē quærit, & inuēris miser abstinet. Miraculū in eo Plinius id iactat: quasi non multa alia passim uideantur, quæ naturali corporē dislocatione, miserī simul quacunq; etiā illata uī nequeunt. Ex eo nominis illi causa est, quā duobus uerficulis in Theriacis suis Nicander tradidit. Ea est huiusce modi. ἀρχαὶ τῶν ἀδιαντῶν οὐκ ὁμοιοί φαίνονται, ἀλλὰ πάλιν πάλιν αὖτε παρὰ τοὺς ἰφίους. Quod est, Purumq; Adiantum, in quo nec descendente imbri, minimū e celo cadens stillicidium folijs

insidet. Docuit idem Theophrastus .s. de plantarum historia. τὸ τε ἐπὶ τοῦ ἀδiantοῦ συμβαίνειν
 οὐδὲ γὰρ ὑφαίνεται τὸ φέλλον βρεχόμενον, οὐδ' ἐπιδύκον ἐστὶ, διὰ τὸ τὴν ὕδραν μὴ ἐπιμένειν ἐπὶ καὶ ἡ προ-
 σκαρία. Quorum sensus est. Et quod in Adianto accidit. Neq; enim mader folium eius aqua cō-
 spersum, neq; humoris aliquod in eo uestigium remanet. Vnde & nomen illi factum est. Plini-
 us etiam. 22. uolumine, ca. 21. Aliud Adianto miraculum. Aestate uirer, Brumia non marcescit,
 Aquas respuit perfusum: mersumq; sicco simile est: tanta dissociatio deprehendit; unde & no-
 men a Grecis. Omnium græcorum, latinorumq; eadem in nominis origine ratio & sententia
 est. Vox ipsa etiam indicat. Neq; enim Adiantum aliud est, q̃ quod ὡς δαίνεσθαι, id est, non mā-
 descit. Testatus idem Plinius est Polytrichon, & Callitrichon Adiantum dici: sed diuersa ratio
 ne. Polytrichon quidem, quia capilli desuuiā explet. Callitrichō autem, quia eos tingit, & spē-
 ciosiores reddit: utrunq; enim effectum habet. Theophrastus nihil ultra, q̃ χρησιμαίνει ἀμφότε-
 ρα πρὸς ἑκφύσιν κεφαλῶν τριχῶν ἐν ἰατρικῇ τριβόμενα. Quod est. Vtilia ambo genera eius esse ad explen-
 dum capillo caput ex oleo inuncta. Sequitur appellationes has Trichomanes, quæ secundo ge-
 neri, de quo mox agendum erit, priuatum competit. Succedit illi etiam quæ in cunctis græcis pa-
 riter legitur, Ebenotrichon: ex qua nos credimus in latinis factum nomen, quod in cōmuni usu
 est Capillus Veneris. Id in antiquioribus inuentum hætenus a me nō est. Dico autem antiqui-
 ores, Theophrastum, hunc ipsum, Plinium, & his æquales alios. Ideoq; oborta suspicio est, ex
 corrupta uoce illa Ebenotrichon, Veneris Capillum factam fuisse. Be enim syllabam, græci, ue-
 pronunciant. Faciliq; potuit lapsus esse ab audito Euenotricho, in Veneris trichas, id est, ca-
 pillum. Suspicionem tamen hanc, nōn decretum uolumus esse. Alioquin ex Ebena, quæ ni-
 gro colore est, factum id nomen fuit: & ad Adianti Trichomanisq; nigros coliculos translatū.
 Neq; enim aliud Ebenotrichon q̃ Ebeni capillum, id est, nigrum, & quali colore Ebenus est, si-
 gnificat. Ceteræ Adianti appellationes quæ in Diosco. leguntur, satis certam habent causam &
 originem: ideoq; a nobis relinquuntur. Sed non relinquenda quæ Theophrastus eodem libro
 retulit. γίνεσθαι αὐτοῦ διὰ τὸ ἰσὺν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν. χρησιμαίνει ἀμφότερα πρὸς ἑκφύσιν κεφαλῶν τριχῶν ἐν
 ἰατρικῇ τριβόμενα. φέσθαι δὲ μάστιγα πρὸς τὰ ὑδρῆα, ὡς δὲ δύνται τινος, καὶ πρὸς τραχυγυρίαν τὸ τριχομανί-
 σον, ἔχειν δὲ τὸν καυλὸν ὁμοίον τῷ ἀδiantῳ, τὸ μέλαν, φέλλα δὲ μικρὰ, φέλλα καὶ πικνὰ καὶ πιφκώ-
 τα καὶ ἀντικρὺ ἀλλήλων. εἶσα δὲ οὐχ ὑπερί. χωρία δὲ φιλί σμικρά. Quorum summa hæc est. Genera
 autem eius duo. Alterum quidem candidum, alterum nigrum. Vtrunq; tamē explendis in ca-
 pite capillis utile: in quem usum ex oleo confricatur. Nascuntur aquosis locis, & ut opinantur
 multū, facit ad uesticæ stillicidia quod Trichomanes uocatur: habetq; caulem nigro Adianto si-
 milem: folia parua, densaq; contrarij inter se pediculis pendentia. Radix illi nulla est: amatq;
 umbrosa loca. Et hæc pro Adianto & Trichomane Theophrastus: quæ a Plinio hīdem fere uer-
 bis reddita sunt quo diximus loco, longe diuersa ab his quæ Diosco. tradit: qui Adiantum Co-
 riantri folio describit: neq; in eo candidum aliquod genus numerat, sed nigris coliculis & hoc
 & Trichomanes describit. Sed nec Theophrastus etiam in qua parte candidum id genus sit, re-
 tulit. Verumtamen ut obseruasse licuit, & ex his quæ Theophrastus indicat, totius generis no-
 men Adiantum est. Idq; statim diuiditur in candidum, & nigrum. Vocaueruntq; candidum,
 quod comparatum alteri albicantibus folijs sit. Quod enim ad coliculos pertinet, totum ge-
 nus nigros habet: in candido tamen augmentibus se coliculis continue minus nigrescunt, deli-
 nuntq; in summō colore uiridi. Sed certius discrimen in folijs est, quæ in nigro minora, penna-
 ta, & Filicis modo disposita sunt: in candido qualia in Coriandro, incertis interuallis prodeun-
 tia, et in extremitatibus incisuris diuisa. Longius itidem candidum nigro est. Hancq; rationem
 secutus Plinius ait. Duo genera eius, candidius, & nigrum breuiusq;. Id quod breuius est, Po-
 lytrichon, aliqui Trichomanes uocant. Quæ tota est huius scriptoris historia: qui primo candi-
 dum hoc Adianti appellatione, mox nigrum Trichomanis indicat. Non est difficile utrūq; in-
 uenisse. Sed quoniam frequentius illud nascitur, habetq; easdem huic uires, ideo notius & in
 frequentiore usu: idq; tantum Veneris capillum nunc uocant. Facillime in Diosco. omnia in a-
 telliget, qui oculus testis, fide sensus ad ea utetur. Neq; enim dubitare poterit, qualia in Adi-
 anto Coriandri folia dicantur: & quomō ἐν ἄκρῳ ἐχέμενα, quæ alij interpretes serrata & cacu-
 minibus diuisa dixerunt. Cum tamen impares foliorum incisuræ sint, & aliter sectæ q̃ in serra-
 dentes: neq; in cacuminibus tantum, sed undiq; per extremitates diuidantur. Credimusq; nos,
 qd in Adianti folijs legit, Filicis similia abundare, & ex altero genere ad historiā huius translatū
 esse: ideoq; uitij nota eo loco adiecta est. Nihil enim Filicis folio Adiantum hoc simile habet: ne-
 q; si tota folia, aut earum segmenta inuicem compares. Fuere ob eam causam animus, duas,
 tresue illas uoces tanq; inutiles relinquere: sed in cunctis græcis latinisq; inuentas seruauimus.

C pręfertim dicere Plinio, Vtriq; ramuli nigro colore nitet folijs Filicis. Verumtñ, ut pauloante pręmonstrauimus, non possunt simul Coriandro & Filici eiusdem plantę folia cōparari. Suspi-
cati; sumus, & adhuc suspicamur, nō esse integrā primā huius capitis partem: perijssęq; uoces
aliquas, quę certiorē totius Adianti historiā facerent: & quę nunc tam incerta leguntur, reli-
quias illius esse: quę truncę intellectum miscent, coguntq; legentes incertis animis inter Adia-
tum & Trichomanes esse. Sed qualē nos diximus pauloante, ut credimus, utriusq; historia est,
Adianti appellatione in toto hoc gñe antiqua medicina usā semper est: & q; generis ea uox est,
& q; omnis Adianti eędem uires ad omnia sunt. Paulusq; Aeginetā cum de Adianto egisset, de
Trichomane nihil tradidit, pręfatus, in Adianto dictum de eo fuisse.

τριχμαντι
ἀδιαντον

T De Fidicula seu Trichomane. **C A P. CXXXVIII.**
Trichomanes aliqui Pterion, alij Opteron, Romani Capilla-
rem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eam Adianton
appellant. Nascitur eisdem in locis quibus Adianton, Filici simile, sed
exilius, folijs Lenticulę, tenuibus, in ordinem utrinq; digestis, aduersis
in se, ramulis acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quę & Adi-
anton pręstare posse, constat.

T RICHOMANES Adianti genus alterum, Calytrichi cognomine, breuius & nigrius, tenuissi-
mis iuncis, radice minima, gustatu seruens. Primum uero genus Adiantum Polytrichon uo-
catum iuncos albos habet, & folia plura, maioraq; frutice quoq; maior est, ut prędiximus.

E X M. V E R G. C O M M.

S Vspicari ex Trichomanis historia facile diligentioribus erit, quod pauloante dicebamus,
credere nos in Adianto uitium esse, reliqtasq; alibrarijs uoces, membrumue aliquod, quo ille
Theophrasti exemplo totum Adiantum diuideret, Trichomanesq; hoc non illud Filici familia
habere folia diceret. Huius enim, non illius iudice sensu similitudo ea est: ideoq; Pterion, quasi
Filiculam a quibusdam dici Diosc. ait. Pterin enim gręci Filicem uocant: cui folia similia, parti-
terq; in ramulis nascētia hoc genus habet. Eupteron alij itidem dixerunt: quoniam pennatū
folium eius sit, nec aliter q; in alis auium pennę folia deinceps in eo sint. Eas omnes uoces imi-
tati Romani, Capillarem, quę Trichomani responderet: Pinulam, quę Euptero: Filiculam, quę
Pterio responderet dixerunt. Gręci hoc genus a ui sua Trichomanes uocauerūt, q; rara cute
fluentem capillum explet, & subnasci facit. *μυόν* enim ea gens rarum uocat.

ξανθιον
φάργανον

X De Xanthio, & Lappa. **C A P. CXXXIX.**
Anthion aliqui Phasganon, alij Antithesion, alij Chascanon,
alij Choeradolethron, alij & hanc Aparinam nominant. Lati-
ni Lappā. Nascitur læto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cu-
bitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis. Folia Atriplicis
habet insecta, Nasturtium odore imitantia, fructum grandis Oliuę
modo rotundum, & ut Platani pilula spinosum, qui contactu uestibus
adhęrescit. Is ante collectus q; perfecte siccescat, tunditur, & fictili uase
reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua
madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in uinō tuns-
dunt, & ita asseruant. Semen aptissime tumoribus imponitur.

B A R B A R I C O R O L L.

X Anthion, & Phasganon uocatur a Galeno & Paulo, Phasganon a Dioscoride, Philan-
thropos ab Actio, nunc Lappa inuersa, & minor a nostris. Non uidetur quibusdam Xanthi-
on ab Aparina superius descripta differre. Sed cur obsecro Dioscorides & Galenus & ceteri
diuerfas habuere duobus locis seorsum de ijs prodentes? Quid q; in omnibus gręcis exem-
plaribus, Aparina ex intervallo stellata pingitur quasi Rubia: Xanthium multo aliter ostendi-
tur folio Atriplicis, uel ut quidam scribunt, etiam Solani.

EX M. VERG. COMM.

Pura Lapparum genera, folio, semine & natali solo diuersa: obseruatumq; a nobis est, quæ cumq; hamatis uncis, aculeatq; & uestium tenacibus seminibus plantæ sunt, in græcis & latinis eodem aliquando nomine indicari: in illis Aparines, in nostris Lappæ. Quæ ueluti generis uox omnibus his est. Inter eas & Xanthion hæc est, numeratis ab hoc scriptore notis satis cognoscenda: sic dicta a græcis ὀρί ξανθὸν τριχὺς ποτὶ, id est, flauum capillum facit. Habet & alias appellatiões, sed nobis parum certas, & ob id alijs relictas. Circa rusticas domos, pingui ut hic ait, sed frequentius humido solo nascitur. Idq; est quod hic ait, arescētibus paludibus. Paludes enim appellat loca etiam, in quibus per hyemem aqua fuerit, æstate uero aruerint. Omnium autem notarum quæ Xanthio huic a Diosco. tribuuntur, nulla certior fructu eius est. Dico autem fructum Lappam, in qua semen est: quem figura grandis Oliuæ, & aculeatū hic describens, facilitam eius deprehensionem fecit. Sed nihil frequentius præmonstratis nascitur locis.

De Avena. CAP. CXL.

Aegilops aliquibus Sitospelos, alijs Siphon, alijs Bromos, Romanis Avena dicitur. Hærbula folia Tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina, ternaue, rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cum farina hæba ægilopijs medetur. Durici as discuit. Succus farinæ ammixtus, siccatur, & eorundem gratia reponitur.

BARBARI COROLL.

Aegilops necat hordeum: in quo maxime nasci amat. Festucago a Gaza dicitur. Plinius Auenam græcam uocauit. Hæc non nisi post annum, ex semine suo gignitur. Vere pilosum ei folium ut Lolio, non tamen ut illi pingue. Immitis aspectu, solum emaciat. Radice, culmoq; multiplici, melius in culto erumpit. Remedium, ut arua biennium quiescant: tum plane luxuriant eam admissum pecus obterat & consumat.

EX M. VERG. COMM.

Equitoca in græcis ad Auenam cunctis notam & ubiq; nascentem frugem, & eam quam modo tractamus herbam Aegylops appellatio, latinis aliquot, ut uidetur, præsertimq; Plinio & posterioribus græcis, miscendi causa fuit, quæ alioquin separanda, & in diuerso genere constitutenda fuerant. Idq; non leui periculo usus, & turpi rerum incertitudine factum est. Qui enim poterit pro Avena fruge modo cognosci, quæ hoc capite a Diosco. describitur Aegylops, duobus, tribusue seminibus in summo rubentibus, & inter ea exeuntibus aristarum modo capillis, quæ secundo uolumine ab hoc ipso scriptore Bromos dicta descriptaq; est: pendentibus in summo paruulis ueluti locustis, duplici cruore diuaticis, in quibus semen: quæ tota Auenæ frugis pictura, & præsens imago est: Qui etiam poterit idem utriusq; usus esse: cum huius ad oculorum fistulas, quas Aegylops dicunt, præcipuus usus tradatur: illius ad pulres, quæ tussientibus inseruiant: Qui etiam poterit non imperitus medicæ materiæ haberi Paulus Aegineta, antiquus & medicæ grauis autor, seorsum de utraq; agens: Bromonq; similem Hordeo uiribus tradens, Aegylopē uero discutiendi uim habere: Pluraq; alia, quæ longius reperenda modo non sunt. Satis enim est, ut diuersæ sint, & constituentur plantæ Aegylops, & Bromos historia, & autoritate eius scriptoris intellexisse. Quemadmodum in hoc ipso uidere facillimum est: qui inter fruges Auenam describens, Bromon eam uocauit: inter herbas autem Aegylopa hoc loco numerans, diuersam ab Avena herbam, nō frugem descripsit. Qualis autem Avena inter fruges sit, facile est secundo uolumine uolentibus cognoscere: qualis autem Aegylops, hoc loco cognoscenda erit: in cuius descriptione nihil est quod ad Auenam frugem pertineat. At Theophrasto Aegylops multis locis nulla alia q̃ Avena est: & quæ ab eo illi traduntur, frugis, nō herbæ competere uidentur. Nolumus nunc nos in ambigua re tanq̃ de cōperta agere. Quæ enim de Aegyllope ab eo octauo de historia & quinto de causis plantarum dicuntur, huiusmodi sunt, ἀλλ' ἵδον τοῦτο τοῦ βολεῖν λέγεται, τὸ μὴ ἀπὸ πάντων βλαστάνειν ἅμα τῶν σπερμάτων, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀντοιτίσθαι, τοῦ δὲ ἵσθαι νύκτα καθάπερ τὸν ἀγίλωπα φασὶ καὶ τὸν λωτόν. Quorum sensus est. Sed proprium hoc Bulbi est, non nasci simul ex totis seminibus, sed alteram eius partem eodem, alteram sequenti anno: qualem Aegylopem dicunt, & Lorum. Quod Plinius. ii. uolumine, capit. 17. reddidit, Mirum, Loron herbam & Aegylopa non nisi post annum ex semine suo nasci: qd

C aliqui, rusticaque præsertim plebs Auenæ frugis proprium credunt esse. Idem Theophrastus quæro de plantarum caulibus, cum ageret de pestibus & iniurijs frugum, ait, καὶ ἡ δὲ εὐχρηστικὰ καὶ ἡ κατὰ φύσιν αὐτῆς καὶ ἡ ἀγρία καὶ ἡ ἐν πύρρῳ καὶ κριθαίῳ. Quod est. Et quæcumque singulis seminibus connascuntur, ueluti Lolium & Aegylops in triticea & hordeacea segete. Qui locus a Plinio etiam libro decimo octauo, capite decimo septimo his uerbis redditus est. Triticum simili modo æra, & hordeum festuca, quæ uocatur Aegylops. Quam feliciter autem ab eo uersum id fuerit, poterunt uolentes collatis Theophrasti græcis uocibus cum latinis eius uidere. Nos illud monemus, festucam, non frugem Aegylopa a Plinio nunc Auenam dici: quæ nihilominus paulo ante Auenam ab eodem dicta fuerat. Videturque uagus in græcorum Aegylope, nunc frugem, nunc herbam describere. Suspicetur merito aliquis etiam Aegylopa frugem Auenam esse, Galenum primo de alimentis dicentem audiens: in triticea & hordeacea fruge cum impedimento aliquo infelicitate egerit, in Lolium alterum, alterum in Aegyloperum sæpe mutari: quod passim in re rustica & agrorum disciplina iactatur. His, multisque alijs ueterum scriptorum decretis & autoritatibus facile receptum est, Aegylopa inter fruges Auenam indicare. Nec nos in re, quæ iam pridem tantopere inoleuit, contra niti decreuimus: & si non desint quibus probare id liceret. Sed quod pro Dioscoridis Auenæ & Aegylope dicimus, huiusmodi est, Auenam frugem Bromon illi esse: traditumque de ea iam pridem secundo nolumine fuisse. Aegyloperum uero herbam omnibus facile cognoscendam esse, si in naturæ contemplatione diligentiores fuerimus: & quas hic illi tribuit seminis in summo coliculo, numeri & coloris notas obseruauerimus. Cubitali fere altitudine coliculus ex folijs, quæ in summa radice sunt, exit Aegylops: primumque florem in candido rubentem profert: mox cum defloruit, capillamenta potius quam aristas molles, procerasque mittit inter grana seminis prodeuntes, duo triaue ut hic ait, sed frequentius tria cum maturerunt rubentia: maiorum locustarum corneis oculis similia semina illa sunt: nec minus nitent: quoque in punicis grana contactu herent, eodem & in capitulo Aegyloperis semina illa. Nascitur macro terreni genere, frequentissima in uineis. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenam indicatæ fuerint. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenam indicatæ fuerint. Plinius post ea quæ alijs locis dixerat, & ex Theophrasto uerterat uicesimo quarto uolumine, capite. ii. ex hoc scriptore totam his uerbis descripsit. Et Aegyloperas sanat eodem nomine herba, quæ in hordeo nascitur tritici folio, semine contrito cum farina permixta, imposita: uel succo. Exprimatur hic & caulibus folijsque pregnantibus, dempta spica, & in trimestri farina digeritur in pastillos. Et hæc de Aegylope obseruata a nobis in græcis & latinis sunt. Relinquimus autem cogitandum legentibus, an satis ad constituendam inter fruges Aegyloperam Auenamque existimandam Theophrasti de ea historia sit. Quod enim ad Plinium pertinet, manifeste deprehenditur, frugem in Theophrasto Aegyloperam existimasse: in Dioscorido autem herbam paulo ante a nobis descriptam. Non esse autem Dioscorido Aegyloperam Auenam, historia eius apertissime indicat. Quæ enim in summo eius duo triaue grana rubentia, & inter grana illa exeuntes ueluti aristas habet, neque sunt in Auenam, neque esse possunt. At in Dioscorido legitur Bromon dici, & a Romanis Auenam. Impitiorum additamenta illa sunt, ab his huic scriptori adiecta, quæ alteram illam Aegyloperis significatio nem cum hac miscuerint, & ubique eandem esse crediderint: propterea, quod hic ait Tritici folio esse Aegyloperam, & Theophrastus ea tradiderit quæ paulo ante longius dicta a nobis fuerunt.

De Bromo Auenæ genere. CAP. CXLI.

Bromos hæba quæ aliqui Siphonion, alij Acrospelon uocant, Auenæ similis est, exiccatoriâ uim habens. Decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijci, rursus decoquitur, dum liquidum mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Alij tritam Aloem addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

BARBARI COROLL.

Bromos & hæc Auenam est, syluestri fere habitu ut Aegilops. Nascitur inter uicia segetis, spicam ferens. Radice copiosa & multiplici, culmo sparsa. De hac & inter fruges, leguminaque secundo libro diximus.

EX. M. VERG. COMM.

Si descripta hoc capite Bromos herba in frugū genere Avena est, ut in Diosc. legitur bis, nec suo loco actum ab eo de ea fuerit: quod in scriptore hoc absurdum, & historia medicinarū eius indignum, si in herbarum genere equiuoca frugi est, non dissimulabo, ignorare me eam palam fateri. Barbarus in Corollario suo syluestris fere habitus hanc esse dixit, multoque ante inter fruges secundo uolumine dixerat: ille de grano & semine, hic autem de herba tradi: discrimenque obseruasse in prima eius nominis syllaba ait: quoniam nunc per, o, nunc per, u, scriberetur. Nos in ignota re, fidem penes autorem uolumus esse. Non tamen tacebimus, non legi hoc caput in antiquioribus & melioribus græcis. Nec qui nobis est uetustissimus latinus Diosc. hoc habet. Obseruauimusque nos, eiusdem fidei, concordemque in cunctis & hunc & illos esse magno argumento, nulla quondam in Diosc. fuisse quæ hoc capite leguntur. Nō uerebimur & illud addere, si diligentius capitis huius phrasim expendatur, ab ingenio & usu uocum Diosc. longissime abesse uidebitur. Quinetiam Paulus Aegineta omnem ex hoc scriptore medicam materiam percurrentis, unam tantum Bromon, & eam frugē numerauit. Ob quæ inclinatur animus nobis, ut credamus adulterinum esse hoc caput, & a posteriore aliquo huic scriptori additum. Scio fore, ut audacior multis in censura hac uidear: & contra aliorum omnium placita, & codicum fidem petulantius de his censere: sed nihil timere nos persuadet studij huius nostri fides, & conscientia: quæ sine aliorum criminacione, & rerum iactura, suspicionibus saltem (quoniam forte alia ratione non potest) prodesse conatur.

De Glauce. CAP. CXLII.

Glaux Cytiso & Lenticulæ folijs similis, quæ superne uirent, æque uersaque candidiora spectantur. Ramuli a terra exiliunt quini se niue, tenues, ab radice dodrantem alti. Flores ceu Violæ albæ purpurei exeunt. Nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

BARBARI COROLL.

Glaux olim Eugalacon ex facto uocabatur. Rami serpunt in terram. Est a quibus non Glaux, sed Glax, & Galax, ut a lacte nominata pronuncientur. Hac descriptione inuenitur herba in nostris littoribus, ad Medocum omnino similis: nisi quod florem habet aureum, non purpureum.

EX. M. VERG. COMM.

Eugalacon, a copia lactis quam facit, uocasse ueteres græcos Glaucem hanc testatus Plinius est, isdem, aut parum diuersis notis eam, 37. uolumine, capite, 9. describens. Nec alia figura nostræ ætatis herbarij eam ostendunt. Relictum in historia eius id tantum ab hoc scriptore est, quod folia in ramulis deinceps disposita sunt bina: contrariis pediculis, & exiguis interuallis penetrant. Legebat in hoc capite corrupte κλωνία δὲ ἀπὸ γῆς. &c. Quod est, ut cæteri interpretes uerterunt, Ramuli a terra. Id nos ueterum græcorum fide adiuti, & rei necessitate admoniti, ἀπὸ γῆς, quod est, per terram, mutauimus. Fecimusque id primum autore Plinio, qui ait. Rami in terram serpunt: sed multo magis, quod inconcinnum erat, bis idem dixisse: primum a terra, mox a radice ramus exire. Satis enim alterum est: nec differt dixisse a terra, & a radice aliquid surgere.

De Polygala. CAP. CXLIII.

Polygala palmi altitudinem petit. Folijs Lenticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

EX. M. VERG. COMM.

Polygalon, & Polygala dicitur. In caule summo folia, ut diximus, Lenticulæ, gustu adstricto.

EX. M. VERG. COMM.

Quam habet solam potestatem Polygalon herba, ipsum statim indicat nomen, in quo sola est multi lactis significatio. Breuissime & hanc Plinius eodem libro, sed capite duodecimo descripsit. Breuis herba ea est, singulari caule: in quo bina folia deinceps figura Lentis, uerum maiora, paruis interuallis prodeunt. In summo ueluti spicatum foliosum cacumen est.

C

Orypis

De Osyri.

CAP. CXLIII.

OSyris frutex est niger, lentus, ramulos ferens tenues, & in his folia quaterna, quina senaue, ceu Lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum iuuat arquatos.

B A R B A R I C O R O L L.

OSyris, & Osyrias, ramulos habet nigros, & folia item nigra Plinio. Semen quoque primo nigrum, post rubescens, cognita mulieribus Smegmate, quod a Galeno, & Paulo, & Actio Corema, siue a pupulis, Corema dici putant.

E X M. V E R G. C O M M.

LAxandi iecur in medicina vires habere Osyrim, ueteres graecorum medici testati solū sunt: in reliquo uitae usu mulieribus cognitam herbam dixerunt, quae ad exterendam leuigandamque cutem ea utebatur. Nominis causam & originem nos ignoramus. Nec scimus unde ex Aegypto, in qua gente priuatim Osyris, non contemnendum tunc numen, colebatur, ad herbam transierit. Offendunt hanc etiam herbarii, modo uera Osyris ea sit: intelligiturque facile quae hic ait, folia a principio nigra, mutato deinde colore rubere maturitate, & quasi siccitate eum contrahere colorem: quoniam superiora continue nigro colore uirent, inferiora autem quasi in more destituta rubente colore illo uidentur.

Omidæ

De aspera Smilace.

CAP. CXLV

Smilax aspera ab alijs Epatitis, alijs Lycanthemon, alijs Cynostbaton, alijs Aniceton, alijs Heliophyton, alijs Anatolicon, alijs Dytricon, alijs Helide, Aegyptijs Lyiste, Romanis Mergina, Etruscis Radia appellatur. Folia habet Periclimeni, sarmenra tenuia, multa, Rubi modo, aut Paliuri aculeata. Arbores scandit, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumque leniter mordent. Nasitur in palustribus et asperis, radice dura crassaque. Folia, et acini & ante & post epoti, uenenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem aditis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura.

B A R B A R I C O R O L L.

Theo. lib. 3.
de planta. hi.
cap. 16.

Smilax trachea, hoc est, aspera, Milax a Galeno dicitur, ut a Smilace per Taxo differat. Ergo Smilax Hederæ genus est, Cilicia cognomine. importata enim ex ea terra est in Græciâ, folio in acuminato quod est, sed & in angulum depressio, nec tamen anguloso, hederaceo, paruo, & ubi pediculo adalligati fere madido, medij calli spinæ modo tenuē habente: staminibus non porrecta ex eo, ut in cæteris folijs, sed circa eum coacta in orbem, ab annexu pediculi, ex quo & iulus quidam gracilis, & conuolutus pampini modo emittit, flore candido, Liliū olente, fructu Solani, aut Melothri, aut etiam ut Labruscæ, racemis ut Hederæ pendentibus, aut Vuae potius, quam ab eodem limite pediculi acinorū exeant: acinis colos ruber, complexis nucleos binos, maioribus ternos, minimis singulos. Nigri sunt nuclei, atque duri. Peculiare habent racemi, quod latera caulium sepiunt, quod unus omnium gratissimus propendet summo caule: ut in Rhamno, atque Rubo. Flore huius coronarij utuntur, quamque syluestri, ut & spinæ acutæ. Hactenus Theophrasti de Smilace sententia. Plinius, Folia ingratum Smilacis & Hederæ in coronamentum se dedere. Smilacem hanc, & Autophorō, & asperam cognominari uideo penes eum. Coronam ex ea factam impari foliorum numero capitis doloribus mederi. Quidam ingratum duo genera Smilacis dixerunt. Alterum immortalitati proximū, in conuallibus opacis scandentem arbores, comantibus acinorum corymbis; contra uenenatam omnia efficacissimam. Huius lignum ad aures quem sonum reddere. Alterum genus culta amare, & in his pignus, nullius effectus, ut mox dicitur. Infausta Smilax omnibus sacris, & coronis, quam sit lugubris: uirgine eius nominis, propter amoris iuuenis Croci, mutata in hunc fruticem. Id uulgus ignoras, plerumque festa sua polluit, Hederam existimando, sicut in poetis, aut Libero patre, aut Sileno, qui omnino nescit quibus coronetur. E Smilace Codicilli quoque fiunt. Plurima hæc in ipsis Tepe uiuit, saxa opes conspicuo nitore, oculos tenens, ut Helianus ingratum. Quam de Smilace quæ Dolichos sit, uideri potest.

test Helianus dixisse. Est autē Dolichos, quam Plinius Siliquam sylvestrem uocauit, id quod tribus Auctoris eius locis inter se collatis, autūmo. Vnus est libro eius. 18. Siliqua inquit o-
minis dira adhaerendo. Alius. 17. & circa inquit. Tempe Thessalica, quae Polypodion uocatur,
& quae Dolichos. Tertius libro. 11. Circa Thessalica inquit Tempe mirū Siliqua sylvestris am-
plecti radicibus fontem eum dicitur, semper florens purpura. Vitruuius tamen hanc, quae cir-
ca Thessalica Tempe nascitur, non herbam, sed arborem intelligit. In Thessalia inquit fons est
profluens, ex quo nec pecus ullum gustat, nec beluā genus ullum propius accedit: ad quem
fontem proxime est arbor, florens purpureo colore.

EX M. VERG. COMM.

Tractata in Croco fabulosa Smilacis historia a nobis est. Fueruntq; tunc ex antiquis alijs
scriptoribus repetita, quae in Plinij & Nasonis lectione nouisse pro Smilace hac oēs oporteret.
Eo labore nunc, & ut poeta ait, fasce leuati, nec habentes quod illi aliud adiciamus, omnia em
ex Theophrasto, & Plinio Barbarus in Corollario suo coaceruauit, breuiores in cōmentatio-
ne eius erimus. Praesertim nascente ubiq; inter stirpes, & in sepibus Smilace, cunctisq; ob eam
causam noto sarmentoso frutice. Cuius flos candidus est, & egregie odoratus. Quae duae eius
notae in Dioscoride non leguntur, in deprehendenda stirpe non minus tot alijs ab eo numera-
tis necessariae: quae aut forte in hoc scriptore perierunt, aut in uulgarī stirpe neglectae ab eo fise-
runt. Nihil pro cognoscenda Smilace certius Theophrasti historia est, quam multis toto opere
locis, sed longissime ad finem tertij de planta. histo. uoluminis tractauit.

De laui Smilace.

CAP. CXLVI.

Laeuis Smilacis folia Hederæ similitudinem habent, molliora, lae-
uiora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuolui-
tur arboribus ut prior. Fructum parit Lupini modo nigrum, exiguum,
floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac Smilace quadam
topiariorum arte tentoria contra aestus molestiam factitantur. Folia per
autumnū decidua. Semine cum Doricniō poto, ternis singulorum obo-
lis, uaria & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

BARBARI COROLL.

Smilax, siue Milax lia, hoc est, leuis. Diuersa est ab ea, ut praemonui, quae Smilax Cepea,
hoc est, hortensiana dicitur: de qua & alio loco demonstratum est. Legem Plinius amare cul-
ta, & in ijs gigni scribit: sed nullius effectus esse. Galenus similes eam uires habere praedicat,
quas aspera.

EX M. VERG. COMM.

Quatuor in scriptore hoc, & in reliquis graecis Smilacis genera numerantur. Verum duo
haec primo, per se, & uere Smilaces dicunt. Quae em secundo uolumine a Diosco-
ride tradita & hortensis dicta ab eo & ab alijs est, ex eadem ui uestiendi sepes murosq; & ut hic
ait, sepnas faciendi, in censum & nomē harū uenit. Licetq; hederaceo folio illa etiā describatur,
fructu tamē & semine penitus diuerso est. Hac em Lupinis, illa Foenogreco comparat. Præter-
ea in censu medicæ materiae, quae a Paulo Aegineta sexto sui operis uolumine tractat, quatu-
or eodē nomine Smilaces numerantur. Aspera haec, & sine aculeis altera: quas Galeni exemplo
Smilaces, non Smilaces & ipse uocat: quemadmodū in Croco nos etiā diximus. Tertiā horten-
sem illā, cuius fructus lobia, id est, siliquas uocari, & hic, & ille ait. Quartā postremo Taxū ara-
borem: quā aliqui per, y, discriminis causā scribi uoluerūt. De qua dictū a nobis hoc ipsō uo-
lumine fuit: totaq; Smilacū omnīū in antiquis graecis historia haec est. Nec contra codicū omni-
um fidem, ueterūq; medicorū auctoritatē nouare aliquid nos audemus. Non tamē credimus,
legendibus fore inutile, monere eos, dubitasse nos, & adhuc animo pendere: hortensem illā, le-
nemq; & sine aculeis eandē hanc esse, & pro una duas in hoc scriptore legi. Vtūq; ad hanc
dubitationē his coniecturis. Vtrq; hederaceo folio describit. Illa graciles caules & clauiculas,
qbus propinquis fruticibus se implicet: haec uticulas eiusdē rei significatione habere dicit. Illa se-
multo incrementū augeat, eousq; ut scēnas & tabernacula faciat: idē & haec facere tradit. Illa se-
men habet *δυσόνορον*, id est, infomniosum: haec *ἐνύπνια πολλὰ καὶ τὰ ταραχώδη*, id est, multa & tu-
multuosa infomnia facere dicit. His nos coniecturis & obseruationibus moniti, dubitauimus
eandē esse, & pro una duas numerari. Sed tūc apud nos merito est ueterū medicorū auctoritas.

D I O S C O R I D I S

C ut eos sequi potius q̄ solus importune sapere uoluerim: presertim uocante Plinio aliquot locis hortensem illā græcorum exēplo Siliquā. Dico autē græcorū exemplo, quoniā illi discernentes eam ab alijs, Smilacē quidem proponūt: sed statim addūt, cuius fructus Siliqua uocāt. Verisimileq; est, hortensem illā in Smilacū nomen, ut diximus, sola similitudine transisse. Et hæc pro quentiorem esse, & in usu coronarū quondam ob floris speciem & odorem fuisse.

¶ De Rusco.

C A P. CXVII.

μυρρίνη

S Y L V E S T R I S Myrtus aliquibus, Græcis Myrtacanta, alijs Hieromyrton, alijs Oxymyrfine, alijs Myacantha, alijs Agonon, alijs Scincos, alijs Mintha, alijs Catangelos, alijs Anangelos, alijs Acaron, alijs Ocneron, alijs Cnicem, alijs Lychene alijs Chamapitys, alijs Chamæmyrte, Beotis Gyrenia, Magis Herculis genitura, Latinis Ruscum appellatur. Foliū fert Myrti, latius, in formā lanceę mucronatū. Baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, a medio folio dependentes, osseo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, uutiliū modo len- ti, fractu contumaces, foliosi. Radice Graminis simili, acerbæ, & subama- ra. Folia & baccæ in uino potæ, urinā cient. Menses pellūt. Vesicæ calcu- los frangūt. Stillidie urinæ medentur. Dolores capitis sanant, & regiū morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radice in uino potū, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorū uice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

D Pli. li. 23. ca. 9.

M Y R T U S syluestris, offert a satua, baccis rubentibus, breuitateq; ideo & Chamæmyrfine uocatur. Eadem & Oxymyrfine, atq; Ruscus, siue Bruscus uulgo: sed corrupte. Inter herbas sponte nascentes, idoneas cibo numerat, & ex qua sunt rursi scopæ. Ruscum inquit Verrius apud Festū, amplius paulo herba est, exilius uirgulto, fructibus non dissimile lunco. Huius colore mulieres uti solitas, Cato meminit. Hanc & Acaron idē Plinius, sed Dioscorides Acaron uocari scribit. Scio fructū huius Cubebas Maurice uocatas credi: quod q̄ uerum sit, diligenter animaduerti cupio, p̄sertim ab ijs dissentiens qui hoc affirmant. Galenus certe id quod Cube- bas medici appellant, ipse Carpesiū uocauit, duorū generum, Ponticum, & Laertium, a mon- tibus Pamphyliæ: ubi frequens est ita dictū. Inueniri hoc & in Sida copiosum tradit: oppidū id est Pamphyliæ. Naturam, & effectum ei reddit, quales ipsi Phur: gustum quoq; simile, tenui- oris etiānum, hoc est, subtilioris substantiæ: propterea & plus uirium in eo esse purgandis, & exterendis intestinis, quæ sint occlusa; non tamē par uirtute penetrandī Casiæ, nedum Cinna- momo, etiāmsi Quinto inquit ita uidebatur. Urinam cit, & renes calculis laborantes liberat: quo argumentō Mauri syluestris Myrti baccas Carpesium, & Cubebas esse putauerunt: præci- pue, cum nec Dioscorides Carpesium, nec Galenus Myrtum syluestrem usquā nominent. Est autē odoratum semen Carpesiū, hoc est, Cubeba. Fortent syluestris Myrti baccæ, dum recētes sunt, ossæ in ijs duricia. In Carpesio nihil tale. Superuacū existimo, in re confessa quidem, sed a nobis primū comperta, longiorē moram ducere. Illud in transursu dixerim. Carpesium si ore contineatur, claram uocem facere pronunciantibus: ob id Bernardus Iustinianus, homo in primis doctus, & eloquens, nunq̄ sine hoc semine concionabatur. Sed & illam dotem prædi- cant: maiorē in coitu uoluptatē sentiri ab ijs, qui habeant id in ore: quasi non satis sit in ea titilla- tione mens cōmota, nisi doceamur, quemadmodū nos Venus adminiculator, & uolentior transuersos auferat. Paulus, & Carpesiam uocauit quādoq;. Nam Opocarpasum, hoc est, lac e Carpaso, siue Carpatho, ut Dioscorides appellat, siue Carpasia, interim, & Carpesia, ut Pau- lus, ex eodem sit genere, an diuersum non constat. Illud certum est, inter delibutoria uenena poni eum succum, libro huius operis supremo. Est & Carpasium lini genus: quod ut Pausa- nias ait, solum ex omnibus igni non corripitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Ruscum nouisse omnibus facile erit, tam certas in scriptore hoc eius notas ruri inter sepes

& rupes observantibus. Potuit cuspidatus magis q̄ spinosus frutex in usu medicinae aliquo & sanitatis quondam, ut hic ait, fuisse. Nunc in nullo honore est. Aliquibus locis tamē scopae ad purganda pavimenta ex eo fiunt. Pueri etiā rubentes baccas ex folijs eius decerpentes, ceu corallijs perludū se illis ornāt. Rustica postremo plebs in earnario suspendit: tuereturq; eo a murū in iurij pernās, & casei sui fiscellas, neq; em acuminata in cuspidē foliorū eius cacumina, penetrant alia illa audent. Quā ob causam Myacanthā, i. Murinā spinam dictā fuisse etiā credimus. Ethruria certe modo non aliunde factio noīe appellat. Theophrastus etiā prāter hāc lib. 3. de plantarum historia *κρομίσσινον*, id est, cuspidatam Myrtum vocavit.

De Lauro Alexandrina. CAP. CXLVIII.

Laurus Alexandrina, quā aliqui Idæam, alij Danaēn, alij Hypoglotton, alij Zaliam, alij Stephanen, alij Daphnon, alij Samothracicen, alij Methrion, alij Hypoglossion uocant. Folio est maiore quam Rusci, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, Ciceris magnitudine. Ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores. Radice sylvestri Myrto simili, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci. Et stillicidio urinæ auxiliatur. Sed sanguinem extrahit.

BARBARI COROLL.

Laurus Alexandrina, Carpophyllos quoq; dicitur, quoniam super dorsum folij fructificat. Propria nascitur circa Idam: unde cognomen Idææ. Plurima & circa Heracleam Ponti. Frutex copiarū, & coronarij est operis.

EX M. VERG. COMM.

Habet Laurus Alexandrina integrę quantitatis folio supernatum a superiore parte paulo supra longitudinis dimidium minus aliud folium, quod ueluti monstrum aliquod in eo supernascitur & uiuit, eiusdem excepta magnitudine per totum figuræ. Neq; ab re hic utrunq; hoc folium Rusci folijs comparauit: acuminata enim sunt: solaq; ut hic ait, magnitudine, mollicieq; & candore differunt. Habet præterea Alexandrina Laurus hæc aliud, quod Rusco simile sit. *ἡπιφύλλοκαρπος* enim ut Theophrastus ait, id est, in folijs contra aliarum stirpium naturā fructum fert. Quod hic breuius indicauit, dicens, *καρπὸς δὲ ἐν μέσσοις*. &c. Nosq; uertimus, fructum fert in medijs folijs. In quo animaduertendum est, fructum ferre Alexandrinam hanc Laurum, in medijs quidem folijs, quemadmodum & Ruscus: non tamen simpliciter ut ille, sed in geniculo alterius eius folij, quod nos maiori folio supernasci diximus. Illic enim hæret fructus: eamq; ob causam potuit hic scriptor *ἐν μέσσοις* dicens, non media folia, sed inter folia medium nasci fructum testari. Quemadmodum Theophrastus libro primo de plantarum historia his uerbis indicauit. καὶ ἐν τῇ καρποφόρῃ μεταξὺ περιεληφέντα τὸν καρπὸν, ὡς αὐτὴ ἡ ἀλεξάνδρεια λέγουσι. Quod est, Sunt & folia quædam fructum ferentia, & inter se fructum amplexa, qualis Alexandrina Laurus est. Inter se fructum amplexa ait, paucis quod dicimus manifeste indicans. Esse autem Alexandrinam Laurum *ἡπιφύλλοκαρπον*, id est, in folijs ferre fructum, pluribus locis testatur Theophrastus idem: præsertimq; tertio de plantarum historia uolumine. Idæa Laurus etiā dicta hæc, ab Ida monte est, quo loco speciosior & copiosior forte nascitur. Stephanon idem, id est, coronam, q̄ pro Lauro ad coronas forte uterentur. Credimusq; nos, Alexandrinam Laurum dictam, q̄ Alexander uictor ea usus fuerit: & si Plinius Daphnoidi id tribuat. Sciendum illud etiā, inueniri aliquādo in ea simplicia folia, quæ supernatū alterum illud minus foliū non habent. Sed sterilia ea sunt. Manifesto argumento, supernascei alterū illud folium fructus causa. Hypoglotton, & Hypoglossidion uocari a quibusdā eandem hic ait. Idē monuit & Plinius. Factūq; id nomen a lingua est: nec aliud significat, q̄ quod sub lingua habetur, aut huiuscemodi quodpiam. In quo non facile persuaserit mihi aliquis, a similitudine humanæ linguæ dictam fuisse. Acuminato enim mucrone folia eius sunt: a qua figura longe humana lingua abest. Quo fit ut credamus, potuisse quondam sic dici, quoniam ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in pueris forte uterentur. Est enim illi acri-

A

ἀλεξάνδρεια
ἀγρια
ιδέα
δανάη
ὑπογλωττίον

B

D I O S C O R I D I S

C monia, & calefaciendi uis. Id tamen in antiquis hæteus inuentum a nobis non est. Verum tamen scimus, Insubres, aliasq; gentes aliquas in balbutientibus pueris uti ea: iuberiq; sub lingua habere, mares duplex eius folium & fœcudum, simplex uero & sterile illud foeminas. Verum tamen ut diximus, in græcis nullum eius usus habemus auctorem.

De Daphnoide.

C A P. CXLIX.

Daphnoide

Daphnoides Alypo simile, flos ut Nymphææ, cuius medium nuci Cypressi non dissimile, in quo semen. Aliqui Chamæ daphnen, alij Peplion, alij Eupetalon uocant. Cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, multis inde sursum uersus foliosis. Cortex supra modum uiscosus ramos uestit. Folia Lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores candidi, bacca cum ematuruit, magna, radix inutilis. Nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens, uel aridum in potu. Menses ciet & uomitus. Caput inanit commanducatum. Sternutamenta mouet. Bacca quindecim potæ aluum resoluunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 15.

Daphnoides & ipsa Laurus est syluestris, baccis e nigro ruffis, sed alij eam Pelasgon. Alij Cephalon, siue Stephanon Alexandri uocant. Herbarij nostri Laureolam, & hanc & sequentem. Folia huius crassiora Plinio q̃ Laurus, graciliora Dioscoridi. Nec illud præteribo, Dioscoridis mihi uerba non uideri, quibus dicitur, Alypo simile hanc herbam esse floribus Nymphææ. Inuenio & qui Alypoides hanc uocent.

EX M. VERG. COMM.

DON Laurum, sed Lauri formâ & spem: neq; eam toto corpore, uerû in folijs & fructu tantum habentē herbam Græci Daphnoides dixerunt. Plinius præter nomina quæ in Dioscoride leguntur, Stephanon, id est, coronâ Alexandri uocari etiâ dixit. Nostræ ætatis peritiores herbarij, hanc priuatim Laureolam uocant: ostenduntq; Laurinis folijs surgentē a terra, surculosum fruticem, cõferctis, coaceruatisq; sub folijs seminibus, quæ laurinarum baccarum figura sunt, nigris ut hic etiâ ait, in maturitate. Florem uidere non licuit. Eamq; ob causam nihil pro comperto de eo testatur: sed respondentibus naturæ cæteris notis, uerisimile est, responsuros etiâ & flores. In quibus damnauimus nos, & explosimus quod a capitis principio statim legatur, Alypo simile Daphnoides, & florem Nymphææ habere: & quod sequit, in medio floribus esse cono simile quiddâ, in quo semen: quoniâ non responderent Daphnoidis historiæ, & nulli bi in antiquissimis græcis & latinis ea legerent: & paulo post de flore eius legitimo loco ageretur. Nasci multum Daphnoides hoc Theophrastus in Arcadia testatus est. Numeraturq; ab eo inter ea quæ præcipuam purgandi uim habent. Quod hic etiâ indicat, monens per aluû pituitas ducere, uomitiones ciere, mensesq;, & commanducatum pituitas oris purgare: quinetiam sternutamenta facere: quæ omnia eiusdem potestatis sunt.

De Chamædaphne.

C A P. CL.

Chamædaphne

Chamædaphnen alij & hanc Alexandrinam appellarunt, alij Daphniten, alij Hydragogon, Romani Laureolam, alij Laetuginem, Galli Vsubim. Virgas emittit cubitales singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læues, folia Lauri similitudine, læuiora multo, ac uiridiora, semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tormenta cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam, ciet. Idem facit pello appositus.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 21. ca. 27.

Chamædaphne folio tenui, eadē quibusdâ & Vincaperuinca est, herba Topiaria, semper uirens, in modū lineæ folijs geniculatim circūdata, ueteribus inopiâ florū supplere solita, cuius

& comedunt asparagi. Porro mihi alia uidetur esse Vincaperuinca, q̄ Chamædaphne: q̄ Vin-
caperuinca non attollitur, sed serpit, ac se in modum lineæ, ut prædixi, porrigit, flore in pur-
purâ ceruleo: Chamædaphne assurgit in cubitalem altitudinē, ut Dioscorides, & Plinius con-
firmât. Potest tamen etiā Chamædaphne dici Vincaperuinca, id q̄d & Plinio placet. Sed ut te-
statum sit tamē, aliud, nō idem oīno genus esse, Alioquin & medicinae quoq; nōnihil uariant.
Hydropicis, & auribus, & aluinis prodesse Vincaperuinca dicitur, Chamædaphne capitis do-
loribus, urinæ, mensibus ciendis, ardoribus stomachi, torminibus.

Hvmilis & terrestris Laurus Chamædaphne est, sola foliorū similitudine græcorū adopti-
one in nomē Lauri & honorē adscita: topiaria herba, si Plinio credimus, & a latinis herbæ
rīs sua ætate Vincaperuinca appellata. Quæ si ea est quam Ethruria nunc Vincam herbā uo-
cat, qua defunctæ uirginēs in gente nostra ad sepulturam coronatæ efferuntur: & qua familiæ
apud nos aliquæ, gentili ture suo, primū ingredientem urbem Archiepiscopum coronatæ, ad
portā excipiunt, stipantq; & per urbem comitantur, cognitu facillima est: in hortis passim na-
scens, tenuissimis uiticulis potius per terram serpens q̄ uirgis, ut Dioscorides ait, a terra se ex-
tollens: folijsq; oleaginis magis q̄ laurinis similibus. Verum a Dioscoridis Chamædaphnes
historia longe ea differt, ob eas quas paulo ante numerauimus, & plerasq; alias notas, quas uo-
lentibus obseruasse facillimū erit. Meminit Theophrastus Chamædaphnes ad extremū ter-
tij de plantarum historia uolumen: sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo aliud intelligi, q̄ fer-
re Chamædaphnem fructum folijs adnatum: quod a nostræ ætatis Vinca, longissime abest.
Ea etiam in nullo ciborū usu modo est, quod ueteres græcorū medici in Chamædaphne fuisse
quondam testantur. Siquidem Paulus Aegineta in sexto de ea agens ait, ἡ καὶ ὑβρίται. Quod
est. Hæc etiā comeditur. Præterea libro primo quo capitē docet de omnī olerum asparagis,
cum longius de pluribus egisset, subiecit, παραπλίσια δὲ καὶ ὁ τῆς χαμαιδάφνης ἀσπράγος, id est,
Nutrit similiter etiam & Chamædaphnes asparagus. His nos indicijs, auctoribusq; persuade-
mur, non esse Chamædaphnem Ethruriæ Vincam herbā. Et nihilominus quæ a Plinio Vin-
caperuinca, u. uolumine, capite undecimo describit, nostræ gentis Vincæ satis respondet. Si-
quidem Vincaperuinca ait semper uirere in modum lineæ, folijs geniculatim circumda-
tam, topiariam herbam, & inopiam florum aliquando supplere. Quæ omnia nostræ huic com-
petunt: in Chamædaphne autem inueniri nequeunt. Quærendum itaq; qualis Chamæda-
phne sit, folio Lauri, cubitalibus uirgis, fructu rotundo rubenteq; & folijs adnato; cuius aspa-
ragus in ciborum usu esse possit.

De albo Veratro.

CAP. CLI.

Elleborum album aliqui Ascida uocant, alij Atomon, alij Pignato-
exarin, Magi sanguinem Herculis, alij Polyidos, alij Anaphylton,
Aegyptij Somphiam, alij Oure, Latini Veratrum album, Galli La-
ginum, aliqui Anepsa. Fert folia Plantaginis, aut Betæ syluestris si-
milis, sed breuiora, & nigriora, rubescentia, caulē cauum, quadran-
talem, tunicis conuolutum cum arescere cœpit. Radicibus nittitur mul-
tis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, Caparum modo fibratis.
Nascitur in montibus & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimū
habetur candidum, friabile, carnosum, modice extensū, nec tamen lunci
modo mucronatum, quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem habet
medullā, gustu non admodū feruens, neq; saluā subinde ciens. Huīusce
modi autē strangulat. Primatū Cyrenaicum tenet. Galaticum autē & Cap-
padoicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatis
mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores. Collyrijs animisce-
tur, quæ caliginem oculorum discutiunt. Partus impositum necat. Men-
ses pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit, cum melle & polenta
subactū. Absumit carnes, si coquat unā. Datur per se ieiunis, & cum Sa-

A

VERG.

B

ἐλλέβορος

C fama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mullâ, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maxime a Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset in hac præsertim ædificatione, de materia, simul medicam uiuendi rationem exponere. Dant nonnulli in pulte, aut halicæ sorbitione, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim Veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus nulla strangulationis suspicio imminet, si nulla ualētudo corpus infirmat. Si quidem dum hæc ita contingunt, deiectio nihil periculi minatur, quod non intempestiue medicamentū corporibus offeratur. Vomitiones con-

Theoph. li. 9.
cap. 10. 11.

Pli. li. 27. ca. 6.

B A R B A R I C O R O L L
Elleborū candidū, hoc est, Veratrū, frigidis gaudet. In Anticyra cōmodissime purgari fructū eius, qđ Sesamæ habet similitudinē, Theophrastus tradidit. Sed hoc Sesamoides uocatur. Coruicibus semen Ellebori gratissimū, scribit Aristoteles: quā ob causam antiqui eas damna uere mensis, nunc quæruntur. Nigrū a candido radice tantū differre arbitrantur pleriq;. Alij etiā folijs, quę candidū continuo radici annexa, et humi sparsa habeat, aule ferulaceo, breuioreq; qđ Albuci. Plurimū nascitur in Oeta monte, & optimū uno eius loco circa Pyrā. Secundus locus Pontico. Tertius Heleatico: qđ in uitis gigni ferunt. Quartus Parnasio, qđ adulterant Etolico, ex uicino. Sunt qui & Massileoticū inter hæc laudent. Albū cum succidit, caput aggrauat. Ideoq; celeriter effodi præcipiūt, & Alliū præsumi, & uinū sorberi: qđ Dioscorides & in nigro seruat. Leguntur autē tenuissimæ radices, breuesq;: ac uelut decurtatæ etiā hæc. Nam summa, quæ est crassissima, Cepis similis, canibus tantū purgandis idonea est. Veteres radicē, corticēq; carnosissimū eligebāt: quo tenuior eximeret medulla. hanc humidis spongijis operā, turgescentēq; in longitudinē sindebant, deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes: nūc ramulos a radice sua grauissimi corticis ita dantes. Incidit forficulis Elleborū, & cribratur. Cortex remanet. Hoc submoto, medulla cadit. Albū optimū, & quod celerissime mouet sternutamentū. Sed multo terribilius qđ nigrū. Durare uim utriusq; triginta annis putant. Necantur albo muscæ trito, & cum lacte sparsa. Galli sagittas in uenatu tingūt Elleboro, circūcisq; uulneribus teneriorem sentiri carnē prædicant. Herophilus, Elleborum fortissimo duci æquabat. Concitatis em̄ intus oibus, ipsum imprimis exire. Ideo errauisse antiquos, parcius id præbendo, cum celerius erumperet, qđ largius daretur. Reddi post quatuor fere horas incipit, totū opus septenis absoluitur. Nigrum equi, boues, fuesq; cauent, cum impune candido uescantur.

E X M. V E R G. C O M M.
Quibus hæcenus nihil auditum de Veratro fuerit, pigeatq; Plinium & Theophrastum legisse, paratus cunctis Barbarus erit, collectis, & in Corollarium suū reuocatis, omnibus antiquorū de Veratro obseruationibus & dictis. Etsi tam notā medicinæ res modo sit, ut nulla noua cōmentatione indigeat. Rarum ubiq; nascitur Veratrum: aliquot locis tamē abundat; nec difficile cognitu est: discrimen coloris in radice præsertim.

ἐλλέβορος μέλας

De Veratro nigro. C A P. CLII.
Elleborum nigrum, aliqui Melampodion uocant, alij Ecstomon, alij Polyrhysion, alij Protion, alij Melanorrhysion, alij Cyranisō, Magi Zomarition, Aegyptij Isæam, alij Elaphine, alij Cemeleg, Latini Veratrum nigrum, alij Saraca, Daci prodiorna. Appellatur Melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Melampus, furētes in se Procti filias, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei uiridia, Platani similia, minora, folijs Sphondyli proxima, subaspera, pluribus diuifuris incisa:

caulis asper, flores purpurei, racematim coherentes, semen Cnici, quod in Anticyra Sesamoides uocant. Quo deiectiones moluntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, a capitulo Capæ simili confibratis. Quorum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimū est quod ex quibusdā petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq; Cuiusmodi est Elicone, Parnaso, & Aetolia natum. Attamen Eliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem. Detrahit bilem, pituitasq; datum per se, aut cum scamoniam, & tribus obolis, siue drachma salis. Decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus & resolutis. Menses inditum trahit. Partus necat. Purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item cōtra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum, aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera & pice, & cedrino oleo. Vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur. Dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur. Hydropicorum uentri utilissime imponitur, factum ex eo farina hordeacea, & uino cataplasma. Confitum proxime radices uitiū, uinum purgandi facultate donat. Huius resparfu domos expiari arbitrantur. Quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiūq; precantur: ac uitant Aquile uolatus. Aduolare enim non sine periculo tradunt. Namq; si auis effossionem Ellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet. Quoniam odore caput aggrauat. Quapropter ad id arcendum fossuri, Allium præsumere, & uinum bibere consueuerūt. Nulli ira noxæ opportuni reddunt. Veratri albi mō emedulla.

BARBARI COROLL.

Elleborum nigrum sunt qui Ectomon Melampodion uocent. Hippocrates certe haud aliter fere q̄ Ectomon appellat Veratrum ipsum, præcipueq; nigrum. Porro Melampodion idcirco dicitur, quia Melampodem inuentorem habeat: quem alij diuinationis peritum, alij pastorem fuisse tradunt: & furentes Proeti filias Elegē, & Celanen dato caprarum lacte, quas Elleboro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia, prope fontē Clitorium. Caulis ei similis cādidus. Folia, ut Theophrastus quodam loco tradit, etiam Laurinis similia. Vbiq; prouenit. Religiōse hoc colligitur. Nam & gladio circumscribit, & ad ortū spectat q̄ eruit, precat, ut id liceat sibi concedentibus Dijs facere. Veratū & nigrū, & candidū ex Anticyra cōmendant scriptores, & poetæ. Anticyra uero hæc in Locride, siue Phocide sita est, ut scribunt Pausanias & Strabo. Nam & aliubi legit Anticyra, hoc est sinu Maliaco, & prope montem Oetam: ubi Elleborus quidem præstantissimus, sed in Phocidis Anticyra melius paratur admistione, ut inq̄t Strabo, Sesamoidis, de quo statim dicemus. Propterea in Phocidis Anticyram, non in Oetæam Elleborum poturi secedebant.

EX M. VERG. COMM.

Quæ in extremo capite fabulosa, & ad augendam rei admirationem potius q̄ medicinae aut historiae Veratri necessaria a Diosco. referuntur, omnia ex Theophrasti, s. de plantarum historia uolumine, paucis mutatis repetita sunt. Et si ab eo in ista, id est, adiecta, & ob id falsa uideri omnia hæc dicantur. Longiores in opere hoc nostro, præsertimq; in re nota eri-

Pli. li. 25. ca. 6.
The. li. 9. ca. 10
& u.

Strabo. lib. 9.

Cmus, si ex eo scriptore cōmentationibus his nostris addere ea uoluerimus. Satis sit græcarum literarum peritis locum in Theophrasto signasse: ignaris uero Plinium lib. 25. capite quinto au dire, eadem illa omnia hīdem fere uerbis narrantem. Quæ licet plura, nec penitus eadem huius scriptori uideantur, non ideo tamen ex uarietate uitium suspicari oportebit. Aliter em̄ hic herbariam, q̄ illi fabulosam historiam docet.

σισαμίδης

¶ De Sesamoide magno. CAP. CLIII.

Sesamoides magnum, aliqui Sesamiten, alij Sesamin, alij Lycoscyta-
lion, alij Anticyricon appellant, quoniam in Anticyra albo Verat-
tro in purgationibus misceatur. Simile est Senetioni, aut Rutæ longo
folio, flore candido, radice gracili, ignaua, gustu amaro, cætera Sesamæ
simile. Ventrem purgat. Datur tritum ad bilis pituitæque deiectiones,
quātum tribus digitis capitur, addito Veratri albi sesquibolo ex
aqua mulsa.

Pli. li. 22. ca. 25

BARBARI COROLL.

Sesamoides maius, a similitudine nomen accipit. Hoc nascitur in Anticyra, nec alibi, quod
inuenerim. Hoc & Elleborum a Theophrasto dicitur: ut in candido norauimus.

EX. M. VERG. COMM.

Sesamoidi quemadmodum uox, & præter uocem hic ipse scriptor, Pliniusq; testatur, nomē
Sesami similitudo fecit. Neq; enim Sesamoides aliud, q̄ quod Sesami speciem & figurā habet
significat. Pliniusq; Sesamoides a similitudine nomen accepisse ait: & hic σισαμὶ ὁ ποτεν ἐν ὀνόματι
id est, semen Sesami simile habere. Duorum generum præter Diosc. autore eodem Plinio, & in
græcis Paulo Aegineta, planta hæc est. Siquidem Plinius cum primum descripsisset genus li-
bro. 22. cap. 25. subiecit statim, Est etiamnum aliud Sesamoides. & c. Paulus uero Aegineta co-
lore candido alterum indicans, suas illi uires assignauit: mox alterum maius appellans Vera-
trum passim uocari ait. Nec dubitandum, tam certa ueterum scriptorum testimonia sunt, duo
Sesamoides esse. Vtq; hoc constat, sic contra parum certum est, sint ne eorū in colore, an in ma-
gnitudine discrimina. Antiquissimi græcorum codices, quos uidere licuit, colore discernunt:
uocantq; prius hoc μίλαν, id est, nigrum, posterius λευκόν, id est, candidum. Qui uero passim cir-
cumferuntur, a magnitudine & breuitate notas & discrimina eorum ostendunt, μίλα καὶ μικρόν,
id est, magnum & paruum appellantes, Paulus Aegineta alterum λευκόν, id est, candidum: alter-
um μίλα id est, grande & maius uocat. Contrariorum tamen ratio exigebat, ut si candido colo-
re alterum signaretur, nigro alterum e diuerso indicaretur: quemadmodum in quantitate factū
in alijs codicibus est: in quibus grande primū, mox breue Sesamoides describitur. Pendemus
q; nos in ea re animo: tam facilis & lubricus lapsus in græcis est, unius tantum literæ mutatiōe
ex nigro ad magnum: et e diuerso, μίλαν nigrum, μίλα grande græcis significat. Receptoq; in pri-
mo Sesamoide semel huiuscemodi uitio, facilis in secundo error fuit. Potuitq; hoc & in Dio-
sc. & in Paulo Aegineta pariter fieri. Egre enim persuademur, proposito candido, non reddē-
dum illi fuisse nigrum. Et si recipienda a colore discrimina hæc fuerint, ratiocinari tunc oportet
bit, qua parte colores illi in alterutro Sesamoide inueniendi sint. Quod difficillimum erit. Ob
eam causam inclinat animus nohis in alteram partem: probamusq; ex magnitudine magis q̄
ex colore in Sesamoide sumi discrimina. Duplicem enim colorem illum, Veratri exemplo tri-
butum Sesamoidi fuisse ex eo opinamur: quod quemadmodum duplex Veratrum est, candi-
dū. s. & nigrū, pmiscueq; Sesamoides Veratrū, & Veratrū Sesamoides, ob eā quā mox dice-
mus causam, quondam diceretur: sic etiam ab imperitis rei, creditū fuerit, candidum & nigrū
oportere Sesamoides dici: Non quatenus diuersa a Veratro herba Sesamoides est, sed quod
illi ob promiscuum ex usu nomen eadem esse credebatur. Fuisseq; usum Sesamoidis in purga-
tionibus Veratro coniunctum, indicant fere omnes. Hic primum dicens. ὅτι δὲ ἐν ἀντικύρῳ ἰλλικό-
ρον καλοῦσι διὰ τὸ μίγνυσθαι ἐν ταῖς καθάρσεσι τὸ λευκὸν ἰλλικόρω. Quod est, Qui autem Anticyram in-
colunt, Elleborum Sesamoides, q̄ in purgationibus candido Elleboro misceatur, appellat. Idē
testatus & Plinius est li. 25. cap. 1. In Anticyra insula tutissime sumitur: qm̄ ut diximus, Sesamoi-
des admiscet. Testatus & Strabo. s. Iuxta geographicū uolumine, in descriptione Thessaliæ, pri-
uatimq; Anticyræ, quo loco sic de Elleboro agit. Postea Anticyræ, quo nomine & alia est ad si-
num latens Maleacum & Oetam montem, illic mitem Elleborum nasci ferunt, Hic autē opti-

me preparatur. Quo circa frequentes huc aduenæ confluunt, purgationis & curationis gratia. Etenim in Laconica pharmacum nasci quoddam Sesamoides semini per se simile, cui permixtum preparant ceterum Elleborum. Paulus Aegineta tamen certior eius rei causam in. s. attulit. Cuius uerba hæc sunt. *επισκευάζει τὸ μέγα ὄπκι καὶ ἄοτιον ἰαχέρος ἀνόμενι διὰ τὸ ὁμοίως ἰαχέρος καθαιρεῖν αὐτὸ τὸ ὄπκιμα.* Quod est. Sesamoides maius, quod palam Elleborus nominat: quia semen eius pariter Elleborum purgat. Ex his ratiocinari facile est, diuersam a Veratro Sesamoides herbam esse: & quia misceretur illi in purgationibus, aut easdem habet vires, Elleborum creditam a multis fuisse: ideoque nigri & candidi, utriusque Veratri modo discrimina ab imperitis inuenisse: sui generis tamen herbam, & quia Sesamo simili semine sit, Sesamoides appellatam.

De Sesamoide paruo.

CAP. CLIIII.

Sesamoides paruum, aliqui Coronion, alij Sesamon sylvestre uocant. Cauliculi ei sunt dodrantes, folia Coronopi, minora, hirsutiora, & in cauliculorum cacumine capitula florum pene purpureorum, medio eorum albo. Semen Sesamæ fuluum, amarum, radix tenuis. Detrahit bilem, pituitasque semine ex aqua mulsâ potum dimidio acetabulo. Illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

ARBARI COROLL.

Sesamoides minus, folio minore quam Sesami. Nascitur in glareosis. Hoc & Sesamoides candidum, a Galeno dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Superest pro Sesamoide dicendum quod superiore capite imprudenter relictum a nobis est. Nasci Sesamoides in Anticyra. Ideoque ut hic, & Plinius dixerunt Anticyricon uocari. Quæ etiam causa fuit, ut in rei æstimatione miscerentur ab imperitis Veratrum, & Sesamoides: quoniam idem natale solum haberent. In quo uidendum diligentius erit, quoniam duæ Anticyræ quondam fuerunt: altera Phocidis urbs, altera in Maleaco sinu insula, utroque Sesamoides hoc nascitur. Ex antiquis enim scriptoribus plures ad purgationes Veratro faciendas insulam magis laudauerunt in Maleaco sinu, quam in Phocide urbem. Alij in Phocidis Anticyra tutius sumi Veratrum dixerunt: quoniam Sesamoides hoc illi admisceretur: manifesto argumento, in hac, non illa Anticyra nasci Sesamoides. Animaduertendum & illud, miscere Plinium utriusque Sesamoidis historiam & medicinam: & quæ alterius sunt, alteri tribuere. Quod nominis similitudo, & æquiuocum eorum appellatio uidetur fecisse. Locus est. 22. uolumine, capite. 25. In cuius rei indicatione locus in eo scriptore corruptus adhuc est, granum Sesamæ dari dicens in uino dulci, ad detractiones quantum trinis digitis capiatur. Sesamoides enim, non Sesamæ legendum autore Dioscoride illic est: a quo cuncta illa Plinius accepta latinis reddidit. Poterunt uolentes utriusque scriptoris dicta inter se conferre.

De syluestri Cucumere.

CAP. CLV.

Syluestre M Cucumin, alij Elaterio uocant, alij Grynion, alij Balin, alij Syncrisin, alij Bubalion, alij Scopion, alij Pherombron, alij Peucedanon, alij Notion, Romani Ancetum, alij Agrestem, Poeni Cusimezar. Fructu solo distat a fatiuo Cucumere, longiore minorem pariens fructum, oblongis glandibus non dissimilem. Folia atque sarmerta fatiui refert, radice candida, magna. Nascitur in sabuletis, & prope domicilia, frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem tumorem discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Ischadicis infunditur. Podagras discutit, decocta ex aceto & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras, & uirilgines abstergit. Nigris cicatricibus colorem reddit. Et in facie

Y η

D I O S C O R I D I S

C maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deiciunt, præsertim in hydro-
pici. Deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis seli-
bra, præsertim in uini Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni
cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Cucumere syluestri, siue anguino, & erratico dictū in satiuo est. Illud hoc loco memine-
rimus, Balidem a quibusdam uocari, ut inquit Dioscorides, anguinum Cucumerem. Ego Ba-
lin, & Balidem lego dici florem quendam, & alio nomine Ballithum: qui mortuos uitæ restitu-
at: ut & de Arione fabulantur. Phorionem habeo grammaticum, qui hoc affirmet post Pliniū,
demonstratam a dracone, qui ea herba catulum sibi occisum reddidit salui. Cucumerem syl-
uestrem Bubaliō quoq; dici, autores sunt Dioscorides, & Hippocrates. Est ubi Caprificum ita
dici legas: errore nato, q; Caprificus agria, Hyce appelletur. Sylvestris uero Cucumis Agrioli-
cys. Alius q; flos habetur, Bellis nomine, pratenlis, & candidus, & quadatenus rubēs, aduer-
sus strumas efficax: ut Plinio uidet. Sit autē Bellis idē, q; & Bellius, siue Bellio, & ipse flos praten-
sis, quem Plinius quinquagenis gnis barbulis pastillicantibus Coronatum scribit, animaduertē
dū puto. Quāq; em luteus uidet a Plinio describi Bellio, uolumine primo, & 20. Bellis uero cā-
didus sexto & uigesimo, non tñ ita in omnibus Plinianis codicibus luteū eū esse legimus. Qui-
dā luteū ei semen, nō ipsum florē audiūt: & Paralyfin uulgo dictā interpretant: q; & primus ueris
flos, & Margarita cognominatur: & hyeme q; tota nascit, ex occidente, ut qdā existimant, in
Italiā conuectus. Quinquagenas tñ ei ternas, non gnas barbulas inuenio. Laudat ad paralyfin,
a quo & nomen: itēq; ad podagras, & Ischiada. Paralyfi uocatæ florem habet simile, pauciori-
bus tñ barbulis. Flos, qui qm a lōginquo conspicuus est, Paradelos uulgo dicitur: folio em nō
admodū diuerso: nisi q; serratū est huic, non Paralyfi. Sunt q; Bupthalmō, & Bouis oculū ap-
pellent, nam q; Antipatrē uulgo dictū renē eū esse, ligdo fallunt: cū sit Antipater furculosus, &
flore luteo, quasi Cunilaginis minore. Folia Roris marini latiora, minusq; longa: Christophori-
anā, & Oculū Consulis nōnulli uocant. Huius illa pprietas, q; flores post nascentes altius tol-
lunt, q; prius nati. De cuius rei argumento uideri posset aliquibus, hanc herbā esse quam Plinius
Impiā nocari tradit. Herba ingt Impiā uocatur icana, Roris marini aspectu, thyrsi mō uestita, et
capitata. Inde alij ramuli assurgunt, sua capitula gerētes. Ob id Impiā appellauere: qm liberi su-
pra parentem extollant. Alij potius ita appellatā, q; nullū animal eā attingat, existimauere. Hęc
inquit inter duos lapides trita feruet, p̄cipuo aduersus anginas succo. Nec tentari unq; eo mor-
bo qui gustauerint: itaque & suis dari. Quæque medicamentū id noluerint haurire, eo mor-
bo interire. Sunt qui & in auiū nidis inferi aliquid ex ea putent: atq; ita non strangulari pullos
audius deuorantes. Hęc Plinius. Cæterū quāq; similitudo in ea proprietate sit, multa sunt in
ter utrāq; discrimina. Primum, q; Impiā, incana est herba: Antipater non est. Alterum, q; trita
non feruet. Tertium, q; nec capitula, nec thyrsos gerit, sed flores dumtaxat.

De Elaterio. C A P. CLVI.

Elaterium

E Fructu huiusce Cucumeris, fit medicamentum quod Elaterium
uocatur, ad hunc modum. Decerpti Cucumeres, qui tacti protē-
nus exiliunt, seruantur nocte una. Postridie imposito supra craterem ra-
riore cribro, utrisq; manibus præhensi, sigillatim supino cultro sursum
uersus aciem habente finduntur, atq; per cribrum humor in subiectū
uas exprimitur. Simulq; carnosum quod hæsit cribro, quo facilius ex-
cidat eliditur, quod ita pressum est, residere sinitur, atq; in uicinam pel-
uim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua per-
funduntur, & denuo pressa, abijciūt. Humor in pelui agitur, & lin-
teo opertus, soli exponitur. Dumq; steterit, tota supernatans aqua, cum
humore concreto effunditur. Hoc uero identidem fieri solet, donec ex-

A istens aqua liquecat: qua stillatim exhausta sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam pituitus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & mediū cauātes, triplicatum linteū obtendant, per qd Elateriū cum sua humiditate diffundūt, siccatiq; in pila ut dictū est, cōterūt. Alij p dulci aqua marinam perfundētes, ita eluūt. Alij in nouissima lotiōe, mulsam aquā respergunt. Elateriū optimū esse constat leue, nō pōderosum, cū cādore leniter humectū, gustu amarissimum, quodq; lucernarū luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen, scabrumq; si turbidum spectetur, atq; erui cinerisq; plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui Cucumis succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chalci duo. Si quidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam alterutra parte extrahit. Optima suspensio est purgatio. Quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij, quod colorare sufficiat, ex aqua erui magnitudine catapotia dato: postea cyathus unus aquæ tepidæ sorbeat. Ad citandas tamen uomitiones, aqua diluens Elaterium, subiectas linguæ partes penitissime pinna oblinito. Quod si quisq; difficiliter euomat, oleo, aut unguento irino resoluito. Somnum inhibeto. Porro his qui eximie uacuantur, continue uinum & oleum dari conuenit. Etenim uomendo restituuntur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Partus enecat in pello subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Diuturnis capitis doloribus liberat. Efficax anginarum unguentum est, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

BARBARI COROLL.

Elaterium, Theodorus Agitatorium conuertit. Nullum medicamentum longiore æuo durat. Ducentum enim aīos uim eius pollere Theophrastus asserit. Melius, quo uetustius usq; ad quinquagesimum. Lucernas adhibitum extinguit. hoc enim ueri probatio est: si prius q̄ restinguat, scintillare sursum, ac deorsum cogat. Pallidum prestantius, ac leuiter amarum. Huius causa maturius secatur. Alioquin semen exilit, oculorum etiam periculo. Harūidine ueteres incidebant. Tradūt hoc succo tactis radicibus uitium, non attingi uuas ab auibus. Ad hunc succum Cucumis Anguinus autumnō carpitur.

Pli. li. 20. ca. 11.

De Satiuo Cucumere. CAP. CLVII.

Satiui Cucumeris trita radix, & drachmæ unius pondere pota in hydromelite, uomitus ciet. Si quis facile secundum cœnam uomere uelit, binis obolis sit contentus.

De Staphide agria. CAP. CLVIII.

Staphida agriam, alij Triphyllon, alij Stefion, alij Astaphida, alij Phthiroctonon, alij Phthirion, alij Apanthropon, alij Polyides, alij Pseudopathes, alij Arsenoten, Aegyptij Ibesaceden, Romani hærbā

staphis agria

Y ij

C Pediculariam uocant. Folia habet Labruscæ, diuisa, et cauliculos rectos, molles, nigrosq. Fert florem Glaſti, & folliculos uirides, ſimiles Ciceri, & in his nucleum triangulum, ſcabrum, ex nigro ſubfulueſcentem, in- tus album, guſtu acrem. Grana quina denaue, ſi trita in aqua muſſa de- tur, craſſum humorẽ per uomitum purgant. Sed qui hauſerunt, am- bulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam muſſam potui dare. Quoniam pericula ſtrangulationis inferunt, & fauces adu- runt. Trita, & ex oleo illita, phthiriali prædeſt. Item prurigini et pſoris. Cit plurimã pituitã cõmanducata. Decoctã in aceto, dentiũ dolori col- luto ore ſubuenit. Rheumatĩſmum gingiuarũ ſiſtit. Vlcerã oris manan- tia, cum melle ſanat. Vrentibus malagmatiſ imponitur.

Pli. li. 23. ca. 2.

B A R B A R I C O R O L L.

Staphis, ſiue Aſtaphis agria hæc eſt, quæ Pituitaria quoq; dicitur. Cornelius Celfus uuam Taminiam intelligit falſo. Matureſcit enim ſemen huius cum uindemia, nigrefcitq; cum Ta- minia acini ruſcant, & in apricis naſcatur: & Ampelos agria ſit, non Staphis agria. Hæc nõ niſi i opacis. Paulus Galenũ ſecutus, duplex genus facit Staphidis, Satiũ, et Sylueſtre: ut Sati uum ſit, quã nos Vuam paſſam uocamus, qnto uolumine reddendã. Aſtaphin, qui Atticelo- quuntur, Oſtaphin uocabant: ſicut Ominthã pro Minthã, ſiue Mẽthã: & Oſtacũ, p Aſtaco. Eſt aut Aſtacus is, quem nos Gamarum quoq; dicimus. Porro eſt locus in Aetio ubi legas, Stepha- nida agriã mendofe, ut ſuſpicio, pro Staphide agria: qm ad uitia, pſoraſq; capitiſ cõmendat eã. Niſi quis Stephanida putet eſſe, quam a noſtris Coroneolam uocari diximus, hoc eſt, Cynof- baron: utiq; ſi & hæc, ut Rubi manantibus in capite præſidio eſſe poteſt.

VERG. D

Quam græci agrian Staphida, ſylueſtre paſſam Vuã ſua uoce intelligẽtes dixerũt, Romani Taminã uuã, Pedicularẽ herbã, Pituitariãq; uocauerũt. Eſt Plinius contra Celfum aliã a græcoꝝ Staphidagria Taminiam latinoꝝ uuã eſſe teſtatus hiſ fuerit. Eſt ſane græciſ Staphis, & ut Athenieſes dicere cõſueuerũt Aſtaphis paſſã Vuã. Ex cuiuſ ſimilitudine hæc ſyl ueſtri tũ habitu ab ea diſcreta eſt. Vocarũtq; laũni Pituitariã, Pedicularẽq; ex uirib, quas habet. Feruore em ſuo cõmanducata multã pituitã trahit; & erũpentibus e corpore pediculũ, ex oleo inũcta aduerſat. Quinetiã, ut Plinius ait, in aceto decocta, etiã ueſtes eo tedio liberat. Faciliſ co- gnitu herbã, tã certis notis a Dioſ. deſcribit: parũq; a græca uoce deſlexa appellatiõe, gẽs noſtra adhuc eã indicat. Folia habet plerũq; ſeptẽ, aliquĩ tũ pluribus, nõnunq; etiã pauciorib, incifuris diuiſa. Vtebant ea ueteres græcoꝝ medici in alia in hiſ q Venerẽ exercere nõ ualerẽt, ex adipe, cui uuã huius admixtũ ſemẽ fuiſſet, genitalia inungi iubẽtes. Vtebant & in purgãdo capite, cõ manducandã dantes: eaq; ratiõe pituitas eiũs partiſ p oſ trahentes. efficaciffime em acrimonia eſt. Plinius, quẽadmodũ pmonſtrauimus, falſo Taminã uuã. 23. uolum. ca. 2. hiſ uerbis uocari ait. Aſtaphis agria, ſiue Staphis, quã aliq uuã Taminã uocat falſo. Suũ em genus habet. &c. Idẽ. 26. ca. 14. Taminie uuẽ uires deſcribẽs, quẽ Staphidagriẽ ſũt palã illi tribuit. Verba eiũs ſũt. Itẽ Phthiriaſi, qua Sylla dictator cõſumptus eſt. Naſcunt q; in ſanguine ipſo hominiſ anima- lia, excuſura corpus. Reſiſtũt uuẽ Taminie ſucco, aut Veratri cũ oleo perũctis corporibus. Tami- nia qdem in aceto decocta, etiã ueſtes eo tedio liberat: quẽ oĩa ex ui Staphidagriẽ huiũs dicta ſunt: qua pediculos enecantẽ, & Pedicularẽ dici in Dioſ. legĩt. Monere legentes hoc tũ uolui- mus, ut inueniſſe & ipſi conent, an de eadẽ uuã Taminia a Plinio duob, locis diuerſe tradiũt fue- rit. Cur aut Staphida potius. i. paſſam Vuã, q Staphylẽ. i. ſimpliciẽ uuã ueteres græci dixerint, folliculoꝝ figura fecit: qui rugoſam uuam magis q; integroſ uuarum acinoſ referunt. Ob quã cauſam & Plinius ait, folliculoſ magis q; acino� eam ferre.

De Thapſia. C A P. CLIX.

Thapſiã aliqui Hypopion uocant, aliĩ Pancranon, aliĩ Scammo- nion, aliĩ Thelyterin, Romani Ferulaginẽ, aliĩ Ferulam ſyl- ueſtrem, Poeni Boeden. Nomen ideo accepit, quod in Thapſo eiũſde nominis inſula, primũ inuenta ſit. Tota uero natura Ferulæ ſimiliſ eſt,

A graciliore caule, folijs Fœniculi, umbella Anethi in cacumine a singulis furculis erumpente, flore luteo. Semen quale Ferulæ, latum, sed aliquanto minus, radix nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita. Lactis extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu serobe, cortices inciduntur, aut radix in fornicis speciem excavata, cooperitur quo merus succus confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus, fictili crasso insolatur. Aliqui folium una terunt, Sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest. Quoniam qui ab radice manauit grauius olet, & humidus permanet. E folijs autē extractus exiccatur, atq; teredinū iniuriam sentit. Qui succū colligit, stare debet nō obuersus uento, cum dies apricus est, & a flatu fileat. Quoniam ob uaporis acrimoniam facies uehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulæ. Ob id prius liquido cærato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radicis, q̄ succus, purgandi uim habent. Lacteus succus in aqua mulsa potus, utrinq; bilem extrahit. Radicis modus quaterni oboli, cum tribus seminibus Anethi drachmis, succi terni oboli, lactis obolus unus. Quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiriosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq;. Datur in cibis, aut obsonio, quibus difficile sit uomere. **B** Tam radix, q̄ succus, omniū maxime quæ pares cū eis uires adepta sunt, uim habent transconcretiuam, ubi ex imo aliquid euocandū est, aut meatuum laxitas alio transferenda est. Vnde succus illitione, & radix recens affricu, alopecias explent. Radix, succusq; cum æquis cærae thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt. Sed non plus binis horis dimittantur. Locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle illitus. Lepras tollit. Tubercula discutit, perunctus cum sulphure. Succus in diuturnis pulmonū, laterum, pedum, articularūq; ualitudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colic glandem, ijs qui natura, non circūcisione curti sunt. Tumorem enim excitat, qui pinguium foru emollitus, in pene iacturam refarcit.

T **B A R B A R I C O R O L L**
Thapsiæ liquor expressus, efficacior q̄ semen. In Africa uehementissima hæc est. Semen Ferulæ, Thapsiam aliqui uolebant esse falso. Suum enim genus est inani caule, nec excedente baculi longitudinem. Thapsia ob humoris abundantiam opus suum, ut Galenus auctor est, sero perficit. Facile corrumpitur. In Theocrito poeta Thapfos legitur, genus herbae, tingendis lanis utile: qua & capillus flauescat. Hanc & Xylon Scythicon, hoc est, lignum Scythicum, a Sappho dici putant, uulgo Chrysoxylon. Diuersum porro, an idem sit Thapfos quod Thapsia, iudicandum relinquo. In Aristotelis tertio Rhetorico. Hypopion, sunt e Græcis, qui pro Thapsia, uel alia herba capiant rubente. Nos pro sugillatione uertimus.

Pli. li. 19. ca. 9.

C **E X M. V E R G. C O M M.**
Cognomines diuersis locis Thapsi urbes, insulæ, Chersonesiq; aliquot Thapsiæ huic quā modo tractamus ab earū aliqua primo quondā sic appellatæ, diuersos natales & diuersas bonitates laudis fecisse uidentur. Nicander in Theriacis suis ex Sicilia Thapsiam in primis contra

Y iiii

C uenata laudauit. γυν δ' ἀντροί, ἐπὶ μὲν τὰ νόσων ἀλκμήναι λέξω, θρηναρίων δὲ ῥίαν ἰλὺν γυναιδία ἐλθόν μίξαι &c. Quod est. Nunc age, composita te malorum remedia docebo. Trinacriam sumito Thapsi radicem, quæ corpori medetur, &c. Plinius contra. 13. uolumine, capite. 12. Thapsiam in Africa uehementissimā esse ait. Hic scriptor, quæ plures alij secuti sunt, in Thapso insula primū inuentā fuisse ait: nec bonitatis, maiorisq; in ea efficacix discrimina aliqua numerauit. Ex eo fit, ut credamus primā Thapsix inuentionē Thapso, quæ una ex Sporadibus insulis est, deberi: & in ea herbario Crateix, qui primos illic plantam, & eius uires obseruasse dictus est: potuisseq; alios ex alijs locis eam potius laudare, q̃ natale solum Africam, Siciliamue, aut alia loca illi assignare. Hanc ueteres Græci Hypopion uocarunt: ancipiti (nisi uirum in Theophrasto sit) & rei, & nominis significatione. Pro qua intelligendum est, significare græcis Hypopion, cui in ultima syllaba, i, non, y, fit, sanguinis ex ictu suctuue, aut insuria aliqua alia, in quampiam corporis partem concursum, integræq; cute in eo loco cessantem, & q̃ extra uenas sit, quali mortuum. Auditaq; Hypopij huius uoce, nihil aliud Græci intelligunt, q̃ cessante sanguine nigrescentem cutem. Nec dubium est his mederi Thapsiam: & ab eo remedio nomen id factum illi esse. Si quidem hic ait, ὑπόπια τε ἔρι καὶ περιώματα. Quod est. Hypopia & liuores delet. Et Plinius rem augens, eodem libro & capite ait. Nero Cæsar claritatē ei dedit initio Imperij, nocturnis grassationibus uerberatā faciem illinens sibi cum thure cæraq; & sequenti die contra famā cutem sincerā circumferens. Solus Theophrastus libro, 9. de plantarū historia aliter Hypopia quibus ea medetur intellexisse creditur. Verba eius sunt, ἡ δὲ τῆς βαφίως ἑμετικῆς, ἰδὲν δὲ τῆς νεφελῆς καὶ αἰνῆς καὶ κἀτω, ἀνιτάται δὲ καὶ τὰ περιώματα ἔξαιρει. ὑπόπια δὲ ποτὶ, ἀλλὰ ἰδιονομα. Quorum sensus est. Thapsix aut uomitoria uis est. Quod si quis eam retinuerit, per inferna pariter & superna purgat. Facit & Hypopia, uerū tamen candida. Ex his (nisi uirum in eo scriptore sit) maculas quæ in cute albicant, Hypopia intellexisse oportet. Nec enī significare aliud potest, q̃d dicit, Facit & Hypopia, uerū tamen cādida. Estq; hoc q̃d paulo ante diximus ancipiti, id est, ad utraq; partem significatione Hypopion uocari Thapsiā potuisse. Et si recipiendū in Theophrasto id est, ad aliā Thapsix naturā referenda res erit, ad pallore scilicet a quo Thapsinus color in Phocione a Plutarcho dictus est. Et a Theocrito in Pharmaceutria, καὶ μὴ χρώς αὐτοῦ ὁμοῖος ἵππῳ το πολλὰν βαφῶν. Quod est. Et corpus meū Thapso simile factū est: nulla alia q̃ pallores significatione, qui color Thapsia fiebat. Consueueratq; ueteres, ad excusandā ualitudinem corporisq; morbos, non aliter, nec alio euctu q̃ cymino Thapsia se inungere. Poruitq; Theophrastus Hypopia candida pallores Thapsia factos indicare. Quod legenubus significasse satis sit. Et si sciamus Theocriti interpretes, & alios græcorū scriptores Thapson Chrysosylon, id est, aurei coloris lignū, non herbā hanc interpretari solitos. Scāmoniū uocari ab aliquibus Thapsiam in Dioscoride legi. Verū tamen nō potuit ad Thapsiam Scāmoniū, nisi ex pari in purgādo ui trahi. Romani ex totius plantæ similitudine, quoniā ut Plinius ait, Thapsia sine dubio Ferula est, ferulaginē & syluestre Ferulā eam uocauerūt. Foeniculi folia habere eā Theophrastus dixit: uerū tū latiora: caulē ferulaceū, radicē candidā, liquore eius efficaciorē esse, per superna pariter & inferna purgare. Seminis nullū esse usum. Nasciq; Thapsiam alibi quidē, sed in Attica. Non uesti ea indigenas pecudes: peregrinas aut uesti ea qdē, sed aut perire, aut diarrhia uexari. Barbarus in colligēdo Thapsix liquore, quorundā codicū, quos & nos uidimus, fidē secutus, qd in Dioscoride passim & uerius legi, ἐκείνου δὲ τὸν συλλέγοντα ὅπου uertit, succidūt eam & tollunt: ἐν τῷ ut in illis legi, id est, radicē, non ὅπου, id est, liquore interpretatus. Nobis cōmunis lectio uerior & aptior uisa est: quoniā nulla est ad colligendū liquorem succidendā & auferendē radicis necessitas. Præterea non semel tantū, sed sæpius uerisimile est colligi posse liquore eum: & si colligendus est, ex uiuente adhuc in radice sua planta colligendū esse. Idem qd erat κνρίδῳ fiscum uertit, a quo & fiscella dicta est. Nec male quidē: nisi Fisci uox nostra ætate ad alterius rei æstimationē trāsata penitus iam pridē esset. Monemus id, ne quis discrepare nos putet. Nulla enī rei, sola uocis inter nos differentia est. Quodq; organis ille ait exprimendū radicis Thapsix succū, scriptoris huius uoces secutus, prælum, torcularue in ea uoce intellexisse oportet.

De Spartio.

CAP. CLX.

σπαρτίον

Spartion aliqui Lygon, alij Lobon appellant. Frutex est longas ferrens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uin ciuntur, semen lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens, florem ut albæ Violæ, luteum. Purgant per superna Ellebori uice, citra pericu

lum flores & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tulsis extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere. Strigmenta autem elicit cruenta.

BARBARI COROLL.

Spartum, siue Spartion Genistā nostri uocāt: fortasse quia genu modo flexilis ad nexus sit, uel quia genibus medeatur dolentibus, multiplici tunicarū cortice, sponte nascens, & quæ seri nequeat: proprièq; aridi soli iuncus, & terræ uiciū: quia nihil ibi seri, aut nasci possit, noxiū animalibus, præterq; cacuminū teneritate. In Hispania Spartum & pro fune ipso capitur: ut Merinthus, Merindusq; a poetis. Sint duo Sparti gēa: Vnum quod Genistam uocamus, Alterū quod in Hispania, & Africa funibus nascat, leucea, siue lygea potius dictū ab Athenæo, dubitauit ante nos & Plinius. Dioscorides certe eum Sparton dixit, Genistā uidetur intelligere: cuius florē in coronas addebant, Apibus gratissimū. Semen quoq; ipsum, Græci Sparton eodem nomine appellant. Asia e Genista facit lina piscatoria, egregie duranta, frutice madefactio decem diebus: hac & uites alligat, ut Galenus inquit. Sparti quidē usus, multis post Homerū seculis institutus uidetur: quoniam cum Sparta dissoluta dixit, significauerit potius, lata. In agro Thebano copiosa: ut Varroni, Plinio, & Gellio quoq; placet. Nec ante Pœnorū arma, quæ primum Hispaniæ intulerūt, & cū fuitiles fierent naues: uel Loro, ut in Liburnia: uel Canabo, & Stuppa, ut in Græcia, non Sparto futas esse constat. Serilla certe, nauigiū est histricū ac liburnicū, a conferendo nomē habens: quia Lino Spartocq; stipat, ut Pacuius cum dixit,

Pli. li. 24. ca. 9.
lib. 19. cap. 2.

Sparteis futa serilibus, qui Sparto cōserant, auctor Pompeius Festus. Idē Napurās, funiculos funiculos intellexit, qui Sparto cōserant, auctor Pompeius Festus. Idē Napurās, funiculos ex stramētis uocari tradit. In Africa exiguit, & inuile gignit. Carthaginēsis Hispaniæ citerioris portio nō tota, sed quatenus parit, mōtes quoq; Sparto operit. Hinc strata rusticis eorū. Hinc ignes facesq; hinc calceamina, & pastoz uestis. Ad reliqs usus laboriose uellit in hyemē uix. Facillime tamē ab Idibus Maijs in Iunias. Hoc maturitatis tēpus. Ager unde colligit, minus triginta passuū in latitudine patet, a litore Carthaginis nouæ, minusq; in longitudine. Longius em uehi prohibent impendia. Ideo Spartū aliter etiā diuulsum, natura interpolatur, rursusq; q; libeat uetustū, nouo miscet. Sparto nihil fere utilius nauitū armamētis, machinis ædificatorū, alijsq; desiderijs uitæ: inuicū in aquis, & mari: sicut in sicco, funts e Canabe.

EX M. VERG. COMM.

Vulgarem Genistam passim & incultis locis nascentē, cuiusq; in re rustica ad nexus quotidianus usus est, nō Hispaniæ Spartum descripsisse hoc capite Dioscorides uidetur. Quas em Sparti huic breues, sine folijs uirgas, & natiuo lentore infragiles, quaz in ligandis uineis usus sit, phaselorū figuras siliquas, & in his lenticulæ semen, luteumq; leuciorū colore florem scriptor hic tribuit, integrā Genistarum quas diximus, & iconiā imaginē ostendunt. Nec nos in re alioquin ex scriptoris huius descriptiōe satis certa suspicari, miscere uel aliquid audemus. Et sciamus, a Plinio. 19. uolumine, capite. 2. Spartum aliter descriptum: & medicinā remediāq; omnia, quæ hoc capite a Dioscoride docentur, Sparto, non Genistæ, cui debebantur. 24. uolumine, capite nono ab eodem tributa fuisse. Res enim nos sequimur, & quæ in antiquis scriptoribus uaga aut ambigua sunt, ad certam, quatenus licet, significationem contrahere conamur. Credimusq; ex his quæ in græcis latinisq; diu obseruauimus, monere tuto legentes posse, duo fuisse græcis Sparti genera: quæ tamen alicuius notæ adiectione distinguerētur. Quod em in Dioscoride nunc forma diminutua legitur, nouū discriminē est: ideoq; a nobis non seruatur. Alterum quod in Hispania nasceretur. 19. uolumine, capite. 2. a Plinio descriptū: alterū quod Genistæ appellatione a cunctis latinis censet. Indicantq; qd dicimus hic ipse primū scriptor: qui intelligēs alterū esse Sparton, nullius (quod hæcenus inuenim) in medicina usus, ut certius cognosceretur, ait, quo uites ligant: eandemq; rationē secutus in. 6. Paulus Aegineta, eandem & ipse adiecit discriminis notā, dicens, *σπάρτον ὃ τὸ ἀμπλόιον ὀνομαί*, quod est, Spartus, quo uites uinciunt: nulla addendæ eius notæ necessitate, nisi alterum esset, quod æquiuoca appellatione fallere audientes posset. Estq; ex communi omnium usu adiecta discriminis nota illa. Neq; enim Hispaniæ Sparto uti omnes possunt: at Sparto quo uites ligantur, uti omnes possunt, Vbiq; em nascuntur Genistæ, & eundem inter ruris uitalia ubiq; usum habent.

B

D I O S C O R I D I S

C Quod Plinius in Hispaniensi Sparti historia nusquam testatus est. Quodque illi præcipuum ab eo tribuitur, ad funes pertinet. Totaque habet Hispaniæ Spartus, ne longiores simus, diuersam penitus a Genista historiam. Esseque Sparton Genistam præter hæcenus dicta indicat etiam Theophrastus primo de plantarum historia, Linospartum inter Polylopa numerans.

De Silybo.

CAP. CLXI.

σίλυβον

Silybum lata spina est, folia ferens Chamæleonis albi. Hæc recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus uomitiones ciēt.

B A R B A R I C O R O L L.

Silybon, aut Silybos spinosa, perinde, ut albus Chamæleon, cui est similis, ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi nascitur, coquere tanti est: ita operosa eius culina traditur. In medicina nullum Plinio usum habet.

E X M. V E R G. C O M M.

Negauit Plinius Silybi huius esse aliquem in medicina usum: maiore tamen quam hic apparatus ad eos coqui indicauit. Sigdem cum oleo & sale elixam comedi Dioscorides ait: ille uero ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi nascitur, coquere tanti esse ait: ita operosa eius culina traditur. Ex quibus rocinari illud facile est, peregrinam Italianam herbam Silybum esse, & diligentiore cura et opera coqui solitam. Qui descriperunt eam posteriores, latissimis folijs, & in folijs per extremitates lauis spinis eam tradunt. Nos in peregrino frutice, quod aliud moneamus, non habemus.

De Vomitorio Bulbo.

CAP. CLXII.

βάλανος μυρ-
φινί

Bulbus, quem Vomitorium uocant, folia habet lentiora & multo longiora cibario Bulbo, radicem consimilem, cortice nigro uetustata. Vomitiones concitat, si per se comedatur, aut eius decoctum ebibatur.

De unguentaria Glande.

CAP. CLXIII.

D

Glans unguentaria, fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine Auellanae nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido Iudææ. Præferunt plenam, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere potum absument. Cum Erui farina, & aqua mulsa, podagricis illinitur. Psoras leprasque decocta in aceto, uirilgines & nigras cicatrices cum nitro emendat. Et cum lotio lentigines, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit. Vomitiones mouet. Aluum cum hydromelite resoluit. Stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciēt. Cortex eius magis adstringit. Verum tussæ & expressæ recementum abstergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduersus pruriginem, & scabrias idonea sunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 22.

Balanus Myrepica, siue ut Plinius, et Aetius appellat, Myrobalanos, hoc est, Glans unguentaria, ex arbore fit cui folium, ut inquit Plinius, Heliotropij: ut Theophrastus (nisi librarius corrupit) Myrti: ut Dioscorides, Myricæ, diutaxat oblongius. Arbor grandis, incorruptaque, sed contorta. Unguentarij corticem glandis eius premunt, odoris gratia. Medici nucleos tundunt, affusa paulatim calida aqua, etiam si Theophrastus inutiles esse dixit. Galenus unguentarios ut scribit, expressæ carnis succo, medicis quoque utilem esse, carnem eius pro uomitorio sumentibus affirmas. Glans ea magnitudine, & aspectu Cappari, aut nuci potius Auellanae similis. Lignum robustum, usu præcipue nauali, in Arabia nascens. Syriaca dicitur, & est candida. Contra in Thebaide nigra. Præferunt illa bonitate olei, quod exprimitur, sed copia Thebaica, inter hæc Troglody

rica uillissima est. Sunt qui Aethiopicam his præponant, glandem nigrā, nec pinguem, nucleoq; gracili, sed liquore, qui exprimitur, odoratiore: nascentem in campestribus. Aegyptiam, cuius & Hippocrates ipse meminit, pinguiorem esse, & crassiori cortice rubentem, & quā in palustribus nascatur, breuiorē, siccioremq;. Ediuerso Arabicam uiridem, ac tenuiorem: & quoniam sit montana, densiorem. Longe aut optimā Petrāam, ex oppido quod uocant Petram, Plinius, & alij nigro cortice, nucleo candido. Differt a glande unguetaria: quæ nux Odorata, siue Muscata uulgo dicitur, incognita ueteribus (ut existimo) de qua in Macher.

EX M. VERG. COMM.

C Appari magnitudine figurāq; unguentariā hanc glandem comparauit Theophrastus, de plantarū historia uolumine: utiq; ea unguentarios, & ipse testatus est. Eamq; ob causam Plinius libro. 12. capite. 22. Myrobalanon uocauit, eadem eiusdem rei significatione cum scriptore hoc: qui Myrephicen Balanon eam inscripsit, q; scilicet unguentis tantū inferuiat. Diximus primo uolumine de Palmulis agentes, quod ad Balanos græcamq; Balanorū uocem pertineret, ideoq; relinquendū hoc loco quod dictum semel est, ne totiens idem repetat. Quod pro re ipsa etiā dicendum fuerat, a Barbaro undiq; collectū in Corollario eius expositū omnibus est. Iisdem em uerbis, ut erat in cunctis diligēs, ex Theophrasto, Plinioq; omnia de unguentaria hac glande reddidit: signauitq; diligenter, in quibus antiqui scriptores illi in eius historia discrepant. Nobis monuisse tantū superest, augere uateq; aliquo opus esse, ut intelligamus, quo nā modo unguetaria hæc Glans a priore libro, qui proprius illi inter unguenta aut aromata locus erat, in quartū, & ad uulgares herbas transierit: quod conijcere hætenus nobis non licuit.

De Narcisso.

CAP. CLXIII.

N Arcissum, aliqui Narcisson Anydron, alij Autogenes, alij Bulbon emeticon, alij Lirion, Romani Bulbum morbitariū. Sunt & qui ut Lilium, Lirium appellarint. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis uacuis & sine folijs supra dodrantem attolitur. Flos albus in medio, intus croceus, in quibusdam purpureus, rardix intus alba, rotunda, bulbosa, semen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimum nascitur in montibus, suauī odore. Cetera porrum imitatur, atq; hærbaceum uirus olet. Radix cocta siue estur, siue bibitur, uomitoria est. Ambustis igni prodest cum exiguo melle trita. Præcisos neruos illitu glutinat. Luxatis malecolis, diurnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposta subuenit. Vitia cutis in facie, uiriliginescq; cum semine urticæ & aceto emaculat. Cum eruo & melle ulcerum fordes expurgat. Abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

BARBARI COROLL.

N Arcisso, foliū Albucī, terræ proximū, sed latius, ut Lilio pingue, frequens, angustū caule sine folijs herbeo. Flos in cacumine, post Arcturū, & circa æquinoctiū, ac uere, item post Lilium, & Violam, Flāmeam uocatā, membrāna inclusus ceu uasculo, ampliusculus, nigricans, oblongus: qui defluens, sponte germinet: præsertimq; defixus in terrā, manu seritur & radice ampla, rotunda, carnosa. Caulis, & cum eo flos eripit, ut in Croco, anteq; folium: qd non anteq; reflorescat, cernit. Caulis cum flore suo emori. Radix Bulbo assimilis, nisi q; non est squamata. Narcissus ter floreudo, tria sætionū tempora demonstrat. In coronamenta flore ueniens, a narce, hoc est, torpore dictus, quoniam caput grauet, non ut fabulæ a puero. Plinius duo genera constituit. Vnum flore candido, calice purpureo. Alteri cetera eadem tribuit, sed calicem herbeum. Omnes inquit ferotini, post arcturum enim florent, ac per æquinoctium autumni. Duo hæc inquit genera medici præcipiūt, quasi & alia sint, quæ non recipiant, hoc est (ut arbitror) genus illud quod uere, aut æstate nascitur: ut ex Theophrasti sententiā prædiximus. Scindum porro est, cum florē eius nigrum a Theophrasto dici legimus, non de flore ipso, quē candidum esse cōuenit, intelligi, sed de semine: quod & membrāna contegi, & nigrū, ac prælongū esse constat, quo in terrā cadente, propagat se, atq; ferit Narcissum, Eumachus cyrenæus in Rhi

A

vāgnatō

B

Theoph. li. 3.

C zotomico, etiā Crotalon & Acacalida Narcissum uocari tradidit. Nā Crotos in Hippo crate, ad ulcera uetera, & uulnera recentia pbata, qd aliud sit q̄ Narcissus, nō uideo. Nisi quis Crotū pro Crotone, hoc est, Cici capiat in eo. Iulius Pollux auctor est, Theophrasti morē fuisse, Liriū pro Narcisso dicere. Homerū uero Liriū appellatione completi, florū omne genus. Narcissum ab adolescente suimet amore capto, & in eum florē conuerso, natū in Boētia Thespienses garrunt, fontē Donaca monstrātes, ubi se specularē puer stultissimus: qui umbrā suam a senesceret distinguere. Coarguit hanc fabulā uetustissimus poēta Pamphilus, qui Proserpinā multis annis antequā Narcissus esset, captam a Plutone cecinit, carpentem Narcissos.

E X M. V E R G. C O M M.

Lilio congenerē Narcissum antiquiores oēs faciunt, a Lilio statim continuata historia de eo agentes. Omnīq; certissime Theophrastus lib. 6. de plantarū historiā his uerbis inter cetera de eo agens. ἢ δὲ νάρκισσος ἢ τὸ λίσριον, οἱ μὲν γὰρ τοῦτο οἱ δ' ἑκάστον καλεῖσιν. Quod est. Narcissus autē aut Lirion. Sunt em̄ qui hoc, & qui illo noīe appellent. Manifesto argumēto, congenerē, aut si milem saltem Lilio Narcissum esse. Ex quo Lirion, qua uoce Lilia ueteres appellauerūt, & ipse quondā dici poterat: & si ex antiquis græcis testati aliquot fuerint, Lirion priuatim Narcissum indicare. Quemadmodū Crinon solū Liliū. Addiderūt quidam, etiā ab Homēro flores oēs una Liriū appellatione indicari. Quod & Aristophanes in Comœdia etiā seruasse creditur. Sed quemadmodū nos in scriptore hoc, & in alijs obseruauimus, naga hæc noīa, similitudo, & pene eadē natura fecit. Vocariq; solitū Liliū a græcis Lirion, manifeste hic scriptor ostendit, cū ait. Quidam etiā quemadmodū Liliū Liriū Narcissum uocāt. Videnturq; Latini una tantū mutata litera, & ut balbutientes solent pueri, pro, r, l, pronūciasse: sicq; ex græcorū Lirio suū Liliū fecisse: eodē modo quo lepidissimus græcorū comicus in Equitibus suis blefa lingua in conuersione loquentē Alcibiadem finxit, ὁλῶς βίωλος κερδὴν κέλαρος ἔχει. Cum tñ in eo qd intelligi uolebat, ubi, l, litera audit̄ intelligenda, r, erat, ὁρᾶς βίωρος κερδὴν κέλαρος ἔχει. Sed ut rem nostrā agamus, p cōpto sit, congenerē Lilio, aut illi penitus similē Narcissum esse: & quoniā dolores & torpidas capitis grauitates faciat, a narce, q̄ uoce græci torporē indicant, nō a fabuloso puero, ut poēta finxerūt, Narcissum græcis dictū fuisse. Testes in eo noīe rōnis eius sunt. Plinius 21. uolumine, cap. 19. & Symposij sui, 3. cōmentario, cap. 11. Plutarchus. Cuius obiter de Narcisso uerba hæc sunt. καὶ τὸν νάρκισσον ὡς ἀμβλύνοντα τὰ νῦτρα, καὶ βαρύνοντα ἐμποιοῦντα νεφροὺς. διὸ καὶ σοφοὶ αὐτὸν ἀρχαῖον μεγάλων βίων τοῦτο τῶν χθονίων σηφάνωμα προσήγορουν. Quod est. Et Narcissum appellauerunt, quasi neruos hebetantē, & torpidas facientē grauitates. Quapropter & Sophodes magnorū Deorum, id est, subterraneorū coronamentū eum uocauit: q̄ scilicet defuncti & morte torpidi, torpido flore merito coronarent̄. Anydron uocasse quosdam Narcissum etiā in Dioscoride legitur: idq; nos factū illi nomē credimus, q̄ longe ab aquis in montanis floret. Quod etiā illi adiectū est Autogenes, quæ uox a seipso genitū, uel per se nascens significat rationē eam habet, quā Theophrastus his uerbis indicauit. αὐτοὺς δ' ἐν πύλαις καὶ βλάστησιν αὐτόματον, de flore & semine dicta ea sunt, significantq;. Hic autē decidens sponte sua germinat & nascit̄. Etsi idem scriptor statim testetur, colligi semen eius, seriq; opere humano, nec minus etiā, ut in cæteris Bulbis plantari radicem. Vocari a quibusdam etiā Vomitorium Bulbum in Dioscoride audimus: haud sane, quia idem Vomitorio Bulbo sit, qui. 2. uolumine descriptus est, sed quia Bulbosq; radicis, simulq; Vomitorius ut ille est: quē in antiqua medicina habet præcipuū usum. Serebat quondā in hortis ad coronamēta Narcissus: nūc montanis locis, in qbus nascit̄, quærendus est, non difficilis inuētū, si diligentius querat. Totam em̄ excepta caulis altitudine, & calathi ambitu, quæ duo minora, q̄ in Lilio sunt, Liliorū speciem referre eum testati oēs sunt. Et præter id serotinus flos (post arcturū enim Augusto mense, & ad Autumni æquinociū florēt) inter Lilia floresq; alios, qui fere oēs tunc defecerūt, latere nō potest. Habet & alīas in scriptore hoc notas, qbus deprehendi possit: Folia porracea: quæ Plinius in radice esse illi ait, minora tñ & angustiora: Concauū caulem, & sine folijs dodrantali altitudine: Postremoq; florem candidū, in medio crocēū: & quod alteri eius generi competat, necesse est, in aliquibus purpureū. In qua descriptione, nisi in cunctis græcis, q̄s hæcenus uidere licuit, uitiū sit, ratiocinari oportet, duplicem esse Narcissum. Quod Plinius sane manifeste indicat duobus locis. Primum, 21. uolumine, capite. 5. in Liliorū historia, dicens. Narcissum uocant, huius alterū genus candido flore, calice purpureo: Mox eiusdem libri, capite. 19. Narcissi duo genera in usu medici recipiunt. Vnū purpureo flore: & alterū herbaceum. Non leui, ut uidetur in docendis his uarietate. Siquidē in priore illa descriptione, alterū Narcissum flore candido, & calice purpureo: in posteriore alterum purpureo flore, alterum uero herbaceum esse dixit. Theophrastus quod

hactenus in eo obseruauerim, cum sæpius Narcissi meminerit, nulla huiusmodi generum di-
 uisione usus est: semperq; tanq; unus Narcissus sit de eo docet, nunc folia, nunc florendi tēpus,
 nunc caulem describens: a quo credimus Plinium alterum genus herbaceum uocasse. Siquidē
 in eius historia inter cætera auditur, τὸν δὲ καυλὸν ἄφυλλον ἔχει ποδὶν δὲ. Quod est. Caulem quidē
 sine folijs, uerumtamen herbaceum. Ex quo potuit Plinius non a flore herbaceum alterum id
 genus appellare. Non ideo tamen non recipiendum duplicem Narcissum esse. Hoc enim a
 Dioscoride Plinioq; & ab alijs traditur. Sed quæ eorum discrimina in flore docentur, non satis
 & in scriptore hoc & in Plinio certa sunt. Cætera quidem, ut ex Theophrasto patet, eandem ha-
 bent historiam ueritatem. Ille enim, s. de plantarum historia Narcissum his uerbis descripsit. Nar-
 cissus uero, aut Lirium (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellent) folium Asphodeli fi-
 gura terræ proximum habet: latius tamen q; Asphodeli, & quali liliaceum. Caulem nudum q;
 dem folijs, uerumtamen herbaceum: in summo cuius flos est. Semen ueluti in uasculo membra-
 na quadam clausum, grande, nigrum, & figura oblongum. Id decidens sponte sua germinat.
 Verumtamen id colligentes, etiam in terra depangunt. Serunt & radicem, quā rotundam, car-
 nosam & grandem habet. Serotinus flos est. Post arcturum enim & circa æquinoctium floret.
 Idem eodem libro in foliorum disciplina ait, Narcissum angusto, numerofo, & pingui folio ef-
 se. Nec multo post de caulibus plantarū agens ait. Mirabile aut in cūctis quod in Scylla & Nar-
 cisso accidit. In alijs enim & quæ a principio cōserunt, et per se regerminant, uere folia primum
 prodeunt, dein caulis: in his autem, id est, Scylla & Narcisso caulis præcedit, & in Narcisso flo-
 ris tantum caulis. Post quæ cum longius descripsisset Scyllæ caulis & floris ortum, subiecit. Cū
 autem caulis hic consenuerit, tunc post aliquot dies folia prodeunt. Similiterq; & in Narcisso
 fit, πλὴν οὐτε καυλὸν ἔτιρον ἔχει παρὰ τοῦ τοῦ ἀνθους ὡσπερ ἱπποδῶν. οὐτε καρπὸν φανερόν ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ
 ἀνθὸς αὐτὰ τὰ καυλῶ καταρ' ὀνίσι καὶ ὅταν ἀναθῶ τότε τὰ φύλλα ἀνατίλλου, id est, Verumtamē nullū ali-
 um caulem præterq; floris causa prolatum, ut præmonstrauimus, Narcissus habet. Manifestum
 idem non habet semen. Flos autem ipse una cum caule arcescit, & cum aruerit, tunc folia emer-
 gunt. Præterea florere prius Scyllā, postea uero Narcissum, idem paulopost testatur scriptor.
 Nosq; tam multa ex eo collegimus, ut facilius & certius deprehendi possit tantū nominis in an-
 tiq; uorum coronamentis flos. Quæ enim Plinius diuersis locis de eo tradidit, ex Theophrasto
 quidem deslexa sunt: sed tanta breuitate ab eo tractata, ut obscuriora legentibus aliquādo sint:
 & ut respondere sibi inuicem Theophrastus & Diosc. uideantur. Cuncta enim de folijs, cauli-
 bus, & semine ambobus eadem sunt. Floris color, & coloris discrimen in Theophrasto tantum
 desideratur: idq; obseruasse & discreuisse legentes oportet: præsertimq; quod hic croceū & pur-
 pureum in medio describit: quod Plinius florem appellat, non satis certo intellectu, totum ne
 florem sic uocet, an quæ crocata in eo sunt & purpurea, ut hic manifeste docet. Potest enim utra-
 q; pars flos dici: quemadmodum in Viola nigra de duplicis floris ex disciplina Theophrasti flo-
 ribus diximus. Nos in Apenninis montibus his nostris, frequentem uidimus florem Augusto
 & Septembri mensibus florentē, figura Lilij, dodratali altitudine: folijs qualia in Narcisso hoc
 describuntur: singulari caule, ipsdemq; alijs omnibus, excepto colore, qui nec cādidus, nec pur-
 pureus ut Plinius docet sit, sed inter candidum & luteum colorem nullius, aut exigui odoris.
 Vidimus & in mitioribus collibus natum, sed non tam speciosum, & magis albicantem: diuq;
 credidimus Narcissum eum esse: neq; ab opinione ea longius adhuc discedimus. Inclinat em-
 animus, potuisse antiquis uagum Narcissi nomen esse: & ut in plantarum disciplina sæpe alias
 testati sumus, congeneribus, similibusq; multis cōmunem eam appellationem fuisse. Tantūq;
 abest, ut constituamus luteo colore Narcissum esse: ut inueniendum hūc florem legentibus re-
 linquamus, q; candido colore sit, croceis intus staminibus, & in aliquibus purpureis: quod intū
 in colore eius a Diosc. discrimen tradit. Nobis enim hactenus uidere non licuit candidos Lilio-
 rum figura flores, capillamentis, aut staminibus intus purpureis. Relinquimus etiam peritio-
 ribus cogitandum, probauerit ne hic scriptor Narcissum simpliciter montanis locis nascētem,
 ut a satiuo & hortensi secerneret: an desiderari ultra aliqd possit, quale scilicet Plinius ait pro-
 batissimum nasci in Lyciæ montibus: in quam partem propensiores trahimur. Superlatiuum
 enim illud ἀλλισσο, certiores sibi nescio quomodo natales locos exigere uidetur: & præpositi-
 uus ille articulus eodem sensu rem etiam indicare credi potest. Suspicio tamen hæc sit, non de-
 cretū. Qualis etiā est in uerbo παρσίσι, quod statim sequitur, significet ne uirescere, & herba-
 ceo colore esse: an potius a Porro uerbum factum fuerit, significetq; Porri odore sentiri. Quod
 tamen nullibi inuentum in antiquis a nobis est. Quæ omnia diligentius obseruanda & consti-
 tuenda alijs relinquuntur.

C
integrat

Hippophæes, alij Hippophyes, alij Hippophanes, alij Hippion, alij Echinion, alij Pelecino, Romani Lappaginem uocant, quo fullones uestes interpolant. In fabulosis maritimisq; nascitur, surcularum frutice, denso & largo, folijs Oleæ, longioribus, mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes. Flores Hederæ corymbis similes, racematim coherentes, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti, ex qua perinde ac Thapsia succus eximitur: qui cum Erui farina subactus siccatur, & ad usum reconditur. Pituitas, bilisq; detrahitis oboli pondere cum mulso & quatuor obolis Erui farinæ. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice liquamentum deponitur, uti in Thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

B A R B A R I C O R O L L.

Hippophæes, siue Hippophyes, & Hippopheon Hippocrati. Galenus hanc & Gnaphon, & Stybon, & Styben quoq; dici putat. Nomen uidetur accepisse, quoniam forte accommodata sit eorum natura: quemadmodum & ea, quæ Hippophæston uocatur, post hanc dicenda. Sunt enim unius fere generis, in binas diuisi species. Vtriusq; nostri Lappaginem (ut arbitror) appellauere. Similis inquit Plinius Anagallidi Lappago uideretur, nisi esset ramosior, pluribus folijs, graui odore. Quæ talis est, Mollugo dicitur, quæ uero asperioribus folijs, Asperugo. Neroni quædam causis utilem Hippophæston Diosco. affirmat. Plinius Lappaginē, quæ dicitur Mollugo. Vnde colligunt nonnulli eandem esse Hippophæston, & Molluginem.

D

E X M. V E R G. C O M M.

Sciendum primo est, spinosum fruticem esse Hippophæes: neq; a Diosco. tantum hoc habitum describi, uerum a Theophrasto, Plinioq; etiam: quorum alter spinis albis esse dixit, alter *λευκὰν* *καὶ τὰς φύλλους* descripsit, id est, nullas habere in folijs, sed ut hic ait, inter folia spinas: quales ab eodem plures alia numerantur. Idq; in eius historia tam manifeste patet, ut nihil de spinis dubitandum sit. Mox ope spinarum quas habet, ad usum uestium translata ueteribus fuisse: nec aliud significare Diosco. cum ait, *ἀνὰ ποταμὸν τὰ ἱμάτια*, id est, ut nos uertimus, quo uestes uellicando poliunt. Id enim est *ὑπόπτυν*, & ut Athenienses dicere consueuerant *ὑπόπτυν*, id est, *κατεβαίνον*, quod uellicando expolire significat. Quæ autem uestium expolitio hæc spinis facta esset, facillimam habet coniecturam: eandem, scilicet aut illi similem, quam carduis, aut hamis ferreis ætas nostra in houis & obsoletis uestibus querit, iacentem, aut longo usu attritum pilum erigens: & si in textura flocci, festucaeue, aut alterius coloris aliquid inheret, ope spinarum illarum extrahens. Eamq; ob causam Galenus Hippophæes hoc Gnaphon etiam uocat: Græcorumq; grammaticam exponentes uocem, dicunt *ὑπόπτυν ἑκάνθου*, *ἢ οὐκ ὑπόπτυνται τὰ ἱμάτια*, id est, Cnaphæ spinæ sunt, quibus expoliuntur uestes: quasi non sola hæc spina eum quondam haberet usum, sed plures honoris eius prærogatiua gauderent. Sic etiam *ὑποπτύματα ξαντόχρονα* dixerunt, id est, quæ uellicantur. Galenus tamen, ut diximus, priuatim Hippophæes hoc Gnaphon appellauit. Quæ causa etiam fuit, ut quemadmodum in Diosco. nunc legitur, Romani Lappaginem id dicerent. Nec aliud significasse nobis Plinius uidetur, cum ait lib. 27. cap. 10. Hippophæston nascitur in spinis, ex quibus fiunt æneæ fulloniæ. Aeneas enim, ut credimus, uocauit ad eundem usum æneum instrumentum aliquod hamatum, forficulatumue: quod primo ex ære factum, nomen in spinis postea serua uerit: auditq; ænearum nomine, instrumentum, additis deinde fullonis materia & usus intelligeretur. Credimus fore, ut uideantur aliquibus nostra hæc duriora, præsertim cum fulloniam, & fullones receperint iam pridem in latina re omnes per his uestes purgant: & lotura, aut infectione candorem illis, aliumue aliquem colorem acquirunt. Quod nos non negamus: neq; his quæ nos per Hippophæem hoc dicimus aduersantur, quæ illi de fullonibus dicunt. Potest enim utrumq; ab eisdem tractari: nec repugnat, posse eum qui uestes lauet, aut in

friciat, eadem qua diximus ratione expolire. Nos enim antiquæ uocis rationem & ueterum auctoritatem secuti, quales *κναφίς* quondam fuerint, & quæ uerbi *κναφίς* significatio sit, demonstrauimus: quæ nulla alia est quàm, ut græce loquamur, *τοῦ ἀποφύειν καὶ ἀποφύειν*, id est, deradendo expolire uellicareque: & si id patiuntur grammatici, expilare. Nasci fruticem hunc Plinius ait fabulosis, maritimisque locis, scriptorem hunc secutus. Theophrastus fabuloso quidem, sed tenui folio: quod propter ea quæ paulo ante ab eo accepta diximus, querendas cognoscendasque facile notas has illi tribuit, *μονόριφον δὲ ἰπποφάει ἰπρίσιον καὶ χαμαίκανλον, βλαστάνει δὲ καὶ ἐν τῷ θέρει καὶ διαμίνει τὸ φύλλον χλωρὸν ἄχρι πλειάδος. χαίρει ὑφάρμοισι καὶ λεπτογίοις χωρίοις. λήγεται δὲ ἐν τοῖς ἱρρασίμοις ἐν βέλαι φνέσθαι καὶ ταῦτα περὶ τὰ ἄστυ καὶ ἐν ἰνυλίοις τόποις φνομίην*. Quorum sensus est. Singulari radice nititur in terra Hippophæas: terrestre est, & caules per terram spargit: per æstatē germinat & floret: permanetque uiridi folio usque ad pleiadem autumnī. Sabulosum & tenue solum amat: diciturque locis cultis nasci nolle, cum tamen circa oppida & apricis locis nascatur. Hæ Hippophæas notæ a Theophrasto numerantur: quæ ideo a nobis repetitæ sunt, ut pluribus ueluti testibus deprehendi latens frutex possit, & cuius non satis certa nominis origo est. Plinius compositum ab equo nomen opinatus, ait. Debent (de Hippophææ & Hippophæsto sermo illi est) accommodatæ esse equorum naturæ, neque ex alijs causis nomen accepisse. Quippe quedam animalium remedijs nascuntur, locupleti diuinitate ad gerenda remedia. &c. Quod si recipiatur, poterunt eandem cætera quæ pariter composita in græcis fuerint habere rationem.

De Hippophæsto. CAP. CLXVI.

Hippophæston, id quod aliqui Hippophæes appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophæes, estque spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore, inanibus tantum capitulis, folijs paruis, spinosis, radículas habens albas, molles, crassas. Succus radice et folijs exprimitur, & exiccatur. Datus cui uoles tribus obolis in aqua mulsâ, aquam pituitasque detrahit. Priuatim comitialibus morbis, neruorum uirij, & orthopnoeæ conuenit huiusmodi purgatio.

BARBARI COROLL.

Hippophæston, hæc uidetur quam Plinius Hippophyes, Theophrastum sequutus appellauit, tributam ei proprietatem scribendo, quod fructum spinosum habeat. Nascitur in spinis, ex quibus sunt anæxæ, ut idem inquit, fulloniæ, capitulis inanibus, folijs multis herbacei coloris, radiculis candidis, quarum succus exprimitur æstate. Idem Plinius sextodecimo uolumine, hanc non Hippophyes, sed plane, ut Dioscorides, Hippophæston nominat, inter herbas quæ fructicibus alijs circumuoluunt sese: quod notatur inquit, & in spina fullonia Hippophæsto, caliculis inanibus, folijs paruis, radice alba, cuius succus ad detractiones in comitiali morbo uti lissimus habetur. Qui locus in Plinio, deprauate legebatur ante nos, ita ut ne intelligi quidem posset a peritis. Paulus non Hippophæston per, i, sed Hypophæsto p, y, scribendum putauit.

Miscuerunt in græcis & in latinis aliqui, quod pmonstratū mō est Hippophæes, & quod nunc tractamus Hippophæston, nominis similitudine decepti. Persuasissetque id eis uidentur hęc amborum narales, & in artibus usus. Vtraque enim fulloniæ spina, eadēque in morbis utriusque plura remedia sunt. Verūtū seorsum a peritioribus actū de utraque est. Neque enim oīa penitus eadē utriusque in historia & medicina sunt. Quinetiā Paulus Aegin. li. 6. cū de Hippophæe primū egisset, non multo post de Hippophæsto agit. Nec ut Hippophæes composito a uoce hippo nomine scribit, sed a ppositione *ἰππο* Hypophæsto. Quā ratione secutus etiā lib. 27. ca. 8. Plinius est: quāuis antea lib. 22. cap. 12. & hæc, & Hippophæes dixisset, debere equorum naturæ accommodatas esse. Nos ut illius, sic etiā huius nominis rationē ignoramus. Oportet tū & hanc aculeatā intelligere: ex quā hic ait, & hanc fulloniæ spinę genus esse. Ratiocinarique facile erit, ut supiore capite pmonstrauimus, omnes quibus possent uestes qua ratione diximus expoliri, cōsueuisse ueteres *κναφίς*, & *κναφίς* id est, fullonias spinas appellare: & ex earum censu hanc etiā esse, quæ non difficilis inuentu erit, tam certis notis ab hoc scriptore describitur.

De Ricino. CAP. CLXVII.

Cici, aut Croton aliqui Sesamon syluestre uocant, alij Sefeli Cyprion, alij Crotona. Aegyptij Sistamna, aliqui Trixin, Magi

A

*ἰπποφάειον
ἰπποφάειον*

B

*Pli. li. 27. ca. 8.
lib. 22. cap. 12.*

VERG.

*κίσι κρότον
σίσσμενον ἄγριον*

Z η

C Sanguinem febris, Latini Ricinum, alij Lupam. Id nomen accepit, a Ricini animalis similitudine. Arbor prouenit paruae Ficus altitudine, folio Platani, maiore, lauiore & nigriore, ramis caudicibusq; cauus in arundinis morem. Semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinū animal representat: ex quo oleum nomine Ricinum exprimitur, cibis foedum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt. Vomitiones mouet. Sed iniucūda admodum est, & molesta purgatio. Siquidem stomachū uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarosq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum tumoresq; leniunt. Turgentes māsas cohibent. Eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 5.
lib. 19. ca. 7.

Cici ab ea differt quae Cuci a Plinio, & Cuciphoron a Theophrasto dicit. Cuci folio & caudice in Aegypto Palmæ similis: quando & eius folijs utuntur ad textilia. Differt, q; Palma indiuidua est, At hæc cum adolescit, in brachia ramorum spargitur: quæ pari modo & ipsa finduntur, uirgis breuib; neq; multis. Pomo rotunditas, quæ manum impleat, colos fuluus, commendabili succo, ex austero & dulci, nec congesto ut Palmulæ, sed discreto: lignum intus grandis, firmq; duricie: ex quo stragulares anulos detornant, ut Theophrastus ingit: aut uelares, ut Plinius. In eo nucleus dulcis dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandī nō possit, nisi pluribus diebus aqua maceratus. Materies nō ut Palmæ rara, heruosa, uirens: sed spissa, carnosa, grauis, dura, crispioris elegantie. Et ob id in magno honore Persis, usq; ad læticipedes. Hæc a Theophrasto & Persicæ textilē uocari. Thebaica pfectura copiosam, si q; arbitrant, coniecturam potius, q; rationem sequunt. At Cici arbor, quam Herodotus Sillocypriū uocauit, Ricinus a nostris dicitur, ut ipsum quoq; animal, canibus præcipue infestum, qd & Cynoraista græce dicit, & Croton: quanq; Theodorus Crotonas rediuos cōuertit, non ricinos. Ferti ni etiā nū hodie, ut ex Didymo zenotele accepimus, q nobis a secretis est, & Anagnostes, uer naculo uocabulo Rhaistas canum uocant. Dicunt & Cynomyæ: quibusdā. Sed & ouibus molestos esse Ricinos testis est Cato. Vulgus ipsū eos græco nomine appellat Cica, Galenus Cica dici uult etiam bestiolas quæ frumentū corrodūt, quarū coetus Cion dicitur. Is uermis etiam Cīs uocatur: ut infra quoq; diximus. Hippocrates hanc arbore uidetur intellexisse, cū Crotoni deos radicem in medicinas quasdam adhiberi commonet. Aliqui non solum Cici, sed Ciccam quoq; nominant. Ab hac arbore conficta iurium uocabula, Cicilendrum, & Cecimandrum, in Plautina fabula, si dixerim, diuinare potius q; docere uidear.

Herod. i Eur.
libro. 2.

E X M. V E R G. C O M M.

Copiosus in Aegypto quondam nasci Ricinus hic dicebatur. Idq; uerisimile est: quoniam luminum necessitas, sine quibus uitæ nullus est per tenebras usus, faciendis lucernarum funiculis, & oleo apum deficiente alio omni, optabilem genti illi fructum fecerat. Et si Plinius lib. 19. cap. 5. refertur Elychnia qdem ex eo fieri claritatis præcipue, ex oleo tamen ppter nimiam pinguitudinem lumen obscurum. Nec aliud hic idem scriptor primo uolumine significauit, dicens Aegyptios multum indigere, & copiose uti Ricinino oleo. Cogebāt enim quod comicus ait, si non possent quod uellent, id uelle quod possent. Plinius. u. uolumine, capite. 7. altitudine. Oleæ in Aegypto & Hispania prouenire ait, caule ferulaceo, folio uitium, semine uuarum graciliū pallidarumq; quas hic βότρυς τραχὺς dixit, id est, racemos asperos. Theophrastus duobus locis, primo de historia, mox secundo de causis plātum nihil æque in eo admiratus est, q; ut ille ait, foliorum ἀνομοιότητα καὶ μεταχρηματισμὸν, id est, inæqualitatem, siue dissimilitudinē & tras formationem. Numerauitq; primum inter ea quorum folia diuersis temporibus diuersa figura uidentur: uerbi causa, a principio rotunda, mox cum creuerint angulosa, aut ediuerso: qualia ostendunt Hedera, Populus alba, & Ricinus hic. Suntq; de eo scriptoris eius hæc uerba. τὰ δὲ φύλλα τῶν μὲν ἄλλων ἀνδράν ὁμοία πάντων ἀντὰ ἑαυτοῖς. τῆς δὲ λίνκου καὶ τοῦ κίττου καὶ τοῦ καλονόμου ἀνόμοια, καὶ ἑτεροχίμωνα, τὰ μὲν γὰρ νῆα περιφέρει τὰ δὲ παλαιότερα γωνιώδη. καὶ οὗ τούτῃ ἢ μετέσσει πάντων. Rursusq; ὁ δὲ τὸ φύλλον μεταχρηματισμὸς καὶ ἑτέρων κοινός. ἡπὶ καὶ τὰ τοῦ κρότωνος π-

ῥιζὴν φυτόν τὴν ῥίζην ὕστερον ἀπαγορεύει καὶ κατὰ τὴν ἀναδιαφθοράν. Quorum sensus est. Aliarum uero omnium arborum folia ipsa sibi ipsis similia sunt: Populi uero albæ, Hederæ, & eius quæ uocant Ricinum dissimilia, & alterius figuræ. Noua enim & a principio circinata: adultiora deinde angulosa. Et omnium mutatio talis est. &c. Rursus. Foliorum uero transformatio & alijs cõmunis est: quoniam eius qui Ricinus nominatur, a principio nascentia folia circinata sunt: tẽpore deinde angulosa fiunt: quasi dearticulatur. Quam rationem ex Theophrasto a cæteris relicta addere placuit: ut hac nota etiam deprehendi Ricinus possit. Et si uulgaris iam pridem hic frutex sit, seraturq; passim in hortis ad spectaculum. Neq; enim ætate hac nostra alium, quem sciamus in medicina, aut reliqua uita usum habet. Vocatq; Ethruria Phaselum Romanum. Diximus de eo etiam in Ricinino oleo: eamq; ob causam non erimus in descriptione eius longiores. Id tñ testamur, uera esse quæ hic ait, Vomitiones ciere, & per inferna laboriosa purgatione purgare. Scimus enim pueros aliquando deuoratis incaute seminibus eius aliquot, integrant cum sua nocte diem paulominus q̃ ad mortem eo cibo periclitatos.

T De Tithymalorum generibus. CAP. CLXVIII.

Tithymali genera septem, quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus Cometes, aut Amygdaloides, uel Cobios. Alter Myrthites, qui fœmina existimatur, eũq; Myrsynitem, aut Carty itẽ uocant. Tertius Paralys, quem Tithymalida appellant. Alius Helioscopius. Quintus Cyparyssias. Sextus Dẽdrodes. Septimus Platyphyllos dicitur.

BARBARI COROLL.

Tithymalum, & Tithymalus penultima producta, Meconion a quibusdam uocatur. Nostri Lactucam appellant caprinam, marinamq;. Aliqui Lactariam, quia & Græci Galaetida nuncupare soleant. Lactẽ Tithymali inscripto corpore, cum inaruerit, si cinis inspergatur, narrant apparere literas: & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, q̃ codicillis. Vnus iam & in castra, & obsessas urbes transit.

Pli. li. 26. ca. 10
lib. 20. ca. 19. et
26. cap. 8.

C De Characia appellato. CAP. CLXIX.

Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri. Lacteo succo, atq; acri madent. Folijs Oleę circum ramos, angustioribus & longioribus, radice dura, lignosa. Pendet in cacuminibus caulium coma iunci, & calyculati folliculi, aliquantum caui. In quibus semen continetur. Nasctur in asperis & montibus. Succus aluum purgat. Trahit pituitam bilemq;, binis obolis in posca sumptis. Et cum aqua mulla uomitiones mouet. Appetente uindemiæ tempore, succus congestis ramulis, mox decisis, & uase reclusis excipitur. Aliqui adijciunt farinam Erui, & in pastillos digerunt, qui Erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas, quaternasue guttas instillant, ut cũ his inarescant. Quas ad usus recondunt. Per se etiã tusus in pila, & in pastillos cõactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neq; quo uentus aspiret stare quenq;, neq; mantis oculis ad mouere conuenit, sed ante eius collectionem, corpus, præsertim, faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat. Quapropter catapocia, cæra, aut decoctio melle oblini par est, & hoc modo dari. Binas tamen, ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse satis est. Recens lac ex oleo, peruncios in sole capillos euellit. Renascentesq; flauos.

χαράκιον

Exiles efficit. Deniq; omnes destruit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. Sed cara dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam uitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pensiles, & quæ Thyimi florem representant. Valêt aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas ulceru, gangrænas, fistulasq;. Legitur semen autumnò, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui cõdiant admisto cum lacte lepidio, & castoreo contuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

B A R B A R I C O R O L L.

Characias ramos habet digitali crassitudine quinq; aut sex. Semen legitur autumnò cum coma, succus incipiente pomorum lanugine. Tam feruentis hoc naturæ, ut per se extra corpori impositum, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Nascitur & in maritimis. Alia omnino est Characias, quam uulgaris sermo Charanciam appellat: quoniã septi modo in hortis fenestrisq; per cancellos, opere topiario digeritur. De qua ne uerbū quidem apud ueteres habitum inuenio, Balsaminam Ligures Padani uocant, Hierosolymitanum pomū Ethruria, folio uitis minore, pampinis item uitū, turbinato utrinq; fructu, uisēda cute, carnosa, uerrucosaq; per uersus: cucumeris pusilli, & Bucini marini quadam similitudine, malo uerius ac tubere, q̃ grandi bacca, aut folliculo puniceus, maturo colore, sanguineo quoq; succo. Inanitas contractio. Semina intus aliquot lenticulæ figura continet rubentia, ex quibus oleum exprimitur, ad uulnera præcipuum.

¶ De Fœmina. C A P. CLXX.

μυρσινίτη
καρύιτη

Fœmina quam Myrsiniten, aut Caryiten uocarunt, similis suapte natura Daphnoidi. Folijs Myrti, sed maioribus, in cacumine acutis, & pungentibus. Ramulos ab radice mittit dodrantaes. Fructū fert post annum nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem. Sed ad citandas uomitiones inualidior est.

B A R B A R I C O R O L L.

Tithymalus Myrsinites, a Theodoro Myrtaria cõuertitur, mollioribus folijs q̃ Myrti. Colliguntur comæ huius hordeo crassescente. Fructus demetitur cum messium maturitate. Hic nō pariter maturefcit, sed pars sequenti anno, & nux uocatur. Inde cognomen dedere Græci Caryitin. Est ubi Theophrastus Clematiam, hoc est, Sarmentulam uocant, folijs humi sparlam, palmi longitudine. Nisi quis corruptum locum putet, legendumq; non Clematiam, sed Carytiam censeat.

¶ De Paralio. C A P. CLXXI.

παράλιος

Aliud Tithymali genus dicitur Paralios, quem Tithymalida, aut Mechona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis rubentibus, palmum altis, quinis, senisue a radice exeuntibus. Folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato. In quo semen ut Eruum, uario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cū radice lacteo succo turget. Similes ad usus recõdit.

B A R B A R I C O R O L L.

Tithymalus Paralios, a Theophrasto Coccus appellatur, folio rotundo, semine candido, quo uua incipiente stringitur.

De Helioscopio. CAP. CLXXII.

Aliud genus Helioscopius dicitur, folijs Portulacæ, rotundioribus, ramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrāntali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis, capite Anethi, semine in capitulis incluso. Helioscopij nomen accipit, quoniam comas eum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus, semineque ut aliorum. Eademque superioribus vires, non tamen usqueadeo ualidæ.

BARBARI COROLL.

Tithymalum Helioscopium, semine albo, columbis gratissimo: quod colligitur nigrescente uua. Nomen accipit, quoniam capita cum sole circumagat.

De Cyparyssia. CAP. CLXXIII.

CYPARYSSIAS in caulem exit dodrāntalem, uel maiorem, subrubrum, ex quo folia Piceæ similitudine exoriantur, molliora tamen, & tenuiora. Et in totum nascentem Piceam æmuletur. Unde nomen traxit. Candido succo madet. Cui eadem uis quæ superioribus.

BARBARI COROLL.

Tithymalus Cyparyssias, caule gemino, aut triplici. Nascitur in campestribus.

De Petræo Tithymalo. CAP. CLXXIII.

GENVS TITHYMALI in petris nascens, Dendroides cognominant, in cacumine largam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, folijs Myrti tenuioris, fructu Characiæ. Eiusdem effectus cuius superiores, similique modo reconditur.

BARBARI COROLL.

Tithymalus Dendroides, aliqui Leptophyllon cognominant, maxime cauliculis rubentibus, & semine copiosissimum.

De Platyphyllō. CAP. CLXXV.

PLATYPHYLLOS Verbasco similis est. Radix, succus & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aquæ insparfus. Reliqua Tithymalorum genera, quæ supra scribuntur, eadem efficiunt.

BARBARI COROLL.

Tithymalum Platyphyllon aliq̃ Corymbiten, aliq̃ Amygdaliten a similitudine appellant: nec ullius longiora sunt folia.

EX M. VERG. COMM.

Satis uno uersiculo, & in eo una tantū uoce in Theriacis suis monuit Nicander, quod commune Tithymalis omnibus esset, & unde potuerint posteriores latini nomen illis apte & feliciter facere. Is autem est: *σάμψλυνον κύτιον τε καὶ ὑλάριαν θυμάλιδας*. Id est. Sampslicum, Cytisumque, & copioso lacte plenas Tithymalidas. γάλαξ enim eius gentis poetæ lac aliquando appellant. Eamque rationem secuti ueteres Romani, Lactariam herbam communiter appellatione, ob commune omnibus lac, uniuersum hoc genus uocauerunt. Mox, ut plerumque in his fit, qui parum didicerunt, quantopere undique communia esse oporteat quibus constituendum genus aliquod est, uidentes aliqui non aliter quam ex Lactuca secta Tithymalis lac fluere, Lactucam uocare incæperunt; cum tamen nullius Tithymali folium ad eius similitudinem accedat. Licetque

Z. iij

A

ἡλιοσκοπίος

κνπαρυσίας

B

πλατύφυλλος

C Lactuca a lacte, quod secto eius caule defluit, nomen inuenit, non ideo tamen hac una in re tantum illi similes plantæ aliæ eodem illi nomine indicandæ fuerant. Nullus enim audita Lactuca, non foliorum eius similitudinem quæret: quæ inueniri in Tithymalo aliqua non poterit. Nec refert, addiderit ne illi quispiam ex re aliqua discrimen, caprinamq; , aut marinā uocauerit. Semper enim audito Lactucæ nomine, similem folijs illi herbam aliquis cogitabit. Idq; sentiens Celsus libro .5. capite .7. cum Lactucam marinā appellasset, adiecit statim, quæ Tithymalos a Græcis nominatur. Intelligebat enim q̄ late pateret Lactucæ nomen, & quatenus fallere quærentes Tithymalum id nomen posset. Multa enim ad mare nascuntur: nec si Lactuca etiam uocari Tithymalus possit, totum genus ea uox indicabit. Quæ enim a Græcis Paralios nominatur, sola ad mare nascitur, & sola uere marina dici potest. Cæteræ enim montibus, campestribus locis, inter rudera, & circa oppida nascuntur. Verisimileq; est, fuisse id nomen tantum in usu his, qui aut nullam aliam Tithymalum apud se nascentem haberent: aut medicorum, qui ea tantum ad remedia uterentur. Eadem, aut non dissimilis in caprinæ Lactucæ nomine ratio est. Vescuntur enim capræ, non Tithymalis his tantum, uerum infinitis pene alijs: nec facile erat ex eius animalis cibo tam multiplicem herbam deprehendere. Eamq; ob causam nos, auctore Plinio, multoq; magis suadente id ratione, ne Tithymalis aliæ misceretur plantæ, ex tot alijs eius appellationibus Lactariam herbam elegimus: quæ tam multis eius generibus inferuaret, & communem omnibus haberet ex communi omnibus lacte indicationem. Et hæc pro Lactariæ herbæ appellatione satis dicta hæcenus sint. Quibus adderem, doceremq; longius, quæ priuatim per singulas species fecerit illi nomina antiquitas: nisi qua licuit breuitate obiter interpres ea docuisssem, Vallaremq; primum eius genus uocari dixissem, non aliter q̄ & Harundinis genus quoddam Characiam, Plinius etiam uocauit: q̄ uallidis septisq; muniendis idonea sit: qua similitudine Lactariæ herbæ primum hoc genus Characiam hic etiam uocari ait, altitudine ut hic inquit, supra cubitum: ut pleriq; autem alij, bicubitali, & crassitudine digitali: quæ tota quantitas erigendis uallis satis est. In cæteris ex his floria eorum per se ratio nominis patet. Nec nos aliud habemus quod ad eā rem certius afferre ualeamus. Eamq; ob causam relictis huiusmodi, ex Theophrasto monebimus, Lactariæ herbæ tria tantū genera ab eo describi. Eam scilicet, quæ prima ab hoc numeratur Characiam, siue marem: Myrsinitem mox, aut foeminam: postremamq; Paralium, quæ tertia Dioscoridis est. Cuius descriptionis quoniā multa erit pro scriptoris huius historia utilitas, nō pigebit longius ipsdem uerbis ex eo omnia repetere. Quæ huiusmodi sunt. Tithymalorum autem maritimus qui Coccos uocatur, circi nata habet folia. Caulem, totamq; plantā altitudine fere dodrantali. Semen candidum. Demetit cum primū incæperit uua maturitate nigrescere. Daturq; siccatum semen & tritum tertia fere acetabuli parte. Qui deinde mas Tithymalus dicitur, oleaginum habet foliū: tota est planta bicubitalis: lac ex eo in uindemia colligunt, & cū id cura uerint, utuntur. Purgat aut magis per inferna. Qui etiā Myrrites uocatur Tithymalus, colore candido, foliū habet Myrto simile, sed in summo aculeatū. Spargit hic per tenā uiticulas longidine fere dodrantales, quæ annuū fructum alternant: aliæ scilicet nunc, aliæ uero sequenti anno ab eadem radice exeuntes. Montana amat loco Tithymalus hic. Vocaturq; fructus eius caryon, id est, nux. Demetit cum ad plenā crassitudinem hordea in spica maturuerint. Cumq; siccauerint, purgauerintq; semē eius, aqua lauant. Siccaturq; rursus dant bibendum, additis nigri papaueris partibus duabus, ita ut sit totū unius acetabuli pondus. Purgat autem per inferna pituitam. Si uero nucem ipsam dederint tritam, in uino dulci bibendam, aut in frigo Sesamo comedendam dant. Hæc sunt quæ Theophrastus de tribus Tithymalorū generibus quod diximus loco docuit, longius ideo a nobis repetita, ut ex eius historia, tantiq; auctoris testimonio pleriq; in Dioscoride certius cognosci possint: collatisq; simul duorum scriptorum decretis, uideant legentes, si qua aliter ab alijs reddita a nobis fuerunt, auctore Theophrasto, & antiquorum græcorum ope reddita fuisse. Quale est, quod in secundo genere foeminam Myrritem, & Caryitem diximus Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similem esse, colore albicante. Qui color, quoniam in impresso, alijsq; aliquot non legitur, relictus ab alijs est: & quod ad Daphnoides pertinebat, non plene expressum. Legitur enim in antiquissimis, τὸ δαφνοειδὲς τὸ γένος καὶ τὸ ὕδου λευκός. Quod est: ut nos uertimus: Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similis, colore albicante. Fecimusq; id confidentius Theophrasto adiuuante, qui in Tithymali huius historia ait, ὁ δὲ μυρρίτης καλεῖται τὸ τῆς δαφνίδος λευκός. Quod est, Qui autem Myrrites dicitur, candidus Tithymalus. Declarat idem Theophrastus etiam quid in Dioscoride, & in secundo Tithymali genere est. τὸν δὲ καρπὸν φέρει παρ' ἑκατέρου.

Quod alter ex nouissimis interpretibus uertit, Fructum fert æternis annis similem nuci. Alter, Fructum fert post annum nuci similem. Nos autem annuū fructum inuicem alternantes. Manifeste enim id docet Theophrastus. Cuius in ea re uerba sunt, κλαμάτια δ' ἀφίσιν ἐπὶ γὰρ ὅς αὐτὴ βαμναία. ταῦτα δ' οὐχ ἀμαφίρει τὸν καρπὸν ἀλλ' παρ' ἑτ' οὗ τὰ μὲν νῦν τὰ δὲ ἕως νῦν. Quibus nihil certius audiri potest. Viticulas autem per terram spargit dodrantali fere longitudine. Hæ autem non simul ferunt fructum, sed annua temporum uicissitudine, aliæ quidem nunc, aliæ uero sequenti anno. Sentiens enim Theophrastus non satis intelligi illud παρ' ἑτ' οὗ, ut certiorē faceret rem, addidit: alias quidem nunc ferre, alias sequenti anno. Idemq; est Dioscoridi παρ' ἐντεῶν, quod Theophrasto παρ' ἑτ' οὗ. Græcæ præpositionis uis id facit, qua carentes latini, non possunt una uoce id exprimere. Plinius ex Theophrasto locum interpretatus libro uigesimo sexto, capite octauo, ait, Fructus non pariter maturescit, sed pars anno sequente. Cum tamen Theophrasti uerba ea sint, quæ nos proposuimus: neq; ex com̄muni uocum illarum æstimatione, ut nobis uidetur, locus ille aliter intelligi poterit. Idem etiam Paralión, id est, maritimum Tithymalum Coccon uocari ait. Quod forte ex Dioscoride perijt. Est autem græcis Coccós non simpliciter omne granum, sed quod rotundum est: etsi non semper in laudatis scriptoribus ea ratio seruetur. Pertinet ea appellatio ad capituli, aut seminis in Tithymalo hoc figuram, quam in altero Dioscoride περιφρη, id est, circinatam, in altero δὲ ὀρεῶς, id est, Erui figura & magnitudine ostendit. Sunt alia etiam quæ Theophrasto & huic scriptori non penitus eadem sint, & quæ in medicina aliter doceantur. Ea cognitu legentibus facilia erunt. Tria ut uidetur Tithymali genera tantum Theophrastus cognouit. Ea; sunt, quæ prima a Dioscoride númerantur. Cætera nec illi, neq; herbarijs antiquis in hoc censu fuerunt. Siquidem Crateias, & Micton antiquissimi herbarij, quemadmodum Nicandri interpretes testatur, primū genus masculum dixerunt: appellariq; Cobium, fruticem exiguū, rubentibus uirgis. Secundum Myrrhinem. Et tertium Tithymalida, qui Paralios est. Cætera enim solo lacte, quo abundant, a posterioribus in censum Tithymalorum recepta fuerunt. Paulus Aegineta scriptorem hunc secutus, totidem illi genera numerauit. Discreuitq; quibus uiribus, & qua natura communiter priuatiq; singula sunt. Quæ omnia quoniam non erit inutile audisse, ex eo h̄sdem uerbis tradentur. Quæ huiusmodi sunt. Prædominantem alijs uiribus acrimoniā habent Lactariæ herbæ omnes. Inest eis etiam ualida amaritudo. Primas habet partes lac: tum semen: mox folia. Particeps & radix earum qualitatū. Eamq; ob causam in aceto elixa, exesorum dentium dolores sedat. Lac uero cauis eorum inditur. Quod si os tetigerit, q̄primum urendo exulcerat: ideoq; cæra id antea inuoluunt. Secundi enim ordinis in calefaciendo est, quem causticum esse dicunt. Eadem ratione defluunt lacte Tithymalorum inuncti capilli: sed quoniam uehementius est, oleo miscetur. Et si sæpius radices capillorum aliquis inunxerit, exusta penitus pereunt, glabrumq; relinquunt locum. Eadem potestate pterygia, formicæ, uerrucas, & thymos tollunt. Quinetiam scabies, impetigines, carbunculantia, phagedenica, & cancræscencia sanant. Omnium Tithymalorum efficacissimas maximasq; habet uires: qui Characias, id est, Vallaris dicitur: quem etiam marem uocant. Fœmina t̄idem: qui & Myrrinities uocatur. Quinetiam in petris nascens & arborescens. Post hos qui Verbasco similis est, Cyparissias, & maritimus. Postremus omniū Solisequus est. Proportionē his omnibus respondet eorū cinis, & lixiuius cinis. Hæc sunt antiquorū medicorum de omni Tithymalo decreta.

De Pityusa.

CAP. CLXXVI.

PITYUSA aliqui Clema, alij Crambion, alij Paralión, alij Canopicon uocant. Hanc specie a Cyparissia differre constat, etsi Tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs Picæ, acutis, exilibus, flore paruo, pureo, semine instar Lenticulæ, lato, radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulla. Item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

πύρρυσσα
κράμβιον

EX M. VERG. COMM.

C Inter arbores libro. 24. capite. 6. Pityusae meminit Plinius, & a Picea statim breuissime quam ille credidit satis fore omnē eius historiam & medicinā profectus est: nulla alia q̄ nominis occasione fretus. Neq̄ enim Pityi, quā Piceam uocauimus, congener Pityusa est. Frutex siquidē hāc, illa uero arbor, totoq̄ gñe inter se diuersae. Ille tñ ne cognata a congeneribus suis separare uideret, cognomines potius q̄ congeneres plantas simul & continuata historia descripsit. Hic cōtra, naturā magis q̄ noīa secutus, Lactarijs alijs herbis eam statim subiecit: quonīā parem laētis ubertatē, & similitē in purgando uim habet, nec tanti folia eius Piceae similia fecit, ut reliquā naturā negligeret. Quod em̄ Pityusa Piceae simile habet, foliū tantū est: cetera Lactariae herbae similiorem & congenerē faciunt. Ideoq̄ ait a quibusdā inter Tithymalorū species & hanc numerari: solaq̄ specie a Cyparissia Lactaria herba differre. Animaduertit hoc ante nos etiā Nicolaus Leoniceus, longiusq̄ de rota hac re in cōmentariolo suo egit. Eam uocari a quibusdā hic Clema ait, id est, uiticulam & famentū: quonīā forte quos habet caules, aliarū modo quae uiticulas habent, per terram spargit. Paralium uero, quonīā Tithymalo ob lactis copiam similis sit. Quod deinde ceteri interpretes in radice dixerunt uocari eam Turpet, adiectū Dioscoridi a posterioribus fuit. Id enim in nullis ueteribus grācis aut latinis legitur: nec legi etiam debet, quādo barbara ea uox est, & a posterioribus medicis quaecūq̄ ea sit sic appellata. Ob quas cauillas, nos libenter & merito ex hoc scriptore eam eiecimus.

De Lathyri. CAP. CLXXVII.

Lathyris

LATHYRIS, quam aliqui Tithymalum appellant, eamq̄ Tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudinis, & digitali crassitudine, inanem. Gignuntur in cacumine alae, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & lauiora. Quae autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, Aristolochiae, aut oblongae Hederae figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici conceptaculo insignem, rotundum, ceu Capparin, in quo grana intercurrentibus membranis distincta continentur. Eruis maiora, rotunda, quae dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radiceis usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti Tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant. Sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum praebet. In gallinaceo iure, aut oleribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

Pli. li. 27. ca. 11.

LATHYRIS, folia habet multa Lactuae similia, tenuiora, ut Plinius tradit, germinibus crebris. semina Piperis magnitudine, facilia purgati.

EX M. VERG. COMM.

Demonstratam paulo ante Pityusam, & quā modo tractamus Lathyrim ob eandem Lactis notā, & purgandi uim, Paulus Aegineta in. 6. Tithymalis alijs adnumerauit. Suntq̄ de Pityusa eius haec uerba. Et hanc aliqui Tithymali speciem dicunt: quonīā simile lac habet, & utile purgat, de Lathyri autē quae sequitur. Priuatim hanc quidam Tithymalū uocant: quoniam pariter illi lac eius purgat: et si in Lathyri praecipua purgandi uim semen habet. In qua descriptione animaduertendū in primis illud est: quod dicitur, priuatim quosdam Lathyrim Tithymalum uocare, eo pertinere, quasi non Lathyris, sed certiore Tithymali nomine ab illis indicetur. Credimusq̄ nos ex hac descriptione, posteriorumq̄ temporū usu, Cataputiam minorem a nostrae aetatis medicis Lathyrim appellatam fuisse. Nihil de Lathyri hac, quod haecenus in eo inuenerim, Theophrastus. Masculino tamen genere Lathyron inter legumina libro octauo de plantarum historia numerauit. Veritq̄ Gaza, Cicerculam: quae nihil ad Lathyrim hanc pertinet, Plinius uigesimo septimo uolumine, capite undecimo, Lathyrim diuersa penitus ab

hæc scriptore historia tradidit: præsertimq; in folijs, quæ hic Amygdalæ, ille Lactucæ similia fecit: magno ut uideretur figuræ discrimine inter Lactucæ, & Amygdalæ folia. Sunt præter hæc & alia, quæ poterunt uolentes inuicem conferre. Nobis satis sit locum signasse.

De Peplo.

CAP. CLXXIX.

Peplos, quem aliqui Sycen, alij Mecona Aphrodem uocant, fruticulus est lactei succi plenus, folijs Rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, dodrantali, humi respersa, semine sub folijs rotundo, minore q̃ candidi Papaueris. Pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacua, ex qua fruticat. Nascitur inter uites, & in hortis. Colligitur messibus. Siccatur in umbra, & continue uersatur. Fructus tufus, & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. Obsonijs inspersa conturbat aluum. Muria conditur.

BARBARI COROLL.

Peplos, ex una tenui radice fruticat. Hanc & Meconion, & Meconitin ab Hippocrate uocari, Galenus auctor.

Pli. li. 27. ca. 13.

EX M. VERG. COMM.

Meconion, Meconitimq; id est, Papauer, aut Papaueraceam herbam uocasse Peplon hanc Hippocratem, testis est Galenus. Idem & Dioscorides testatur, spumeum Papauer ab alijs quibus dici affirmans: postq; hos omnes Plinius libro. 27. capite. 12. Quod non aliunde, q̃ ex seminis similitudine factum est: quod omnes albi Papaueris esse dixerunt. Paulus Aegineta præter id habere Peplon lac etiam ait, Tithymalorumq; modo purgare. Omnes itidem Sycen uocari dixerunt. Quæ uox græcis Ficum significat: & quoniam lacte arbor ea abundet, ideo Lactariæ herbæ cōmunicasse suum potuit nomen. Plinius quo diximus loco ipsdem notis descriptam facile cognoscendam diligentioribus reliquit.

De Peplide.

CAP. CLXXX.

Peples, quæ aliqui syluestrem Portulacam uocant, Hippocrates Peplion, in maritimis nascitur, largo frutice, candidi succi pleno, folijs satiuæ Portulacæ, rotundis, inferne rubentibus, semine sub folijs rotundo, uti in Peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi solet. Datur uti Peplos, & conditur. Easdem habet uires.

BARBARI COROLL.

Portulacas syluestres uocari herbas tris inuenio. Vnam quæ sit Atzoi species. Alteram cognomine Telephion. Tertiā Peplin, siue Peplion: de qua præsens mentio. Quid aut sit Diplion Actio, qui ad auctore id refert Aretæum, haud scio. Terentiū cum aqua inquit in angina morbo Diplion, & subiecto linamento, imponendum pectori, quoties præuocatio timeretur. Sunt apud Græcos, inter quos Isacius, qui Peplium, pro Senna modo appellata intelligant. Ego diuersum puto genus: cum Senna filiquas, & in ipsa semine ferat, Peplis non ferat. Alia est & Sennicula, siue Sanicula uocata, trasalpina herba, folio Vitis, aut Apij rubentibus, in sine sectionū maculis quibusdam, surreculis quoq; rubris ad radicē: quæ multis ei fibris subest, capitulis in summo frutice pusillis subnigrisq;: huius succū uulneratis in potum cōmendant.

EX M. VERG. COMM.

Neutro gñe, sed eadē diminutua forma Galenus Peplion Peplida hanc uocat, & ad ducendam pituitā & bilem semine eius cōmendat: auctoreq; Hippocrate, disciendis inflationibus utilem prædicauit. Paulus Aegineta a decretis scriptoris huius non discens, feruidi saporis semen habere Peplida hanc ait, Peplioq; pariter purgare. Quā ob causam eandē Peplo esse aliqui crediderūt, folijsq; in declinatione nois discrimen esse. Verūtamen certis discriminibus duæ inter se plantæ differūt: præsertimq; foliorū, quæ in altera Rutæ, in altera Portulacæ sunt. Ex quo

C factum est, ut tertium genus syluestris Portulacæ hæc credita fuerit. Et sane similis illi paulo minus quæ tota figura est: adeo, ut facile pro Portulaca fallere legentes possit.

De Chamæsyce.

CAP. CLXXXI.

χαμαίσυκη

Chamæsyce aliqui Syce, alij spumofum Papauer uocitant. Ramos emittit quaternū digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos, folia Lentis, parua, Peplum plane referētia, tenuia, quæ a terra non attolluntur, semine sub folijs rotundo, ut in Peplo. Neque caulem, neque florem promit. Radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex uino triti uulua dolores sedant, in pefso appositi. Tollūt tumores, ac uerrucas omnium generū illiti. Decoctorū cibo, aliis resoluuntur. Succus simili effectu prodest. Illitus contra scorpionis ictum auxiliatur. Aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squalidis petrosisque nascitur.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

Chamæsyce, pumila Ficus est, quasi terræ Ficum significans.

D Quæ a Lactarijs herbis deinceps a scriptore hoc numerata, tractataque sunt Pityusa, Lactyrus, Peplos, & Peplis, uno, quæ cætera desint, lactis liquore, quæ secunda omnes destillant, facile congeneres, nulla intercedente herba, fruticeue alio, coniuncta merito descriptione in eo habuerunt. Nec aliunde humilis, iacensque in terra terrestris Ficus hæc, quæ tota Chamæsyces græcis significatio est, in ordinem & numerum illarum uenit: soloque lacte, quod Ficus simile habet, honestiorem quæ decebat ab arbore appellationem inuenit. Neque enim ramos, folia, fructusue ficulneos habet. Quod Fico commune habet, lac tantum est. Quam ob causam parum proprie pumilam Ficum, quod aliqui fecerunt, eam aliquis dixerit. Aliud enim est pumilam Platanum, & Cerasum dicere coactæ breuitatis arbores: & aliud quas Græci Chamæsyce, Chamæcisson, & alia huiusmodi. Illæ siquidem suum genus seruantes, sola breuitate ab alijs differunt: hæc similitudine aliqua tantum, & alicuius solum partis in alio genere constitutæ, deficiente omni alio nomine, ab arbore, plantaue alia, cui in ea parte similes sunt, id impetrarunt. Quod facillime in Chamæsyce hac deprehendit: quæ ramulos suos per terram spargit, & folia Lentis habet parua, ut hic ait, tenuiaque, & in terra iacentia: quæ longissime a Fico arbore absunt: nec relinquunt, unde sic uocari debuerit, quæ lactis liquor, quo multis oculorum uitijs & morbis medetur.

De Scammonia.

CAP. CLXXXII.

σκαμμωνία

Scammonia aliquibus Scambonia radix, alijs Colophonias, alijs Dactylion, Romanis Colophonium, Magis Apopleumonos, Aegyptijs Sanilum dicitur. Ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant, folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, densis, & triangulis. Flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauidi. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excuatur: quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis Iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem Scammonium læue, nitidum, rarum, & colore quæ simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ contermina deportatur. Nec attendere

solum par est, si linguæ tactu albescat. Hoc enim euenit adulterato, qđ admisto sit Tithymali lacte. Sed longe magis antea narratis. Item si nō uehementer linguam exurat. Id quod misti Tithymali argumentū est. Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauiā, dēsa, Erui farina, & Tithymalo uitiata. Succus drachmæ unius, aut quartum obolorum pondere haustus, ex aqua pura, uel mulsā, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum Sesama, aliove semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi quaterni oboli cum duobus Veratri nigri, & Aloes drachma una. Fiunt purgatorijs sales drachmis uiginti succi Scāmōniæ, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionē uiriū. Integer quidem tria cochlearia, medius duo, minimus unum. Radicis drachma una, aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat, succus uulvæ in lania subditus. Tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus. Decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

BARBARI COROLL.

Scāmōnia, siue ut Cicero, & Plinius quandoq; appellant Scāmōnium: quancq; Scāmōniū, p succo eius quoq; carpitur. Frigida amat loca, pingui tamen & arido solo nascens. Lachrymā e radice sua fundit, folijs albis, pinguibus, radice nauseosa. Circa canis ortum succus excipitur. Adulterant Tithymali marini succo, maxime in Iudæa: quod etiam strangulat sumptum. Vis bimo, nec ante, nec postea. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Priennense, specie autē nitidū, cito liquefcens, uirum redolens, somniosum, linguæ tactu lactescēs, & cū diluū albescēs.

EX. M. VERG. COMM.

Erimus ueterum & iuniorum exemplo in Scāmōniq; & Scāmōnij cōmentatione breuiore. Quotidiani enim in medicina usus res est: nullusq; non audito alterius nomine, intelligit qđ ad purgationes præsentem, & maximam uim habet: noueruntq; omnes quem uendunt officinæ, concretum ex radice herbæ liquorem. Quæ multis quidem locis prouenit. Probatissima autem transmarinis regionibus, præsertimq; Asia, & toto Colophonio agro. Ex qua regione factum illi aliquando fuisse nomen hic a gentibus testatur. Quæ dum probatissimum Scāmōniū quæ runt, & ex Colophone Asiæ id petunt, paulatim fecerunt, ut quæ bonitatis nota erat, in nomē & appellationem transferit. Verumtamen facile id nomen perijt: seruat ubiq; quod primum eraptius illi fuerat a principio factum: quod nos credimus rationem a fossura habere: quā hic ad excipiendum liquorem fieri docet, οὐκ ἔστιν enim græcis fodere est. Vocauitq; gens illa scāmōnino genere Scāmōniam herbam: masculino autem, aut neutro, exceptum ex secta radice eius ὀπὸν, aut ὀπῖον, id est, liquorem. Fecitq; usus, qui plerumq; liquoris eius est, ut misceretur quondam, & adhuc misceantur in appellationibus simul, liquor, & planta. Probatiores tamen græci neutro genere semper Scāmōnium liquorem uocauerunt. Sic Plutarchus in commentario, quo docet quibus notis discernendus ab amico adulator sit, cum moneret, non esse in calamitate & infortunio castigandum hominem: quoniam non aliter reiecturus tunc præcepta illa esset, qđ si ægroto assidens medicus diceret, ob præteriti temporis uoluptates, nimiam uenere, lōgiore coenas, & quotidianam ebrietatem omnia illi ea mala adesse. Fieri enim, ut respōdeat dolens, iratusq; παρακινῆσαι καὶ μοι κακόν τι καὶ σκαμμόνιον, οὐ δὲ νοσήσεις καὶ φιλοσοφῆς. Quod est. Preparatur mihi Castorium & Scāmōnium, tu autem mones & philosopharis. Protulitq; genere neutro Scāmōnium, ὀπῖον, id est, collectum & seruatum in medicinis usum radicis Scāmōniæ liquorem intelligens. Descripsit lōgiore historia Plinius Scāmōnium & Scāmōniam lib. 26. ca. 9. Hortamurq; nos bonarum literarum studiosos, omnia eius scriptoris di-

Pli. li. 26. ca. 9

D I O S C O R I D I S

Cetera, singulasque voces cum Dioscoride confetre. Neque enim erit ad utramque partem negligendi operæ precium. Siquidem intelligent in radice descriptione, quam hic ait *ῥαπίδιον*, quæ vox græcis graueolentem simpliciter significat, ab eo nauseosam dici: & quam hic *ῥαπίδιον* id est, liquore abundantem, madidam: multaque alia quæ Barbarus Plinium imitatus, ab aliquibus forte longius a scriptoris huius sensu discessisse videbitur: madidam enim & ille vertit. Nos quoniam post tot secula sentimus mutatam in multis vocibus antiquam significationis æstimationem, aut si ea adhuc seruetur, apertiores tamen docendi rationem ineundam in his esse, uertimus graueolentem, & multo liquore abundantem: ipsam uocem uestigijs huic scriptori per plantas eius ingredientibus.

De Chamelæa. CAP. CLXXXII.
Chamelæam aliqui Pyros agnen, alij Heracleon, alij Bdelyram, alij Coccon gnidion, Romani Citocacium, nonnulli Oleaginē, quidam Oleastellum uocant. Surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia Oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, foetibus præsertim in catapotio deuoratis. Namque duæ Absinthij partes, adiecta Chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapocia coguntur. Ea autem in uentre non liquefcunt. Siquidem quot fuere deuorata, regerunt. Folijs cum melle tritis sordida ulcera & crustola repurgant.

BARBARICOROLL.
Chamelæa, frutex est petrosus. Sunt ei (ut quidam habent codices) mora odorata Plinio. Quidam folia ei amara & odorata scribunt. Simillimum huic oleum inest, ut Oleastro: cuius & baccas quoque similes habet, ob id a quibusdam Oleastellum, & Olea ciliabra uocatur, autore Columella, Sirapam inde conditi solitam scribente. Sunt qui succum in Gallia, aut Italia nascentis, eundem esse cum Euphorbio putauerint. Sed hic multum infra illum est. Ex hac & granum Cocci plerique falso nasci existimauere. Nostri & hanc, & Thymelæam præcipue Casia uidentur appellasse. Theophrastus Cneoron: Igino id apud nos Casia interpretat. Cuius duo genera feruntur. Candida, cui folium cutis modo quadamtenus oleagineum. Nigra carnosum, Tamarici similis, siue ut in Theophrasto quidam (quos probo) legunt, Myrto. Candida magis humi se spargit, & odorata est, Nigra sine odore. Radix ambabus alta, pergrandis, rami copiosi, crassi, surculosi, ab terra protinus aut paulo supra emicant, admodum lenti, ut quibus ad uinciedum, p. iunco utant. Venere in coronamenta folio. Post æquinoctium autumnus germinant, atque florem mittunt, qui diutius eis est. Hæc tota de Cneoro siue Casia Theophrasti sententia est. Dioscorid, Cestron, & Cneoron uocari Thymelæam prodit. At ego non Cestron, sed Cneoron legendum arbitror, Hippocratis, & Galeni, & codicum uetustorum fretus autoritate. Hoc ipso nomine Cultellus appellatur quo casei scabunt: quanquam & Tyrognestis, & Cobelis quæ is dicit Poluci. Liparotis herbe meminit Aetius, & Alexandria sic uocante: quam aliqui Cneestron ingenerant, ad ulcera capitis manantia uehementer utilis. Nec indicatis autor, qualis ea sit: utrumne a Thymelæa, siue Cneoro diuersam, an eandem putarit. Recentiores, ut plerique omnia, Chamelæam, & Thymelæam cum Daphnoide turpiter confundunt.

EX M. VERG. COMM.
Non ausim ego dicere, quod fecisse uidentur aliqui, pro comperto mihi esse, græcorum Chamelæam capite hoc a Dioscor. tractatam, Columellæ Cilibracæ oleam esse, quam. 11. uolumine, capite. 49. scriptor ille, propter similitudinem Oleastellum a quibusdam uocari ait. Quæ enim numerantur ab eo illic ad Sirapæ confectioem Oliuarum genera, ex arboribus, non fruticibus legi præcipiuntur, posæ, licinæ, & culminæ, omnes in Oliuarum censu inter primas laudatæ: quibus uerisimile est, connumerari debuisse eam quæ egregiæ bonitatis pariter esset: præsertim dicente eodem Columella. Verumtamen habetur præcipua in hos usus olea Ciliabra: quam quidam propter similitudinem Oleastellum uocant. Ratiocinari enim ex his oportet, meliorem phario remque Cilibracæ oleam præmonstratis illis esse: quod parum uerisimile est in Bacca, Oliuæque illa quæ sola similitudine, non quæ cõgener oleis sit, in censum earum uenerit. Nec obstat dicere Columellæ, propter similitudinem Oleastellum uocari. Potest enim ad totius arboris formam id re-

ferri. At Plinius. 15. uolumine cap. 7. oleum ex Chamelæa fieri testat, expresso ex oleastris simillimum. Scimus id quidem: & nisi aliud doceatur, ex oliuis oleum etiam exprimi, oportere: si exprimendum ex Chamelæa oleum sit, oliuas baccasue in ea intelligi: quod tamen hic in Chamelæa historia non testatur: & si Plinius aperte id dicat, non constituimus ob eam causam Cilibracam Columellæ oleam: etsi Oleastellum uocari a quibusdam ille dicat Dioscoridis Chamelæam omnino esse. Siquidem oportet ad conficiendam Sirapam (sic enim ab eo appellatur, oliuarum cōdituræ antiquum genus) meliores probatioresq; oliuas eligi: quæ si in Chamelæa sint, quemadmodum ex Plinio ratiocinari licet, immaturas, asperasq; & quales in Oleastris sunt intelligere oportet. Non enim Olea Chamelæa est, sed a foliorū similitudine furculosus, & dodrantalis frutex sic appellatus. Eamq; ob causam, si baccas, aut oliuas fert, quales diximus esse, eas uerisimile est. Patetq; id ex eodem Plinio quo diximus loco, dicente post descriptum ex oleastro oleum, Simillimū huic est ex Chamelæa frutice, folijs Oleastri, baccisq; frutice saxoso, nō altiore palmo. Quæ tota descriptio longe a scriptoris huius historia diuerla est. His nos rationibus usi, quod in Dioscoridis legitur, aliqui uero Citocatiū Chamelæam uocant, nō mirauimus: & si ea uox nihil modo nobis significet: sed qualis in cunctis græcis est, seruata a nobis fuit. Barbarus literarum prima uestigia secutus, Cilibracum ex Columella interpretatus est. Neq; aliam ob causam longius dicta hæc a nobis sunt, q̃ ut diuersitatis huius, & seruata a nobis cōmunis lectionis ratio omnibus pateret. Heraciam mox, id est, Herculeam uocari etiam Chamelæam in Dioscoridis legitur. Credimusq; nos factum id nomen ex antiqua fabula fuisse, quam ex Pindaro in Oleastro primo uolumine retulimus: q̃ scilicet Hercules ex Scythia coronatus Oleastro in Græciam redierit: & quoniam similis Chamelææ Oleaster sit, & Oleastro Chamelæa, ideo similitudine decepti aliqui, non Oleastrum, sed Chamelæam Herculeam uocauerint fruticem & coronam. Reliquimus etiam contra aliorū interpretum rationem quod inter has appellationes auditur, ἡ χαμδαία μίλανα. Quod est, aliqui autem Chamelæam nigram. Error enim id eorum est, qui græcarum uocum similitudine decepti, Chamelæonem cum Chamelæa miscuerunt. Neq; enim nigredo Chamelææ competit. Qui colore nigro a candido discernitur, Chamelæon est. Et quoniam nihil in Chamelæa id causæ haberet, inutiles eas uoces expunximus. Errasse autem in duabus his plantis non græci tantum, sed latini, & hi quidem inter medicos probatissimi Auicenna, & Serapion uidentur. Qui Mezereon, quæ Chamelæa hæc barbaris est describentes, multa quæ Chamelæoni debentur illi tribuerunt: & ediuerso. Poteruntq; uolentes id certius in Chamelæone, & Mezereon posteriorum scriptorum uidere. Sunt Chamelææ huius appellationes aliæ, uerumtamen improprie, & ex alijs plantis importune ad hanc relatæ. Quemadmodum in Tymelæa quæ mox sequitur patebit. Ea enim proprie Pyrosachne, & Cnidium granum uocatur, si Plinio & antiquis græcis credendum est.

De Thymelæa. CAP. CLXXXIII.

Thymelæam alij Ghamelæam, alij Pyros agnen, alij Cestron aut Cineoron uocant. Ex qua Granum cnidium, quod est Thymelææ fructus, colligitur. Hoc Syri Apollinū, alij Linum appellant. Quoniam satui Lini frutex suapte natura similitudinē referat. Virgas edit perpulchras, tenues, tripedaneas, folijs Chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosissq; si mordeantur: flore candido, fructu Myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubescit, pulpa fructus dura, foris nigra, intus alba, quæ per inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur. Verum fauces adurit. Itaq; cum farina, aut polenta, aut in uuæ acino dari debet, aut melle cocto obducta deuorari. Qui agre desudant, trito semine cū nitro & aceto inunguntur. Folia quæ peculiariter Gneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere cōuenit. Illiū

Aa ij

A

B

Θυμδαία
χαμδαία

Cacetabuli modo cum diluta potione, aquam extrahit. Mediocris purgat, addita Lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina uux acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta. Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinatur qui Coccon Cnidium fructum esse Chamelææ existimant. Falluntur enim quadam foliorum similitudine.

Pli. li. 12. ca. 21

DE Thymelæa, granum, siue Coccon Cnidium enasci constat, Myrti magnitudine, colore & specie foris, autore Dioscoride, non farris, ut in Plinianis codicibus deprauate legitur. De Thymelæa nonnihil & superiore protinus mentione diximus.

EX M. VERG. COMM.

ANtiquæ, & antiquorum scriptorum autoritate receptæ appellationes omnes, Thymelææ scriptori adiectæ sunt. Quandoquidem Plinius, 13. uolumine, capite, 21. his uerbis de Thymelæa egit. Fruticem uero Thymelæam, alij Chamelæam, alij Pyrosachnen, alij Cnestren, alij Cneoron. Qui uocum & nominum numerus idem huic scriptori est. Theophrastus itidem primo de plantarum historia de foliorum diuersitate agens, Cneoron Thymelæam uocauit. Eius uerba hæc sunt. τὰ δὲ ὅτιον σαρκοφυλλὰ πῦρ δὲ ὅτι σαρκοφυλλὰ ἔχουσι τὸ φύλλον ὅσον κηρύττου μύρτιν ὁμοίαν. τῶν δὲ φρυγανικῶν κνήκων σάχην, τῶν δὲ πικρῶν ἐνίσχον. &c. Quod est. Carnosi folij quædam etiā: & id quidem, quoniam carnosum id habent qualis Cupressus, Myrice, & Malus est. In surculo fo itidem genere Cneoros & Stæbe, & in herbaceo Sedum. Quæ ex scriptore illo repetita. & cōmentationibus his nostris addita sunt: ut qualis Thymelæa hæc sit certius adhuc cognoscat. Surculosi generis herba, & carnosii folij: quæ in Diosc. conscienda magis, q̃ manifeste intelligenda sunt. Siquidem uirgas in ea dixit, & Lino comparauit, & folia pingua gumosaq; descripsit. Quod totum Plinius ex Theophrasto acceptum eodem loco retulit, simile Oleastro Thymelæam faciens: folijs angustioribus, gumosis si mordeantur, Myrti magnitudine, &c. In quo laudandus etiam Theophrastus, qui folium Thymelææ describens, Cneoron eā uocauit: quæ si sciret & ipse quod Diosc. testatur, folia tantum ea uoce censeret. In 9. deinde remedia & uires eius tractaturus, Cnidium granum uocauit, easdemq; huic scriptori uires illi assignauit. ὁ δὲ κνίδιος κνήκος στρογγύλον ἔχον τὴν χρυαὴν μίσην δὲ τοῦ πεπύρωτος ἰσχυρότερον δὲ πικρὸν τὴν θερμότητι, διὸ καὶ ἔστιν διδιδάσκον κατὰ ποτὸν, διδιδάσκον γὰρ πρὸς κοιλίαν λίσιν ἐν ἄρτε ἢ σίκατι περιπατῶντες, καὶ γὰρ ἄλλως τὴν φάρμακον. Quod est. Cnidium uero granum rotundum, coloreq; rubens, semen fert Pipe re maius, multoq; ad calefaciendum Pipere ualidius. Quam ob causam cum dant (datur autē ad soluendam aluum) in pane, aut adipe inuolutum dant: alioquin fauces urit. Et hæc nominū diuersitas in Theophrasti Thymelæa est. Quibus addiderunt alij alia: uocaruntq; aliqui Pyrosachnem, ab urendi uī quam habet. Pyr enim græci ignem uocāt. Nec aliud Pyrosachne, compositum ex igne & tenui stipula nomen indicat, q̃ quod egregie urit. Chamelæa eadem dicta sit: quoniam ut Plinius ait, Oleastro similis sit: ut hic scriptor autem, quoniam Chamelææ, quæ superiore capite præmonstrata est, folia similia habet: quod totum eodem redit. Quod enim simili simile est, eandem similitudinis causam & principium habere oportet. Cnestro postremo eandem hanc Thymelæam uocarunt probatissimi græcorum scriptores Hippocrates, Galenus, & pleriq; alij. Nobis tamē ignota uocis eius origo & causa. Comparauit eam Diosc. λίνω σάφρω: neq; aliud uoces illæ in cōmuni significationis æstimatione significant q̃ satium Linum. Quærendum ratū & eruiscandum diligentius opinamur, Lino ne satium simpliciter, an surculoso frutici, quem Sparton omnes uocant, & hic eodem hoc libro descripsit, similem Thymelæam dixerit. Nobis in hanc partem inclinari animus: & si aliorum interpretum modo & nos satium Linum uerterimus. Genistæ em̄ similior, q̃ Lino ex historia, descriptioneq; eius uideri potest. Vniuersæ plantæ nomen factum uidetur ab Olea cui similis est, & a Thyma herba cuius habet flores. Paulus Aegineta præter ea quæ nunc in Diosc. leguntur, radicē eius contra sanguinū p̃fluuiā cōmendauit, uiribus, saporeq; acerbis: eiq; malo prodesse potā & foris impositam.

2273

A De Sabuco. CAP. CLXXXIII.
Cten aliqui Dendron arctu, alij Hemeron, Latini Sabucum, Galli Scobiem, Daci Sebam uocant. Ex eo genere quædam in

arborem assurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candidi-
cantes, proceros. Folia luglandis terna, quaternauc, ex interuallis circa
ramos exeunt, grauiā odore, minutim in ambitu secta, & in ramulorum
cacuminibus cauliculisq; circinatae umbellae, quae florem candidum pa-
riunt, mox fructum Terebintho similem, in nigredine subpurpureū,
acinosum, succo madentem, uinosumq;.

BARBARI COROLL.

SAbucum medulla carere aiunt nonnulli. Theophrastus Carnosam ei adiungit. Fruticosa
uirgis arbor: quae anniculae, donec folia deciderint in longitudinem crescant. In sena maxime
cubita: post id tempus in crassitudinem fundantur. Lignum fungosum, & cum inaruit leuissi-
mum: medulla molli; quae tota uirgulis eximitur baculorum usu. Siccatum durat, inoffensum
q; aquis redditur, etiam decorticatum, quod ei sponte arido contingit. Caudici crassitudo ga-
lea. Cortex laevis, tenuis, spissus: quem uocant Canopum, cuius a Graecis in Iuliani Oxy-
melle fit mentio. Radices tellure summa, nec multas, nec grades agit. Folium minus, quod quide-
pars est maioris, molle oblongumq; habet, ut laurus latifolia, maiusculum tamen, latiusculūq;
subtus & situ medio rotundius, exacutum, serratumq;. Folium uero maius, qd ex illis minori-
bus quasi coalescit, pediculo uno crasso & neruoso geritur, ceu ramulus, folijs utrinq; genicu-
latim & ordine iugatis, uno in uerticibus relicto singulari. Subruffa haec, & fungosa, & de sin-
gulis petiolis uniuersa collabuntur. Sunt & in ramis nouellis internodia, sed quasi rudia, inar-
ticulataq;. Flos candidus, ex flosculis minutis, faui specie congestus, e pediculi fissura, graui o-
dore, quanq; Lilij. Fructus quoq; racematim pediculo unico dependet. Astion uocatus, qui
cum ematuruit, nigrescat. Immaturo color uitae acidae, paulo maior q; Eruum, humore lento.
Manus capillumq; inficit. Grana intus sesamacea, non ingrata turdis, sturnisq;. Locis potissi-
mum opacis, & iuxta aquas gignitur. Differt a ferulaceo genere, q; plus ligni ac succi habet, q;
Ferula. E Sabuco magis canoram buccinam tubamq; credit pastor, ibi caesa ubi gallorum can-
tum frutex ille non exaudiat. Dictam puto arborem, a Sambuca musico instrumento, quod
alij Pectida uocant, alij Magadin: ut in arundine notauimus. Sambuca porro, ab autore uide-
tur appellata: cui nomen Sambyx fuerit. Viam tamen ea primam omnium Sibylla perhibent.
Arbor utiq; ipsa non Sambucus, sed Sabucus dicenda est: si Serenio Quinto credimus.

Pli. li. 16. ca. 19
26. 40.
lib. 24. cap. 5.

B

De Ebulo. CAP. CLXXXV.

ALTERVM genus Chamgaeae uocatur, alijs Helio-
saeae, alijs Agria aeae, alijs Euboica, Romanis Ebulum, Gallis
Ducone, Dacis Oliua. Ebulum longe humilior est, magisq; herbaceo
generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs Amygdalae,
ex interuallo longioribus, geniculatim distributis in uersus, graueolen-
tibus, in ambitu serratis, muscario Sabuci flore, & acino eiusdem. Radi-
ce nitiū longa, crassitudine digitali. Eade utriusq; uis & usus, refrigerās, et
exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum mo-
re coquuntur ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in pa-
tinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta & in cibis data, hy-
dropicos adiuuat. Prodest uiperarum morsibus, eodem pota modo.
Vulvas emollit insidentium decocto. Laxat earum spiracula, & uicij
corrigit. Acini in uino poti eodem funguntur munere. Denigrant ca-
pillis illiti. Folia si praetenera ac mollia ex polenta illinantur, inflam-
mationem mitigant. Ambustis, & canis morsibus illitu profunt. Vlce-
ra quae dehiscunt in fistulam, agglutinant, lis qui podagra tentatur, cū

χαμαίαντα

Aa iij

C seuo hircino profunt illita folia.

Pli. li. 25. ca. 10
lib. 26. cap. 3.

E Buli, siue Chamæactes, hoc est, Sabuci pumilæ foliorum decocto, muscæ necantur. nam & colibuli macerantur aqua, ut ea sparfa culices abigantur, Baccas, flores ue Ebuli, aut Sabuci uidetur intellexisse Plautus cum dixit in Captiuis, Laridum, Atq; Ebebulas foueri focolis feruentibus. Nisi quis herbulas in eo uersu lecitare malit: aut qd' propius est uero, epulas. Ouidius, Epulisq; foci miscere calentes. Aut hanc, aut ualde similem esse puto, quam Plinius Actæan uocauit uigesimo septimo uolumine. Actæa inquit, graui foliorum odore, caulibus Anisi geniculatis, semine nigro ut Hederae baccis mollibus. Nascitur in opacis, & asperis, & aquosis, datur acetabulo pleno, interioribus foeminarum morbis. Pro eo quod Dioscorides in caulibus umbellas, & capitula Chamæacten habere scribit, Plinius caules Anisi reddit ei: quanq; non caulibus Anisi, sed asperis in plebisq; legitur codicibus. Sed exemplaria quædam uetusta legunt Anisi, non asperis.

ΠΥΚΝΟΜΟΝ

P De Pycnocomo. CAP. CLXXXVI.

P Y C N Ocomon constat Erucae folijs, acrioribus, scabris, & crassis, caule quadrangulo, flore Ocimi, semine Marrubij, radice nigra, rotunda, lutei coloris, exigui Mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis. Semen grauius somnia & tumultuosafacit, drachmæ instar potum. Tumores discutit, illitum cum polenta. Spicula, adactosq; corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutunt. Radix eius in aqua malsa duum drachmarum pondere, aluum et bilem extrahit.

Pli. li. 26. ca. 3.

B A R B A R I C O R O L L.

P Ycnocomon, caule tenui, modico.

E X M. V E R G. C O M M.

S Vnt Plinio, & scriptori huic nostro de Pycnocomo omnia eadem: tantumq; non hîsdē uerbis cuncta latinus scriptor ex græco genti suæ reddidit. Locutus est, 26. uoluminis. s. capite. A foliorum confecta densitate nomen illi fecerunt græci. Neq; enim aliud Pycnocomon indicat, q̃ quod densa & conferta coma est. Herbarum autem comæ folia sunt, quæ hic a Plinio relictâ aspera constituit. Ille enim crassiora tantum & acriora q̃ Erucae sint dixit. Non indicauit etiam Plinius, quale semen Pycnocomi sit: non dico autem quale uiribus, sed figura & specie. Desyderauimusq; nos id magnopere, hoc agentes, ut uariam in græcis lectionem teste & auctore cōtutius eligeremus. Sunt enim in quibus Marrubij, in quibus Porri seminibus comparetur Pycnocomi semen, una id discrimen faciente litera. Cæteri interpretes communem secuti lectionē, Marrubio simile fecerunt: nos probatiores & uetustiores græcos, & quæ habemus egregiæ antiquitatis latinum Dioscoridem secuti, Porto comparauimus: uolumus tamen incertæ nobis rei fidem penes naturam esse. Discrepant in radice colore Plinius & Dioscorides, ille lutei coloris tantum: hic nigrum primum, mox ἀχρὺν, id est, pallidam, quod idem luteo colori est, descripsit. Susplicari multa in uarietate hac licet: aut deesse Plinio, aut abundare huic nigrum colorem, aut foris nigram, intus uero lutei coloris intelligi oportere, Pliniumq; alterum colorem tantum indicasse: quod suspicari ab re forte non fuerit. Nigram tantum tradit quem antiquissimū habemus latinus Diofco. Quotquot autem græcos uidimus, omnes nigrum & luteum colorem illi assignat. Eamq; ob causam inclināt animus nobis, ut credamus diuersos colores illos, ad diuersas referri oportere partes. Legentibus tamen hoc liberum sit, donec, ut in semine paulo ante diximus, natura & res cognita, tam multas difficultates extricauerint. Animaduertendum illud etiam in uiribus & potestate radice, dicere Plinium exinanire eam aluum, bilem, & pituitam: hunc autem & reliquos græcorum medicos, bilem tantum: & inter eos præsertim Paulū Aeginetam, qui Pycnocomi radicem, semen, & folia discutiendi & extrahendi uim habere ait: & semen, quia ualidius sit, infixæ corpori etiam extrahere. *πῖλον δὲ ξανθὸν χολῆς ὑγρῆς καθαρτικόν.* Quod est, Radicem uero flauam purgare bilem. Id Barbarus extenuare dixit, non satis apto ad eam uim uerbo, ut nouisse omnes facile possunt.

A De Apio, seu Radice syluestri. CAP. CLXXXVII.
 Pion nonnulli Ischiada, alij Camæbalanam agriam, alij Linozo-
 stin, Latini Radicem syluestrem, Pœni Thorphathfadæ appel-
 lant. Iuncos duos, siue tres spargit, rubros, tenues. Qui a terra parum at-
 tolluntur. Folijs Rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, hærba-
 ceis, semine paruo, radice Hastulæ regię, in formam Pyri turbinata, succi
 fecunda. Intus habet succum candidum. Extra, cortices nigros. Superior
 pars eius uomitione bilem pituitasq; extrahit. Inferior per aluum, Tota
 utrinq; purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili
 mergitur, & agitata aqua quod supernatat pinna selectū, exiccatur. Pur-
 gat utraq; parte is succus sesquibolo potus.

D E A P I O H E R B A, cognomento Ischas, quæ Raphani syluestris genus est, uolumine secun-
 do locuti sumus. Vbi omnia hæc ad uerbū fere uidentur esse repetita. Plinius, Oposcillam uo-
 cauit (ut arbitror) corrupte, pro Apios Ischas.

E X M. V E R G. C O M M.

Hæc est Apios illa solo nomine, sed ab imperitis facta, notissimæ cunctis Raphano con-
 gener existimata. De qua longius secundo uolumine in Rhaphano egimus; polliciti sumus;
 iterum hoc loco de ea dicendum nobis esse: haud sane quia superfuerint tunc aliqua, quibus
 nunc dictis secemenda hæc ab illa esset, sed q; inuenienda hoc loco, ueluti ex aliena possessione,
 ob eas quas tunc longius percurrimus causas, enicienda ex illo erat, tractandaq; cum cæteris,
 quæ efficacior in purgando uim habent. Quales multæ descriptæ hoc libro hætenus, & de-
 scribendæ adhuc plantæ sunt, syluestres omnes, montibus & incultis locis nascētes: non qua-
 lis fatiua in hortis, aut syluestris in campis Rhaphanus nascitur: quæ nihil huic simile æquale-
 ue, aut idem habet, non ramulos, non folia, non semen, nec radicem etiam. Siquidem in Rha-
 phanis longiores, in Apio hac rotundiores & pyri similes radices sunt. Quinetiam præter to-
 tam speciem obstat color, qui in nulla Rhaphano foris, ut in Apio hac niger conspicitur. Sunt
 aliæ plures etiam diuersitatis notæ, quas breuitati consulentes expendendas legentibus relin-
 quimus. Apion a radice forma Græci herbā appellauerūt. Est autē græcis Apion in pomorū ge-
 nere Pyrum. Et quoniam pyri forma radix eius sit, contractior tamen rotundiorq; ideo nomen
 hoc illi ea gens fecit. Antiquum sane, & quo, scribente Theophrasto plantarū historiam, Græ-
 cia passim utebatur. Neq; hoc tantum, uerum eo etiam quod secundo loco in hoc scriptore illi
 adijcitur. Verba eius nono de plantarum historia uolumine hæc sunt. τὸ δὲ τῆς ἀντὶς ρίζης τῆς
 ἰσχυρῆς καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ καθεστῆναι βαρυκαίοντος διὸν τῆς τι θαλάσσης καὶ τῆς ἰχθύος, οὗδ' ἂν πονοῦν καλοῦσι. Quod
 est. Purgare autē in eadem radice alias partes per superna, alias per inferna, magis mirabile: qua-
 les Thapsiæ sunt & Ischiadis, quā Apion aliqui appellant. Testis, ut uidetur, utriusq; appella-
 tionis Theophrastus est. Vtq; alterius appellatiōis Apij, scilicet manifesta est ex forma radice
 ratio, sic ignota nobis alterius: nec quā ob causam a coxendice, coxendicisue dolore, nisi hoc
 loco Ischias aliud significet, nomē id inuenerit ratio cinari licet. Est quidem omnibus in prom-
 ptu, facillimūq; ratiocinari, quia purget, & purgando dolores coxendicis leuet, sic forte appel-
 lata fuisse: sed nimis cōmune id est: neq; hic, aut Theophrastus quicq; pro coxēdicis dolore pa-
 lam illi tribuerūt. Quo fit, ut nos & si in cōmuni græcorū omniū lectione nihil mutare ausi sim-
 us, credamus non Ischiada, quæ uox coxendicem & eius dolores, sed Ischada, quæ Caricam
 significat, non absurde penitus existimasse quosdam dici Apion hanc oportere. Similis enim,
 & turbinata figura non aliter q; Pyrum Carica est. In Theophrasto quidem Ischas passim legi-
 tur, non Ischias. Quo fit, ne demiremur, qui in eo Caricam uerterunt. Quemadmodum
 non constituimus, scriptoris huius codicibus magis, quā Theophrasti credendum esse.
 Plinius nec Pyro, nec Caricæ radicem eius comparauit, sed Cepæ: atpiorem tamen q; Cepa
 sit, eam describens. Legitur paulo post in scriptore hoc, Chamæbalanon dici etiā Apion hanc.
 Ea uox terrestrem significat glādem, quasi latentem & obrutam terrā glandis forma radicem:
 oportetq; non glandis simpliciter intelligere, sed ut Græci Balanorū cōmuni appellatione lo-
 quuntur.

Ciores fructus indicant. Cur deinde agrestis, aut montana Raphanus dicta eadem fuerit, satis secundo uolunt in Raphano, & hoc loco dictum a nobis est. Radicem eius, ut fere in cunctis græcis legitur, Spondylion herbæ hic comparauit. Respondetq; id naturæ, quoniā & hæc, & Spondylion tertio uolumine tractata, Raphani radice describitur: oportetq; inuicem similia esse, quæ alteri pariter similia sunt. Vidimus tamen nos, in quibus non radix Spondylion similis legitur, sed Asphodelo, & his quidem probatissimis, & antiquæ fidei, quod ab re penitus non est. Siquidem Asphodeli bulbosæ radices illæ, non penitus dissimilē huic speciem habent. Secuti tamen communem lectionem & nos sumus, ob eam præsertim causam, q̃ hic in Spondylion radicem eius Raphano comparauit: & hæc ob eandem causam syluestris, & montana Raphanus a multis credita & dicta est.

De Colocynthide. CAP. CLXXVIII.

κολοκυνθίς

Colocynthis aliquibus Colocyntha ægos, alijs Sicya picra, alijs Alexadrina Colocyntha, Zoroastri Tymbra, Ostani Autogenes, Romanis Cucurbita syluatica, Dacis Tustrata dicitur. Sarmenta foliaq; satiuæ Cucurbitæ emittit, per terram repentiā, diuisa: fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratū, uehementer amarum, quem legere oportet, cum coeperit in luteum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam uim habet, si quatuor oboli melle cocto Myrrha & Nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ dysenteribus prosunt, neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli uitij, ut quæ bilem, pituitam & strimenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fœtus admotæ enecant. Dentium dolorem tollunt, si una repurgentur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulla, aut passum incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur. Virenti succo utilissime isehiadiçi perfricantur.

Pli. li. 20. ca. 3.

BARBARI COROLL.

Colocynthis, Cucurbita est syluestris, plena ipsa, nec inanis, ut Somphos, minor q̃ satiuæ. Primo herbacea, mox pallida, quæ & utilior est, quando eius sunt medicinæ. Hippocrates syluestrem Cucurbitā Sicyonem, & quæ fundo careat, & specie globosa & uniformi sit. Sicyan ἄτμντον, hoc est, infecilem appellat: interiorem uero partem eius, spongiam.

EX M. VERG. COMM.

Cucurbitulam Græcorum exēplo non male aliquis Colocynthida inter latinos dixisset. Cur enim, si licuit diminuto a Colocyntha, quæ illis Cucurbita est, nomine, syluestrem & amaram hanc Colocynthida dicere: nō liceat & nobis a latinorū Cucurbita, Cucurbitulā facere, æqualemq; illis æstimatione & uocis compositione, rei passim notæ appellationem ad medicinā asferre? Nos sane in eam partē trahebamur. Fuitq; diu nobis animus, Cucurbitulam huic capitulum facere: sed reuocauit nos ab eo consilio, recepta iam pridem a medicis oibus, & officinis græca uox: multoq; magis, ne æqui uoca appellatione miscerentur simul planta hæc, & quas latini scriptores omnes ad aliū medicinæ usum transfulerunt, Cucurbitulas eas uocantes, quæ spiritus, & præfocatae flammæ ui corporibus nostris impactæ in superiorem partem & extimā cutē sanguinē, & q̃ alia opus fuerint, trahūt. Eaq; ob eam seruata græca appellatione, de Colocynthide, q̃ syluestris Cucurbita est, caput inscripsimus. Alioq; Colocynthis parua Cucurbita est. Fecerūtq; eā Cucurbitis alijs congenerē Viticulæ folia & fructus: ideoq; tā multas ab eadē Cucurbita appellationes alias inuenit. Credimusq; nos, qd in Diosco. legitur, ὅτι δὲ κολοκύνθα ἀγρῶς, quæ uoces nihil significat aliud q̃ capræ Cucurbitam, & a cunctis ex eo caprina Cucurbita reddita est, potuisse q̃ndā legi ὅτι δὲ κολοκύνθα ἀγρῶς, qd est, syluestris Cucurbita. Nolumus nūc querere, uelcant ne ea capræ, an nō; amaritudinēq; eius in cibo sentiāt: & an qd ho-

mini nocet, possit alijs animalibus nō nocere. Quotidianum enim id est. Fitq; passim quod Lucetius cecinit, ut non sit idem nobis & brutis multarū rerum sensus. Quippe uidere licet, pinguescere saepe Cicuta barbigeras pecudes, homini quæ est acce uenenum. Verum quod suspi-
cari hoc nos coegit, plantę genus est, quæ ab omnibus in syluestriū censu numeratur: omnesq; Colocynthida describentes, syluestrem Cucurbitam uocant. Et omnium maxime Plinius lib. 20. capite. 3. Quod a scriptore sioc relinquendū fuisse uerisimile non est. Monere id uoluimus, & si non multifaciendum forte aliquibus uideatur. Fecit amaritudo, quæ Colocynthidi maxima est, & omnibus tam manifesta, ut qui plantam, & rem ignorat, solo Colocynthis audito nō mine, amaritudinem intelligant, ut amara Cucurbita a quibusdam etiam diceretur. Quemad-
modum quoniam copiosa in Aegypto nascitur, cuius rei testes etiam sacre hebræorum literæ sunt, Alexandrina Cucurbita. Et hæc pro Colocynthis appellationibus dicta hætenus sunt.

De Epithymo. CAP. CLXXXIX.

Epithymum Romani Inuolucruu uocant. Flos est e Thymo du-
riore, Satureię similis. Capitula habet tenuia & leuia, & in eis fi-
bras, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque
atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabur-
li mensura, ad quattuor drachmas, cum melle, sale & aceti exiguo. Plu-
rimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

BARBARI COROLL.

Epithymum, flos est Thymi, sed non omnis. Differentia, q; hic herbaceus, alterius Thymi
candidus. Aliqui eum Hippopheon uocant. Quidam aliter Epithymum tradunt, sine radice
nasci tenui, similitudine Pallioli rubens.

EX M. VERG. COMM.

Quod in Italia nascens nostrę ætatis herbarij Epithymon ostendunt, id nobis uidet quod
Plinius. 26. uolumine capite. 8. de Epithymo agens aliter ab illo & his uerbis descri-
psit. Quidam aliter Epithymū tradūt, sine radice nasci, tenui, similitudine Pallioli rubens, &c.
Tenuissimis quasi capillamentis in glomerem conuolutis, & his rubentibus Epithymon hoc
uidetur: Floribus minimis, candidisq; Thymo similibus: nullis ut ille ait radicibus: eaq; for-
ma, ut sanæ, stuppę glomerem uidere te credas. Quam ob causam, non male crediderit ali-
quis, potuisse hoc genus a posterioribus Inuolucrum dici. Quod enim ab hoc describitur, &
copiosum in Cappadocia & Pamphylia nasci traditur: diuersum, ut ex historia eius patet, et ali-
ud a nostrate hoc est: simile tamen, aut coniunctum Thymo aliquid habere nomen indicat
aut alterum forte Thymi genus esse a Theophrasto & Plinio descriptum, nigro colore: quod
tertio uolumine inter appellationes Thymi numeratum ab hoc scriptore est. Theophrastus
quidem palam id docet quinto de plantarum historia dicens, καὶ θυμὸν τὸ μὲν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν.
Quod est, Et Thymon candidum alterum, alterum nigrum. Et Plinius. 21. capite. 10. Toti-
dem & Thymi species, candidum, ac nigricans. Neq; hic aliud indicat, dicens Epithymum
Thymi esse florem durioris & Thymbrę similis, quasi alterum sit Thymi genus, mollins, nec
Thymbrę simile. Quocunq; autem modo se habet, si non alterum Thymi genus sit, coniun-
ctum Thymo aliquid esse oportet. Id em ea uox significat, quod in Thymo est scilicet. Et Pau-
lus Aegineta lib. 6. de eo agens, ait in tertio ordine siccare, calefacereq; Epithymum, & Thy-
mo efficacius esse. Quod ductu & conceptu uocum quod diximus ratiocinari facile est. Nihil
autem in eam partem magis nos trahit, q; nominis ratio, qua ut diximus, quod in Thymo sit,
nascaturue, intelligi oportet. Uritur eo idem Paulus, ut hic ait, in melancholicorum purgatio-
ne: nec minus etiam in ducenda simpliciter aluo. In quem usum bibi in uino iubet.

De Alypo. CAP. CXC.

Alypon surculosa herba est, subrubra, latis ramulis, tenuibus fo-
lijs, flore molli, copioso, radice Betæ, tenui, referta acri succo, se-
mine Epithymi. Gignitur in maritimis. Hac pleracq; Libyæ loca sca-
tent. Semen atram bilem deiecit, si mensura Epithymo pari cum sale
& aceto sumatur. Verum interanea leniter exulcerat.

C BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 4.

Alypon, & Alypea, & ut Paulo placet, Alypias, cauliculus est molli capite, non absimilis Betæ: ut inquit Plinius, acre gustatu ac lentum, mordensque uehementer & accendens. Caput, id est, radicem eius, Betæ similem intelligo, non folia: quippe quæ minuta ei sint: ut Dioscorides affirmat. Deprauata in Plinij uigesimo septimo libro Aliphon, pro Alypo legebatur, antequam ipsi locum indicarem.

E X M. V E R G. C O M M.

Semel tantum, & id etiam breuissime Alypi. 27. uolumine capite. 4. meminit Plinius. Nihil etiam Paulus Aegineta dictis decretisque scriptoris huius addidit. Vtinamque omnes non multo breuius & incertius, quam hic de eo tradidissent. Verba enim Plinij sunt. Alypon cauliculus est, molli capite, non dissimilis betæ: acre gustu, ac lentum, mordensque uehementer & accendens. Aluum soluit in aqua mulsa, addito sale modico. Minima portio duarum drachmarum, media quatuor, maxima sex, ea purgatione quibus datur e gallinaceo. Horum nihil, aut unum, alterumue in Dioscoridis legitur: cætera aut ab alijs accepta, aut aliter cognita Plinio fuerunt. Paulus Aegineta hisdem uerbis Dioscoridi subscripsit, Alypi dicens semen per inferna nigra purgare bilem, pari Epichymo mensura sumptum, additis aceto & sale. Veruntamen leuiter intestina exulcerare. Quæ tota est in scriptore hoc Alypi medicina. Qui deprehendisse nostra ætate Alypon se credunt, surculosam, ut hic ait, herbam: sed non ultra duos, tresue surculos in ea ostendunt: in quibus per interualla bina sunt folia rubentia, & in summo lutei floris umbella. Quæ posset Alypon credi, nisi radix quæ in scriptore hoc gracilis & quantitate betæ traditur, in ea longe crassior inueniretur. Potuit illi a ui sua nomen fieri: & quoniam nigram bilem purget, qua purgata animi tristitia in melancholicis pellitur, eaque pulsa adest statim lætitia humani animi naturalis habitus, sic dici. Est enim græcis Alypon, quod tristitia, doloreque caret, aut liberat.

De Empetro, seu Calcifraga. CAP. CXCI.

Pli. li. 27. ca. 9.

D

Empetron aliqui Phacoides uocant. Nascitur in montibus & maritimis, falso gustu. Sed quo propius terreno fuerit, amarior sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 9.

Empetron hoc Phacoides a Dioscoride, Prasoides a Galeno & Paulo cognominatur. Fere in saxo nascitur. Recenti uires sunt, uetustate perdit eas. Lapillos qui sufferuehant, una rumpi affirmat, quod & in Saxifraga quoque diximus ex Plinij sententia, ut qui nihil differre ab ea iudicaret: quandoquidem medicinas, quas seorsum in utraque mentione Dioscorides enumerat, ipse uniuersas Empetro huic assignat. Aut igitur ita sentiendum est: aut Plinium errasse confitendum. Paulus certe Dioscoridem secutus, mentiones duas habet, quasi duorum generum, Galenus uniuersam, Empetron Actius etiam Epipetron, uocari solitum affirmat.

E X M. V E R G. C O M M.

Nasci in petris Empetron satis indicat nomen. Epipetron eadem significatione ex antiquioribus aliqui etiam uocauerunt. Nec solum, quia Lentis figuræ & spem refert Phacoides, sed Marrubio simile Prasoides etiam. Plinius Saxifragam a latinis uocari ait: miscetque cum ea quæ priuatim & seorsum a Dioscoride Saxifraga hoc ipso uolumine descripta est. Ex quo iterum suspicari cogimur, quod in Saxifraga dictum hoc ipso uolumine a nobis est, non esse illud in hoc scriptore eo nomine recipiendum: aut si sit, quod uerisimile tamen non est, uariantibus historia & medicina, bis de eadem actum fuisse non multo ante sub titulo Saxifragæ: quæ latina, & iterum nunc sub Empetri, quæ tota græca uox est. Paulus quidem Aegineta, qui totum in. 6. suæ medicinæ Dioscoridem multa breuitate exscripsisse uidetur, Empetri manifeste meminit: Saxifragæ autem nusquam: quod non relinquendum ab eo fuerat, si tunc in Dioscoride Saxifraga legeretur, aut ipse pro diuersa eam recapisset. Crederemus nos, etiam eadem Saxifragam & Empetron esse, nisi diuersa penitus utriusque historia & medicina esset. Ob eam causam peritioribus hoc relinquemus, certius de Saxifraga inuenturis, quod recipiendum, constituendumque sit.

¶ De Clematide. CAP. CXCII.

Clematidem aliqui Epigeti, Aegyptij Philacum, Romani Ambuxum nominant. Viticulis constat subrubris, folio uehementer acri gustu, & exulcerante. Vicinis inuoluitur arboribus ut Smilax. Tritum semen, & ex aqua, aut hydromelite potū, bilem pituitamq; detrahit. Illita folia lepras eximunt. Cum lepidio conditur ad esum.

¶ De Labrusca. CAP. CXCIII.

Labrusca sarmenta Vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensij Solani, longioribus ac latioribus, muscoso flore, & capillaceo, fructu exiguis uuis simili, post maturitatē rubente. Rotunda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota, humorem alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuæ eius, uitia cutis in facie, & maculas omneis expurgant. Enascentes ramuli cibi gratia condiuntur.

BARBARI COROLL.

Ampelos agria, hoc est, Vitis syluestris, cæditur horis omnibus, sed præcipue autumno. Ra dice acri, ut Theophrastus scribit, folio spisso, candicante, geniculata, rimoso cortice, uuis rubentibus Cocci modo, ut Plinius. 23. uolumine. Hæc & pro Amuleto, cuius sit proprie uua Taminia. Radix & acini, coria perficiunt, gelidissimaq; eorum est natura. Vt errauerit Theodorus, qui uerba illa in Theophrasto *φλοῖνι τῷ καρπῷ τὰ δέρματα* interpretus ita sit, Fructu defoliant arbores: cum legere debuerit, non dendra, hoc est, arbores, sed derma, hoc est, corium: nec defoliant, sed depiant & subigunt. Pars acinorum æstu moritur, priusq; reliqua: qui & folstitiales dicuntur. Vniuersi nunq; maturescunt: & si prius q; tota uua maturescat, detur cibo. Generi gallinaceo fastidium gignit uuas appetendi. Flos huius in racemis candidus dependet Solani per initia, post diuiditur in uitis fere imaginem, sed oblongam. Est ei similis, sed in salicis nascens, ad eisdem usus quæ Salicastrum uocatur, contra hominum & quadrupedū scabiem, Plinius. 27. ita descripsit. Folio duro, cineracei coloris, uiticulis callosis, rubentibus qualiter flos quem Iouis flammam appellamus in Violis, ferens semen punici mali simile in acinis, ad eisdem effectus. Propterea e recentioribus fuere, qui hanc & flammulam, & Iouis quoq; flammam uocarunt. Est & Labrusca uitis syluestris una species, Oenanthen ferens, duorum generum, albi & nigri, ut Dioscorides post docebit: Neu quemq; decipiat Pliniana lectio, Labrusca inquit Oenanthen fert satis dictam, quæ a Græcis Ampelos agria appellatur, spissis & candicantibus folijs, geniculata, rimoso cortice, fert uuas rubentes, cocci modo, & reliqua. His uerbis Plinius. 23. uolumine duos fructes, non unum designat, Labruscam, & quæ Ampelos agria uocatur.

EX M. VERG. COMM.

Non est syluestris hæc Vitis quam Romani Labruscam dixerunt. Illa enim sola constitutionis priuatione à reliquo uitium genere differt: hæc uiticulari, & racemosi fructus, quæ fert, similitudine inter Vites numeratur. Eamq; ob causam, duobus locis ab hoc scriptore, hoc scilicet, & a quinti uoluminis principio statim de syluestri Vite agitur. Hæc inter herbas, illa inter Vites: hæc folio hortensij Solani describitur, illa utigineo folio intelligenda est. Et nihilominus, quod raro in ea gente sit, utriusq; idem nomen auditur: & utraq; Ampelos agria uocatur. Fuitq; hæc Plinio causa, nominum magis aliquando q; rerum ratione sequenti: ut bis diuersis locis de eadem syluestri hac Vite importune ageret. Primum. 23. uolumine capite. 2. inter Vites. Mox iterum. 27. capite. 7. inter herbas. Poterunt uolentes certius in eo quod dicimus cognoscere: legentesq; palam deprehendere, paulo minus q; totam duobus locis eiusdem plantæ historiam & medicinam esse. Quæ enim folia. 23. uolumine candicantia ab eo dicuntur. 27. deinde cineracei coloris uocantur: nullo discrimine inter candicans, & quod cineracei coloris sit. Quodq; priore illo loco in medicina decernitur, Radix decocta in aqua, & in uini Cōi cyathis duobus, humorem alui ciet, ideo hydropicis datur: in posteriore pariter docetur, Radix eius decocta in aquæ cyathis ternis, additis uini Cōi cyathis duobus, aluum soluit leniter: i.

A

κλματτιδε

κμπλοσ αγρια

Pli. li. 23. ca. 2.
lib. 27. ca. 7.

B

D I O S C O R I D I S

C deo hydropicis datur. Quæ ex multis monstrasse satis fit; ne dubitent qui in Pliniana lectio-
ne occupantur, quales in eo siluestres duæ Vites sint. Vna tamen tantum est, & inutiliter iterū
ab eo repetita, neq; apte inter Vites tractata; quoniam herba sit, & in herbarum censu seruan-
da fuerit. Nominis ut diximus ratio magis, q̃ rei misceri in eo hæc fecit. Theophrastus. 9. de
plantarum historia breuiter, & his uerbis de radice agrestis Vitis egit. θυμαντικὸν δὲ καὶ ἀγρὸν καὶ
τὸ ἀμπέλου τὸ ἀγρὸν ἢ φίλα, διὸ καὶ ἡ φίλαθρον χρίσαν καὶ ἰφιδίλας ἀπάζειν. τὰ δὲ καρπὰ φίλαθρον
τὰ ἀγρὸν, τὴν αὖτις δὲ πᾶσαν ὥραν ὁ πάρος δὲ μέδισκ. Quod est. Calefacit, acrisq; est, & syluestris
Vitis radix. Eamq; ob causam depilando est, & cutis aspredines exterit. Fructu depilantur co-
ria. Cæditur quocunq; tempore, sed autūno præcipue. Dictum a nobis hoc etiā est, quoniā &
a Theophrasto inter herbas Peucedanū, Daucum, Dracunculūq; non inter arbores syluestris
hæc Vitis numeratur; multoq; magis ob diuersitatē remediū ex ea contra cutis asperitates: qd
hic in fructu & acinis, Theophrastus in radice cōstituit. Videndū tamē, an syluestris hæc Theo-
phrastī Vitis ea sit, de qua nunc agimus: an quæ statim ab hac tractanda erit: ex quo depilare
fructū eius dicit; quod a Dioscoride albæ Viti, quæ mox dicitur, tribuitur. Sit ergo inter her-
bas syluestris Vitis, inter arbores autem Labrusca, suisq; notis utraq; quærētibus se ostendat:
illa, ut passim omnes nouerūt; hæc, ut a Dioscoride & alijs traditur, satui Solani folio a prin-
cipio, paulatim deinde in uitiginei figuram transeunte: uiticulis longis, & quales in Vite sunt
lignosis, asperis, rimosi corticis, acinis paruis, rotundis, in maturitate rubescētibus; quibus ob
seruatis notis, non erit difficile inter frutera eam, et in sepibus inuenire. Et si non adeo frequens
nascatur. Nos qualem hic descripsit aliquando uidimus.

De Vite alba.

C A P. CXIII.

ἀμπέλου λευκῆς

V I T E M A L B A M aliqui Bryoniam, alijs Ophiostaphylon,
alijs Chelidonium, aut Melothron, aut Psilothron, aut Arche-
zostin, aut Agrostin, aut Cedrostin appellant. Folijs sarmentis, pam-
pinisq; satiuam Vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos
D prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur. Fructus rubens
in uua dependet, quo coria pilis spoliantur. Ex ea asparagi, qui pri-
ma germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. For-
lia, fructus, radix, acrem uim sortiuntur. Itaq; ulcerum phagedænis,
gangrænīs, chironijs, putrentium tibiarum tedio, efficaciter ex sale illi-
nuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vitia cutis in facie,
uaroſq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta chia,
& scenogræco. Eodem effectū prodest decocta in oleo, usquedum li-
quescat. Sugillata tollit. Reduias committit. Inflammationes discu-
tit illita ex uino. Suppurationes rumpit. Medicamento apte immisce-
tur, quod carnem exest. Infracta ossa extrahit, trita & imposita. Da-
tur comitialibus in potu, drachmæ pondere cotidie anno toto. Prodest
attonitis & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra ui-
perarum ictus pota drachmis duabus auxiliatur. Partus necat. Mentem
interdum subturbat. Cit urinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, diffi-
cile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, uulsis, ruptis, & la-
terum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus con-
sumit. Illiniē ad eadem cum fico. Ad muliebres infessus decoquū. Siqui-
dem uulvas purgat, sed abortū facit. Succus e radice uere exprimit, qui
trahit pituitā cū aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semē efficaciter illi-
niē. Lactis abundantia facit succus eius, si cū tritico decocto sorbeat.

Ampelos leuce, hoc est, Vitis alba, quæ & Bryonia & Bryonias a Columella, & Madon ab antiquibus uocatur, Echtholus ab Hippocrate, Melothron (ut putatur) a Theophrasto, in coronas folio admissa. Quidam Psilothrum dicunt: quia pelles confici huius acinis, quemadmodum & Labruscæ possint. Huius sarmenta, longis & exilibus internodijs geniculata scandunt. Folia pampinosa, ad magnitudinem Hederæ diuiduntur, ut Vitis. Radix alba, gradis, Raphano similis. Semen in uua, raris acinis dependet, succo rubente, postea crocino, Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis.

EX M. VERG. COMM.

Quod poterat a legentibus in scriptoris huius Bryonia desiderari, quos scilicet natales habeat, & quibus locis inuenienda sit, Columella Romanus scriptor in carmine suo expleuit dicens. Quæq; tuas audax imitatur Nysie uites, Nec metuit sentes; nam uepribus improba surgens Achradas, indomitæq; Bryonias alligat ulmos. Bacchi uiribus similem, & in sepibus spinas, & aculeatos frutices alligantem describens: quæ tota fere est candida in hoc scriptore Bryonia historia. Monuit illud obiter etiam Romanus ille auctor, consueuisse ueteres ob quotidianum & multiplicem eius ad uitæ remedia usum, syluestrem alioquin stirpem in hortis conserere: ne cogerentur incultis locis, & inter sepes quærere, quod non in morbis tantum utile esset, sed in sanitatis usu simplex, & sale seruatum etiam placeret. Quod hic primum indicat, dicens comedi e terra primum prodeuntes Bryoniae asparagos. Mox etiam in primo Paulus Aegineta de omnibus asparagis agens. Et inter latinos Columella lib. 13. capite. 7. multarum herbarum cum floribus & coliculis suis condituram docens. Quæ omnia a posterioribus neglecta, dubium nobis modo utriusq; Bryoniae nomen & historiam faciunt. Cum tamen nihil ubiq; notius, & medicina etiâ nostri temporis, barbaris uocibus in his utens, cognita re, Bryoniam non satis cognoscit. Laudauit magnopere Bryoniae asparagos quo diximus loco Paulus Aegineta his uerbis. καὶ οἱ ἀπὸ τῆς βρυονίας ἀσπαραγοὶ ὑσώμαχοι μὲν καὶ διουρητικοὶ ἐλγὸν προοῖσι πικρὸν δὲ μᾶλλον τριφύλον τῶν ἀπὸ τῶν λαχάνων. Egerat eo loco is scriptor de his, qui nunc priuatim asparagi dicuntur: mox ea subiicit. Et Bryoniae asparagi stomacho quidem accommodati sunt, & urinam ciunt: parum tamen nutriunt: & si cum concoquuntur, olerum asparagis in nutriendo efficaciores sint. Quod totum ad sanitatis usum pertinet. Nam in medicina præter has aliæ ab eodem in sexto uires utriusq; Bryoniae assignantur. Omnes tamen ex hoc scriptore acceptæ, in quibus minus efficacem candida nigram, de qua mox dicitur, tradit. Nec aliud in remediis usu discrimen inter eas tradidit. Quibus autem notis & partibus inter se differant, facile erit ex scriptoris huius historia cognoscere: præsertimq; ex foliorum figura, & fructus colore. Sunt enim in alba satiuæ uitæ similia folia, pilosiora tamen: in nigra hederæ, priuatimq; Smilaci: fructus in utraq; quidem acinosus, sed in candida purpureus rufus scilicet, in nigra ante maturitatem uiridis, cum maturuit niger. Habet nigra etiâ radicis certas notas ab hoc scriptore traditas, quibus facillime discerni ab alia possit. Non erit, ut diximus, difficile in sepibus, & inter fruteta quærentibus utramq; Bryoniam deprehendere: ubiq; enim nascuntur: & cum deprehenderit aliquis, si uoluerit antiquorum exemplo earum asparagis in sanitate uti poterit: sin minus, medicinæ seruare. Numerauit Plinius. 23. uolumine capite. 2. Bryoniae albæ easdem huic scriptori appellationes Ophioistaphylem, Melothrum, Psilothrum, Archezostim, Cedrostim, & Nadon. Verum ultima hæc Dioscoridis, nulla est: nisi quæ in eo Chelidion legitur, Nadon legi debuerit: aut ediuerso legi in Plinio oporteat. Omnium huiusmodi nulla satis certa origo est: præterq; Psilothri, quæ a depilandis corijs, quem usum habent acini eius, facta est. Ex quo potuit etiam & Melothron fieri. Siquidem græci μέλοθρα dixerunt βέμματα & καλλυπύματα, id est, colorum infectiones & concinnationes. Quod corijs forte ex Bryoniae albæ fructu accederet. Sed in hoc scriptore per, ω, Melothron, in illis per, ο, scribitur. Potuit etiam Ophioistaphyle dici, quasi anguina uua. Id enim ea uox græcis indicat. In sepibus enim uirgineo folio, & acinoso fructu nascitur: in quibus & angues plerumq; latent: quasi crediderint aliqui, ut ex fatiis uiribus uuæ homini debentur, sic anguibus natura illas eo loco seruauerit.

De Vite nigra. C. A. P. CXC.

Nigra Vitis quam aliqui nigrâ Bryoniam uocant, alij Ghironion ampelon, alij Bucranion, Romani Oblameniam, alij Britaniam, alij Betisfalcam, Daci Priadelam, alij Pegrinam, Aphri Lauothen.

A Plin. li. 23. ca. 13.

B

ἀμπέλως μὲν λευκή

Bb

C Folia fert Hedere, sed maiora, smilaceis pxima, caules etiam cognatos. Capreolis suis arbores quasi adminicula cōprehēdit. Fructus racemati coherēt, qui inter principia uirēt, & post maturitatē nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxo colore nitet. Caules qui primo germinū par-
tu erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellunt. Vrinās cient. Lie-
nem absumunt. Vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione ten-
tatis profunt. Radix eadē quæ Vitis alba præstat, sed inefficacius. Fo-
lia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissime illi-
nuntur. Luxatis itidem imponuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Ampelos melæna, id est, Vitis nigra, quam proprie Bryoniam uocant, alij Gynecanthen, aut Aproniam, similem priori, præterq; colore, ut Plinius existimat. Sunt & in folio discrimi-
na, ut Dioscorides, & ipsa quoq; res demonstrat. Huius semen nigrum, Asparago simile. In fru-
ctis, & arundinetis maxime nascitur. Aiunt, si quis in uilla eam extruxerit, fugere accipitres,
tursq; fieri aues uillaticas. Hanc etiam Tannum, siue Tamum quidam uocari putant: & uul-
go Tamarum. Q. Columella,
Lubrica iam Lapatos, iam Tami sponte uirescunt.

Sunt qui Thamnum quoq; scribant, non Tamum, aut Tanum.

E X M. V E R G. C O M M.

Rarior inuentu, ideoq; cognitu difficilior nigra q; alba Bryonia est: inuenta tamen, totam
ueterum scriptorum historiam confirmat. Sunt illi per interualla cum folijs dispositi racemi: &
qui non ultra octo, decemue acinos ostendunt: multo minore q; in punice magnitudine: & co-
lore ante & post maturitatem quo ab hoc describuntur. Quos tamen hic caules uocat, nos po-
dius uiticulas dixerimus: earum enim speciem magis q; caulium habent. Maturescūt acini eius.
extrema æstate: & ubi minus calet, umbrosiq; locis autumnō. Nascitur & hæc, ut in alba dixi-
mus, in sepibus, & inter fruteta, propinquas stirpes ascendens, & alligans. Minor hæc q; alba
est, nec tam late ut illa uiticulas suas spargit. Pares utriusq; uires antiqui omnes esse tradiderūt:
ideoq; sine discrimine uti alterutra iusserunt. Licetq; id in Paulo Aegineta cognoscere: qui con-
tra nigras cicatrices, utriusq; ope his uerbis utitur. *ὁὐδὲς μὲν αἰνῶς ἀπὸ τῆς βρυονίας ἴσμεν δύνασθαι καὶ με-
λαινῆς ἐκθεῖσθαι ἐν ἰαίῳ ἀρχιχλωρίῳ τὸ ἰαίον ἐπιτιθεῖσθαι.* Quod est. Nigras cicatrices delet Bryo-
niæ radicis albæ & nigrae in oleo decoctæ, &c. De eius appellationibus non est quod dicamus,
præterq; Chironiam uitem uocari potuisse: aut q; Chiron medicinae & herbarum in Thessalia
peritissimus, ulceribus iumentorum & hominum ex ea primus remedium inuenerit: aut q; Chi-
ronijs ulceribus ea ueteres mederentur. Quod autem in scriptore hoc legitur, uua Taminiam
dici a Romanis, falsum est. Alia enim a Bryonia Taminia uua est: quemadmodum Latini anti-
quiores omnes docuerunt.

De Filice C A P. C X C V I.

PTerin Græcorum alij Pterineon, alij Dacidonon, alij Anaspho-
ron, alij Blechnon, alij Polyrhizon uocant. Magi Hermubain,
Romani Filicam, alij Laculem, alij Filifanariam, Aegyptij Asini sangui-
nem. Folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali
longitudine exeunt, multifida & lateribus pinnata, subgrauī odore, ra-
dice per summa cespitum nigra, oblonga, multis capillamentis fibrata,
subadstringente gustu. Nascitur in montibus & saxosis. Radix latas ti-
neas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa. Melius si cum
Scamoniae, aut Veratri nigri totidem obolis detur. Sed qui sumunt, æ-
lia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix &
potu & illitu prodest ijs qui arundinibus cæsi sunt. Probatur maxime,

quæ in arundinetis proueniat & locis Pulegio scatentibus.

BARBARI COROLL.

Pteris, hoc est, Filix, marcescit simo iniecto, & ob id pecoris incubitu: quod & in Medica herba nonnulli tradunt. Nullus Filici incisc succus. Radici gustus e dulci astruigens. Vna hæc est, & ex ea Filices exeunt, bina etiam cubita excedentes longitudine, hanc marem existimant. A Filicibus Filicæ, ut a Caricibus Carectæ dicimus. Est autem Carex e qua molliissime texuntur cathedræ. Folio fere arundinis, uliginoso, & palustri solo plurima. Seruius Caricem describit acutam, & durissimam, Sparto similem. A Filice Filicæones dictos existimant; quos ueteres pro malis & inutilibus accipiebant. Dicebantur & Felicati calices a Filice.

EX M. VERG. COMM.

Inuisam Maro in Georgicis suis, contra in Buccolicis ἀπαλὴν, id est, mollem, & ex eo amabilem Theocritus Filicem, clari rerum omnium peritiæ poetæ duo dixerunt. Neuter tamen simpliciter, sed alter araris & frumentario agro, alter pastoribus & pecori: eadem fortuna qua tota fere natura est, quæ benigna semper & utilis, quod alijs importune abstulit, aut in quo nocuit alijs liberaliter dedit & profuit. Sterilitatis, aut parū fecundū ad fruges agri, indicium Filix est: & præter id obliquis & longis radicibus terram amplexa, bubulcos & boues longioris laboris tedio arantes remoratur. Contra, in montibus, incultisq; locis nascens, grata pecori & pastoribus quæ sita: his cubilia & tomenta per hyemē sicca præbens, illi utroq; tempore cibos. Inutilis homini & infelix, nisi eiusdem naturæ benignitate malorum remedijs & medicina ipsa etiam se miscuisset: nataq; in nobis uentris animalia enecaret, & perimeret. Quod nō tantum hic docet, sed multo certius Theophrastus ad extremū nonum de plantarū historia uolumen. Cuius de Filicis potestate & ui uerba hæc sunt. ἡ δὲ τῆς πτέριδος φύλα μόνον τῶ χυλῷ γλυκύτροφος. ἡ δὲ πλάττων ἐκβάλλει. σπέρμα δὲ οὐκ ἔχει οὐδὲ ὄπλον. τίμνωσθαι δὲ ἀραίαν μεταπάρων φασίν. Quod est. Radix uero Filicis sola, sapore dulci simul & acerbō est. Latos lumbricos pellit. Non semen, non liquorē habet. Ferunt tempestiuā autumnō secari. Pluribus in scriptore hoc appellatōnibus Filix indicatur: pluresq; earum ab alis auium, quarum speciem in ramulis disposita eius folia referunt, factæ a gentibus fuerunt. Pennatus enim & pennatis folijs frutex Filix est. Quæ quoniam numerosa & conferta in pilosis ramulis eius sunt, ideo etiam a quibusdam Dasyclonos dicta est, δασύς enim hirsutum, pilosum, & asperum græcis significat. Quod deinde in eodē scriptore hoc passim, & in cunctis græcis legitur, uocari a quibusdam Filicē βλάχων, id est, ut nos uertimus, Blachnon, parum certam nobis habet rationem. Nec scimus, an ex Pulegio, quod βλάχωνα ueteres aliqui nominauerunt, ad Filicem male & importune deflexa appellatio ea fuerit. Siquidē nihil Pulegio & Filici simile, comune est. Nec legisse meminimus, gustatam pecori primū Filicem, quod Pulegio omnes tribuerunt. Balatū in toto grege excitare: ideoq; sic uocatam fuisse. Et nihilominus, ut paulo ante testati sumus, quorū uerba uidimus græcorum codices, Blachnon uocari Filicem indicant. Solus Nicander in Theriacis suis, nisi alia Filicis in eo ea uox sit, aut male in eo id legatur, aliter appellationem hanc protulit. Verfusculus eius est. ἡ δὲ πολλὸς χυλὸς βλάθρον περιβάλλει χάριτι. Blethrum ille, nō Blachnon Filicem in multa folia diuisam uocauit. Quiq; interpretatus est eum græcus scriptor, Blethrum ait Filicē dici, quæ etiam Blachnon nominetur. Ex quo si recipiendum sit hominis testimonium, colligere oportebit, utroq; modo & Blachnon, & Blethrum Filicem quondam dictam fuisse. Eamq; ob causam nos nihil mutantes, Blachnon uocari eam a quibusdam uertimus. Folia hic sine caule Filicem merito, & ex re uocauit. Sunt enim sibi folia non minuta illa, quæ numerosa & pene infinita totis ramulis disposita sunt, sed quæ uno pediculo cubitali, ut hic ait, longitudine a terra statim, aut ex stipite eius exeunt in plura & minora alia illa foliola diuisa. Nullos habet caules Filix. Si quid enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem habet: quoniam negato illi semine, merito caulem natura etiam negauit. Propter semen enim plærumq; caulis est. Sterilem, & sine semine omnes Filicem dixerunt. Falsumq; est quod iactant aliqui, una solstitiali nocte florere Filicem: eademq; hora cum defloruit, maturum in terram semē cadere: ideoq; nisi aliquis tunc adfuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse. Quæ omnia Agyrtarum cōmenta sunt, humanæ ignorantia ad questum tam impudenter illudentium. Neq; hoc mendacis genere contenti, ne quid fraudi eorū & sceleri deesset, religionem etiam cōmentis suis addiderunt. Natali nocte eius, quo (ut sacræ Christianorū literæ testantur) inter natos mulierum maior alius non surrexit, cuncta illa fieri & obseruari præcipientes. Nec sentiunt, quo dierum numero natalis ea nox, & solstitialis illa nunc inter se distent.

Bb η

A

Pli. li. 27. ca. 9.

B

D I O S C O R I D I S

C Sterilis, ut rem nostram agamus, priuataq; semine Filix est. Quodq; a natura sibi ea non inuenit, homini etiam inuidet. Siquidem quod in scriptore hoc non legitur, uetres græcorum medici & herbarij, posse Filicem dixerunt uiuentes in utero animantium foetus enecare, et enecios pelleré. Quod ab hac statim dicendæ Thelypteridi a Dioscoride tribuitur. Cuius & Filicis pares paulominus q̃ omnino uires sunt.

Θηλυπτερίς

De Filice foemina. CAP. CXC VII.

Thelypterin, aliqui Nymphæam Pterin nominant, Romani Lin-
guam ceruinam, folijs Filicis, furculosis & quæ non singulari
ut illa pediculo fulciantur, radicibus longis, pluribus, latis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pel-
lunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate sumpto. Potæ
cum uino drachmis tribus teretes tineas efficiunt. Datæ foeminis steri-
litate faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina
humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. lumentorū
cervicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uē-
trem emolliant.

BARBARI COROLL.

Thelypterin alterum Filicis genus, foeminam appellant. Folijs hæc bræuior, mollior, den-
sior, canaliculata. Vtriusq; radicibus sues pinguescunt: quæ sunt eis longæ, obliquæ, nigrae, præ-
cipue cum inaruer. Siccant eas sole, Virgilij occidentibus effossas. Nascuntur ubiq; sed ma-
xime frigido solo. Vtriusq; lateribus pinnata: unde Græci nomen imposuere. His cimices neci-
tur. Serpente non recipiunt. Vfus radicis in trimatu tantum, nec ultra, nec citra. Laudant in
utroq; sexu Macedonicam: deinde Cassiopicam.

EX M. VERG. COMM.

COpiosior, & pluribus locis Filix q̃ Thelypteris nascitur: ideoq; rusticæ & urbanæ plebi no-
tior: & quatenus homini inuicilis planta, in minore honore est. Alioquin eosdē natales, easdēq;
uires utraq; habet: specie etiam adeo similes, ut imperitos inuicem sæpe fallant. Quod aut ma-
xime simile habent, pinnata folia sunt, eodem ordine & magnitudine in utraq; disposita. Quod
contra discrepat inter eas, ramuli, & ramulorum color est: qui fruticosi in hac ab uno princi-
pio ex terra oriuntur, & quo colore radices hic esse ait, in nigro ruffo, & aliquando rubente ui-
dentur. Discrepat & illud, q̃ Filix ubiq; fere nascitur, & contumax agricolæ repugnat, post con-
sitos etiam agros regerminans: Hæc locis incultis, frigidis, umbrosis, & humentibus semper in-
uenitur. Quā ob causam Nympha Pteris, id est, Nympha Filix dicta est: q̃ nymphas, id est
solitudines, nemora, & aquas amet. Foeminā Filicem græci eam nominauerunt, non sexus di-
uersitate aliqua, sed ut ea ratione qualia in plantis & medica materia pleraq; alia sunt, a priore
illa discernere. Plinius, & græcorum herbarij alij, & medici simul, continuataq; historia de
utraq; egerunt: hic tamen seorsum. Eumq; nos secuti, duobus capitibus, duas descripsimus pla-
tas. Alioquin non male forsan coniunxisset eas aliquis: tanta inter eas similitudo, & tam comu-
ne genus, paresq; uires sunt. Legebantur in hoc capite contra q̃ oporteret duo. Alterum Barba-
rus ex Plinio emendauit, in radicum historia, s. in qua male in græcis legitur πλατῖται, quæ uox
latitudinem significat: cum tamen nulla sit radicibus his latitudo. Vnius literæ uisum & lapsus
id fecit. πλατῖται enim, id est, obliquæ, legi oportet. Plinius de his agens ait. Radices utriq; longæ
in obliquum, nigrae, &c. Alterum ambo interpretes ex eodem Plinio emendari posse non ani-
maduerunt. Est autem ad ultimum capite, quo loco hic ait, καὶ ἕκαστος διαβῆ. &c. quarum uo-
cum sensus quidem est, ut illi crediderūt, Etsi prægnans supergrediatur, &c. Verum non διαβῆ,
quod supergredi significat, sed λαβῆ, quod est, sumat, legi oportebat. Sic qui uetustissimus &
probatissimæ fidei apud nos est græcus Diosc. habet. Sic ratio etiam ostendit: & Plinius confir-
mat dicens, Neutra danda foeminis: quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Pl-
nio etiam antiquior Theophrastus lib. 9. de plantarum historia de Thelypteride hac his uerbis
docuit. ἡ δὲ θηλυπτερίς χρησίμη πρὸς τὰς ἑμινθὰς τὰς τε πλατῖτας καὶ τὰς λεπτάς, πρὸς μὲν τὰς πλατῖτας
ἀναδινύμην μόνον. πρὸς δὲ τὰς λεπτάς ἢ διὰ γλυκὺ, καὶ ἀλφίτων διδωδῶν, γυναικὶ δὲ τὰν γιλοῦν, τὰν μὲν
ἑμίνθην ἐν ἑσθλῶν φασίν, τὰν δὲ μὴ, τὸ δὲ ὅλον ἄτεκνον γίνεσθαι. Quorum sensus est, Vtilis autem contra

lumbricos uentris Thelypteris, & latos, & graciles. Contra latos quidem cum melle, cōtra grāciles aut in uino dulci cum polenta. Quinetiam si mulieri detur, prāgnanti quidem abortū, simpliciter autem foeminis sterilitatem facere dicitur. Et hāc Theophrastus eadē cunctis alijs. Oēs, ut uidet, cibo potuue Thelypteridis sterilecere foeminas, grauidas uero abortū facere affirmāt. Nullus aut, si grauida Filicem hanc supgradiat, fieri abortum testatur. Eamq; ob causam, totte stūi concordī fide & autoritate, aliter q̄ ceteri locum, & ut legitur intrepide uertimus.

De Filicula. CAP. CXCVIII.

Polypodion aliqui Scolopendrion, alij Pterin, alij Polyrrhizon, Latini Filiculam uocant. Nascitur in muscosis petris, & uetustis arborum caudicibus, prāsertim Quercuum, palmi altitudine, Filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuifura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu poliporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus hārbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgādī uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua, ad aluum soluendam. Aridae farina aquae mulsae insparsa, detrahīt bilem & pituitā. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus digitorum fissuras.

B A R B A R I C O R O L L.

Polypodion, nostri, ut Theodorus putat, Filiculam appellant, in Plinio ita legens. Ego Filiculam dicendum arbitror, cum ex Dioscoride, tum ex Filicis similitudine: tum ex Catone, q̄ Feliculam uocauit, ad deiciendam aluum prāberi iubens eam. Eodem modo & Columella nominauit. Vnde uinum Polypodites quoq; ad eundem usum fit, prācipuum in Phoenice oppido eius Byblo: ut inquit Aetius. Post imbres semper emicat hāc herba, floret, & semen non fert.

EX M. VERG. COMM.

Folia Romanis Filiculā, Grācis pilosae cauernosaeq; acetabulorum modo radices Polypodii fecerunt: exiguam herbam, ideoq; diminuto nomine ab utraq; gente appellatam. Folia enim (quod hic Theophrastus, Plinius, latiniq; & grāci fere omnes testantur) Filici similia habet: radices autem pilosas, minimi digiti crassitudine. Sed quod marinis Polypis cognominem plantam fecit, per longitudinem certis interuallis dispositi concaui tumores, eadem specie et naturae usu quo in polypis acetabula uidentur, fuerunt. Neq; enim a multitudine pedū, quos nullo habet ut polypum, Polypodium grāci herbam nominauerunt, sed quoniam polypo, quā diximus nota similis est, sic quondam uocata fuit: nulla alia q̄ exigui polypi significatione. Diminutum siquidem a polypo nomen Polypodium est. Facile intelliget quod dicimus, qui oculatus testis radicis eius fuerit. Videbit enim qualem nos diximus crassitudine, & uillositate radicem: mox in ea apertos & concauos tumores quosdam, quibus nititur & hāret: non aliter q̄ in mari polypi acetabulis suis hārent, sugunt, & quae coeperunt tenent. Qualia autem Acetabula sint, & unde ad multas naturae partes id nomen transferit, in Acetabulo herba, & alibi longius diximus. Idque est quod Plinius uicesimo sexto uolumine ait. Radix crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri. Felici descriptione usus, rei quam antea Theophrastus, & hic scriptor isdem fere uerbis tradiderant. Theophrasti uerba libro nono de plantarum historia sunt, quo loco de radicum diuersitate agit, hāc. ἡ δὲ τοῦ πολυπόδιου δὴ οὐκ ἔχει ἰχθυόσας κοτυλιδόνας, ὥστε αἱ τοῦ πολυπόδου πικτάναι, καθάραι δὲ καὶ τὸ φύλλον ἔχει ὁμοίον τῇ πτέριδι τῇ μεγάλῃ καὶ οὐταὶ ἐν ταῖς πέτραις. Quorū sensus est. Pilosa aut Polypodij radix, acetabula habens, qualia polyporū cirri habent: purgat per inferna. Foliū maiori Filici simile habet, & in petris nascitur. Hic non tam manifeste rem descripsit: sed cum dixisset habere Polypodij radicem cirros polypo similes, cogitanda legentibus reliquit acetabula: quae necessario eos sequuntur, & sine quibus in polypis cirri esse nō possunt. Alioquin differunt a Cirris Acetabula. Illi enim tota polyporum flagella sunt: hae autem in flagellis & cirris his cauernosae concauitates, quibus id animal nititur, apprehendit, & apprehensa exfugit. Et hae tota Polypodij nominis ratio in grācis, & causa fuit. Romani, quae certius & in aperto magis erant folia contemplati, Filiculam uocauerūt. Testaturq; id Plinius, eodem loco dicens. Detrahīt bilem Polypodium, quam nostri Filiculam uocant. Similis enim Filici est. Sed multo certius ante eum, M. Catō operis sui

Bb iij

πολυπόδιον

Pli. li. 26. ca. 8.
& 12.

B

C de re rustica capite centesimo quinquagesimo octauo, qui cum familiam rusticam doceret, quo modo aluum deicere oporteat, plura simul coqui iubebat: frustum de perna Brassicae, & betae, cum radice sua coliculos: tum Filiculae paulum, Polypodium hanc intelligens: cui, testantibus id cunctis alijs, egregia in purgando uis est. Polyrhizon, id est, multiradicem uocari hic etiam ait, ut paulo ante diximus, a copia radicum: quod nomen accreuisse nos illi credimus ex pilositate eius. Nasci in petris tantum Theophrastus ait. Omnes alij tamen ultra petras in arborum, praesertimque quercuum truncis prouenire etiam tradiderunt. Probantque officinae, ex quercu magis, quam ex petris, aut alijs arboribus. Plinius sub arboribus uetustis nasci ait. Caeteri uero in, non sub arboribus. Addidit ille tamen uetustatem necessariam Polypodij natalibus. Inter corticis enim rimas nascitur, quas uetustiores tum arbores amisso iuuentutis humore & leuore ducunt.

De Dryopteri. CAP. CXCIX.

dryopteris

DRYOPTERIN aliqui Pterion, alij Nymphaeam Pterin nominant. Nascitur in ueterum roborum musco, Filici similis, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim primum usque dum sudorem euocet: mox sudor abluitur, & recess imponitur.

Pli. li. 27. ca. 69.

BARBARI COROLL.

D

Dryopteris, folio subdulci diuersa huic, sed similis est, Dryophonon a Plinio uocata, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis utrinque folijs, Pollicari amplitudine: qualibus Oxymyrline, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sabuci. Edunt cauliculos eius decoctos: semine uero pro Pipere utuntur.

EX M. VERG. COMM.

QVERNA Filix Dryopteris est: id enim graecis ea uox significat. Eamque ob causam ex Filice pleraque illi nomina accreuerunt. Polypodio similis eousque Dryopteris est, ut saepe carpentes fallat. Filici enim similis ut illud, & in uetustis quercubus pariter nascitur. Quod discrepat, radix est, & in natalibus muscosae arborum illarum partes. Sapor in utraque idem, sed ad medicinam uires diuersae. Breuissime de ea antiquiores omnes egerunt. Nosque eos secuti, nihil ultra de ea monebimus, quam oportere in carpendo diligentiores herbarios esse: ne si legentes similitudo fefellerit, nullas Polypodij uires esse utentibus credendum relinquat.

κνικος

De Cnico. CAP. CC.

CNICUS folijs constat oblongis, asperis spinosis, caule sesquipeda li, capitulo magnitudine grandis oliuae, flore Croci, semine candido, alioqui ruffo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi succus adiectis amygdalis, nitro, aneto, & melle decocto, cogitur in placentulas, quae aluum emolliunt. Haec in frusta quatuor finduntur, quae nucis iuglandis magnitudinem impleant. E quibus ante coenam duo uel tria sumpsisse satis est. Ratio temperandi haec est. Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anesi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendae alui facultate donat.

Pli. li. 21. ca. 15.

BARBARI COROLL.

CNecos, a Theodoro Cartamum sermone tulgi dicitur. Multis caulibus, ramisque sespargit. Desyluestri diximus in Atractylide. In Cneco peculiare illud a Theophrasto redditur: quod syluestre tenerius, leuius, & semine copiosius habetur: Satiuum durius, spinosius. Cnicon Italiae ignotam, ut Plinius scribit, Aegyptus maxime celebrat, oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt

ex semine eius, quo & pſitaci nunc aluntur. Cnecos melius q̄ Cnicos dicitur. Nam & Cnacon, a seminis colore Theocritus pro candido, siue flauo usurpar. Democritus, & omnino chymici florem Cnici Echumenion appellant. Iidem Elydrion herbam nominant: nec quæ sit ea docent, præterq̄, q̄ lutei sit coloris. Inuenio tamen in Opisthiographis medicinalibus quibusdam, pro Chelidonio minore acceptam Elydrion.

EX M. VERG. COMM.

Agyptiam ubiq̄ in historia sua, & Italiae ignotam Plinius Cnicon suam facit: conficiq̄ in ea gente ex eius semine oleum. Theophrastus, aliq̄ omnes, non magis in Aegypto q̄ Græcia & alijs locis nasci decreuisse uidentur: simpliciter de ea agentes, nullumq̄ huiuscemodi discrimen in ea indicantes. Eorum nos, priuatimq̄ scriptoris huius historiam secuti, quam nouerūt rura omnia aculeatam herbam intelligimus. Cuius flore ad coloranda obsonia, pro croco rustica plebs passim nūc etiam utitur, Crocumq̄ sarracenum totus Etruscus ager uocat. Congruunt enim omnes illi quæ a scriptore hoc notæ illi tribuuntur. Foliorum modica longitudo, incisio, asperitas, aculei, cubitalis caulis, & in eo capitulum: flos itidem Croco similis: potestremumq̄ omniū candidum, oblongum, & angulosum semen: eamq̄ ob causam uulgarem, & quotidiani pro Croco usus herbam intelligimus: quam diligentius etiam rura ob eā utilitatem serere consueuerunt. Nolumus, ut factū ab alijs est, quomodo ab agresti fuso Cnicos differat docere, & an congener illi, diuersaue sit. Ex Theophrasto enim libro. 6. de plantarum historia nouisse huiuscemodi aliquid forte diligentior quispiam poterit. Qui duo genera Cnici constituens, syluestre, & satium, in altero potuit hanc, in altero illam numerare. Locus in eo nobis non satis integer uidetur. Eamq̄ ob causam nihil ultra ex eo constituimus.

Mercuriali.

CAP. CCI.

Linozostin marem, e Græcis aliqui Parthenion, alijs Argyron, alijs Aritrillin, alijs Chrysitin, Aegyptij Aphlopho, aliqui Hermobotanion, Latini Mercurialem masculam, alijs Testiculatam. Aphri Asumes uocant. Folijs constat Ocimi minoribus, Helxinæ cognatis, ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fructu in semina copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari e foliorū sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis una cohærentibus. Frutice dodrantali, aut maiore. Vtraq̄ in oleribus manditur, ad aluum ciendam. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq̄ detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere, ut sceminæ illam, si a purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoveantur.

BARBARI COROLL.

Linozostis, siue Parthenion a Mercurio inuentus est. Ideo apud Græcos Hermupōan, & Hermubotanen multi uocant. Caule utriusq̄ generis cubitali interdum, sed ramoso in cacumine, geniculis densis. Semen in geniculis dependens. Sceminæ solum & candidum, mari iuxta genicula stans, breue, rariis, contortū. Folia Ocimo angustiora, sed maribus nigriora, sceminis uero candidiora. Radix superuacua, præteruis. Nascitur in campestribus cultis.

EX M. VERG. COMM.

Commendat se statim diuino noīe Mercurialis herba, uulgaris alioquin, uinetisq̄ & campis fere omnibus nascens: aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiā inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Vna, præcipuaq̄ illi in deſcienda aluo naturæ uis est, & a cunctis in medicinæ usu recepta. Numerauit, quo diximus in Polypodio capite. M. Cato & hanc inter ea quæ familiā rusticam ad deſciendam aluū docebat, monens non multū ex ea accipiendū esse. Quæ uis quoniā cōmunis illi cum pluribus alijs est, non uidetur diuino nominis ornare eam debuisse. Credimusq̄ nos, quod in extremo capite ex aliorū fide a Dioscoride, & a Plinio. 25. uolumine, capite. 5. traditum est, diuini eius nominis causam illi fuisse. Id enim magis Deum hominibus ostendisse decuit, rarum, incognitū, multisq̄ omnibus seculis optatum: qui aut dum ægre ferunt, plures sibi nasci filias: uxorūq̄ suarū in eo sexu fecunditatē calamitosam sibi fore aniaduertunt, aut dum nominis sui memoriā, generis subſidiū, hæredes fa-

Bb iij

C milia, & Reipub. ciues post se quotidianis uictimis & precibus reliquisse optant. Qua ratione alia præstare id sibi possent, a Deo cognouerunt. Factumq; ex eo est, ut Græci ἰριου πόναν, id est, Mercurij herbam, latini Mercurialem uocauerint; notam uulgo, ut diximus, & quæ ob nimiam soluendi uim, quam habet, pro maledicto in gente nostra etiam nunc sit.

De Cynocrambe.

C A P. CCII.

Cynia, aut Cynocrambe, aliquibus Linozostis, Aphris Armas, alijs Asumessabon dicitur. Cauliculum binum palmorum altitudine emittit, mollem, subalbidum, folia Mercuriali, aut Hederae similia, certis interstitijs subalbida. Semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota aluum cient. Oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamq; detrahunt.

BARBARI COROLL.

Cynia non est ea, quam Theodorus Canariam interpretatus est, ut in Culice docuimus. E X M. V E R G. C O M M.

Qualis canina hæc Brassica sit, non satis nobis constat. Si nomen solum expendatur, eadem Apocyno, quæ non multo ante hoc ipso uolumine tractata est, uidebitur. Si uires, & quæ posse traditur, Mercurialis esse merito credetur: præsertim ipsdem penitus uerbis in hoc scriptore tractata. Quæ enim de ea feruntur, semen eam secus folia habere exiguum, rotundumq; potam præterea, aluum soluere: & olerum modo coctam, bilem & aquas corporis trahere: omnia paulo ante dictæ Mercurialis herbæ sunt. Quod autem nos maxime suspenderit, & in ancipiti turbauit, uetustissimorum græcorum codicum, & latinorum fides est: in quibus non legitur hoc caput. Nec Plinius (quod hæcenus deprehenderim) aut Theophrastus de ea alicubi agentes. Inclinat ideo animus nobis, adulterinū scriptoris huius esse hoc caput, & alterius Mercurialis herbæ traditam ab aliquo sub hoc titulo historiam esse. Censebunt de ea peritiores. Nos enim quod ignoramus fateri pudebit.

D

ἡλιότροπον το
μίσυα

De Heliotropio magno.

C A P. CCIII.

Heliotropium magnum aliqui Scorpiuron uocant, alijs Heliotropon, alijs Dialion, alijs Heliopon, alijs Scorpioctonon, alijs Sesamion agrion, alijs Scorpij uran. Flos ei est effigie scorpionis caudæ. Vnde Scorpiuro ei nomen. Et quoniam folia cum sole circumagat, Heliotropion dicitur. Folia Ocimi habet, hirsutiora & candidiora, & maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut subfuluus. Incuruatur ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & inutilis. Nascitur in asperis. Decocta ex aqua fasciculo manus plenæ, pituita, bilēq; per aluum extrahit. Contra scorpionū ictus & potu & illitu prodest. Adalligat, ut conceptū adiuet. Aiunt per horā unam ante accessiones, seminis grana quatuor, quartanas finire, tria uero, tertianas. Illitum semen formicantes uerrucas, penilesq; & thymi florem representantes, & epynictidas exiccat. Folia infantiū destillationibus, quas syriaseis uocāt, podagris, luxatisq; utilissime illinuntur. Menses cient. Partus trita & imposita pellunt.

BARBA.

Heliotropium a Cornelio Celso Solaris herba dicitur, æterno folio. Particulatim ut Ocimum fleret: ideoq; perq̄ diu. Incipiens ab imo per solstitiū circūagat se cum sole, ut nomē indicat, ut ortum eius mane spectet, et eius iter ad occasum usq; persequatur. Sed & nubilo die. Noctū uelut syderis desiderio contrahit ceruleum, ut Plinius ait, florem: album, subruffumq; ut Dioscorides. Genera eius duo. Maius Heliostraphon cognominatum. Et minus. Quæ utrunq; semipedalem altitudinem non excedit, Semen in folliculis messibus colligitur. Nasci-

tur nō nisi in pingui solo, cultoque maxime. Colos Heliotropij, unus est e tribus fastigijs, in que conchilium diuisere ueteres; nostri Verrucariam appellauerunt: ut ualentem contra uerrucas. Si terram furculo huius circumscribat aliquis, negant scorpionem egredi. Imposita uero herba, aut inde omnino respersum, protinus mori. Formicas certe agri efficacissime necari Heliotropio monstratum est, opulatis herba earum foraminibus. Succum huius excipiunt æstate hora sexta, miscens cum uino, ut sit firmior. Multa Magi de ea, sicut de cognomine quoque gemma pollicentur. Sed hæc propositi nostri haud sunt.

V E X M. V E R G. C O M M.
Varro rerum rusticarum primo uolumine capite. 46. Heliotropium describens, sic uocari ait, quod solis ortum mane spectat, & eius iter ita sequitur ad occasum, ut semper eum spectet. In Malua ex Theophrasto omnium huiusmodi causa reddita a nobis fuit. Scorpionum mox, & Scorpionij cauda a floribus, uel ut nos certius dici credimus, seminis inflexione, quæ Scorpionum caudæ, ut hic ait, speciem refert, dictum Heliotropium fuit. Scorpionum non autem a uiribus quas contra Scorpionum ictus efficacissimas habet: & quia scorpiones enecet, ideo Scorpionum dictum etiam est. In reliquis non tam certa ratio est, ut doceri a nobis possint. Solarem latini priuatimque Celsus uocauerunt, græcorum imitatione, qui a sole eam indicauerunt. Fuerunt præterea qui Verrucariam uocauerint, quoniam tam multis Verrucarum generibus, quæ ab hoc numerantur, medetur. Numerauit Heliotropium Theophrastus inter ea quæ particulatim florent: ab inferiore parte sumptō principio, mox inter ea quæ perpetuo folio sunt. Ex quibus tam multis notis, facile erit multi nominis quondam & usus herbam & florem deprehendere. Vtebantur enim Solari hæc uerba passim ueteres græcorum medici in his naturæ uitij & morbis, quibus mederi scriptor hic eam testatur: quæ nec numero pauca, nec periculo leuius negligenda uis sunt.

De Heliotropio paruo. CAP. CCIII.

Heliotropion paruum, quod & aliqui Scorpionum uocant, nascitur in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Hærbæ cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio & aqua, latas tineas teretesque excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit.

B A R B A R I C O R O L L.
Heliotropium minus, Tricoccum priuatim appellatur. Vbiq; prouenit, folijs non solum minoribus, sed etiam in terram uergentibus. Semen & huic effigie scorpionis caudæ: de quo & Scorpionum ei nomen est.

V E X M. V E R G. C O M M.
Duo esse Heliotropia, maius scilicet & minus, quo diximus in maiore loco Varro testatur. Verba eius sunt. Nec minus admirandum quod sit in floribus quos uocant Heliotropia. Idem & Paulus Aegineta lib. 6. confirmat, seorsum priuatimque de utroque agens. Quibus autem notis inter se differant, hic satis docuit: nec minus quibus etiam uiribus discrepent. Quod tamen hic additis nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua ait. &c. Paulus Aegineta pro Nasturtio (nisi uicium in eo sit) Cardamomum numerat, frequenti in scriptore hoc & alijs, a Cardamo, quæ uox Nasturtium græcis significat, ad Cardamomum lapsu & mutatione.

De Scorpioide. CAP. CCV.

Scorpioides hærbula est, folijs exiguis, semine caudæ scorpionis effigie. Illita, scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

B A R B A R I C O R O L.
Scorpioides a Plinio Scopios uocatur, ex argumento nomine accepto. Est & alia eiusdem nominis effectusque Asparagi cognomine: sed in totum spina, nullum enim folium habet, caule Asparagi, cacumine aculeato.

A

ἡλιότροπον τὸ
μικρὸν

B

scorpionis effigie

D I O S C O R I D I S

C S C O R I O N E Plinius uocare hanc aliquot locis uidet. Non satis tñ nobis constat, an ubiq; hæc intelligat. Theophrastus em̃ lib. 9. de plantag. historia Scorpion a radicis, non feminis figura dicta aperte ostendit. Verba eius sunt, *ἡ δὲ σκορπίον καλοῦσιν διὰ τὸ πᾶν ἵσαν ἔχιν ὁμοίαν σκορπίου.* Quod est. Alij autē Scorpion uocant, quia scorpioni similem habet radicem. Hic autē feminis eam figuram dicit esse. Cogitandum itaq; quærendumq; qualis Scorpionides hæc sit.

¶ Finis L I B. Quarti.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. L I B. Quintus.

I O. R V E L L I O interprete.



V P E R I O R I E V S quatuor libris amicissime Ari, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & earūdem lachrymis ac fructibus, itē animalibus, melle, lacte, adipe, frumētis, oleribus. Nec non de omni radicū, hærbarum, succorū, seminūq;

D ratione: In hoc autem totius operis Quinto differemus de uinis, & metallicis, & a Vite nostram cōmentationem auspicabimur.

¶ De uinifera Vite.

C A P. I.

ἀμπέλος οἴνοφο-

F O l i a V i t i ū, & triti capreoli, cāpitis dolores illitu mitigant, & inflāmationē stomachi ardorēq; cum polenta. Folia etiā per se, ut quæ refrigerēt & adstringāt, imponi solēt. Potus eorū succus dysentericis, sanguinē excreatibus, stomachicis, & grauidarū malaciæ medet. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli & poti. Lachryma Vitiū quæ ueluti gutti mi in caudicibus concrefcit, ex uino pota calculos pellit. Illita lichenas & psoras, leprasq; nitro prius perfrictas sanat. Eadē cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectū habet, maxieq; sanies, quā accensa farmēta Vitiū exudarunt. Qua & perunctæ uerrucarū informicationes extrahunt. Cinis farmentorū et uinaceorum erūpentibus in sede condylomatis & thymij illitus ex aceto medet. Prodest luxatis & uiperarū morsibus. Contra lichenis inflammationē illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

H E R M O L A I B A R B A R I

Patrij Veneri, & Aquileiē. Patrarchæ Collariorum L I B. Quintus.

V I T I S S A T I V A.



Pli. li. 14. ca. 3.

I T E M satiuam, Græci ampelon Hemeron, & Oenon, & Oenophoron, id est, urbanam, & uinum ferentem uocant. Item Clematida, & Clemacem, interim & Oenanthen: ut placet Iulio polluci. Superuacuum genera eius psequi, quia toridem Vitium affirmantur esse, quot foli. Nascitur passim, & in alto Viris, & propinqua littori. Durare Vitē ad infinitū, resubili foecūditate perhibent, cultura quodam genere, Theophrasto auctore,

ad Elephantinē: ut idem scribit, & Varro mutuatur. Non decidunt Viti folia, neq; circa Mem-
 phin. Ad Deltam quoq; Nili, fere, tota uiuet semper. Quod & alijs quoq; satis accidit. Capnia
 uocatur unum Vitis genus, quæ uiam nigram ex candida, & candidam ex nigra sine prodi-
 gio ullo ferat. Insanæ Vites appellantur, quæ ad florem usq; perducunt. Quinetiam est ubi Plī-
 nius Insanæ Vites Triseras appellat: quoniam in his aliq; maturescunt, aliq; turgescunt, aliq; flo-
 rēt, Smyrnæ Triseram a se uisam. M. Varrone etiā prodente. Vitis candida melius reddit,
 quo latius fuit germen: quod quidē & huic, & Fico propriū. Vitis Capreoli tribuuntur,
 & Viti: quos & Clauiculas, & Pampinos uocamus, Græci Helicas. Is est coliculus, ut Varro
 inquit, Viteus, intortus ut Cincinū, a capiēdo dictus, quoniam ad locum capiēdum sur-
 sum uersus serpat. Sicut Vitis dicta primo, quoniam inuitatur ad uuas pariēdas: & a pariē-
 do Parilema, deinde Palma, literis immutatis. Est autem Palma maior flagellus, unde nascun-
 tur uuæ, Dalma, unius inuersione literæ a uenti statu dicta: ut idem Varro inquit. Eadem Vi-
 tis Caprea nominatur: quia Capreolum pareret. Vitiā & pabuli genus est, a uinciēdo appel-
 lata, q; item Capreolos habet ut Vitis, & ad scapum lupini, aliumue calamum ad quē hereat,
 id solet uincire: unde Vitiālia, pro pabularibus e Vitiā dicuntur. Vitiā tamen duplex, femina
 ris, & pabularis uocata. Recentiores Græci Biciā appellant, a nostris (ut puto) mutuati. Con-
 sistit in Vitis lachryma largior incisis, paulo ante germinatum, partior autumno: & hyemis
 initio, minus fecundæ crebrioribus oculis gēantur, solidioresq; feruntur. Ipses appellamus,
 uermes in Vitis nascentes, austrinis flatibus. Peculiaris Viti morbus Tragos, hoc est, Hir-
 culus importuno uento germinibus abscessis: uel imperitia colentiū oblaesis. Theodorus Arti-
 culationē uocauit. Hircelcere porro Vites dicuntur, cum infecundæ fiunt: quoniam & Hircus
 animal, ut inquit Aristoteles, sterile scit pinguedine. Vuæ ipsæ, & pampini laborant Crambo,
 qui similis rubigini est, sole post humores longos insequuto uehemēti. Est & Niuatio, siue Rō-
 ratio, quoties uua deflorente uixerit. Præterea Exacinatio, quā Theodorus Exuperantiā ap-
 pellat. Græci citosin, quoties acinæ racemis defluunt. Sine granis interioribus uuas arte nasci,
 auctores Græci posse docuerunt, Agigarton id genus uocantes. Vites arbutiue sunt, & sim-
 plices. Arbutiuas Græci Anadendritidas, & Dendritidas appellant. Arbuta uero ipsa, siue
 ignobiliori uoce arborea idem Græci, Anadendradas, & Aminyxidas, & Amamaxidas, Epi-
 charmus, & Sappho. Nam & Arbutulæ testudinū (instrumenti nomen id bellici est) Amaxā
 podes uocantur: in quibus rotarum uersantur axiculi: ut Vitruuius Pollioni placet. Quamq;
 nō defunt, qui genus Vitis Amyxidas, & Amamaxidas accipiant. Alij uuam Bumaston, ali-
 j Hesperion uocatam interpretantur. Auroschas Parthenio Vitem significat: Eratothēni, ra-
 mus eius cum racemō dicitur: Apollodoro Vitis Elinos, quo nomine Philetas, & Nicander
 ramum eum, non Vitem ipsam capiunt. In Hircania, feracissimam esse Vitem, mirati sunt scri-
 ptōres: cum sit Aquilonibus exposita. Nam in Carmanis, & Margianis, Arisanisq; crassitudo
 tanta caudicis est, ut bini homines plerumq; amplecti nequeant, bicubitalibus racemis, Vitem
 Boetij Thebis primum natam putant: qua & Liber pater.

EX M. VERG. COMM.

Quæ a rusticæ rei scriptoribus in conserenda uinea tam multæ numerantur Vites, Ami-
 næ, Psythiæ, Verrunculæ, Bumasthi, & pleræq; aliæ, omnes quocunq; colore ma-
 turescunt, uindemiamue, aut rusticā penum explent, una uiniferæ appellatione a Diosco. colla-
 guntur. Omnium enim in medicina eadē uis, paresq; in earum partibus ad remedia uires huic
 scriptori sunt: & si posteriores aliqui in plerisq; Vitis candido colore uuam maturantis folia,
 palmites, & capreolos magis probauerint. Quodq; uiniferæ discrimen additum illi ab eo est,
 nō aliā habet causam, q; ut ea nota satiua omnis Vitis ab alijs, quæ superiore uolumine cogno-
 mines illi tractatæ sunt, separetur. Hæc enim ad uindemiam, & sanitatis usum ubiq; fere conse-
 ritur & excolitur: illæ sponte sua nascentes, nulla hominis cultura, medicinæ tantū inserviunt.
 Hæc passim & omnibus nota, illæ medicam materiam tantum tractantibus, solaq; similitudi-
 ne aliq; gentium adoptione in nomen Vitium receptæ. De quibus dixisse tunc quæ oportebat
 satis sit: quemadmodū nunc in quotidiana & notissima re nullū opæ precium laborasse fuerit.

De syluestri Vite.

CAP. II.

Syluestris Vitis duorum generum est. Alterius uua non mature-
 scit, sed floretenus Oenanthen nominatam perducit. Altera ad fru-
 gem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules & clauiculas

κμυλλο ἀγρίαι

D I O S C O R I D I S

C uiculae, quibus repunt, uim habent cultae Viti similem.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Vite syluestri, superiore libro diximus.

E X M. V E R G. C O M M.

Alia est syluestris Vitis haec ab ea, quae superiore uolumine Ampelos agria, i. syluestris Vitis dicta etiam a Diosco. & tractata fuit. Haec em fatuae congener, syluestri habitu tantum diuersa: illa sola racemosi fructus similitudine sic appellata. Eamque ob causam illa syluestris, haec Labrusca uitis sit. Nota ubique, et cuius flores nunc etiam condiendis & odorandis uinis, quo tempore pubescit, diligentius leguntur. Dicimus autem pubescere, Vites florere, poetae nostri exemplo: qui felici translatione a pubertate hominis usus, ait, Tunc largo pubescit uinea foetu, flore Vitis intelligens: qui flauo colore lanuginosus, primae in homine pubertatis spem ostendit. Graeci a flore *ἀνθη* uocant. Quid autem Oenanthe graecis sit, primo uolumine in Oenanthini unguenti confectione diximus, & ab hoc loco non multo post etiam dicemus.

De Vua.

C A P. III.

segvā

Vuae recentes aluum turbant, & stomachum inflant. Innocentiores quae decerpunt diu pependere: ideo, quod in eis copia humoris exiccatur. Vtilesque fiunt stomacho agrisque, atque cibi auaritatem excitant. Vinaceis, aut uinario uase seruatae, ori & stomacho gratae sunt. Aluum sistunt, sed uesciam & caput tentant. Et sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque quae in musto fuere. Sapa, aut musto conditae, stomachum magis infestant. At quae solem prius passae, in aqua coelesti conduntur, minus uinosae sunt, siticulosas, ardentibus, & longis febribus salubres. Reconditi tuinacei, inflammatis mammis, turgentibus ac praeduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, coeliacos, & foeminas fluctuione uuluae laborantes iuuat infusa. Ad decessiones ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent. Stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum polentae modo, dysentericis & coeliacis & solutis stomacho.

B A R B A R I C O R O L L.

Vuam, Graeci Staphylen, a Staphylo Liberi patris filio, ut Ptolomaeus uoluit, appellant. Lenida etiam poetae. Nam & Lenaeus dicitur is Deus. Alia porro Vua eliquescit in potum, alia eligitur ad uiscendum: haec autem in corbulam fecernitur, ut inde addatur in ollulas: quae in dolia plena uinaceorum truantur: alia in piscinam picatis amphoris demittitur: alia in haram Carnario suspenditur. Vuam Amineam minusculem, & maiorem, & Apiciam, commodissime in ollis condi putauit Cato. Eiusdem generis in Sapa, & Mulso rectissime seruantur. Duracinas, & Amineas, Scancianas, affirmant opportunissimas esse quae pendeant: quod genus omnes Conditaneas, & Condituias appellamus. Vuae in palea seruatae, pensilibus proximae dicuntur. Vuae uehementiores nigrae. Ideoque uinum ex his minus iocundum. Suauiores albae, quoniam aere translucido facilius accipitur. Est & Vua Theriaca uocata: quod contra morsum omnium bestiarum proficiat: cuius ratione ferenda Palladius instituit. Florem Vuae, in cibis dardi gallinaceis praecipiunt, ut praeterea non attingat uuas: quod & in Labrusca diximus.

Vinaceus, Graece Stemphyllon uocatur. Dicimus & Vinacea neutro genere. Palladius etiam foeminino Vinaceam. Haec & Flores appellantur, sicut in Oliua Flaces, atque Fraces. Vinaceos, poetae sunt qui Brycia, & Brytea quoque appellant, quaeque pro fratribus Oliuarum sumuntur. Stemphylla, in Aristotelis Rhetorico, secundo. Gellius faciem ipsam e Vinaceis, & oliuis expressam, Flores, & Fraces dici scribit.

Gd. li. ii. ca. 7.

Nuclei acinorum Vuae, a Graecis Gigarta dicuntur. Palladius excrementa, & semina, & grana uuae interiora nominauit. Ab acinis, Acinaticum dici uinum existimo Veronensis agri: ut scribit Cassiodorus, alumnus, odoris, saporisque suauissimi, colore purpureo, ineffabili dulcedine, tactu quoque densum, atque pingue: ut carneus liquor, aut potio esculenta uideri possit. Lau

dantur ex eodem agro & Rhætica ueteribus, in montanis Rhætorū, qui supra Veronā sunt, nascuntur: ut inquit Strabo. Ipsos acinos, Cato acina, Catullus acinas, pronunciant.

E X M. V E R G. C O M M.
Stillud ante omnia sciendum, a patientia Passis uuis, & uino nomē quondam factum fuisse, si Plinio credimus, 14. uolumine, capite primo dicenti. Quin & a patientia nomen acinis datur passis. Qualis autem ea sit, quantaq; 13. uolumine, capite. 16. docuit Columella, iubens ad passas eligi maxime albas, dulcissimi saporis, maximis acinis & raris: fieriq; id oportere Luna decrescente, sereno, & sicco cœlo, circa meridiem: lectasq; uuas has in tabulis paulisper porrigi, ne inter se pressæ suo pondere collidantur: mox in ahenō, aut fictili aliquo nouo amplo ex sarmentorum cinere factam lixiuiam, usq; ad feruorem calefacere: & cum feruebit, aliquid putri & optimi olei adijcere, simulq; miscere: tum racemos uuarum pro magnitudine binos, uel ternos simul colligatos in ahenum illud feruens demittere: tam diuq; illic habere dum decolorentur, non tamen excoquantur: in qua re agenda moderatōne temperamentoq; opus erit. Exemptas dein ex ahenō uuas in crate disponi idem iubet, rarius q̃ ut altera alteram cōtingat. Singulas deinde post tres horas insolatās conuertit. Neq; ubi prius fuerant reponendas: ne relictō illic humore corrumpantur: noctibus etiam tegi, ne irrorentur, aut imbre madeant. Post aliquot postea dies cum modice aruerint, in uasa noua cōdi precipit. &c. Et hæc scriptoris eius Passæ uuæ sunt. Palladij alia ratio est: quam in Octobri mense his uerbis monstrauit, non ut Italia, sed ut Græcia conficere consueuerat. Vuam passam græcam sic facies. Melioris acini, & dulcis, & lucidi, horridiores in ipsa uite torquebis, & patieris sponte sua inarescere: deinde sublatos in umbra suspendis, & uuam districtam componis in uasculis: sub sternis pampinos, sicco algore frigentes. &c. Diuersa hæc a Romana Passæ Vuæ confectio est: quemadmodum & eius condituræ fuerunt. Quæ quoniam longius a Columella eodem capite docentur, non reddentur a nobis. Poterunt enim ab illo uolentes omnia certius audire. Interim autem nos docebitur, primum qua ratione Columella, tum qua Palladius Passum, & uterq; suum conficiant. A Columella. 13. uolumine, capite trigessimono ex Magonis Africani præcepto (nam eius gentis primum Passi confectio, & maximus usus fuit) sic fieri Passum præcipitur. Vuam præcoquam, bene maturā legere oportet: acina arida, aut uitiosa reijcere: furcas mox palosue qui cannas sustineant, inter quaternos pedes figere, & perticis iugare: tum in supercannas ponere, & in sole pandere uuas: noctibus uero tegere, ne irrorentur. Cum deinde exaruerint, acina decerpere, & in dolum conijcere. Eodem mustum q̃ optimum, sic ut acinis superferret, adijcere. Vbi combiberint uuæ, seq; impleuerint, sexto die in fiscellam conferre, & prælo premere, Passumq; tollere. Et hæc conficiendi Passi disciplina ueteribus fuit: & si alia etiam rationes ab eo eodem loco numerentur. Palladius non dissimilem huic confectiōnem Octobri mense sua ætate fieri docuit. Ante uindemiam enim Passum fieri iubet uniuersæ Africæ more pingue atq; iocundum. Leguntur Vuæ Passæ q̃ plurimæ, & in fiscellis clausæ iunco factis aliquatenus rariore contextu, uirgis primo fortiter uerberantur. Deinde ubi uitium corpus uis cōrusionis exsoluerit, cochleæ supposita sporta comprimuntur. Hinc Passum est quicquid effluxerit, & conditum uasculo mellis modo seruatur. Breuior sane hæc ratio, sed non dissimilis priori. Siquidem quæ a Palladio Passæ Vuæ legi iubentur præcoques illæ, & sole arisactæ Columellæ sunt. Et quas ille musto implet ut succum reddant, hic uirgis flagellat, & lentescere cogit: quamq; hic cochleam, ille prælum: & quam fiscellam Columella, hic sportam uocat. Fuit quondam Passum quotidiani usus: eratq; in sanitate & ualitudine homini pro melle, sine inflationis periculo, ut diximus, quam mel præcipue facit. Exoleuerunt nostra ætate omnia huiusmodi: ideoq; qualia hæc quondam fiebant, reperiata a nobis longius fuerūt: ut cognoscant, intelligantq; omnes, quantopere in Passis Vuis, & Passo a ueterum disciplina & moribus discesserimus: multoq; magis in tam multis Vuarum condituris, quæ illis pene infinitæ fuerunt, ex Columella, alijsq; rei rusticæ scriptoribus cognoscendæ: ut certius intelligant legentes, quas hic in uinaceis, in ollis, in sapa, & musto, & in cœlesti aqua seruatas dicit. Cuncta enim ab eo traduntur eodem operis sui uolumine, capite. 43. Nos enim tam multis obseruationibus commendationes has nostras augere nolumus. Erit etiam ex lectione scriptoris illius aliud operæ precium. Intelliget enim quis id ager, quas hic Passas antea factas Vuas in cœlesti aqua componi iubet, addiditq; *ἢ ὀκρίαν τὰς τοὶ αὐτὰς γινώσκαι βινάδιον*, eam habere rationem quam nos locum illum uerentes indicauimus, exiguo scilicet uino, ut uinosa fiant, conspergi oportere. Ex Passi enim confectiōne tota ea ratio fluxit, in quo iubet ille uuas in musto demergi ut uinum combibant. Necessarium enim est, ut qui sole natiuus humor in eis aruit, nouo &

D I O S C O R I D I S

Congenere liquore aliquo iterum uuescat. Idq; nos præcipi a Dioscoride credimus: & si aliq; aliter locum interpretati sint: quos non damnamus, sed interpretationis nostræ quam debemus causam indicamus. Quemadmodum a principio capitis huius cōtra q̄ Plinius & aliq; dixerint locum ipsi etiā uertimus, πρὸς τοῖς ἀσθινοῦντας. Quas uoces Plinius, 23. uolumine, capite. 2. uertens, ait. Innocentiores, quæ decerpæ diu pependere, qua uentilatione etiam utiles fiunt, sto- macho, ægrisq; Aegros appellans quos hic ἀσθινοῦντας. Plinium secuti interpretes aliq; ægris, p- desse & ipsi dixerunt. Nobis, quibus infirmum corpus est, magis uertere placuit: non ob aliam sane causam, q̄ ut certiore intellectu res nunc pateret.

V De Vua passa. CAP. IIII.
Va passa alba adstringentior est. Prodest esitata caro earū tuf- si, renibus, ac uescicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis. Et decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ouo, ualet ad purgandum caput. Eiusdem gratia cum pipere commandu- catur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epynictidas, carbunculos, enatas in articulis putre- dines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cū ruta imposita, sanat. Poda- græ conuenienter cum opoponace illinitur. Mobiles ungues illita ex- trahit.

D BARBARI COROLL.
Va passa Græce Staphis, & Astaphis Hemeros, hoc est, satiuia dicitur. Cæterum Apame- as inuenio celebrari passulas.

O De Oenanthæ. CAP. V.
Oenanthæ uocatur Vitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet siculi non picato, collectaq; substrato linteo in umbra sic- catur. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria. Quare pota, stomacho ac ciundæ urinæ utilis. Aluum sistit, ac sangui- nis excreationes. Contra fastidia & acorem stomachi, sicca & illita ef- ficax est. Capitis doloribus tam uiridis q̄ sicca ex aceto & rosaceo p- funditur. Sanguinolenta uulnera cataplasmate, & incipiētes ægilopas, cicatrices in ore, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione uindicat. Pessis miscetur ad sistendū san- guinem. Contra oculorum delachrymationem, & stomachi ardores, cum polline polentæ, & uino illinitur. Crematæ carbonibus cinis fa- cit ad oculorum medicamēta. Rediuiuis, paronychia, abscedentes gingi- uas, cruentasq; cum melle sanat.

V BARBARI COROLL.
Va Oenanthæ, quam Vites syluestres, hoc est Labruscæ ferunt, laudatissima est in Syria, maxime circa Antiochiæ, & Laodiceæ montes. Item ex alba Labrusca. Sunt qui principatum in unguentis dent in Parapotamia nascenti; deinde in Antiochia: & Laodicea Syriæ. Tertiū lo- cum ex montibus Medicis, quæ & utilior medicinæ. Quidā omnibus ijs præferunt e Cypro. Vi- ris ea quæ Massaris in Africa uocatur, nunc medicis, nunc odoribus tantum gigni Plinius af- firmat. Nascitur in Africa & Vitis quam Vbolima uocant accolæ, oliua in uites insita, utrius- q; fructum arboris ferentem; hanc Græci & Eleostaphylon appellant. Vinum Oenanthinum, sit duabus libris florum, in musti cado inaceratis, qui post triginta dies mutantur. Oenanthem & a uitis dulce uinum ferentibus arbusiuis maxime colligi quidam præcipiunt, non syluestri tantum. Labruscam dici putant, q̄ in marginibus terræ cū labris quibusdam fere nascatur. Vi- num Anthosmias, ab odore floris dicitur, nec idem cum Oenanthino uino est. Pro precioso fa-

Pli. li. 12. c. 23.
& lib. 23. c. 11.

ne capitur a Græcis. Eius mentio est apud Aristophanem, & Hippocratem, & alios uel promiscua. Hippocrates certe hoc etiam Anthinē uocauit. Aliq Anthinē, pro Anethino capiunt: ut Galenus inquit. Nam uinum cognomento Hippocraticum, Gallijs maxime transalpinis gratissimum, fictici generis est, facili ratione. Cinamomum, Saccarū, et Carpesiū teruntur in fuscū: ex eo uinum liquatur, ut transeundo qualitates eas cōbibat. Datur hoc epulis principalibus, cū Escharite pane bellariorū uice, qui mos, sed in alio uino, peculiaris Atheniēsis fuisse legitur.

EX M. VERG. COMM.

Labruscæ uitis tantum Oenanthe medicis flos est, neq; ad medicinam ex alia uite utuntur. Cæteris fatiuae etiam flos, & prima uitium omnium pubertas Oenanthe dicitur. Numerauit inter aues etiam Plinius hoc nomine, quæ statos latebræ dies habet, exorientes sirio, occultata ab occasu eius progrediens. Sic forte dicta, quæ cum uitium prima pubertate hac prodeat. Nec ultra quicq; de ea tradidit: diligens alioquin in Oenanthis huius historia & medicina: quarum alteram, 12. uolumine, capite, 29. alteram, 23. capite, 1. longius profectus est. Ex eo multa quæ in Diosc. non leguntur. Barbarus additioni suæ miscuit: quæ poterunt uolentes facile in eo deprehendere. Nobis tōidem quatenus licuit & hīdem uerbis omnia reddere placuit. Eademq; fide monemus, scribere in 6. suæ medicinæ Paulum Aeginetam, plurimū quidem ex Labrusca Oenanthis usum esse: quoniam egregie adstringit, stomachumq; & aluum maxime firmat: uerū tamen traditis his idem statim subiicit. *ὁ δὲ Dioscorίδης ἰσχυρὰ ὑποτάσσει τὰν ἰανθίαν τῇ Δουναμῇ ἰχθυῶν, ὅτιν ἀντὶ τῆς πρὸς τὴν σπυγγώπιαν καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἰσχύος.* Quod est. Dioscorides autem aliam de scribit Oenanthem contrarias huic uires habentem: ideoq; secūdis, stillicidij uesticæ, & fellis suffusionibus cam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur: neq; in scriptore hoc alibi legisse me memini: & nihilominus non negligenda Aeginetæ autoritas & testimoniū est, quæ credere oportet uera, & quæ aliqui legisset testari. Nobis nihil est qd adijcere aliud his ualeamus. Rem tñ signauimus: ut si forte laxandi uires habere Oenanthem aliqui aliqui inuenerit, autoritate scriptoris eius sciat, aliam ab hac illam esse: alteriusq; uitis quærendum cum florebit fructum, qd contrarias huic uires habeat. Qualis autem ea sit, non ausim ego dicere.

De Omphacio. CAP. VI.

Omphacion succus est acerbæ uuæ, nondū maturescētis e Thassia uite, aut Amminæa. Oportet autem ante canis ortum, expressam melliginem in cyprio uase linteo cōoperto insolare, usq; dum cogatur. Semperq; quod ceruici uasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere. Noctu sub dialibus locis auferre. Quādoquidem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, uehementer adstringens & linguā mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, uuam, ulcera oris, humida ginguarum uitia, purulentas aureis cum melle aut passo. Item ad fistulas, uetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluctione uulua laborantibus clystere infunditur. Oculorum claritati & scabritia, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat, sed pauco & a quatiore est utendum. Valde siquidem exurit. Idem adstringit. Prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item hī qui ilei dolore conflctantur. Conuenit in grauidarum malacia. Sorptū auxiliari constat, cum populatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

BARBARI COROLL.

Omphaciū, siue Omphax, idem, acor, siue acementum uuæ, ab immatura uite dicitur, quæ Omphax a Græcis uocatur. Est & oleum Omphaciū, de quo inter unguenta diximus. E Thassia, ut Dioscoridi uidetur, uua, e Pfydia, ut Plinio, probatur acor. Cum sunt acini ciceris magni

B

δμφάκιον

Pli. li. 14. ca. 14

Cē ij

D I O S C O R I D I S

C tudine, ante canis ortum incipiente pubertate. Precium in libras sex. Solet & aliter fieri, uuam imaturam terendo in mortarijs: siccataq; in sole, postea digeritur in pastillos.

EX M. VERG. COM.

Non animaduertunt Diosc. Omphacium uertentes interpretes alij, infortinē, nec reliquo corpori congruē in extremis clunibus caudam illi reliquisse: nec aliter q̃ Flaccus cecinit, qd ille fingebat monstrum, turpiter in atrum piscem definere, ex Omphacio Omphacite uinum fecisse. Quod em̃ in extremo capite in eorum æditionibus legitur, uis succo adstrictoria, &c. uel ut alter ex eis eam incipit partem, idem adstringit, prodest stomacho qui cibi tenax nō sit: et ab his quod totum legitur usq; ad integram capitis huius clausuram, totum ex historia & medicina uinorum, quæ statim sequitur, in Omphacium irrepsit: in qua hic idem ait. ἡ δὲ καλοῦσθαι ὅμα φασὶν. &c. Μοχ, συντινὴν δὲ ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ὑστέμαχον, καὶ κισάδου καὶ τοῖς δυναπτοῖς καὶ ἰνδελαινοῖς τὸν σβραχὸν ἀρμόζουσαν. δίκτυ δὲ καὶ λοιμναῖς διαβίοντι βουτῶν. &c. Nelongius q̃ decet tam multa repetantur, omnia, ut uidetur, duobus locis eadem, & importune ab aliquo ex uino ad Omphacium translata: qui Omphacite id uinum uocari sentiens, Omphacio coniungi debere credidit. Verumtamen longo interuallo Omphacium, ab Omphacite uino differt, ut mox in confectioe eius legentibus patebit. Debuerant hoc illi animaduertere: nec præterita tantū, sed inuenienda posthac etiam in scriptore hoc cognouisse. Calcantis enim Homericæ maxima illa fuit, & omnium integra semper laus erit, Præterita tuemini, præsentia intelligere, & futura conijcere: cognitisq; his, apte omnia constituere. Nos eam reliquimus partem inuilem hoc loco, non multo post apposite tractandam. Indicaruntq; id nobis antiquioris fidei codices, in quibus nihil huiusmodi legitur, sed multo magis res ipsa suis locis docens tractanda singula: nec diuersa simul miscenda rerum genera esse: importuneq; his aliquid nulla urgente necessitate tractari non debere. Discrepant nobis etiam cum alijs interpretibus plærq; alia, & si forte nō multum facienda alicui uideri poterunt: quale est, quod alter eorum pro acerbis, necdum maturis uuis, quas græci notissima cunctis uoce Omphacas uocant, acidas dixit: quod priuatim ad saporem pertinet, potestq; in maturitate etiam sentiri. Neque enim acidum ὄμας simpliciter significat, sed acerbum: in quo poterit acidus, poterunt & alij sapes esse: utq; priuatim acidū dicimus qd sapore suo acefcit, sic acerbis omnibus cōmunis Omphacis uox est: neq; uua magis q̃ oliuas, Lauri baccas, & innumera alia nondum matura græci ea uoce indicant: non ex sapore Omphacite oleum, sed ab imaturitate oliuarum appellātes. Eamq; ob causam, cōmunem eius uocis æstimationem nos secuti, acerbam uertimus. Nec dissimili ratione, quod hic scriptor μῆλον παρασούεισιν ait: uertitq; idem, nondum nigrescentis; nos, nondum maturescentis, diximus: cōmuniore in uuis eius uerbi significatione usi. Est enim græcis παρασύν μιλανίσσαι, id est, nigrescere: est ἰτιδὲμ, ποικίλλεσθαι, id est, uariari: est postremo μεταίνεσθαι, id est, maturari, & maturitate mitius fieri. Fecimusq; id: ne quod hic non decernit, ex albis uuis fieri posse Omphacium negaremus: quod contracta ad nigredinem uuarum maturitate necessario futurum erat. Sunt quidem leuia hæc, uerumtamen nō negligenda penitus, in his quæ ad artes & uitam pertinent, in quibus nulla satis fides, aut diligentia hominis unq; fuerit. Quales autem Amineæ uites, quas hic cæteris antepōnit in disciplina ruris sint, copiosissime docebunt Columella quarto operis sui cōmentario capite. 1. & 14. uolumine, cap. 2. Plinius. Breuissimeq; omnium felicissime in Georgicis suis Maro, cum cecinit. Sunt & Amineæ uites, firmissima uina. Quæ una firmitatis laus causa antiquis scriptoribus tam græcis q̃ latinis fuit, ut ad medicinam ex hac uite materiā, uua, omphacium, & uinum præ cunctis alijs laudauerint semper, & amauerint. Idemq; de Thais constitutendum est, quarum idem Maro honeste itidem eodem loco meminit. Quod deinde a Diosc. dici ἡν καλῶματι ἱρυθρῶ, id est, rubete æneo uase, ad genus æris pertinet, qd eo colore in hoc usu probabatur. Id Cyprium uas alter ex interpretibus uertit, relicto legētib; desiderio, ex qua materia querendū id uas sit. Scimus qdem ante ferri cūctis alijs in medicina Cypriū æs, & in Plinio Cyprium uas, pro æneo ex ea gente intelligi aliqñ oportere. Verumtū nō erat nostra ætate tam obscure dicendum, quod a Diosc. apertissime ostendebatur: præfertim nihil de Cyprio magis q̃ de quo uoluerit aliquis alio ære hæc docente.

De Vini natura. CAP. VII.

Vino uetere nerui læduntur, & reliqui sensus, gustu quod suauis est. Quare cauendum hīs qui internam alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda ualitudine, paucum, aqua di-

lutum, innoxie sumitur. Nouum inflat. Aegre coquitur. Insomnia parit. Et urinam ciet. Aetate medium utraq; uitia fugit. Quare ad uictus sanorum agrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & cōcoctu difficile. Carnem alit. Et ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias inter utrumq; uires habet. In secunda tamē & sinistra ualitudine, cum primis laudatur albū. Quin & uina qualitate distant. Siquidem dulce crassis partibus constat. Et difficilius a corpore discutitur. Stomachū inflat. Aluum & interanea ut mustū turbat, sed minus inebriat. Renibus & uesicæ aptissimū. Austerū per urinā celerius transit, sed capita dolore tentat, & temulentia gignit. Acerbum ad ciborū per membra digestionē accommodatissimū. Aluum & cæteras fluxiones cohibet. Nouū, neruos minus tentat. Vinū aqua marina factū, stomacho aduersatur. Sitim stimulat. Neruos infestat. Aluo aptū. A ualitudine se recolligentibus inutile. Passum quod uuis sole siccatis in area, aut in sarmento adustis exprimitur, Creticum cognomine, aut Pramniō, aut Protopon, & Sapa, quæ fit musto igni decocto. Græci syrion, aut Hepsema appellāt: quodq; Melas dicūt, aut Melampsythiū, crassa sunt, & corpora multū alunt. Candidū tenuius, & medium medias fortitur uires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocāt. Faciūt aduersus uenena, quæ exulcerando necant ex oleo pota, & uomitionibus reddita. Contra cicutas, meconiū, uenenum, toxica, & concretū lac. Item contra renū ac uesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesq;. Inflan tamē, & stomacho aduersantur. Priuatim prodest Melampsythium, si uenter rheumatismū sentiat. Album magis cæteris emollit aluum. Gypso conditū neruis officit, caput aggrauat & incendit, ac uesicæ aduersatur. Contra uenena cæteris aptius. Picaca, aut resinata, excalfaciūt, cōcoquūt. Sanguinē excrementibus inimica. Quæ uero Parachyta uocant, admistā Sapam recipiūt, caput implent. Temulentia gignunt. Aegrius a corpore discutuntur. Stomachū male habent. Inter Italica uina Falernū principē locū obtinet, quod inueteratū perq; facile coquitur. Languidos pulsus exuscitat. Aluum abstringit. Stomacho utile. Sed uesicæ nocet. Atq; ipsi qui uisus hebetudinē sentiunt, & ad potus crebros minime idoneū. Albana crassioribus constant partibus. Dulcia stomachū inflant, Ventrem emolliunt. Sed concoctionē non æque adiuuant, & neruosa minus infestāt. Vetustate eadē, austerum saporē concipiūt. Cecubū dulce est, & Albano crassius. Corpus & colorē alit. Aegre tamē coquitur. Surentinū satis austerū est. Quare intestinorū & stomachi fluxiones cohibet. Et cum tenue sit, caput minus tentat. Inueteratū suauius redditur, & stomacho utile. Adrianū, & Mamertianū in Sicilia æque crassis partibus gignuntur. Modice adstringunt, & ocysime inueterantur, minusq; ob-

D I O S C O R I D I S

C suam tenuitatem nervos tentant. Paretypianum, & qd ex Adriatico sinu defertur, odoratū ac leuius est. Quare multus epotus fallit. Diu seruat ebrietatē, et soporē adfert. Isticū Paretypiano simile ē, sed urinā uehemētius pellit. Chiū tñ antedictis mollius, et aptū potui ē. Bene alit, & minus inebriat. Fluctiones cohibet. Oculorū medicamētis utile. Lesbīū facile mēbra subit, Chiō leuius, & aluo idoneū. Ephesiū eandē uim habet. Empygela, et Etinolo Asiā, Mesogites nomine, capitis dolores ciet, & nervos lædit. Cōum uero, & Clazomeniū, qm multam sibi maris aquam uendicāt, facile corrumpunt. Flatus mouent. Aluū turbant, nervis officiunt. Vinū omne, ut reliqua in cōmune dicantur, merū, ac syncerum, et sua natura austerū, excalfacit. Facile in membra distribuitur. Stomachum adiuuat. Appetentiā ciborum inuitat. Vires alit, ac robur auget. Somnum conciliat. Et cōmendat colorē. Potū liberalius, auxilio est contra assumptā cicutam, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium, argenti spumā, taxum, aconita, fungosue. Contra serpentium morsus, et omniū ictus quē refrigerando necant, aut stomachū in uomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorū, ac distentiones & stomachi singultum, & si uenter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, et quibus corpus inmodico sudore digeritur (diaphorumenos uocant) maxime alba, uetera, & odorata. Quę tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesicę accommodatiora redduntur. Vlceribus, inflammationibusq; in succida lanā imponuntur. Tetra ulcera, & phagedænica, & fluctionibus obnoxia commode perfunduntur. Marina austera, & alba, ad sanorum uictus usurpantur. his præstat Italica, falernum, furentinum, cecubum, signinum, & permulta Campanię, & parætypianum ab Adriatico sinu, & siculum, quod mamertianum appellatur. Ex grecis chium, lesbium in Phygela, & Epheso nascent. Crassa uero & nigra, stomacho negocium exhibent. Inflationem pariunt. Corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt, et minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & candida, uehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent. Nervosq; largius pota tentant. In mediā ætate, ut a septimo aņo, potui saluberrima sunt. Modus autem pro ætate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate uini definiatur. Non sitire, & modice cibos proluī, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, et maxime assidua. Siquidē obsessos nervos quotidie relaxat. Largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Modice tñ inebriari, aliqt diebus, maxime post aquę potus, utile. Namq; expurgans sensuum excrementa transfert, et per cæca corporis spiramenta discutit. Sed aquam post ebrietatē bibere oportet. Namq; a cura cōstitis temulētis quendā auxiliij modū inducit. Omphacites nomine peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uua, pauloātē maturitatē decerpta,

triduo, aut quadriduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumque **A** uinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet. Prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus. Item pregnantium maliciae, & crudis. In pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam Deuteriam, alij Potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquae, in uinacea, quibus triginta uini metretae extractae fuerint: calcatis uinaceis, expressoque decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios binis salis sextarijs. Post hyemem transfunditur in uasa. Lora post annum utendum. Etenim celeriter exolefcit. Conuenit aegris quibus timemus noxam uini, coacti saepe desiderijs eorum obtemperare. Item a longa ualitudine se recolligentibus. Fit & uinum quod Adynamon uocant, Lorae uires habens, hoc modo. Pares aquae & musti mensurae coquuntur molli igne, donec absumatur aqua: quod ubi refrixerit, elutriatum, picato uale reconditur. Alij marinae & coelestis aquae, mellis, & musti pares miscent portiones, & quadraginta diebus insolant, quo post annum utuntur. Vinum e syluestri uua nigrum adstringit. Prodest alui & stomachi fluctuationibus, & caeteris quibus contractione & contractione opus est.

BARBRAI COROLL.

Vinum Oenos Graece dicitur, Cratinus Maronem uocat. Philaethen puerbia: quale illud est. Vinum, & ueritas. Item illud. Non habere uinum temones. Pittacus, ut aes frontis, ita uinum mentis esse speculum. Aristophanes Vinum loco Veneris appellat. Poetae uinum etiam *πικρόν* dicunt, quasi uibrare mentem faciat. Vnde Crapula inquit Photion, dicitur *κρίπδαν*. Folia Vitis priuatim Oenaria uocant a poetis, & Sarmenta Oenaridos. Ipsa porro uitis, ab Hippocrate nominatur Oenarion. Tenuissimum est id quod celerrime inueteratur: Nam cui sumi amaritudine acescit aetas, insaluberrimum putatur. Quo generosius uinum est, hoc magis uetustate crassescit, & in amaritudine corpori minime utilem coit. Saluberrimum Campaniae, quodcumque tenuissimum, utilissimum cuique, uiribus edomitis sacco. Vinum alit uires, sanguinem, colorem, sicut lactis potus, ossa, frugum, neruos, aquae carnes. Simias & quadrupedes digitatas, negant crescere assuetas uini potu. Vnum de dando uino uolumen Asclepiades condidit, ab eo cognominatum, in quo utilitatem eius uix Deorum potentia aequari posse pronunciauit. Vinum succus est, qui seruendo uires e musto sibi fecerit. Mustum Graeci Gleucos, & Gleucine uocant aliquando. Vinum omne, aut Mustum est, aut uetus, ut in puerbio fit. Vinum medium pro aqua: quod & prandium caninum dicitur, apud Varronem, & Gellium. In Plauti Cassina, mendosus est senarius.

Adibo, caninam scauam spero meliorem fore.

Scribendum est, non scauam, sed coenam caninam, hoc est, abstemiam. In Latino agro, & Campano ad montem Vesuuium, qui Sumani dicitur, uires modo habentur Graece appellatae, uino inde presso, quod Graeci non ante dicitur, quam anno post calcatas uuas actum. Vilius, quod diu annis uinum est: pindeque Viannum, quasi, uinum anni eius, hoc est, Ornium uulgo Tabernae predicant uidentium.

VINI QUALITAS.

De qualitate, & aetate Vini dictum mox est. Vinum porro tenerum Graeci Apalon, Cato, Lene uocat: cui contrarium sit asperum: ut idem auctor appellat, hoc est, Scleron, siue Durum. Nam & Muria, quae aspera esset, dura cognominabatur Columella, Celsoque. Nisi quis dura Muria, sicut dura Picem, non pro aspera, sed pro densa spissaque accipiat, & utique pro Garo. Quandoquidem Celsus eam dysentericis commendat, sicut Garum Dioscoridi. De uino temperando, quod Lymphatum, & Dilutum dicitur, alij alia percipiunt. Hesiodus tres partes aquae liti unam Vini miscet. Caeteri meracius fecere, hoc est, ut quinque in duas adderent. Vnde natum prouerbiu: *ἡ πλεονεξία τοῦ οἴνου*, *ἡ πλεονεξία τοῦ οἴνου*, *ἡ πλεονεξία τοῦ οἴνου*. Quod Plautus poeta festiuissimus significat, cum de cantione graeca loquitur, in Stichus. Vide inquit, quot cyathos hos bibimus. Tum ille, Quod digiti sunt tibi in manu.

Cc iiiij

Pli. li. 23. ca. 1.
B

D I O S C O R I D I S

C Cantio est græca, ἡ πίσις πίσις, ἡ τρις πίσις μὴ τέρψα. Est autē senlus: ut aut duas uini partes, ad quinq; laticis, aut unā ad tres bibere oporteat, ad quam or nō opteat: ceu futurū sit dilutius, q̄ sanitatis usus exigit. Anacreon, ut Vinarius poëta, unā uini, duabus aquæ tempat. Alij aliter, p suo quisq; ingenio. Vinū modice incoctū, ut Aristoteli placet, minus officit ebrietatē uitantibus. Temulētæ sunt & animātes aliq̄t, præter hoīem. Sues uinaceis, Corui & Canes herba quā Oenuttā Græci uocāt. Simia & elephāt, uino. Vinū, cui nomē Samagonio, qd tradidit Aristoteles, tribus heminis, & quidē lymphatis, qdraginta uiros inebriare dicit. Ebrietatē Plato nunq̄, nisi semel anno liberalibus pmisit in legibus. Ante decimū & octauū porro ætatis annū, uino r̄pandū penitus existimat: ut ne gustet quidē. Mnesitheus Atheniēsis medicus, inebriari nunq̄, sed statis tñ diebus hilarescere pmisit: qd genus Cōthōnismōn a calicis noīe uocauit: ut dilutū nihilominus, & sine bellario: comitatu bibere. Ac prima quidē potio in cōiuijs, q̄a meraca erat, cum p̄satione ἀγασθὺ δαίμωνος, in honorē uidelicet Liberi patris, nec tñ tota, sed quasi p̄gustāda prēbebat. Postrema uero quoniā diluta esset, & salutaris, cum p̄satione Iouis liberatoris hauriebat. Vinū aqua misceri Staphylus Siteni filius instituit: ob id græcū uulgo non aliter uinū modo noīat q̄: Crasin, hoc est, mixtū.

P A S S U M, E T V I N U M P R O-

Passum, hoc est, Glycy, gñā habet laudata, P̄ythiū: & a colore appellatū nigro, Melampsythiū, quæ suū saporem, non uini p̄ferant. Nam in qd additū est Defrutū, Glyxis appellat Athenæo. Sapa, quā Nonius scribit uulgo dictā suo tēpore Mellaciū, sit musto ad tertiā partē mensuræ decoctio: sicut Epsēma, siue ut Hippocrates Epsēton, hoc est, Defrutū, ad dimidiā: & Calenū, ad partes ē tribus duas redactio. Passum probāt, Ciliciū, & Africū: & in Italia, ut qd Neapolitanū uocāt, a Columella redditū, prouincijsq; finitimis. Oīaq; hæc, ut Plinij uerbis utar, post Græcū. Fieri certū est ex uua, quā Græci Sticam uocāt, nos Apianā, q̄ apes eā impopulari gaudeant. Hanc sunt qui Muscatulā uulgo dictā interpretent. Item Venicula, siue ut Cāpani dicūt, Sircula: q̄ et Stacula, & Numisiana appellat, passis, & diutius in uite sole adustis uuis, Staphidion (ut arbitror) uocatū ab Hippocrate, aut feruētē oleo. Quidā e quacūq; dulci, dū præcocta. Q̄ si, quantū uuis ex̄pslere, ad̄iciāt uinaceis aquæ puteanæ, secundariū Passum facient. **D** Protopos accipit etiā pro musto, qd sponte defluit anteq̄ calcent Vux, ut est apud Iulij Pollicē. Hoc protinus diffusum, lagenis suis deferuere patiunt: postea in sole quadraginta diebus torrent, ætatis secutæ ipso canis ortu. Habetur & Protopū inter transmarina uinū: quod Athenæus in Lesbo nasci dulce scribit, etiā Prodromon uocatū ab aliquibus. At Pramnon, siue Pramnion Hippocrates, & prior Homerus celebrauit. Premebat hoc Smyrne regio, ut Alciphron Mæandrius scriptū reliquit, Montano uico Latonæ prius dicato, postea Latorix, nomē id Amazonis. Extabatq; id etiāum Plinio prodente, iuxta delubri matris Deum. Nigrū Galenus fuisse uoluit, Athenæus quoq; nō crassum, aut dulce, sed durū, ausertūq;: ob id eo Athenienses minime delectari scribit Aristophanes: hoc tñ non Smyrne, sed in insula primū Icaro natū putat Seuius, in petra, quo nomen Pramno. Sed & Pharmacinū dici hoc ipsum quādoq; tradit. Pro ueneno est Sapa, si q̄s ieiunus a balneis bibat eam. Polybius auctor est, Romanas mulieres nō uinū, sed Passum bibere solitas, ad restinguendā sitim. Passum uero dictū, quia ex uuis passis, siue quas in uite passis sunt aduri sole, premis, simile Cretico, & Aegostheni uocatis. Plautus, Murrinam, inquit, Passum, Defrutum, Mellinam.

Nonius Murinulum, siue Murinulā uocat, quā aliq̄ Murrinā, nisi uitiū in exēplari sit. Varro, mulieres inquit, natu grādiore, aut Loram, aut Garū, aut Defrutū, aut Passum bibebant, quā Murrinā Plauto appellari putat. Est & Murrina idem qd & Myratū uocant aliqui. Non utiq; a Myrrha, sed a Myro, qd est odoremētū: ut post docebimus. Gellius mulieres inq̄t Romanas Lauream, Passum, Murrinā potasse: lauream pro lora capiens. Meminit Varro & porionis genus fuisse Miricā. Nonius duas facit Loras: alterā, quæ sit Deuteria: alterā, quæ Lora constat. Lora uinū dulce, potōis, inq̄t, erat cōfectū, mulieribus grāda uis aptū: qd in q̄busdā codicibus lorā, non lorā scriptū inuenio, distinctionis forte gratia. Laudat a Græcis inter uina dulcia Scybelites: & natū in Arcadiā Thyraū. De Cilicio uino mentionē hoc capite habuimus. Forte autē hoc sit, qd e Pisidia medicinæ usu cōmendabatur Ambladeū cognomine, ab oppido: ut Straboni placet. Vīno autē Aegostheni, de quo supra diximus, nomen datū quidem uidet ab oppido Aegosthene, qd in Attica terra est. Ceterū affirmare non ausim: quādoquidem Carystū ex Euboia quoq; posset existimari, Carysto ibi celebrata scriptoribus. E Laconia tantū uenit Carysto uilla id ferente, quod & Alcman pōeta celebrauit. Laconicum uidetur fuisse initio: &

qd Monobasites dicitur, etiam Creticū hoc nomine intelligimus, corrūpente uulgo id uocabulū & uocante Malualium. Moueor, q locus ubi Tanarū in Laconia monstrat, Monobasia dicitur hoc tempore, ditionis Venetū id oppidū est, unde in Cretā directo fere cursu nauigat. Forteq Monobasites uino datū nomē fuerit, non q ibi nasceret, sed q illud primū e Creta cōportaret. Aetate nostra celeberrimū est qd Achaicū uulgo quoq dicitur: fortasse id qd ex Phliunte, oppido quondā Achaia, Phliasū ab Antiphane prādicatū est: etiam si nunc aliubi quoq feritur.

VINVM GYPSATVM.

Vinum Gypsatum, a Gypso dicitur, sicut a Calce calcatum, a marmore marmoratum.

VINVM PICATVM, SIVE RESINATVM.

Vino Resinato dicta inquit Plinius est Crapula: siue quia caput tentet, quasi lucta eius: siue q ipsa quoq resina, & flos eius crudus, qui uinis ad excitandam lenitatem additur, Crapula quoq nominari solet. Pugnacibus inquit Plinius mustis, plus Crapulæ inditur, lenibus parcius: a quo & uehementia uini, atq feritas crapulæ significatur uocabulo. Photionis de crapula interpretationem aliam superius explicui.

VINVM PARACHYTON.

Vinum Parachyton, siue ut Plinius uocat, Diachyton, si modo idē est, sit uuis in sole siccata, loco clauso per dies septē in cratibus, totidem pedibus a terra alte noctibus a tore defensis, s. die calcatis: optimi odoris, saporisq inter dulcia. Etenim Parachyma, Græci Defrutū quāq apellant. Vnde uinū originale, hoc est, sine fūco, & sine dulci Aparachyton, & Autiten uocat. Quamq & alia significatio Autitæ uini est: ut altubi monuimus. Timachidas rhodius uini genus passi dulce Hypochytō in Rhodo uocari tradit. Nā uinū Autōceras hoc dicitur, qd ita est exile, ut dilui nō debeat, ut iquit Pollux. Porro nostri, dulcia uina, Liberi patris Bellaria uocabāt.

PHALERNV M.

Phalerum, quod Græci Phalerinon uocant, nec in nouitate, nec in nimia uetustate corpori salubre. Prima eius ætas a decimo, media a quintodecimo anno incipit. A uigesimo capiti, & neruis est noxium. Duo eius genera. Austerum, cui rufus color: & dulce, quod tunc demum accidit, cum sub ipsam uindemiam austri flauerint: quo & nigrius efficitur. Athenæus, & Galenus auctores. Phalerno Statinum simile est, tantum lenius. Simile & Venaphranum.

Albani quoq duo sunt discrimina, subacerbum, & dulce, Vfus eque a quintodecimo ætatis anno. Inter Albanum, Phalerumq Labicano gloria: quod est dulce, ac pingue gustu feritur. A decimo placere incipiente. Buxentium Albano simile est, utiq acerbior.

CECVBVM.

Cecubum iam non gignitur, frequens olim in Terracina, fundisq: sicut & Setia. Parum a superioribus Statana non longo fuerunt intervallo. Nam Signini nomen celebre alio listendæ, in sexennium uetustate melius.

SVRENTINVM.

Surentinum, ueteres maxime probauerunt. Sequens grās, Albanū, aut Phalerum. Deinde alia aliq. Virum plus Surentino, austeritatis Albano, uehementi minus Phalerio. Surentinū a. 27. anno poculentum facit: quoniam macilentum, & aridū cum sit, ægre cōcoquitur, nec nisi uetustate castigatū utentibus prodest, qd & Tripholino accidit. Simile est & Aequanū. Celebrantur a medicis & Rheginū, Surentino pinguius, eoq celerius ad bibendū utile. Item Priuernū Rheginū tenuius: & Phormianū Priuerni simile, dūtaxat crassius. Tiburtino tenuitas red dicitur: idq a decimo anno bibitur. Prænestinū Tiburtino pinguius. Gaurano pstantiam paucitas quoq ipsa facit: ualidū hoc, & pcrassum. Mariscū austerum. Austerū & Barbinū Athengo, qd Balbinum dicitur, Balbiæ proueniens Plinio. E Campaniā ppe Cumas, Vluanū cōmendat: quinto demum anno poculentū, leue. Iam Calienū, quod & Phalerno pferūt, ad utilitates stōmachi. Fundanū plus iusto alit: ideo parcius erat cōuiuijs: q & caput, & stomachū tentabat. Sabinum leuitate pponēbatur omnibus. Vsum eius a septimo ad quintumdecimū ætatis annum probabant. Nomentanū a quinto anno incipit: nec leue, nec admodum suauē. Spolentinum suauē, coloris aurei. Caulinum prope Capuam, fortasse id quod eo loco tradit Polybius Anadendritū uocari, prælātū omnibus. Circa Neapolim Trebellicum. Herbulo color niger, non multos post annos candidus: delicatū hoc, & perq leue. Tarentina, & quæcunq illo tractu habentur, tenera sunt, & dulcia, & amica stomacho: cuiusmodi Lagaria, non procul Grumentum nascentia, Messalæ potu, & salute, ut Plinius retulit, insignia. Beneuenti fiebat Infumatum, quod Græce Capnias dicitur, a Platone comico, quemadmodum & uuæ fabrorū ferratorum, maxime fornacibus ex Africa, præcipua Tiberij Cæsaris cura.

A

Pli. ll. 14. ca. 6.

B.

D I O S C O R I D I S

A D R I A N V M.

Pli. li. 14. ca. 6.
per omnia.

C Adriana optima, ex intimo sinu Adriatici maris: quæ Pucina, a loco ibi sito dicta sunt: & a Græcis Pyctana, medicamentis aptissima: quibus Liuia Augusti octauaginta duos quibus tuixit annos, retulit acceptos, non aquosis. Haud procul a Timauî fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras, Britannor: regi adeo gratû, ut quotannis deferendû sibi curaret. Mamerinû uero, a colonis eius loci, non Messeniû, ut inquit Strabo dicitur, etiâsi circa Mellanâ in Sicilia proueniat. Hoc & Italicû quoq: dicitur, etiâsi extra Italiâ, ut Athenæus inquit, nascit. Siculû est, & Potulanû ab auctore dictû, qua proxima est Italiæ Sicilia. In eadem prouincia & Taurominitanis honor lagenis, pro Mamertino plarumq: subiectis.

P R A E T V C I V M.

Praetucia ex supero mari, sicut & Ancone nascetia, & quæ a palma uua forte enata, Palmae appellat: ut Plinio placet. Cassiodorus, Vinû quoddâ inquit Brutû appellauit, Palmatium laudare cupiens antiquitas. Nos Styplin, asperû, sed gratû suauitate. Nâ licet inquit, inter uina Brutia uideat extremû factum, tñ est bene gnali opinione picipu. Est em suau pinguedine molliter crassum, uiuacitate firmû, nari uiolentû, candore perspicuû, qd ita redoler ore tractatû, ut merito illi a palma uideat nomē impositû. Viscere defecia cōstringit, uulnera madida desiccant, lassum pectus reficit. Praeticiû mulso picipue cōuenire dicit, sicut Apamenû Syriæ. In ter externa Syriacû est: & qd reges Persar: bibebant, Chalyboniû uocatû: ut Straboni placet. Hoc Possidonius in Damasco Syriæ nasci tradit, eorûdem regum cura satum.

H I S T R I A N V M.

Histriano pximû natione Liburnicû fuit, ex Issa insula, qd Agatharchides p̄fert oibus.

C H I V M.

Chium, & Chiothes dicitur, hoc & Thasium. E uinis trāsmaria ueteribus fuere in summa gloria. Theophrastus Thasium, quod magistratus bibebant, antepōit omnibus. Terzio loco habebatur Clazomeniû, postq: parcius mari condere cōperit, utq: post homerica illa, Pramnion, & Maronites, siue, quod idem est, Maronæum, in Thraciæ maritima parte genitum, uities tantum addito aque miscendum Homerus censuit. Vin eius ad Plinium durasse legimus, prodentem sextarios singulos, octogenis aquæ dilui: nigrum colore, & odoratum, & uetustate pinguescens. Hinc (ut arbitror) Cratinus, uinum ipsum appellabat Maronem. Nam Monarites aliud uini genus est, Cappadociæ Melitena eius parte nascens, non postferendum nostratibus præstantia. Maronæum, a Marone filio Euanthis, satum publicatumq: Philostratus in heroicis suis testatur. Pramnion, a uite Primna dictum uolunt, aliqui a mansuetudine: quidam a caudicis crassitudine, quasi distinguatur a Crucio uocato. Est autê Crucium e uitis altissimis, qles Aricinæ sunt, acerbiusculû, & asperû. Porro Thracia putant & Ismaricû a Poluce, Biblinû ab Homero noiât: siue q: Biblina ea terra diceret, q nûc Tifara, & Oesyma noiatur: siue ut Epicharmo placet, a Biblinis Thraciæ mōtibus uocatis. Seruus Naxiû id existiat, qd Archilochus nectari cōparatû scribit a Bimblino, siue Biblo amne. Hoc i Sicilia Poliû, siue Polæum appellari, qm a Polide sicyonio, siue Rhegino, qui Syraculis regnauit translatû eo sit. Quidâ a uite Biblia, q in Italia uisat dicat. Nâ Byblos p, y, oppidû est i Phœnice uetustissimû: ut qd a Saturno conditû putet: ubi uinû quoq: medicamentosum ex herba fidicula cōficiat: ut diximus. Differt a Maronæo Mareoticû in Aegypto, a Maria lacu dictû, ubi nascit, ad uetustatē quoq: diffundi solitû. Nâ uicinû ei Libycû appellatû, p̄fertimq: ad Antiphras notû: improbat uel adagio, qm minus uini, q: maris habeat. Alexandriæ id uulgo bibit præcrude ac Zythû: ut Strabo ingt: etiâsi nō Zython, sed Zygon interps in eo legerit, & ad pōdera uti uino eo Alexandrinos ineptissime cōuerterit: in quē errorē & Domitius Veronēsis gnus corruit, in Propemptico Papini, qd incipit, Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Oia porro trāsmarina septē, in sex annis ad uetustatē mediā peruenire existimant. Vino Chio ueteres in oculor: uitis uti solitos, nomen ipsum indicat Collyriorum quorundâ, quæ Græci Chiaca cognouant. Hoc uinû & Ariusia, a loco, & optimû qd esset Aristum uocabant, Iulius Pollux auctor. Nigrû uinû in Chio primû fuisse Theopompus auctor est. Nam et uite serere in eadē insula, repertû putant ab Oenopione Liberi patris filio: qui & urbē in ea condidit.

Lesbium, sponte naturæ suæ mare sapit. Hoc & Protropû dicitur quotiens dulce est, itemq: Prodromon, Athenus auctor. Querat aliquis in Viâruuio, quis sit uerbor: sensus, cum dicit. Sed animaduertimus insulam Lesbion, uinum proitrum, maloniam, caracecaumenen, Item Lydiam molliton. Corrupta lectio: quæ sic restitueda est. Sed animaduertimus insulam Lesbion Protropion, Moxoniam, Caracecaumeniten; Lydiam, Tmolit dare, De Protropo di.

etum est superius, de Tmolite statim fiet mentio, de Catacecaumene Strabo. Catacecaumene inquit regio est, quam alij Mysiam, alij Moeniam appellant. Dictam uero ita, quod nihil in ea prae-
ter uinum gignatur: idque nobilissimum, ambusta uelut igni terra.

E P H E S I V M.

Ephesium De-fruto, & mari conditur: ideo insalubre. Phygelites appellatur ab oppido pro-
pinquo, quod Phygela Plinius, Pygellam plerique noiauerunt. In nomine sunt & transmarina,
& Leucadii, & Sapia, & Thasium: quibus principatum dat Hermippus in oppido Opunte: quod
et Plautus in Penulo demonstrat, sumptum ab Eubulo. Item ex Euboica Sciatho, et e Peparetho
insulis. Quod postremum hoc, multi sunt qui dant. Iam e Syria Phoeniciu uocatum quadoque
Cycliu: cuius & Xenophon in ascensu meminit. Laudatur & Magneticu, & ut alibi diximus,
Mendaurum. Praeterea ex Acantho urbe. Nam Cirimphiu asperum contemnitur. Troezeni, ut
ait Aristoteles, Anthedonidiu, & Hyperandiū comendant, auctores suorum nominibus, Hypero, &
Anthē: quod admodum & Althephiadiū ab Althebio: quod ex Alphei nepotibus fuit. Apyru quoque
uinu ab Alcmane poeta memorat. Est autem Apyron, quod etiam non est costu. Laconica sunt Pen-
talophiu a quinque collibus, ubi nascitur uocatur: item Denthadiu, siue Denthis: & Oenuntiu, &
Onoglis, & Stathiniu, a locis omnia, quae iuxta Pytanem sunt oppidu eius terrae. Theophras-
tus Erythaeum molle salsumque: idem Heracleoticu tradit odoratu, atque durum.

M E S S O G I T E S.

Messogites, & Tmoliu, aut quod idem est Tmolites, duo sunt uini genera, nomine a montibus Ly-
diae imposito, qui Thmolus, & Messogis appellantur. Messogites uero nobilissimu a loco Aro-
meum nomine, correpta secunda syllaba, ut Straboni placet. Tmolio per se gratia, ut uino non
est, sed cuius dulci admixto, reliquorum duricia suauitatem accipiat simul, & aetatem. Ex eadem
Lydia & Metropolitum uinum comendant, ab oppido eius uno Metropoli uocato.

V I N V M I N C O M M V N E.

De uino Incomuni, nonnihil & in mentione Annioli diximus. Nunc illud adijcio. Vinum
omne in infantia dulce est, tum uidelicet cum Mustum dicitur. Vbi autem pubescit, suauius effi-
citur, quod dulcius. Dulcedo enim seruendo adimitur Vinis. Vinum porro, aut uetus, aut nouu
est. Media aetas a medicis introducta est. Vulgo nescitur. Vnde notum prouerbiu Varroni,
Medium uinum, prandium caninum esse: hoc est, quia nullum tale uinum habeatur. Vt uel-
lus asinum Aristophani, pro eo, quod nuscum sit.

V I N V M O M P H A C I T E S.

Vinum Omphacites, siue Omphacinu, uidetur idem esse, quod & Bizeon Graeci appellauere:
quodque marinam ei aqua largiorem misceri adijciunt. Caetero conueniunt, Medicinae item congru-
unt. Ut errare uideantur, qui non Bizeon, sed Bion, quasi a uita deriuatum nomen scripserunt:
cum Plinius, a festinatione, quasi uolenter fiat, uocari prodiderit.

V I N V M D E V T E R I A.

Deuterias nostri Loras, siue Loreas, ut Cato, & secundaria, & operaria uilla nominant.
Lora, quod lota acina fiat, uocatur. Inter Deuterias, & Fecatum Cato appellat facibus uini ex-
pressum, quod a Columella Fecinum dici puto, a Polluce Trygephanion. Plinius Tortiuum
inquit, nouissime expressum intelligo: quod Cato Mustis tingendi gratia, ut pigmentum ali-
quod adijciendum praecipit. Graeci hoc uulgo Thamnam uocant, apud quos Autites uinum,
pro Deuteria sunt qui capiunt. Alii pro syncero, alii pro nostrate, hoc est, non alienigena, sed
patrio Galeno. Galenus in Hippocrate Autiten interpretatur, quasi autoctitem, hoc est, anni-
culum, siue ornum. Est & Tornu uini mentio apud Hippocratem, ad pulmonu praesidia. Vi-
tiosum uinu Graeci Tropian, & Ectropian, & Oxynon dicunt. Genus uini est & quod Grapi-
nam uocant, subasperu. Nulli ex his pluraque anno usus. Brant & quae spurca dicebantur uinat
sed apud Pontifices, hoc est, quae sacris adhiberi uetabantur: ut De-frutu, & Dilutu: & igni ta-
ctum: sed & Mustu quoque, ante quod deferuisceret. Vinu porro malu, Amphis graece dicitur a so-
ficrate, quasi dubiu: ita enim uocauimus & nos, auctore Plinio Fugacia. Praeliganea uocan-
tur & quae ad operarios, ut Cato inquit, ex misellis uuis premuntur. Circumcidanea uero, siue
ut Varro, Circumcisa uina dicimus, cum calcatis uuis scopi earu, siue scopia, ut Cato, cum
folliculis praelo subijciuntur iteru: hoc est, ubi desit fluere circumcisis extremis: non dissimile
Tortino, quod Graeci Bostrichitin (ut puto) uocant. Tortinu enim Columella dicit esse Mu-
stum, quod post primam pressuram uinaceoru circumciso pede exprimitur.

V I N V M A D Y N A M O N.

Adynamon ratio facienda uaria, sed omnibus fere cognita.

A

B

Pl. li. 14. ca. 10.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

CD Iscedentibus quondā ex Sicilia in Italiam Troianis, quæ uniuersæ classi & genti satis forent uina, bonus subinde cadis onerarat Acestes: Carthaginensis regina etiā, exceptis a naufragio ipsdem cum rege suo, centū instituerat famulas, totidemq; pares ætate ministros: qui dapibus onerarent mensas, & pocula cunctis deinceps ponerent. Ipsa etiā cum laticum in mensam libasset honorem, Bitūq; poculū increpitans dedisset, tanta copia diffundi uinū iussit, ut cum pleno ille se proluisset auro, post alij omnes biberent proceres. Tantus præterea, & eousq; uini laudator in suo carmine Homerus quibusdam uisus est, ut una hac suspicione, uinosus facile creditus fuerit. Fuerunt & in alijs cœnarū apparatibus numerata a poetis, præsertimq; a Flacco in carminibus suis, tam multa & generosa uina, ut naturæ copiam, & hominum pro uita & uoluptatibus studiū & artem merito aliquis in uino admiretur. Nullus tamen, toto orbe nascentibus uinis, & quibus tunc gentes maxime uterentur, plures, certioresq; ad salutem & noxam scriptore hoc notas assignauit: nec aliunde, ad utramq; fortunā, ex uini usu maior hominū, q̃ ex eo occasio est. In cæteris enim uini, aut alterius horæ uoluptas in cōuiuio quæsitā uino est: laudauitq; unusquisq; aut quod maxime apud se natū nouisset, aut quod ingenio, naturæq; suæ aptissimū sentiret: in hoc longiore historia, cunctosq; habita rōne, singulorūq; in natura decretis uiribus, nihil desyderandū legentibus relinquit: siue ad uoluptatē cœnas, siue ad honorem cōuiuia & epulas, siue ad ebrietatem cōmessationes, siue in quotidiano usu pocula, siue ad medicinā remedia parasse aliquis sibi uelit. Magna sane in multiplici hoc bono, & liberalior naturæ uarietas: nō minor tamē scriptoris huius diligentia, qui obseruatis toto orbe per se nascentis, & humano artificio exculti uini potestate & uiribus: a principio statim uetustatē in eo damnare incipiens, uariato librorūq; incuria sermonis ductū, dubitandū legentibus relinquit, simpliciter ne, uitanda foris & intus uetusta uina sint, his qui uitiosa & infirma interiore aliqua parte sint: an uitanda intus tantū his, qui infirma & uitiosa interiore aliqua parte sint. Dubitationi huic, & si non multifacienda sit, causam dedit, q̃ in antiquis græcis diuerso loco librarij dictiones eas pupugerunt. Sunt enim in quibus legitur, ἀσθενὲς μῆρος ἰχθύων ἴσθιν παρὰ τὴν τῆλεν. &c. Quod est. His quibus uitiosa & infirma interior aliqua pars sit, uitanda esse hæc uina. In aliquibus autem, ἀσθενὲς μῆρος ἰχθύων ἴσθιν παρὰ τὴν τῆλεν. &c. Quod est. Vitanda his intus uina hæc esse, id est, non bibenda, qui infirmā aliquam partē habent, non interiorem magis q̃ exteriorē: quasi intus damnāndus, foris autē concedendus eorū usus sit. Nos in ambiguo communiorē lectionem secuti, & ex potiore, frequentiorēq; uini usu, grauiorēq; eius noxa rem docuimus, uitanda his uetusta uina precipientes, qui interiore aliqua parte infirma sint.

De Melitide uino.

C A P. VIII.

ἔινος μελιτῆρος

Melitides datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarūt. Namq; aluū emollit. Vrinam ciet. Stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renibus, imbecillo capiti, & mulieribus abstemiis. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat a mulso quod sit e uino uetere, austero, & melle exiguo. Melitides autē adiectio ad quinq; congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quo magis ad efferuescēdum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale. Cūq; efferuere desierit, in alia uasa transfunditur.

Pli. li. 14. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

D Vlci e genere Melitites, sed austerum seculis. Iam fieri desisse Plinius existimat. Sit autem Melitites id, quod in Pseudulo uocat Plautus Mellinam illo uersu, Murrinam, Passum, Defrutum, Mellinam, in medio relinquimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Desierat, quo tempore naturalē historiam suā Plinius cōmentabatur, multoq; antea in usu esse Melitite hoc uinū: quoniam inflationes faceret, damnatū: & nihilominus confectionē eius, et ipse docet. 14. uolumine, capite. 9. eandē huic scriptori, aut paulo diuersam, medicināq; iidem 22. capite. 24. Quo minus miretur aliquis, nunc in nullo honore esse, uixq; in medicina nomen eius audiri. Antiquiores tamen oēs, ad explendā totius uini historiam de eo cum cæteris uini ge-

neribus tradiderunt: non inutili penitus, sed quod posset medicinā & ipsum augere, & humanae salutis aliquando adesse: praefertimque, ut hic ait, *πυναιξίν υδροποτοῦ χάρις*: Quod ceteri interpretes mulieribus uini abstemijs, ex Plinio uerterunt, nos simplicius, aquā bibentibus: haud sane quia non id pbemus, sed quod nescimus, an uini abstemijs simpliciter mulieres hic dicat; an in foetura uinum fastidientes, ideoque aquā bibentes. Ex quo enim hic uini huius usum ad mulieres priuatim contraxit, certā etiam priuatimque in foeminis cognoscendam causam intelligi uoluisse uidetur. Si enim simpliciter uini abstemijs dandum hoc uinū sit, non magis foeminis quam uiris dandum erit. In utroque enim sexu abstemijs uini passim uidemus. Quodque in foeminis, idem in uiris etiā hoc uinum poterit. Credimus ideo nos sic intelligi locū oportere: fastidientibusque in foetura uinum mulieribus Melitide dandum. Eamque ob causam, quoniam latius pater abstemijs uox, bibentes aquā mulieres nos diximus. Eoque pertinere uidetur quod statim sequitur, Odoratum enim est, & nutrit. Quorum alterū pertinet ad discutienda fastidia; alterū ad uitae nutrimentum, quod tunc maxime ad incrementū & firmitatem foetus praegnantibus indigent. Quod etiā a Dioscoridis non legitur. Nos tamen comunem secuti lectionē, eam seruauimus uocem, medicis diligentius excutendum relinquentes, quo modo huic malo prodesse Melitide hoc uinū possit. Adijcimus illud etiam, quoniam neruorum infirmitati omnes utile tradiderunt, & inter Latinos Plinius, etiā non male suspicaturum aliquem, quoniam idem in graecis renum & neruorum uocis principium est, uocatque ea gens renes *νεφροί*, neruos autem *νῆρρα*, potuisse eas librariorum imperitia uoces commutari, & pro neruis renes scribi. Medicinae quidem id certius responderet: in qua praecipitur, uitanda omnibus uina esse quibus uitio aliquo laborant nerui: tuncque his pro uino Melitide hoc dari. Coniecturas tamen haec nos, non detrecta esse uolumus.

De Mulso.

CAP. IX.

Mulsum e ueterē uino austeroque, & bono melle factum praefertur. Minus enim inflat, ac celeriter id genus uigore adipiscitur. Vetus corpus alit. Media aetate, aluo prodest. Urinā pellit. Ab ultimo cibo sumptū nocet. Et inter initia potum implet. Dein appetendi auaritia reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, ammixta una mellis. Aliqui quo celerius praebere possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondunt. Dulce autem permanet.

BARBARI COROLL.

Oenomeli, hoc est, uinum Mulsum: quamque nostri sine uini mentione hoc intelligunt, Mulsum dicentes. Vinum hoc facillime cum melle incorporatur, quod in dulci nunquam euenit, Mulsum in Thracia primus Aristeus comperit. Multi senectam longam intinctu Musti tolerauere, neque alio ullo cibo, Regium morbum Varro cognominatum aquatorium tradit, quoniam curatur Mulso. Cistibiles genus uini est, in Galatia nascens, & Balincium in Sicilia, quae saporem Musti, non uini praebent. Ex musto, quod fit Mulsum, Graeci Nectar uocant.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam in honore & dignitate Mulsum, uulgaris res, et quotidianus homini potus: qui rusticas & urbanas cellas pariter augeret: nec aliter quam cetera uina, cum opus esset, ad usum familiae seruaretur. Nunc mutatis moribus, & faciendae homini medicinae rationibus solum eius auditur nomen. Idque inmerito, modo uera sint quae Plinius tradidit, interrogatum Pollionem Romanum Caesaris hospitem, centesimum annum excedentē, quia nam ratione maxime uigore illius animi corporisque custodisset: Respondisse, foris oleo, intus Mulso. Egregia sane utriusque laude, sed eo Musti maiore quam olei, quo meliora, uitalioraque hominis intus quam foris principia & uitres sunt. Quo magis demiremur, exoleuisse penitus Musti usum: qui multus antiquis ideo fuit, quod persuaderentur, omnem animae asperitatem dulcioribus succis mitigari, spiritus leniri, transire, & molliores fieri meatus, experimentaque in se ipso cuique esse. Quando omnis animi impetus cibo & potu molliatur: eoque praefertim, qui non solum corporum medicinam, sed & morum etiam habeat. In quo genere Mulsum praecipue laudauerunt ueteres. Cuncta tamen haec bona praesens inflationis periculum & noxa inutilia homini fecit: desieruntque uti eo homines, nocere

C sibi ea ratione sentientes: paulatimque cum usu confectionis ratio etiam perijt. Nos tamen si cui nouisse eam gratum sit, ex Palladio qualis scribente eo erat docebimus. Qui. 12. libro in Octo-
bri mense de Mulsi confectione sic docuit. Mustum de maioribus & egregijs uitis post. 10. di-
es q̄ leuatum fuerit, ex lacu quantum uolueris sumis: & ei mellis non despumati optimi quin-
tam partem prius tritam fortiter donec albescat admisceas: & agitabis ex canna uehemēter. Mo-
uebis autem sic per dies. 40. continuos, uel quod est melius quinquaginta: ita, ut cum moueris
mundo linteo tegas, per quod facile confectio æstuanda suspiret. Post dies ergo quinquaginta
munda manu purgas quodcumque supernabit, & in uasculo gypso diligenter includis, & ad ue-
rustatem referuas: melius tamen si in minora & picata uascula proximo uere trāsfundas: & gy-
psata diligēter operies, & in terrena & frigida cella recondes, uel harenis fluuiatibus, uel eodem
solo uascula ex aliqua parte submergas. Hoc nulla uisitur ætate si diligēter effeceris. Et hæc de
confectione Mulsi satis modo dicta sint. Quibus in scriptore hoc addendum fuerat: quidnam,
& qua ratione hic dicat simpliciter implere Mulsum: nisi id medicis constituendum relinquere
mus, qui ex uini mellisque natura quid, & quo modo Mulsum impleat facile intelligunt.

De Aqua mulsa. CAP. X.

μελικράτον

Aqua mulsa easdem quas Mulsum uires possidet. Decocta uti-
mur, cum moliri deiectionem, aut uomitionem incitare uolu-
mus, ut ijs qui uenena hauserunt ex oleo. Decocta datur imbecillis, &
hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere Microsphyctos, tussi-
entibus, peripneumoniacis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam
paratum repositumque, quod aliqui hydromeli pprie uocant, media æta-
D te Adynamo uino, aut Lora correspondet, & similem uim adipiscitur.
Quare inflammationibus alicuius membri plus q̄ Lora prodest. Inuete-
rati tamen usus damnatur, inflammatis, aut constrictis. Sed laboranti sto-
macho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit duabus plu-
uiæ aque ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fonta-
nam aquam adijciunt, & ad tertias parteis decoquunt, & ita recondunt.
Nec desunt qui hydromeli appellant, qd a melle elutis aqua fauis con-
fici soleat. Sed meracius facere conuenit. Aliqui id coquunt. Aegrotan-
tibus noxium est: qm plurimam sibi floris cerei partem uendicat.

BARBARI COROLL.

Meliceraton, & mixtum mel, & aqua mulsa dicitur interim, & dulcis aqua. Rationes aquæ
mulsæ conficiendæ plures sunt apud rei rusticæ scriptores. Alia res est Metaceras apud Hippo-
cratem, quæ uox egelidum, siue quod idem est, tepidum mixtum significat, hoc est, Galactio-
des syncrama. Iulius Pollux nescio q̄ recte, Meliceratum inquit est, quod nunc Oenomeli uoca-
mus. Ceteri magno hæc discrimine separauerunt. In Aethiopia Troglodyte Meliceratum e cu-
iusdam herbæ floribus conficiunt, proceribus bibendū uini loco, sicut dilutū Paliuri, populo, q̄
Hydromeli, secundum Aquæ mulsæ genus est, saporem uini uetustate assequitur: nuscq̄ ma-
gis laudatū, q̄ in Phrygia, ex imbre quidam puro, & melle: damnatum multis annis, iisdem ul-
tjs quibus uinum, nec iisdem utilitatibus.

EX M. VERG. COMM.

Frequens, & nullo nō fere capite repetita μελικράτον, et ἰσοπομίδιον huic scriptori uox est, tam
exiguo rei discrimine, si substantia & usus æstimeretur, ut totam nominis, nullam autem rei dif-
ferentiam fuisse antiquis in ea merito quispiam crediderit. Vtraque enim melle, & aqua constat:
& iisdem fere Plinio & alijs utriusque usus sunt. Quod differre in eis uidetur, sola confectionis ra-
tio est. Quam plerique non tanti faciunt, ut diuersi generis ob id eas faciant. Hic tamen, et post eū
Plinius, omnesque alij seorsum de utraque agentes, diuersas merito constituisse creduntur. Eamque
ob causam diuersis nominibus in scriptore hoc indicatas, diuersis & nos appellationibus eas in-
dicauimus, dulcem alteram, mulsam aquā alteram appellantes. Fuitque nobis dulcis aquæ au-

A
 Auctor Columella, qui postremum Hydromelis genus, quod maceratis aqua fauis fieret, a Dioscoridis proprio, & uero Hydromeli additum dulcem. 13. uolumine, capite. 11. aqua nominauit: inscripto etiam de dulcis aquae confectione capitis titulo: ut diuersis uocibus in opere hoc, diuersa saltem confectione Hydromelis ab aqua Mulsam ostenderetur. Et si quod maxime inter eas differt, sola aetas est: dicente Plinio. Mulsae aquae genera duo, subita, ac recentis alteri: in ueteratae alterum. Nec Plinio tantum, sed hoc ipso scriptore etiam: qui cum Melicratum, quam nos Mulsam aqua interpretati sumus, proposuisset, subita & recentem illam Plinius intelligens, subiecit statim, το δὲ οὐκ αὐτὴν ἔστιν, ἀλλὰ πρόσθεν. Quod est, ut nos uertimus, Quae autem maiore apparatu in ueterata seruatur. &c. In qua descriptione Hydromel, id est, dulcem aqua a nobis dictam intelligi tantum uoluit: praesertim cum adiecit, quae priuatim quidam Hydromel uocant. Congenere enim, & eiusdem substantiae dulcis, & Mulsam aquae sunt, & sola uetustatis ratione inter se differunt. Eamque ob causam promiscuum in medicina usum habuerunt: praeterquam in quibus nouitas, aut uetustas eius priuatim exigeretur. Quod nos ignorantes, seruatis ubique scriptoris huius uocibus, huiusmodi uestigijs esse secuti: ubi Hydromel erat, dulcem: ubi Melicratum, Mulsam aqua semper reddidimus: ne si hoc magis quam illud exigeretur genus, uocum earum uarietate, & inconstantia, grauiore periculo morborum remedia miscerentur. Quotidianus, ut uidetur, communisque utriusque huius aquae quondam fuit usus. Indicantque id rei rusticae Romani scriptores: qui nisi ad usum familiae confici, & seruari consueuissent, nunquam in ruris disciplina de confectione eius tam certe docuissent. In quo monuisse illud uolumus: a Columella lib. 13. capite. 12. Mulsam appellari aqua utrumque hoc genus: a Palladio contra in Iulio mense Hydromel: quoniam, ut diximus, facile miscebantur, quae tantopere inter se similia erant: praesertimque ab his, qui non ut in medicina oportet, certum illud & exactum quaererent. Docuit Hydromelis confectionem Plinius lib. 14. capite. 17. uinumque appellauit, ob eamque mox patebit causam. Verba eius sunt. Fit uinum ex aqua ac melle tantum. Quinquennio ad hoc seruari coelestem iubent prudentiores aliqui. Alii statim ad tertias partes decoquunt, & tertiam mellis ueteris adijciunt: deinde quadraginta diebus canis ortu in sole habent. Alii diffusa ita decimo die obturant. Vocatur hoc Hydromel, & uetustate saporem uini assequitur. Soporem uini uetustate assequi Hydromel Plinius ait: eamque ob causam uinum uocari: cum tamen nihil uini admixtum habeat. Hic non saporem uini, sed uires assequi dixit, Loraeque pares habere uires: utile instaurandis in ualitudine aegrotorum uiribus: quod apperentibus his uinum innocenter potu daretur. Diximus ex Plinio, quale Hydromel quondam fuerit: dicemus nunc ex Columella, qualis Mulsam aqua fuerit: ut utriusque certior ratio pateat. Verba eius sunt. Haec autem non uno modo componitur. Nam quidam ante multos annos coelestem aqua uasis includunt, & sub dio in sole habent. Deinde cum saepius eam in alia uasa transfuderint, & eliquauerint (nam quotiens etiam per longum tempus diffunditur, aliquid crassamenti in immo simile feci reperitur) ueteris aquae sextarium cum libra mellis miscent. Nonnulli tamen cum austeriorem uolunt efficere gustum, sextarium aquae cum dodrante pondus mellis diluunt: & ea portione repleta lagenam, gypsatamque patiuntur per caniculae ortum in sole quadraginta diebus esse: tum demum in tabulatum quod sumum accipiat reponunt. Nonnulli, quibus non fuit curae coelestem in ueterare aqua, recentem sumunt, eamque usque in quartam partem decoquunt: deinde cum refrixerit, si dulciorem Mulsam facere uolunt, duobus aquae sextarijs sextarium mellis promiscunt: si uero austeriorem, sextario aquae dodrantem mellis adijciunt: & his portionibus factam in lagenam diffundunt, eamque sicut supra dixi, 40. diebus insolatam in tabulatum postea quod suffumigetur reponunt. Et haec quidem Columella: cui non dissimilia Palladius instituit quod diximus loco. Docet praeterea Columella alterius dulcis aquae confectionem, quae maceratis aqua fauis, & fauorum ceris fieret: quam Dioscoridis in postremo capite numerat. Eam poterunt uolentes in eo scriptore uidere. 11. tertij decimi uoluminis capite: quae in medicinae usu damnata ab eo est: quoniam stomachi, & praecordiorum inflationes faceret: confectionem tamen eius monstrauit, quoniam condituris oliuarum, aliarumque huiusmodi rerum pro Deferuto utilis esset, & cibarium saporis haberet. Prodesse Mulsam aquam, darique decoctam Dioscoridis ait. τὸ μικρὸν φάρμακον ἔχει, καὶ διὰ τὴν ἰσχυρίαν, quod est, ut nos uertimus, his qui pusillis uenarum pulsibus & multa corporis infirmitate sint. Plinius tamen aliter docere rem uidetur. Vigesimo enim secundo uolumine, capite. 24. ait. Inuenio etiam apud auctores hunc potum bibendum aliosos, item animi humilis & praeparci, quos ille dixere Micropsycho. Videturque Micropsycho & humilis & praeparci animi eos appellare, quos hic μικροψυχῶν, & ἀδυνάτου uocat. Quae omnes uoces ad corpus, non ad animum referendae sunt. Monuisse id placuit, quoniam diuersa penitus Mulsae aquae tribuisse auctores hi uidentur. Nobis in scriptoris huius sententia magis inclinamus. Relinquimusque peritioribus cogitandum

Dd 11

D I O S C O R I D I S

C quale sit quod a Plinio dicitur. Sunt autē pusillis uenarū pulsibus huic scriptori homines, quibus, ut Galenus in diffinitionibus suis docuit, exigui uenarum pulsus sentiuntur ad minimam longitudinem, altitudinemque & latitudinem extollente se & insurgente arteria.

¶ De Aqua. CAP. XI.

Aquam in uniuersum, propter locorum proprietates & peculiares naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est experiri. Magna tamē ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps. Et quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur. Ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiam. Si nec inflationes creēt, nec corruptioni cedat.

BARBARI COROLL.

Aqua profluens, utilior existimatur stagnante, ac pigra. Tum putealis quærenda. Cisternarum ab alijs laudatur, argumento subtilitatis: ut quæ subire in cœlū, ac pendere potuerit. Ab alijs damnatur: ut quibus ffordium, & limi, & animalium quoque plurimum inesse sentiatur, citius simumque ideo calefiat aqua pluuia, computrescatque, minime durans in navigatione. Grandinis quidem potus, in confesso pestilentissimus. De niue, & glacie dissident sententiæ: alijs subtilissimas eius elementi partes arbitrantibus, quia pendeant in sublimi: alijs crassissimus, atque iccirco insaluberrimus inde haustus, quoniam exinanitū sit quicquid reuissimū in ijs erat. Liqueor omnis congelatione minuitur: & rore nimio scabies fit, pruina uredines, Aqua septies putrefacta, purgataque, non putrescit amplius. Amnica non statim utilissima, sicut nec torrentiū. Palustres, pluribus locis salubres. Parthorum reges & Choaspes, & Eulco amnibus tamen bibunt: ex quauis in longinqua comitant illos. Salubritatis argumentum est, anguillis scatere amnes, sicut uisū limū, & frigitis in fontibus tineas: ut quæ uulgo nominatur Lampredæ, quasi lampyrides, aut Lampetræ, a lambēdis petris, in cibos admissæ laucioris uitæ: interim anguillarū amplitudine, parte plurima digiti minimi crassitudine, palmi longitudine: cetero anguillis pusillis, & murenulis simillimæ: nisi quæ septem habent a capite in collum foramina. Aquæ ante omnia improbantur amara, & quæ scrobem statim impleant. Fontes, Græci nymphas: & altrices Liberi parvis cognominant, in sacris uinalibus, quæ ipsi Lenæ dicunt: quia uinū addenti, modū eius augeant: siue quia, ut Theophrastus inquit, uites piceis, aquā reddūt, & illachrymāt. Est & cœlestis aqua, siue potius diuina, chrymistarū: quæ et Democritus, et Mercurius Trimegistus nouere, modo tamen uisum, modo scythiicū laticē appellantes, modo Pneuma, hoc est, spiritū ex ætheris natura, & essentia rerum quanta: unde aurū poculentum, & iactatus ille, nec dum inuentus philosophorum lapis, & sabulum confiet. Hinc & arti datum nomen, Plammurgicen, & Mysticen, & Hamophysia, & sacra & maximā uocando, seu literas quasdam seclusas habeat, & a quibus profanum uulgus arceri cōueniat. Hoc genus laticis (ut arbitror) significat epigramma nuperrime in agro Patauino, iuxta oppidulū Atelle inuentum opere lateritio, ac proinde fragili, per imprudentiamque manus rusticæ proscindentis: ubi terram, corrupto: cuius memoria ne pereat, uerba prætexuimus.

Plutoni sacrum munus, ne attingite fures!

Ignoratum est uobis hoc, quod in orbe latet.

Namque elementa graui claudit digesta labore,

Vase sub hoc modico maximus Olybius.

Adsit focundo custos sibi copia cornu,

Ne precium tanti depereat laticis.

Abite hinc pessimi fures. Vos quid uultis cum uostreis oculis emissicis?

Abite hic uostro cum Mercurio petasato, caduceatoque. **MAXVMVS**

MAXVMVM DONVM PLVTONI HOC SACRVM FACIT.

¶ Tertium discrimen aquæ mulsæ, Apomeli dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Aquæ, ut Græcorum uoce utamur, probatur aqua. Dico autē, & πικρὴν, quasi sequelem, id est, qualitate omni carentem: quæ nihil odoris, colorisue aut saporis habet, & friget. Si enim ex terra emergens, calebit metalli alicuius, aut subterranei ignis contagio per quod transierit, medica

mentosa & infecta plerumque erit: quales diuersis locis medicinae tantum utiles inueniuntur, a medicis per tempora deinceps cognoscenda, & ex infectionis calorisque sui natura, ad sanitatis & morborum remedia transferenda. Vt quae sulphureae fuerint, neruis medeantur: quae caluminosae, sanguinis reiectionibus, & non suo tempore & ordine purgantibus se foeminis: quae nitrosae & salae, capiti: quae ferratae, stomacho & lieni prosint, aliisque uitijis & morbis alijs potestibus altae. In quo non tantum bonitates, uiresque earum ad sanitatem, sed uitia etiam ad morbos cognouisse oportebit. Quae tota res quoniam longior est, tractari hoc loco nec debet, nec potest. Illud tantum meminisse semper oportebit: quoniam multus & quotidianus aquae homini & pecori usus est, nihil diligentius curandum homini esse: neque id tantum quod Socrates precipiebat, non agendum his locis nobis esse, in quibus nec iusticia, nec profluens aqua perennis erit, sed quae citissime & longius fugisse illinc, ubi uitio aliquo infectae aquae uarios subinde faciant morbos: quales multis locis fuisse quondam audiimus, & esse adhuc quotidiana experientia cognoscimus. Pro qua re satis huic scriptori fuit monere, quale oporteat quesiisse & probasse aquam. *καίτοιχον*, ut inquit, *ὁ ἀσθενέστερος ποιεῖται*. Quod est, ut nos uertimus, cuiuscunque qualitatibus expertem. In quo subscribentes sibi habet posteriores omnes graecorum medicos, *ἵδωρ λίγνται ἢ ἀποστεινόντες καὶ κατὰ γαστρὴν καὶ κατὰ ὀστέον*, id est, probatissimam esse aquam, quae omni penitus in gustu & odore qualitate carebit. Quin etiam adiecerunt, aspectu & oculis purissimam esse oportere: haecque bibentibus utilissimam fore, & suauissimam. Licetque hic probari puram, dulcemque dicat, non tamen intelligenda aquae dulcedo est qualis in ceteris rebus dulcis sapor sentitur & est: sed quod hic ait *γλυκὺ*, quae uox in communi significationis aestimatione, dulce significat, pro suauis, & in potu amabili recipiendum est. Sic enim Paulus Aegineta *ἵδωρ* in hac ipsa re uocauit. Siquidem ad aquae suauitatem satis est, ut sine odore, saporeque, & aspectu pura solo frigore commendetur. Et haec dulcedo eius est, quam hic communi dulcedinis uoce indicauit. Cetera huic & alijs communia sunt. Sed longe plura ab alijs quam a Diosco. de tota ratione Aquarum dicuntur. Quae in Plinio, Victruuo, rei rusticae scriptoribus, mille alijs graecis, latinisque auctoribus cognoscenda uolentibus relinquimus. Longior enim & numerosae uarietatis ea disciplina est. Quodque hic, quoniam multiplex erat, professoribus cognoscendum deinceps reliquit, tractari ob eandem causam a nobis non debet.

De Aqua marina.

CAP. XII.

Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur. Aluum enim conturbat. Pituita expellit. Si uero calida ad fatus adhibeatur, elicit, & discutit. Neruorum uitijis, & perniciosis ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepescit infunditur. Ad tormina calida, psoras, pruritus, impetigines, & mammas turgentes foueri utile est. Liuios suffitu discutit. Ad uenenatos ictus qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumque. Etiam si quis in calidam descendat auxiliatur. Et malo habitu confectis iamdiu corporibus, neruisque, balneae ex ea utiles. Hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates feruentis uapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquae mixture reposita, uirus deponit. Sunt qui etiam precoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per se, aut ex posca, aut cum uino, aut melle. Verum post deiectionem, dant gallinae, aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

BARBARI COROLL.

Aquam maris, hoc est, hydor thalassion, probant ex alto hausta, nullaque dulcium mixtura. Haec rubiginem ferro exterit celerrime. Dulcescit enim argilla percolata. In mari expansa circa nauim uellera madescunt halitu maris: qui postea dulcis exprimit. Demisse raticulis in mari coctae e cera pils, aut uasa inania obturata, dulce intra se colligit humorem. Verustate uirus deponit. Codunt aquae rosae, & Rosaceae uocant, hydor rhodina, & hydor rosata Graeci appellant.

Dd ij

B

θαλάσσιον ὕδωρ

Poterunt quibus procul a mari agentibus marinam aquam, & remedia eius negant naturam, maris aquam non multo sumptu laboreque, ex ueterum disciplina sibi facere. Præcepit hi, quatuor aque sextarijs, salis sextariū misceri: hisque utriusque rei portionibus, salissimi maris uina & naturam impleri. Moderatissimum tamen putari, supradictam aque mensuram octonis cyathis salis temperari: quoniam ita & neruos calefaciat, & corpus non exasperet. In quo mirum est, quantopere salutis hominis natura cauit, modo uera sint que illi retulerunt, si plus quam sextarius salis cum aque sextarijs quatuor mergatur, uinci aquam, salemque non liquari. Intelligens enim nociturum quod nimis fuerit, certam incuriæ & ignorantie hominum legem huiusmodi natura præscripsit. Poterunt itaque procul a mari agentes, marina aqua morbos, uitiaque corporum suorum hac ratione curare. Quæ ut certius cognoscantur, non pigebit aliqua hoc loco signare, quæ aut mutata a nobis, aut cum alijs eadem nobis non sunt. Quorum illud primum est: dixisse nos purgare marinam aquam pituitam, & præter pituitam bilem: quoniam utraq; in uetustioribus & melioribus græcis legebatur: & Plinius lib. ii. cap. 7. dixerit, bibi non sine iniuria stomachi ad purganda corpora, bilemque atram: alioquin in cōmuni lectione pituitam tantum purgari indicatur: & posteriores græcorum medici pituitæ utilem tantum dixerunt. Signamus nos rem, & diuersitatis nostræ causam reddimus.

De Thalassomelite. CAP. XIII.

Quod Thalassomeli uocant, uehementer purgare constat. Temperat autem æque portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, et picato uase per canis æstus insolatis. Alij ad binas marine coctæ sigulas mellis adiiciunt, et uase condunt, moderatius autem marina, et mitius.

EX M. VERG. COMM.

Nihil certius in Plinio Thalassomellis huius confectione est. Eam enim uolumine, capite quinto docuit scriptor ille. Sed qui alter ex scriptoris huius interpretibus eo duce usus est, ueritatemque, confici Thalassomel æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto: qui totus uerborum Plinii in hac ipsa re ductus est, quod in Dioscoride non legitur addidit, & quod a Plinio dicitur in portune, nec suo loco reddit. Quod enim Plinius ex alto dicit, non ad imbrem in eo pertinet, sed alterius membri principium est. In quo cum dixisset, melle, mari & imbre confici Thalassomel: sumpto iterum sermonis principio, ex alto, & ad hunc usum aduehi, non imbrem, sed maris aquam dixit: nec littoralem, ideoque lutulentam, aut dulci aqua mixtam, sed ex alto, id est, longinquiore mari petendam esse: quod in coelesti aqua & imbre dici non potest, qui ex altiore parte coeli repeti nequit, sed dum decedat expectandus, & cum deciderit colligendus est. Non animaduertit, pungendas in Plinio uoces eas esse, antequam ex alto, & ad hunc usum aduehi iuberet. Facile præterea erat meminisse in poetis, altum passim mare, non cælum, aut aerem dici: & Columellam lib. ii. cap. 16. marinam aquam ad muricæ confectionem de alto peti iubere. Verba eius sunt. Quod si ager maritimus est, silentibus uentis de alto tranquillissime mari fumenda est aqua. Pertinet hoc ad huiusmodi confectionum disciplinam. Semperque non nisi ex alto procul a litore, ob eas quas diximus causas, petenda est maris aqua. Quod forte in scriptore hoc desiderauerit quispiam. Ideoque a nobis longius repetitum id est.

De Aceto. CAP. XIII.

Acetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile. Appetentiam excitat. Erumpentem undecumque sanguinem, potu incessuue sistit. Prodest alui fluctationibus coctum cum cibis. Cruentis uulneribus inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositum. Repremit procidentia sedis, uuluaque. Item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedænas ulcerum, nomasque fotu continuo cohibet. Podagricis calido fotu cum sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis,

ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur. Ad A
 aquam intercutem, grauitatem aurium & sonitus, sibilosq; feruentis ua-
 por proficit. Instillatum quoq; aurium uermes necat. Panos cbercet te-
 pidi forus, aut si imbuta aceto spongia admoueatur. Pruritus permul-
 cet. Contra uenenatos morsus, qui refrigerando nocent, calidum com-
 mode fouetur. Et frigidum ijs, quæ exurens uirus eiaculantur. Calidū
 potum, atq; uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax
 est, presertim contra meconium & haustam cicutam. Conglobatum in
 uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam, taxumq; cum sale.
 Haustu uoratas hirudines si sorbeatur eijcit. Tussim ueterem mitigat,
 & recentem laceffit. In orthopncea calidum commode sorbetur. Gur-
 turis fluctiones gargarizatum inhibet. Anginis, & iacenti uuæ conue-
 nit. Contra dentium dolorem calidum colluitur.

BARBRAI COROLL.

A Cetum, id est, Oxos, uini quidē uitium est. Sed ad luxuriam cessit hominibus: tot ad usus
 expetitū, sine quibus uita, ut inquit ille, mitior exigi non posset. Est & Vapda uitium uini, sed
 nulla ex cōmendatione. Quin probrosa quoq; res, uel hominū conuitio, quorū degenerauit
 animus. Fit aut Vappa, cum iterū sponte musta feruent. Infusum terræ acetum, spumat, saxa
 rumpit, quæ non ruperit ignis antecedens. Cibos quidē & sapores, non alius magis succus cō-
 mendat & excitat. Compescitur eius asperitas, tosto pane, aut uino, aut sale. Contra iners, ac-
 cenditur pipere, aut lasere. Acetum fit etiam non ex uino cōmentitium multis modis: sicut ui-
 num & oleum, sine uuis & oliuis. Acetum aliud non esse q; culpatum uinum, quis nesciat? Mi-
 xtum oleo Græci Oxelæon, sicut aqua Oxycratum, nos Polcā, Pulcamue dicimus. Ipsi quoq;
 Græci Phuscā, ut Paulus & Actius. Infubres & Ligures Padani, uinum secatum, siue Lorani
 uulgo fere Polcam nominant. Nam acetum rosaceum, Oxyrhodinon græce dicitur. Acetum
 natura frigidum comprobat Galenus. Calidissimum Theophrastus existimauit.

EX M. VERG. COMM.

Q Vale homini uinum natura dederit ex aceto, quod uitū eius est, facillime ratiocinabitur
 aliquis. Intelliget enī, omnium bonorū eius quæ tam multa numero usq; necessa-
 ria & grata homini sunt, id maximū merito esse, cuius labes & uitium, tam multas medico salu-
 tis, patri uero familias uitæ occasiones affert. Cibos quidē & sapores nō allus magis succus cō-
 mendat, aut excitat: nullus etiā tam efficaci remedio contra tot mala pugnat. Neq; autem ego
 dicere, utrobi liberalior humano generi omniū parens natura fuerit. Id certe omnes sine inui-
 dia fatebimur: esse quidem multorū, quæ sponte sua uitata, bonitatē suam amiserint, in sanita-
 te & morbis aliq; usum: esse itidem, quæ uitari & corrumpi ob easdē causas a nobis cogant:
 sed nihil frequentiore opera, maioreq; diligentia, q; uinum in quodidianos uitæ usus ad contra-
 riam aceti fortunam transfertur. Cogiturq; deficiente aceto, acescere uinum, tantū naturæ mu-
 nus: ut omnem domesticā rem nihilo minore q; uinum gratia ad cibos, & ciborū condituras
 instruat. Rara, & quæ uni Diogeni inter sapientes cōtingerat laude. Vt enī ille paupertate sua in-
 ter gentes claruit, quotidianamq; ex infelicitate laudē inuenit: non dissimili ratione ex uitio
 gratia sibi acetum fecit: nec quicq; in uitiorū naturæ censu tam multos habuit semp, & adhuc
 habet usus: ex quorū numero hic tantū eos tradidit, quibus aliquando ad salutē medicina indi-
 get. In eis satis certa omnia sunt, nec quicq; est quod legentes mōnet longius oporteat. Quod
 inter Barbarū & nos unum discrepat tantū significabimus: idq; ad uenena pertinet, quæ ille ue-
 nenata nominauit. Verba Diosc. sunt, ποικίλη πρός τὰ θανάτεια, quæ qualia sint ipse statim nu-
 merat: opitum, cicutam, concretum in grumos sanguinem, & lac, fungos, ixiam, & taxum:
 quorum nullum rite uenenatum dicitur. Venena enim ipsa sunt. Venenata autem quæ uiuen-
 tia animalia parem uenenis illis noxam ictu, morsuue illatam relinquunt. Suntq; primum in
 natura uenena, mox eiusdem maleficij communicatione uenenata: ideoq; in diuerso genere
 constituenda, nec simul miscenda: presertimq; in hoc usu in quo bibendum acetum est: tum
 uomitionibus reddendum. Quod in uenenis quotidianum est. In uenentis autem fieri ne-

Dd. iij

D I O S C O R I D I S

C quit, quæ foris nocuerunt, non hausta nocent: ideoq; uomitionibus reddi non possunt.

De Aceto mulso.

CAP. XV.

οξυμυλ

A Cetum mulsum, quod Oxymel uocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinque, salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina, atq; ubi refrixerit diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischia-
dicis, comitialibus, & articulorum morbo conflicta-
tis prodesse creditur. Contra morsum eius uiperæ quam Sepa uocant, haustum meconium, ixiamue, auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

Pli. li. 14. ca. 17
lib. 23. cap. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Oxymeli a Themisone, & Asclepiade medicis damnatum prædicant, Acetum mulsum latine dici potest. Nam mixtum cum saccharo pro melle, Oxysachar appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

D Ocuit duobus locis Aceti mulsi confectiōem Plinius, primum. 14. uolumine, capite. 17. tum. 23. capite. 1. alterā simpliciter, alterā ex Dieuce antiquissimi medici auctoritate: nec eodem modo utraq;. Siquidem in alterius confectiōe cœlestem, in alterius marinā aquā sumi iubet. Ex eo non importune suspicari aliquis possit, deesse huic scriptori in oxymellis confectiōe aquæ genus. Neq; em uerisimile est, qd non eodē modo a gentibus tunc fieret, incertū ab eo relin-
ctū fuisse. Locus in Plinio primū est lib. 14. cap. 17. Suntq; de Oxymelle eius hæc uerba. Quin-
etiam acetū melle temperabat: adeo nihil intentatū in uita fuit. Oxymel hoc uocauerūt: mel-
lis decem libris, aceti ueteris heminis quinque, salis marini libra, aquæ pluuiæ sextarijs quinque,
sufferuescatis decies: mox obturatis, atq; inueteratis. Et hæc prima Plinio Oxymellis confectio
fuit. Alterā deinde. 23. uolumine, capite. 3. idem his uerbis tradidit. Oxymel antiqui, ut Dieu-
ces tradit, hoc modo temperabant. Mellis heminas decem, aceti ueteris heminas quinque, salis
marini pondo, thymbræ quadrantē, aquæ marinæ sextarijs quinque pariter coquebāt, decies de-
feruescente cortina: atq; diffundebant, inueterabātq;. Quæ omnia præterq; in genere aquæ ea-
dem huic scriptori sunt: desiderariq;, ut diximus, in eo id tantū potest. Verūtamen ut nos in
medicinæ scriptoribus alijs, Galenoq; præsertim quarto lib. de his quæ faciunt sanitatem obser-
uauimus: quemadmodū non erat una conficiendi Oxymellis ratio, sic etiā non unum, idemq;
placuit diuersis eius auctoribus aquæ genus: uerū cœlesti aliq;, marina aliq; usi sunt, pluresq; sim-
pliciter potabili. Neq; omnes antea melli & aceto mixtā inueterabant, sed in ipso usu aquā, sta-
tū Oxymelli non aliter q; in uino sit, miscebant. Testis ejus rei, quo diximus loco Galenus est,
qui despumato præcedente coctura mellis aceti tantū misceri iubet, quod gustanti nec acidum,
nec dulce nimis sentiat. Cumq; duo hæc miscuerit, iterum coqui ambo simul præcipit, usq;
dum diuersi liquores inuicem penitus se miscuerint, nec crudum bibentibus acetum sentiat.
Ex quo tempore cum exiger usus, misceri aquā præcipit, eodem temperamēto quo ad potum
uina aquis temperantur, nullo aquæ discreto genere. Quo fit, ut potabilem simpliciter intelli-
gi oporteat. Et hæc pro Oxymelle dicta hætenus satis sint.

De acida Muria.

CAP. XVI.

οξυμυλ

A CIDA MURIA, quam Græci Oxalmen uocant. Contra
anomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus
auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim ca-
lida in uulnus injiciatur. Prociduam sedem reprimat. Dysentericis si no-
mas sentiant, infunditur. Oportet autem eam ex lacte instillare. Hirudi-
nes sorbitione, aut gargarizatu necat. Furfures & manantia capitis ul-
cera extergit.

B A R B A R I C O R O L L.

Oxalme dicta, qd ex aceto & sale fiat, quasi acetū salsum efficaciter, si sit recens acetū.

EX M. VERG. COMM.

Mixtis simul aceto & muria, quemadmodū in Galla primo uolumine dictum iam pridē a nobis est, Oxhalme quondam fiebat. Indicatq; id nomen etiam: quā illi ad ea excogitauerunt, in quibus sale & aceto opus esset. Præferebantq; in ueteratam: quoniam recentibus aceto & sale efficacior erat. Quos aut priuatim in medicina usus quondā habuerit, hic satis docuit; eamq; ob causam ad Thymoxalme, cognatam ei rem, sermonem nostrum nos transferemus.

De Thymoxalme.

CAP. XVII.

Thymoxalme ueteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulū, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

BARBARI COROLL.

Thymoxalme, quasi thymata falsilago dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Rara hæc in antiquis medicinarum scriptoribus auditur uox: nō multi ideo fuisse usus aliquis Thymoxalme credat. Ad explendam tamen historiam, quoniam nihil intentatum uita sibi reliquit, confectionem eius hic docuit: quæ Oxalme eadem esset, nisi ex horto adiectæ illi herbæ pauloante numeratæ fuissent, quæ ex uiribus suis in diuersis corporum nostrorum uitijs eam commendarent. Fuisseq; usum eius in ducenda per aluum pituita, testis hic ipse in Thymo herba est. Siquidem habere Thymum ait *δύναμιν πινόμενον μετὰ ἄλαν καὶ ὄξους ἄγιν φλεγμονώδους κατὰ νοσήσαν*. Quod est, Potum cum sale & aceto pituitosa per aluum ducere. Quo genere remedij Thymoxalme hanc indicasse palam uidetur: quæ Thymio, aceto, & sale præcipue conficiebatur. Testatus in Pulegio etiā hic ipse est, multis ex ea herba remedijs efficaci uirium societate aceti addi. Qua ratione Thymoxalme quæ inter cætera aceto etiā constat, nunc Pulegij additur.

De Scyllino aceto.

CAP. XVIII.

Scyllinum acetum hoc modo fit. Scylla quæ candida fuerit expurgata conciditur, traiectaq; lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus. Mina eorū in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & uase diligenter operto, septenis diebus in sole madescit. Post eum numerū dierū Scylla eximitur, & expressa abijcitur. Defecatū acetū transfunditur & reponitur. Aliq; Scyllæ minā, quinque aceti sextarijs miscet. Alij citra exiccationē repurgantes, parē mensurā adijciunt, & senis mensibus macerari patiunt. Id multo magis humorū lēticias digerit. Gingiuas humore pregnātes collutione stringit. Et motos dentes firmat. Putredines oris, & graues halitus tollit. Durat fauces, & callosas facit. Vocē expedit, & limpidā canorū reddit. Datur stomachicis, egre cibū cōcoquētibus, melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis. Itē uuluarū strangulationibus, lienis incremēto laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat. Corpus sanū reddit, & bonū colorē præstat. Oculorū acie exacuit. Tarditatem quoq; aurium infusione purgat. In summa, ad oīa efficax. Cauēdū tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū ui-

D I O S C O R I D I S

C tjs. Datur quotidie ieiunis sorbendū, inter initia exigū, paulatim adau-
gendo ad cyathum usq;. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Pli. li. 10. ca. 9.

A C E T U M S C I L L I T I C U M, & S C I L L I N U M, & S C I L L A T U M q u o q; d i c i t u r, & S c i l l i t e g r æ c e.

V E X M. V E R G. C O M M.

Vlgarem fuisse quondā Scyllitici acetī confectionē, & ex ea quotidianū in familiā usum, qui eam docuerūt tam multi ex ueteribus indicant Plinius, Columella, Palladius, & in græcis quicūq; ad sanitatē & ualitudinem humanā rem aliquādo instruxerūt. Nouerant enim, q̄ mul-
tas utroq; tempore acetū id utilitates habet. Earumq; studio nullus nō propriæ, familiæq; suæ
saluti consulens paterfamilias, Scyllite acetū per æstatem a se confectionē domi seruabat. Mon-
strauerūt priuatim suas confectiones singuli: quas ne longiores simus, repetere hoc loco consi-
lium nobis non est. Locos tantū in latinis signabimus: critq; uolentibus hæc nouisse legendus
Plinius lib. 10. capite. 9. Columella lib. 11. capite. 24. Palladius in Iulio mense, capite. 8. Hi enim
omnes prædictis locis suas Scyllite acetī confectiones docuerunt. Suntq; illis omnia eadē, aut
parum diuersa: præterq; in numero dierū, quibus insolandū acetum hoc est. Plinius enim qua-
draginta & octo diebus id agendū esse præcipit, Palladius. 40. quod hic septem tantū diebus fie-
ri iubet. Ex eo suspicari sumus. 40. dierum numerū, quo hic monet sicandā in umbra esse Scyl-
lam, pertinere ad insolationem potuisse: aut septem diebus illis, quo spacio iubetur insolari a-
cetū hoc, deesse quadraginta numeri notā: nec septem, sed quadraginta septem, aut octo die-
bus oportere id agi. Verba Plinij sunt. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub regulis totius
diei solem accipientibus: post eum numerū dierum tollitur uas. Intelligitq; numerū. 40. & .8.
dierū, quem nō multo ante proposuerat. Palladij autē, Et. 40. diebus patieris esse sub sole. Ob-
seruauimusq; nos quadragenariū hunc numerū in medicina, confectionibusq; his ueluti de-
cretoriū esse. Eamq; ob causam inclināt animus, ut credamus non septem, sed quadraginta &
septem, octoue amplius diebus insolandū acetum hoc esse anteq; in uasa diffundatur, & serue-
tur. In cōmuni tamen græcorū omniū lectione nihil mutare ausi sumus. Quemadmodum non
procul a fine totius capitis etiā, quo loco hic ait, In uniuersum ad omnia uim habere Scyllite
acetum. Cauendū tamen in interioribus exulcerationibus, capitis doloribus, & neruorū infir-
mitati. Qualia illic erant, omnia seruauimus: q̄uis quæ ultima duo sunt, coniungi præcedenti-
bus non possint: multoq; minus, ut in cunctis græcis leguntur, per se stare: modo uera sint quæ
Plinius & alij tradiderunt. Hic enim dolorem capitis, & neruorū infirmitatem excipit: iubetq;
caueri in exulceratis interaneis, dolore capitis, & neruorū infirmitatibus: Plinius autē de capi-
tis dolore quidem nihil agit, sed neruis infirmis perq; utile ait esse. Quod intelligēs Barbarus,
mutata dicendi forma, capitis doloribus, neruis infirmis quotidie ieiunis bibendū esse uertit.
Nobis qua decet interpretem fide, nihil in scriptore hoc mutare placuit. Vitium tamen, aut uij-
tij suspicionem saltem signauimus: monemusq; iterum, male sequacem habere, quæ eo loco
sunt uoces intellectum: ideoq; medicis diligentius omnia illic expendenda esse. Credimusq;
nos, deesse eo loco aliquid, quo iuberetur in capitis dolore, & infirmis neruis bibendum iei-
unis Scyllite acetum esse: uerum ut diximus, nihil addi, interponiue ab interprete debuit. Fuit
etiam satis nobis a principio, purgatam tantum Scyllam dicere: quoniam nihil aliud q̄ κατάρ-
α in Dioscoride legeretur. Quæ autem ab alijs multa addita sunt: direptis, duris, & extrinsecus
positis. &c. omnia ex Plinio huic scriptori addita fuerunt.

D

¶ De uino Scyllino.

C A P. XIX.

συλλινικόν

Scyllinū uinum fit hoc modo. Dissectam uti dictū est scyllam, & sole
siccata contundito: minam eius tenui cribro incernito, & linteo
illigatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito. Vbi tri-
mestri spacio maduerit, elutriatum uinum obstructio diligenter uase re-
condito. Licet quoq; sic humida Scylla uti. In orbiculos Rapi modo
dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & in-
ueterascere. Alia parādi ratio. Scyllæ dissectæ & repurgatæ tres minas, in
Italicam metretā musti demittito, & senos menses in uase obstructo mace

rari finito. Post id tempus excolatū uinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborū corruptiones. Item ijs qui reuomunt cibū, & si pituita in uentre, aut stomacho cōierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquæ inter cutē, regio morbo, difficili urinæ, torminosi, inflammationibus, resolutioni neruorum, rigoribus longis, uertiginosis, & uulsis. Menses pellit. Minime neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

EX M. VERG. COMM.

Svas etiam Scyllitæ uini Columella & Palladius, quibus paulo ante locis diximus, confectiones docuerunt, huic scriptori in eo, quod mox dicemus, tantopere contrarias, ut uicium in altero non suspicari, sed constituere oporteat. Dico autem alterum, quoniam concordēs sibi inuicem Columella & Palladius, alterā contrarietatis huius ambo faciunt partem. Ea huiusce modi est. Iubet ad uini huius confectionem Dios. sectam in sole sicari Scyllam, *figaver in idio*, quod est, siccato eam in sole: illi autem contra in umbra sicari præcipiunt. Columellæ in ea re uerba sunt. Taleolascq; sectas suspende in umbra, ut adficcantur. Palladij, Scyllam de montanis, aut maritimis locis sub ortu caniculæ procul a sole siccamus. Nec quicq; omnibus in eo quod docent certius est, tam aperto sensu a singulis concæptæ uoces suæ sunt: eo fit, ut nullæ in contraria re partes nostræ sint, q̄ rem simpliciter signasse. Grauis enim scriptoris huius æstimatio, dignitas, & fides: græues etiam in re latina scriptores illi sunt, præsertimq; Columella: quem ego nunq̄ crediderim in uulgarire, & quæ quotidianum haberet usum, decipi debuisse: & nihilominus, ut uideatur, contraria huic illi docent. Relinquemus ob causam de tota hac re peritioribus censendum: illud tantū monentes, duorum fidē, contra uini auctoritatem certare: certiorēq; habere rationem, ut in umbra potius q̄ in sole arescat Scylla: quoniam uis sua exsiccata, omniq; humore citius exhausta, inutilem, aut saltem minus efficacem sol faciet: quod contra in umbra fit, in qua paulatim arescens, nihil, aut parum ex uiribus suis amittet. Et præter hæc in Scyllite Aceto, cuius eandem merito in ea re aliquis credat esse rationem, ab hoc ipso scriptore præcipi, in umbra sicari Scyllam: admittendamq; potius eam rationem, in qua hic alijs, & huic alijs cōueniant, q̄ eam in qua hic nec sibi, nec alijs. Quod deinde dictum a Diosco. est, secandam raporū modo Scyllam esse, ex Columella repetendum nouisse id uolentibus est. Is enim. 17. uolumine, capite. 11. de Raporum conditura hæc obcult. Raporum q̄ rotundissima sumito: eaq; si sunt lutuosa, detergito, & summam cutem nouacula decerpito. Deinde, sicut consueuerunt salgamarij, decussatim ferramento lunato incidito: sed caueto ne usq; ad inum præcidas Rapum. Salem inter incisuras Raporum, non nimium, minutum aspergito, &c. Hic incidendi Rapa modus est: quo in incidenda Scylla Diosco. uti iubet: ut positam in tabula, scilicet integrā Scyllam, cultello decussatim incidas, ita tamē, ne usq; ad inum præcidas. Quid autem decussare sit, & decussatim incidere, mathematici primum, tum rei rusticæ auctores, & in architectura & fabrica periti facile ostendunt: qui omnes decussis, & in decussim ductas lineas appellant, quæ non ad rectos angulos, sed quadamtenus transuersæ cadentes, & in alias lineas incurrentes græcæ literæ. x. Romanæ autem. X. faciunt: quæ quoniam denarij numeri, quemadmodum nūc etiam est, quondam nota fuit, ab eo numero decussis, & decussare uerbum latinis fecit. Ex rusticorum salgamorū disciplina itaq; secanda duabus transuersis, & in decussis incisuris Scylla, ut nos credimus, erit.

De Vinis marinis.

CAP. XX.

Marina uarie faciuntur. Aliqui enim statim quū decerpitæ sunt uuas aquā maris ammiscent. Alij in area uuas sole siccant: quibus calcatis, marinā adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt. Id magis Passi generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febriliū aduentantium indicia ualent, si modo meliora non adsint. Aluum subducunt. Profunt purulenta extussientibus, aut si dura aluus exerceat.

si uas dicitur

C Quæ ex Aminæis uinis fiunt, caput tentant. Stomachò aduersantur, flatus creant. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio teneantur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre. Non quod frequēs eorū, aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad eorū rationem attineret. Sunt aut quædam ex ijs facticia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus. Vti quæ ex coto-

B A R B A R I C O R O L L.

Vinum Tethalassomenon, hoc est, marina aqua factum, duo fere habet genera. Bizeon, de quo dictum est. Alterum Leucoñion, aut etiā Leucochran, marina in album mustum confusa. In alijs autē gentibus Tethalassomenon, id est, mari conditum uocatur, a serui furto origine accepta, sic mensuram explentis. Habetur & Thalassites, uasis musti deiectis in mare: quo modo Cato præcipit, quadriennio Secundus. Rhodiū Coo simile est. Phorineum falsius Coo. Medicinas aliquot ex uino marina aqua facto legas, & ubi Dioscorides de qualitate uini loquitur. In hunc usum quidā ex alto peti mare iubent, seruariq; ab æquinoctio uerno, aut certe nocte solstitio, Aquilone flante. Hauriri autē circa uindemiam; si hauriatur, decoqui.

Vinum facti-
tium Incom-
mune.

Nillum uinum factitium, præterq; quæ specierum uetustate fiant, plus anno durare putant; & plura ne tricenis quidem diebus. Vinum ex siliqua, Cerautes, hoc est, siliquatium appellatur. Præstantissimum ex syriaca. Factitium uinum Græci Oenon Secuaston appellant. Quidam Propomata: quæ quidem ut sua quoq; sponte nascantur ex uitibus, ratio a Græcis inuenta traditur. Condebant & nitro uina. Item marmore. Item sulphure, ac cinere: quod miremur. Veteres e uitis maxime fermentis, aut quercu.

E X M. V E R G. C O M M.

Poterant, auctore Celso, uina omnia hæc simpliciter Salsa a nobis appellari. Is enim, 6. primi uoluminis capite, inter solutæ alui remedia, negat falsum bibendū homini uinū. Habetq; id manifestā ex decretis ab hoc scriptore rationē; qui deijciendæ aluo, & his qui dura aluo erunt utilia ea esse docens, facile post se alios monuit, non esse augendā falsi uini potu alui solutionem. Sed ancipitē uocis eius intellectū fugientes, nolimus dubitari a legentibus, posse qualia uina hæc quondā fuerint, & an satis esset illis salem miscuisse. Diximus id, quoniā poterant alijs inter pretes, si erat illis animus, in titulo capitis huius a rei substantia discedere, ex Celso honestiorem titulū uinis his præferre. Aptius enim Salsa, a sapore simpliciter, q̃ marina, aut græca uoce Tethalassomena dicta ab eis fuissent, præsentī legentū dubitatione, quæ nam adiectæ uocis eius causā & ratio esset. Tradiderunt præter scriptorem hunc falsi uini huius confectiōē, et si non penitus eandē, non tamen oīno dissimilē. Plinius quidē, 14. uolumine, capite. 8. quo loco ait. Salsi uini huius originē, a furto serui ortam, marina aqua explētis, quod subtractū in dies fuerat, Columella autē, 11. uolumine, capite. 22. & 6. Quos poterunt uolentes audire, & ex eorum decretis etiā falsi uini confectiōes discere. Nos interim ad reliquas uinorum confectiōes interpretationem & cōmentationem hanc nostram transferemus.

De uino Cydonite. C A P. XXI.

κυδωνίτης
μηλίτης

CYdonites, nomine alio Melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exēptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarū pondo, in musti metretā triginta diebus demerguntur. Postea defæcatū uinum reponit. Alia faciendi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum, pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit. Prodest stomacho, dysenteria, hepaticis, renum uitijis, & urinæ difficultati.

E X M. V E R G. C O M M.

Coniunximus ex meliorū in græcis codicū lectiōe Cydonitæ uini & mellis confectiōem. Continuata enim historia in illis duo hæc capita leguntur. Habetq; id ex uirium utriusq; similitudine rōnem. Cydonitæ uini confectiōē monstrauit Palladius in Octobri mense, capite. 10.

sed tam diuersam, & scriptoris huius disciplinæ adeo contrariam, ut utilius nihil de ea egisse fuerit. Malomellis autem cōfectionem Columella. 13. uolumine, capite. 45. tam manifeste tradidit, ut cōmentationibus his nostris eam addidisse inutile non fuerit. Post traditam ab eo scriptore longius seruandorum pomorum, præsertimq; cydoneorum in melle disciplinam, huiuscemodileguntur. Hæc ratio non solum ipsa mala custodit, sed etiam multæ saporis liquorem præbet, q; sine noxa possit intra annum dari febricitantibus: isq; uocatur Melomeli. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt: præterq; q; Columella intra annum uti eo cōcedit, hic post annum mīdus fieri ostendit. Sed locus in hoc claudicat, & ideo uitij nota signatus est.

De Melomelite. CAP. XXII.
Melomeli, quod & Cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mella feminibus suis castrata, in q̄ plurimum mellis, quo demergipossint coniunguntur. Id post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

De Hydromelo. CAP. XXIII.
Hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub caniculæ si-
 dus insolatæ, additis ad unam Melomelitis facti ex cotoneis. Vis
 huius eadem est.

BARBARI COROLL.
Hydromelon, aliud est q̄ Hydromeli, ut constat, alioquin & sine melle fingitur quandoq;,
 ut Paulus existimat. Laudabatur in Græcia quod e Cibyra siculibus pusillis austerum, uino-
 sumq; solebat inuehi.

EX M. VERG. COMM.
Nillum, quod hætenus inuenerim, hoc nomine in re latina Hydromalum est. Factū illi ex
 aqua & Malomelle, quibus constat, nomen est. Fuisse autem græcis usum eius quæ tradit con-
 ficiendi disciplina, & eius gentis medici aperte ostendunt.

De Omphacomelite. CAP. XXIII.
Omphacomelitis faciendi ratio hæc est. Acerbæ uuæ immaturæ
 & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi par-
 teis, mellis optimi despumati singulæ partes adiunguntur, & insolatum
 in uasa transfunditur. Vim adstringendi ac refrigerandi habet. Stoma-
 chicis, coeliacisq; conuenit. Vsus post annum est.

BARBARI COROLL.
Omphacomeli, hoc est, mel acerbum, siue acidum.

EX M. VERG. COMM.
Docet in Augusto mēse Omphacomellis etiam cōfectionem Palladius. Ea neq; omnino
 diuersa, nec penitus eadem huic scriptori est. Quæ potiora in ea sunt, ambobus eadem sunt.
 Quam hic tradit, ex antedictis nouisse facile est. Palladius suam his uerbis docet. In uuæ se-
 miacerbæ succi sextarios sex, mellis triti fortiter duos sextarios debetis infundere: & sub solis
 radijs diebus quadraginta decoquere. Vocat Palladius semiacerbas uuas, quas hic ait *μῆπερ*
περικαυόμεναι, id est, nondum integra maturitate nigrescentes. Et quod hic simpliciter iussit, in-
 solandum esse eum succum, Palladius. 40. diebus fieri id præcipit. Cætera paulo minus q̄ ea-
 dem ambobus sunt.

De uino Apjete. CAP. XXV.
Eit e pyris perinde atq; cotoneis uinū Apjites nomine, sed ita ut
 pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, for-
 bis simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba sunt, & adstrin-
 gunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

D I O S C O R I D I S

C V Inum e Pyro, Sorbo, Mespilo, Siliqua, Ceraunia. Differt porro Apites, ab eo quod Apia ros etiam græce dicitur: q̄ illud e Pyro fit, hoc ex Apio.

EX M. VERG. COMM.

Longe aliter e pyris uinū cōfici in Februario mense Palladius p̄cipit. Et qm̄ qd̄ ille instituit, aliud ab hoc penitus esse credimus, nihil ex eo ad hūc scriptorē asserimus. Quaq̄ breuitate Plinius lib. 14. cap. 16. uinū ex filiqua Syriaca & e pyris, malorumq̄ omnibus generibus fieri docuit, eadem nos in scriptore hoc uina eadem primo uertimus, & nunc cōmentamur.

De uino Oenanthino. CAP. XXVI.

Spoltræ diuor

E Labrusca fit, hoc est, uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum. Sicci flores minis duabus musti metreta macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum uinum recōditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, coeliacos & dysentericos.

BARBARI COROLL.

Vinum Oenanthinum, quasi labruscatum conuertas. De hoc in Oenanthino dictum.

EX M. VERG. COMM.

Nihil ab hoc scriptore in Oenanthini uini cōfectiōe Plinius mutauit, e labrusca, i. syluestri uel te fieri dicens: floris eius duabus libris in musti cado maceratis, & post. 30. dies mutatis. Quale autē legere florē eū oporteat, ex Palladij disciplina dictū in Oenanthino unguento a nobis est.

De uino Rhōite. CAP. XXVII.

Spoltræ diuor

D

Flt e punicis malis maturis quod Rhōitē nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, Apyrina uocant, aut decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluctiones internas, & febrim cum alui profluuiū exortam, Stomacho utile. Adstringit aluum, & urinam mouet.

BARBARI COROLL.

Rhoites, & uinum dicitur, & mel, quo punica mala condiuntur.

EX M. VERG. COMM.

In medicina quotidianus ex punicis expressi uini usus est. Certa etiam in scriptore hoc eius cōfectiō. Nihil ob eam causam de eo ultra agendum.

De uino Rhodite. CAP. I. XXVIII.

Spoltræ diuor

Rhodites sic fit. Rosarum siccarum tusarumq̄ minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito. Et post tres menses, defæcatū uinum transfundens, recondito. Vtile ijs qui febre carent, & ad stomachi cōctiones, & dolores in fine potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoq̄ ex succo rosarū, addito melle qd̄ Rhodomeli uocant, quod arteriæ scabricijs conuenit.

BARBARI COROLL.

Rosaceum uinum est hoc, siue ut Palladius, Rosatum.

Rhodomeli, hoc est mel rosaceum, aut rosatum. A Paulo etiam Rhodostactō dicitur. Nam Rhodomelon ex rosis & coroneis malis conficitur.

EX M. VERG. COMM.

Rosarū uini genū hoc Palladius in Maio mense appellat. Cōfectionēq̄ eius qualis sua ætate erat, his uerbis docet. Quinq̄ libras rosę pridie purgatę, in uini ueteris decē sextarios mergis. Post. 30. dies despumati mellis librā adjcis, & iteris. Nec multo post Rhodomel suū idem etiā docet, quod huiuscemodi est. In succi rosę sextarijs singulis libras singulas mellis admiscēs, & 40. diebus sub sole suspendis. Docuit præterea in Octobri mense deficientibus rosis, qua ratiōe uinum quod idem rosaceo posset, conficeretur. Ea cōfectiō huiuscemodi est. Folia citri uiridia

in sporta palmea missa in musti nondum seruētis uasa depones, & claudes: exemptisq; his post 40. dies, addito melle ad modum rosari cum placebit uteris.

De uino Myrtite. CAP. XXIX.
MYrtites fit baccis nigris post maturitatem tulsis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adijciunt, & uini ueteris parem modum. Postea exprimunt et seruant. Magnopere adstringit. Stomacho utile. Fluxionibus uētris ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes & profluuiā. Denigrat capillos.

BARBARI COROLL.
Vinum Myrtites, hoc est, myrtatum, Cato docuit fieri e nigra: postea compertum ex alba. Genus uini Plinio est & Myrtidanum, ab ipso nominatum, e syluestris Myrti baccis: quo & manus tingunt. Myrtidanum Dioscoridi frutex est, non uinum, ut diximus. Aliud genus uini est Myratum: unde Myrata porio, non a myrrha, sed a Myro, id est, odoramento: quod & Iulius Pollux Myrinem uinum appellauit, nostri Murinam. Quamq; inquit sunt, qui Myrinem etiam pro dulci capiunt: quod et Plinio placet ex Lelij Senilq; Capitonisq; sententia. In comœdia certe noua, Myrines, hoc est, odoratum uinum, Trimmer dicebatur. De hoc & in Lora diximus. Nā Myrrha conditum amarissimum sit oportet: quippe quod in cruce Domino sit præbitum, non oblectamenti, sed cruciatus proposito: idq; non tam Myratum, q̃ Myrrhatum scribere oportet. Est & Myrtites pro melle myrrato acceptum quandoq;.

EX M. VERG. COMM.
MYrtitæ uini confectionem in latinis rei rusticæ scriptores omnes quam nouerant & exercebant sua tempora tradiderunt M. Cato operis sui de re rustica cap. 25. Palladius in Ianuario mense cap. 17. Columella. 11. uolumine, cap. 38. Postq; hos omnes Plinius. 14. uolumine, cap. 16. Omnes, excepto Catone, & Columella, simpliciter tulsis myrti baccis, & c. fieri uinum hoc tradiderunt. Duo illi ad certum fruticis eius genus rem contraxerunt, nigræ myrti baccis fieri præcipientes: & ex duobus generibus in hoc usu nigram tantum probantes. Catonis uerba sunt. Myrtam nigram arefacito in umbra, & c. Columellæ uero. Nigri generis baccæ cum sunt maturæ, & c. Eo fit, ut credamus quod a principio capitis huius legitur, *μύρτα μίλανα παραμύσοντα λαβόντα*. & c. quod est, Sumito nigras myrti baccas cum iam maturitate sua dilabuntur, non ad nigrum in maturitate baccarum colorem simpliciter referendum esse, sed ad alterum myrti genus, quod priuatim nigrum ab antiquioribus uocatum est. Quod enim ad maturitatem pertinebat, in uoce *παραμύσοντα* indicabatur. Duobusq; illis autoribus redditus a nobis locus est, & ad nigræ myrti baccas contractus. Fecimusq; id confidentius: quoniam in omni medicinæ usu prælata candidæ nigra myrtus semper est. Non erit inutilis labor, antiquorum mores in his cognouisse cupientibus, quæ a Columella longius quo diximus loco de myrtitæ huius uini cōfectione præcipiuntur legisse. Diligens enim, & pro hominis uita ubiq; operosus homo, diligenter id etiam gentem suam & posteros docuit.

De uino Myrsinite. CAP. XXX.
MYrsinites sic temperat. Rami nigræ myrti cū suis baccis et folijs tulsis, decē minarū pōdo, in tribus musti cōgñis seruēscūt, donec duo superlinr, aut certe sesq; congius relinquat. Id uinū colatū ad usum recōdit. Cōtra furfures, ulcera i capite manātia, eruptiōes papularū, gingiuas, tōsillas, & purulētas aureis efficax est. Sudores sistit.

EX M. VERG. COMM.
Altera hæc ex Myrto uini cōfectio est. Differt a priore: q̃ illa baccis tm̃, hæc ramulis, folijs & baccis myrti cōstat. Indicatq; in græcis manifeste utrāq; nomē. Quod em̃ myrtite ab illis dicit̃, ex baccis quæ gens illa myrta uocat, factū est. Quod uero myrsinite, ex toto frutice quæ myrsinē iſdem græci appellant: eamq; ob causam alterum nos Myrtite græcorū & latinoꝝ mō, alteræ Myrteū latina tm̃ cōformatiōe diximus. Fuit ppria græcorū altera cōfectio hæc, si Plin. credimus.

Et ij

C lib. 14, cap. 16, dicenti, Græci uero & alio mō teneris cum suis folijs in albo musto decoctis, &c.

Χίνισκος

De uino Lētiscino, et Therebinthino. CAP. XXXI.
Lētiscinū similiter ut Myrsinites temperatur. Nec secus Terebinthinum. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes in sunt uires. Adstringunt. Stomacho accommodantur, & defluctionibus intestinorum, uescig, & stomachi, & sanguinis profluuiū. Vlcera omnia fluctionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt. Fluctiones uuluae ac sedis, in seffione cohibent.

Πόντος

BARBARI COROLL.
Schininum uinū, hoc est, Lētiscinum, siue Lētiscatū dicitur. Si mastichen uero capiat, Mastichites uocabitur. Vtuntur in hoc cum pice diligentiores, ut inquit Plinius, nigra mastiche, quam in Ponto similem bitumini prouenire tradunt, radice Iridis, oleoq; additis.

Φυμίνθη

De uino Palmeo. CAP. XXXII.

Palmulas maturas, quas uocant Chydæas, in urseolum imo per-
 tusum, & obstructum, picata arundine demittito: lino foramen
 sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios infundi-
 to. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq; congios infudisse sa-
 tis est. Post decem dies detracto ab arundine linto, assumito uinū cras-
 sum & dulce, & reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxium. Cōtra
 fluctiōes, ppter adstrictoriā uim efficax. Stomachicis, cœliacis, sanguinē
 expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & ter-
 tio, quarto, quinto, sextoue faciunt: quod tandem acore uitiat.

Pli. li. 14. ca. 16

BARBARI COROLL.
Palmeo uino Parthi & Indi utuntur, & oriens totus. Phœnicites appellatur, quod ex triui-
 ali palma constat. Id autem quod ex abierte palma fit, Spathites, & Elatites quoq; dici pōt.

EX M. VERG. COMM.

Tota, ut sic loquamur, diametro in Palmei uini confectiōe distat ab hoc scriptore Plinius.
 Ille em. 14. uolumine, capite. 26. palmularum modio iubet aquæ tres infundi congios, hic decē
 modijs eam mensuram infundi pariter præcipit. Magna inter hos scriptores mensuræ eius diuer-
 sitate, & cuius causam nos ignoramus. Nisi in alterutro mensuræ illius nota eam fecerit. In gre-
 cis omnibus, quas hætenus uidere licuit, nulla est nunc numeri alicuius nota, sed integra uox
 δέκα, id est, decem. Qui itidem nobis est uerustissimus, & longobardis literis scriptus latinus Di-
 osco. decem, manifeste ostendit, Pliniani contra codices omnes eodem modo, & his uerbis le-
 guntur. Maturarum, quas uocāt chydæas, modio in aquæ congij tribus macerato. &c. Quod
 autem nos diximus, potuisse mensuræ eius notam diuersitatis huius causam facere, huiuscemo-
 di est. Græci denarium numerum decimæ, ut illi constituerunt in aliarum ordine literæ suæ no-
 tæ, quæ iota est, indicant. Signantq; illam, ut uidere passim licet, eadem figura qua latini suum, i,
 Latini ediuerso unitates suas in numerorum incremento eodem illo, i, signant. Concurruntq;
 in eandem formam græcorum denarij numeri, & latinorum unitatis notæ. Poruit ex eo diuer-
 sitas hæc fieri, & quod decem in Diosc. legendum erat, unū a Plinio intelligi, non ex græcæ, sed
 ex latinæ notæ illius indicatione. Credimusq; nos ueriores scriptoris huius, q; Plinij historiam
 esse. Exigua enim mensura modius est, nec futura satis ad transferendum in tres aquæ congios
 uini saporem: multoq; minus in quinq; ut hic etiam iubet.

κατορχίτης

De Vino Catorchite. CAP. XXXIII.

Catorchites aliquibus Sycites uocatur. In Cyprio fit, ita ut Pal-
 meum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humo-
 ris adiiciūt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ quæ che-
 lidoniæ, aut phœnicæ appellantur, præsertim nigrae, macerantur, uti di-

ximus, & post decem dies humor excipitur. Atque iterum aut tertio, idem modus aquæ in aqua uinacea maduerint, infunditur. Simili modo intercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorem contrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est. Flatus gignit. Stomacho aduersatur. Fastidium parit. Aluo tamen prodest. Urinam ciēt. Menses trahit. Lactis ubertatem facit. Vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam Zethon appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adiiciunt. Alij muræ amphoram, quod non facile uiniatur, & aluo idoneum fore censent. Alij Thymum & sceniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt, & ita uicissim, donec uas expleuerint.

BARBARI COROLL.
Sycites uinum, aliqui Palmiprunum, siue Palmiprium uocant. Nam eius quod Sycinum appellauere, sicut & Ithacomeliæ, & Lectispagitæ, oblitterata iam ratio est.

EX M. VERG. COMM.
Sycarum non male aliquis hoc uinum dixerit. Honeſta enim, & quotidiani usus in animalium fecore aliquando ea uox in relatina fuit; neq; ab re. Cur enim liceat græcis Sicytæ uinum hoc a ficis, quas ea gens sycæ appellat, dicere: Latinis autem a ficis Ficatum dixisse turpe sit. Infelicius bonas artes profitentur, qui sic uetustatem amant, ut nihil suo tempore nouum oriri posse existiment. Nobis semper placuit quod Flaccus ait, licuisse indies, licereq; signatum presente nota producere nomen. Ideoq; titulo capitis eam nos uocem addidimus, quam placere legentibus optamus. Satis in scriptore hoc Ficatum uini per se confectio pater, nihil ideo de ea agimus. Quod desiderari a legentibus possit tantum monemus: quas hic chelidoniæ ad uini huius confectioem exigit, in licorum censu ab antiquis scriptoribus inter primas numerari. Laudauit eas Athenus in tertio sui Dipnosophilæ, campeſtribus locis conscri præcipiens. Laudauit Columella in carmine suo, Purpureq; Chelidoniæ. Laudauit, ut cæteros omittamus. i. uolumine, capite. i. Plinius, nouissimam sub hyeme maturari Chelidoniæ dicens. Eam nos credimus a Chelidoniis in Illyrico gente dictam fuisse. Neq; ab re est, nouissimam sub hyeme maturari quæ in frigidissima regione primū puenerit. Omnes colore eā describunt nigricatis purpure. Neq; eū Colu. aliud significauit dicens, Purpureq; Chelidoniæ: et hic phœnicas. i. colore palmularum uocari, et nigras esse testatus, eodē cæteris colore describit. Facile ex his notis erit Chelidoniæ fici uolentibus cognoscere, colore nigricantis purpure, & postremæ oīm aliæ maturitatis.

De uino Sycomorite. CAP. XXXIII.
F It & e Sycomoris eodem modo uinum. Sed in acetum acre de- generat: quoniā nominata præualet uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

BARBARI COROLL.
Vinum e fico Aegyptia, siue Alexandrina, item ex Cypria, cuius acetum Alexandrino melius est, Sycomoriten Græci uocant.

De uino Resinato. CAP. XXXV.
Resinatum uinum populatim facitari solet. Copiosum in Galatia. quoniam uinum illic coacescat, uua non maturescente. Ideoq; refrigerat, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice turditur, & amphoræ, dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi effervescit excolant, separantes resinam. Alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem & uertigines faciunt. Concoctionem tamen adiuuant, Urinam ciēt. Tussientibus ac destillatione uexatis co-

Et iij

C ueniunt. Item coeliacis, dysentericis, mulierum mensibus, & hydropicis, & foeminis fluctione uuluae laborantibus. Altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Pli. li. 14. ca. 16

Vinum Rhetinites, hoc est, resinaturn, de quo & in Pissite, id est, Picato dictum.
B A R B A R I C O R O L L.
E X M. V E R G. C O M M.

Haec sunt Resinata uina illa quae Martialis in Epigramate suo dicebat, relictis Phalernis importune bibere hominem: quoniam potu illa delectarent, haec plerumque amarescerent: quo gustu nunc etiam aliquot locis in Graecia bibuntur. Neque enim conditurae eius ratio penitus exoleuit. Quondam tam communis condiendi hac ratione uina in gentibus disciplina erat, ut hic Resinati uini nota & titulo simpliciter contentus, nec quicquam ultra hoc testatus desiderare legentes modo cogat, quo Resinae genere uina haec condirentur. Barbarus ex Larice addidit: cum tamen in scriptore hoc non magis Larigna, quam quicquam alias intelligi resina possit. Resinatum enim tamen hic ait, & nihilominus multiplex resina est. Dubitandum etiam, quam intelligi Galatiam oporteat: eam ne quae in Asia, an quae ultra Alpes ad Septentrionem est. Verum cum hic dixerit, non maturefcere illic ob gelu uuam. &c. aptius de ea quae ad Septentrionem ultra Alpes est intellexisse fuerit. Et si nunc legisse me memini, consueuisse Gallos resina condire sua uina.

De uino Strobilite CAP. XXXVI.

στροβιλίτης

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisque. Praebetque resinati effectus, si quis madefactas nuces pini musto decoquat. Potum conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

D Hoc uinum Hippocrates Coniam uidetur dixisse, quae arbor, e qua nuces pineae funduntur, Conos, & Strobilos uocetur: ut alio loco docui. Galenus Coniam, pro Pissite cepit.

E X M. V E R G. C O M M.

Nucleis Pineis, non nucibus condit hoc uinum Barbarus: nos contra nucibus, non nucleis. Anceps ad totam nucem, & nucleos eius in graecis uox diuersitati causam dedit. Secutus ille Plinium est lib. 14. cap. 16. dicentem. Fit nucleis Pineis: hi musto madidi exprimuntur. &c. Nos in ambiguo, quae scriptoris huius decretis responderent, potius elegimus. Primo enim uolumine, capite de pino, nucibusque & nucleis eius manifeste monuit, totas nuces ab arbore decerpas, contusas, in mustoque decoctas, uetustissime & tabidis prodelle. Quod totum idem hoc loco auditur. Nisi forte in prima capituli huius parte de nucleis, in secunda de nucibus agi dicatur: quod tamen parum uerisimile est: cum hic dixerit recentes strobilos, & confusos, quod nucibus magis quam nucleis congruit. Praeterea remedium tota uis in resina est, quae multa foris in nucibus, nulla in nucleis haeret.

De Vino Cedrino. CAP. XXXVII.

κεδρίνης ἢ ἀρ-
κιδίνος ἢ κυ-
πρίνης ἢ
κεδρίνης ἢ
κεδρίνης ἢ
κεδρίνης

Cedrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinum, Pineum, aut Abiegnum simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos cum fructu adunt, aut soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet, uti defudet, congioque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere. Et antequam recondantur insolare. Factiorum uinorum uasa impleri debent. Namque non plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia excalfaciunt. Urinae ciēt, & substringunt. Laurinum tamen uehementius excalfacit. Fit quoque e fructu Cedri maioris uinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra. Diebus quadraginta insolari debet, & defaecatum in uasa transferri.

De uino Iuniperino. CAP. XXXVIII.

ἀκυνθιδίνης

Et etiam uinum e baccis Iuniperi, non aliter quam cedrites, et ad eadem ualens.

E X M. V E R G. C O M M.

Differt, ut uidetur, re primū, mox nomine etiā quod ex eadem Cedro, sed non iisdem eius partibus fit uinum. Quod enim ex materia eius conficitur, Cedrinum: quod ex liquore, Cedrite ab antiquis græcis dictum est, iisdem & nos nominibus duo discreuimus genera: licetq; in pluribus græcorum, tribus capitibus seorsum hæc docerentur, nos tamen naturæ in arboribus his similitudinem, & partium coniunctionem, mox meliorum græcorum fidem secuti paulo minus q̃ congeneres plantas, & earum partes uno eodemq; capite claufimus: reddidimusq; singulis, qua licuit certitudine, quæ sua erant.

De Vino Cedrite.

CAP. XXXIX.

Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt. Et ita musto replent. Hoc genus uini excalfacit, extenuat. Tussi utile sine febre, pectoris, laterumq; doloribus, uentris & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua malo opportunis, hydropicisq;. Facit aduersus uentris tinea & rigores. Contra uenenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vinum Cedrites, a Cedrino differt: q̃ Cedrites e Cedria fit, Cedrinum ex Assulis Cedri, aut fructu.

E X M. V E R G. C O M M.

Debuerat resinato coniungi statim Picatum uinum: quoniam nihil aliud q̃ combustæ resinæ fluxus Pix est. Hic tamen plura ex arboribus his confecta ante numerauit uina, quæ aut resinam ipse ferrent: aut resinæ pares haberent uires: nec nisi post eas Picatum docuit uinum. De quo eadem huic omnia Plinius tradidit libro. 13. capite secundo, ex quo poterunt uolentes multa intelligendo huic scriptori necessaria audire.

De Vino Picato.

CAP. XL.

Picatum ex liquida Pice, & musto temperatur. Picem autem primum marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncæra maris aqua defluat. Mox aqua dulci proluenda. Congijs octo musti, uncia Picis una aut altera adiicitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vitale doloribus pectoris, iocineris, lienis & uulua, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

B A R B A R I C O R O L L.

Diximus de Pissite, id est, Picino, aut Picato etiam superius.

De Vino Absinthite.

CAP. XLI.

Absinthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italicarum amphorarum, ammistam Absinthij Pontici libram decoquunt ad tertias parteis, & ubi infuderint nonaginta aceti sextarios, & Absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas, dumq; conquieuerit defæcant. Alij absinthij minā in amphorā demittunt, tufamq; & raro linteo deligatā, in decem congijs musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantē, alij trientē, & Nardi Syriacæ, Cinnamomi, casia, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarū,

Ee iiij

C singulos sextantes inijciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstrueto uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt. Postea defæcatum uinum transfundunt ad usus. Alij addunt in musti cadum, celticæ Nardj drachmas quatuordecim, & Absinthij drachmas quadraginta lintheo inuolutas, & post quadragesimum diem elutriant. Alij in uiginti sextarios musti, absinthij libram, & siccæ pini resinæ sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stomacho. Vrinam cit. Tardam concoctionem accelerat. Hepaticis, regio morbo, & renū uitij auxiliatur. Fastidia discutit. his prodest quibus stomachus negociū exhibet. Valet cōtra longā præcordiorū distentionē & inflatiōes, teretesq; uentris tineas, & remoratos menses. Contra hausta ixiæ uenena q̄ plurimū potum, & uomitionibus redditū auxiliat.

Vinum Absinthites fit & alio modo circa radices uitium conficitur, sicut Elleborites.
B A R B A R I C O R O L L.
E X M. V E R G. C O M M.

Sacris Romanæ gentis celebratū quondam Absinthiū est. Siquidem latinæ: ferijs certantibus in Capitolio quadrigis, uictor Absinthiū bibebat: sanitatem, ut par est, præmio dari honorifice tunc existimantibus Romanis, cuius seruadæ, restituendæq; non parua merito inter olera laus Absinthio debetur: tam multiplex uis eius est, & in firmando stomacho tam efficax. Ob quod sapor eius in uina transferi. Fitq; Absinthite uinū toto hoc capite a Dioscoride longius descriptū: ne deesset gentibus tractandæ Absinthio medicinæ ratio hæc etiā: quā docuit & Columella. 3. sui operis uolumine, capite. 3. his uerbis. Vinū Absinthite sic condire oportet. Ponitici Absinthij pondo librā cum musti sextarijs. 4. decoque usq; ad quartam. Reliquū quod erit frigidū, addē in musti amminci urnā. &c. Simplex, ut uidet, Absinthite uini huius Columellæ conditura est. Dioscorides operosior: neq; una, aut altera, sed pluribus rōnibus instituta. Quæ omnes satis per se patēt: tractariq; hoc tempore etiam possent, nisi quæ Absinthij, aliarumq; rerum pondera & uini mensuræ nunc in Dioscoride leguntur, suspecta nobis essent: non tam quia uarie in antiquis græcis leguntur, q̄ quia alicubi maiora, alicubi minora, q̄ rei usus exigit esse nobis uidetur. Nos nihil mutauimus, communem lectionem in cunctis secuti. Monemus tamē, sicubi conficiendi Absinthite uini studium aliquando fuerit, quod ad pondera & mensuras in eo pertinet, diligentius expendendum illi prius esse.

H De Vino Hyssopite. **C A P. XLII.**
Hyssopites e Cilicio Hyssopo maxime laudatur. Fitq; similiter fortiorum Hyssopi tusorum libra in amphorā musti coniecta. Lintheo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, ut degrauatus pondusculo fasciculus sidat. Vinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Contra pectoris, laterum & pulmonis uitia, ueterem tussim, & suspiria prodest. Vrinam cit. Torminibus & rigoribus febriū circūitu repentibus auxiliatur. Menses mouet.

Vinum Hyssopites, potest & iuxta radices sato uinum fieri, ut Absinthites.
B A R B A R I C O R O L L.
E X M. V E R G. C O M M.

Non est Hyssopitæ uini nostri orbis gentibus desperanda penitus confectio. Et si hic, Plini usq; ex Cilicia tantū Hyssopo probatissimū fieri dicunt. Columella em̄ quo diximus in Absinthite loco, nulla aliunde petita Hyssopo Hyssopitæ suū conficit. Poterūtq; uolētes suæ regionis Hyssopo uinū condire, si non omnīū altæ, probatissima ea saltem quæ inutilis oīno non sit.

S De Vino Chamædryite. **C A P. XLIII.**
Simili modo Chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit. Con-

uullis, regio morbo, uulue inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. **A**

¶ De Vino Stichadite.

CAP. XLIII.

Stichadites non secus temperatur. Congijs sex stichadis minam addere oportet. Crassiciem, inflationes, laterum, neruorumq; cruciatu, & perfrictiones discutit. Comitialibus commode datur, cum Pyrethro & Sagapenio.

stichadites

¶ De Aceto Stichadico.

CAP. XLV.

Fit ad eadem Acetum e Stichade herba, ut paulo ante diximus, acetum macerata. Quod eosdem implet effectus.

acetum dicitur stichadites

¶ De Vino Cestrite.

CAP. XLVI.

Fit Vinū e Betonica, quā Cestron psychotrophon appellant. Hærbam semine maturo prægnantē, cū suis ramulis minæ pondo, congij duobus musti macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse pollet. Et ut in uniuersum dicatur, facticia uina, sibi misturarum uires adsciscunt. Quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam consequi. Veruntamen uinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum e Betonica Acetum ad eadem uitia utile.

cestrite

¶ De Tragoriganite uino.

CAP. XLVII.

Tragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis, in quater nos multi sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uullis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, agris concoctionibus.

B

tragoriganites

¶ De Vino Bunite.

CAP. XLVIII.

ENapis fit uinum nomine Bunites, drachmis duabus tusi Napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis.

bunites dicitur

EX M. VERG. COMM.

Napis inter cætera condiri uinum hic scriptor ait: prodesseq; armorum, & equitandi labore defatigatis: neq; haberet a reliquis disciplina diuersum aliquid conditura eius, si esset Naporum contra lassitudines priuatim uis aliqua. Aut si ratiocinari liceret, cur magis laboribus illis duobus, q̃ tot alijs cursus itineris, pilæ, remigij, saltusq; proffit. Omniū enim idem euentus est, & ob eam causam eadem constituenda remedia sunt. Testatur tamē id Dioscorides. Fuisseq; id ab antiquissimis Græcis obseruatum & institutum. 21. uolumine, capite secundo Plinius etiam confirmat: & si in græcorū ostentationem totam huiuscemodi ille reiſciat rem. Eius uerba sunt. Et alias modum exceſſerat medicorū in his ostentatio: uelut e Napis uinum utile esse ab armorum, equitatusue lassitudinē præcipientium. &c. Nos ex tam multis hoc signauimus, ut scrupulum legentibus iniiceremus, quo cogerentur & ipsi remedij eius ex uini & Naporum uiribus causam inuenire. Docuit præterea hic scriptor, Marrhubio notissima omnibus herba condiri uinum. Certiorem tamen eius condituram decimotertio uolumine, capite. 22. tradidit Colu mella. Ea huiuscemodi est. Vinum Marrhubij multi utile putant ad omnia intestina uitia, & maxie ad ruffim. Cum uindemiā facies, Marrhubij caules teneros, maxie de locis incul-

Ctis & macris legito: eosq; in sole siccato: deinde fasciculos facito, & tomice palmea, aut iunceae ligato: & in seriam mittito, ita ut uinculum extet. In musti dulcis sextarios ducentos Marrhubij pondo libras octo adijcito, ut simul cum musto deferuecat. Postea eximito Marrhubium, & purgatum uinum diligenter oblinito.

¶ De Vino Dictamnite.

CAP. XLIX.

Δικταμνίτης

DICTAMNI drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia. Menses & purgamentum a partu subducit.

¶ De Vino Prasijte.

CAP. L.

πρασίνης οίνου

MArrhubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, et reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitijis, & omnibus quibus Marrhubium.

¶ De Vino Thymite.

CAP. LI.

θυμίας

THymi tusi & cribrati uncias duas lintheo colligatas, in amphorā musti adijcito. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & præcordiorū dolores, hybernos horrores, & uenenata animalia, quorū morsum frigus insequitur, aut putrescit locus.

¶ De Vino Thymbrite.

CAP. LII.

θυμβρίτης

Simili modo e satureia uinū fit, quod eadē quæ Thymites præstat.

¶ De Vino Origanite.

CAP. LIII.

origανίτης

Sic quoq; Origanites ex Heracleotico Origano conficitur. Facit eadem quæ Thymites.

¶ De Calaminthite, & Abrotonite uinis.

CAP. LIIII.

καλαμίνθης

αβροτονίτης

ECalamintha, Pulegio, Abrotono uina fiunt eodem quo Thymites modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, et regio morbo: q; urinam moueant.

¶ De Vino Conyzite.

CAP. LV.

κονυζίτης

FIt & item e Conyza uinū, contra uenenata ante alia efficax.

¶ De Vino Aromatite.

CAP. LVI.

ἀρωματίτης

ARomatites ita fit. Palmæ, Aspalathi, Calami, Nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito, Postq; contriueris musto subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, quadraginta diebus quiescere finito. Deinde ubi sæce expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami uncia, Phu drachmæ septem, Costi drachmæ duæ, Nardi Syriaci drachmæ sex, casie uncia, croci drachmæ quatuor, Ammomi drachmæ qnq; Asari drachmæ quatuor, omnia simul trita, & lintheo colligata in caddū musti demergunt. Et postq; uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores. Difficili urinæ, rigoribus, retardatis mensibus, atq; ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. Pictitæ crassiciem extenuat, Colorem alit, Somnum conciliat, Dolorem finit. Renum & uesicæ uitijis auxiliatur.

V B A R B A R I C O R O L L.

A

Inu Aromatites, hoc est, odoratū, parabilius, & simplicius Catoni ē ferra, lunco, Palma. Athenæus auctor est, ut in Myrrite diximus, potiōis genus ex aromatis confectū, q̄ ueteres uterent, appellari Trimma. Diximus & de alio Aromatite, qd Hippocraticū recētiōres uocāt.

A B E X M. V E R G. C O M M.

A B Aromatis, quæ odoramēta sunt, Aromatite uino nomen grēci fecerūt. Neq; ab re tam multis odoramētis condit. Nota in conditura eius oīa sunt, & nisi in ponderū, & mensurarum notis uitū in grācis fuerit, qd fere suspicamur, certa in reliquis ratio erit.

F De Vīno e Pipere, Myrrha, & Irīde. C A P. LVII.

F It & Vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coijt, Myrrhæ duæ drachmę, Piperis candidi drachma una, Iridis drachmę sex, Anisi drachmę tres. Omnia plenius trita & linteolo inuoluta in sex uini sextarios coniiciuntur. Vinum post triaduum colatur, et in lagenā reconditur. Datur post deambulationem meraculum cyathi unius mensura.

F De Nectarite uino. C A P. LVIII.

F It quoq; Nectarites ex Helenio hærba, quā alij Medicā, alij Symphyton, alij Idæon Phlomon, alij Orestion, alij Nectarion uocāt. Radice sicca pondo quinq; drachmarum linteolo colligata, & in congiōs sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris uitia. Urinam pellit.

E De Vīno e Syriaca Nardo celtica, & Malabathro. C A P. LIX.

E Syriaca Nardo & celtica, Malabathroq; uinum facitatur hac ratione. Singulorum selibram in binos musti congiōs mittito. Post menses duos colato. Datur cyathus unus cum tribus aquæ. Hoc Vinum efficax est contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem. Prodest stomachicis, atq; ijs quos pallor decolorat. Alj b flem, aut sextantem acori, & celticæ Nardi quadrantem, in musti amphoram adiiciunt.

H B A R B A R I C O R O L L.

H Vic uino pipere & melle addito, sunt quæ alj Condita, alj Piperata appellant. Acetum quoq; piperatum fieri solebat.

A De Asarite uino. C A P. LX.

A Ssari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id uini genus urinam ciet. Hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit.

R De Vīno e syluestri Nardo. C A P. LXI.

R Adicis syluestris Nardi recētis & trite, cribratæq; bessem, in congiū musti coniicito. Duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

R De Daucitate uino. C A P. LXII.

R Adicis Dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram im-

Cponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulvæ. Menfes pellit. Ructus ciet, & urinam. Prodest tussi, ruptis, uulsisq̃.

ἐλελεφακίτη

SAluiae unciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mitto. Valet contra renum, uesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos menfes.

B A R B A R I C O R O L L.
Saluiatum uinum, a Saluia dici nouimus. Saluiatum uero quo ueterinarij utuntur, portionis genus est. Poton Græci uocant ex ordeacea, aut triticea farina & sale: a quo fortasse Saluiatum. Quidam in Columella Saluiatum, aut Salinatum legere malunt. Ab eo salinare uerbum deducitur.

πανακίτη

PAnacis unciam in musti congiū mitto, & transfundito. Prodest ruptis, uulsis, fractis, orthopnoeæ. Lienis crassiciem extenuat. Contra tormina, coxendicum dolores efficax est. Tardas concoctiones accelerat. Menfes & partus extrahit. A quæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur.

ἀκορίτη

Vina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorū uncias in senos congiōs mittere, tribus mensibus macerare, mox in uas transferre. Faciūt ad pectus & latera. Et urinā mouēt.

σεληνίτη

Seminis apij recentis, maturi, & cribrati drachmæ nouem in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat. Stomachicis & difficili urinæ auxiliatur. Oris halitum commendat.

μαραθρίτη καὶ ἀνθήνη

EX Fœniculo, Anetho, & Petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

FIt & e flore salis uinum multo ad purgandum efficacius, q̃ uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicam, renes, & stomachum infestat. Quare neq̃ in secunda, neq̃ aduersa ualitudine prodest. Fit etiam uinum quod Phthorion uocant, quoniam partus necat, & abortus facit. Veratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uitium saro. Siquidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Id uinum partus enecat. Datur ieiunis mulieribus quæ ante uomuerunt, cyathorum octo mensura dilutum.

B A R B A R I C O R O L L.
Vinum e salis flore, Halosanthiten Græci appellant.

θυμιακή

RAmorum Thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta dra-

chmas mittito in congiōs tres musti, & leui igne coquito, donec con-
gij duo super sint, defecatumq; recondito. Aquosa purgat excremen-
ta, & lienem absumit.

BARBARI COROLL.

Vinum Phthorion¹, aliqui Estromaticon appellāt, ex Elleboro in Thaso fit, ibi & uinū con-
cipi perhibent, alterū ad soporem, alterū ad uigilias. Cato Ellebori radices in pila contundi prae-
cipit, circū uitē dandas. Vtile id uinum fore ad mouendam aluum, sine periculo. Theopha-
stus in Arcadię oppido Heræa, uinum tradit esse, cuius potu foeminae pariant: uiri mente com-
moueantur. In Achaia saltu Ceryniensi uinum & uitē nasci, quę foeminis gustata faciant ab-
ortum, in Troezenē steriles. Idem auctor, uina quædam scribit Ethica uocari: Theodorus uer-
it, moralia: etiā si mēdōse scriptū est, molaria quandoq;. Laudantur, q̄ celeriter purgāt se, ac
cōsistunt, quoniā tenuia sunt, & mixturæ immunia, ob id Ethica dici potuere, quasi castigata.

A

Vinū Phtho-
rion.

C De Vino e Chamælæa. CAP. LXX.
Hamælæa dum floret, cū folijs tusa, & cribrata decem drachma-
rum pondere, in musti congiū additur. Post duos menses
uinum in uas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine
contractis efficax est. Item mulieribus quæ a partu ægre purgantur.

χαμειλαίτη

C De Vino Chamæpityino. CAP. LXXI.
Hamæpityinum simili modo fit, ad eadem conueniens. Vri-
nam quoq; ciet.

χαμειπιτύινον

C De Vino Mandragorite. CAP. LXXII.

L ibrum radices concidito. Segmenta lino trañcito, quod selibram
æquat in musti congiōs decē demittito. Ibiq; esse finito ad men-
ses treis. Media potio heminae dimidium, bibitur, passo in duplum ad-
dito. Aiunt hemina uini congiō mistam, potu sapore adferre. Cyathus
unus cū sextario uini potus, enecat. Mediocris usus eius, doloris sen-
sum aufert. Fluctiones incrassat. Olfactu, instillatu, potuq; idē præstat.

μανδραγορίτης

B

C De Vino Elleborite. CAP. LXXIII.

I N congiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri
ueratri triti in linteo mundo, mittito. Dumq; efferbuerit, in maris
nae aquæ congiōs quatuordecim aut quindecim transfundito. Et ubi
pleniusscule frēgeris, inñcito. Post aliquot dies colato, & utitor. Dato
cyathum unum ex aqua in potu ad aluum soluendam ijs qui euomue-
runt a coena. Alia ratio. Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias
as duodecim, spicæ syriacæ uncias tredecim, cribratas & linteo colliga-
tas in septem uini cōi sextarios, diebus quadraginta macerandas indi-
to. Postmodum colato. Dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Deco-
ctæ marinæ aquæ ex pelago petita sextarios duodecim, ueratri candi-
di libras sex, quadragesimo die q̄ madefeceris, colato, & utitor. Alia ra-
tio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in senis mu-
sti sextarijs diebus quinis denis macerato, mox colato, & semestri ex-
acto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uuas in-

ελλεβορίτης

Ff

D I O S C O R I D I S

C sole siccata imponito in musti metretam (implet autem metreta congi-
os decem) & gypsum in uinum mittito pondo drachmarū uiginti, et bi-
duo residere finito: conijcito ueratri nigri uncias triginta, iunci odorati,
calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios du-
os & heminam, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens lin-
teolo diebus quadraginta appendito: postea colato, dabis heminas treis
aut duas dilutas. Purgat a partu & abortu scēminas. Menses extrahit.
Contra strangulatus uulvæ efficax.

BARBARI COROLL.

De altero Elleborite, dictum est in Phthorio.

De Vino Scammonite. CAP. LXXIII.

σκამμωνίτης

SC A M M O nites sic fit. Radicis scammoniae per menses ef-
fossæ, tritæ & linteo colligatæ drachmas quinq; in uini congiūm
mittito, ad dies triginta. Aluum purgat. Bilem & pituitam extrahit.

BARBARI COROLL.

De altero Scammonite legitur in Phthorio.

EX M. VERG. COMM.

Satis per se patent quæ fictitij Vini tam multa gñā supiore capite collecta a nobis sunt. Ni-
hil ob eam causam ultra de eis agemus: sed festinantes ad reliqua, quæ uertēda in scriptore hoc
alia supersunt, interpretationis, cōmentationisq; nostræ laborem transferemus.

καδμίας

DE oibus metallicis, et primū de Cadmia. CAP. LXXV.
EX Cadmiæ generibus optima est Cypria, Botrytis nomine, den-
sa, modice grauis, et in leuitatem magis declinans, racemosa facie,
colore spodij: quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur
foris carulea, intus candidior, internatis segminibus, onychitæ lapidi si-
milis. Cuiusmodi sunt quæ e ueteribus metallis effodiuntur. Quædam
etiam Placodes, id est, crustosa dicitur, lineis quibusdam perinde quasi
zonis cincta: ob quod eam Zonitin appellauere. Alia Ostracitis nomi-
natur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem ha-
bet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis
Botrytis nomine, & Onychitis, utiles. Reliquæ ad emplastra, & farinas
quæ cicatricibus inducendis insperguntur. Ad eadem Cypria prodest.
Ex Macedonia uero, Thracia, & Hispania delatæ, improbantur. Cad-
miæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, cor-
poris meatus infercire, excrementa in carne coercere, crustas creare, &
ulcera quæ cacœthe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur Cad-
mia ex are in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus ca-
merisq; fornacum applicata. Prægrandes autē ac ferreæ sunt fornaces,
ab officinis appellatæ Acestides, per summa nullo spiraculo relicto, cō-
camerate: ut quæ ab are iactantur sursum corpuscula cohæreant, & ini-
bi detineant: quæ cū spissius insidēt, in corpus conerascunt, & modo
genus unum eius, modo alterū, mō omnia perficiūt. Extrahitur & Cad-
mia cremato lapide cui Pyritæ cognomē est, mōi sole supereminente.

In quo etiā quædam quasi uenæ, chalcitis, mysios, foreos, melantheriæ cærulei, chrysocollæ, atramenti futuri, diphrygisque inueniunt. Nec desunt qui Cadmiam in lapidū fodinis inueniri tradant: falsi quadā lapidum cognatione. Reperitur & apud Cumas lapis nullā sui uim ostendens. Si eo depræhenduntur, quæ sunt Cadmia leuiiores, nullumque alienū mandentibus saporem exhibent. Cōmanducatus autē lapis, dentes offendit. Cadmia, utpote cum cedat, esum nō respuit. Alio autē discerni possunt argumento. Cadmia in farinā detrita, & aceto subacta, in sole se cōprimit. Quod in lapide nunquā accidit. Item tritus, & igni appositus lapis, profilit, & fumū igni similem ei aculat: Cadmia uero quieta manet, fulginemque luteo colore, aut æreo splendentem expuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignē expertus, atque refrigeratus, colorē mutat, ac leuior multo fiet: sed Cadmia nihil euariat, nisi quis eā aliquot diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda ærariæ. Vritur Cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: mox extinguitur uino aminnæo. Sed quæ ad pforarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo. Exustam cōterunt in uino, rursumque fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur. Iterumque tritam ex uino, urunt donec in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens. Hac spodij uice utuntur. Lauatur in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidū nihil emergat. Dein coacta in pastillos reponitur.

BARBRAI COROLL.

Cadmiam uocant & lapidem quendam erosum, ex quo fit æs, fusuris necessarium, medicinarum inutile: quamque Galenus lapidosam Cadmiam circa Solos in Cypro insula nascentē, fornaciarum prælatam ætate sua meminit, inuenturam. Possidonius quoque lapidem Cadmiam ex Cyprio tantum ære fieri commemorat. Fit autē Cadmia, de qua hic loquimur, etiam in argenti fornacibus, candidior ac minus grauis, sed minime cōparanda ærariæ. Plinius Capnitin, hoc est, Fumariam appellat eam, quæ sit tenuissima, in ipso fornacium ore inuenta: qua flammæ eluctantur exusta, & nimia leuitate similis fauillæ. Secunda Botryitin, hoc est, Racemariam: quia interior sit, & cameris dependeat: cui prima dignatio tribuitur, grauior priore, leuior sequentibus. Duo huius colores, cinerius, & puniceus, qui & melior. Friabilis hæc, oculorumque medicamentis utilissima. Tertium genus Placitis, aut Placodes: & ipsa ex argumento, quoniam crusta sit uerius quam pumex. Ponderosissima hæc, & intus uaria. E lateribus fornacis fluunt ex ea duo genera, Onychitis extra pene cerulea. Intus Onychite, modo maculosa, Ostracitis tota nigra, & cæterarum durissima: unde nomen.

EX M. VERG. COMM.

Non potuerunt metalla etiā, & si naturæ solidissima sunt, pares iniurias temporū, & liberiorum incuriā, duas bonarū artium, & antiquorū scriptorum maximas calamitates & pestes, euadere. Habet enim hoc etiam caput, quod suspicemuraliter quondā legi potuisse, quod in antiquis exemplaribus uariet, & quod duobus locis necessario desideretur. Quod suspicamur eo loco est quo legitur. Vocatur & Ostracitis, alia concretionem suam. Quam uocem nescio quomodo gracilem, nos etiā alios imitati diximus. Neque enim Cadmiæ gracilitas congruit. Si enim minore crassitudine describenda erat Cadmia hæc, tenuem, nō gracilem dici oportebat. Per latitudinem enim Cadmia extenditur: potestque tenuis, aut contra crassior concrecere: & nihilominus hic dicit: quæ uox per longitudinem subtile, & gracile significat. Eapropter dubitauimus cum uertentes locū, non *ixvii*, quod est gracilem, sed *ixpav*, id est, ualidam & effracem legi potuisse: ut non ad habitum & figuram, sed ad potestatem & uires referenda ea uox

Ff ij

C fuerit. In quo non tam persuasit suspicari id, facili ob literarum & soni uicinitatem ex altera in aliteram uocem & significationem lapsus, q̄ Plinius de hac ipsa Cadmia agēs lib. 35. cap. 10. fortissimam ceterarum eam esse dicens: quasi ἰχθυήν, non ἰχθυήν ipse tunc legisset. Cōmunis ramen gręcorum omnium ea lectio est. Et qui latini scriptoris huius codices circumferuntur, his uerbis eam describunt. Est & alia quę Ostracitis dicitur tenuis, & nigra, eadem fere tenuitatis & gracilitatis significatione: eamq; ob causam nihil nos ex cōmuni lectione mutauimus, contenti suspicionem hanc nostram legentibus indicasse. Quod deinde in scriptoris huius exemplaribus uariat, coniunctum his statim sequitur: habentq; uetustiores gręci, & quibus nos magis deferimus, hæc uerba. γαστέρι δὲ καὶ ὄστρον δὲ καὶ ἰχθυήν ἰριφανία, coniunctio scilicet cum superioribus sensu. Qui sit, ut nos uertimus, uocari Cadmiam aliquam testaceam, gracilem, plarumque nigram, terrestri, testaceaue superficie: quasi rationem & causam hic scriptor redderet, cur testacea Cadmia hæc appellaretur, quoniam terrestri, aut marinis testis simili superficie sit. Qui uero impressi codices passim circumferuntur, alium, & qui forte a uero non discrepet his uerbis indicant sensum. γαστέρι δὲ καὶ ὄστρον δὲ καὶ ἰχθυήν ἰριφανία, qui scilicet sit, terrestrem esse Cadmiam, quę testacea superficie sit: ideoq; in medicina minus utilem. Nos antiquiores gręcos & latinos secuti, terrestri, testaceaue superficie Cadmiam illam esse descripsimus. Nec eo secius audisse hoc legentes inutile penitus nō fuerit. Quemadmodum contra pro comperto his esse illud oportet, perijsse huic scriptori aliqua quo loco hic ait, adhærente parietibus & cameris eius fauilla. &c. Quę enim statim sequuntur, Grandes hæc, ferreæq; sunt ab ærarijs aceftides appellatę, in summis fornacium cameris compactę, &c. integro & apto sensu coniungi nequeunt. Ceteri ininterpretes nihil deesse hoc loco suspicati, ad fornaces rē detorserunt; uerteruntq; grandes, ferreæq; fornaces eas esse, & ab ærarijs aceftidas uocari. Nō animaduertentes, si sic legatur, contra eius artis leges & obseruationes fieri ex metallo in eū usum fornaces: quę eodam igne candentes & ipsę fluent, aut liquefacto æri incorporabuntur: nec ab ærarijs in eo usu tractari aliqua ratione poterunt. Quod præterea sequitur, ut rinēant, confidantq; in eis quę ab ære sursum feruntur, ad cameras & earum conuexitatem simpliciter referri non posse: neq; fornaces a gręcis aceftidas uocari: sed ex quo hic ait, ab ærarijs aceftidas uocari, oportere aliud quidpiam ea uoce significatum suspicari. Quibus ueluti impedimentis nos admoniti, suspicati uitium primum sumus: mox ex antiqua scriptoris huius interpretatio ne id manifeste deprehendimus. Seruant em̄ adhuc in ea uerę lectionis exigua uestigia aliqua. Quę huiuscemodi sunt. Multi uero ponunt ferreas hastas, & longas. &c. Ex quibus ratiocinari facile est, consueuisse qui Cadmiam quærerent, ferreas uirgas ueluti axes transuersas in summa fornacis camera in eum quem hic docet usum suspendere. Eritq; sequax hic sermonis ductus, ut cum dixerit Diose. Fit Cadmia ex ære in fornacibus accenso, adhærente fornacium parietibus, & cameris eius fauilla: interim solere ærarios, ut aprius hæreat & confidat Cadmia, in summa fornacis camera transuersos axes, aut tegulas componere: esseq; has grandes ferreæq; & ab ærarijs aceftidas uocari. Qua uoce gręci ab Acesta Sicilię ciuitate plostelli genus huiuscemodi axibus compactum uocabant. Non longe postremo a fine necessario desyderat, quod tamen restitui facillime potest. Locus est ubi de cremanda Cadmia agitur: in quo cum in cunctis gręcis legatur, post eius cocturam, tum uino amineo restinguitur: sequaturq; statim: quę uero ad scabiem aceto. &c. necessario deesse aliquid constituendum est. Dicendi enim modus hic gręcis pariter & latinis parum congruus. Nec habet sequacem sermonis ductum aduersatiua particula illa quę sequitur, quę uero ad scabiem aceto. &c. Nisi præcesserit aliud a quo quod sequitur separetur. Nec sane decebat hunc scriptorem, aliam restinguendi crematam Cadmiam rationem docere, priuatimq; ad scabies eius usum cōtrahere, nisi diuersam in diuerso usu restinguendi rationem antea docuisset. Habendę Plinio hoc loco ingentes gratiæ. Ostendit em̄, 34. uolumine, cap. 10. quibus additis et insertis in integrum restitui locus hic posset. Verba eius sunt, & ut nos credimus a scriptore hoc accepta. Restinguitur uino amineo, quę ad emplastra præparatur: quę uero ad pforas, aceto. Vocauitq; ille pforas quas nos scabies cutis. f. asperitate omnes. Nihil itaq; certius hoc loco erit: respondebuntq; sibi omnia, si quis post Cadmię cocturam legat: restinguitur uino amineo, quę ad emplastra præparatur: quę autem ad scabies, aceto. Fecit id Barbarus ex Plinio acceptum, ut diximus. Verum tamē in gręcis pars ea nō legitur: nec nos addere huic scriptori eam uoluimus, satis fore rati locum signasse. Volumus legentes in eo etiam monere, quod a principio capitis huius non est nobis cum ceteris interpretibus idem: maluisse nos rubiginosum dicere, q̄ eruginosum, quod in scriptore hoc ἰδιότης est. Scimus quidem ἰδιότης in metallicis æruginem plarumq; esse, ab ære dictam, quę metallo illō &

humoris alieuius, præsertimq; aceti habitu, quemadmodū non multo post hic describet, fiat cuius in medicina multus est usus, uiridi semper colore. Nouimus etiam hunc scriptorem in ea significationis æstimatione hac uoce plerumq; uti. Veruntamen scientes duos in Cadmia ab antiquis græcorum medicis laudari colores, cinereum, & puniceum; nec posse æruginem quia uiridis sit, cinereo, aut puniceo colore describi ex altera græcæ illius uocis significatione, nam & rubiginem id græci aliquando dicunt, rubiginosam diximus, in qua uoce puniceus color sit. A rubore enim, rubigo dicta est, & scabrics quæ igne semper fit: quorum nullum in æruginem dici poterat, quæ uiret, & humoris alicuius aspergine, non igne conficitur.

A

De Pompholyge.

CAP. LXXVI.

Pompholyx specie sola, non genere a Spodio distat. Siquidem Spodios nigricat, & plerumq; ponderosior est, palearum, pilorumq; plena: quasi derafum quiddam, ac detractum ab ærariarum officinarum pauimentis, fornacibusq; uideatur. Pompholyx uero pinguis est, & candida, usq; adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad æris colorem uergens, suppingue. Alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida fit Pompholyx, quoties in perficiendo æte, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam Cadmiam cumulatiuè insparserint. Namq; tenuissima fauilla quæ effertur, in Pompholygē cōit. Cæterum Pompholyx nō ex aris modo materia & fabili industria factitatur, sed ex Cadmia quoq; ad gignendā ipsam eximie proflata. Cuius faciundę ratio hæc est. In domo binis tectis operta, fornax extruitur: iuxta quam medio-
cris fenestra uersus tabulatum a supernis partibus pateat. Domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usq; perforetur, ad excipiendam follis naem. Ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. Domuncula altera cōiuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex, Cadmiam particulatim fractā inspargit, a locis supra fornacis caput extructis. Idem negociū obit artificis minister, simulq; carbones adiicit, usq; dum indita Cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta suffitu, tenuis pars & leuis materię in summā domū euolat, & parietibus tectisq; adhærescit: conflatū inde corpus, inter initia erumpentibus aquarū bullis simile prodit: postea maius incrementum capescens, elaboratis lanis simile redditur. Ponderosius autem in subiecta pedibus loca se recipit. Sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret. Quod tenuiore deterius existimandū est, ideo q; multum terrę collegerit, & spurcicia in aceruatione refertur. Sunt qui hoc modo tantum fieri Spodium arbitrantur, de qua ante dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto odorem aris præstat, colore aliquantum piceo, sapore luti horrido: & si fraudem nō experta, flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Ante dictis autem notis, diligenter attendendum est. Siquidem a nonnullis

pompholyx

B

Ff iij

D I O S C O R I D I S

C adulteratur taurino glutino, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cognitu fuerit. Quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antedicta sunt. Pompholygem ita lauare oportet. Ligatam linteo mundo, modiceq; raram, aut siccam, aut aqua respersam in labellum demittito, quod imbrem continet, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito. Ita enim limosa pars eius ac dulcis effluet, et omne crassamentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito, mutata tantisper aqua & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest siccant, et manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant: & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumoso quod traiectum est & supernatat uasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit, et sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto harenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. Hoc identidem faciunt, donec cinis merus & harenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire. Pilos autem & paleas leuitate sua in sublime at tolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum ut Cadmiam eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus. Et ita redditur adstringentior, q̃ aquis elota. Vis Pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur quæ sensim cruftas obducunt. Quod si Spodium torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos: fictiliq; nouo, subiectis leuibus prunis orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fuluescunt. Neq; ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri Spodium. Verum post Cypriam Plumbea maxime commendatur.

BARBARI COROLL.

DE Pompholyge, ac Spodio, cōmuni usu hic agitur: differentia, ut aliqui existimant, q̃ Pompholyx paratur lotura: Spodium, siue Spodos illota est. Quidam id quod candidum sit, leuissimumq; Pompholygen dixere, & esse aeris & cadmiæ fauillam, & ut nomen indicat ampullam: qualis est bullantiū aquarū. Spodium uero nigriore, ponderosiorq; mixtis scintillis aliqui et carbonibus. Optimā e Cipro: p̃pterea Hippo. Melancyprio, quasi atramentū cypriū uocatā inter prant aliq. Nam Possidonius e Cyprio tm̃ are fieri Spodio existimauit, ut Straboni placet: fieri q̃ liquescentibus Cadmiā arario lapide leuissimā. Hęc euolās e fornacib. & testis adherescēs, a fuligine distat cādore: q̃d minus cādidiū ex ea fuerit, imaturū fornacis argumētū est, hoc q̃dā Pompholyge uocat. Qd̃ uero rubicundius ex ijs inuenit, acriorē uim habet: exulceratq; adeo ut cū lauat, si attingat oculos, excēcet. Est & mellei coloris Spodos, in qua plurimū aeris intelligit: sed q̃d cūq; genus lauādo fit utilius. Habet & i argēti fornacibus Spodos, quā uocat Lauriotin, forsasse quā Illyriōū Hippo, nescio an corrupte, Laurio certe locus erat in Attica, ubi Argēti fodi-

ne quodā fuere, ut inquit Pausanias. Vtilissima hæc oculis, quæ fiat i aurarijs. Spodis & ex plūbo fit, eodē modo quo ex ære Cyprio mōstrauimus. Fit Pompholyx et ex sola quoq; Cadmia, ut Galenus testatur. Aetius inuentu inquit rara est Pōpholyx, & adulterari facilis. Laudatur uero non candida, sed quæ subliuet, quæq; carbonibus inspersa, flammā ignis auream uideri faciat.

EX M. VERG. COMM.

Praefatus a principio statim hic scriptor, specie solam, genere nullā habere diuersitatem in metallicis Bullam & Cinerulā, promiscuum in medicinā monuit utriusq; cum opus erit fore usum: simulq; ueniam dari sibi a legentibus petit, si mutatis inuicem nominibus his confectio nem, loturamq; & usum toto hoc capite utriusq; docuisset. Quod em̄ in eis differt, color, pondus, & puritas tantum est, Substantia eadē, & uires in utraq; pares: tantūq; abest, ut rei discrimen aliquod antiquitas fecerit: ut Bullam sola lotura differre a Cinerulā aliqui testati fuerint. Hic tamē certius rem docens, certas utriusq; notas reddidit. Quæ deinceps ab eo traditæ, repetendæ inutiliter a nobis modo non sunt: indicantibus præsertim earū etiam nominibus, nō rei, sed partium diuersitatem. Pompholyx em̄, quæ a nobis Bullæ nomine reddita est, Bullarum in aqua similitudine cōcrescens, eademq; figurā quasi clauso intra se spiritu, ut in offensa aqua sit, tumens, indeq; inuento nomine uel flammæ egesta, & hærens ex materia æris, quod leuissimum purissimumq; erat secū derulit. Contra autē Spodion, quā Cinerulam uertimus, grauiore pondere, sordidiorq; non aliter q̄ cinis extincto igne mixtis carbonum reliquijs subsedit. Accessit etiam utriq; color, qui in altera ob eam causam nigricans, in altera candidus, partium itidem, nō substantiæ diuersitatem ostendit. Eoq; pertinet quod in Cinerulā hic ait, esse eam ueluti fornacum purgamentū, & quasi quod scopis ueritur. Non aliter q̄ infimi, & pro re rustica stercoris generibus græci *σπυμαριτιν* uocant, id scilicet, quod undiq; scopis in unū collectum fuerint: quale in purgandis tridinijs, totaq; domo quotidie in certum aliquem conueritur locum. *σπυμα* enim, qua uoce hic usus est, nihil indicat aliud. Quemadmodum & *σποδον*, siue *σποδιον*, non simpliciter cinerem, sed sordidum, & in quo extinctorum carbonum reliquiæ supersint aliquæ. Id enim nos obseruauimus inter *σποδον*, & *σποδον* græcorum discrimen. Neq; hic aliquando *σπυμασποδιον* dicens aliud, q̄ feruentem cinerem eumq; in quo ardentium adhuc carbonū exiguæ reliquiæ sunt intelligi uult. Cognouerunt discrimen hoc latini etiam, si Columellæ credimus lib. 2. capite. 15. de generibus stercoris agentī: in quorum censu prodesse etiam satis ait cinerem, & fauillam: in altero rem notam significans: in altera cineri mixtos carbonēs, & eorum quas diximus reliquias.

De Antispodo.

CAP. LXXVII.

QUONIAM Spodos sæpe numero desyderatur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in Spodij locū suffici possint, Antispoda uocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaq; myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictili crudum coniecta, inditoq; operculo continua foramina habente uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. Iterum in fictile aliud crudū transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, exempta lauatur ad usus. Idem quoq; fit e termitē syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, fatiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis. Item ex moris immaturis, id est, candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, oenanthe, aut mollibus rubi folijs, uel e buxi coma, uel pseudocypero cum flore. Alij ficus in sole antea siccatas, eodem modo parant. Alij taurinum gluten. Alij succidas lanas asperas, pice, aut melle irrigatas. Quæ omnia in Spodij uicem usurpantur.

BARBRAI COROLL.

Antispodion est & cinis fici, caprificiq; ac lentisci: e buxi quoq; coma est, pseudo Cyperi, & Terebinthi, & Oenanthēs.

C

πικρὺν μένος
χαλκόν

De Aere usto.

CAP. LXXVIII.

AEs ustum probatur rubrum, quod contritu colore Cinnabarim imitetur. Nigrum uero plus q̄ deceat exustum est. Fit autē e clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis, subperso sulphure, cum sale pari: omnibus uicissim insparis, fictile circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale fictili, aliquot dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos, urunt, & iterum aut tertio idem efficiunt: postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit. Ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Vitia oculorum emendat. Ex crescentia in carne consumit. Nomas cohibet. Vomitus ciet, cum Hydromelite potum, aut cum melle delinctū, illitumue. Lauatur ut Cadmia, mutata quater in die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercusue, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur, & eandem uim, sed imbecilliolem habet.

B A R B A R I C O R O L L.

AEs ustum, Græci Calchon cecaumenon uocant: Celsus uero cum Cinerem cypriū uocat, aut Cypriū æs, crematū, aut Spodion cypriā intelligit. Aegyptus collyrii modo terit in conculis. Fuligo aeris, siue ut Aetius appellat, ærariorū fabrorum, Ephestia græce dicitur.

D

Scoriam metallorum, Græci, & Scoriā, & Cibdelin uocant: ut Photioni placet.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinium secutus Barbarus, colorem in cremato ære probauit, qui ad Minij speciem accederet: rubentis quidē, eodemq̄, aut non dissimili Cinnabari colore fulgentis: non tamen, ut hic paulo post docebit, re & substantia eiusdem: cum alterū ex Hispania, alterū ex Libya quondā affereret: uulgareq̄ Minium & copiosum, Cinnabari autem exigutū & rarum esset: & quo tantum in uariandis lineis pictores uterent. Ex eo quoniā in consimili genere poterant Cinnabari & Minij diuerso colore esse, alterūq̄ profundiore, alterum dilutiore rubore uideri, a uocibus scriptoris huius discedere longius ipsi nolimus. Et quoniā in cremato ære colorem hic probauerat, eundem nos etiā probauimus: nec aliter q̄ hic Cinnabaris colore in attritu crematū fieri descripsimus. In cuius confectione non est quod miretur aliquis, probare hunc clauos solutarum nauium. Fuit enim aeris quondā largior, q̄ ferri copia: eousq̄, ut arma etiā quibus ad bellum uterent ex hoc metallo fierent: si græcorū poetis, præsertimq̄ Homero credimus. Erat in fabrica quotidianus itidem aeris usus: in qua prælatū diu ferro id est, non ob copiam tantū, quæ maior ferri aliquādo fuit, q̄ quia nulla rubigine perit æs, & in quotidiano attritu contumacius durat. Ea q̄ est causa, cur hic æreos clauos in nauigijs dixerit. Cur autē ex solutis nauibus potius, q̄ nouos quæri præceperit, aliā habet rationē: quoniā scilicet aptius in eo usu æs illud sit, quod attritu domitū, & consuetudine laboris ueluti mansuefactū erit. Multa em̄ sunt quæ in nouitate sua minorem, q̄ in uetustate, ob nimias uires, utilitatē habent. Nec aliūde factum fuisse nos credimus, ut uetusti aeris & in clauos iam pridem conformati, multoq̄ labore edomiti, ad hanc rem usus esset. Potuit etiam ex nauigijs magis, q̄ ex ædificijs quæri: quoniā ex mari, saleq̄ eius aliquid bonitatis ad hunc usum æri accreuisset: quod antiquiores illi experti, posteris suā fide recipiendū tradiderunt. Satis cætera in hoc capite patent.

ἐν θέρ χαλκόν

De Flore Aeris.

CAP. LXXIX.

Flos Aeris, quem nonnulli clauorum ueterum Psegrma, quasi ramentū, noiarunt, optimus est, friabilis, in attritu fuluescens, milij

A effigie, brevis, ponderosus, modice splendens, atq; constringens, qui de limatam aeris scobem nō recepit, qua saepe adulteratur. Sed id facile deprehenditur cum dentiū illisū dilatantur ramenta. Fit aut, cum aes fornacibus fustum, in receptacula delabitur, per cola fistularū ad ea pertinentiū. Circa eas em occupati, sordes expurgantes, aquā clarissimam infundunt, refrigerare uolentes. Itaq; repētino concretu, ac addensatione, expuit, & scatet antedictus flos. Adstringit, & excrementia coerct. Offusam oculis caliginem emēdat, sed magnopere mordet. Quaternū obolorū pondere datus, crassum humorē extrahit. Carnosa narium uitia absomit. Eruptiones papularum cum uino cohibet. Contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellit. Vuam, tonsillasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

B A R B A R I C O R O L L.

Flos aeris, hoc est, Chalcuanthos, differt a Chalcantho, quod atramentum est futuriū. Differt & a Squama, quae ut atq; ictibus clauis & panibus aeris excutitur: Flos uero ex iisdem cadit sponte. Fit aut in aerarijs officinis, iam fuso aere atq; percoctio, additis etiamnū carbonibus, paulatimq; accensis. Tum repente uehementiori flatu expuitur aeris Pala quaedā (ut Plinius uerbis utar) quod Pseuma, Floremq; uocat. Est aut Pala proprie, ut inquit Strabo, purgationis auri gleba semilibralis: a quo translatus id nomen est & ad alia. Plinius alio loco Palacas in Hispania dici massas auri scribit, in puteis repertas, decussis pondere: quas & Palacranas uocant: sicut minutum quod est, Balancē. Democriti chymistae aphrodites sperma, hoc est, Veneris semen. Nā & ipsum aes nō alio q̄ Veneris uocabulo pnunciant. Idem Ascion chalcō, pro aeris flore accipiunt, hoc est, quasi exumbratū aes interpretet. Sunt qui Florē diuersum intelligāt a Pseuma, sed ratio faciendi eadem. In utroq; solū quo Pseuma excipitur, stratum esse iubent.

De Squama aeris.

CAP. LXXX.

SQUAMA aeris excussa clauis cyprio aere fabricatis, crassa quidem ipsa. Bona est quae Helitis nominatur. Sed ex malo aere, aut candido, uitiosa intelligitur. Quam utpote tenuem & inuolidam damnamus, maxime approbantes crassam, ruffam, praesertim si aceti respersu rubiginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, resprimentē, & erodentem. Nomas coerct. Vlceres ad cicatricē perducit. Pota ex aqua mulsa aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in carapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabriciam absumit, & fluctiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccae aeris squamae expurgatae selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousq; pessum ierit. Abijcitur quod emerit, & effusa aqua, haemina coelestis hymbris adijcitur, & distenta manu, squama quasi exiccanda sit, uehementer confricatur. Dumq; lentorem emittere coeperit, aqua sensim ad sex heminas usq; superinfundit, terendo ualide. Squama ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur. Quo facto, expressus humor pixide ex aere rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos Squamae, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficac. Inutile quod superest. Lauatur, donec nullam prorsus lenticiam excernat, & linteo opertum biduo conuiuiscere sinitur, effusaq; extan-

D I O S C O R I D I S

Cte aqua, ubi siccatum erit, reconditur pixidicula. Alij ut Cadmiam lauant, & reponunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Squama, hoc est, lepis, etiam e ferro in usu est, ex acie, aut mucronibus maxime simili, sed aciore ui, q̃ tubigo. Cyprios clauos, de quibus hic habet mentio, Palladius cuprinos clauos: & cuprinū æs, pro cyprio ære appellat. Aeris inquit Celsus, duæ species sunt: alia tantū æris: alia rubri æris. Veteres ipsum æs rude impolitūq; dicebant Raudiū, siue Rodū: unde porta Romæ, q̃ ærata esset Raudera, et Rauduscula, siue Raudusculana uocaret. Quid si pomi genus in citrea, q̃d Rantiū uulgo dicit, ab æris colore quasi Raudiū uocaris: hoc est, fuluū. Est em̃ fuluū æs, ut inquit Ennius. Q̃q; & a Neratio fortassis inuentore, Neratiū dici potuit. Nisi quis non Rantiū, sed Araniū, quasi Arianū, id est, Persicū, a gente uelit appellatū. Est enim Aria, ut inquit Hellanicus, & si recte memini, etiā Herodotus, & Plinius, & ceteri, Persica quædā regio. Quid item si malū Arantium, ab Arantia oppido Achaïæ dictū conicias: q̃d & pomis ferile scribunt fuisse: a quo effectu, posteri Phliunta noīauere, ut inquit Stephanus: proinde Lacedæmonij mēsem, in quo terra fructibus abundat, Phliasion appellat. Accedit, q̃ Herculem mala Hesperidū, Arantiam primū tulisse credunt, auctore Pausania. Sed uereor, ne quis me alias inuidiæ obnoxii, etiam nimio iuuandi rem latinā studio, lapsus prædicet.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ tria ex uno eodemq; ære in medicinæ usu deinceps a scriptore hoc numerata hæcenus fuerunt, æs, ærisq; flos, & Squama, non aliter q̃ de bulla & cinerula non multo ante hic dixit, specie tantū inter se differunt, genere nullā habent differentiā. Ex eadem em̃ materia, eosdem fere usus & effectus præstant. Nec aliter de his ueteres tradiderunt, q̃ ut æris partes haberi tria hæc uellent. Longius de his docuit Plinius uolumine. 14. capite. 11. Qui licet aliter a scriptore hoc de his tradere uideatur, re tamen eadem omnia docet. Nec aliud esse discrimen ostendit, q̃ q̃ Squama excutitur ictibus, flos sponte cadit: alterūq; illud Squamæ genus, quod Stomoma dicunt, subtilius esse, ex summa scilicet lanugine decussum. Est em̃ græcis Stomoma ferri acies: & uerbum illis *στομόν* aciem in ferro trahere significat: cum in cote ductū, reductūq; acuitur, & acuendo exterritur. A quo euentu quæ subtilissima ex ære detrita est, Squama, Stomoma dicta ab ea gente est: quasi in trahenda acie in cote detrita. Squamā æris probauit hic, quæ in Cyprijs ærarijs, &c. Damnauit contra, quæ *ἐν τοῦ χαλκοῦ ἢ ἐν τοῦ λευκοῦ* de cussa fuisset: non ex malo ære, promiscuoue, ut alij interpretes uerterunt, sed uulgari & uili. Neq; enim malum, promiscuumue æs ea uoce indicatur, sed uulgare, quod omnibus locis inuenitur: ideoq; Cyprio comparatum, nullius, aut exiguæ dignitatis & æstimationis. Sequitur ab hoc loco statim in probatione Squamæ huius participium *ιονμίνην*. Quod alter ex interpretibus ad rubiginē retulit: cum tamen iudicio nostro ad Aeruginem, quæ propria æris est, contrahenda uox illa fuerit. Communis enim metallis omnibus rubigo est, quia rubet sic dicta. Quæ autem in ære concreuit, aceti, aut alterius etiam humoris aspergine, aut halitu, ærugo uiret. Quemadmodum in confectioe eius mox dicitur.

D

λεπίδος στόμμη

De Squama ex acie decussa. C A P. LXXXI.

Squamæ ex acie, aut mucronibus decussæ, quam uocant Stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad molientiam alui deiectionem inefficacior est.

B A R B A R I C O R O L L.
Stomoma, genus est Squamæ subtilius, ex summa uidelicet lanugine decussum.

ἰὸν ἔρπον

De Aerugine rasa. C A P. LXXXII.

AERVGO rasa fit ijs modis. Super doliolum, aut aliud consimile uas aceti q̃ acerrimi, æneum uas, præsertim concameratum, sin minus, planum uersetur: sitq; extersum, nullumq; habeat spiramentū. Exempto uase quo doliolum obturaueris, decimo quoq; die insidens Aerugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspen-

ditur, ne attingat: & totidem post dies raditur. Aut massulæ æris, aut laminae, uinaceis iam acedentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetiā ex delimata æris scobe æruginem facere licet. Necnō e laminis, quibus bractee auri conclusæ malleo ducuntur. Si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginē in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdā nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit. Adduntq; nōnunq; per caniculæ æstus e quodā specu manare. Sed hoc exiguum, & optimū esse: illud speluncis effluens, copiosum quidē, & boni coloris, sed uitiosum, quod lapides multos collegerit. Pluribus aut modis adulterant. Aliq; pumice, alij marmore, alij atramentō sutorio. Sed deprehēdemus pumicem, aut marmor, pollice sinistrae manus madefacto, & æruginis portitunculā in alterū atterente. Siquidē eam diffundi constat. Marmoris aut pumicisq; partes cōeunt non dissipatę, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin et dentiū appressu. Siquidē synœgra cedit: leuis, sine asperitate. Atramentū uero sutoriū, igne coarguitur. Namq; si fictile, aut lamina, adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere, aut carbonibus incalescat, mutabit colorem. Atramentū sutorium rubescit, quod ustum suapte natura talem sortitur colorem.

B A R B A R I C O R O L L.

AErugo rasilis, quā Græci uocant Ion xyfton, minus probatur e squamis. Ocyssime contrahit æruginem coronarium æs. Aeruginem maxime Rhodiam adulterant marmore. Deprehendit papyro, galla prius macerato. Nigrescit em statim ærugine illita. Deprehenditur & uisu, maligne uirēs. Aerugo æris, a Columella est ubi ænea rubigo dicta sit. A Vitruuio Erucanominatur, eadem quæ rasilis a specie uermiculi eius, ut conicio, qualis Rhodo fingeatur. Ob id & genus alterum æruginis, ut mox liquebit, Scolex appellabatur. Nam & morbus quidam arborum, nunc Rubigo, ut Plinius, nunc Aerugo appellatus est, ut Hieronymus, quem Græci Erysiben, Rhodij Erethiben uocant, a colore, ut nos Rubiginem; a quo & Robur dictū sit, quia plurimas huius coloris, quasi uenas habeat.

De Aerugine Scolecia. CAP. LXXXIII.

AEruginis quam uocant Scoleciam, duo sunt genera. Quædam fossilis est. Altera facticia. In mortario cyprii æris dimidiam heminā aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. Deinde aluminis rotundi, salis fossitij, translucentis, aut marini q̄albissimi, solidiq; drachmam unam, aut certe cum natri pari pondere terito in sole, ætuosissimis diebus, sub sidus caniculę, donec colore ærugineum, & coaugmēto strigmētosum fiat. Vbi aut se in uermiculorū speciem contraxerit, recondito. Efficax & boni coloris redditur, si duas parteis urinae ueteris, cum una aceti adieceris, & alia quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginem rasilem, quę in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendāt. Quod genus, ut uitiosum improbatur. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortatio & pistillo cyprii æris, cum urina pueri impubis, qua aurū ferā

ἰόν ἐκάλειον

C ruminant. Antedicta aeruginum genera, uisio æri correspondent. Sed magis effectu ualent. Sciendum fossilem Scoleciā præstantissimā esse. Derasam sequi. Postremo loco facticiā. Mordacissimā tamen est, & magis adstringens. Aurificum autē Aerugo rase correspondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. Oculorum cicatrices emendant. Lachrymas cient. Nomās sistunt. Vulnēra ab inflammatione tuentur. Ulcera ex oleo, cæraq; ad cicatricem perducunt. Callos & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ. Callum fistularum erodunt, cum ammoniacō, collyrii modo in eas adactæ. Ad gingiuarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarū crassiciem, cum melle illitæ. Verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ cum are & nitro lepras abigunt. Vritur particulatim fracta, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita. Versaturq; donec se mutet, & colore subcinerefcāt. Postea refrigerata reponitur. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est, sed non prorsus eundem colorem cremata contrahit.

B A R B A R I C O R O L.

Scolēcia Aerugo fit & per se rasa, ex ærario lapide quem Chalcithin uocant. Nominatur autē Scolecia, siue Scolex, uel quia se contrahat in uermiculos sponte, uel quia fingatur in eos arte. Aristoteles, In Cypro inquit insula, ærariis fornacibus, ubi Chalcites lapis pluribus diebus uritur, uermiculi mediō igne quadrupedes, & pennati nascuntur, paulo muscis grandibus maiores, qui per ignem ambulent, & saliant quamdiu ibi sunt, uiuentes: cum euasere longius paulo, moriuntur. Pyralides, siue Pyroli nominantur, uel ut in quibusdam Plinianis codicibus, Pyraustæ.

D Aerugo aurificum, hoc est, Santerna, quæ a Græcis Ios Chrysochoon, & Chryfocolla dicitur, gluten est & ferrumen auri eius, quod argentosum uocant. Signumq; est, si addita ea, ni reficit. Ediuerso ærosū contrahit se, hebetaturq; & difficile annectitur. Fit autem id glutinum præter ea quæ a Dioscoride scribuntur, etiam auro & spuma argenti additis, unaq; contritis. Vtrum uero Santerna hæc, an alterum genus intelligatur a Theophrasto, chytos argyros, hoc est, argentū fusile; quum dicat, & mortario, & pistillo æris terēdo confici & aceto, nondum liquet. In Santerna certe sola, qd quidem sciā, mortarium & pistillū ex are cypro desyderant, sed cū urina impuberis, non aceto. Inuenio & Argentū mentitum, hoc est, Pseudargyron uocari, qd ex lapide quodam uisio fiat Anderis, in Troade: itemq; in Lydia prope Tmolū: huic æs addendo mixtura prouenit, Orichalcum a quibusdam appellata, ut Straboni placet. Cæterū Chryfocolla dicit & panificij quoddam genus, ut in Tritico docuimus. Santernā fortasse dictā putē, quasi Xanthernā: quippe cum legamus Aeruginē hanc a Græcis quādoq; dici Xanthesin, a colore flauo: qualis aureus est. Ob id & Latex diuinus ille, tingendo auro chymistis tantopere quæsitus, plerūq; Ios Xystos, & Aerugo nominatur.

Aerugo ferri, hoc est, rubigo, deraditur humido ferro, clauis ueteribus. Hac Telephum Achilles sanasse proditur: qd id quidam ex ærea cuspide factū interpretantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Monstrauit Vitruius suæ Architecturæ libro septimo cum de coloribus ageret, Aeruginis unam tantum confectionem, eam scilicet quæ secunda huic scriptori est: suntq; eius post confectionē Cerussæ disciplinam hæc uerba. Eadem ratione lamellas æreas collocantes efficiunt Aeruginem, quæ Eruca appellatur, &c. Vocatq; insecti, & uermis nomīne Erucam, quæ cæteri omnes Aeruginem dixerūt. Nec nos sciamus, qd integra in eo scriptore ea uox sit. Aliqui quoniā insecti, quod Græci Campem dicūt, ea appellatio est, Vermicularem illā Aeruginem ex similitudine ab antiquis Romanis dictā eo nomīne fuisse existimāt: nos tamē, quoniā quam Vitruius Erucam appellari ait, a uermiculari distat, nec aliquid illi simile, aut cōmune habet, uerum ut diximus, secundum huic scriptori genus facit, confirmare id non audemus: du-

bitamusq; in Vitrutio male Erucam forsitan legi: ueramq; lectionem, æneam, aut æream esse: quoniam latini scriptores aliqui æruginem nominantes, æneam, aut æream semper addiderunt: ut ex quo metallo æruginem dicerent, certius indicarent. Neq; ab rei quando ut in græcis κομινis ad æruginem & rubiginem uox est: sic forte in latinis aliquando fuerit, promiscueq; ærugo in cunctis metallis diceretur, & si priuatim in ære ea uox in usu postea esse tantum cœperit. Coniicimus hæc, non decernimus: eamq; ob causam poterunt arbitrio suo de his legentes sentire. Quo loco deinde hic scriptor ait, fieri itidem æruginem ex delinata æris scobe, laminisue illis αἰὲρ περιχόμενα τὰ χρυσὰ πτάλα λαμβάνεται. &c. nosq; uertimus, quibus inclusa aurea coronarum folia extenduntur: adiecimus nos coronas, quæ nullæ tamē in Diosc. sunt: propterea, q̄ de his necessario agebatur: nec poterant aurea folia illa aliter, q̄ in coronis intelligi. Quod græci aliquot indicant de coronis agentes: breuissimeq; Plinius dicens. Ocyllime uero contrahit coronarium æs æruginem: illud intelligens, quod in extendendis ex auro bratteolis in foliorum figuram, in usu ea tempestate esset. Quod nunc alia ratione fit. Vitium non multo post signauimus, quo loco scilicet de deprehendendo rasilis æruginis adulterio agitur. Male em sequax illic sermo est: nec satis (alioquin certa res) patet. Docet enim pumice, aut marmore adulteratam æruginem humore & attritu intelligens: quorum altero deluit, altero albescit ærugo. Quod in sincera nō sit. Numeratur deinde inter alias uermicularis æruginis uires a Diosc. ἀκρονόησις, quod est, lachrymas ciere, trahere & ducere: idq; tam manifeste, ut in scriptore hoc intelligi aliter res nequeat. Nescimus tñ nos, q̄ integer locus ille sit: non tam quia Plinius de erugine rasilis, cui uermicularis non adeo dissimilis est, lib. 34. cap. 11. ait. Vis eius collyrijs oculorū aptissima, & delachrymationibus mordendo pficiens: q̄ quia in oculorum medicinā compescuntur, nō pritantur delachrymationes. Erit id medicis diligentius animaduertendum.

R De Rubigine ferri. CAP. LXXXIII.
Vbigo ferri restingit. Sistit fceminarum profluvia admota. Potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perq; utilis ad scabrias genarum, paronychia digitorum, & reduuias. Condylomatis prodest. Gingiuas firmat. Podagras illita lenit. Alopecias replet. Vinum aquaue, in qua cā dens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

FERRUM Græce sideros appellatur: candens hoc, nisi duretur ignibus, corrumpitur. Rubens inhabile est tundendo, neq; anteq̄ albescere incipiat aceto, & alumine illitū sit æri simile. A rubigine uindicatur Cerussa, & Gypso, et Piceliquida. Hæc est temperatura a Græcis Antipathia dicta. Ferunt quidam & religione quadam id fieri.

MALUIMUS in Ferro ob colorem Rubiginem, q̄ æruginem dicere, ob eas quas non multo ante tradidimus causas. Alioquin idem uitiosus in cunctis metallis euentus est, communisq; uoce a græcis omnium metallorum læuori contraria scabries uocata est. iōv enim in cunctis metallis uocant, quod uetustate, humore, cessationeue asperitatis & mali coloris illis accreuit. Habent etiam ἰσχυρίαν qua rubiginem indicant: sed ut nos obseruauimus, in frugibus potius q̄ in metallis. Legentes illud etiā in capite hoc monemus, uidisse nos in græcis, nec negligenda si dei codicibus, in quibus nulla erat extrema eius pars illa, qua iubetur demergi aqua, uinoue cā dens igne ferrum. &c. Nos tamen ut erat seruauimus, ex quotidiano rei usu, & ex eo quod Celsus monuit lib. 4. capite, 9. inter lienosorum remedia: pro quibus ait, & post cibum aqua a ferrario fabro petitur, in qua candens ferrum subinde tinctum sit.

S De Stercore ferri. CAP. XXXV.
STERCVS ferri, quam Scoriam uocant, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex hydromelite potum opitulantur.

D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G. C O M M.

Metallorum spurciciam ueteres graeci Scoriam uocauerunt: Romani, autore Celso. lib. 7. capite. Recrementum eam dixerunt. Neq; in metallis modo, uerum in multis alijs recementi uoce usi sunt; ut primo uolumine in Crocomagmate dictu a nobis etiam est. Graeci in metallis priuatim Scoriam suam seruant.

De Plumbo eloto. C A P. LXXXVI.

Lotura Plumbi sic fit. In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & succi modo crassescat, aut coenosa reddatur. Linteolo deinde colato, aquam infundens: quo facilius quidquid est resolutum incerni possit. Hoc facito usq; dum satis habuisse uidearis. Vbi confederit, priorem aquam effundens, nouamq; adiciens, ut Cadmiam lauato, donec nulla extet nigricia. Postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi Plumbi lima quæstam, mortario lapideo, pistilloq; terunt: aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. Mox ubi crassamentum pessum ierit, colligunt in pastillos. Nam tritum uehementer, cerussæ simile redditur. Alij elimate scobi modicam plumbaginem adijciunt. Affirmantes ita elotum Plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, obstruere, mollire, explere caua. Sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrescentia. Sanguinem supprimit. Prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas ex rosaceo. Item ad ea quæ ægre cicatricem ducunt. Et in totum spodij effectus præbet. Nisi q; non obducit crustas. Integrum Plumbum affricu, marini scorpionis, draconisq; plagis auxiliatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Loturam Plumbi Plinius etiam inter latinos. 34. uolumine, cap. 15. adeo similem huic scriptori docet, ut alieni decreti potius interpretes q; sui autor uideri possit. Nisi aliqua addidisset, quibus non uariari rem, sed certius & aptius tractari aliquis credat. Quale statim est quod in eo legitur, coelestem exigi aquam: quæ in plumbeum mortarium coniicienda erit, ut plumbeo pistillo circumacta, mutuo mortarij & pistilli attritu, plumbi substantia nigrescat & crassescat. Quæ duo tantum ille dixit, non ut cæteri interpretes addiderunt, donec succi modo crassescat, aut coenosa reddatur: non animaduertentes quod a Dioscoride dicitur, unum tantum esse *ἡ χυλώδης ἢ πηλώδης*, id est, in limum crassescat: quæ uero sequuntur, *ἢ χυλώδης ἢ πηλώδης*, glossæmata & interpretationes illius fuisse, Diosc. codicibus ab aliquo adiectas, dum uult certius indicare quid *ἡ χυλώδης* sit: quæ deinde ab imperitis librarijs in Diosc. coaluerint. Idem enim omnes significant: nec Plinius ut diximus, aliud q; donec crassescat, inquit. Quale etiam non multo post quo loco hic ait. Quidam purum plumbum lima deterentes in lapideo mortario, lapideo pistillo terunt, addidit ille, Thebaico, lapideo. s. mortario: sed ex ea gente lapide, ex qua ad usum medicinæ mortaria, ut idem Plinius testatur, præcipue probabantur. Quod & si non multifaciendū forte alicui uideatur, non tamen inutile penitus nouisse fuerit. Quemadmodum maiorem diligentiam exigit, qui statim in Diosc. sequitur male sequax, nec certo sensu locus: in quo spacium, & in spacio uitij nota relicta a nobis est. Cæteri quod uerisimile erat, & rei necessitatem secuti, locum iudicio suo magis q; ex uocibus quæ illic modo legantur expleuerunt. Quod poterunt græca intelligentes uidere. Nobis non uisum est alienis nostra miscere.

De Plumbo usto. C A P. LXXXVII.

Vritur Plumbum sic. Super q; tenuissimas Plumbi laminas, fissili nouo inditas, sulphur inspargito, additisq; rursus laminis,

interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito. Flagrate autem Plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilque nonustum haerit. Tum demum obstructis naribus, eximito. Alioquin halitus Plumbi noxius sentitur. Aut elimatam scobem in olla cum sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, et circumlinentes operculum, dato exili spiramento urunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula ferrea continue mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi ustio: & si uehementius uratur, contrahit spumae argenti colorem. Magis placet nobis prima. Plumbumustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.

BARBARI COROLL.

Plumbi halitus combusti, canes ocissime interficit, sicut omnium metallorum muscas, & culices: quod breui non sunt ea tedia in metallis. Plumbum crematum, cui cerussa sit admixta pari portione, aut hordeum, Spodio cyprio a medicis praefertur. Retosum Plumbum est, quando uocetur a chymistis Helcysma. Laminis Plumbi ad lumborum renumque partes adaligatis, somnia Veneris inhiberi praedicant: quod & Caluus orator, & Franciscus Barbarus auus meus fecere. Athleras Galenus eo remedio uti solitos affirmat. Plumbum graeci Molibdon uocant. Multum aeris in Plumbo esse argumentum est, quod in statu aspicitur. Plumbum enim quod pedes earum lapidibus ferruminat, & annectit, ita plerumque intumescit, ut ex ijs lapidibus crystalli modo pendeant uerrucae. Multa Plumbi genera connumerant chymistae graeci. Marinum sordet, & asperum est, Sabyesum, & Dalmatense nitet, ac molle dicitur. In Sardiniano teneritas, & aerolitas aspicitur.

Pl. li. 34. ca. 18

EX M. VERG. COMM.

Erit opere precium certior adhuc Plumbi cocturam nouisse cupientibus, Plinium, 34. uo lumine, cap. 18. audire. Multa enim quae desiderari posse nunc uidentur, certius ab eo traduntur. Qualia sunt, cum sulphuri quod Plumbi lamellis inspergendum est, minutum adijcit: iubetque, trito sulphure ad eam rem uti: & cum, non naribus tantum oclusis Plumbi cinerem tolli, sed spiritus foraminibus: ut os etiam complecteretur, per quod respiratione poterat eadem contrahi noxa. Et cum in fornacem coniectum fictile, in quo Plumbi delinata scobs erit, tandem coqui uult, donec percoquatur figlinum. Et cum ferro misceri praecipit, praeter ferrum, feruaceis rudibus idem fieri etiam indicans. Nec minus cum cerussam, aut hordea pro sulphure inspergenda pari pondere cum plumbo sumi monet. Multaque alia eodem modo docet, quibus poterit coctura Plumbi certius tractari.

De Recremento Plumbi. CAP. LXXXVIII.

Recrementum Plumbi, quod Scoriam uocant, optimum est defumum, fractu contumax, cerussam plane representans, nihil plumbosi habens, quod ad mali colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quae plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa a qua parte, quae luteum colorem duxit. Idque saepius, dum recrementum absumatur. Dein quod subsidit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

εκκριμα μόλιβδου

EX M. VERG. COMM.

Monstrante id Celso Romani sermonis candido autore, graecorum Scoriam Recrementum diximus. Locus in eo est quinto suae medicinae libro capite, 18. cum ait. Plumbi recrementum Scoriam molibdu graeci uocant. Quid autem in metallis scoria & recrementum sit, satis non multo ante in Ferro dictum a nobis fuit. Plinius eodem quo in coctura plumbi diximus loco

Gg ij

D I O S C O R I D I S

C de Scoria, sed angustius q̄ hic agit.

¶ De Molibdoide lapide. CAP. LXXXIX.
Molibdoides lapis a plumbi similitudine dictus. Corresponden-
 tem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

BARBARI COROLL.
Lapis plumbarius, hoc est, Moliboides, differt a Molibdēna, hoc est, Plumbagine, ut statim
 constabit.

¶ De Stibio. CAP. XC.
Stimmi optimum quod splendidissimum est, modocq; nitedularum
 semicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabi-
 le, quod Stibi appellarunt, alij Platyophthalmon, alij Larbason, alij Gy-
 næcion, alij Chalcedonion. Vis eius adstringere, obstruere, refrigerare,
 excrementa in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes et
 ulcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri membrana
 profluentem. Et ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est.
 Priuatim ambusta igni, in crustas erumpere non patitur, cum adipe re-
 centi illitum. Crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cæ-
 ra & exigua cerussa. Torretur adipe circumlitum & carbonibus obru-
 tum, donec carbunculetur adeps. Exemptumq; restinguit mulieris la-
 cte, quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus suc-
 cens efflatum, quoad flagret. Si enim paulo magis concremetur, plum-
 bum fit. Lauatur ut cadmia, & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum
 eluant.

BARBARI COROLL.
Stimmi, nos Stibium, & Stibi dicimus, in argenti metallis inuenitur, spumæ lapidis candidæ
 nitentisq; non tamen translucentis. Aliqui Alabastrum uocant, Alabandum, & Alabandi-
 cum Aetius. Duo eius genera. Mas horridior, scabriorq; & minus ponderosus, minusq; radi-
 ans; & arenosior foemina, quam magis probant; niter friabilis scissurisque, non globis dehiscens;
 Platyophthalmon uocatur, quia dilatat oculos. Gynæcion, quia mulieribus obseruiat, cilia tin-
 gentibus, semiorbesq; pingentibus. Vnde scitum illud, geometriam exercere foeminas in ci-
 lio, præsertim in Hispania, Hippocrates certe Stibium significat, ut Galeno placet: aut crustas
 in eo inuentas, quæ Tetragonum in medicina nominat. Democritus Stibium nisi locis distin-
 guit, Italicum, & Chalcedonium prodendo. Quidam non adipe utuntur coquentes, sed fimo
 bubulo. Habetur & Stimmi cognomento Regis Alexandri: sed cōpositio medicamēti ea est ad
 oculos. Rhyadas, hoc est, qui delachrymationem arcere non possunt, qn̄ per maxillas defluat.

EX M. VERG. COMM.
Stibium hoc est, quod in medicinæ usum a ueteribus inuentum, corruptis moribus paula-
 tim ad formæ lenocinium concessit: cum natiuo decore non contentæ mulieres, ad fucum &
 amoris illecebras abuti eo inceperunt. Auditur pro muliebri fucō ea uox aliquando in sacris
 hebræorū literis, cum præcipitur, ne stibio depinxerit aliquis oculos suos. Quam uocem igno-
 rantes aliqui, a stoebe, quæ huic scriptori herba est, Stibium dici & fieri crediderunt: cum tamen
 in Plinio, & Celso nihil aque notum sit: tradideritq; Plinius. 33. uolumine, cap. 6. principalem il-
 li usum circa oculos esse; ideoq; Platyophthalmon uocari, quoniam eos dilatat, eorumq; fluctu-
 ones & lippitudines inhibeat. Et quoniam in cura decoris & formæ eo mulieres utebantur, γυναικῶν
 id est, muliebres etiam dici; & si adiectiuo illi potuisse quondam coniungi substantiuum
 aliquod nomen, suspicari aliquis possit: Verbi causa, fucū, pigmentumue, aut simile aliud qd-
 piam. Possunt desiderari alia etiam, quæ multa Plinius quo diximus loco longius tradit, uo-
 lentibus in eo scriptore cognoscenda.

De Molibdena, siue Plumbagine. CAP. XCI.

Molibdena optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modice splendens, cum teritur ruffa. Cocta cum oleo iocineris colorē trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, iuxta Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissime medicamentis, quæ Liparas uocant, atq; emplastris minime mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

BARBARI COROLL.

Molibdena, hoc est, Plumbago, quam & Galenam uocamus, communis est plumbi, & argenti uena. Commendantur friabiles, & modice ponderosæ. Quæ sint fossiles, metallicas appellant. Laudatissimæ quæ in Zephyrio fiant. Sunt qui Molibdenam inter spumas argenti collocent. Fossilis Molibdena est, & ad uicem Ergasteriam uocatum, inter Cyzicum, & Pergamum octo & quinquaginta millibus a Pergamo distantem. Nominatur & Molibdena, id est, Plumbago herba Plinio, contra serpentes, etiam in aruo, folio lapathi, crassa radice, hispida: quæ cō manducata, si oculis subinde religetur, Plumbum, quod est, genus uitij, ex oculis tollit.

EX M. VERG. COMM.

Galenam bis terue trigesimo tertio & quarto suæ historiæ uoluminibus græcorum, metallica Molybdenam Plinius uocauit: nō tam ut a Molybdena Plumbagineq; sui generis herba, quam, 25. eiusdem historiæ uolumine, cap. u. priuatim Plumbaginem dixerat, alia appellatio ne secerneret: quia scribente eo suam historiam, hæc erat priuatim metallicæ Plumbaginis appellatio, ab Hispaniæ Galecia, ut credimus, facta, in qua celeberrimæ quondam metallorum ferre omnium fodinæ fuerunt. Quæ quoniam nostra ætate nulla est, nec habet ea uox aliquā nūc significationis æstimationem, impune, & sine inuidia relicta a nobis fuit: præsertim in re quæ ex substantiâ sua certius indicanda erat. Plumbago ob eam causam Molybdena hæc dicta: & ne cū herba misceretur, ex metallo nota illi adiecta est. Herbam quo diximus loco Plinius manifeste Plumbaginem uocauit: causamq; addidit: quoniam si commanducata oculis subinde religet, Plumbum quod est in ea parte uitij genus, tollat. Metallum toto hoc capite Diosc. nihil simile commune cum herba habens, quæ in Plumbi nomen & honorem ex usu tantum recepta est: id autem ex plumbi substantiâ iustius Plumbaginis nomen inuenit. Gigni hanc ex auro & argento hic scriptor ait: quale autem id sit Plinius ostendit, adherescere dicens argenti & auri fornacibus. Ostendit itidem plumbi uenam esse Plumbaginem: multaq; alia, quæ nos breuitati cōsulentes, relinquimus in eo scriptore nouisse ea uolentibus exposita. Fit quod nouerunt metallici, Plumbago alterius metalli, argentiq; præsertim coctura: quodq; excretum ex his plumbosum fuerit, Plumbago ueteribus fuit. Verumtamen fossilis eadem quondam inueniebatur ad Coryci, ut nos uertimus, Sebastiam, in Asia tunc notissimam regionem: cui Corycum hic adiectum, ut a reliquis quæ diuersis regionibus Sebastię urbes & oppida tunc audiebantur, separaret. Fuit enim frequens id quondam nomen: numerabaturq; in Armenia Sebasie ciuitas, numerabatur in Iudæa, numerabantur & alijs locis aliæ: omnes in Romanorum Cæsarum gratiam sic dictæ. Quas enim Augustus Germania, & Hispania nominauerunt, eas græci Sebastas, & Sebastias dixerunt. Est enim Sebaston græcis idem quod Romanis Augustum. Intelligitq; hic scriptor κατά σιδέριαν καὶ κορυκὴν ὑπὸ κορυκίῳ, Coryci Chersonesum hoc nomine quōdam in Asia sic appellatam.

De Recremento argenti. CAP. XCII.

Recrementum argenti, quod Scoriā uocāt, aut Helcysima, aut Encauma, molibdenæ uim habet. Quare emplastris quæ phlegmas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, ut po

Gg. iij

A

Molibdena

Pli. li. 25. ca. ii.

B

το σιδέριον
καὶ κορυκίον

C te cum adstringat, extrahatq.

EX M. VERG. COMM.

Coniunctum natalibus plumbagini argenti recrementum est: ideoq. paulominus q. continuata historia a Diosc. docet. Fit enim ex argento utrumq. In scoris metallicisq. recrementis: omniū genere, solum argenti recrementum priuatim Helcysma grecis dictum est. Testatur id Plinius, 37. uolumine, cap. 6. his uerbis. Scoriam in argento greci uocant Helcysma. Testantur idem greci latiniq. omnes: nec aliunde q. ab extrahendi ui quam habet, factum illi nomen est.

De Spuma argenti.

CAP. XCIII.

201677008

Spuma argenti quædam gignitur ex harena, quam Molibditin uocant, in fornacibus conflata, donec perfecte incandescat. Altera ex argento. Tertia ex Plumbo. Probatissima est Attica. Secunda Hispaniensis. Has sequitur quæ fit Dicæarchiæ, id est, Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. Plurima enim hisce locis e flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, Chrystitis appellatur, melior cæteris. Quæ in Sicilia, Argyritis. Quæ ex argento, Calabritis, Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrementa in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur Argenti Spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium, ita accensa foliis. Abstergitur insidens spurcia, & reconditur. Aliqui quater aceto, aut uino restinguentes, iterum urunt & eadem prosequuti, reponunt. Lauat ut cadmia: ut Argyritidi nominatæ, aut si desyderet, alteri cador detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, choeniceis atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, adiectis candidi tritici quatuor sextarijs, priuatimq. pugillo hordei, linteolo raro auribus uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dehiscat. Deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur. Triticum abijcitur. Spuma argenti uehementer manibus affricando, aqua lauatur, assiccataq. in thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec dissoluatur. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperis infusa calida aqua sinitur. Mane colis excernitur. Alia infunditur, atq. ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet. Postea additis ad singulas minas Spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq. calida aqua, ter in die teritur, & addita aqua excolatur. Cumque inalbuerit, calida infunditur, dum nullam prorsus falsedinem resipiat. Demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina Spumæ Argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur. Aqua infunditur, ita ut superemineat. Mouetur quotidie mane & uesperis, aquaq. superinfunditur, priore nequaquam effusa. Hoc fit triginta diebus. Namq. nisi moueatur, crassescit usq. in duriciem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in thebaico mortario Spuma argenti teritur: coniectaq. in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsedinis indicium præbeat. Deinde quod

ex argenti Spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pixide conditur. Alij Spumam argenti in fabarum magnitudines confracatam, in uentre suillo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquescat, exemptamq; cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram unam, & Spumæ argenti tantundem in sole terant, aqua continue mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sumito quantamuis Argenti Spumam, ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ fuerint, lanaq; dealbuerit, exemptam Argenti Spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adijciens. Eadem tertio quæ supra, facito. In summa, tantisper dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortacium, ad singulas salis fossicij libras adijcito octogenas Spumæ Argenti drachmas atticæ, & terito, intermittensq; nitri q̄ albissimi cum aqua diuisi, drachmas quadraginta septem indito. Iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato. Vicissim eadem proseguere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas.

BARBARI COROLL.

Spuma argenti, hoc est, Lithargyros, distat a Scoria, quo a fœce spuma. Lithargyros, purgantissimæ materiæ uitium est, Scoria purgatæ. Tria Spumæ huius gēa nostri habent. Chrysitin: quæ fit ex ipsa uena, & est optima. Secundam Argyritin ex argento, Tertiam Molibditin, plumbi ipsius tufura, quæ fit puteolis: & plerūq; omnes hi colores, in eisdem tubulis inueniuntur. Quidam duo genera eius nouere, quæ uocant Stelerythida, & Peumenen, tertium Molibdænam: de qua diximus. Omnis autē Spuma, fit ex cocta sua materia, ex superiore catino defluens in inferiorem: eo sublata uerruculis ferreis in ipsa flamma conuoluitur uerruculo, ut sit modici ponderis. Est autē, ut ex ipso nomine intelligi potest, seruescentis, & futuræ materiæ Spuma. flet Argyrolithos a Lithargyro, ut in lapide Selenite diximus.

EX M. VERG. COMM.

Operosa græcis, ut uidetur Lithargyri sui confectio fuit: licetq; præter argentū ex plumbo etiā fieret, a meliore tamē metallo nomen seruauit. Compositaq; ex argento & lapide appellatione, ex qua præcipue fieret, substantiā græci indicauerunt, Lapidem, uenam eius metalli intelligentes: quæ conflata igne, ut in coctura omni fit, eam ueluti Spumā redderet. Latini cocturæ eius euentū, & quod ex ea fieret contemplati, eiusdem metalli seruato nomine, Spumam argenti uocauerunt. Fuitq; non Plinio tantū, sed cunctis alijs Romani sermonis primis auctoribus, in indicanda re hac propria & quotidiana ea uox. Nec dubitandum alicui est, non esse latinis argenti Spumam, quæ græcis Lithargyros est. Vnusq; satis in ostendenda re Plinius erit, qui, suæ historiæ uolumine, capite. 6. omnem Spumæ huius confectionem, discrimina, appellationes, cocturam, loturamq; & usum similiter huic docuit, Argenti Spumam semper appellans. Eritq; scriptorem eum legētib; in tota hac re non paruū operæ precium. Multa enim angustius ab hoc scriptore dicta certius audient: & ex his quæ aliter ab eo traduntur, suspicari in Dioscoride male forsitan legi aliqua poterunt.

A

B

Pli. li. 33. ca. 6.

C

Cerussa fit hoc modo. Infuso in urseum oris lati, aut fictile labellū
 q̄acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū,
 subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq̄ uelaminibus, ne
 halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq̄ deciderit, humo-
 rem purum ad summa delatum colato. Crassamentumq̄ transfundito.
 Debet quoq̄ siccare in sole, mox trusatili mola teri, alioquin tritum cri-
 brari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribran-
 dumq̄. Vicissim eadem tertio, quartoq̄ facienda. Melior quā primo
 cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum
 tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneam rudem in
 medio uase appendant, & supra cratem plumbum imponant, ita ut ace-
 tum non contingat, inditoq̄ operculo circumlinentes dimittunt. Post
 dies aliquot, laxato obturamento uisunt. Cumq̄ resoluta materia fue-
 rit, reliqua ut supra diximus exequentur. Si autem quis in pastillos uelit
 digerere, aceto acri subacta diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Ae-
 stare tamen supradictum opus obeundum est. Ita enim candida atq̄ effi-
 cax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urseis supra furnos, balnea, aut
 fornaces impositis. Ascendēs enim calor, idem quod sol præstat. Lauda-
 tissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedemone. Proximā Pu-
 reolis. Torret hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, ma-
 xime attico, tritam Cerussam imponito, & assidue uersato. Cumq̄ cinere
 um colorē traxit, eximēs refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus.
 Trita patinis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec
 similis sandarachæ fiat. Extractaq̄ ad usus ministratur. Quæ uero ita pa-
 rata est, Sandyx a quibusdam dicitur. Lauatur Cerussa cadmiæ modo.
 Vis ei adstringere, ocludere, emollire & explere. Insuper ex crescentia re-
 primere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis & emplastris quæ
 liparæ uocantur, pastillisq̄. Est autem lætalis eius potus.

Pli. li. 34. ca. 19.

B A R B A R I C O R O L L.
Cerussa, hoc est, Psmithion, colos est e candidis. Fuit & terra perse in Theodoui fundo
 Smyrnæ, ad nauium picturas ueteribus: de qua tamen in terra Melina differendum nobis est.
 Nunc omnis Cerussa ex plumbo & aceto fit. Sandyx uero ex Cerussâ, si torreatur æqua por-
 tione rubrica admixta. Quæ Virgilius herbam uidetur intellexisse uersu illo,
 Sponte sua Sandyx, pascentes uestiet agnos.
 Si Plinio, et Seruio grāmatico credamus, qui herbâ dicit esse Sandycem, ex qua Sandycinus
 color fiat. Quidam pro colore ipso acceptâ a poëta Sandycem existimant. Preciū Sandycis in
 libras asses bini, & semis, hoc est, dimidiū eius quod Sandarachæ. Paulus Sandycē, et Siricon,
 & Sericon uocari scribit. Syricon Aetius, & Plinius: hinc hodieq̄ Mauritanii Sarcon eam no-
 minant. Syricū inquit Plinius, facticius est colos, ex Sinopide ac Sandyce mixtis, quo Minif
 sublinif, adulteraturq̄. Nam Scyricū, aliud genus est, ut in Ceruleo noiauius.

E X M. V E R G. C O M M.

Dant gentibus Cerussam plumbariæ officinæ. Conficiuntq̄ eam huic scriptori eodē mo-
 do Plinius & Vitruius: alter historiæ naturalis. 34. uolumine, capite. 18. alter suæ architec-
 turae. 7. cōmentario. Laudantq̄ ambo, & cunctis alijs præferunt Rhodiam: non tamen bonita-

tis eius censum per gentes ultra faciūt. Hic diligentior, & humanæ salutis certius, & ex professo consulens, post Rhodiam Corinthiam & Lacedæmoniam, & ab his quæ Campaniæ Dicæarchia conficiebat, numerauit. Nec aliquid legentibus in Cerussæ confectione desiderandū reliquit, quæ dierum numerū, quo operculatum & circumlitū uas illud dimittendum sit. In prima si quidem confectione, donec solutū fuerit plumbum. In secunda, *ἡ μίτραν ἀφαιρούμεν*. &c. Quæ partem deficiente dierū numero, post aliquot dies, nos uertimus. Potuit quidem numerus ille huic scriptori librorum incuria perijisse. Verumtamen Viétruius etiā nullo temporis certo decreto spacio (post certū enim tempus tantū ait) quæ a Dioscoride incerta relinquuntur confirmasse uidetur: esseque tempus id, cum solutū fuerit plumbū. Plinius rem certius tractans, his uerbis rem docet. Fit & alio modo, addito in urceos aceti plumbo obturatos per decem dies. Credimusque nos, & paulominus quæ pro comperto testamur, diebus scriptoris huius adijciendum esse denarium Plinii numerum. Inconcinuus enim, & scriptore hoc indignus sermonis ductus ille est. Neque enim *ἡ μίτραν* aliud, quæ post dies, significat. Quæque a nobis, & ab alijs indefiniti numeri uox, aliquot, addita est, ad concinniorē sensum, & maiorem rei certitudinem addita est. Quemadmodum a principio capitis etiam, cum diximus (uentricoli id uasis generis est) græcorum Gastram certius indicantes, & uasis in medio tumentis formam ostendentes, qua olearii urcei nostra ætate passim uidentur. Quod Plinius intelligēs, urceos in hoc ipso ufu sæpe appellauit. Quæ deinde hic *μοδιόλην πλίνθον* imponendam uasis ori dixit, Barbarus cōmunem eius uocis æstimationem secutus, laterem plumbeum imponi iussit. Alter aptius, laminam plumbeam. Nos regulam, cetiore adhuc, ut credimus similitudine, & græcæ uocis seruata significatione. Siquidem *πλίνθον* appellatione laterem quidem plerumque, aliquando tamen omnē in ædificio necessariam figlinam, lateres scilicet, imbrices, tegulas, & si qua in hoc genere alia sunt antiquiores Græci uocauerunt: & ex tegularum similitudine hic plumbeam Plinthum dixit uasi huic superponendam esse, cuius patentius os lateris unius latitudine totū regi non poterit. Quinetiam in columnis architecti Plinthum nominauerunt, quod in earum basi spiris subiacet. Vtque in superiore capitulo Abacus, sic in inferiore basi Plinthus est, ex æquata latitudine ueluti tabula. Sunt & alia his similia in reliquo capite, quæ nobis & alijs eadem non sunt, legendum diligentia & censura relicta.

De Chrysocolla.

CAP. XCV.

CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem Porri quæ simillime reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. Quo in genere præfertur pura. Damnatur quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tusam infusa aqua, mortario ex passa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quæ confederit colato. Alteram infundens aquam, rursum terito. Hæc uicissim prosequere, donec pura, syncæraque spectetur. Dein siccato in sole, & ad usus recondito. Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra diximus. Dos Chrysocollæ ad purgandas cicatrices. Ex crescentem carnem coercet. Adstringit, purgat, exalfacit, & modice corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

BARBARI COROLL.

Chrysocolla, humor est in puteorum scrobibus, per uenā auri canaliensis defluens, crassescens limo rigoribus hybernis, usque in duriciā pumicis. Laudatiore eandem in ærarijs metallis, & proximā in argentarijs fieri compertum est. Inuenitur & in plumbarijs, utilior etiam auraria. Macedonicam Democritus æris similem ærugini describit. In omnibus autem his metallis fit, & cura multum infra naturalem illam, immixtis in uenam aquis leuiter hyeme tota, usque in Iunium mensem: dein siccatis Iunio, & Iulio: ut plane intelligatur nihil aliud Chrysocolla, quæ uena putris. Natiuam duriciā maxime distinguit. Vuam uocant: & tamen illa quoque herba quam Luteam appellant, tingitur. Natiua est, quæ lino, lanæque ad succum bibendum tundi-

A

B

Χρυσόκολλα

Pli. li. 33. ca. 33

D I O S C O R I D I S

Cur in pila: deinde tenui cribro cernit: postea molitur. Demum tenuius sic cribratū, quicquid non transmeat, repetit in pila: & iterum molitur: puluis semper in catinos digerit, ex aceto macerandus, ut omnis duricia soluat, ac rursus tundit, dein lauat in concis, siccaturque. Tum tingit Aluminis fissili & herba supradicta, pingiturque antequam pingat, nisi rapiat colorem. Addunt & Scytanum, & Turbysitum. Ita uocant medicamenta forbere cogentia. Cum tinxere pictores, Turelobitum uocant, Medici Accessin, quæ non sit tincta. Duo eius genera: pictoribus luteæ, quæ seruat in tomenta: & liquide, globulis sudore resolutis. Vtrūque in Cypro fit. Alij tribus eam generibus distinguunt. Asperam, quæ taxat in libras septem. Mediā, quæ denarij quinque. Attritam, quā & Herbaceā uocant, quæ tredecim. Luteam porro dictā putant, ab herba cognomine, a qua etiā adultera. Et em Ceruleo uiridiue sublitā, & pro Chrysocolle inducūt, uilissimi generis, fallacissimi. Creta æstimat sestertij in libras. Nouitius est & anularius, sed candidus, quo muliebres picturæ illuminant ex Creta, & ipse admixtis uitreis gemis ex uulgi annulis, unde & nomen. Chrysocollam in Hispania copiosissimā haberi narrat. Sublinunt autem arenosam, priusque inducant atramentum, & paretonio. Hæc sunt tenacia eius, & colore blanda. Paretoniū quoniam est natura pinguis, & propter leuorem tenacissimū, atramentum inspergit: ne paretonij candor pallorem Chrysocolle afferat. Strauit Chrysocolle spectaculis circi arenā princeps Nero.

E X M. V E R G. C O M M.

DVplex antiquis Chrysocolle fuit, si Plinio in latinis, in grecis uero eius generis medicis credendum est: Altera, quæ in cunctis fere metallis, laudatior tamē in ærarijs inueniret. Altera, quæ ut grecorum scriptores docent, rubro ære, & impubis pueri urina: ut autem Plinius monuit, Cypria ærugine, & eiusdem pueri urina addito nitro temperaretur. Hanc aurum operibus inducentes, agglutinando auro necessariam sibi uendicauerunt, ab hoc usu nominatā existimantibus cunctis. Siquidem nihil Chrysocolle uox aliud, quæ auri glutinum indicat. Metallicam cōtra illam medicam sibi seruauit. Naturalem, per uenas auri defluentem, crasse centesimo hybernus frigoris usque in duriciem pumicis, de qua tantum hoc capite agitur: indeque factio nomine. Quamuis ut antiquiores omnes testant, laudatior in ærarijs metallis fluere: proximamque illi in argentarijs: postrema autem in plumbarijs, quæ auraria priore illa uilior etiā esset: & nihilominus nomen illi ex auro factum est: ob præcuius bonitatesque alias, deferentibus auro hunc etiā, ut credimus, honorem gentibus. Nihil metallicam Chrysocollam peritiores aliud esse tradiderunt, quæ humorem per puteos metallorum defluentem, qui frigore, ut præmonstratum est, in pumicis duriciem duret. Nec minus cura etiā fiat, sed multo infra naturalem illū, immixtis per metallorum uenas aquis leuiter tota hyeme usque in Iunij mensē: dein eo tempore siccatis, ut plane intelligatur, putrem metalli uenā esse Chrysocollā, colore uiridi: ob quā causam hic primū laudauit, τὴν χρυσὴν κατακόρυον πρασίον, quod redditum a nobis est, usque ad satietatem uiuent. Satiatē intelligētibz, quod ab undet, & ex copia factio fastidio minus placeat. Nec ultra id quicquid adiecit, totidē huic scriptori uerbis rem ostendentes. Cæteri interpretes quæ ab eo non dicunt, plerumque addiderunt. Alter ad Porri colorem contracta re, ratus πρασίον uerbum, quoniam grecis πράσον Porri sit, eius oleis colorem tantum indicare: cum tamen omnem uiridinem eo uerbo greci indicent: hoc uno ut cætera omittamus, indicio, quod πρασία in hortis uocat ea gens, cōfita oleribus, ideoque uiuentes areas. Alter ex Plinio longius, quæ oportebat rem describit: qui, 33. uolumine, capite, 5. Chrysocolle huius bonitatem indicans, ait. Summa cōmendationis est, ut colorem herbarum segetis letæ uiuentis, quæ simillime reddat. Quæ tota, τοῦ κατακόρυου πρασίον in scriptore hoc summa est. Potuit ille sui auctor, non alieni operis interpres, quā magis placuit ratione, quod scribebat docere. Interpretem contra auctoris sui uestigijs inherere oportuit: ne frustra cogere aliquando herbā, & uiuentes letas segetes, quæ nullæ in scriptore hoc sunt, alijs querere. Hæc est Chrysocolle illa, quā Romanæ historiæ scriptores, stratum a Nerone circum maximum dixerunt, quā die concolori panis no aurigaturus esset. Bonitatis Chrysocolle censum per nationes aliter Plinius, quo diximus loco tradidit. Reliquit enim Cypriam: & pro eā largissimā in Hispania inueniri ait. Vitruius septimo suæ architecturæ libro, pingendis parietibus, forte utiliore solā Macedonicā laudauit. Verba eius sunt. Chrysocolle apportatur a Macedonia. Foditur autē ex his locis, qui sunt proximi ærarijs metallis. Quotidianus & multus fuit quondā in pingendis tridinijs, cubiculis, & porticibus Chrysocolle usus: quoniam sylvarum, & uiuentis agri modo oculis color eius bladiet: quemadmodum nunc etiā, sed alio colore, uiridi scilicet creta, passim fieri uidemus. Quod superest, unū adhuc monebimus: contra aliorum æditiones a nobis redditum, quo loco scilicet hic ait, habere Chrysocollā δύναιμι σηκτικόν, ut fere in cunctis legitur, δύναιμι, quæ uox cicatricū, significat. Ideoque ab illis, Valer cicatrices exterere, et ad purgandas cicatrices, locus red-

ditus est. A nobis aut, ad extergenda ulcera, cōtracta res fuit. Habuimusq; in ea diuersitate autēctores, ueterū primo & meliori: codicū fidem: in qbus ὑλκωρ, id est, ulcerū, non ὀυλκωρ, id est, cicatricū legitur. Mox Paulū Aeginetam, s. suae medicinae libro testatū, ὑλκωρην κακοὸν ὄντων ἀρμόδιον, id est, doloſis et maleficis ulceribus accommodatam esse. Et si recipiendū sit, quod quadamtenus simile fuerit, Pliniū etiam qui eodem loco ait, Vſus Chryſocollae, & in medicina est ad purganda uulnera, non adeo diſſimili ulcerum & uulnerum natura euentuq;: ut non poſſit hoc etiam ueluti teſte, quod dicimus confirmari. Adhiciemus praeterea, ne ſuſpicionem noſtras etiam relinquamus: non penitus ab re forſitan fore cicatrices legi, non tamen ſimpliciter, ſed oculorum. Quoniam idem eodem loco Plinius dixerit, Miſcetur & collyrijs ad oculos: cicatrices. Quod ſi recipiendum ſit, perſiſſe oculorum uocem eo loco conſtituendum erit. Verumtamen nullibi in graecis inuentis oculorum cicatricibus aliquibus, & in probatoris fidei inuentis ulceribus, accedente Pauli teſtimonio, in ancipiti illud elegimus.

De Armenio lapide.

CAP. XCVI.

ARMENIUS lapis praefertur laevis, colore ceruleo, perq; aquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quae Chryſocolla praestat, ſed inefficacius. Quinetiam uſum habet ad pilos in palpebris alendos.

BARBARI COROLL.

Armeniu, ſive lapis Armenius, & Armeniacus, inter colores floridos uocatos deponitur. Sunt aut Colores floridi, q; dominus ſingenti pſtat, Miniū, Cinnabaris, Chryſocolla, Indiū, Purpuriſſum. Ideo em q; precioli ſunt, legibus excipitur, ut a domino, non a redēptore repraeſentent. Ceteri auſteri nominant. Armenia hūc mittit. Lapis eſt Chryſocollae modo infectus: optimuq; eſt quod maxime uſret, cōmunicato colore cum Ceruleo, in libras tricenſis quondā nūmis. Nunc inuenta per Hispaniā arena, quae ſimilem curā recipiat, ad denarios ſenſus uilitas redit. Diſtat a Ceruleo candore modico, qui teneriorē Armenio colorem efficit. Diſfert ſine dubio ab Armenio, ea gleba quā Bolon armeniam uocamus, dicendam inter Cretas.

EX M. D. V. E. R. G. C. O. M. M.

Mittebat quondā Armenia ſui nominis lapidem hūc. Chryſocollae modo is infectus erat, colore maxime uiridi, ſed cum Ceruleo cōmunicato. Idq; eſt qd hic ait, ἡ δὲ χρῶμα κυανὸν ὁμαλόν. Vertimusq; nos, in quo ceruleus color aliquis eſt, & aequaliter cōmunicato ſibi eo colore ſplendet. Meminit Armenij Viſtruius etiam libro ſeptimo, ſed ut doceret tantū, quem in architectura, & pingendis parietibus uſum quondam habuerit.

De Ceruleo.

CAP. XCVII.

CAerulei origo ex aerarijs metallis in Cipro. Copioſius ex harena littorali, ſecundum quosdam ſub cauatos ſpecus maris inuenitur, quod magis probatur. Eligi debet merum. Vritur ut Chalcitis. Lauatur ut Cadmia. Vim habet reprimentem, & modice erodentem. Cruſtas gignit, & exulcerat.

BARBARI COROLL.

Ceruleum, ſive lapis Ceruleus, hoc eſt, Cyaneus a Theophrasto, Galenoq; Cyanos mafculino & foeminino genere pronunciai. In argenti & auri metallis ſit, ſicut & Sil: de quo prius ut agatur, cōmodius eſt. Color Sil, ut Ochrae luteus: qui tamē cremato Silis marmoroſo, acetoq; reſtincto, abit in purpureum: quod nos experti ſumus, & teſtantur Viſtruius, atq; Plinius. Optimū Sil, quod Atticu uocatur. Preciū in pondo libræ. 22. Proximū Marmoroſum, quod tantū utuntur ad abacos: quoniam marmor in eo reſiſtit amaritudini calcis: Hoc ſubdimidio Attici precio eſt. Tertium genus eſt preſſum: quod alij Scyricum uocant, ex inſula Scyro. Iam quidem & ex Achaia, quo utunt ad picturę umbras. Cuius preciū ſextertij bini, uel octoni. At quod uocatur Lucidu, uenit e Gallia, precio Scyrici dupondij detractis, quo & Attico utuntur ad lumina. Effoditur & ad uigeſimū ab urbe lapidem in montibus: quod quidem crematū adulterū eſt preſſi. Deprenditur amaritudine, & quoniam reſolutū eſt in puluerem. At Ceruleum non limus, ſed lapis, & harena eſt. Huius genera tria ueteribus fuerunt. Aegyptiu, quod ad ſyncera, meracaq; lomenta maxime probaretur, Scythicum, ad diluſiora: & enim hoc di-

A

ἡρμηνίου λίθος

Pli. li. 37. ca. 6.

B

κυανός

Pli. li. 37. ca. 17.

Cui facile. Cumq; teritur, in quatuor colores mutatur, candidiorem, nigriorem, crassiorem, tenuiorem. Quod hoc Ceruleo in commune Theophrastus, non Scythico solum tribuit. Tertium quod & præferebat Scythico, Cyprium. Adulteratur autem Aegyptium, ut idem Theophrastus ait, quodam genere, idq; in gloria regis Aegyptij adscribit, qui primus tinxit. Alio loco Plinius hæc tria Cerulei, siue Cyanei fastigia, Aegyptiū, Scythicum, et Cypriū, inter gemmas, nescio q; recte collocauit, ut in castigatione Pliniana indicauimus. Etenim scire oportet, Cyanon etiam gemmā esse proximam, & germanā laspidi. Ea uero, de qua hic agitur, metallicā & arrosam esse. Ea res peperit errorem scribentibus, ut utriq; genus pro uno ceu obliiti confunderent. Accellit his Puteolanū, & Hispaniense, harena similiter ibi coapta confici. Viſtrutiū Ceruleū ait fieri, harena cum nitri flore in farina cōtrita, & æris Cyprij scobe admixta factis orbiculis: qui siccati urceo siccili condunt in fornace, ut confudent, atq; ita Ceruleū colorem præferūt. Tingitur aut omne Ceruleū, & in sua coquit herba, bibitiq; succi. Reliqua curatio eadem, quæ Chryſocollæ. Ex Ceruleo fit quod uocatur Lomentū. Perficitur id lauando, terendoue. Et hoc est Ceruleo candidius. Precia eius. 25. in libras. Cerulei. 18. Vius in Creta, calcis impatiens. Nouissi me superuenit Nestorianū, ab auctore Puteolis id curante. Fit ex Aegyptij leuissima parte. Preciū. 40. in libras. Idem & Puteolani usus, præterq; ad fenestras. Vocant Cyllon. Est & subtilissi mū genus Lomēti, quinis alibus taxatū, qd Attici uocant, hoc est, ut puto λείωμα. Quod Lomentū ipsū a Theophrasto λείωμα dici uideo. Cerulei synceri experimentū, in carbone ut flaret. Fraudat uiola arida decocta in aqua, succoq; per lintheū expresso in cretā erethriam. Sile primi instituere pingere Polygnōtus & Mycon Attico dūtaxat. Hoc secuta ætas ad lumina est usa. Ad umbras aut Scythico, & Lydio. Lydiū Sardis emebat: qd nūc, ut ait Plinius, obmutuit. Difficillime terit Sil. Ab hoc, ut arbitrant aliqui, Silatū uinū: quod & Sil uocat, & Silaceus color. Sil & Aufonius poeta nominat, latiaris, an peregrina sit uox addubicans. De uino Sil, Cornelius mentionē habet. Silatū porro & lentaculū, & prandiculū dicebant: quoniam ieiunis & ante prandiū uinum bibere meracū moris esset. Auctor Festus. Ob id Græci Dianestimon, & Acrastima id appellabant. Sunt qui a Sefeli, quod Tordilon & Sile dicitur, Silatū uinum deriuent. Sed auctorem nec ij ullum habent. Erat autem lentaculum, ut Athenæus tradit, buccæ ex uino: quod genus barbari, a uino & pane Vippam uocant.

D E X M O V E R G. C O M M.
Colorum duplex quondam, quemadmodum & nostra ætate, ratio fuit. Nascuntur enim aliqui, & exigua aut nulla hominis opera ad temperaturam indigent. Finguntur contra aliqui, & sine hominis opera nulli sunt. Nascuntur Ochra, Minium, Chryſocolla, & pleriq; alij. Fingebantur autem quondam atramentum, ærugo, hyalos, pluresq; alij, quibus similes nostræ ætatis pictura, nunc etiam multos alios fingit. Facileq; erit uolentibus antiquorum in his temperaturas, confectionesq; omnes a Plinio & Viſtrutio audire. Ceruleum in utroq; genere quondam fuit. Nascebatur enim & fingebatur. Illud in metallorum fodinis, præsertimq; æris: in quo genere Cyprium hic ceteris anteponit. Hoc littorali harena, nitro, æreque, ut ignis excoctis eisdem in pictura habebat usus. Fuitq; ut fere omnium in natura rerum fortuna est, multiplex Cerulei bonitas, ex nationibus confectionisq; temperatura ab antiquioribus obseruata. Quæ omnia a duobus illis scriptoribus certius docent: ab altero naturalis historie. 33. uolumine, cap. 13. ab altero. 5. suæ architecturæ cōmentario. Quæ potuissent, debuissentq; a nobis repeti hoc loco, nisi iisdē uerbis cuncta illa in Corollario suo Barbārus collegisset. Nec coſecius nostra hæc legentes hortamur, historie pigmentorumq; disciplinæ huius magistros si bi antiquos scriptores illos potius fecisse. Intelligent enim certius, quid nam in Ceruleo hic dixerit. Nasci in Cypro, in æarijs fodinis, & ex littorali harena copiosissimum fieri Ceruleum; quod in toto hoc capite præcipuum est.

I N D I C I. **De Indico.** CAP. XCVIII.
Indici duo genera. Vnum sua sponte nascitur, tanquā spuma germi natione, Indici harundinibus exiens. Alterum insectoriæ dant officinæ. Est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimū existimatur, quod Cerulei speciem præbet, succolum, & læue. Inter medicamenta est quæ uelociter adstringunt, & inflammations, tumoresq; rumpunt. Purgat & reprimat ulcera.

B A R B A R I C O R O L L.

Indicum Ceruleo proximum est, ex India nō pridem, ut Plinius inquit, apportari coeptum: cuius precium in libras. 17. alibi denarios uiginti reddit, inexploratē sibi hoc inuentionis fuisse tradens, & inter Cerulei genera constituens. Ratio in pictura, ad incisuras, hoc est, umbras diuidendas ab lumine. Quod ex India inquit uelitur, harundinū spuma est, adhærescente limo, cum teritur nigrū. Ac in diluendo mixturā purpuræ, Ceruleiq; mirabilē præsentat. Alterū spuma est purpure. Adulcerant uero Indicum, sterora columbina, uel cretā selinusiam, uel anulariam uitro inscipientes, ut Vitruius ac Plinius testatur. Probaturn carbōne. Reddit em̄ sincerū flammā, excellentis purpuræ, & dū fumar, sapit mare: ob id quidā ex scopulis id colligi putat.

E X M. V E R G. C O M M.

VNum tantum Indici genus ostendi nūc potest: neq; antiquum forte illud quod ab Indis in quibus nascitur nomen sibi fecit. Alterum ex quo desit tingi purpura, nullum inter gentes est. Nouerunt nunc omnes Indicum, quem nostra ætas habet, eamq; ob causam in uulgari re nihil ultra nobis laborandum.

De Ochra.

CAP. XCIX.

Ochram leuissimam, & uehementer luteam eligere oportet, meram, & aliena materiā uacantem, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare, Excreſcentia in carne reprimat. Caua cum cærato explet. Et articulorum toſos comminuit.

B A R B A R I C O R O L L.

Ochram, Luba tradit in insula rubri maris Topazono gigni. Sed inde non peruehitur ad nos, inquit Plinius. Ochram si quis interpretari cupiat, Luteam aptissime conuerterit. Nisi Lutea ut herbæ & Chrysocolle genus esset. Exoleuit inquit Attica Ochra Vitruius, Inueniebatur autem tum multis locis etiam in Italia.

E X M. V E R G. C O M M.

Apallore nomen Ochre antiquitas fecit. Terra ea est quæ quondā in Attica laudatissima fodiebatur. Vtq; illi precium & honor in pictura maximus fuit, sic nostræ & uulgari multiplex & sine honore aliquo usus est. Quos habuit & habet in medicina usus hic docuit: quos autem in pictura, pictores iam pridem quotidiana tractatione nouerunt.

De Cinnabari.

CAP. C.

Hallucinantur qui Cinnabarin Minio eandem esse existimant. Minium em̄ in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ harenæ permisto, temperari solet. Alioqui non dignoscitur. Fornacibus autē in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur. In metallis uero strangulantem halitū eructat. Itaq; facies incolæ uescicis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium ærem attrahant. Ea pictores ad sumptuosa parietū honestamenta utuntur. Cinnabaris, quæ ex Aphrica deferret, magno constat. Hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciat. Densum, nec dilutum colorem reddit. Quare quidā Sanguinē esse draconis existimauerunt. Vim habet Cinnabaris Hæmatitæ lapillo eandē, uerum efficaciorē. Conuenit ad oculorum mendicamenta. Magis em̄ adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus cærato excepta medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cinnabari ueteres uſi sunt ad monochromata, hoc est, ad ea quæ coloribus singulis pingebantur. Adulteratur sorbis tritis, aut caprino sanguine. Preciū sinceræ nummi quinquaginta.

Hh

A

w x p

Pli. li. 35. ca. 6.

B

w d c a p i

Pli. li. 33. ca. 17.

D I O S C O R I D S

C Est autem Cinnabari, siue Cinnabaris, uera sanies draconis elisi, elephantorum in pugna commorientium, pondere permixto utriusque animalis cruore. Nec alius est color qui in picturis proprie sanguinem referre possit. Pinxerunt & ephesio Minio: ubi primum id repertum est, autore Theophrasto, ac Vitruiuo. Vtrumque omisum est, inquit Plinius: quia nimis acre existimabatur. Tum quia curatio magni operis erat, ideoque transiere ad Rubricam, & Sinopide. Minium sane inter pigmenta magnae autoritatis fuit: quando & Iouis ipsius simulachri faciem, festis diebus miniandam censores locabant. Triumphantium quoque corpora, Minio lini solita leguntur. Ideo & in unguenta triumphalis coenae addebatur. In Aethiopia & totos tingi proceres, & Deos, hoc colore moris fuit. Inuentum Theophrastus tradit, hanc multo ante se a Callia atheniense, initio sperante, aurum posse excoqui harena rubente in metallis argenti. Reperiebatur tamen inquit, iam tum in Hiberia (malo enim ita quae in Hispania conuertere, ut in castigatione Pliniana diximus) sed durum & harenosum. Item apud Colchos in rupe inaccessa, decutiendum sagittis. Sed id esse adulterum. Optimum autem supra Ephesum, in Clibanis agris Iliba Minium ferri possit nasci, & in Carmania & Aethiopia Harenam illam Ephesi, quam diximus Cocci colorem habuisse, praedicant. Hanc teri solitam: dein lauari, & quod subsidat, iterum lauari. Differentiam artis esse: qua alij Minium faciunt prima lotura, apud alios dilutius id esse: proptereaque Plysina dici: sequentis autem loturae optimum. Minij uenae Romae ex Hispania signatae perferebantur, ad dena milia fere pondo annua. Romaeque lauabantur, statuto lege precio, septuaginta in libras, officinis eius, inter aedem Florae & Quirini positae. Atque hoc uerum erat Minium. Quod uero Dioscorides commemorat, adulterinum ac deterius. Namque est alterum genus, in omnibus fere argentarijs, & plumbarijs metallis, quod sit exusto lapide uenis permixto. Non ex illo, cuius uomicam liquoris aeterni Argentum uiuum nominant, sed alijs simul repertis, qui stiles etiam sunt plumbi: nedum argenti. Tales cremati tunduntur in farinam: & hoc est secundarium Minium, per quod paucis notum, multum infra naturale illud sabulum. Hoc ergo adulteratur Minium in officinis: unde praeda societati. Item Syrico. Sublimi autem Syrico Minium, compendij ratio monstrauit, & alio modo furis opportunum erat: pictoribus plenos subinde penicillos abluentibus. Sidit enim in aqua Minium, constatque furantibus. Sincero Cocci nitore. Secundarij autem splendor in parietibus sentire debet imaginem: quantique hoc rubigo quaedam metalli est. Si saponensibus autem miniarijs in Betica, unde ad nos nec aliud fere inuehebatur, siue uenae. Harena excoquitur, sine argentoque eae, contra quam alijs regionibus. Idque celebritimum auri modo probatur ferro, & melius auro candente: fucatum quod est, nigrescit. Sincrum retinet miniacum colorem. Inuenio & calce adulterari. Solis atque Lunae contactus inimicus. Vnde dicatur ab hac iniuria, si parietis siccato, cera punica cum oleo liquefacta candens, setis inducatur. Iterumque admotis gallae carbonibus, aduratur ad carbonem usque, postea candelis subigatur: ac deinde linteis puris, quo modo & signa nuda marmorea nitescunt: quae Loricatio graece appellatur Conasias. Autor Vitruius, Minium in uoluminum quoque scriptura usurpasse, clarioreque literas, uel in auro, uel in marmore etiam in sepulchris facit. In uenena esse Minium nemo dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redidit Plinius contra quod hic testatur, sanies draconis elisi elephantorum morientium pondere, permixto utriusque animalis sanguine Cinnabarim esse. Nec solus credidisse id uidetur: cum hic plures idem sibi etiam persuasisse testetur. Quod ex grauiore Cinnabaris precio factum fuisse uerisimile est, dum nouitate & miraculo aliquo mercium suarum precia augere mercatores conantur. Verum tamen arguendo tam impudenti eorum mendacio satis unus hic scriptor sit, qui totius naturae peritissimus, qualis uera Cinnabaris sit, optime cognouisset, & salutis humanae consulens, non id tantum monuerit, sed falso etiam existimari Minio eandem Cinnabarim esse. In quo decaptos quondam fuisse, & decipi adhuc posse homines non adeo difficile fuit & erit. Rubent enim ambo, & in pictura eundem tunc habebant usum. Discrepant tamen, ut hic docet, nationibus: quae altera ex Libya, alterum ex Hispania quondam afferebatur: & illa in medicinae usum, hoc inter uenena, aut ueneni saltem maleficium habentia receptum fuerat. Vtri usque seruantur nostra aetate nomina. Habetque gens nostra quo passim utitur, uerbum miniare, a Minij colore factum: quo pingi, uariarique libros, & librorum titulos eo colore dicat. Habent Cinnabaris nomen omnes in nostro orbe fere gentes: quo non rem, sed colorem illum indicet. Qui enim nunc ruber color eum habet usum, ex argento uiuo conficitur: quemadmodum ex Minio argentum uiuum. Quod totum nouerunt qui haec tractant: ideoque a nobis aliud agentibus relinquenda huiusmodi sunt. Satis enim legentibus erit, ex scriptore hoc didicisse, quale utrumque fuerit, & qua ratione inter se differant: tamque nunc ueram Cinnabarim uidisse homini

difficile esse, quod quondam Minium facile erat: cuius quotidianus usus & tractatio Romæ quondam fuit, ex Hispania per redemptores eius metalli, ut illic curaretur, allati. Relictum in Cinnabaris & Minij huius historia non procul a principio spacium a nobis est, utiq; nota signatus locus: quoniam male sequax uerborum & rei ductus illic esset: exigeretq; sibi aliquid, quod ad discerendam a Minio Cinnabarim antea dictum pertineret: a quo statim hic inferret, aliter non posse cognosci. Siquis aut totam Minij confectionem, temperaturam, uitia, bonitates, & usum audire optauerit, Plinium & Vitruium auctores habebit: quorum alter. 33. suæ historiæ uolumine, capite. 17. alter suæ architecturæ cōmentario. 7. longius omnia illa profecuti sunt.

De Argento uiuo.

CAP. CI.

Argentum uiuum fit ex Minio, quod abusiue Cinnabaris dicitur. Patinis fictilibus, imposita ferrea concha Cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succedunt. Si quidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in Argentum uiuum cōit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concreuit. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis. Siquidem aliam materiā omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciosam habet. Suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino. Auri limata scobs, id est, ramentum tenuissimum epotum, mirabili est auxilio.

BARBRAI COROLL.

Hydargyros, siue Hydrargyron, ex Minio fit tantum secundario. Apospematismū Draconis non desunt qui uocent in arte chymica Hydrargyrum: ut fel Draconis Hydrargyrum, quod e stanno fit, & quod ex auro Disci solis. Fit & ex marmore, ut Vitruius refert Argentum: id uiuum nominat. Sudor calici deterfus in confectione Hydrargyri liquorem aquæ habet, argenteo colore: unde nomen Hydrargyro. Idem guttis facile diuiditur, & lubrico humore confluit. Hydrargyro quemadmodum & Argento uiuo argentum inauratur solum, nunc prope. Cum & in æra simili modo aurum duci legitimum quondam fuerit. Sed alia ratio inuenta est e uilliori materia, ut paulo post dicemus. Quæ aut hic de noxa Hydrargyri a Dioscoride scribuntur, Plinius Argento uiuo tribuit. Credo Hydrargyri genus haberi duplex. Factitium, quod proprie Hydrargyron dicatur: & Metallicum, cui sit Argenti uiui nuncupatio dicata. Est aut Argentum uiuum, argentei liquoris uomica: qui in lapide in uenis Argenti reperto, inuenitur: qui & ipse in Argentum excoquitur, & Achrosyalon priuatim uocatur a Chymistis. Quamq; & pro Scitherite lapide Aphrosyalos ab ijs accipitur. Venenū rebus omnibus est Argentum uiuum. Omnia ei innatant, præter aurum. Id uinum ad se trahit mere: ideo & optime purgat, ceteras eius sosdes expuens crebro iactatu fictilibus in uasis. Ita uitij eius abiectis, ut & ipsum ab auro discedat, in pelles subactas effunditur, perq; eas sudoris uice defluens, purum relinquit Aurum. Ergo & hoc cum æra inaurantur, sublitum bratteis, pertinacissime retinet: uerum pallore detegit simplices earum, aut prætenues: qua propter id furtum quærentes, oui liquore candido usum eum adulterant: mox & Hydrargyro. Inaurandum uero æs cruciatur ignibus, accensumq; restinguitur sale, aceto, alumine: postea exarenatur, an satis recoctum sit splendore deprédente. Iterumq; exhalatur igni: ut edomitū, mixtis pumice, alumine, Argento uiuo inductas bratteas accipiat. Argentum uiuum non large inueniri solitum affirmant. Candidum id, & sugaci corpore, nec usq; consistens. Omne tamē corpus fusile recipiens atq; in se contrahens. Qui Metallicas species adulterant, & Chymistæ a fundendo appellantur, siue a succis quos herbarū maxime conquirunt, immutant rebus nomina: siue ut alijs maligne occultent, in quibus ipsi hallucinantur: siue ut præstigias suas uelut quædam mysteria uenerabiliores faciant. Argentum uiuum Hermem, hoc est, Mercurium appellant. Sed aliter quam Græci Aurum Solem, Argentum Lunam, & alia fere ad hunc modum omnia. Multos huc

Hh ij

A

Apoergys

B

Plin. li. 37. ca. 6.
& 8.

*

D I O S C O R I D I S

C Auaricia sola compulit frustra, nondum inuento, qui non oleum et impensam perdiderit: ut de
 is iure dici possit quod Demetrius Phalereus in eos cauillatus est, qui aurum per cauernas scrui-
 rantur, & in eā spē patrimonia sua cōferunt & absumunt. *ἃ μὲν ἰμῶν δὲν ἰατρῶν, ἃ δ' ἰσχυρὸν ἀνέκα-
 λον.* hoc est, quę capere debuerant, non ceperunt: quę possidebant, amiserunt, ut Athenæus, et
 ante ipsum Strabo meminit. Argentum eos uiuū p̄cipue torquer, indignantes tam proximam
 argenti probi spem elabi manibus, nec spissari, aut inhiberi motum eius ullo fere modo posse.
 Argentū qdem iam tingitur tam simili colore auri, ut nec maculo, nec coticula, nec ponderē,
 nec alio q̄ lateris & ignium argumento deprehendatur. Quę probatio Cōmentitia & Cupel-
 laria uocari solet: qm̄ cōmētū illud laterculis, hoc est, in cuppa uratur. Malū hoc iam late patet:
 nec Auaricia solū, aut Luxuria censenda, sed puerilis quēdā uanitas, & ostensatio diuitiarū: ludi-
 cra, totis abacis ex hoc adulterio, uel principū epulās ornantibus. Hinc passim moneta falsa cu-
 ditur, præsertim Veneta: maiore furto, qā nullum sit aurū, uel argentū Veneto sincerius. Præ-
 fertur omnibus numis orbe toto Venetus. Huic crimini, Decemuiralis potestas, non aliter q̄
 aut lesa maiestatis, aut uiolatæ religionis obiecta est. Nihil fere tñ, aut graues pœnæ fontibus
 constitutæ, aut imensa premia deferentibus propolita iuuere. Non erat prius cautum, ne cui li-
 ceret metalla cruciare. Monetarios tantum leges oderant, Chymistas esse patiebant. Hoc ipso
 anno quo hæc prodimus, Chymistas quoq; ipsos capitales fecere: simul ut occasionem sceleris
 adimerent: simul, ne quis ætatem suam tereret in follibus & ustrinis et capunculis futilibus, quę
 iam conuicio desidiæ Choridiola, siue Scoridiola græce nominantur.

EX M. V E R G. C O M M.

S Tare loco nescit, micat, tremicq; & suo pondere hac & illac facile fertur Argentum uiuū.
 Vnāq; hanc rationem in eo contemplati ueteres Romani, insensibili alioquin rei, uitæ sensum
 Argento huic tribuerunt, uiuū uocantes. Græci ediuerso non morum, sed fluidum & aquo-
 sum eius habitum admirati, Hydrargyron, quasi aquosum argentum nominauerunt. Omnes
 tñ cōmuni consensu in Argenti censu id constituerunt: uel q̄ candore suo simile argento sit: uel
 quod magis uerisimile est, quoniam in argentarijs metallis cū argento inuenitur: uel q̄ priua-
 tim & per se similem argento uenam & uomicam habet. Fuit enim hoc primum Argentum ui-
 uum in metallis natum, & a natura gentibus datum. Quo deficiente, ut fuit semper urgente ne-
 cessitate aliqua ingeniosa humana gens, fingi cœptum est, et ex alijs metallis artificiose cōfectū.
 In quodidianos uitæ usus pro illo concessit. Quo magis miret aliquis scriptorem hunc, a ficti-
 tio historiam Argenti uiui incepisse, quam Plinius a naturali. 33. uolumine, cap. 6. auspiciatus
 fuerit his uerbis. Est & lapis in his uenis, cuius uomica liquoris æterni Argenti uiuū appellat.
 &c. Et cum longius de eo egisset, fictitium ex Minio eiusdē uoluminis, cap. 8. docuerit, hic tñ ar-
 tem naturæ anteposuit: nec scimus, an bonitatem, efficacioresq; in fictitio q̄ in natuo uires hac
 ratioe mōstrare uoluerit: habereq; in artibus & medicina fictitiū aptiorē natui uisum. Duplex
 ex his quæ p̄monstrata sunt Plinio Argenti uiui genus est, huic uero triplex. Fictitiū ex Minio,
 quod in fossura argēti inuenit. Et quod per se metallum est, perpetua liquoris uomica a Plinio
 fluere dictū. Est præter hæc quartū etiā genus, eodē fere quo ex Minio modo ex marmoris fra-
 gmētis & assulis quæ marmorarij diūciūt, factum. Docet id a Vīctruuio quo paulo ante dixi-
 mus loco. Quæ conficiendi id ratio quoniam multiplex est, & longa rerum serie tractatur a no-
 bis, legenda in eo scriptore uolentibus relinquatur.

μῆλτος σινυπικῆς

De Rubrica, seu Minio sinopico. CAP. CII.
M inium sinopicum maxime probatur graue, densum, ad iocine
 ris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, in resoluti-
 one succosum. Effoditur in Cappadocia spelūcis quibusdam, expurga-
 tumq; defertur in Sinopen urbem, in qua uenditur. Vnde cognomen
 tum accepit. Vim habet exicatoriam, quasi inducendo obstruentem,
 & adstrictoriam. Quapropter uulnerarijs emplastris, & pastillis exiccā-
 tibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumptum,
 aut clystere infusum. Datur iocineris uitio laborantibus.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 33. ca. 7.

R ubrica Sinopis, quam Celsus Minium Sinopicum appellat, inuenta primum in Ponto

dicif. Nafcitur Rubrica & in Aegypto, & Balearibus, & Africa: fed optima in Lemno & Capadocia: ut in mentionibus duabus proximis indicabitur. Species Sinopidis, aut Sinopicae tres. Rubra. Et minus tubens. Et inter has media. quæ præfertur omnibus: quia minus adule- retur, ob id & Autarcen uocari Theophrastus eam prodidit. Preciū optimæ in libras. 12. dena- rij. Vfus ad penicillū, aut si lignū colorate libeat. quæ plus rubet, utilior est abacis. Idem preciū eius, quæ Preffior uocat, & est maxime fusca. Vfus eius ad bases abacorū. In medicina quoq; blandus emplastris & malagmatis, quæ dicunt Phæa. Troianis etiā temporibus, Rubrica hoc est, Miltos in honore fuit, Homero teste: qui naues Miltoparias cōmendandi gratia uocauit. Alioq; rarus in picturis. Rubrica & in ferrarijs metallis nascitur, picturis apta. Fit & ex Ochra, ut dicemus. Quid sit apud Columellā in apum cura lutum punicum, nisi sit Rubrica, non fa- tis uideo. Legitur sane Rubricam ex Africa uenire, quā Cicerculum uocabant, cuius precium octoni asses, Legitur & Lutum uenetū abluendis maculis quæsitum: de quo & Martialis poeta meminit. Nisi quis hanc intelligat, quam dixi Preffioem uocari, & maxime fuscā esse.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod in Sinopide Rubrica maxime optauerit nouisse aliquis, eadem ipsa est: ut optima, & quæ ueteribus cognita tam multis remedijs medicinam instruxit, uti ætate hac no- straliceret. Cætera enim quæ de ea a Diosco. docentur, in hoc ipso, & in Plinio satis per se pa- tent. Eamq; ob causam relictis omnibus alijs, illud tantum monebimus: ob coloris similitudi- nem, & hanc, & Fabrilē, & Lemniā Rubricā Minium sepe appellasse ueteres aliquos: non tamen simpliciter, sed adiecto semper gentis, aut usus cognomine aliquo: uerbi causa, Si- nopicum Lemnium, & Fabrilē, Minium nominantes. Sic Celsus aliquando, sic plures alijs usi sunt. Cætera quæ de omni Rubrica dici poterant, ab alijs ex antiquis scriptoribus collecta, si- ne legentium desyderio a nobis relinquuntur.

De Rubrica fabrili. CAP. CIII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegy- ptia, & Carthaginensis. lapidū expers, friabilis. Gignitur in lbe- ria quæ ad occidentē spectat, Ochra exusta, & degenerante in Rubricā.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica fabrilis, hoc est, Miltos tectonice, utilissima fabris est: quæ in Aegypto nascitur & Africana: quoniam maxime sorbetur. Hæc & in Lemno fit, diuerso genere ab ea quæ Sphra- gis appellatur. Sicut & qua lintearij, fullonesq; utuntur, in lauando extergendoq; uiribus præcipua. Galenus auctor. Ochra excoquitur in Rubricā, ollis nouis luto circumlitis. Com- mentus hoc esse dicitur Cydus quidam, incensis casu officinis. Quo magis arsit in caminis, hoc melior, quia nigrior, & carboni similis efficitur. Vicumq; talis Rubrica deterior q̃ natiua semper, ut Theophrastus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Licebit uolentibus ex Plinio fabris aptæ Rubricæ huius historiā, bonitatem, natales, tempe- raturā, omnemq; usum. 35. uoluminis, capite. 6. certius intelligere: ideoq; nos parato omnibus eo scriptore, nihil cōmentatiōibus his nostris in re aliq̃n nota adijciemus. Factū Rubricæ huic cognomē a fabrica est, in qua dirigendis lineis, colorandoq; ligno multus semp fuit eius usus.

De Lemnia terra. CAP. CIIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata e Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permista. Quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant. Vnde & Sphra- gida appellauere. Vim antidoti habet, contra perniciofa uenena singu- larem. Pota cum uino, & præsumpta, euomi uenena cogit. Contra ictus morsusq; animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur. Est & dysenteriae utilis.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica, siue terra Lemnia, quā Celsus Minij Glebam uocat. Palmam huic dedere Mi- Hh ij

A

μῆλτος τεκτονικῆ

B

Pli. li. 35. ca. 6.

λεμνία γῆ

Pli. li. 35. ca. 6.

D I O S C O R I D I S

C nio proximam. Hæc est antiquis multum celebrata, cum insula sua, in qua nascitur. Hæc Minium sublinū, adulteratq: qualis & in Cappodocia effodit spelūcis: quæ saxi adhæsit, excellere existimat. Glebis suis color, extra masculosus: hac usi sunt ueteres ad splendorem. At Sphragis uocatur inquit Galenus, quoniam Dianæ signum habeat a Sacerdote impressum: nec animalium sanguinem misceri, sed triticum & hordeum piamenti gratia, illi terræ dari. Rubet ambusti modo tumulus in Lemno: ubi hæc legitur, prope oppidum Ephestiada cognominatum: quod in eum locum Vulcanus ceciderit, quo orientem spectat insula. Ibi nihil iuxta nasci, aut uirere. Siccari Lemniam, nec remollescere sub digito protinus tactam, ut Rubrica. Philoetrem fatiatum ea ex Hydri morsu, Philostratus scribit: ob eamq: rem nouum insulæ nomen inditum, ut pro Lemno dicere Acaia, Huius insulæ uestigia senatus populuscq: Roman, concessit Atheniensibus fouendo.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est cæteris græcorū scriptoribus, præsertimq: Galeno eadem huic scriptori Lemniæ rubricæ, seu terræ historia. Hic enim ex cuniculoso specu, palustribusq: eius insulæ locis afferri ait: illi in ea insula montem esse dixerunt, ambustorum modo rubentem, sterilem, in quem pœtæ e coelo pulsum cecidisse Vulcanum ferunt: ex quo terra hæc legitur, non procul ab Ephestiade eius insulæ oppido: signariq: Dianæ, non capræ signo a sacerdote eius hanc terram: nec sanguinem illi caprarum misceri, sed fruges alias, piamenti causa monti illi defodere incolæ: pluraq: alia, quæ huic scriptori non conueniunt. Quinetiam nihil ab eis dictum est quale a Diosco, dicitur, uti ad religionem & initiationes quosdam hac terra.

De Atramento sutorio. C A P. C V.

καλκάνθη

A tramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum, sed in specie differentias treis habet. Vnum namq: humoribus stillatim in tuniculos quosdam colatis, concreuit. Quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, Stalactis appellatur. Petesellus ipsum Pinarion uocat, alij Stalacticon, id est, stillaticium: alij Pecton, Ephthon, Aracton, Lonchoton. Alterū simplici ratione fit in speluncis. Postea transfusum in excavatos scrobes, concrementū capessit. Quod Pectō, id est, Cōcreticium proprie nominatur. Tertium dicitur Coctile, & i Hispania fieri solet, sed inutile, ac inualidissimū esse constat. Ratio parandi hæc est. Aqua madefactum decoquunt: mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus cōalescit, in complureis formulas digestum, tesseraū speciem reddētes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cæruleum, graue, concretum, translucens. Cuiusmodi Stillaticium est. Ab alijs Lonchoton nominatū. Proximum Concreticiū. Coctile uero ad infectus & denigrationes aptius cæteris esse compertum est. Sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docēt. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. Latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratū, aut cū melle linctū. Vomitus ciet. Aduersus hausta fungorū uenena, ex aqua potum auxiliat. Purgat caput aqua dilutum, & in uellere naribus instillatum. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus.

Pli. li. 34. ca. 13

B A R B A R I C O R O L L.

Chalcanthum, aut Chalcanthos, aut Chalcætes, ut Strabo appellat, a Cornelio Celfo Atramentum sutorium fere semper conuertitur, cognationem æris græci nomine fecerunt. Fit in Hispania, e puteis stagnisq: id genus aquæ habentibus. Decoquitur ea, admixta dulci pari mensura, & in ligneas cortinas funditur. Imobilibus super has transitis dependēt resses lapillis exæretq:

quibus adhærescens limus, vitreis acinis, imaginem quandam uuae reddit. Exemplum ita sic-
catur diebus, 30. Hoc Ephthon uocatur, quod fit & salis modo flagrantissimo sole, admissas dul-
ces aquas cogente. Color est ferrugineus, siue ceruleus, perq̃ spectabili nitore, utrumq̃ esse
creditur. Diluendo fit Atramentū, tingendis corijs. Fit & pluribus modis, genere eo terræ, in
scrobibus cauato: ut Dioscorides tradit. Purissimū est, qd Stalactida, siue Stalagmiā, hoc est,
Stillatitium uocant. Sed ex eo candidum colore uiolam sentiente, Leucoion nominant, cetera
uiolacea. Fit autē quod Pecton uocatur, & in saxorum catinis pluuiā aqua corruato limo gela-
scente: a quo & nomen habet. Factitium pallidius est q̃ fossile: quantum colore, tantū & boni
tate uincitur. Maxime probant Cyprium in medicinæ usu, quod & solum Possidonius esse cre-
didit. Chalcanthum Galenus in Chalcitin lapide mutari tempore, incipiens a superficie, testa-
tus est. In harena Vrsorū & Leonum ora Chalcantho aspergi solita dicuntur: tantaq̃ erat uis
in astringendo, ut mordere non possent. Differt Chalcanthos, id est, æris flos, a Chalcantho
latius q̃ ut monendū sit: etiam si Democritus in chymicis florem æris dicendo Chalcanthum
intellexisse uideatur: ut Chalcanthū nominando, luteum oui significare uoluerit. Atramentū
est & quod Melantheriam Græci dicunt, explicandum suo loco. Itemq̃ Melan. Differt Cala-
canthum a Chalcantho: quod illud herbæ genus est, muscas, muresq̃ necans, nec aliud de ea
proditum inuenio: quamq̃ Græci uulgo Calacanthum accipiunt pro Chalcantho.

EX M. VERG. COMM.

AEri cognata res est Chalcanthum. In ærijs enī metallis, ut metallici docent, plerumq̃
concreuit. Indicatq̃ id in græcis nomen: in quo ærimum æs intelligitur. Romani, quoniam eo
tingendis corijs gentes uterentur, a nigro colore quē reddebat, Atramentū: & a fucinis in quā
bus coria tractantur, futorium nominauerūt. Genera, confectionesq̃ eius satis hic docuit. Nec
nos parum laborauimus in restituenda capiti huic antiqua integritate. Qualis autē ea sit, & qui-
bus ablatiis, mutatisue factum id a nobis fuerit, collatis cum nostra aliorum additionibus, faci-
le uolentes intelligent. Poterunt a Plinio etiam Atramenti huius futorij easdem confectiones,
genera, & nomina intelligere historiæ suæ. 34. uolumine, capite. 12. Eadem enim omnia huic
& illi sunt. Quod in medicina, & remedijs monere uolumus, illud est. Quod hic Atramentum
futorium contra fungos cum aqua bibi ait, non multo post cum ex professo de fungorum ma-
lesicio ageretur, cum aceto bibendum in eo periculo præcipitur: ut tunc certius docebitur.

De Chalcite.

CAP. CVI.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inuete-
rata, intercurrentibus oblongis uenis, splendentibusq̃. Huic ab-
sterforia uis inest, excalfaciens, & crustas ulceribus obducens. Purgat
quæ oculis & eorundem angulis hærent. Ad ignem sacrum, & ulcera
quæ serpunt, efficax est. Sanguinem e uulua & naribus erumpentem,
cum succo porri sistit. Carunculā gingiuis enatam, depascentia ulcera,
tonfillasq̃, eius farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculorū me-
dicamentis longe utilior redditur. Callum genarum & scabriciam ab-
sumit, abstergitq̃. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta.

BARBARI COROLL.

Chalcitis, hoc est, lapis ærius, ita dicitur, quoniam ex ipso Aes coquitur. Distat a Cadmia
fossili, quod illa ex subdialibus petris ceditur, hic ex obrutis. Item q̃ Chalchitis friat se statim, na-
tura mollis, ut uideatur lanugo concreta. Est & alia distinctio: q̃ Chalchitis tria præter se genera
complectitur, Aes, Misy, & Sory. Habet autē æris uenas oblongas. Probatur mellei coloris,
gracili uenarum discursu. Putant & recentem meliorem esse, quoniam uetustate Sory fiat. Mace-
ratur autē in fistilibus ex aceto circumlitis fimo diebus. 40. & colorem Croci trahit. Chalchitis
inueterata, ut Galenus inquit, etiam in Misy transit, a summa cute incipiens.

EX M. VERG. COMM.

Chalchitim uocant metallici lapidem ex quo æs coquitur. Habet is plures, ut illi uocant, di-
stinctiones, nō repetendas hoc loco: quoniam ex Plinio cunctas alij suis Corollaris inseruerint.
Et si uetustiores aliquis amet auctores, totam unus Plinius rem lib. 34, capite. 12. docebit.

Hh iij

A

B

B

χελκίτης

Pli. li. 34. ca. 12

ψωρικόν.

FIt ex ea medicamentum, quod Psoricon uocant, duabus Chalcitidis partibus, cum una Cadmiæ additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere fimo, diebus quadraginta per caniculæ ardore: sic enim fit acrius. Idem quod Chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito. Modus autem uisionis in humidioribus est, dum ipsa Chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit. In reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum, aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcicia flatu expellenda. Mox reponenda. Torretur etiamnum perflatis carbonibus, usque dum luteo colore palleascit. Aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec conflagret, & colorem mutet.

E X M. V E R G. C O M M.

Coniuixerunt Chalcitidi Psoricon hoc aliqui: nec sine causa penitus. Ex ea enim, ut præmonstratum est, fingitur, fictitium enim, non natuum; nec simplex, sed compositum est. Nos tamen ueterum græcorum rationem secuti, qui seorsum a Chalcitide de Psorico egerunt, diuisa historia, & alio capite a Chalcitide, statim Psoricum prosecuti sumus. Medicamentum id est, sic dictum, quoniam contra scabries & asperitates cutis, quas Græci Psoras, dicunt uim & usum quondam haberet. Quæ autem sit huic scriptori eius confectio, satis ex eo patet. Cæteri tantum græcorum medici ad confectiorem eius non Cadmiæ, sed Spuma argenti usi sunt: neque ex uiribus eius minus aptam forte uim contra cutis asperitates Psoricum habebit. Cætera huic, & alijs omnia eadem sunt: qui fimo obrui, & 40. diebus sub sole habendum omnes præceperunt: quoniam ea ratione maiores in siccando uires acquireret: ipsum magis extenuaretur, & in erodendo mitius Chalcitide fieret. Est illud in medio capite certius cognoscendum: in cocturæ spacio, et quædiu coqui metallicum aliquid oporteat, quæ nam hic πωρική, id est, humore abundantia, quorum cocturæ finis sit, cum bullas agere desierint, & aruerint, dicat: & quæ reliqua intelligi ibidem oporteat, quorum cocturæ finis sit in speciosiore colore mutatio: in uno ne Psorico constituendum id sit, an in cunctis metallicis: decreueritque hic, & appellauerit humore abundantia Psorica, quæ copioso aceto, aut uino temperata fuerint, reliqua uero quæ aridiora: an simpliciter de cunctis metallicis, omniumque coctura intelligere id oporteat. In quam partem inclinat animus nobis, non tam ex conceptis illis uocibus, quæ in hunc sensum facile legentes ducunt, quæ quia non uidetur, quo referenda reliqua illa sint, cum de uno tantum Psorico agatur. Eamque rationem nos secuti, de cunctisque præcipi eo loco opinati, ad omnium metallicorum cocturam rem contraximus. Plinius, 34. uolumine, capite, 12. de eodem Psorico hoc, sed non eodem penitus huic modo egit. Prius enim fimo in sole obruit, quæ Cadmiæ illi misceat, Cætera huic & illi eadem fere omnia sunt.

D

¶ De Misy.

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & uisionem cum Chalcitide eandem, citra Psorici compositionem, excessu defectuque differens. Aegyptium autem cæteris præstat, ut pote quod efficacius habeat. Sed ad ocularia medicamenta multo supradicto inferius.

Pli. li. 34. ca. 12

B A R B A R I C O R O L L.

Misy, quidam putauere fieri exusto lapide, in scrobibus, flore eius luteo, miscente seligni pinea fauilla. Re uera autem ex Chalciti fit lapide, concretum natura, discretumque, optimum cum teritur: arenosa qualitas, siue terrea, similis Chalcitidi. Hoc miscetur, aurum purgant. Lapidiosus est quæ Sory.

Deprehenderunt metallici in Chalcitide lapide, ex quo diximus excoqui æs, tria contineri. Aes primū: mox Misy hoc de quo nunc agitur; & tertium Sory, de quo non multo post agitur: non tanq̃ eiusdem substantiæ partes, sed diuersi generis cōcreta simul, discretāq̃ quasi metallā aliqua, quæ coctura deinde, rationibusq̃ alijs separata in usum uitæ traherentur. Quale aut̃ hoc Misy sit, satis hic, satis etiam Plinius quo diximus loco docuerunt. Hic breuissime medicinam, & remedia eius numerauit, æquale uiribus Chalcitidi faciens. Plinius tamen longiore certioreq̃ historia multa addidit, quæ uidisse in eo operæ precium fuerit. Docentur autē ab eo quo diximus paulo ante capite & libro. Cæteri etiam græcorum medici in genere exulcerantium medicamentorum cum ualidiore adstrictione Misy hoc numerauerunt: minus tamen q̃ Chalcitis erodere, quia tenuius ea sit. Addidit præterea Galenus Chalcitum: & quod nō multo post dicitur Sory, uetustate in Misy hoc mutari a superficie incipiente statim mutatione.

De Melanteria.

CAP. CIX.

Melanteria geminæ est originis. Quædam in faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, salis modo cōcreuit. Alia uero in summa facie supradictorum locorū cōit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus fossilis quædā. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticā obtinet Misy similem.

BARBARI CÖROL.

Melanteria, ex nomine quidem ipso atramentum significat: quæmadmodum & Melan: de quo post dicemus. Differt: q̃ Melan factitium & librarium, siue scriptorium atramentum est: Melanteria uero terra.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Melanteriæ nomē color, qui in metallica natiuitate, sin fossilis contactu aquæ illi accedens, semperq̃ & in omni niger est: nō male a latinis Atramentum metallicum dicta aliquando est. Græcis tamen uocibus in hoc Romana medicina plerumq̃ usa est: uocantq̃ latini nō minus q̃ græci Melanteriam metallicum hoc atramentum, in ærarijs fodinis conrescens, & ut uerisimile est, æris naturæ. Veteres græcorū medici in genere efficacissime astringentium eam nominauerunt: facilem ex historia huius in ærarijs metallis inuentu.

De Sory.

CAP. CX.

Sory existimarunt aliqui Melanteriam esse, aberrantes. Siquidem sui generis est Sory, ei non absimile. Verum Sory uirus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptiū, quodq̃ frianti nigrius apparet, spongiosum, suppingue, insup adstringens, & olfactu, deuorationeq̃ magnum uirus olens, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas Misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & uestionem supradictis similem habet. Dolori dentium, cauernis inditum medetur. Labantes firmat dentes. Ischiadicis ex uino infusum auxiliatur. Illitum cum aqua uaros extinguit. Medicamentis ammiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem fere omnia quæ uestionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur, præter salem & uini fecem, nitrum, calcē, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Combusta enim uiribus efficaciora redduntur.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Sory Cyprium oculis utilius, cætero superatur ab Aegypto: alterius nationis Sory, q̄ Aegyptium. Si teratur, splendet. Sory crassius est q̄ Misy. Chalcitis mediâ inter ea qualitatē habet. Galenus auctor. Describitur Sory a Democrito, ceruleum, scabrum, semper inueniri solitum in ipso Misy, uocatum ab aliquibus Calchanthum uiride.

E X M. V E R G. C O M M.

Hoc est Sory illud nō multo ante dictū a nobis in Chalcithite cōtineri. Quodq; ea iuetera fieri etiā Plinius ait, satis ab hoc & ab eo descriptū, ideoq; non dicendū a nobis iterū, neq; ex scriptoribus antiquis repetēda ad Soreos huius historiā modo quæ in illis, præsertimq; Plinio parata oibus, & exposita sunt. Docet em̄ ille longius genera, bonitates, ususq; eius oēs.

De Diphryge.

C A P. CXL.

Diphrygis tria genera esse credūtur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. Lutosum namq; defertur, ex luto cuiusdam inibi regionis, postea delatum, sole siccatur, mox circumpositis farmentis uritur. Diphryges ideo uocatum est, q̄ & a sole, & a farmentis uratur, are scat, & ferme torreatur. Alterū perfecti æris, quasi subsidens fex est. Siquidem post frigida aquæ offusione, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære fornacū ima parte coharēs id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem Pyriten, ut calcem cremant, in camini aliquot diebus, cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximētes recondūt. Quidam tradunt ex sola materia lapidē æris gignente fieri, quoties in dictis arcis assata, & in scrobes translata peruratur. Tunc enim ambientem scrobis locū comprehendit, & exemptis lapidibus æquale nihil inuenitur. Præfertur quod saporem æris reddit, rubiginosum, adstringens, & linguam uehementer exiccans. Quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata Diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurgare, excrementa consumere, ulcera serpentina, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut cerato ex captum discutit.

Pl. li. 34. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Quatuor habent, qui Aes perficiunt, Aes, Scoria, Florem, Diphryga. Aes ipsum in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernatat, Diphryges remanet, auctor Plinius. Quidam perhibent in fornacibus globos lapidis qui coquantur, ferruminari: circa hunc Aes feruere: ipsum uero non percoqui, nisi translatum in alias fornaces: & esse nodum quandam materiæ, id quod relinquitur ex cocto, Diphryga uocari.

E X M. V E R G. C O M M.

Eadem huic scriptori Diphrygis Plinio undiq; historia est, nec quicq; ab eo felicius simul & breuius ex hoc scriptore redditū aliquādo fuit. Locus est. 34. uolumine, capite. 3. Diphryges em̄ uocari ab eo, q̄ bis torreatur, inquit. Triplicem eius originē esse. Fieri ex Pyrite primū lapide in fornacibus cremato, donec in rubricā excoquatur. Fieri itidem in Cypro ex luto cuiusdam antri arefacto prius, mox paulatim circumdati farmentis excocto. Fieri postremo in fornacibus subside æris face. Differentiam esse: q̄ Aes in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernatat, Diphryges remanet. Addidit præterea, tradi a quibusdam ferruminari globos lapidis, qui in fornacibus coquuntur: circa eos feruere æs, ipsos uero non percoqui, nisi in alias fornaces translatos, & esse nodū quandam materiæ: idq; quod excocto superfit, Diphryga uocari. Ex quibus ratiocinari facile est, quatuor ærariis in coctura æris redire res, æs, scoria, florem, & diphryga: quorū quemadmodum non dissimiles, sic non penitus æquales uires in medicina sunt. Nosq; ex antiquo scriptore hīdem uerbis commentationibus nostris illa adtecimus: ut scirent primum legentes, recepta a latinis scriptoris huius decreta fuisse, mox ha-

berent uolentes inueniendi & colligendi Diphrygis a Plinio tradita certiore ratione.

¶ De Auripigmento. CAP. CXII.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus Sandarachæ gigni-
tur. Optimū existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli
materiæ permistum, fissile. Quale Mysiæ & Hellesponto nascitur. Hu-
ius duo genera fluxerunt. Vnum supra dictum est. Alterum glandis
effigie, pallidum, & colore Sandarachæ imitans, glebosum. Ex Pon-
to & Cappadocia defertur. Secundum locum tenet, has nactum dotes.
Torretur in testa noua, uiuis carbonibus subiectis. Assiduoq; uersat,
donec igne flagret, & mutet colorem. Deinde refrigeratum, tritumq;
reconditur. Vim habet adstrictoriā & erodentem. Crustas cum uehe-
menti punctione excitat. Reprimit quæ excrescunt, & capillos euellit.

BARBARI COROLL.

Arsenicum, siue Arsenici tria genera. Coloris in auro excellentis. Alterum pallidius, &
Sandarachæ similis: quod sit deterius. Tertiū quo miscetur aureus color Sandarachæ, quasi
ex prioribus duobus iunctum. Vtræq; hæc squamosa: illud uero sicum, purumq; gracili ue-
narum discursu fissile. Arsenicum nos, & Auripigmentū uocamus: ut Paulo, & Vitruiuo,
& Plinio, & Celso placet, Democriti Chymistæ Androdamanta quandoq; hoc appellant. In
Carmania duos haberi montes Onesicritus tradit, alterum Arsenici, alterum Salis.

EX M. VERG. COMM.

Auripigmenti in pingendo adhuc usus aliquis est, ex quo Romani quondam illi nomen fe-
cerunt, utunturq; eo nunc passim in pingendis librorum frontibus bibliopolæ. Accessit no-
stra ætate etiam, qui antiquioribus, ut credimus, nullus erat alius Auripigmenti usus. Trito
enim, pediculosos accipitres suos aucupes inspergunt, presenti contra eā labem remedio. Du-
plex eius genus hic fecit. Alterum quod fulgore attri splendet. Alterum quod *Balanoidis* uo-
catur. Significatq; ea uox, ut omnes uertimus, quod glandis formam & speciem habet. Non
tamen respondere his quæ sequuntur id uidetur. Qui enim potest aliquid glandis figura esse,
quod glebosum paulopost dicitur. Ob eam causam suspicatus sumus, ad colorem posse eam per-
tinere uocem: & eum quidem puniceum, qualis non in glandibus simpliciter, sed qualis in ma-
turi palmulis est: quas græci cōmuni aliarum glandium nomine Balanos aliquando uocant:
ut primo cōmentario in Palmulis & Balanis testati sumus. Vbiq; enim & passim coloris hoc
discrimen in Auripigmento uidetur, præcipueq; in pingendo apparet: quo tempore dilutum
humore aliquo ad eam rem necessario puniceum illum quem diximus colorem representat.
Facitq; ad hoc quod coniunctum illi statim est *sandarachæ*, id est, colore Sandarachæ, cuius co-
lor flammeus & rubens describitur. In hanc partem diu inclinauit animus nobis, & adhuc pro-
pensiores sumus. Nihil tamen contra aliorum interpretum æditiones mutare in re non satis
certa uoluimus.

¶ De Sandarachæ.

CAP. CXIII.

Sandarachæ probatur ruffa, & aliena materia uacans, friabilis, Cin-
nabaridis colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadē & uestio, quæ
Auripigmento. Explet alopecias, resina excepta. Scabros ungues exi-
mit. Contra phthiriasin ex aceto efficax est. Tubercula cum adipe dis-
cutit. Prodest ad narium orisq; ulcera, & cæteras papularum eruptio-
nes cum rosaceo. Item condylomata. Datur ex mulso purulenta ex-
tussientibus. Sufficitur quoq; cum resina, aduersus ueterem tussim, rapto
per fistulam nidore. Vocem expedit, cum melle delincta. Suspiriosis
cum resina in catapotio, optime datur.

D I O S C O R I D I S

C **S** **B** **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**
 Andaracha inuenitur & in insula rubri maris Topazono : ut Ochra . Sed inde ad nos im-
 portari negant. Inuenitur autem & in aurarijs, & argentarijs metallis : ut in Paphlagonia Pi-
 moliseno tractu, urbe Pompeiopoli. Sed & in Scythia proxime flumen Hypanin optima. Fit
 & adulterina ex Plimythio, in fornace cocto : idq; incendio facto ex casu repertum est. Colos
 esse debet flammeus, precium in libras asses quini . Viſtruius multo meliorem usum præstari
 ex ficticia, q̃ ex fossili Sandaracha pictoribus existimat.

E **X** **M** **V** **E** **R** **G** **C** **O** **M** **M**
D Vplex quondam græcis & latinis scriptoribus cunctis Sandaracha fuit. Metallica pluri
 bus locis fossilis, ut testati Plinius, Viſtruius, pluresq; alij sunt : qui ad Hipanin Scythiæ flu-
 uij optimam omnium inueniri tradiderunt. Ficticia deinde & adulterina, quæ ex cœcia cerussa
 fieret, illa aptius medici, hac pictores felicius usi sunt. Auripigmento æqualem in censu reme-
 diorū uitæ græcorū medici eam fecerunt, discutientibus & repurgantibus medicamentis eam
 miscntes. Cerussæ substantia Sandaracha est : indicatq; id Viſtruius septimo suæ architectu-
 ræ cōmentario, dicens. Cerussa uero cum in fornace coquitur, mutato colore ad ignem incen-
 dij Sandaracha fit. Id autem incendio facto ex casu didicerunt homines, & ea meliorem usum
 præstat, q̃ quæ de metallis per se nara foditur. Et hæc Viſtruius. Plinius addidit, flammeum
 debere in ea esse colorem : & si hæc ipsa torreatur, æqua parte admixta rubrica, Sandycem fie-
 ri : qui ueteribus poetis, præsertimq; Maroni color notissimus est. Et si crediderunt aliqui her-
 bam Maroni Sandycem esse cum cecinit, Sponte sua Sandyx pascens uestiet agnos, cum
 tamen id nullam eius intellectus necessitatem habeat. Quod enim ab eo dicitur est, fore eam
 tunc felicitatem, ut sponte sua colores in ouium uelleribus nascantur, & inter pascendum a-
 gni colorentur : neq; id pastu Sandycis futurum, sed quod nos credimus, colorem Sandycis
 contrahendum simpliciter ab eo dici.

De Alumine.

C A P. CXIII.

ovilapia

O Mne Aluminis genus fere in Aegypto, & eisdem metallis inueni-
 tur. Est enim scissile quoddam, quasi flos sudorue eieciūcius ter-
 ra. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Li-
 paris, Sardonis, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plariscq;
 alijs regionibus, Rubricæ modo. Plurimæ eius species, uerum ad me-
 dendi usum scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum est
 scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perçp adstringens. Cal-
 culorum expers, nec glebulose, aut assulose compaciū, sed figillatim
 in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Quale est quod Tri-
 chitis, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq;
 lapis huic Alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, q̃ non ad-
 stringat. Damnañ in rotundi genere, qd manu confictū est. Sed ex figura
 deprehendit. Assumēdum aut suapte natura rotundū, bullis turgens, al-
 bo propius, atq; ualidius adstringens. Præterea nōnihil palloris cū qua-
 dam pinguedine præ se ferens, sine harenis, friabile, natiōe Aegyptiū, aut
 ex insula Melo. Liquidū probatio, ut sit lymphidū, lacteum, æquale, & sem-
 per succo madens, sine lapidibus, atq; quendā caloris igniculū expirans.
 Vim habent ex calfaciendi, stringendi, sanandi, & expurgandi, quæ cali-
 ginē pupillis oculorū offundunt. Genarū carnem, cæterasq; excrescenti-
 as extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligit. Vri & torrerī Chalcitū
 dis modo debent. Putrescentia ulcera cōpescunt. Sanguinis fluctiones in-
 hibent. Gingiuas humore prægnātes comprimūt. Motus dentium cum

aceto et melle firmant. Profunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum sanguinalis hærbae succo. Leporis conueniunt cum brassicae folijs, aut melle cocta. Item pruritus & unguium scabrie, pterigijs & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceto, faece & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas ulcerum, & cum salis duabus partibus, ad uitia quæ pascunt. Furfures cum eruo & pice illita abstergunt. Ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Contra tumores, et graue alarum inguinumque uirus, illinuntur. Ex melo autem aduectum, mulieribus præstat ne concipiât, ante coitum ori uulua inditum. Partus quoque extrahit. Gingiuis si caro excreuit, uua, ac tonsillis accommodantur. Auribus & uerendis cum melle illinitur.

BARBARI COROLL.

Alumen Græcis ab astringendo Stypteria dicitur. Qui uolunt hoc exprimere, saluginem terræ finiunt. In Cypro candidum, & nigrum, exigua coloris differentia, cum sit usus magni: quoniam inficiendis claro colore lanis, pellibusque, candidum liquidumque utilissimum est, contra fuscis, atque obscuris nigrum: ob id Byrsodeplicon utrumque cognominatur. Et aurum nigro purgatur. Fit autem omne ex aqua limoque, hoc est, terræ exudantis natura, corruatū hyeme. Solibus æstiuis maturatur. Quod fuerit ex eo præcox, candidum efficitur. Laudatissimum in Aegypto Alumen: proximum in Melo. Quancumque in medicina Aegyptio prælatum. Nascitur & in Hispania, & Ponto, & Strongyle insula. Phorimon uocatur liquidum, cui notæ optimi respondant. Quod an sit adulteratum, deprehendit succo punici mali. Sincerum enim mixtura eius nigrescit. Est & genus alterum, quod Paraphoron uocant, pallidæ, & scabrae naturæ, & quod inficitur galla. Concreti uero Aluminis genus id quod Trichitin appellauere: fieri arbitrantur ex lapide, propterea & Chalcitin uocant, quem Hippocrates Meliada, quia sit e Melo, nominat: ut sit sudor quidam eius lapidis, in spumam coagulati. Strongyle duas habet species. Fungosum, atque omnium ore dilui facile: quod in totum reijcitur. Melius pumicosum: & foraminum fistulis simile spongiæ: nec inficiens nigritia. Optimum ex omnibus rotundis, Melinon. Aluminis, ut breui comprehendam, sex habentur Galeno summa genera. Scissum, siue scissile. Rotundum, Astragalites, hoc est, talare. Hygron, id est, liquidum. Placitis, & Plinititis, hoc est, crustarium. Et Latercularium. Alumine prælita non incenduntur: id quod & ob fidione Athenarum sub L. Sylla Quadrigarius compertum scribit.

EX M. VERG. COMM.

Quæ sit uniuerso Aluminis præcipua dos & uis, nomen indicat. Ab astringendo enim quæ multam & egregiam potestatem habet, græci Stypteriam uocauerunt. Longe pluramque hic discrimina eius & genera Galenus & Græcorum medici alij numerauerunt: monstrante, ut par est, quotidie nouum aliquid natura, & adijciente antiquorum inuentis experientia quod ab illis nondum inuentum, aut obseruatum fuerit. Ea nos in scriptoribus illis cognoscenda reliquimus. Scriptori huic tantum inseruiens, qui a principio statim dicens esse Alumen scissile, *ἰσχυρὸν τὸν βολεῖτιδος ἄνθος*. Quod ab alijs, nobisque pariter ueluti glebosi flos uersum est, non leuè suspicionem nobis iniecit, potuisse quoddam aliter legi: quoniam in toto Aluminum censu nulum Boleitidis nomine indicatur. Præterea glebam *βόλον* græci dicunt, & ω, littera scribunt. In cunctis autem, quos hactenus uidere licuit, scriptoris huius græcos codices, o, paruo uox illa legitur. Accessit his Plinius etiam lib. 35. cap. 14. de scissili Alumine hoc his uerbis agens. Concreti Aluminis unum genus Schiston, id est, scissile græci appellant, in capillamenta quædam canescencia dehiscens. Vnde quidam Trichitum potius appellauere. Hocque fit ex lapide: ex quo & id Chalcitum uocant: ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hæc nescio quomodo historie & uocibus scriptoris huius respondere omnia uidentur. Id quidem in confesso est, de eodem scissilis Aluminis genere ambos agere. Potuitque hic florem, quem ille sudorem nominat, dicere. Et si id sit, non sine ratione dubitauerit aliquis, Boleitide scriptoris huius in Chalcitidem Plinij mutandam esse: qui Chalcitum uocari alumen etiam hoc ait, quod ex lapide fiat: fitque

Plin. lib. 35. ca. 14

B

li

C ueluti sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hoc nos monemus, eruscandæ ueræ lectionis & inueniendæ rei non contemnendam occasionem hanc legentibus porrigentes.

De Sulphure. CAP. CXV.

6199

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod Apyron uocant, nite-
dulæ modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatur
in genere Sulphuris ignem non experti, quod uiret ac præpingue spe-
ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictū Sulphur cal-
facit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, puru-
lenta extussientibus, in ouo sumptum, aut suffitum. Præterea partus, u-
sti nidore extrahit. Lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina
mistum, aufert. Cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est. Vitiligi-
nes tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur. Cū aceto uero, dra-
conis marini, scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpen-
tes, cum nitro deterfum sedat. Regiū morbum emendat, insparsum frō-
ti cochlearis mēsurā, aut in forbili ouo sumptū. Facit ad grauedinē, &
destillationes. Sudores quoq; cōspersum inhibet. Podagricis cum aqua
& nitro illitū, cōducit. Grauitatē auditus, suffiti nidore raptim per fistu-
lā hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Erumpentē undecūq; san-
guinem sistit. Fractis auribus cum uino & myrrha illitum medetur.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 35. ca. 146

D

Sulphur Græce Thion, nascitur in insulis Aeolijs, inter Siciliam, & Italiam, quas ardere cer-
nimus. Nobilissimū in Melo. Sed & Neapolitano, Campanoq; agro collibus: qui uocant Leu-
cogæi. Libyæ cuniculis effossum, curatur igni. Genera quatuor. Viuum, hoc est, Apyron, siue
ignes non expertum: gignitur solidū, id est, glebosum, eoq; uno ex omnibus generibus medici
utuntur: cetera liquore constant, & perficiuntur oleo incocta. Viuum effoditur, translucescē ac
uiret. Alterum genus appellant Bolon. Quidam pro Sulfure tantum crudo Bolō capiunt. Ter-
tium uocat Egula, cuius unus dūtaxat usus, ad suffiendas lanas fullonū officinis, qm candorē
eū mollicieq; cōfert. Quarto utunt ad Ellychnia maxime conficienda: ex eo Cautō uocant. Ce-
terum tanta ei uis est, ut morbū fonticum dephendat nidore. Lusi & Anaxilaus eo, condens
in calice nouo, prunaq; subdita circūferens, exardescens reperculsu, pallorē dirū, uelut defun-
ctoz effundente conuiuis. Harpacticon, siue Harpax appellat in medicamētis, a celeritate uel
lendi. Habet & in religionibus locū, ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis eius & in aquis
feruentibus. Neq; alia res facilius accenditur. Fulmina qdem, & fulgura Sulfuris odorē habēt.
ac lux ipsa eorum sulfurea est. Porro sulfur in uenis terræ ceu decoctus quidā adeps est, tā uali-
da & firma confusione partium, ut oleū eius arte nulla separari possit in rebus ceteris. Propter-
ea cū oleacea, & ignea, nō sulfuginea sit eius natura, haud facile diluitur. In spiritū, siue nebulā
facile attollit, ac sublime fit. Crematū cum ære, uiolaceum colorē: cum hydrargyro, ceruleum
facit. Sunt hæc chymistis notissima, non aliud magis in conficiendo auro cōmendatibus, q̄ Sul-
phur: quippe quod splendorē, & colorē metallis asserat: ut corpus, & materiā hydrargyros: p
indeq; sit maris uice Sulphur, Hydrargyros uero, id est, Argentū uiuum formina: ut Democri-
tus propterea omnis generis metallici spumā esse Argentū uiuū prodiderit. Duobus ijs, phar-
macum illud famigeratū potius q̄ compertū etiam, Philosophici lapidis nomē clatura nobile.
Conficit ab Osthane, Mercurio, Chane, Zosimo, Agathodemone, Democrito, Quanc̄ & alij
scripserūt de miris, ne dicā signētis huius peritię. Orus, chrysorychites, Pebichius, Comerius,
Ioānes, Apuleius, Petasius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synesius Olympiodorus Alexā-
drinus: recentiores ijs Stephanus ad Heracleū Cēsare, Heliodorus ad Theodosiū. Iā formine. 3.
Cleopatra uirgo, Taphnutia, quę minus pbat, & Iudeę gētis Maria, quā plurimi sequunt. Au-
tores ijs, occultē rei gratia, nihil fere suis nominib. appellāt: ut ipsam Sulphuris, & Hydrargyri
fuliginē Argyrō nama, hoc ē, Argentū fontē dicant, Afemon uero, fuliginis eius ferruginē.

15

EX M. VERG. COMM.

Fecerunt Sulphuris quattuor alij genera, quæ ut græcos omittamus, a Plinio. 35. suæ historiæ commentario cap. 14. suis nominibus, notisq; priuatim indicantur & numerantur: hic duo tantum: alterum ignem non expertum, quod usuum nominant: alterum uero quod igne confectum fuerit. Diuersitatilq; eius non alia fuit causa, q̃ q̃ cæteri pluribus locis & multiplex nascens Sulphur, quale in plerisq; artibus & uitæ necessitatibus aliquot quæsisse id oporteat, docet: hic medicinam tantum tractans, ex omnibus generibus uiuo; & ignem non experto illo præcipue indigebat. Eo enim medici plerumque utuntur: quoniam natura, & sua uis efficacior illi quam cæteris est. Eamq; ob causam in uniuerso Sulphure una illa differentia merito usus est. Græci *ἀπυρον* uiuum illud uocant, non alia uocis indicatione q̃ q̃ igne careat. Celsus libro 8. to, cap. 18. altera nota idem indicauit, Sulphuris ignem non experti quod *Apyron* uocatur, dicens, Maro contra Georgicorum suorum. 3. commentario, in pecoris medicina uiua Sulphura appellauit. Contrarium uero illi alterum genus idem græci *πυρρὸν* uocant, igne incoctum intelligentes. Quotidianus, & numerosus inter homines Sulphuris usus est: Indiget em eo plæ resq; arres. Indiget & ad quotidiana igniaria, expiationesq; domus: sed nullibi uilius q̃ in morbis, q̃bus numero multis, & periculo grauib; medet. Quæ omnis ratio ab hoc scriptore, & quo pauloante diximus loco, a Plinio copiosissime tractata, repeti a nobis inutiliter non debet.

De Pumice. CAP. CXVI.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, teri facilis, nec harenosus, item fragilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, et ubi canduerint, extractus, uino restinguitur odorato. Iterumq; incensus extinguitur: & tertia uestione exemptus, & per se refrigeratus, ad usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt. Explet ulcera, & ad cicatricem perducit. Excrescentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus autor est, si quisq; in bullientem urseum uini Pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

BARBARI COROLL.

Pumicis farinam, potiores in certamine bibendi præsumere, sed nisi uniuerso potu impleantur, periclitari Theophrastus autor est: qui & Eudemum pharmacopolam, in uigessimas secundas uices durasse scribat. Ingressumq; balneas, nihil omnino reiecit: sed quasi non bibisse, ita coenitasse, Pumice uidelicet, ab septima statim potiõe hausto, primum ex aceto aspero, mox ex uino. Ut errauerint qui locum eum in Theophrasto de uiginti duabus Ellebori potionibus acceperunt, cum ex Plinio id facile deprehendi possit. Pumice in musti cados addito, non ad præsens modo, sed in totum feruere uina desinunt ui siccifica. Pumicis duo significatus. Alter notus omnibus. Altero dicuntur ita & cætera saxa erosa annis, qualia in ædificijs, ut Plinius inq̃, Musæa uocant dependentia, ad imaginem specus natiui arte reddendam. Nunc inde Musæa uulgo nominantur, preciosissimis dicata templis. Inuentum id Agrippæ quidam referunt acceptum. Huiusmodi operis artifices Musæarios Cassiodorus, & Iustiniani leges uocant, etiam musæarios corrupte multi lectitent. Amianus Marcellinus, Musiciū opus nominat. In uitis cæsarū, quas ab Adriano Iulius Capitolinus, & alij cōplures scripsere, pictura de Musæo nominat, etiam si mendose legebatur, de musco. Laudatissimi Pumices sunt in Melo, Scyro, Aeolijsq; insulis. Probantur teri faciles. Poliendis libris accommodatur: unde Repumicatos appellamus. Pumex græce Cissaris uocat: q̃d nomen aliud nihil significat, q̃ erosum. Etem uermiculus triticarius, et ordearius Ciss dicit, ut Ips cornicularius, Trips lignarius, Sis uestiarius, Ix nitiarius, si Photiōi grāmatico fides habenda est. Pumicem ueteres etiam spongiā uocabāt. Nā & e maris quoq; spūma coalescit aliq̃: itemq; ex arena littorali: ut in insula Cyclade Nisyro. Vjstruuus, quæ nūc inquit, sub Vesuuio monte Spongia, siue Pumex Pompeianus uocatur, ex cocto alio genere lapidis, in hac redactus uidetur generis qualitatē. Talis autē Pumex inquit, & circū AEnam gignitur, & collibus Myliæ, qui catacecaumēnos a græcis, hoc est, deustus appellatur. Talis &

A

uicariis

B

Pli. li. 36. cā. 16

li ij

C Lipareus est, ut inquit Theophrastus; alioquin anteq̃ uratur, niger, leuis, atq; sarcus. In Meso-
quoq; insula, idem autor est, Pumices quandoq; in altero gigni lapide: ponderosum, & nigrū
esse Siculum: qui & cæteris præfertur.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redimus scriptoris huius Pumici ab aliquo, qui omnem eius historiam eodem loco habe-
re uoluerit, accreuisse quod in extremo capite ex Theophrasti. 9. de plantarum historia acceptū
legitur. In uetustioribus enim græcis nulla est ea pars, neq; in medicina necessitatem aliquam ha-
bet. Nec Dioscoridis etiam historię, decretisq; omni ea reiecta parte noquerit aliquis. Retulit id
Theophrastus quo diximus loco: acceptamq; ab eo rem eam omnem Plinius etiam docuit. 36.
uolumine, cap. 16. quo loco tractata itidem omnium Pumicum historia & medicina, scriptoris
huius decretis omnibus subscribit: additisq; aliquibus, cocturæ, usuiq; Pumicum non parum
profuisse uidebitur. Nos breuitati consulentes, ea relinquimus: monemus tamen omnes, non
fore inutilem eadem hæc in eo scriptore legentibus operam. Aut si Plinium audire nolue-
rint, Barbarum saltem uisere, in quo omnia ex Plinio hsdem uerbis tradita leguntur. Notissimus
nunc etiam omnibus Pumex, a græcis Cissaris, ob fistulosas concauitates quas habet, nomi-
natus. Cui enim ab eis dicitur, qui in tritico & hordeo cum referbuerunt, nascitur uermis. Cui
natura est, semina illa cuspide potius, q̃ ore quam habet exiguis foraminibus terebrare: qui-
bus foraminibus quoniam similis sit fistulosus ille Pumicum habitus, quasi ab his uermibus p-
foratus fuerit, Cissaris Pumex dictus est.

De Sale. C A P. C X V I I.

S Al fossilis efficacior est, communiter si est candidus, calculis uacās,
& perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter Amōniacum
genere laudatur, si modo findi facile possit, rectisq; segminibus diduc-
ci. In marino Sale eligendus est cādus, æqualis. Probatissimus in Cy-
pro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter
dicta salis genera lacustris præfertur: sed multo ualidissimus est Phrygi-
us, nomine tapeus, ut tritæus, aut gantæus. Salis natura, in commune p-
q̃ utilis est. Adstringit, abstergit, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat,
& crustas inducit. Sed hoc interest, q̃ alius alio sit præstantior. Quin &
a putredine uindicat. Ammiscetur medicamentis psoras abstergenti-
bus. Excrecentia in oculis reprimat, & pterygia cōsumit. Cæteraq; car-
nis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines
ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur. Dolores in
saccis fotu mitigat. Et pruritus sedat, ex oleo & aceto infrictus, donec
ad ignem sudent. Item lichenas, lepras, psorasq; Anginam ex melle, ace-
to, & oleo illitus leuat. Tonsillis, uuaq; cum melle tostus, ulceribus in
ore manantibus, gingiuis quas humor uexat, & phagedænis ulcerum
cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini se-
mine. Contra serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Aduer-
sus cæraſten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopen-
drę morsus cum melle & aceto. Aduersus uestparū ictus, & crabrones,
albidasq; capitis pustulas, thymos, & tubercula cum seuo uitulino. Fu-
runculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tu-
mores cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum
morsibus auxiliatur, tritus in linteolo & intinctus aceto, ita ut uinculis
loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in fa-

cie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cū aceto mulso bibit. **A**
Luxatis imponit cum farina & melle. Ambustis igni cum oleo im-
positus, pustulas erumpere non patit. Podagricis itidem imponitur, & au-
rium doloribus cum aceto. Ignis sacros & ulcera quæ serpunt cum ace-
to, aut hyssopo illitus sistit. Vritur ficuli, diligenter opertus, conditusq;
prunis, usq; dum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline, obliniunt,
& carbonibus subiiciunt, usq; dū pollen exuratur. Solet & sal cōmunis
eodem modo uri. Sed aqua semel abluitur & siccatus in ollam cōoper-
tam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat.

BARBARI COROLL.

Sal omnis, græci halas uocant, Panaceam Lucretius, a remediorum multitudine. Aut fit, ut
palustris, & maritimus: aut gignitur, ut fossilius: utrumq; pluribus modis, sed causa gemina.
Coacto humore, aut siccato, siccatur in lacu Tarentino. Item lacu Cocanico, in Sicilia, & alio
iuxta Gelan, & Pachynum, tanti splendoris, ut sentiat imaginem. Item in Phrygia, Cappado-
cia Aspendi, ubi tantum noctu subuenit, quantum in heridui auferas. Omnis est alius Sal minū-
tus, atq; non gleba. Lacus duo in Baetris sale aestuat. In Cypro, Cittiæ, ab oppido id nomē.
Extrahūt & Memphi, e stagno: dein sole siccant. Apud Caspias portas, quæ Salis flumina ap-
pellantur, superficie densantur in salem, amne reliquo fluente uelut sub gelu. Itē circa Mardos,
& Armenios, & in Baetris amnes Ochus, & Oxus, ex appositis montibus deferunt Salis ra-
mēta. Lacus in Africa, & quidem turbidi, salem ferunt. Calidi quoq; fontes, sicut Pegase, Oro-
menus, salis mons natiui est apud Indos, in quo ceditur renascens, magno uectigali Regū. Car-
ris Arabiæ oppido muros, domosq; massis salis faciunt, aqua ferruminātes. Inuentus & iuxta
Pelusium, inter Aegyptum quoq; & Arabiam etiam per Africā squalētia detractis harenis, us-
q; ad Hammonis oraculum, qualis crescere affirmatur cum luna noctibus. Hammoniacus tra-
ctu Cyrenaico celeberrimus, sub harenis, unde nomen, similis est colore alumini fissili, longis
glebis, neq; per lucidis, ingratus sapore, sed medicinæ utilis, leuissimus, intra specus suos in lucē
uniuersam prolatus, uix credibili pondere ingrauescens. Adulteratur cocanico & cyprio, mire
simili. In Hispania citeriore Egelest, ceditur glebis pene translucentibus, cui iam pridem palma
a plerisq; medicis tributa. In Medis Atropatena regione, stagno cui Spauta est nomen, sal coit,
pruritus & dolorem tactu ciens. Remedium, oleo inungere. Omnis locus in quo reperitur sal,
sterilis est. Vulgaris plurimus in salinis, mari affuso, non sine aqua dulci, sed imbre maxime iu-
uante, ac super omnia sole multo. Africa circa Vticam, construit acervos salis ad collium speci-
em: & in agro Rauēnati, Ceruia: ob id, ita ut puto, nominata, quasi Aceruia: qui sole & luna in-
durati, nullo humore diluuntur, uix ut ferro cedi possint. Fit tñ & in Creta, sine riguis aquæ
dulcis, & in Aegypto. Fit & puteis in salinas ingestis. Prima densatio Babylonis, in bitumē liq-
dum cogit oleo simile, quo et in lucernis utunt. Detracto subest sal. Et in Cappadociæ puteis, ac
fonte quem in salinas ingerunt, ubi & specularium modo lapidum effodit, magno glebarum
ponderet: quas uulgo Micas uocat. In Chaonia excoquunt aquā ex fonte, refrigerandoq; salē
faciunt inerrem, nec candidū. Galliæ, Germaniæq; aquam salis lignis ardentibus infundunt.
Hispaniæ quadam sui parte puteis hauriūt saluginem, Muriā appellant. Quercus ad id opti-
ma, alibi Corylus laudat. Carbo etiā in salē uertit. Quicūq; ligno conficit sal, niger est. Vmbri
harundinū, & iuncorum cinerem excoquūt aqua, donec exigū super sit humoris. Quin & mu-
ria falsamentorum recoquūt ad naturam suam consumpto rediens liquore, uulgo e menis io-
cundissimis. E stagnis maxime laudat Phrygius, Tattæi cognomento: et Tarentinus, quē antiq;
ad medicinæ usum uehementer probant. Tattæus e Cappadocia, magna Phrygiæ parte stagno.
Tatra Morimenorum gente nascit. Nam q fossilis in Cappadocia sal est, in laterculis affertur.
Colopeno et Camiseno tractu multus, ut Straboni placet, forminis gratissimus, qā cutis nitore
faciat. Magis tamen extendit Cittiæ. Salissimum Salem putant, q sit siccissimus. Suauissimū
esse Tarentinū, eundemq; candidissimum. Fragilis qcūq; candidus, pluuia dulcescit ois. Sua-
uiorē rores faciunt, copiosum aglones. In igni nec exilit, nec crepitat Acathius, ab oppido ubi
nascit uocatus. Nec Tragaseus ppe Smynthiū in Troade, ab aqs, quæ Tragafa dicunt, appella-
tus: siue ut Iulius Pollux, a Trago, cui Neptunus agros in Salē uerterit. Licebat hūc omnibus

Pli. li. 3. cā. 7.
& 9.

B

li. iii

C gratuito colligere. Vestigalem fecit Lysimachus, obaruit: uectigalibus remissis, denuo erupit. Sed nec ullius spiritu crepat in igne, nec rametum, aut tenuis Sal. Agrigentinus, ignis paties, ex aqua crepitu exilit. Rubens Memphi, croceus in Cappadocia, idemq; odoratissimus. In Baetris rufus circa Oxum Ceturupis, et in Aetna purpureus, & in Lusitania, ut inq; Strabo, purpureus albet, lumentor; & boui oculis Tragaseus, & Beticus pferit. Ad obsoniu, & cibum utilior quilibet facile liquecit. Item humidior, minus em amari sunt, ut Atticus, & Euboicus. Seruadis carnibus aprior Megaricus: qm acer, & siccus est. Condit Sal odoribus, quo & pulmentarij uice usi ueteres. Adeoq; necessariu elementu est, ut transierit intellectus ad uoluptates animi q; . Nam ita, ut inq; Plinius, Sales appellant. Hinc dicta salsa, & uia salaria: qm ea sal ad populos portari consueuisset. Ancus Martius salinas primus instituit, & populo congiarium e Sale dedidit. Sine Sale, hoc est, mola salsa, nullu sacru fiebat. Caunites efficax i collyria. Tebaicus ad pruritum. Laudat & a Sodomis Galeno. Sal, uiru, atq; nitru, sulfuri cōcoctu, in lapide uertit. Cornea piscatoru corpora dicunt, qd sole, & sale obduruert. De Agrico sale mentionē in Columella inuenias: nisi p gne nitri capiat, qd Agrion uocari docebitur: haud scio pterea qualis sit.

De Spuma salis.

CAP. CXVIII.

άλος ὄξυς

Halos achne spumosi salis ramentum, in exilibus petris inuentum, cui uis eadem quae sali.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 31. ca. 7.

Halofachne salis genus, & hoc sponte natum, spuma ex aquis maris in extremis littoribus ac scopulis relicta. Hæc enim omnis rore densatur, & est acrior quæ in scopulis inuenitur. In igni nec crepat, nec exilit. Ad omnia in quæ sales, probatur: spuma iocundior & utilior, Halofachnen uocant, & unum e quinque Alcyonij generibus.

EX M. VERG. COMM.

Salis seipsam solo nomine cōcrefcens in littoralibus petris, & in mari scopulis, fluctuū aspergine, salis lanugo potius q; spuma indicat. Plinius Spumam. 31. uolumine, cap. 7. appellat, ex propria achnes in grecis significatione. Hic tamen ἡλίθυμα eam esse dicens, lanuginem magis, cum iam in saxis concreuit, describere uidetur, facilem cognitu & inuentu rem.

De Muria.

CAP. CXIX.

ἡλμυρ

D

Muria effectus salis præbet. Abstergitq; . Dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit. Ischiadicis ueteribus ad fortius, aquæ marinæ usum præstat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 31. ca. 8

Salsugo, id est, Halme, iteq; Muria uocari pot, q; & aliud genus Murie inter sales diximus. A Garo differt Halme, etiam si utrūq; ad pisces Galeno teste pñet. Garus est sanies intestinorum ipsa, ut diximus secundo libro. Halme uero muries & falsilago pisciū inueterato; , hoc ē, ius salsum in q; seruant, quā mulieres nostræ uulgo Salimuriā appellant. Hæc a ueteribus & Salsugo thasia uocari solita est: ita condebant, inueterabantq; pisces ij, quicq; in pruna et craticula cōmode cog possent. Ob id eos Aristophan. Anthracidas, hoc ē, prunarios & carbonarios uocauit. Nos ut arbitror Aleculas. Huiusmodi sunt Smarides, & Menæ. Itē Chalcides, quas & Chalcidicas, & Sardas, & Sardinos q; appellat. Nā Chalceus. i. Saber, alius piscis ē orbiculari specie, Cyzici frequēs. Carbonarij sunt & Trichides, quas & Trichias uocat. Nā Trichiades ab Aristot. dicunt quæ Thyñides sint: quas tñ ipsas, ut Athenæus, qnto de partib. animaliu uolumine Trichidas nominat. Eiusdē fortis arbitror Epsetos, a coquēdo nominatos, q; Artemidorus etiā Plestos uocauit. Sed in Aristot. Theodo. Naricas interpretatus est, nescio q; uere. Piscis certe minurus ē Narica, ut Festus inq; . Plautus muriaticā Naricā i uasis stagnis apportat i comœdia. Illud in transcurso dixerim, Sardinos ab Aristot. intelligi nōnunq; eos, q a nōnullis Eritimi uocant. Differūt porro Eritimi, ab Erythinis. Nā Eritimos, ut dixi, sarda ē, uel sardē similis. Erythinus aut is ē, q a nostris uocat Rubellio. His gñibus pxime sunt & Thryssæ, quas Gaza noster, et ante Gazā Georgius tiphernas, in Strabōe Alosas, cōi pisciū cū mugili & delphinis Nilo. Sed ita cur uocēt, nondū cōpi. A qbus distat, q Thratte siue Thrassæ nominant, et a qbusdā Thette. Pisciculus et hic pusillus ac uersicolor. De Alosis ē qd dubitē, sint hē q; Romani uulgo Larias appellant, Alosas Gallia & Germania, Culpeas Venetiā, in inensum platīs, quæ Tiberino amne capiunt; an genus aliud, Athenæus qdem Laton piscem cōmemorat, quem Archestratus

poëta præstantissimū in Italia nasci cecinit, præsertimq; fredo siculo. Hunc in Nilo grandissimū euadere ducentas excedentē quandoq; libras. Esse autē candidissimū, & suauissimū, oibus modis paratū, similem glandi uocato, qui amne Istro capiat. Ex aceto & muria fit, qd oxalme dicitur. Sicut apud Cratinū ex allio & muria Scorodalmē. Qui iocularē quæstionē, siue gryphum in cōuiuio propositū non soluissent, multabantur haustu murie, sed ita, ut in uino paulatim, & cum interpiratione biberet. Apud alios uictis meracū, uictoribus osculū dabatur.

EX M. VERG. COMM.

Pro comperto nobis est, deesse huic capiti vires, potestatesq; illas oēs, quas salū hic idē scriptor paulo ante assignauit. Neq; em̄ uerisimile est, ex tā multis, unā tantū extēdī scilicet dictā ab eo fuisse. Persuadetq; id non tā antiqua scriptoris huius interptatio, in qua deinceps multæ aliæ numerantur, q̄ Plinius, 11. uoluminis, cap. 8. plures & ipse numerās, spissare, mordere, extenuare, siccare, & quæcūq; alia hic scriptor toto hoc capite docet: a quo isdem uerbis oīa reddita sunt. Credimus nos factū id ab aliquo, cui satis esset, in sale ea audisse, laboriq; in scribendo iterū quæ semel scripta fuissent parcens, eas neglexerit. Repetēdæ itaq; et in hoc caput reuocandæ ex sale oēs illæ erūt. Barbarus græcorū Halmen Saluginē uocauit, latioris forte ambitus, q̄ græcorū Halme certa res exigeret, uoce usus. Nos Muria auctoribus Columella, Plinio, Romanisq; scriptoribus alijs appellauimus: qui in medicina, & domestica re Muria semp uocauerūt. Ea duplex ueteribus fuit. Altera, qua in cōditura uini uterent: cuius cōfectionē & usum Columella docuit, 11. uolumine, capite. 26. Altera, quæ dura ab illis uocabatur: cuius cōfectionē & usum idē scriptor eodē uolumine, sed capite. 6. & 7. tractauit: qua in condituris olerū, radicū, pomorū, salgamorūq; omniū usa antiquitas est. Solūq; hoc genus Halme Dioscorides uocat: quoniā altera illa admixto sibi melle, nullū nisi in uindemia habebat usum. Eius cōfectio a Columella his uerbis docet. Doliū q̄ patentissimi oris, locato in ea parte uillæ quæ plurimū solis accipit. Id doliū aqua coelesti impleto, ea est em̄ huic rei aptissima: uel si non fuerit pluuia, fontana dulcissimi saporis sit. Tum indito sportā iunceam, uel sparteā, quæ replenda est sale candido, ut candida Muria fiat. Cum salē per aliq̄ dies uidebis liquefcere, & ex eo intelligis nondū esse Muriam maturā, alium subinde salē tamdiu ingeres, donec in sporta permaneat integer sal, nec minuat. Quod cum aniaduueris, scias habere Muria maturitatē suam. Et si meliorē adhuc uolueris, in uas bene picata diffundes, & operā in sole habebis. Omnē enim murem uis solis aufert, & odorē bonū præbet. Est illud etiā maturæ Murie experimentū, ubi dulcem caseum in eam dimiseris: si pessum ibit, scias esse adhuc crudā: si innabit, maturā. Et hæc cura antiquorū Muria fuit, qua in condituris salgamorū uillici & patresfamilias utebant. Medicina autē in plerisq; morbis, præsertimq; interaneorū exulcerationibus, & coxëdicis doloribus eadem rōne, qua secundo uolumine in Garo idem hic scriptor monuit: ut exulcerata ad cicatricem perduceret, & quæ exulcerata non essent, ad ducendum ulcus proritaret.

De Flore salis.

CAP. CXX.

Flos salis flumine Nilo defluit. Lacubus tamē quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu Gari. Interdum longe magis uirus olet, gustusq; mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autē rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea lyncærus nō nisi oleo resoluitur. Adulteratur nōnulla ex parte, etiā aqua diluente facticiū colorem. Ad ulcera quæ cacoëthe uocant, & phagedænas, genitaliū nomas, & purulentas aureis efficax est. Oculorū hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris, unguentisq; coloris caussa, ut rosaceo, miscetur. Sudorem cit. Aluū turbat in uino, aut aqua sumptus. Stomachū male habet. Additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum, acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

BARBARI COROLL.

Flos salis, id est, Halosanthos, siue Halyanthon, & Halasanthion, non fit, nisi aquilonibus. Est autē fauilla salis, quæ leuissima: ex eo est & candidissima, in totūq; diuersa res a sale, humidiorisq; naturæ, & crocei coloris, aut rufi. Si feces imæ concutiant in uasis, uelut rubigo salis

A

B

Aur. 2. 1. 1.

Pli. li. 11. ca. 7.

li. iij

D I O S C O R I D I S

C adulteratur, & testa trita. Florem Salis Cato uocat, qui e populari Sale candidus arte factus sit. Propterea & Alabaster a Democrito quandoq; dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Peregrina, nec satis certa res Italiae quondā salis hic Flos fuit. In Aegypto inueniri ab hoc, & ab alijs dictus, paludibusq; & fontibus quibusdam innatare. Quo minus demireretur aliquis, nūc in medicina parum cognosci, & nullum eius esse usum. Salis ueluti rubigo quādam ab alijs dictus salis Flos est, quoniam colore ruffo fit. Commendabatur tunc, qui olei pinguitudinem quandam redderet. Quod sane miretur aliquis, ab olei pinguitudine diuerso penitus sale. Certissime de eo Plinius. 31. uolumine, capite septimo egit: nihilq; nō ab hoc scriptore traditum, iisdem reddidit uerbis. Ob quam causam longius de eo non agimus, in scriptore eo cognoscenda relinquentes, si qua nouisse alia de eo aliquis optauerit.

De Nitro.

C A P. CXXI.

νίτρον

Praefertur Nitrū laeue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddā. Quale ex Illyrico affertur, a Buniorū ciuitate. Humores transfert qui alicubi concreuerūt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 31. ca. 10.

Nitrum, Graeci & Litron, uocāt attice. Veteres hoc ignorauere medici. Non multū a Sale distat, nec quisq; Theophrasto diligētius de eo prodidit. Exiguū fuit apud Medos, canescentibus siccitate conuallibus, uocabant Halmirhaga, minus etiā in Thracia, iuxta Philippos. Sordidum terra, quod appellant Agrion. Omissum est e quercu cremata fieri, propter impendia. Nitrosae uero aquae, multis locis reptae, sicut & sulphurosae, aluminosaeq; sed sine uiribus defendi. Optimū, copiosumq; in Clitiis Macedoniae, qd uocant Chalastricū, quo in pane utitur pro sale: cui & proximū est natura, purū & candidū, nitroso ibi lacu exiliente, e medio dulcis aquae fonte: quo semp emicante, nec augei tamen, nec effluit. Ibi fit Nitrū Canis ortu, nouenis diebus. Si fuere imbres, falsius, per aquilones deterius: totidēq; cessat, ac rursus inatat, ac dein de cessat. In Aegypto non nascit, sed conficit fuscū, lapidosumq; nitrarijs Nilo infuso. Siccantē excedente eo, decedente madet. Succo Nitri. 40. diebus cōtinuis, non ut in Macedonia statis, protinusq; ut densari est coeptū, rapitur: ne liqueat. Conditū in aceruis durat in lacu Asanio, & quibusdā circa Chalcidem fontibus. Sūmas aquas dulces, et poculentas tradunt: inferiores nitrosas. In Nitro optimū quod tenuissimū, & ideo Spuma melior, Aplronitrū uocata. Sordidum tantū probārad inficiendas purpuras, tincturasq; oēs. Nitrariae circa Memphim peiores, ubi & circa Naucratin dūtaxat solebant esse in Aegypto, nunc multis in eadem prouincia locis egregie uisunt. Lapidescit circa Memphim, multis ibi tumulis infusa. Nitrariae calciamēta protinus consumūt. Vlcerā allata, eo celerrime sanant. Ibi facta tarde. In Nitrarijs, non lippunt. Aegyptiū teneriores facit Rhaphanos, sed obsonia alba, & olera uiridiora. Salnitrū uocabulo uulgi dici, pulueri conficiendo necessariū: quo ad bellica tormēta utunt, nouitia, poenitendaq; ac pessimo publico inuenta. Diuersum a Nitri generibus existimo, indicitq; ueteribus, etiam si locus in Plinio est, ubi de hoc gñe loqui uideat. Sed eum nos mendosum credimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Ferunt quondam Nitri pluribus locis non aliter, q̄ alioz metallorū nitrariae fodinae: alijs quibus etiam siccatis sole nitrosis aquis & paludibus fiebat. Et ne longiores simus, nullū quale nostra aetate est, ficticiū Nitrum tūc erat: nec eum quem nostra aetate usum, in missilibus igne tormētis habet, in antiqua militiā habuit. Vtebatur eo medicina tantū. Nihilq; Apsyrto in ueterinaria medicina frequētius est. Quoniā salis modo auiditate cibi morbofo pecori excitaret. Simulq; quā habet pellendi ui purgaret. Vtebat & ganea, in qua periti eius obseruauerāt, tene rescere Nitro multa, praesertimq; herbarū radices, candorē obsonia contrahere, & olera uirtdio ra fieri. Ex quo usu Martialis etiā cecinit. Ne tibi pallentes moueant fastidia caules, Nitrata uiri dis brassica fiat aqua. Quod totū legentes monuisse placuit, ne quis ab hoc, et ab alijs de Nitro dicta, de Nitro nostrae aetatis, quē Salem Nitrum oēs passim noiant, dici existimet. Laudauit antiquitas Nitri ob diuersos usus, diuersis locis nascens. Hic ex bunis spongiosum alijs ante-

posuit; non satis certa loci indicatione. Omittimus quæ Plinius, 31. uolumine, capite. 10. retulit, optimū, copiosumq; in Clitis Macedonia nasci. Nihil enim quod ille ait ad scriptoris huius. Bunos pertinet. Qui si hoc loco colles simpliciter significant, fossile & ex montanis erutū cæteris uidetur Dioscorides anteposuisse: sin cōtra, non colles ea uoce, sed certū aliquem significauit locū: in ambiguo tunc res est. Plures em diuersis regionibus urbes, & oppida hoc nomine in antiqua Geographia audiuntur: quia in collibus ædificatæ habitarentur sic nominatæ. Bunos enim Græci cespitibus erectas aras & tumulos uocant. Siquidem in Illyrico, in Eptaro, nec procul ab Antycira eodem nomine Buni urbes & oppida fuerunt: ut testati Stephanus Bizantius, Plutarchus, pluresq; alij sunt. Nobis inclinatur animus in eam quæ non procul ab Antycira a Plutarcho describitur, in commentariolo, cui titulus est, utrobi, in terrestribus, an in aquatilibus brutis maior sit prudentia.

¶ De Spuma Nitri. CAP. CXXII.

Spuma Nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore pene purpureo, aut spumosa, & mordens. Qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariae gignitur. Vim & uisionem salis habet tam Nitrum, q̃ Spuma eius. Præterea Nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti Ruta, uel Anetho. Febribus circumitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessiōem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autē calida, aut uino infusa, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. Sordes expurgat cum aceto instillata. Canum morsibus ex asinino adipe, aut suillo medetur. Resinæ admista furunculōs aperit. Aquæ inter cutem cum fico illinitur, opisthotoniscq; iam remissioribus, & luxatis cum cærato. In resolutione linguæ panī cōmode permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urūt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

BARBARI COROLL.

Aphronitrum, siue Aphrolitron maxime laudatur, quia sit Nitri pars tenuissima. Hæc ueteres negabant fieri, nisi cum ros cecidisset prægnatibus nitarijs, sed nondū parientibus: itaq; non fieri incitatis: etiā si caderet. Alij operimētore, acruorūq; fermento gigni existimauere. Proxima ætas in Asia colligi tradit, in speluncis distillans molibus: specusq; eos Colycas uocant, dein siccāt sole. Lydiū in pastillis affert. Aegyptiū in uasis picatis, ne liqueat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiunt. Differt Aphronitru, ab Aphonitro. Id qd Spuma sit, tritum esse in pollinē affirmāt. Candidū, & triticæ farinæ simile. Aphonitru uero, siue Apholitru congelati specie coit: eoq; in balneis quotidie, ut Galenus inquit, ad extirpandas sordes utimur.

EX M. VERG. COMM.

Nec eadem, nec diuersa Nitro penitus Nitri Spuma antiquis fuit: isdem locis cum Nitro nascens, & aequali illi potestate: aspectu tamen alia, quo tenuior Nitro, eo etiā melior. Discrimen in nascendo potius q̃ substantiæ eius erat. Prægnantibus enim, sed nondū parientibus nitarijs, ut Plinius ait, Spuma colligebatur. Eratq; ob renuitatem suam Nitri Spuma præuius, & in summū emergens, simulq; conrescens humor. Sunt tamē in græcis, qui testentur fieri Nitri Spumā, a ceruore nitri, ueluti fermento quodam, ex quibus referuētibus hæc ueluti Spuma emergeret. Quod in multis alijs sit, feruore suo se purgātibus. Addiderūt aliq; in priore illa colligendē nitri Spumæ rōne, non concerni eā in nitarijs, nisi nocturni accesserint rores. Quocūq; aut modo se res habuerit, qd tenuissimū ex Nitro se proferebat, id Nitri Spuma quondā dicebatur: multi, ut uidet in medicina usus, a Nitro sola bonitate diuersa. Ob quā causam, & si forte uno, eodēq; capite continuata historia de utroq; traditū quondā a Dioscoride fuerit, nos tamē aliorū omniū rationem secuti, seorsum de utroq; egimus. Neq; est quod ultra moneamus, q̃ fuisse quondā pro sale aliquibus locis Nitri huius usum: tanta illi similitudo coloris, saporis, & to-

A

αφρόνιτρον

B

Pli. li. 31. ca. 104

D I O S C O R I D I S

Cnus substantiæ est. Posseque adhuc inueniri, & in eodẽ usu gentibus aliquibus esse: id tamen pro comperto nobis nõ est. Quemadmodũ sine controuersia a cunctis recipit, nullũ fuisse usum, nec confectionẽ aliquam eius, qđ nunc decocta terra ad usus belloꝝ fingit, & Salem Nitru uo cant. Magna cum illo similitudine, & naturæ id generantis imitatione excogitatũ.

¶ De Fæce.

C A P. CXXIII.

ELigenda Fæx maxime a uino uetere, Italico: sin minus, ab alio con simili. Fæx aceti uiribus longe acrior est. Crematur ut alcyonium, ante diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incandescat. Alij uiuis carbonibus Fæcis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ Fæcis aceti ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. Vlcerata ad cicatricem perducit. Vehemẽter exest, siccataq; . Sed recenti utendum est, quoniam celeriter exanimatur, aperta, & nullo uase condita. Lauat ut Pompholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. Ventris, stomachiq; fluctiones illita sistit. Muliebri profluuium, imo uentri, aut genitalibus imposita, mitigat. Panos discutit, nondum exulceratos, & tubercula. Turgentes mammas suiq; lactis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cum resina uero ambusta, & scabros unguis aufert. Addito lentiscino oleo illita nocte tota, ruffat capillum. Elota, oculorum medicamentis, ut spodos adijcitur. Cicatrices, & eorum caligines eadem abstergit.

B A R B A R I C O R O L L.

Vini Fæx, græce Tryx uocatur, utiq; nõ usta, sicut usta Sphecle, quasi fæcula, interim Sphecle pro fæce cruda quoq; Græci capiunt, ut Paulus. Fæci tanta uis est, ut descendentes in cupas enecet. Experimentũ dimissa præbet lucerna, qđ diu extinguitur descensionis periculũ denuncians. Siccata recipit ignes, ac sine alimẽto persflagrat, cuius uis & natura quæ Nitro. Fæx cum expirauerit, lauandis corporibus, & uestibus est utilis. Fæx aceti pro materia acrior sit oportet. Vtriq; multum adijcit uirium crematio. Habet & suam sapa fæcem. Cratinus poëta comicus, hoc est, Tryga, pro uino quoq; accipit aliquando. Apud nos quoq; Fæculam, qui dixerit, pro uino meminisse uideor.

E X M. V E R G. C O M M.

Sedimentũ uini, cum in dolio deferbuit, Fæx est: nota omnibus, & nisi in medicina uires aliquas habeat, homini penitus inutilis. Crude pariter & coctæ usus quondam fuit. Vocauit Fæcem posterior græcor; medicina etiam Pheclam. Copiosaq; in græcor; medicis ea uox est, quæ crematã priuatim significant. Eius non meminit Dioscorides, quoniã sua ætate nullũ erat forte adhuc id nomen. Illud humaniores literas profitentes nouisse, & obseruasse uolumus, quod a nobis dictum est. Utendum recente est: ciuillime em efflata ui languet: eamq; ob causam diligentissime operculanda: nec nisi uase aliquo clausa seruanda est: a Plinio breuius & aptius dici, Celeriter exanimatur, non in cluso condita. In quo exanimandi uerbo usus, animam ad omnem halitum, & ut Græci dicunt, ἀπὸ ψυχῆς, contraxit.

¶ De Calce.

C A P. CXXIII.

CALX HOC modo fit. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano nocte dimittito: postera die si candidissima fuerit, extrahito. Sin aliter, iterum urito, usquedum uehementer inalbuerit. Dein ubi in aquam frigidam immersa fuerit, in fictile nouum conijcito, & exacte pannis operiens, noctem unam conquiesce

resinito. Mane eam extrahens, si ad intentum finem perducta est, recon-
dito. Fit & e glebis lapidum crematis, necnon e uili marmore: quæ cete-
ris præfertur. Vis omni Calci in commune ignea, mordens, adurens, &
crustas inducens. Quibusdam alijs immista ut adipi, oleo, concoquendi
uim assumit, & dissipat. Vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existi-
matur recens, nec aspersa aquis.

B A R B A R I C O R O L L.

CAlx uiua, id est, Asbestos. Differt ab ea Calce, quâ Græci Titanon appellant, ut spēs a ge-
nere: item a Maltha, quæ fit ex Calce recenti. Vino restinguit, mox tundit cum adipe fusillo, et
ficu duplici linamēto: quæ res omniū tenacissima, & duriciā lapidis antecedens. Quod mal-
thatur, oleo perficitur ante. Galenus in Hippocrite, Maltham pro cera capit.

E X M. V E R G. C O M M.

Titanos inter uenena ab hoc ipso scriptore sequenti commentario nominatur, quæ hoc lo-
co Asbestos ab eodem dicta est: specie tantū, ut aliqui crediderunt, diuersa: ut nos autē in græ-
cis obseruauimus, solo architectorum usu: qui Titanon intellexisse uidentur, eam quā parie-
tibus tectoria inducerentur. Et quoniam Gypso id aliquando fieret, Gypsum saepenumero ea
uox græcis etiam significat. Quinetiam *τῆς τοῦ τῆς* uerbum illis inter cetera, Gypso inducto te-
gere & oblinire est. Verumtamen sola Calx utraq; appellatione illa indicatur. Quæ posuit ex
diuersa materia, ut hic ait, facta, in architectura diuersos habere usus. In medicina tamen con-
traq; in ueneni maleficio, utrumq; enim Calx præstat, nullum huiusmodi discrimen a natu-
ra accepit. Omnis enim Calx sine generis discrimine nocet, & prodest.

De Gypso.

CAP. CXXV.

GYPSUM VIM habet adstringendi, obstruendi. Sanguis
nis eruptiones, sudoresq; cohibet. Sed potum strangulat, quo-
dam suffocationis modo.

B A R B A R I C O R O L L.

Gypsum, siue Gypsus, siue Spygos, ut Theophrastus quoq; noiat, plura habet gñā. Nam
& coquit e lapide, ut in Syria, & Phœnice, ac Thurijs. Et terra fodit, & quidē summa eius cu-
te, ut in Cypro. Copiosa itē Aetolia, circa Peroëbiā, atq; Tymphem: a quo & Tymphaciū, si-
ue Tympheticū uocatur. Qui coquit lapis, non dissimilis Alabastrite esse debet, aut marmori
eroso. In Syria durissimos ad id eligūt, coquitq; fimo bubulo, ut celerius urant. Optimū fieri
comperit ex speculari lapide: qui & Diapahnes uocat, squamam uitalem habente. Gypso
madido utendū est, quoniā celerrime coit. Inepa fit operi duricies: tamē rursus tundi, & in fa-
rinā resolui patitur. Natura Gypsi caloris in terendo tanti, ut rudiculis non manibus tractari
possit. Tenacissimus ob id usus eius in albarijs sigillis ædificiorū & coronis gratissimus, & ad
uaporaria conclauia apud nos, quæ Mappas ex nostra consuetudine uocamus. Græci pro Cy-
molia, uestibus poliendis, Tymphacio utebant Gypso, Theophrasti ætate. Hinc Gypsati ue-
nalitior pedes, ut in Cymolia diceb. Est & in Gypso qd flos appellat, ueteres Chymiste, Argen-
tum uiuū, gelu astrictum, hoc est, spissatum, iam addensatumq; Gypson uocabant.

E X M. V E R G. C O M M.

Cognata calci res Gypsum est. Plura numerantur eius genera, priuatimq; a Plinio libro
36. capite. 24. Poterunt uolentes ab eo singillatim omnia audire. Posteriores græcorū medici
de uiribus eius certius docuerūt, siccare, & opplere Gypsum dicentes, & in compescendis san-
guinis profluuijs cum farina polline, & oui albo usum eius esse. Cremari ut cetera Gypsum
etiam, crematumq; opplendi uim amittere, sed in siccando efficacius fieri.

De Sarmenticio Cinere.

CAP. CXXVI.

Sarmentorum Cinis urendi uim habet. Cum axungia autē, uel ace-
to illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum no-
dis prodest. Cum nitro & aceto excrementias carnis in scroto reprimi-
t. Serpentiū canumq; moribus illitus ex aceto medetur. Crustas obdu-

A

Pli. li. 36. ca. 34

374

B

Pli. li. 36. ca. 34

τῆς ἀλματιῆς

Centibus medicamentis ammiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

Pli. li. 17. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Cinis, Græce Conis, & Spodion, & Tephra dicitur, & Coloscertos poetice. Sed lixiuium Conia. Apud nos Lix: unde Lixiuui, & Lixiua, & ut Columella uocat Lixiua. Cinis foci uocatur: dictus forte, quia luxatis in potu prodest. Vnde Gladiatores cum delussissent, hac iuuari potione uidebantur. Cineri omni uim ascriptoriam inesse, Dioscorides uoluit. Negat id Galenus: utiq; ficulneo. Ipsum quoq; uinum, quod anteq; prælo pressum sit, aut nimium calcatae uix in lacum musti fluxerit, Lixiuum, aut Lixiuum mustum appellatur, a Græcis uero Prothyma. Nam & Protofactum inuenio apud Paulum. Sed pro cinere Lixiuo, qui primus distillauerit, ut coniectura capio. Calidum cinerem Hippocrates Marilem appellauit.

ἀλκυονίς

¶ De Alcyonio.

C A P. CXXVII.

Alcyoni quinq; esse genera, compertum est. Vnum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie. Item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plerūq; in littoribus inuenitur. Alterū pinnullae oculorū, aut spongiæ simile, fistulosum, & læue, odorē algæ referens. Tertium uermiculi forma, & colore, magis purpureum, quod Milesium uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, spongiosum, læue. Quintū figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre. Quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur. Patrio nomine Halos achnen uocāt. **D**uo priora, in sceminarū smegmata assumuntur. Contra lentigines, lepras, uirilgines, nigricias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertiū ijs qui difficili urina uexantur, aut harenulas in uesica colligūt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex uino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. In alia absterforia, psilotracq; assumitur cum sale mistum. Si quisquam Alcyonium cremare uelit, in crudum fictile mittat: & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet: & cum figlinum percoquetur: extrahens ad usus recondat. Lauatur ut Cadmia.

Pli. li. 32. ca. 5.

B A R B A R I C O R O L L.
Fit in mari Alcyonium ex nidis, ut aliqui existimāt Cæicum & Alcyonium: quas nostri Alcedonas uocant, quasi Algedonas, ab Algore, ut alij, e fordibus Spumarum crassescens, alij e limo, uel quadam maris lanugine. Quo candidius, hoc minus probabile. Dioscorides quinq; genera dinumerat. Plinius quatuor. Primū quale Dioscorides. Secundum molle, lenius, odore fere algæ. Tertium candidioris uermiculi. Quartū pumici & spongiæ putri simile, pene purpureum: quod optimum: hoc & Milesium uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non ausim ego nunc censere, an quæ in antiquis græcorū & latinorum poëtis, discedentibus a se mari, aut eodem elemento ad se reuersuris coniugibus, & amoribus suis Halcyonios precabantur dies amicæ & uxores, bona fide pro salute eorū uota, precesq; conciperent: An utliceret illis per brumam septem diebus, tranquillo mari, ad nitorem læuorēq; cutis Halcyonium tuto expiscari. Mala enim mulieris mens, & ad nouas uoluptates sedulus animus, conciliandis nouis amoribus continue studet: gaudetq; aliud agere credita, quibus subinde placeat formæ suæ lenocinio quærere. Id certe uerissimile est, & facile credat aliquis: Halcyonium, quo quotidie ad uultus decorem uterentur, certius q̃ Halcyonios dies nouisse forminas: reliq; uiris tota maris & navigationis obseruatione, unde speciem suam augerent diligentius curasse: neq; ex fabulosa Ceycis, & Halcyones historia aliud, q̃ Halcyonium nouisse lenocinio for-

ma nascentem in mari rem: siue ex Halcyonum nidis reliquiæ, siue crassescences spumarum for-
des, siue limus & maris lanugo quædam id sit, Nomen illi Halcyones marinæ aues fecerunt,
haud sane quia ex earum nidis Halcyonium mari innatet, sed quia ex eo mari innatanti & flui-
danti Halcyones aues nidos sibi ad foeturam faciant. Prius enim Halcyonum nidis spuma &
lanugo illa maris est: tum ex ea Halcyonum nidi: & quoniam Halcyonibus ad foeturam inser-
uiat, Halcyonium dictum est. Discrepat in generum numero ab hoc scriptore Plinius: ille qua-
tuor, hic quinque genera eius facit, nec ipsæ notis ambo quocumque ea sint indicant. Quodque
a Plinio non numeratur, quin tum illud nobis uidetur fungorum figura, sine odore, & asperum.
Poterunt id certius uolentes in Plinio uidere lib. 32. capite. 51.

De Adarce.

CAP. CXXVIII.

FIt in Cappadocia quod Adarces appellatur. Est autem concreta sal-
silago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & harun-
dinibus ac hærbis agglutinata, colore flori lapidis Asiatici similis, &
omni forma molli Alcyonio, & aliquantum cauo proxima, tanquam lacu-
stre Alcyonium esset. Ad euellendas lepras, lentigenes, lichenas, & uis-
cia cutis in facie accomodatur. Et in summa, uis ei acris. Humorem euo-
cat, qui in aliqua parte concreuit & ischiadicis prodest.

BARBRAI COROLL.

ADarca, & Adarcion, & Adarces, & Adarcos dicitur. Item Calamochneus, id est, calami
lanugo. Plinius latinum Adarcæ nomen putauit, in Italia nascentis circa tenues harundines,
hoc est, in cortice calamorum, sub ipsa coma, e spuma aquæ dulcis ac marinæ, ubi se miscent.

EX M. VERG. COMM.

Calamochneum, id est, harundinum lanuginem Adarcem hunc in græcis aliqui nominau-
runt: factum, quia in harundinibus concreta lanuginis modo inuenitur, illi hoc nomine. Credi-
musque nos, non excusandi lapsus Plinio occasione eam dedisse uocem. Is enim quod ante nos
alii etiam deprehenderunt, lib. 16. capite. 37. inter harundines Adarcem his uerbis numerat.
Est & in Italia nascentis Adarca nomine palustris, &c. Tum cum tota fere naturam percurrisset,
ageretque de aquatilibus, 32. capite. 6. inquit. Inter aquatilia dici debet & Calamochneus, latine
Adarca appellata. Nascentem circa harundines tenues, spuma aquæ dulcis, & marinæ, ubi se mis-
cent. Plura sunt duobus his locis eius scriptoris errata. Primum, quod plantam cum hærente & ad-
nata illi spuma miscet, confunditque rei intellectum: tum quod Adarcem latinam uocem esse affirmat,
cum græci passim pro sua ante latinis uisi ea fuerint: mox in Italia nasci, contra Dioscoridis, &
aliorum omnium decreta. Barbarus etiam hoc capite quod Diosco. περί πικρῶν καλὰ μοι καὶ
χρησίων ait, monetque concrecere Adarcem in harundinibus, & herbarum cremis, farragine
dixit, contra rei rusticæ auctores omnes, farraginis uoce in ea re usus. Habet enim farrago cer-
tæ rei in pecoris pabulo significationem: ut certius illi docuerunt.

De Spongijs.

CAP. CXXIX.

Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas, quarum
duriores Tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ contrari-
as dotes habent. Vruntur eæ ut Alcyonium. Recentes sine pinguitu-
dine uulnerariæ sunt, & tumores reprimunt. Recentia uulnera ex aqua
poscaue conglutinant. Veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetus-
tæ autem inutiles. Aridæ & ligatæ lino, si penicilli modo adigantur,
occlusa ulcera, callosque laxant. Recentes & uacuae senilia ulcera, & que
fluctatione laborant, aut cuniculatum exedunt, imposito siccant. Sanguis-
nis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini
auxiliatur. Et ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius,

KK

Cin oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura fiunt, e molliissimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris cohæret. Infolantur inuersæ, hoc est, parte caua fursum spectante: et qua adhæsere, deorsum. Si uerò æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, persusæ salis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Pli. li. 9. ca. 35
lib. 21. cap. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

Spongia, græce spongos appellatur, itemq; Spongia, ut dicunt Attice. Inter Zoöphyta, hoc est, quæ nec animalium, nec fruticum naturam, sed tertiam ex utroq; sortiantur. Nascuntur oēs in petris. Aluntur conchis, pisce, limo. Vbi autulforem sensere, contrahunt se, ac multo difficilius uelluntur, exprimentes abundantiam humoris, abscessu uero sanie emittentes. Circa Toronem, ut inquit Aristoteles, uelci conchis minutis intra eas repertis cōstitit, auulsasq; aiunt, & ex relictis radicibus recrescere. In petris cruoris quoq; inhæret color, Africis præcipue, quæ generant in syrtibus. Maximæ fiunt Maucæ, sed molliissimæ circa Lyciam penicilli: in profundo autem nec uentoso molliores, unde ablatae sint spongiæ. In Hellesponto circa Malearti uero aspæ ac densæ, putrescunt in apricis: ideo optime in gurgitibus. Viuētes, madetescq; ac illorū, nigricant. Adhærent nec parte, nec toto. Inter sunt em fistulæ quædam inanes, quaternæ fere, aut quinæ, per quas pasci existimatur. Item aliæ, sed superne concretæ: & subesse membrana quædam radicibus earū intelligitur. Viuunt longo tempore. Pessimæ sunt Aplysiæ, quia erui nō possunt, in quibus maximæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissa. Ceterū aliter discreuere genera. Earum quædam tria faciēdo. Spissum ac predurū & asperū, qd Tragos, idest, Hirculus uocetur. Alterum spissum & mollius, quod Imauos. Tertium tenue, densumq; Achilleū, inuentu rarū. Hoc galeis & ocreis inseritur, ne strepitum gestatu cieant. Ex eo peniculi fiunt. Medici inscitia, ad duo eas genera redigere. Africanas, quarū firmitus sit robur. Rhodiacas, quæ ad fouendū molliores. Nunc aut molliissimæ circa Lyciæ urbis Aniphelli muros inueniuntur. Mares quæ dicuntur perforbent, tingunturq; in delictis aliquando & purpura. Fœminis fistulæ maiores, ac perpetuæ: Tragis tenuissimæ ac densissimæ. Ab aquilone genitas ceteris præferunt. Nec usq; diutius durare spiritum medici, q̃ in Spongiis affirmant. Sic & prodesse corporibus, quia nostro suum misceant. Hoc genus remediij Aposphongismō Archigēnes, & secuti eū medici appellant. Quia uero de peniculis diximus, scire oportet, nō Spongias mō, sed & e codis q̃q; fetas. Penicillos a ueteribus esse nominatos, quibus calciamenta tergebant: ob id & Tergenteas uocabant eas aliqui: nos uulgo Setulas. Est em penis, idem qd cauda. Vnde Penita ossa, obsemen carnis porcine cū coda significat.

E X M. V E R G. C O M M.

Tertium habet in natura Spongiæ ordinem nec frutices, nec animalia, sed inter utrūq; hoc genus medium quiddam, in quo mixta simul animalis, & plantæ natura est, Zoöphyta græci omnia appellant. Pluribus locis in mari nascentes, diuersisq; nominibus ab antiquis distinctæ: quoniam non una sit earum forma, bonitas, & usus. Hic quod ad faciendam ex eis homini medicinam pertineat, satis hoc capite tradidit. Quod autem ad historiam, certius Aristoteles libro quinto de animalium historia, a quo accepta omnia Plinius lib. 9. primum capite. 35. tum. 31. capite undecimo ipsdem retulit uerbis. Quæ a Barbaro in Corollario suo etiam collecta, sine desiderio legentium a nobis relinquuntur. Quomodo autem uulnerariæ Spongiæ sint, manifeste docuit eodem loco Plinius, dicens. Fracturæ, & uulnera spongiis utilissime fouent. Sanguis rapitur in secando, ut curatio perspicui possit: & ipsæ uulnerum inflammationibus imponuntur. Multaq; alia, quæ idem scriptor & alij in uulnerum curationibus tradiderunt. Quod dictum a nobis est: ut scirent legentes aliter uulnerarias esse Spongias, q̃ plura alia sint quæ toto hoc opere a Dioscoride τριφυτικῆς, id est, uulneraria dicuntur.

De Corallio. C A P. CXXX.

cap. 21. lib. 21.

Corallium, quod aliqui Lithodendron appellarunt, marinum esse fruticem constat, qui imo extractus duratur statim, atq; emergit, tanq̃ offuso ære protinus concreascit. Plurimum inuenitur Syracusis, in promontorio cui Pachino nomen est, Laudatissimum rubens, eo

lore Hastulae regiae, aut Sandycis meri, nec secus terenti facile cedens, A
 æquabili usquequaq; cōcremento, rursus algæ, aut fuci marini odore,
 q̄ ramo fissimum, cinnamomi æmulum, forma fruticis. Quod autem
 in lapidis duriciam cōit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum
 existimatur. Adstringit & mediocriter refrigerat. Excreſcentia cōercet.
 Oculorū cicatrices abstergit. Vlcera caua, & cicatrices explet. Con-
 tra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. Vrinæ difficultati au-
 xiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

BARBARI COROLL.

Quantum apud nos Indicis margaritis præcūm, tantum apud Indos Corallio. Gignitur
 & in rubro mari. Sed nigrius. Item in Persico uocatur face. Laudatissimum in Galli
 co sinu circa Orchadas: & in Siculo circa Heliam, & Drepanum. Nascitur & apud Grauiscas
 in Italia, & ante Corniculum, & Neapolin Campaniæ, maximeq; tubens: sed molle, & ideo ui-
 lissimum Erythris. Color sub aqua uiridis. Baccæ eius candidæ ac molles. Extra rubescunt,
 induranturq; ceu corna satiuæ magnitudine ac specie. Aiunt ractu protinus lapidescere si ui-
 uat. Itaq; occupari, euellitq; retibus, aut acri ferramento præcidi, a quo & Corallio, quasi cu-
 rallio ἀπὸ τοῦ κορυλλῆος nomen inditum: nec aliter sane Theophrastus, q̄ Curallium appellat, a ra-
 dendo scilicet: ob id & Gorgonia quoq; dictum putatur: itemq; Dendritin, hoc est arboreum.
 Probant q̄ maxime rubens, & q̄ ramolissimū. Damnant inane, aut concauū. Auctoritas Bac-
 carum Indis, utroq; sexu preciosa. Religiosum etiā id gestamen Haruspices eorū, uatesq; in pri-
 mis habent, priusq; hæc notescerent. Galli gladios, scuta, galeas adornabant Corallio: postea
 Indis Vniones suas pro Corallio mutuantibus, in penuria esse coepit. Surculi eius infantiæ ad
 alligati, tutelam habere creduntur. Ignibus diu repugnant. Est & lapis Corallius, uel ut qdam
 scribunt Colaris, multū a Corallio diuersus, Pyrites s quibusdam appellatus: quoniam sit pluri-
 mus ignis illi. Sed est alius etiamnum Pyrites, in mentionē suam seruandus. Qualis porro la-
 pis Erythros, hoc est, rubens, ab Hippocrate significetur, quo mulieres inquit explorantur, an
 sint prægnantes, nisi aut Corallium sit, aut Pyrites, aut etiā Hæmatites, affirmare nihil habeo.

EX M. VERG. COMM.

Rescit arboris modo, & in duriciem lapidis duratur in mari Corallium. Nota nunc res
 omnibus, sed in nullo fere honore, si antiqua repetatur eius gratia, qua preciosissimis in natura
 gemmis prælatum in gentibus aliquibus diu fuit. Siccandi, & mediocriter repurgandi uim illi
 ueteres græcorum medici tribuerunt: ideoq; cruentis sputis, ut illi etiam tradiderunt, utile.

De Antipathe. CAP. CXXXI.

Quod Antipathes uocat, Corallium esse arbitrantur, specie tan-
 tum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum
 magis. Vires supradicti habet.

BARBARI COROLL.

Antipathes, pro genere Corallij, quale sit in Plinio, haud facile docuerim: nisi quis intelli-
 gat fruticem circa Troglodytarum insulas, nascentē in alto, quē Isidos Plocamon uocari tra-
 dit, Corallio similem, sine folijs sentiri eum, se capi, durariq; colore in nigrum, cum cadat fran-
 gi. Theophrastus Corallij duo uidetur statuere fastigia. Vnum quod rubens, rotundumq; est,
 ut Radicula in mari nascens. Alterum huic nō multū dissimile: quod Calamus inquit uocatur
 Indicus: qui duratur in silicem. Plinius inter gēmas enumerat Corallida, minio similē: quæ in
 India, Syenæq; gignatur. Fortasse per Theophrasti tēpora, minus erat Corallij uulgatus usus.

De Phrygio lapide. CAP. CXXXII.

Phrygius lapis quo infectores in Phrygia utuntur, a qua nomen
 accipit. Nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus,
 modice grauis, inæquali compage corporis, intercedentibus albis seg-
 mentis, ut in Cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuiscq; car-

KK ij

Pli. li. 32. ca. 2.

B

ἀντιπαθε

Pli. li. 37. ca. 10

ἀπὸ τοῦ φρυγίου

D I O S C O R I D I S

C bonibus obrutus perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat. Rursus eodem uino restinguitur. Hoc iterum & tertio faciendum. Attendēdū tamen, ne minutim confringatur, et in fuliginem euanescat. Vis crudo ustoque adstrictoria, expurgans. Vlceribus crustas quadamtenus inducit. Ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut Cadmia.

Pli. li. 7. ca. 19

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

Gentis nomen habet Phrygius lapis, pumicosa, ut Plinius ait, glebat Italiae semper peregrinus, nūc aut nulli cognitus: & ex eo, quod praeceptum habere fertur, in nullo nostra aetate usū.

De Asio lapide.

De Asio lapide. CAP. CXXXIII.

Asius lapis assumi debet pumicosus, levis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas melini coloris ad imū actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compagine tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergēte. Admotus linguæ aliquantum mordet. Vim habet uterque adstrictoriam, et modice erodentem. Ammistus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longe ualidior flos existimatur. Cæterum siccatus flos, uetera ulcera et cicatrici repugnantia sanat. Excrescentia cohibet. Tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat. Vlcus caua explet, depascentiaque cū cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento, & lienosis ex aceto & calce. Prodest phthisicis linctū. Podagrici iuuantur pedibus in solio, ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoque oculi, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporū crassiciem absumunt, uice nitri in balneo. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Pli. li. 16. ca. 17

BARBARI COROLL.

Asius, et Asia petra dicitur. Est et Asius per duplex, scilicet, ab Asio Troadis, ut inquit Plinius. Sed ab Asio diuersus. Ille Sarcophagos quoque nominatur, ab effectu: qualis & in Lycia, & in Oriente habetur. Et in Mysia quoque inueniri eum Stephanus affirmat. At noster hic per simplex, scilicet, fere scribitur ab autoribus, gustu falsus. Corpora defunctorum condita Sarcophago, consumi intra 40. diem, sed illata quoque mortuis, lapidea fieri traduntur. In Oriente adalligata uiuentibus erodunt ea.

EX M. VERG. COMM.

Longe breuius quam hic ceteri graecorum medici lapidis Asii, florisque eius uires tradiderunt: extenuare quidem, sed sine erosione dicentes. Eamque ob causam humentes & flaccidas carnes absumere una πρὸς τὸν αἶμα uoce complexi, quæ tam multa singillatim a Diosc. numerantur.

De Pyrite lapide.

De Pyrite lapide. CAP. CXXXIII.

Pyrites lapidis genus est, a quo æs extrahitur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur sic. Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec rufescat. Alij in carbones igni candentes, lapidem melle persusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere coeperit, extrahunt. Efflatoque cinere, rursus in adfaciū cremant, donec æquabili tenore assiccatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusque reconditur. Si ex toto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi, quam uisti uis est exalsa.

cere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duricias conco-
quere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne
cohibet, sed calorem quandam & adstrictionem parit. Ita ustum non
nulli Diphryges appellant.

PYRITES, sunt qui & Sideriten uocent, & Androdamanta, & Bostrychiten. In Cypro repe-
riri uolunt, & in metallis, quæ sunt circa Acamaniam. Vnum argenteo colore, qui & Argyri-
tis a Democrito cognominatus uidetur. Alterum aureo. Aliqui tertium genus faciunt, quod
plurimum ignis habeat, ponderosissimumq; sit: quos & uiuos appellamus. Hi exploratori-
bus castrorum maxime necessarij: quia clauo, alteroue lapide percussis, excutuntur scintillæ,
quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, aut folijs celerrime ignem trahunt. Pyrites & gemma
est, nec scio an diuersa ab hac. Nigram esse inuenio, & attritu digitos urentem. Pro Pyrite, in
medicinas uenit Mylios, siue Mylitis, Cochlax appellatus, hoc est, molarius, insula Nisyro plu-
rimus, ab Hippocrate Lapis niger, ut Galeno placet. Mylias ab Theophrasto & Heliano, ex
Aethna monte fluens, luti nigri modo in Sicilia, post durefcens colore custodit. Fluunt & Py-
romachi dicti, ut idem Theophrastus ait.

Pli. li. 36. ca. 19.

EX M. VERG. COMM.

Igniarium fuit quondam, quemadmodum & nunc etiam est Pyrites lapis. Factumq; illi ab
igne nomen, haud sane quia caleat, aut ignis modo fulgeat, sed q; inuicem attritus, aut ferrament
to aliquo percussus, ignis modo igneas scintillas ex se mittit. Dico aut igniarium, quodcunq;
ad instaurandum nouum ignem homines excogitarunt, Semina siquando hesternæ male con-
dita flammæ, Vt prima sub luce solet cinesfacta, perissent. Habent, præstantq; id uulgares lapi-
des omnes, sed omnium maxime qui durissimi & metallici sunt: qualis Pyrites hic est, cuius ab
hac potestate bonitas probatur. Anteposuit enim hic cæteris eum qui concolor æri est, & qui
facillime, & quantum uoluerit aliquis leui pulsu scintillas ignis ager. Quod ideo adiectum illi
a Diosco. est, quoniâ plura ad instaurandum nouum ignem lapidis huius genera & bonitates
sunt. Quæ ex eadem ignis potestate & natura eodem nomine omnia tunc censebantur. Egit
de his Plinius libro. 36. capite. 19. plures & ipse Pyrites numerans lapides: & inter eos genus
unum faciens plurimum habentium ignem, quos uiuos tunc uocabant, ponderosissimos: qui
bus exploratores in castris titerentur: quoniâ clauo, uel altero lapide percussis, scintillas sta-
tim ederent: quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, uel folijs, dicto celerius ignem traherent.
Quos Maro etiam felicissime in primo suæ Aeneidos descripsit dicens. Ac primû silicis scintil-
lam excudit Achates, Succipitq; ignem folijs, atq; arida circum Nutrimenta dedit, rapuitq; in
fomite flammam. Validissimum in discutiendis tumoribus, concretionibusq; Pyritem lapi-
dem hunc ueteres græcorum medici dixerunt. Contra duricies, quas Scirros ea gens uocat
utentes, cremato primum, mox acerrimo aceto restincto. Nec minus contra concretum in gru-
mos puerperarum lac.

De Hæmatide lapide. CAP. CXXXV.

Hæmatites optimus habetur friabilis, puro colore niger, duris-
simus, & æqualis, nulla sorde ammista, nulloq; zonarum discor-
su. Vim habet adstringentem, & excafactoriam aliquantum. Oculorū
cicatrices & scabriciam cum melle purgat. Cum lacte aut muliebri, lip-
pitudini, collisionibus, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur con-
tra difficultatē urinae, & fluctiones mulierū in uino, & ab ijs qui san-
guinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo cotes & colly-
ria oculorū uicij apta. Vritur ut Phrygius, uino tantū subtractio. Mo-
dus ustionis est, ut modice leuis fiat, & bullis quibusdam inturgescat.
Sunt qui Hæmatiten ita adulterant. Densam glebā rotundamq; schisti
lapidis, cuiusmodi sunt quæ radices uocantur, uase figlini operis, quod

KK in

DIOSCORIDIS

C feruentem cinerem contineat, condūt, paucaq; interiecta mora eximūt, experiunturq; si trita ad cotem Hæmatitæ colorem reddat: q; si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruūt, & subinde conspiciētes periculum faciunt. Siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato dissipatur. Coarguitur male confictus, scissilibus uenis. Quippe in rectos uenarum discursus refringitur, & longe secus se in colore habet. Namq; floridū reddit, Hæmatites uero sanguineum atq; Cinnabarin imitantem, inuenitur in sinopico minio. Fit & e magnete lapide, uehementer ambusto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

Pli. li. 36. ca. 20

BARBARI COROLL

Hæmatites reperitur in metallis. Vstus Minij colorem imitatur. Adulterant Schisto: sed distinguūt uenæ rubentes. Est & Magnetis genus unum Hæmatites appellatum. Præter hoc quæ genera Hæmatitarum traduntur. Aethiopicum, cui & principatus datur. Alterum Andromadanta uocant, colore nigro, pondere ac duricia insignem: & inde nomen, præcipueq; in Africa. Trahere enim succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum ad cotem aquariam, aliquando croco similem, pari duricia cum secundo. Quarti generis Helatites uocatur, q; diu crudus sit. Coctus uero Milites, aut etiam Milites, ad omnia utilior q; Rubrica. Quartum hys adijcitur Schistos, de quo protinus mox agitur.

EX M VERG COMM.

Cruento sanguinis colore cōspicitur Hæmatites: & inde illi nomē. Plura eius gñā numerat Plinius li. 36. ca. 20. oīa Italic peregriua, ut ex eorū nominibus cōscire licet. Idem bonitatis oīm noras eodē loco docet: multa q; alia, quæ uidisse in eo inutile nō fuerit. Vtilis medicinae & inter uitæ remedia qñdam lapis hic fuit: medebaturq; inter cætera oculis. In quorum usum siebāt ex eo collyria, ut hic ait, & Aconia: quæ a cotibus, quas græci aconas dicunt, dicta in Hebeno primo uolumine certius descripta a nobis fuerunt.

D

De Schisto lapide.

CAP. CXXXVI.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ contermina gignitur. Probatur maxime, qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & serie coherentium uenarum, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet Hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet, muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, item genarū crassiciem, & uuas oculorum, magnopere efficax est.

2150 N 100

Pli. li. 36. ca. 20

BARBARI COROLL

Lapis Schistos cognationē cum Hæmatite habet, sed peculiare in Schisto, q; splendet. Est & Schistos alterius omnino generis q; Hæmatites, quem cognominant Anthracitū, nasci tradentes in Africa nigrū: qui attritus reddat aquarijs cotibus ab ea parte quæ fuerit ab radice, nigrum colorem, ab altera parte croci. Sunt & gemmæ plures hoc nomine carbunculi: quarum alie preciosæ sunt, alie uiliores, ut quæ nascuntur in Græcia: Theophrastus autor, ac Plinius.

EX M VERG COMM.

Qualis habitu, concretioneq; sua lapis hic sit, nomen, sed longe certius hic scriptor ostendit. Illud a scissili crustarum eius diuisione factum est: hic Hammoniaco sali comparans, certissima nota totam speciem eius indicauit. Plures in græcis Hæmatitæ congenerem Schistum hunc lapidem fecerunt. Soracus tamen ex antiquissimis scriptoribus, alterius generis tradidit. Plinius duplicem colorem illi tribuit, ab altera parte nigrum, ab altera croceum. Vocariq; a carbonum nigro colore Anthracitem: hic tamen simpliciter *ἄνθραξ*, id est, croci colore esse dixit. Nosq; ad certiorē coloris eius intellectū, luteū addidimus. Vtilē oculorū medicamentis ut Plin. Schistū lapidē hūc testatus ē. Ideoq; nos credimus, quæ multa numerata a Diosc. mala hoc capite sunt, cōcaua, rupta, pēdētia, crassas palpebras, & uuas, oīa ad oculos pūnere.

De Gagate lapide.

CAP. CXXXVII.

A

IN Gagatarum lapidum genere præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est cõmuni ex parte, squalidus, crustosus, perq̃ levis. Vis ei molliendi & discutiendi. Deprehendit fonticum morbum suffitus. Recreatq̃ uulvæ strangulationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qui influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inveniuntur.

Gagatæ aiunt & in Leuco Pamphylæ (ut arbitror) promontorio, aut Lyciæ, ppe Cypri insulâ, expelli mari, atq̃ infra duodecim stadia colligi. Solinus & in Britania Gagatæ gigni tradidit. Planus est, pumicosusq̃, nō multum a ligno differens, fragilis odore, si teratur gravis. Ficilia ex eo inscripta nō delentur. Accenditur aqua; oleo restinguitur. Deprehendere dicitur uirgines suffitu. Hoc & magi utunt̃ in ea quā a securis argumento uocant Axinōmanciā: peruri eū negantes, si euenturū sit, quod quisq̃ optet. Dictum a fluuio in Lycia cognomine, Diofco. affimat. Nullum se Galenus in Lycia cõperisse tradit amnē, qui Gages, aut Gāgates uocetur. Photion grāmaticus, oppidū in Lycia fuisse Gagas a Rhodis conditū scribit. Plinius Rhodiopolin a Gāgis diuersam facit. Stephanus Gagas oppidū in Lycia fuisse, qd̃ Paleontichos ante diceret. Crustaceos uero lapides, atq̃ nigros, & q̃ in ignē additi exilem flāmam edeant, bituminis odore in Syria Coele inuētos sibi meminit, in collibus mari mortuo circūdati ad orientē solē spectantibus: ubi & Bitumē q̃q̃ nascit̃: utilissimos tumoribus in genu diuturnis.

EX M. VERG. COMM.

Qui Gagatem statim sequitur Thracius lapis, a Diofco. & ab alijs dictus Gagatē eadem oia posse, miscendi simul utriusq̃ noras & euentus Plinio causam dedit, tradendiq̃ libro. 35. capite. 19. Accendi aqua, oleoq̃ restingui: qd̃ non Gagatē, sed Thracio lapidi Nicander in Theriacis suis, & hic in lapidum historia aperte tribuerunt. Nicandri de utroq̃ uersiculi sunt, primumq̃ de Gagatē. ἄλλοτε δ' ἀσάδιν καὶ ὠν ἰχθυόσιν πύρρον, ἢ ἐν δὲ μαλ' αὖτις πυρρὸν πύρρον, ἢ ἐν δὲ πυρρὸν. Quorū sensus est. Aliquando aut Gagatem sicū lapidē urens, quē ualidi ignis impetus non domat. Accendi quidē igne Gagatem Nicander ait: non tamē ut cætera eo absūmi, sed in urendo bituminis odorem tantum sentiri. Paulo deinde post de Thracio agens, inquit. ἡ ἰσχυρὴ θρηάσιαν ἐν φλέγῃ πυρρὸν λαὸν ἢ δ' ἰσχυρὴ θρηάσιαν εὐδαίμονα ἰσχυρὸν αὐτὴν τυτθὸν ἢ ὀδυνητοῦς ἰσχυρὸν αὐτὸν λαὸν, τὴν ἀπὸ θρηάσιον νοτίου ποταμοῦ φέρονται, ἐν πόντῳ καὶ λῶναι. Quorum sensus est. Aut Threiciū in igne lapidē urens, qui aqua respersus flāmas agit. Extinguitur aut̃ exiguo insperso oleo. Lapidē hunc a Thracio flumine pastores quē Pontum nominant afferunt: quē tota est in scriptore hoc Thraci, non Gagatē lapidis historia. Plinius aut̃ quo diximus loco de Gagatē inquit. Mirumq̃ accenditur aqua, restinguitur oleo. Quod, ut præmonstrauimus, in Nicandro, & ut mox in scriptore hoc in Thracio lapide patebit, nō Gagatē, sed Thracio cõperit. Diximus nos comitales suffitu deprehendere Gagatē, quos hic ἰσχυρὸν πύρρον palā nominauit. Ceteri interpres acceptā ex Plinio uocē, fonticū morbū dephendi eo dixerunt: cõiore mali illius indicatione q̃ nunc forte oporteat usi. Alter etiā comunem secutus lētionē, in Cilicia nasci Gagatem ait: cum ex Geographis, Plinio, melioribusq̃ græcis in Lycia uertendum fuerit.

De lapide Thracia.

CAP. CXXXVIII.

B

Lapis Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Pontō nomen est. Vis ei Gagatē. Traditur aqua accendi, & oleo restringui. Quod in bitumine accidit.

Ficilis lapis Thracias, qui exemplaribus Plinij quibusdam Meiulla dicitur, trium generum, uiridis, pallide, sanguineis guttis. Non habeo certum proferre. Nomen gentis sue habet, ut cecinit Nicander: quemadmodum & Cappadoces in Argæo Cappadociæ nascentes, simili cum prioribus natura, qui & in laqueum cremorem soluātur, ut Galenus & Paulus ægineta scribunt: qui & Ageroton lapidem cõmemorant, astrictoriam, & discussoriam uim habentem, & guttibus inflammationibus auxiliare: quo sutores uti soleant ad dandum calceis nitorem. Præter-

KK iij

Pli. li. 37. ca. 10

Cea & Hieracitin, ut Diogenes scriptū reliquit, subuirdem ex atro coloribus itē alijs respersum, quē qui gester, muscæ non infestent. Hunc literis quibusdā inscriptis, contra sanguinis eruptio- nes ualere perhibent. Addiderūt ijs & Indicū, subruustum colore, attrituq; succo purpureo ma- nantē, nec ualido, nec denso corpore. Inuenio & Perdicitin, siue Perdiciatin, et aliū a sorbi simi- litudine, ut uirū cognomēto Scythicū, ad oēs duricias pollentes, in compositionē illam quæsi- tas quæ Pamphlethes, & Diacinnabareos uocat ab Aegineta Paulo. Vitem ad oculos quoq; suffusiones cōmendat, cum felle aspidis acontiae uocata, mirabili effectū, post quintum diem repræsentata curatione. Id fel, in serpentis eius dorso, iocinori annectitur, ut Aetio placet.

μαγνίτης

De Magnete lapide. CAP. CXXXIX.
Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæ- ruleum uergente, nec admodum grauis. Datur cum aqua mula- sa, trium obolorū pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui Magnete- tem crematum pro Hæmatite. uendant.

Pli. li. 36. ca. 16

BARBARI COROLL.
Lapis Magnes, quē & Magnitin Græci dicunt. Itē Sideritin & Heraclion, id est, Herculeū. Magnes ab inuēto- re uidet appellatus. In India nunc, & passim inuenit in Hispania quoq;. Re- pertus aut scribitur clauis crepidarū, & baculi cuspide serrata hærentibus, cum armenta pasce- ret. Quinq; genera eius serunt. Aethiopico principatū dant, argentoq; rependit. Inuenit in Ae- thiopia Smiri. Ita uocat regio harenosa. Ibi & sanguinei coloris, sanguinēq; reddēs, si teratur. Sed & crocum, Hæmatites cognomine, in trahendo ferrū, non eadē natura, qua ceteri Magne- tes. Aethiopici argumentū est, qd Magnetem quoq; aliū ad se trahit. Secundū genus Magnesia cum, e Magnesia, & contermina ei Macedonia, a Bebonea locatum petentibus dextra. Tales ruffi, nigriq; sunt. Tertiū in Echio Boëtiæ, ruffi coloris plus habens qd nigri. Quartū circa Ale- xandriā Troadem, nigrū, & feminei sexus, ideoq; sine uiribus. Quintū in Magnesia Asiæ, de- terrimū (nam & candidus est) neq; attrahit ferrum, similis pumici. In eadem Aethiopia mons haud procul gignit lapidem Theamedem, cui contraria Magnetis natura, ferrum omne abigens respuensq;. Trahitur ad Magnetem ferrum, quia sola fere materia ea, uires ab eo lapide concæ- ptas diu retinet. Aliud apprehendens ferrū, ut annulorū catena uideatur: quod quidem impe- ritum uulgo appellat, ferrum uiuū, uulneraq; ex tali asperiora sunt. Lapis hic & in Cantabria eruitur. Non ille Magnes uerus, caute continua, sed sparsa, Bubbatione (ita appellant) nescio, an uitro fundendo perinde utilis: nondū enim expertus est quisq;. Auctor Plinius. Ferri utiq; inficit aciem, ut Magnes. Dinocrates architectus Alexandriæ templū Arfinoēs concamerare coe- perat Magnete lapide. Intercessit mors, & ipsius, & Ptolomæi regis, qui id sorori suæ fieri cupie- rat, ut simulacrū eius e ferro pendere in aëre uideret: quod genus præstigiæ, ad superstitionem suam Arabes cōmentū dicunt in eo feretro, ubi auctōr eius sectæ conditus existimatur. Dioge- nianus Magnetem uerum argento scribit esse tam similem, ut decipiat. Nec hunc lapidem, qui ferrum ad se trahat, Magnetem, sed Heraclioten appellandum esse.

ἄραβικος λίθος

De Arabo lapide. CAP. CXL.
Arabus lapis elephanti maculæ similis. Is tritus illitu Flammæ rhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

γαλακτικός

De Galactite. CAP. CXLI.
Galactites appellatur, qd lacteum reddat. Cinerei tamen est co- loris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plumbea recondere, propter uim glutini, quod obhæret.

BARBARI COROLL.
Galactites, ait Plinius, ex uno colore lactis est, succo quoq; eius & sapore, a quo nomē: de hac intelligat, an diuersa, dubium: quando cineris colore traditur a Dioscoride, non lactis. Est & Galaxia, quam aliqui Galactitem uocant, intercurrentibus sanguineis, aut candidis ue- nis. Nam Chalaxia, grandinū & colorem, & figuram habet, unde appellata est, adamantinaq; duricie. Narrant etiam in ignem additæ, manere suum frigus. Ergo Pliniana Galactites, quam

aliqui & Leucogageam, & Sinephyten, & Leucographin appellant, uidetur ei proprius. Quæ & Morochthos, & Leucographis, & Galaxia Dioscoridi & Galeno dicuntur, ut paulo post liquebit. Vtunque, infantium adalligata collo, saluam facere dicitur. In ore autem liquefcere: memoriæ adimere uel iniuriarum. Mittit eam Nilus, & Achelous quoque amnis. Sunt qui & Smaragdum, albis uenis circumligatū, Galactiten inquit uocent. Est & gemma Galaicos, distans ab hac, Argyrodamanti similis, paulo sordidior. Inueniuntur autem binæ, aut senæ.

De Melitide. CAP. CXLII.

Melitites omnia Galactitæ similis. Hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem ut Galactites effectus.

BARBARI COROLL.
Melitites lapis dictus, quia succū tonsus melleum emittit. Differt ab hoc Melichrus: cuius plura sunt genera. Melleus colore, Differt & Melitis a malo, cuius imitatur color appellatus.

De Morochtho lapide. CAP. CXLIII.

Morochthus lapis, quem aliqui Galaxiam, aut Leucographida uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo utpote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis uestibus utuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur, conueniens ijs qui sanguinem expuunt, coeliacis, & uescicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluctationibus uulvæ, impositus uelleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur. Explet enim caua, atque delachrymationes sistit. Idem cæratō exceptus, ulcera quæ fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.
Lapis Molochthus, aut Morochthus, siue ut Galenus & Paulus uocauit, Moroxus, & Graphis, haud uideo eundem cum eo esse, qui Molochitis, a colore malvæ dicitur, spissius uirens: nec translucida, reddendis laudata signis, & infantium custodiæ. Sit autem Morochthus, quem Plinius in ore ait liquefcere, de quo in Galactite diximus, ex collatione Dioscoridis subodorari potest aliquid, dicentis mollē eum esse, diluicque facilem, ut uel idem cum Pliniano, uel si milis esse uideri possit. Nominatur & Morochthos Plinio, sed inter gemmas, lacte sudans porraceo. Idem auctor & Leucographin inter herbas collocat: nec qualis ea sit, reperisse unquam fateatur, eosdem ei effectus reddens, quos hoc loco Dioscorides, Galenus, cæteri, ut propterea non desint, qui Plinio quasi pro herba lapidem acceperit, increpiterent. Sed auctor grauissimus, aliorum sententiam, non suam opere toto recitat.

De Alabastrite lapide. CAP. CXLIII.

Alabastrites uocatus Onyx, crematus, resina aut pice assumpta duriciis discutit. Stomachi dolores cum cæratō laeuat. Gingiuas comprimit.

BARBARI COROLL.
Alabastrites, siue Onyx in Alabastro Aegypti, circa Thebas nascitur: quem in ædificiorum quoque ornamentis includunt. Nascitur in Syriæ Damasco, candore interdicto, uarijs coloribus. Cæteris omnibus candidior. Probatissimus in Carmania: mox India. Iam quidem & in Syriā, Asiāque. Viliissimus, & sine ullo nitore in Cappadocia. Probatum maxime mellei coloris, in uertice maculosi, atque non translucidi. Vitia in ijs corneus color, atque candidus, & quicquid uitro simile est. Alabastrites, ad unguentorum fidem laudatissimus: unde uas, id est, Onycem unguentarium uocamus, quod & Alabastrum, & Alabastrū quoque dicitur, etiā e uitro interim. Est & Onyx inter ostrea, ut uolumine secundo patuit. Habet & Onyx gemma: in qua unguis humani similitudine candore esse dicunt. Alabastrites porro, & in Arabiæ montibus, & Germania quoque reperitur, ex quo & uasa potoria, & pedes lectorum, & selle delictis factæ. Itē amphoræ, & urcei cadorum magnitudine. Iā columnæ, 10. duos pedes longæ. Sunt quæ hac amplitudine, non Onycem, sed Onychitum uocent. Differt ab Alabastrite Alabandicus, siue Abalandicus: & eum utroque

C modo legitur. Color Alabandico subnigrat ex ruffo. Perspicuus est, ut ignis, & quibusdā quā si rimulis ueniscq; dehiscit. Capillos albos, attritus inficit. Dicitur Alabastrus Democrito, & sal omnis, & calx uiua: quæ de putaminibus ouorum conficitur. Hæc ipsa Encephalos quoq; dicitur a chymicis, & marmor Thebaicum, & Claudianum.

¶ De Thyite lapillo.

C A P. CXLV.

λίθος θυίτης

L Apis nomine Thyites, in Aethiopia gignitur, subuירידי colore, la spidem imitatus. Liquefscens tamen lacteum succum reddit. Vementer mordet. Tenebras quæ pupillis obuersione expurgat.

B A R B A R I C O R O L L.

L Apis Thyites, a Plinio Mortarium uocatur, quoniam Thya mortarium significet: etiam Acone dictum Hippocrati, ut Galeno placet.

¶ De Iudaico lapide.

C A P. CXLVI.

ἰουδαϊκὸς λίθος

L Vdaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, discurrentibus lineis quasi industria detornatis. Solutus nullam qualitatem manifestam gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in uesica comminuere.

B A R B A R I C O R O L L.

Hic & Tecolithos uocari coeptus, quia calculos absumat: qd a Galeno falsum existimat.

¶ De Amianto.

C A P. CXLVII.

λίθος ἀμιάντος

A Miantus lapis in Cypro nascitur, scisso Alumini similis, quo ut pote flexili, pannos tantum ostentationis gratia texunt, qui ad ignes coniecti ardent quidē, sed flammis inuicti splendidioresexunt.

B A R B A R I C O R O L L.

D Lapis Amiantus, ueneficis resistit omnibus, præsertim magorum. Hoc qd de lapide Adiantho dicitur. Texi ex eo uela, quorum ignis uelut aqua sordes eluat. De lapide quodam nascente in Carystho Euboæ, Strabo retulit.

¶ De Sapphiro.

C A P. CXLVIII.

σάπφειρος

Sapphirus lapis, percussis a scorpione potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Ex crescentia in oculis, uasq; & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit.

B A R B A R I C O R O L L.

Sapphiri aureis punctis collucet, ceruleæ, raroq; cum purpura. Optimæ apud Medos, nusquam tamen perlucidæ. Præterea inuiles sculpturæ, interuenientibus cristallinis centris. Sapphirum gemmarij inter lapides collocant.

¶ De Memphite.

C A P. CXLIX.

μειφιππε

Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorū magnitudine, uersicolor. Tradunt trito & illito, quæ urenda, aut seanda sunt, sine periculo obstupescere, ita ut non sentiant cruciatū.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Memphites, gemmantis est naturæ.

¶ De Selenite lapide.

C A P. CL.

σελενίτης

Selenites lapis, quem aliqui Aphroselenon appellarunt, quoniā noctu plenus, crescente luna reperitur. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, læuis. Huius ramēta comitialibus in potu dari iubent. Eo ad

amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodē frugifere reddunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Selenites, fulgore melleo pspicius nomine accepto, quia imaginem Lunæ reddat in dies singulos augescens, minuentiq; numero. Hunc semper Galenus Aphroselenon appellat, Chymistæ Aphroselenon, etiam Comarin, & a leuitate ponderis Cupholithon, & Argyrolithon quandoq; uocitant. Habetur & Comaris apud eos Scythica, pro Arsenico & sulphure. Itemq; pro lapide philosophico, toties a nobis indicato, coarguendi potius & irridendi proposito, q̃ monstrandi. Seleniten Eustathius alium quoq; lapidem intelligit, qui & Asterius, & Lychnites uocetur, nascens in Thracia Pallenēs littoribus, auctore Dionysio. Plinius Lychniten ab Asterio diuidit, itemq; Selenite. Sed ut herbarum, sic & lapidum uocabula confundimus.

De Iaspide lapide.

CAP. CLI.

Iaspidium quedam Smaragdum imitatura. Alia ChrySTALLū, similis pituitæ. Alia nō dissimilis æri: ob id uocatur Aërizoufa. Alia ueluti fumo infecta, quæ Capnias ex argumento uocatur. Quædā lineis albis & resplendentibus præcingit, Assyrios appellata. Alia Terebinthinæ, similis, quæ Terebinthizusa dicitur. Alia colore Calaida gemmā æmulator. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensæ.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis sepe trāslucet ac uiret. Smaragdo similis Indica est. Cypria, colore glauco & pingui. Peritica, similis æri: quæ ob id Aërizoufa uocatur. Thermodontiaca, cerulea; & Scythica inter ceruleas omnes optima. Phrygia purpurea. Cappadox ex purpureo cerulea, atq; non effulgens. Thracia Indicæ similis. Chalcidica turbida, præfertur omnibus, quæ purpuræ quicq; habet: secunda quæ rosæ: tertia quæ Smaragdi: quarta celo autumnali matutino similis: quæ Boëa appellat, & Aërizoufa. Similis est & Sardæ, imitata & uiolas. Non minus multæ species reliquæ: sed omnes in uitro ceruleæ, aut chrystallo similes, aut pituitæ, atq; muco, siue ut Plinius, Myxis. Item Resinæ Teberinthi, quæ & Terebinthi Zusan uocant, inter ceruleas & ipsam marē existimantes. Nam quæ Iaspachates appellatur, ex Iaspide Smaragdo simili, et Achate proprietatem suā habet. Prestantiores Sphendone, id est, funda cludi solent, id est, parentes, nec præterq; margines auro amplectente. Vitū est & breuius nitior, & longē splendēs, & sal & omnia, quæ in cæteris gemis nitro adulterata coarguitur, extra fulgorē spargendo, atq; nō continendo in se, nec in diuersa. Quæ Sphragides uocantur, quoniā optimæ omnium signent: ea quæ Smaragdo similis p̃transuersum linea candida p̃cingitur. Orienti familiarissima, pro Amuleto Garāmatis uocat, quæ pluribus Polygrāmos. Est & Onychi puncta, quæ Iasponyx dicitur, & nubē complexa, & niues imitata, quæ stellata rutilis punctis est; & salī megarico similis, & fumida, Capnias, siue Capnitis appellata. Magnitudinē Iaspidis, undecim unciarū uidit antiquitas, effigie Neronis thoracata. Inter ceruleas, post Scythicā Cypria: post quā Aegyptia. Adulterat maximē tinctura. Idq; in gloria Regū Aegypti ascribitur ei, q̃ primus tinxit. Inest aliquando ceruleis aureus puluis: nō ut in Saphiris puncta. Galenus Iaspide medicinę utilē, Chloron Iaspin, hoc est, uiridem cognominat. Inscribi iussit in Iaspide draconem radios habentē Necepsos Rex, ad stomachi futurā. Sed idem p̃fectus est, in torque suspenso eo rudi, ita ut os stomachi attingat.

De Aëride lapide.

CAP. CLII.

Aërides lapis est ueluti prægnans, cum quatitur alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt uulua & parū tenaces, sinistro brachio adalligatus. Sed parturientibus e brachio amoueat, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditū offerat. Fur em̃ mansum deuorare nō poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit. Quippe decocta cū co, deuorare non poterit. Tritus & cærato exceptus, cyprino, aut gleuæ

D I O S C O R I D I S

Cino, aut alio excalfaciente, comitiales magnifice iuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Aëtites, quem aliqui Gagiten dixere, Strabo Gangiten, in Armentia repertū scribit: quo serpentes fugant: hunc, an alium accipiat, nondū liquet. Inādicatur nido aquilae, non tamen omnium, nihil igne deperdens: sed uis eius medica, non nisi nido direpti. Aiunt binos in ueniri, marem, & foeminam: nec sine ijs parere Aquilas, & ideo binos tantū. Genera eius quatuor feruntur. In Africa pusillus & mollis, ac uelut in aluo habens argillam suauem, candidam. Ipse friabilis: quem foeminam existimant. In Arabia mas durus, & similis gallae, aut subrutillus: in utero continens lapidem durū. Tertius in Cypro, colore Africani, amplior tamen atq; dilatatus. Caeteris enim globosa facies. Habet in aluo harenam iocūdā, & lapillos. Ipse tam mollis, ut etiam digitis fricetur. Quarti generis Taphiusius uocatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiusa: qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucaden: inueniturq; in fluminibus candidus ac rotūdus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur Callimus: nec quicq; tenerius. Nam Calais, aliud genus est lapidis, a quo & Calainus color, pro Veneto, si Photioni credendum est. Ego etiam fordidū colorem, Pliniū secutus, Calaini appellatione possum capere. Amplitudine inquit conspicua, sed fistulosa & fordiū plena est Calais. Hic & Augites a multis dicitur. Quae uero Calaina ostraca nominat Aëtius, pilos extenuantia, considerantibus relinquo. Apud chymistas uisū calcis aquam inuenio Calaion uocari. De Calaino etiam colore, Dioscorides in laspide supra mox cōmeminit. Idem Aëtiten pro Chrysolitho, & Porphyrite, & Chrysochromo cognomine Macedonico, & Polychromo accipiunt.

De Ophite lapide.

CAP. CLIII.

ὀφίτης

Ophitae genera multa. Quidam grauis est odoris, niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. Tertius lineis quibusdam candidis interinctus est. Omnes contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

B A R B A R I C O R O L L.

Ophites, marmor est serpentium maculis simile: a quo nomen. Duo eius genera: molle candidum: nigricans durū. Ex Ophite, columnae nisi paruae admodū inueniuntur. Inter Ophitae existimari fere possunt, propter colorem, quod Augusteum uocāt & Tiberiū. In Aegypto unū usq; principis temporibus reperta. Differunt, q̄ maculas diuerso modo colligūt. Augusteum undatim crispatur in uertices: Tiberium sparsum, conuoluta canicie spectatur. Theophrastus lapidem Chiu uocando, uidetur Ophitem intellexisse. In Aegypto inquit, nascitur lapis niger, translucidus, Chio similis. Quem locū Plinius ita uertit. Theophrastus inquit auctor est, tras lucidos lapides in Aegypto inueniri, quos Ophitae similes ait. Fortasse, quia uersicolores illas maculas, ut ait Plinius, primae Chiorum lapidicinae ostenderunt.

De Lapidibus Spongiarum

CAP. CLIIII.

LAPIDES in Spongijs inueniuntur, qui uesicae calculos rum-punt, in uino poti.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapides, qui nascuntur in Spongijs, & ipsi uocantur Spongiae, quidam eos Cysteolithos uocant: quia uesicae medeantur. Sunt & Pumicum in genere, quos Spongas uocant: ut in Pumice docuimus.

De Lithocolla.

CAP. CLV.

λιθοκόλλα

Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. Fit autē ex marmore, lapide pario, & taurino glutino. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare.

B A R B A R I C O R O L L.

Lithocolla nomine, significat glutinum ex lapidibus.

¶ De Ostracite. CAP. CLVI.

Ostracites testæ similitudinem habet, glebosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino sistit. Si quattuor diebus a coitu bibatur sicilici pondere, foeminis prestat ne concipiant, Cum mel le autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

BARBARI COROLL.

Ostracites a testa nomen habet. Transilit & ad gemmas. Si quidem, ut Plinio placuit, Ostracias, siue Ostracites, altera est testacea & durior, altera Achata similis. Nisi quod Achates politura pinguescit, Duriori tanta uis inest, ut aliæ gemmæ scalpantur fragmentis eius. Habetur & Ostracides, cui Ostrea nomen, & similitudinem dedere.

¶ De Smyride. CAP. CLVII.

Smyris lapis est, quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, et urendum utilis, Gingiuis quas humor uexat, prodest. Dentifricio commendatur.

BARBARI COROLL.

Nota uulgo Smyris, uel ipso nomine, quam Smyrium potius quam Smyrin officinæ appellant: cuius fragmentis gemmæ aliæ scalpantur: quo usu Plinius secundus non Smyrin, sed Ostraciten uocauit, ut superius proxime notauimus.

¶ De Harena. CAP. CLVIII.

Harena e littoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruatur. Torrerij solet ad aridos fortus, pro milio, aut sale.

BARBARI COROLL.

Harena littorum, græce Psammos, & Hammos Aegialitis uocatur. Quæ porro calculosa lapidiosaque est, Acholax poetis dicitur. Harena secantur marmora premente eam serra, in prætenui linea uersando, tractuque ipso diuidente. Aethiopica ad hoc maxime probatur. Proxima Indica, & scabrior: qua combusta poliunt marmora. Scabra est & Naxia, & a Coptis quæ uocatur Aegyptia. Postea inuenta est, non minus probanda, ex quodam Adriatici maris uado estu nudante, obseruatione non facili. Fraus deinde secandi, quacumque harena fluuiatili, quæ quod crassior est laxioribus segmentis terit, ita sectæ attenuantur crustæ. Polituris accommodant Thebaica, et quæ sit e pumice, aut Porro lapide, hoc est, Tofo. De Sabulo puteolano, Capanoue, ite de Ethrusco, quod proprie Carbunculus uocatur, nihil dicturus sum, nisi quod Campanum ex usta terra, Carbunculus ex cocta materia efficitur. Autor Vitruius, Romæ uulgo Puteolana dicitur harena quocumque loco fossilis, modo quæ in calcem conueniat.

¶ De Cote. CAP. CLIX.

Ecote Naxia, quod exacuendo ferro detetitur, illitum alopecias ad pilum reducit. Virginum mammas cohibet, nec incrementum patitur. Potum ex aceto lienem absomit.

BARBARI COROLL.

Cotes, siue lapis Naxius, id est, Acone, sicut olearis Cotes, Elæa cone. Diu placuit Cotes, e marmore Naxio, ut & simpliciter Naxium dicatur. Ita uocant in insula Cypro genitas. Vicere postea ex Armenia. Differre putant Corem a lapide Coticula: uon solitum inueniri, nisi in flumine Timolo, siue Tmolo (nam utroque modo recte dicitur) a mōte, ut arbitror, cognomine in terra Lydia. Nunc uero passim quæ alij Heraclium, & Lydium appellant. Sunt autem lques, & calculi similes, quaternas uncias longitudinis, binasque latitudinis non excedentes: siue ut Theophrastus inquit, calculi amplissimi, dupla magnitudine, præterea specie lata, non rotunda: quod a sole fuit in his melius, quam quod a terra. Sed & caloribus immodicis deterius respondet. Fiunt enim aspergi

A

ὄστρακίτης

σμύρις

ἄμμος
B

Pli. li. 36. cā. 23

ἀκόνια νάξια

Pli. li. 36. cā. 22

Li

Cne quadā ex alto reuocata, quasi lubricę, ut idē Theophrastus ait, his Coticulis periti cū uena siue nūmo lima sapuerint, experimentum protinus dicunt, quantum auri, quantum argenti aut æris habeant scrupulari differētia, nunq̃ fallente ratiōe: incipientibus a minimis nodis, hoc erat granū, post colybus, tū duo chalchi, dein quatuor moria, ut Theophrasti uerbis agā. Lapis & Chrysitis, & Balanos chrysochoice, hoc est, index aurarius uocat, quo, ut gręci aiunt, aurū explorat, obryzū sit, atq̃ probū, an improbū uitiosumq̃. Quanc̃q̃ Balanistes & p mortario qñq̃ accipit. Porro dicitur Obryzū, quasi abryzū, hoc est, delicatū sincerūq̃. Vt Photionis etymo utar. Vocāt aut̃ Obryzū, q̃tiens simili colore rubet ignis, ut inq̃ Plinius, & aurū qd̃ apyrō appellāt, purum est: idq̃ habet nomen, q̃a igne nō egeat: quale arabicum esse Diodorus tradit: qd̃ inter Abileos, Gasandosq̃ foditur. De arabico Auro & literę sacre meminere.

De Lapide Geode. CAP. CLX.

λίθος γεώδης

Geodes lapis, adstringit, siccat. Caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testium mām̃arumq̃ inflāmationes sedat.

EX M. VERG. COMM.

Geoden ex argumento appellant, quoniam amplexus est terram.

EX M. VERG. COMM.

Repetemus & id quidem q̃ breuissime licebit, ex gręcorum decretis, quas uniuerso lapidū generi uires, priuatimq̃ singulis, & his præferim quos deinceps ex toto eorum genere hic scriptor numerauit, naturam dedisse antiquiores deprehenderunt. Quę huiusmodi sunt. Siccāt nōn aliter q̃ Terra omnis lapides omnes. Priuatim tamen Magnes, quem & Heraclium lapidē uocant. Hæmatitę æquales habere uires dictus est. Notus ubiq̃ hic lapis, mirabili naturę euentu, ex interuallo ferrum ad se trahens: & quasi sensus, manusq̃ illi sint, omnium rerum domitricem materiam illam cedere & parere sibi cogit: non aliter q̃ toto orbe monstra celsisse quondā uiribus Herculis traduntur. Ob quam causam ab Hercule Heraclium credere aliqui dictū fuisse. Verumtamen non desunt qui non ab Hercule, sed ab Heraclia Magnesię dictum uelint. Et quemadmodum a Magnesiā Magnes, sic Heraclius ab Heraclia dictus fuerit. Sic Lucretius libro, s. credidit dicēs. Quod superest agere incipiam, quo federe fiat Naturę lapis hic ut ferrum ducere possit. Quem Magneta uocant, patrio de nomine Grai, Magnetum quia sit patris in finibus ortum. Et si Plinius autore Nicandro, a Magnete inuentore nominatum testetur. Euripides non hunc Magnetem in carmine suo uidetur uocasse, sed Indicem, quo argentarij utuntur. Versiculus eius est. τὰς βρωτῶν γῶμας σκοπῶν ὅτι μαγνήτιος λίθος. Quod est, Hominū mentes ueluti Magnes lapis probans. Arabicus Ebori similis, siccandi repurgandiq̃ uires habet. Lactarius scissili eadem omnia, sed minore efficacia potest. Melitres a sapore mellis nominatus quadā tenus calefacit. Morochthos, quem a candore lactis Galaxiam, & Leucographida uocari Dioscorides ait: quo prædictis omnibus mitior est, quia nullas habet efficaciore uires, eo magis sine dolore curat. Eamq̃ ob causam, in mollibus corporū partibus ad inducendas cicatrices usque eo antiquitas est. Plinius tertiam lapidis huius appellationem inter herbas numerauit lib. 27, nominis uicinitate cum leuce deceptus. Poterunt uidere id uolentes. Nos enim festinantes hęc tū signamus: præsertim, cum ante nos aliq̃ id etiam deprehenderint Alabastritę cinerem qdam ex ueteribus bibendum dederunt cibum in stomacho non continentibus. Hunc primo Onychē, ab humani unguis similitudine ueteres gręci nominauerunt: quemadmodum secundo uolumine in Indico Onyce diximus. Nunc eo loco dictis adiiciendum est, gręcos præter Onychem Alabastritem etiam uocasse, ab usu. s. qm̃ ad Alabastra unguentorū usus eius esset. Fuerunt autē gręcis Alabastra lapidę pixides, in quibus ob frigiditatem suam diutissime & felicissime odores seruarent: sic dicta, quoniā ob læuorem suam e manibus laberentur. Et qm̃ ex Onyche hoc alabastra illa fierent, ideo Alabastrites lapis dictus est: priusq̃ Onyx fuit: tum facta ex Onyche alabastra Alabastritę uocari lapidē fecerunt. A Equiuoca in gręcis, ut uidetur, ad unguem & lapidem Onycis uox est: poteritq̃ aliquando ubi parum certa res sit, legētes fallere: quemadmodum primo uolumine in Bdellio dubitari potest, lapidi ne, an ungui id Diosc. comparauerit. Simpliciter enim ὄνυχι ἰσχυρόν esse ait. Nos nihil illi aliud adiectum inuenientes, unguem uertimus: id enim tutius uisum est, & si Alabastritę huic lapidi simile forte Bdellium ille fecerit. Qd̃ tunc relictum monuisse nunc satis sit. Quemadmodum a mortariorum usu Thyitem cum qui statim sequitur dici intellexisse. De quo præter tradita a Diosc. nihil certum in antiquis gręcis inuenimus. Dissicere renum calculos dictus ab illis Iudaicus est. Ob easq̃ uires posteriores gręcorum medici Tecolithon, id est, calculos absumentem eum uocauerunt. Sapphirū cōtra scorpia

hum ictus bibi utiliter, iidem græci dixerunt. Lunarem comitialibus utilem. Iaspidem, qui uiri di colore fit, alligatum, & in anulo gestatum, cibum in stomacho non continentibus prodesse. Qui autem subuiridi, qm̄ efficacior fit, oculorum cicatrices & prerygia extenuare. Ophitē adalligatum, contra uiperarum morsus prodesse. Calculos in uessicis frangere, in spongijs inueni-
 tos lapides. Ostracitem, & Geodem, id est, terram intra se complexum, efficaci ad siccandum ui-
 esse: ideoq; inflammatis tumoribus egregie prodesse. Smyrim repurgandi uim habere: ideoq; dentifricijs acōmodatum esse. Refrigerandi uim habere etiam crediderunt ueteres græci, quod
 ex Naxia cote confricato ferramento detritum fuerit: eaq; ui crescentibus uirginum mamis, &
 puerorum testibus utile. Quod uero ex olearia Cote detritum pariter fuisset, capilli defluuia,
 quas alopecias dicunt, explere. Plures alios etiam medicinae utiles lapides numerauerunt post
 hunc scriptorem posteriores græci: uerum ab eo relictos, nos etiam relinquimus: in re quæ iam
 pridem desijt in honore esse, legentes monuisse haftenus contenti.

De Terra. CAP. CLXI.

Omnis terra ad medendi usum recepta, sumam & primam uim
 habet occludendi. Sed specie distant, cum alia adiunctis quibus-
 dam, ad alia sit utilis.

BARBARI COROLL.

Terra, hoc est Ge, omnis sicca est in medicina ui, presertim appellata Georgumene, hoc est,
 agricolaris. Nam terra Aegyptia, e luto eius fit. Sunt qui Aegyptiam, pro singulari terra inter-
 prentur. In nomine est & Cretica, minus pollens, & plus habens aeris q̄ ceteræ: usus ad exte-
 rendas sordes argenteis uasis celebratissimus. Et Armeniæ glebæ locus, siue lapis ea, siue ut Ga-
 lenus mauult terra nominetur: quia madescat aqua interius, non sumā tñ cute, ut lapides. Vul-
 gato eius usu, contra pestilentiam, quæ Galeni ætate fuit, & contra deploratos phthisicos: ob
 id in Africā & Alexandriā nauigare solitos, ex Armenia Cappadocię cōtermina inuehiūt: ui ma-
 xime siccifica, luteo colore, aut pallido, teri facilis, usi mō lapidis: minimū tñ harenosa lapido
 faue, sed Samio Asteri leuore similis, uerū pōderosior ac densior. Syri eā Zazinacha appellāt,
 ut Aetius inqt, urbē in cuius mōte nascit Vagauanaga uocari: agrū in q̄ mōs ille sit Agaraces
 uulgo dici, cui similis ē effectū, quæ Alanę cognominat. Est & Carasenia ex oppido Tauricorū
 peninsule, qua uulnera oīa sanant. Quod aut genus Cretæ sit, quā Hippyocrates Schediada no-
 minauit, duorum discriminū, haud plane scio: quemadmodū nec illam quam Conchylū Xe-
 nophon, alij Cenchyliū uocant lapidem, ut inqt Pollux. Agricolaris duæ sumæ differentię, in
 finitis inter eas medjs. Nigra, quæ & pinguis est. Alba, quā græci uocant Argilon, hoc est, Ar-
 gillā, Sabuloni similē, acieiunā, sordidā, famelicā. Sunt & alia duo Terre gñā. Pharmacitis, hoc
 est, medicata: cuius species Eretrias, & Samia, & Rubrica, & Lemnia, & quæ sequuntur cæterę.
 Metallicum: in quo lapides, & fere quæcūq; supra diximus, orsi a Cadmia.

De Eretriade. CAP. CLXII.

Eretriæ duæ sunt, una uehementer alba est, altera cinericia. Opti-
 ma habetur ad cinereum colorem uergens, perq̄ mollis, quæ si
 per æramenta tractum ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut Ce-
 rusa, aut hunc in modum. Teritur ex aqua, & ubi pessum ierit, humor
 leuiter excolatur. Siccata solibus iterum teritur, interdū adiecta aqua,
 ut uespere confidat. Antelucanis colo excernitur, & demum in sole tri-
 ta, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desyderetur, pastil-
 li magnitudine Ciceris in ficule perforatū consiuntur, oreq; uasis di-
 ligenter obturato, supra carbones continenter folibus perslantur. Vbi
 uero cinis in fauillas se conuertit, aut æreum colorem contraxit, exem-
 pti reconduntur. Vim habet adstringentem & refrigeratariam, leuiter
 mollientem. Caua explet, & sanguinolenta conglutinat.

BARBARI COROLL.

Eretria, & Eretrias terræ suæ nomen habet. Hac Nicomachus & Parassius usi.

Li ij

Pli. de terrę ge-
 neribus lib. 17.
 capite. 9.

B

ip̄t̄p̄id̄

D I O S C O R I D I S

C
γῆ samia

¶ De Terra Samia. CAP. CLXIII.

Samia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinosa, mollis, succosa, friabilis. Cuiusmodi est quam aliqui Collyrion, & uocant & uocant. Duæ enim species eius. Vnam ante diximus. Altera Aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædēsa. Vritur ac lauatur ut Eretria. Vinctus consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Fœminis fluctatione uulue laborantibus, cum flore sylvestris punici datur. Testiū & mammarū inflammationes illita ex rosaceo & aqua refrigerat. Sudores arceat. Contra serpentium morsus et uenena pota ex aqua auxiliat.

B A R B A R I C O R O L L.

Terra samia, genus est candidi coloris, quemadmodum & Melinon, de quo in Crea melina differitur. Porro Samia quæ Aster uocatur, globosior est quæ species eius altera Collyrion, utraq; tamen candida. Nascitur & in Samo quoque Melinum, sed pictores eo quod sit e Samo non utebantur, propter nimiam pinguitudinem, sed eo quod e Melo. Accubantes effodiunt ibi, hoc est, non stantes, sed aut in obliquum, aut supini uenas scrutantur in saxis, autore Theophrasto: quæ ut Iulius Pollux inquit, Geophania uocantur, Aster, non nisi quarta demum aggreffione proditur.

λίθος samios

¶ De Samio lapide. CAP. CLXIII.

Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore & duricia. Vis ei adstrictoria, et refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus hebetat. Verum ad lachrymationes oculorum & ulcera cum lacte efficax est. Paratus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus fœminarum custodit.

D
χία γῆ

¶ De Chia terra. CAP. CLXV.

Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem glebosa, albaque. Sed ficticijs formis differens. Vis eadem quæ & Samiæ. Extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit. Colorem in facie & corpore toto commendat. In balneis pro nitro de terget.

σελινουσία γῆ

¶ De Selinusia terra. CAP. CLXVI.

Eadem præstat Selinusia. Maxime laudatur quæ uehementer resplendet, candida, friabilis & aqua dilui celerrima.

B A R B A R I C O R O L L.

Selinusia, lactei coloris est, eademque lacte diluta, renouandis albarijs rectoriorum probatur.

κιμωλία

¶ De Cimolia. CAP. CLXVII.

Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, tactuque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni si statim Cimolia oblinantur, pustulas non sentient. Testium duricias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

BARBARI COROLL.

Terra Cimolia, siue ut Hippocrates & Pollux & Nicocharis appellant, terra Meētis, siue Smeētis, ab exterfu a Cimiolo quidem, una Cycladū. Sed tñ laudatur maxime Theſſalica. Naſcitur & in Lycia, circa Bubonem oppidum. Eſt & alius uſus Cimoliæ in uestibus. Nam Sarda, quæ aſſertur de Sardinia, candidis tantum probatur, inutilis uerſicoloribus: & eſt utiliſſima omnium Cimoliæ generū. Precioſior Vmblica, & quam uocant Saxū. Proprietas Saxi, q̄ creſcit in macerando, atq; pōdere emiſi: Illa uero meſſura. Vmblicā nō niſi poliendis uestibus aſſumēbant. Primū igit uestibus abluebat Cimolia Sarda, dein ſulphure ſuffiebat; mox deſquamāt Cimolia, quæ eſt coloris ueri. Fucatus enim nigreſcit, & eſundit ſulfure; ueros aut̄ & p̄cioſos colores emollit Cimolia, & quodā nitore exhilarat contriſtatos ſulfure. Candidis uestibus Saxū utilius a ſulfure, inimicū coloribus. Græcis uicem Cimoliæ Gypſum tymphaicum implebat.

De Pnigite terra. CAP. CLXVIII.

Quæ Pnigitis dicitur, colore Eretriæ ſimilis eſt, grandioribus tantum glebis. Manum ſi quis admoueāt, refrigerabit. Tactu linguæ uſq; adeo glutinoſa, ut penſilis hæreat. Cui effectus idem qui Cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro Eretriæ de uendunt.

BARBARI COROLL.

Pnigitis, nigra eſt, ut Ampelitis, glutinoſior quandoq; q̄ Samia.

De Teſtis. CAP. CLXIX.

Fornacæ Teſte, uehementer toſtæ, cruſtas ulceribus obducunt. Quare pruriginī, & pabularum eruptionibus medentur. Podagricis profunt. Strumas diſcutiunt, carato exceptæ.

BARBARI COROLL.

Teſtas, Oſtraca uocant græci.

De Terra fornacum. CAP. CLXX.

Fornacum terra, quæ retorrīda fulueſcit, eiufdem cum Teſta effectus.

BARBARI COROLL.

Terra uſta, ſiue toſta, itemq; ruſſa, quæ a græcis Catopos & Caminitis atque Pyrra dicit̄, nō eadem eſt cū ea, de qua Plinius ita meminit. Uſta caſu primū repta incēdio, Pyrræ ceruſſa in oris cremata, quam primus Nicias tabulis inuſſerit. Optima nūc Aſiatica habetur uſta, quæ & Purpurea inquit uocatur. Preciū eius in libras æris quinq; fit & Romę uſta cremato ſilice mar moroſo, reſtinctu aceti, purpureo colore, ut inquit Viſtruius. Sine uſta non fiunt umbræ.

De Melia terra. CAP. CXXI.

Melia colore cineream Erethriam imitantur, aſpera tactu. Ea diſgitis friata, deaſi pumicis modo crepitar. Vim habet aluminōſam, ſed remiſſiuſculam, id quod guſtu deprehenditur. Modice linguā ſiccāt, purum corpus reddit, & colorem cōmendat. Pilos extenuat. Viti ligines & lepras abſtergit. Pictoribus uſum præbet, ut colores diutius perennent. Emplaſtris quæ Chloreg dicuntur, efficaciter inferitur. Ex omni Melia terra, & omni alia in uniuerſum, eligi debet recens, mollis, non lapidoſa, friabilis, quæ cum humorem attigerit facile reſoluatur.

BARBARI COROLL.

Colores, præter Ceruſſam, candidi erant antiquitus duo, Melinum, ab inſula Cycladū Me lo dictum: quod & in Samo quoq; naſcitur, ut diximus. Linguam tactu ſiccāt omne Melinum. Taxatur in libras, ſingulis ſextertijs. Melinum porro, a terra Melina, ſiue ut græci appellant, Me

L i ij

C liade, atq; Melia nihil distat. Alterum candidi genus, Paretonium uocatur. Nomen loci habens ex Aegypto. Spumam maris esse dicunt, fordidatam cum limo, propterea & minutas in eo specari conchulas. Fit & in Creta insula, & Cyrenis. Adulteratur Cimolia decocta, cōspissataq; Preciū optimo in pōdo sex librarum. E candidis coloribus pinguisimo, & ppter leuorē tenacissimo tectorijs. Fuit & Smyrnæ terra, Theodorios ita nominata, quia Theodoti fundus is erat, in quo id genus Cretæ primo fit inuentum. Hanc Plinius inter candidas enumerat, qua ueteres inquit, ad nauium picturas utebantur. Vitruius inter uirides, optimā credi uoluit.

De Ampelide terra. CAP. CLXXII.

EX Ampelide terra, quæ Pharmaciis nomine, in Seleucia iuxta Syriam nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ carbones referēs, assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tūgendis capillis idonea. Vfus ad illinendas uites sub germinationis tempus. Vtpote cum innascentes uermiculos enecet.

BARBARI COROLL.

Ampelitis, bitumini est simillima. Vocatur ita, quoniam uitis, qua gemant illitis, arcere creditur uermes Ipsas, siue Senipas a græcis appellatos, a nobis Voluoces, & Conuoluolos: etiam si Voluocem alij dumtaxat intelligunt, qui prærodat pubescētes uuas. Theophrastus hanc in Cilicia coqui tradit, atq; ita lentescere, uitesq; obungere. Hæc & Pharmaciis dicitur, etiam si nomen hoc medicatis omnibus commune est, ut inquit Galenus.

EX M. VERG. COMM.

Quod ad omnem terram cōmuniter priuatimq; hanc, aut illam a græcis traditum pertinet, sic se habet. Siccatur omnis terra: & nisi mixtam, coniunctamq; sibi aliam habuerint qualitatem, nullam habet erodendi uim. Sin autem feruida illi qualitas aliqua accesserit, eā omnem lotura amittit. Primumq; a ueteribus græcorum medicis efficacissime adstringere Eretia dicta est. Crematamq; & lotam sine erosione siccare, & in toto eius genere probari & anteponi cunctis alijs quæ cinereo colore est. Samiam, quoniam glutinoso lentore sit, uilem omnibus quæ leniri oporteat. Omnesq; sanguinis eruptiones, quacumq; parte erumpant, compescere. Chiam & Selinusiam maiore & efficaciore repurgandi ui esse: ideoq; mulieribus ad nitorem & laeuorem cutis usum eius fuisse. Quinetiam carnibus ulcera explorare, & ad cicatricem perducere, præsertimq; ambusta. Cimoliam, quam a Cimolo insula nominauerunt, mixtas refrigerandi discutiendiq; habere uires: & hoc simplicē, nec lotā: lotā uero magis refrigerare, & ambustis ex posca mederi. Phigitim deinde pares Cimoliæ uires habere. Hanc nigro colore esse tradiderunt ueteres græci. Ampelidem a uineis appellatam ferunt: q; contra innascentes uitis uermes, gemmasq; earum erodentes, usus quondam eius esset: siccandi discutiendiq; egregias habere non sine erosione uires. Numerauerunt & alias aliquot relictas ab hoc scriptore posteriores græci. Aegyptiam, cuius luto contra incipientes cutem subire aquas, & duratos lienes uteretur. Creticam, quam sine erosione similem Ampeliti constituerunt. Alaniam, quam Armeniæ glebæ æqualem fecerunt. Omniumq; postremam Armeniam glebam, quam adhuc Armenium Bolum uocant. Cuius multiplex fuit & est in medicina usus. Numerabantur ab eis etiam in Terræ celsu Lemnia, Sphragis, Sinopis, Rubrica, & Fabrilis. De quibus quoniam nō multo ante priuatim actum ab hoc ipso scriptore, & a nobis est, nihil ultra hoc loco agetur.

De Fuligine pictoria. CAP. CLXXIII.

Fuligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. Si quidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax, Fracta cum rosaceo cærato, ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 35, ca. 6

Fuligo hæc a græcis Asbolon, & Asbole uocari solet. Inuenti sunt pictores, qui a sepulchris carbones infectos effoderent ad attramentū tectorium, siue quod idem est, Pictorium. Sed cōmodius tū sit ex fuligine, resina exusta, auripice: propter quod officinas & laconica etiam ædifi-

cauere, fumo excipiendo. Fit ex sarmentis, sed laudatissimum e tædarum Schedijs, ita enim uocat assulas Viæruuius. Igitur Fuligo quæ parietis & cameræ curuaturis adhærescit collecta, partim componitur ex gummi subacta ad usum atramenti librarij, partim tectores glutino admixto in parietibus utuntur. Adulteratur fornacium, balnearumq; Fuligine, quo ad uolumina scribenda utuntur. Sunt qui & uini facem arefactam excoquant: quæ si ex bono uino fuerit, Indici speciem imitari uideatur. Polygnotus & Mycon e uinaceis fecere, Tryganon uocatum. Apelles commentus est, ex ebore combusto, quod Elephantium uocant. Fit & tædis ligno combusto, tritisq; in morario carbonibus. Mira in hoc Sepiarum natura: sed ex his non fit. Omne autem Atramentum sole perficitur, librarium, & tectorium, glutino admixto: quod autem aceto liquefactum est, ægre eluitur.

EX M. VERG. COMM.

Facilis cognitu pictoriæ Fuliginis huius in Viæruuiio confectio est. Eam longius scriptor ille septimo suæ architecturæ libro tractauit. Poterunt uolentes ab eo non eius tantum, sed librarij Atramenti etiam, quod statim sequitur, certam audire rationem: ideoq; nos nihil ultra de his agimus. Monemus tamen, quod in hoc capite a Barbaro uersum est, fracturas perducere ad sanitatem Fuliginem hanc, assumpta cera Rhodia, longissime a Dioscoride sensu ab esse. Nec enim quod hic ait, *ὅν ποδὶν κρητὸν* ad gentem & insulam Rhodum pertinet, sed ad ceratum quod rosaceo unguento coactum fuerit. Notior res, & toto hoc opere totiens repetita, ut ostendi a nobis aliter non debuerit.

De Atramento librario. CAP. LXXIII.

Atramentum quo scribimus, Fuligine e tedis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ Fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam e Resinæ fumo, & pictoria Fuligine, de qua paulo ante diximus. Assumitur autem Fuliginis mina, Gonus sesquilibra, Glutinis taurini, Atramenti sutorij, singulorum sesquuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis. Ambustis ex aqua commode illinitur. Sed non ante soluatur q̃ cicatricem iuduxerit. Sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decidit. Cæterum habes amicissime Ari abunde, quæ tradenda duximus, non pro operis modo, quem destinaueramus, sed pro materiæ & auxiliorum medicinalium copia.

BARBARI COROLL.

DE Atramento scriptorio, quod & librarium uocatur, & græce melan graphicon, dictum est in Fuligine pictoria, Chalcantho, Melantheria.

LI iiij

Finis LIB. Quinti.

A

μελαν γραφικόν

B

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Sextus.

IO. RVELLIO interprete.



SUPERIORIBVS amicissime Ari libris, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & eorundem fructibus, lachrymisq; Item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, hærbis, radicibus, liquamentis, uinis, metallisq;. In hoc uero totius operis ultimo, facultates eorum recensebimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitantes itaq; nomenclationis tædia, ad institutum reuertemur. Huiuscemodi autem Tractatus, cum bifariam distributus sit, in partem uenena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes: aut siquando per imprudentiam dentur, ut tum quoq; innoxia fiant, irritaq;. Et in partem auxiliatricem. Primum disseram de præcauendi modo: quem esse difficillimum plerique Maiorum arbitrantur, quod dantes clam uenena, ita insidias temperant, ut peritissimum quemq; decipiant. Siquidem uenena sua amaritudine, permixtis dulcibus spoliant, & graue odoris uirus mistura odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ leuandæ ualitudinis gratia dari solent, & præsertim quæ infirmioribus, ut Absinthium, Tragoriganum, Cunilam, aut Hyslopum. Quinetiam Thymum, Irim, Origanum, Castorium, aut si quid medicamenti cognatum habere saporem uideatur. Aut potionibus inserunt, aut uinis, aut iuribus, aut passo, aut mulsæ aquæ, musto, succis, lenti, polentis, aut medicaminibus. Aut concinantes ipsi, eduljis admiscent. Quare qui in ea suspicione sunt, condita edulia uitare debent, omnique intensa saporis qualitate, dulcium, aut salforum, aut acrium abstinere, nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes uoraciter comesse, semperq; ad saporem esitatorum diligenter attendere: præsertimq; bibentes, frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates ægerrime concoquuntur. In infirmis quidem facile uitare possumus potiones auxiliij gratia dari solitas, quas offerunt improbi, qui beneficia moliuntur. Itaque ob id laborantes morbo, non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem, ne facile seducti homines, capiantur dolis ueneficorum, occasio est & facultas. Sed alia expeditior, ut suspitiosi aliqua præsumant, quæ uenenorum uires hebetent, & inefficaces irritasq; reddant. cuiusmodi Caricæ sunt cum Iuglandiū nucibus manducatæ, & quæ Cedromela uocant, id est, Citria, semina

A nis Napi drachma cum uino. Item folia Calaminthæ, aut terra quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum uino. Aut Rutæ folia, & nucis Iuglandis nucleum, aut Caricas duas, & salis callum ieiuni sumant, & nullo ueneni genere ledentur. Antidota ex uino sumpta eundem effectum præbent. Inter quæ intelligitur magnum metridatium, quod scinco & sanguine temperatur. Quin & sæpe uenenis obsistunt peculiares affectus in corporibus, certo quodam modo constitutis, & quadam cibi potusque qualitate, aut uini copia ita temperatis, ut cum uenenis dissentiant. Siquidem ingesti ueneni uires frangunt, atque iam priore alimento factis, præclusisque meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur. Verumenimvero quoniam fortunæ temeritas interdum similia discrimina, peregre agentibus affert, absque ullis insidijs hominum, nonnihil dissimulandum mihi de hac re necessarium duco. Iamprimū igitur culinam apparare loco sub diali conuenit, cibosque & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri commode nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi, apponendi que sub tecto. Sed tunc diligenter laquearia animaduertenda. Frequenter enim a superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet. Namque reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbentia, noxium uirus eructant: interdum uero delapsa, immerisque moriuntur, & exitij causas haurientibus afferunt. Sed hæc hætenus dicta sint, cauti & prouidi, insidijs ne pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sumplerunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem dum comites singulorum uenenorum notæ expectantur, immedicabile fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægre cedit. Quare si qui compotes mentis, se uirus sumplisse fateantur, aut eorum qui aderant testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile peculiari nativæque constitutioni restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo uitia, quorum causæ corporibus insident, medicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt uenena, medendi rationem aspernantur? Aequè uero omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, aut pristinis affectionibus, qualitatibusque, quibus sit opportunum corpus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsitan obmutescunt, aut temulentum, aut nolentes alioqui uenenum egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad ea quæ communiter epotis quibuscunque uenenis opitulari consueuerunt. Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari potest, quam ut proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogantur, da-

B

D I O S C O R I D I S

Cri conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, urtica, scenograeco, aut halicæ decocto uicem eius exhibebit. Hæc enim non modo uomitionibus exigent ui illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoq; subducent, & corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias eorum hebetent. Id quod euidenter huiuscemodi argumētoprehendere licet. Esto ut quisquam uiua calce, uel uini facie, aut cantharidibus, aut alio quouis acri corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationē non accipiet. Atqui neq; uehementer adstringi corpus, neq; refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam uomitus non ob id modo quæuacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentū adfert, sed quod assumptum uirus nonnuncq; odore, coagulatis globulis, aut colore, prodat. Quippe cum odore & amaritudine meconium, colore cerusam gypsumue, globulis lac, aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ ueneficia deprehendit; ita ut nonnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo, maluæ decoctum ammiscetur, aut glaucium, aut ædeps anserinus, aut pinguiū carniū iura, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi uero uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquiæ clystere acri deuocentur. Facit & nigrum tritum, & cum hydromelite sumptum. Vina uetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes, pinguesq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namq; subducunt, uti diximus, & stomachum resoluentia, proniorem ipsum ad uomitionem reddunt. Et uenenorum acrimonias hebetant, atq; meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inhihent. Quinetiam medicamēta dantur, quæ cōmuni dote profunt, ut Lemnia terra, Agaricum, Abrotonū, Irio, radix Eringij, semen Pastinacæ & Calaminthæ, Nardum gallicum, Castoriū, Ferulæ uirentis medula, flos Rhododendri, succus Marrubij, Laser aut Laserpitium, Sagapeniū, Peucedani succus, aut Panacis, & radix quæ Magudarim appellarūt, Aristolochia longa, syluestris Rutæ semen, & Betonicæ (quæ Cestron noīant) folia. Singula cū uino drachmæ pondosumi debent. Effectum præbet Polij decoctū, & Seseli, & liquida Pix linctā. Magnifice ferūt opem, antidota quæ in calce operis scripta reliquimus. Cōmunis ratio præstandi auxilij, ita se habet. Ceterū ab ijs quæ consueuerūt euenire, cōmunia remedia sumptitari possunt. Fere enim uires uenenorum quam plurimorū, in affectus consimiles, corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisq; cōmunia conducūt auxilia. Permulta etenim uenenorum genera, cōmunes tamen, nec multi iisdem affectus oriuntur. Neq; fieri potest, ut omnia quæ contingere solita sunt, unū uenenum sequantur. Alioquin superuacaneus esset uenenorū tractatus, si

gillatim remedijs ab authoribus traditis. Neq; uero in uno eodemq; **A**
promptum est inuenire, ut stomachi, iecoris, renum & uesicæ dolore ue-
hemēter crucietur, ut singultuat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, ob-
mutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, ueterno prematur, caligent sen-
sus, stranguletur, sitiāt, sanguis erumpat, febre conflictetur, ægre lotium
reddat, torminibus uexetur, crebro uomitet, nausea prematur, rubescat,
liuore suggilletur, palleſcat, desipiat, stertat, uiribus deficiatur, & pleraq;
alia eueniant. Vnumquodq; uenenū in generales affectus diducitur: ut
pauca numero & communia demonstrantur, quæ enenire consueuerūt.
Quare in singulis quæ supra diximus, non facile fuerit deuoratum uirus
cognoscere. Nam stomachi & linguae erosio, uentris ac renum inflamma-
tio, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris exitus, laceratio, &
in plurimis partibus quiddam adustionis sensus, non in Cantharidibus
modo potius reperiuntur, sed in Erucis quoq; pinorum, & Bupreste, &
Salamandra. Porro eos qui Meconium hauserunt, non modo ueterno,
aut sopore premi, stertere, liuore, suggillari, torpere, refrigerari, stupeſce-
re, sensu priuari constat, sed eos etiam qui Mandragorā, aut Cicutam deu-
orarunt. Delirium non Hyoschamus tantū infert, uerū etiam quæ To-
xica appellantur. Itidem aconitum, & mel quod in Heraclæa pontica gi-
gnitur. Strangulatio non minus in fungis, q̃ in sanguine taurino, lacte,
aconito, cerula, gypso conspicitur. In summa, difficile unum uni ueneno **B**
propriū inuenire signum, quod haustum uirus prodere possit. Maxi-
me, q̃ hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, com-
munia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, adnotari for-
tasse, quod inspectum fuerit, licet, ut postea trademus. Sed ijs qui ad lon-
gas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat,
quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum uenena statim atq; præſenta-
neam uim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus communia
reliquorum uitiorum remedia, compositionesq; flagitent: cum uenefica
proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diu-
turniorum morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi ra-
tionem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hætenus.
Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus: si
prius simul exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut ma-
leficam uim sortiunt: ut medicinæ studiosi, intra obseruationē cauti, qui-
busdam eorū medicamentorū misturis utant, quæ memoriæ literarū tra-
dita sunt, & ab authoribus descripta. Imprudentia em̃ magnas adfert no-
xas, & sæpe continuo usu eorū, homo in perniciem agitur. Proinde ani-
malia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt. Cantharides, Buprestis, Sa-
lamandra, pinorum Erucæ, Lepus marinus, Rubeta, & Rana palustris
muta, deuoratę Hirudines. Semina sunt, Hyoscyamus, Coriandrū, Cicu-

D I O S C O R I D I S

Cta, Gith, Mandragora, Psylion, Liguamēta, Meconium, Opocarpasōn, Thapsiæ succus, Elaterium. Radices quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui colchicum uocant, q̄ in Colchide nascatur. Hærbæ oleracq̄, Smilax, quam aliqui thymion appellant, Romani Taxum: Solanum manicum, quod et doricium dicitur: Sardonîa herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum Papauer, Phtharicumt, Toxicum, Ruta siluestris, Fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, duo Sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum uiuum dicitur. E uitibus uinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

De Cantharidibus.

C A P. I.

hærbæ p̄d̄i

Quibus datæ sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usq̄ cuncta erodi sentiuntur. Picem, aut simile quiddam Cedriæ resipiunt. Dextra præcordia inflammantur. Vrinam ægre reddunt. Et subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atq̄ dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent. Animo linq̄untur. Obortaq̄ uertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo anteaq̄ tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. Mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzæ, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut foenigræci, aut radicem altheæ, quam latinus sermo Ebiscum appellat, clystere infundatur. Præterea Nitrum eisdem dandum, ex hydromelite: ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adherent, lingendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi intercidantur, ingesta ex Nitro aqua mulsa uacuari debent. Detur deinde uinum, aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus, inflammatae aut partes hordei farina aut mulsa perungantur. Ab initio ad mota cataplasmata nocent: q̄ citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur. Vtpote quæ dolores & permulceant & leniant. Quo tempore corpus calfaciente oleo, quo facilius introeat, eluere par est. Cæterum omnibus medicina, ut noxium uirus per summa corporis excernatur. Deiectiones multas riam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeat. Galinaceis carnibus, & hædinis, aut suillis, catulis, maxime pinguibus. & tenerimis uesci debent. Siquidem aluum cient, atq̄ uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest Thuris cortex, & Samia terra, quæ Aster appellatur: si quaternæ singulorum

drachmæ cum passo fumantur. Item Pulegium, ex aqua tritum. Irinum aut rosaceum cum rutæ decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longe omnium potentissime antidota auxiliantur, in quatuor drachmis aquæ mulsæ pota.

EX M. VERG. COMM.

Infames quotidianis experimentis, & in interiore usu a cunctis damnatæ Cantharides semper fuere. Quales autem hæ sint, satis. 2. uolumine a scriptore hoc, & a nobis dictum est. Tractataque tunc omni earum medicina & historia, nihil nisi maleficium, in quo diligentior esse hominem oporteat, relictum modo est. Quale autem id sit, satis in scriptore hoc patet. Patent & remedia, quæ ab eo deinceps tradita sunt. Idque tam certe & diligenter factum est, ut nihil monuisse legentes nos oporteat; & si plurima in nobis aliorum æditionibus contraria, aut diuersa saltem legantur. Quæ diligentius, & exactius prosequi posthac nobis animus non est. Festinamus enim longiore quæ a principio credidimus, opere hoc defatigati. Cupimus tamen pro nobis in eo legentes laborare; collatisque aliorum in hac parte æditionibus, scriptori huic, & in eo humane salutis operæ ferre. Ipsi interim in Cantharidibus his non tacebimus, discrepare alterius interpretationis æditionem a nostra, quo loco Dioscorides negat inflammationibus potu Cantharidum factis, imponenda a principio ex hordeacea farina fomenta: causam afferens, *διὰ τὸ ὑπὸ τῆς γινόμενης θερμότητος κατὰ τὴν ἐξουσίαν τῶν τοῦ σώματος ὄντων κυρίως*. Quod uersum ab eo est. Quia excalidatis corporibus remedia contineantur, quæ muniendis & defendendis illata uitalibus fuere. Nos autem contrarium concipientes sensum, diximus. Propterea quæ accedente calore retinetur quod datum fuerit, uenenum uitalioribus partibus inhærens. Retulit ille *τὸ δὲ δὲν*, id est, quod datum est ad remedia; in quo rei, & sibi ipsi, ni fallimur, aduersari uideat. Negat hic ob calorem a principio fomentis utendum esse; reddiditque causam, quoniam scilicet retineatur. &c. Manifesto argumento sumpta a contrario ratione, uelle conarique Dioscoridem, pelli & excludi pro hominis salute quæ intra eum sunt. At in remedijs optandum querendumque id non est. Quæ quo diutius intra hominem fuerint, eo certius medebuntur. Idque nos cogitantes, de ueneno intelligi oportere in eo participio credidimus: eamque rationem secuti, locum ut in æditione nostra legitur uertimus. Dicit forte aliquis, de remedio intelligendum ob eam causam esse: quoniam nisi descendat, egrediatursque uomitione, aut alui deiectione sumptum id remedium, uenenum una non educet, simulque cessans nullam afferet in hoc periculo opem. Non spernendum penitus id esset, nisi hic subiecisset, retineri quod datum fuerit uitalioribus partibus inhærens: quod nisi de ueneno apte intelligi non potest: & si intellexisse hoc modo etiam id oporteat, ad uenenum & unde mali principium est tota reuertitur res. Non conuenit etiam nobis cum cæteris interpretibus quo loco hic scriptor ait, dandas contra Cantharidum maleficium animalium pingues carnes, *καὶ ἀπαλώματα*. Eam uocem cæteri ex cōmuni eius æstimatione uerterunt, tenerrimas; nos autem, longiore coctura flaccescentes. Fecimusque id autoribus græcorum medicis, qui in scriptore locum hunc signantes, *ταυράς* in hoc usu carnes exigunt. Significat autem id quod diximus, longiore coctura, & eousque tenerescētes, ut diminutæ primum a sua quantitate, omnem etiam amiserint duriciem. Suntque coctura, non ætate tenerrimæ hoc loco intelligendæ carnes. Eadem etiam dulcis aquæ balneis in hoc periculo uti iubent.

De Pinorum Eruca. CAP. II.

Is qui Erucas Pinorum hauserunt, ilico dolor in ore & palato exoritur. Vehemens alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur. Corpus totum exæstuat, fastidium urget. Quibus est succurrendum, remedijs quæ deuoratis Cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici Oleo et Irino, Melinum quod e cotoneis pomis & oleo temperat, accipiemus.

EX M. VERG. COMM.

Satis secundo uolumine de Erucis dictum a nobis est. Nunc legentes monuisse aliud non oportet, quæ tunc de olerum, nunc priuatim de Picearum Erucis agi; simili quidem, & natura congenere insecto, uiribus tamen & maleficio dissimili. Siquidem quæ in piceis nascunt, presentem mortis habent causam, ab oibus passim danatur: priuatim a scriptore hoc, quæ salutis humane cōsulēs, notas

Mm

C ueneni earū et remedia breuiter qdē, sed certissime tradidit. Meminisse illud tñ legētes uolumus, quę cognomines his in mari nascunt, Erucęq; adhuc passim aliq̃ gentibus uocant, nullū habere ueneni maleficium, sed mare incolentibus gentibus in mensarum precio & honore esse.

¶ De Bupreste. C A P. III.

Βούπρεστις

Qui Buprestin biberunt, non dissimile Nitro uirus sapiunt. Stomachi, uentrisq; uehemens dolor insequitur. Tam ueter q̃ stomachus mirum in modum ut in aqua intercutem diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contendi. Vrina suppressa. Quibus eadem quę potis Cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridę ficus p̃sunt. Itē earum decoctū ex uino. Vbi uero iam fere pericula inclinantur, thebaica rū Palmularū cibo, aut earūdem tritarum in mulso, aut lactis potu iuuantur. Pyrorū etiā omne genus esse, & lac humanū bibere, cōuenit.

EX M. VERG. COMM.

Pestis acerba boū Buprestis est: & inde illi a gręcis nomē. Rarū in Italia animal, antiq̃ auctores aliqui hoc tradiderunt. Nunc frequētius q̃ agrestis fortuna & res patiat, interempto quod tidie boue, ruris colono, inueniri agricolę lamentantur. Scarabeo lōgipedi simillimum tradit. Fallit inter herbas, bouēq; maxime: haustumq; ita inflamat, ut rumpat. Vniuerso qdem pecori nocet, sed in maiore bouis q̃ aliarum quadrupedum iactura: ab eius noxa priuatim nominatū est. Cecinit in Alexipharmacis suis notissimos de eo uersiculos Nicander: nihilq; non ab hoc, & ab alijs dictum & ipse etiam in notis & remedijs monuit. Addidit tamen, colorari labra eius qui Buprestidem hauserit. Versiculus eius est, ἰδ' ἢ τοι λίτρω ἢ τοι χράουσα χαλινά. Ex quo infecta nobis suspicio est, quod nitrum in scriptore hoc legitur, in Nicandro autem λίτρω, potuisse quondam forte aliter legi: nec maleficij Buprestidis notam in uiroso tantum odore nitri esse, sed in putris corruptiq; tabi colore simul & odore. In cōmuni tamen gręcorum omnium lectione nihil mutauimus. Relinquimusq; in bubus saltem diligentioribus obseruandam rem. Quos etiam monere uolumus, uolumine eiusdem numeri capite, Buprestim Plinio herbam esse, quā tamen ille non describit: & si Gręcos, magna inconstantia, in ciborum laudibus eam habuisse dicat: eosdemq; remedia tanq̃ contra uenenum prodidisse, boumq; uenenum esse ipso nomine indicari, quos dissilire degustata fatentur. Quod quale in eo sit, legentes uiderint. Nobis enim constitisse sibi gręci uidentur, nec nisi in uenenorum censu Buprestim constituisse.

¶ De Salamandra. C A P. IIII.

σαλαμάνδρα

Si Salamandram hauserunt, linguę inflammatio consequitur, mens præpeditur. Tremor cum torpore, aut horrore quodam ac exoluti one accedit. Partes nonnullę corporis liuoribus circumquaq; suggillantur. Sapeq; diutius immorante ueneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta quę potis Cantharidibus. Peculiaria uero remedia, resina, pinus, aut galbanum ex melle linctum, & trisaginis decoctum, in quo nuclei pīnei conterantur, urticę quoq; folia, cum lilij & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marinę, aut terrestres, cocta. Item ranarum ius, cum quibus eringij radix incocta sit.

EX M. VERG. COMM.

Describitur a ueteribus Salamandra Lacerti figura, stellato corpore, nunq̃ nisi magnis & continuis imbribus proueniens: tanta natui & intra se congeniti gelu ui, ut ignes non aliter q̃ glacies extinguat. Retulerunt ijdē, sanie, quę lactea ore eius euomitur, quacūq; hominis parte contracta, defluere pilos: quodq; contactum fuerit, natuum colorem in uiridiginem mutare. Addiderunt aliq̃, inter quos & Plinius est. uolumine, capite, inter omnia uenenata maximum Salamandrę scelus & maleficium esse. Siquidem aliorum uenenis singuli, nec plures pa-

riter intereunt: Salamandra improvidos, necare totos populos potest. Nam si arbori irrepsit, omnia poma ueneno inficit: & eos qui ederint, frigidissima ui enecat. Idem familiæ periculū est, si contactu ab ea ligno panis incoquatur. Vel si in puteum deciderit. Habet tamē talis, & tanti mali uis remedia aliquot, quæ capite hoc a Dios. docentur. In quibus a principio statim non est cum alijs idem nobis, quod ad notas haustam Salamandram sequentes perdet. Illi enim quod nunc in Dios. legitur καὶ διανοίᾳ ὑποδισμός, significatq; usus mentis impedimentū, ut in eo legebatur uerterunt. Nos autem ad sermonis impedimentum, auctoribus græcorum medicis eam transfulimus rem. Siquidem Paulus Aegineta de Salamandræ maleficio agens, καὶ λαλοῦ ὑποδισμός ait, significatq; illi, nō mentis, sed linguæ ad sermonē impedimentū: quod alijs eius mali notis magis cōgruit, linguæ inflammationi, resolutioni, tremorūq; quæ omnia sermonis potius q̄ mentis usui officere uidentur. Accessit his etiam in Alexipharmacis suis utriusq; sane euentus testis Nicander, sed in eo quod nos dicimus certior. Versiculi eius sunt. αἰ-τα ῥόν ὑπὲρ ῥόνου γλῶσσης βέρον, ἀτὰρ ὑπομάχης δάμναται, ὑμῶν δὲ κακὸς τρόμος ἀφ' ἧς: οἱ δὲ περισφάλλοντες ἀτὲρ ῥόνου ἱρπύσουσι τετραπόδου, νεῖραι γὰρ ἀπὸ φρενὸς ἀμυλόνονται. Eorū sensus est. Statimq; incenditur lingua: & torpore contrahitur. Vrgensq; malus tremor, membra soluit. Illi uero aberrantes, ueluti infantes quadrupedes repunt. Mens enim illis hebetatur. Vtraq; a Nicandro ueneni Salamandræ nota numeratur, & linguæ, & mentis impedimentum. Sed nos magis amauimus, quod Aegineta & Nicandri testes & auctores habet: præsertim dicente hoc impedimentū, quod linguæ & sermoni aptius q̄ menti tribui uidet. Persuasitq; id etiā quod Nicander ait, inflammari linguam, & torpore contrahi. Quo loco aduerbio ἔφ' usus est, quod retro significat: & μάχῃ uoce, quæ in contractione ex gelu facta apte dicitur. Est enim ut græcorum grammatici docent, μαλίν, frigore contrahi manus & torpere: quod suo gelu Salamandra in lingua facit: torpenteq; ea impeditur eius usus. At Nicander ait, hebetari eis mentem. Fatemur id quidem, nec multo ante diximus, probasse nos hoc magis q̄ illud, quia plures id testantur: & q̄ aptior hic sermonis ductus nobis uideretur. Nunc autem illud addimus, non aduersari huic sententiæ Nicandrum, sed hanc ultra alias notam mali huius eum ostendere. Nos sic sentimus, & nihilominus poterūt uolentes quod magis probauerint sequi. Nobis grauissimus testis Paulus Aegineta est, toto huius scriptoris capite hoc in cōmentarijs suis exscripto. Testati cæteri omnes sunt, nō tam qui ex professo hæc docuerunt, sed qui obiter Salamandræ meminerunt poetæ, scriptoresq; alijs, ueneno eius defluere humani corporis pilos omnes. Sic Martialis mulieri imprecabatur. Hoc Salamandra caput, uel sæua nouacula nudet. &c. Et nihilominus a scriptore hoc, alioquin diligentissimo, nihil huiusmodi traditur. Non tamē negligentæ, ignorantiaue eius aliquis id adscripserit. Qui cum bifariam notere, foris scilicet contactu, & intus haustu Salamandram sciret, alterumq; illud malum leuius esse, nec nisi dehonestamentū decoris facere, alterum in quo de uita ageretur diligentius obijit. Quam rationem secutus Plinius, 10. uolumine, capite, 67. quomodo cōtactu foris Salamandra homini nocet, breuius docuit. Ait enim. Sanie eius quæ lactea ore uomitur, cōtactas hominis partes totum amittere pilum, idq; quod contactum fuerit colorem in uisilignem mutare. Reliquo deinde opere, multis locis intra hominem insecti huius maleficium hoc, aut illo remedio curari præcepit: hic autē, ut diximus, τοῖς σαλαμάνδραν λαλοῦσιν id est, his qui Salamandram hauserint, remedia instituit. Crediderunt aliqui etiam, male in hoc capite legi, remedium illud quod ad Vrticæ folia cum Lilij decocta pertinet: asserētes, auctore Appollodoro, ut Plinius testatur, non cum Lilij, sed cum testudine legi oportere. Plinij uerba sunt lib. 22. capite, 15. Appollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Ratiocinatiq; in eo sunt, ἀπὸ τῶν χελωνῶν, quæ uox testudines significat, facile κρινῶν, id est, Lilliorum fieri potuisse. Verumtamen in cunctis græcis eadem lectio est, & Paulus Aegineta inquit, ἡ κνίδας φύλλα συνειλεχέντα κρινῶν. Quod est, Vrticæ folia cum Lilij decocta.

De Ephemero. CAP. V.

Sympto Ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem Bulbū appellunt, pruritus in toto corpore excitatur, nō secus atq; ijs qui urtica, aut scylla laceffuntur. Interna rosionem sentiunt, Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterum inualecente morbo, cruor strigmentis ammissus, per aluum exigitur. Quibus ut ijs qui Salaman-

ἐφῆμερον

Ματ. η

Cdrā hauserunt., uomitione, aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed ante q̄ uenenum inualeſcat, dandum eſt decoctum frondium Quercus, aut glandium, aut florum mali granatæ. Lac bibere prodeſt, in quo ſerpyllum ſit decoctum. Itē ſuccum ſanguinalis hærbæ, aut ramorū uitis, aut rubi, aut medullę recētis ferulæ, aut myrti. Baccæ autem myrti tuſæ tritaq̄, & aqua macerata, ut liquor inde ſumatur, opem ferunt. Medius ſardoniarum glandium liber, ſimilē effectum præbet, ſi crudus in aliquo ſupradictorum ſucco ſumptitur. Origanum quoq̄ cum lixiuio epotum. Eximie iuuantur aſinini lactis, aut bubuli potu, etiaſi in ore cōtineant. Ita, ut quibus copia lactis huius adſit, nō aliud deſyderetur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quale Ephemerum hoc ſit, & quibus locis frequens naſci quondam diceretur, ſatis dictū quarto uolumine ab hoc ſcriptore, & a nobis eſt. Potuit, quia ſumptum ad unam diem uitam proroget, ſic græcis nominari. Non aliter q̄ multa alia, quę ob hanc ipſam cauſam Ephemera, ab eadem gente appellantur. Obſeruatum in hoc capite illud a nobis eſt: uomitiones, & clysteribus inteſtinorum inundationes, quas hic ex Salamandra ad Ephemerum remedia repeti iubet, nullas in ea legi. Oportereq̄ ob eam cauſam ſuſpicari, aut in Salamandra remedia eorum rationem deſſe, aut (in quam partem nobis inclinatur animus) quoniam Cantharidū modo curatur Salamandra: in ea em̄ hic ait, cū fecerimus omnia quę in Cantharidibus iuſſa ſunt, &c. non ex Salamandra, ſed ex Cantharidibus uomitiones, clysteribusq̄ exinationes illas repetendas eſſe. Vtriſq̄ enim pariter competunt, & ex utriſq̄ pariter imperari poſſunt. Licetq̄ non legantur in ea: quia tamen ſiunt, non male id fieri percipitur. Eſt illud etiam animaduertendum, quam Dioſ. ait caſtanearum mediam tuniculam, &c. eam intelligi oportere, quæ inter corium & carnem eius ferrugineo colore eſt. Et præter id, quemadmodum primo uolumine in Caſtaneis hic monuit, non tuniculam eam tantum, ſed carnem ipſam etiam contra Ephemerum uim habere: efficaciorē tamen tuniculam hanc eſſe. Quod & Nicander in Alexipharmacis ſuis etiam teſtatur.

D

De Dorycnio.

CAP. VI.

Dorycnion, quod & aliqui Manicon Solanū appellant, epotum, lactis ſaporē in guſtu refert. Vehementes ſingultus ciet. Humor linguā uexat. Sanguis ſubinde reiſcitur. Strigmentofa quædā perinde quaſi dyſentericis, aluo egeruntur. Itaq̄ anteq̄ aliquid ex ijs eueniat, auxilio ſunt antedicta, uomitus, clyſter, & quęcunq̄ potum uenenum expellere poſſunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulſa, lac caprillum, aut aſininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniſo bibatur, nuces amara, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchylia omnia tam cruda quam toſta eſſe ſalutare eſt. Conueniunt & locuſtæ maring, & gammari, & pota eorundem iuſcula.

E X M. V E R G. C O M M.

Poteſt, nec male quidem, falſoque Dorycnium uocari quodcunq̄ tela, cuſpides, & ut Poeta cecinit, ferrumq̄ poteſt armare ueneno. A ferratis enim lancearum cuſpidibus, quas græci dorata uocant, factum illi nomen eſt. Præſtiterunt id, & adhuc præſtant multa. Antiquitas tamē, ſi Plinio credimus, fuiſſe Solani ſucco ad eam rem primatim uſa eſt: uocauitq̄ ob id Dorycnium. Verba Plinii ſunt. 21. uolumine, capite. 31. Hoc eſt uenenum, quod innocentiffimi auctores ſimpliciter Dorycnion appellauerunt, ab eo, q̄ cuſpides in prælijs tingerentur illo paſſim naſcente. Eſſeq̄ Dorycnium fuiſſe Solano idem, hic primum teſtatur, dicens: Dorycnium, quod quidam fuiſſe Solanum dicunt. Teſtatur Plinius quo diximus loco certius: teſtantur græcorum medici & herbarij omnes. Vtq̄ ab hoc ipſo ſcriptore. 4. uolumine locale ſim.

pliciter dictum Dorycnium est, sic certius, & ex professio nunc notæ & remedia eius docetur. In quibus duo tantum, ex Nicandro alterum, alterum ex Paulo Aegineta monebimus. Sequi haustum Dorycnium hic ait, *ὡς αἶψα γάλακτος ποιῶντος ἐν τῇ γαστρὶ*. Quæ uoces nihil significant aliud, quæ lactis in gustu qualitatem, quæ nulla alia quæ sapor est. Pertinet enim ad gustum ea tantum qualitas. Nicander tamen in Alexipharmacis de hoc ipso Dorycniio agens, inquit, *ἀλλὰ ἄριστ' ἐστὶν ὁ δορύκνιον ὅτε γάλακτι ὡπὴ τε θρῶσις τε περὶ σωματίων ἵκται*. Quod est. Sed age Dorycnium etiā cōtemplare. Cuius circa os lacti similis est aspectus & cibus. ὡπὴν enim ille uocat, quod uidetur, & oculis sentiuntur: id aut color est: *θρῶσις* uero quod estur: & ex eo saporem, duasque notas has numerat colorem & saporem, & utrunque lacti similem. Hic tamen solum saporem indicasse uidetur. Nisi aliquis in cōmuni illa qualitatis uoce quæ usus est, colorem etiam intelligi uoluit: uerum eam qualitatem ad gustū hic tamen contraxit. Alterū quod ex Paulo Aegineta monemus, ad remedia pertinet. Quod enim hic ait, cum aniso tepidum passum, ab eo cum exiguo aniso dari præcipitur. Potuit ea uox scriptori huic perijisse. Ea quæ ob causam ignotā legentibus esse nolimus.

De Aconito. CAP. VII.

A Conitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit, gustantibusque maxime cum exurgere conatur, uertigines offundit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori & præcordijs adfert. Simulque crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus est. Vimur inter arcentes potus origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semperuiuo, uel abrotono, uel chamælaea, aut trisagine. Prodest etiam annum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipe-re, & ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum hædi, leporis, aut hini nuli cum aceto. Ferri quoque stercus. Item uinum in quo aurum, ferrū, argentumue candens restinguatur potum. Lixiuiaque cum gallina & uino decocta, aut carniū præpinguium iura cum uino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

EX M. VERG. COMM.

A Testibus contra testes, ut in iudicijs quotidie fit, pro Aconito agendum nobis est: & unus contra multorum fidem audiendus, haud sane quale Aconitum sit dicentibus: locale enim oēs esse affirmant: sed unde facto nomine in poetis, scriptoribusque alijs tantopere infamis sit. Grammatici siquidem, poetæ, & qui plantarum historiam aliquando scripserūt, a cotibus & petris, in quibus nasci fertur dictum esse uolunt. Naso in Transformationibus suis lib. 7. notissimos cecinit uersus. Quæ quia nascuntur dura uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Plinius. 27. uolunt mine, cap. 3. eosdem natales illi tribuens, ait. Nascitur in nudis cautibus, quas Aconas uocant: & ideo Aconitum aliqui dixere, nullo iusto ne puluere quidem nutriente. Secuti hos plures alij, idem tradiderunt. Tamque a grammaticis id receptum est, ut non facile sit decreta eorum conuellere. Conabimur tamen, ueritati consulentes: unusque cunctis his uelut in acie obijcietur Theophrastus. Qui lib. 9. de plantarum historia nasci quidem petrosis locis Aconitum tradit: non tamen a petris nominari, sed a Periandynorum uico, quem Aconas uocabant: ad quem copiosum & efficacissimū nasceretur. Verba eius sunt. *φύεται δὲ πανταχοῦ καὶ ὅχι ἐν ταῖς ἀκόνιας μόνον, ἀλλ' ἐν ἡμῶν τισὶ τῶν περιανδύνων, φιλὰ δὲ μέγιστα τοὺς πετρώδεις τόπους*. Quorum sensus est. Nascitur autem ubique Aconitum, non in Aconis tantum, a quibus appellatorem habet. Vicus autem Periandynorum Aconæ sunt. Amat præcipue petrosa loca. Aequi uoca loci & cotis appellatio, diuersitati huic causam dedit: multoque magis in petris natales eius. Vtris autem magis credendum sit grammaticis censebunt. Est enim omnium grauis, nec damanda fides. Theophrasti tamen auctoritatem poetis, Plinio, grammaticisque nunc ego ex æquo contulerim. Anceps in hoc capite etiā locus est: illic scilicet ubi contra Aconitū remedia docentur. Dubitari enim potest: iubeat ne Dioscorides sumi cum uino Lixiuia, & elixos gallinaceos: an potius contra Aconitum prodesse lixiuiam, in qua una cum uino elixati gallinacei fuerint.

Crint. Nos in ambiguo id elegimus quod ab alijs græcorum medicis confirmatur.

μῆλι ἐν τῷ ἡρα-
κλῆα

¶ De uenenato Heracleæ melle. CAP. VIII.

Mel Heracleæ in Ponto, ubi aconitum gigni solet, Athenis Ionía, Euboíce Siderites nominatur: quod qui edunt, bibuntue, non secus affliguntur, q̃ qui Aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ po- to Aconito conueniunt. Adiuuantur in primis cōtinuo uini mulsi po- tu, cui rutæ folia sint adiecta.

κορίον

¶ De Coriandro. CAP. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem, densam uocem facit. Insaniam adfert, a temulentis non aber- rantem. Qui sumpsērunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis o- dore uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concis- tatam, uti retulimus. Merum & per sese, & ex absinthio potum auxilia- tur. Item oleum. Nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in mu- ria sorbeantur, & epota muria, & ius falsum ex gallina & anfore. Passū quoq; cum lixiuia sumptum.

EX M. V E R G. C O M M I

D

Famosa in Carmine suo Coriandra appellans Columella, ancipiti uoce usus, cogitandū po- sterior reliquit, quotidianum ne eorum usum laudauerit: an magis in ueneni maleficio, q̃d ha- bent, monere legentes ea ratione uoluerit. Vtrumq; enim nouisse hominem uerisimile est, præ- cepisseq; eorum inter hortensia consitionem: & nihilominus quoniam homini nocerent, una illa uoce, nimium, ut hic in Coriandro ait, usum eorum damnassee. Quod ab hoc ipso, uolu- mine factum est, cum monuit, maiore copia sumptum Coriandrum graui periculo mentem cō- mouere: ideoq; nimium, & continuum uitandum eius usum. Factum & ab alijs græcorum me- dicis & herbarijs omnibus, inter quos & Nicæder poeta est. Cuius antiquissimus interpres, syl- uestri Coriandro, non fatuo ueneni maleficio assignat. Nos tamen in plantarum, & medicæ materiæ historia, syluestre in hoc genere hætenus non inuenimus. Et quoniam omnes Corian- drum simpliciter nominant, unum tantum genus eius credendum. Plura q̃ Diosc. numerauit remedia contra Coriandri furorem a Nicandro traditū. Nolumus nos ea docere. In eo em̃ scriptore parata omnibus sunt. Quod autem nobis cum alijs nō conuenit, ex eo, et Paulo Aeg- inetæ confirmandum est. Id scilicet quod hic ait ὡς τε κινωθέντα ἢ τὸ αὐτὸ καὶ διεθίντα οὖν ἀλμυρὰ φονδύα. Qui locus quomodo ab alijs & a nobis redditus fuerit, facile erit uolentibus cognosce- re. Quod autem cum altero eorum nobis non conuenit, remedij huius ratio & usus est. Ille em̃ quæ Dioscorides ὡς τε κινωθέντα, id est, oua omni intrinseco humore uacua appellat, nec ultra q̃- q̃ illis adiicit, Oua in patinam depleta & subacta cum falgine, uertit. Remediumq; instituere uidetur, quasi deplere oua oporteat: & quod ex eis depletum est, subigendum esse, & cum falsu- gine forbendum. Nobis contra uisum est non quod in ouo clauditur querendum esse, sed de- pletis omni suo humore ouis, eorum putamina. Vtūmurq; ad hanc sententiam rationibus his: q̃ in cōstituendo ouorum usu, huic & alijs, semper satis fuit ouis uti præcepisse. Quod enim in illis usum plerumq; habet, interior liquor est: & si hac magis q̃ illa parte uti oporteat, tunc ui- tellum aut albumen seorsum imperari. Idq; tam late in hoc scriptore & alijs patet, ut certius o- stendi non sit opus. Hoc autem loco cum iubeat hic scriptor, depletis, id est, uacuis ouis contra Coriandrum uti, putamina eorum tantum imperari opinati sumus. In eamq; sententiā nos pri- mum traxit Paulus Aegineta, qui ὡς τε κινωθέντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ λυαθέντα, in hac ipsa re itidem dixit, id est, euacuata oua, & in seipsa, id est, nullo alio in loco trita & infracta. Traxit & Nicader, qui in Alexipharmacis suis inquit, πολλάχις ὀρεαλίων ἀπαλὴν ὡδὴν κινώσας, ἀφρόν ἐπιπικράσκει. &c. Qd̃ est, Sæpiusq; gallinarum mollem partem euacuans, spumam superinfundens. Manifeste iubet is, gallinarum oua deplenda esse: depletisque his nihil superest quod intelligi possit, quam puta- mina. Accedit his communis deinde sensus, in quo auditis depletis ouis, nihil quauā putamen

intelligi relinquitur.

De Psyllio. CAP. X.

PSYLLION epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam affert. Cui omnia quæ exhausto Coriano auxiliantur.

REFRIGERAT Psyllion, quæ Pulicaris herba est. 4. uolumine a Dioscoride tractata: suoque frigore uitæ noxias perfrictiones & algores facit. Et præter algores corporis resolutiones, & mentis tristitiam. Qualis ea sit, & quomodo ueneni maleficiû hominis uitæ afferat, ex historia eius facile legentibus patebit.

De Cicuta. CAP. XI.

CICUTA pota, uertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut eminus non cernatur. Singultus ciet. Mentem turbat. Extremitates gelantur. Denique conuulsi suppressio arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, Cicutam uomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur: ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus, dantes nonnihil intermissionis. In qua proderit lac bubulum potui datum: aut absinthium cum pipere, & uino castorio, ruta, mētha cum uino: aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia: aut piperis cum semine urticæ & uino: aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo. Passum per sese largius potum proficit.

EX M. VERG. COMM.

Sunt scriptori huic, & grecorum medicis in Cicuta remedijs omnia eadem: pleraque tamen illi adijciunt, quibus tota certius tractetur res. Quale uerbi causa est, quo loco hic Piper simpliciter instituit, illi commune addiderunt: utendumque communi Piperi iubent, ut longum & album ab hoc usu excluderent. Quale itidem cum Lauri folijs teneritudinem adijciunt, tenerisque eius arboris folijs uti præcipiunt, summos ut nos credimus coliculos eius intelligentes. Quale etiam cum decernente hoc Amomi, Cardamomi, aut Styracis drachmam, illi unciam constituunt. Similiaque his pleraque alia, quæ uolentes diligentioribus in hoc studiorum genere relinquimus.

De Taxo. CAP. XII.

SMILAX a quibusdam Thymion, a Latinis Taxus appellatur. Frigiditatem uniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert, cui eadem quæ Cicutæ conueniunt.

EX M. VERG. COMM.

DICTA a nobis quarto uolumine de Taxo arbore fuerunt, quæ satis tunc fore credidimus. Nihil nunc monuisse aliud legentes oportet, quæ ex eo loco repetendam eius historiam: cognoscendamque arborem, quam ueteres greci non Smilax tantum, sed Thymion etiam uocauerint. Hæc enim altera eius appellatio quondam fuit, & si uarie in antiquis exemplaribus legitur: solaque umbra, non succo tantum homini letalem: non tamen semper, sed ut Plutarchus Symposij sui tertio commentario monuit, quo tempore prægnas flores profert. Ex quo quod in historia scriptoris huius, quo diximus loco legitur, letalem umbram homini Taxum esse, non nisi cum floret, intelligendum est. Nec caret ratione aliorum quorundam florum exemplo, quorum halitu homini sæpenumero nocetur.

Mm iij

C De Carpasi succo. **C A P. XIII.**

E Potus Carpasi succus, soporem, citamq; strangulatiōem adducit. Aduuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

E X M. V E R G. C O M M.

C Arpessia quinto suæ medicinæ cōmentario uocat Paulus Aegineta, cuius liquorē oēs ho-
mini letalē faciunt. Meminit eius aliquādo Plinius. Nobis de gñe herbę nō satis cōstat. Verū-
tamē frigore noxiā intelligere oportet, ex quo iisdem Cicutæ remedijs illi succurritur.

C Sardonīa hærba. **C A P. XIII.**

σαρδόνια πόν

SARDONIA Ranunculi hærbae generi assignatur, quæ uescen-
s tribus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in-
rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. A qua quidem affectio-
ne, de Sardonio Risu adagium in uulgus aperte manauit. Post uomit-
tum peculiariter conuenit aqua mulsa liberalius epota, lac, irrigatio,
perunctioq; a pinguibus totum corpus excalfacinentibus. In calidam
aquam, oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere
expedit. Et in summa, curam omnem quæ conuulsioni neruorum ad-
hibetur, exequi oportet.

E X M. V E R G. C O M M.

Nouerunt nostræ ætatis herbarij Sardoniam herbam, Risus Apium appellantes. Apulei-
us in cōmentario illo de herbis, Sceleratam herbam nominat, manifesta a maleficio eius no-
minis rōne. Nos longius de ea secundo uolumine in Ranunculo herba egimus: quodq; tunc
factum est, inutiliter agi iterum hoc loco non debet. Poterunt uolentes ex cōmentationibus
illis nostris quæcunq; opus erunt in hunc locum reuocare.

D De Hyosciamo. **C A P. XV.**

υοσκάμιον

HYOSCIAMUM potum, aut comestum similem ebris abalienatiōem
mouet. Sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa co-
piose data, lacq; præsertim asininum, si id desyderatur, caprillum, uel bu-
bulum, uel aridarum ficuū decoctum. Faciunt ad id etiā nucleī pinei, aut
cucumis semen ex passo sumptum, & uinum salsum cum adipe suilla re-
centi passocq; itidem urticæ semen, aut nitrū ex aqua, & intubus errati-
cus, & sinapis, & nasturcium, radix cepæ, & allium. Et hæc singula cum
uino sumantur: post conquiescant, ut uinum concoquatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ cognoscendæ Apollinari herbæ necessaria erant, quarto uolumine in historia eius
dicta iam pridem ab hoc, & a nobis fuerunt. Quo loco, cum dictum a Dioscoride
fuerit *μανιόλη καὶ καρωτικόν* esse Hyosciamum. Quorum uocum altera insaniam, altera soporem
significat, dubitandum, quærendumq; legentibus reliquit, an desit hoc loco, an abundet illic
altera illa soporis uox. Ex his sane quæ hoc capite traduntur, abundare illic uidetur. Ex quo
inquit imperandam esse quietem, ut potum ebriorum modo uinum concoquant. Quæ impe-
randa non erat, si *υάρον*, id est, soporem Hyosciamus faceret. In maleficio eius præterea a græ-
corū medicis nihil aliud, q̃ ebrietati similis amentia numeratur. In angusto uersatur res, ut aut
ex Hyosciami historia eam expunxisse uocem oporteat, aut quod illic *καρωτικόν* est, contra cō-
munem uocis eius æstimationem ad capitis affectionem aliam transferendum sit. Omnia toto
hoc capite, omnibus eadem sunt: præterq; in extremo calce, in quo aliter uoces suas concipit
Paulus Aegineta: monerq; imperandā esse quietem, ut non aliter q̃ ebrii potum somno con-
coquunt uinū. Sic etiā quiete sua qui Hyosciamū hauserint, ueneni eius uim pariter concoquāt.
Nihil em̃ in re alioquin haud multifacienda mutauimus, satis imperatā quietē fore opinati.

De Mandragora.

CAP. XVI.

A

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uchemens ueternum, nihil temere distans a lethargo. Cui antequam aliquid ex his accidat, uomitus ex aqua mulsa proderit. Postea nitrum, & absinthium, ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & acetato perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii & rutæ, tritorum in aceto, & liquidæ piceis, & odor e lucernarum extinctu. Quod si ægre si reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

EX M. VERG. COMM.

Sopit quod primum malo somno hominem Mandragoras, Idque non tantum hoc loco Dioscori, sed in historia. 4. uolumine longius ab eo traditum est. Remedia nunc tam noxiæ quietis traduntur. Primumque locum uomitiones, & mulsa aqua sibi uendicauerunt. In quibus non conuenit nobis cum alijs interpretibus. Illi enim uomitiones, & aquam mulsam coniunxerunt, uomitus ex aqua mulsa prodesse, & uomitiones moueri, & aquam mulsam dari dicentes. Nos ex Græcorum medicorum disciplina, conferre quidem uomitiones diximus, sed a uomitionibus statim mulsam dari aquam. Habuimusque in eo auctorem Paulum Aeginetam, qui scriptoris huius caput hoc exscribens ait, ἀρμόσι δὲ πρὶν τούτων τὴν συμμίχραν ὅτι ἰμύθῳ, καὶ μετὰ τούτων μίλιπτον. Quod est. Prodest priusque quicquid horum fiat uomitus, & post hunc aqua mulsa. Cogitauimus etiam, quoniam ab eodem scriptore inter Mandragoræ remedia non numeratur Eupatorium, multoque magis, quoniam nihil quod ad hoc faciat in decretis Eupatorii a Dioscoride traditur, aut abundare eam uocē, aut pro quapiam alia male eam illic legi. Quod signasse tantum uoluimus.

De Meconio.

CAP. XVII.

B

EPoto Papaueris succo, quem Meconion uocant, consequitur ueternum, cum perfrictione & pruritu uehementi: ita ut sæpe in ualescente ueneno tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumque mulsam cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido, merum cum Absinthio aut Cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua, aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, uino & panace, piperque cum castorio & aceto mulso, uel cum satureia, aut origani decocto cum uino. Si olfactibus excitandi. Ob enatam pruriginem in balneas descendat, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino, aut passo. Medulla etiam ex oleo pota.

EX M. VERG. COMM.

Numerant a Nicandro in Opii potu, perfrictiones, soporē, languorem, pruriginē, & toto corpore Opii odorē, notæ aliæ plures: pallida facies, labrorum igneus color, exigua & frigida respiratio, liuescentes ungues, distortæ nares, & concaui oculi. Addidit illud etiam, odorem quem Dioscorides ait toto corpore reddi una cum sudore, ueluti ex labore euaporari.

De Corniculato Papauere.

CAP. XVIII.

Papauer quod Corniculatum appellat, & potu, & cibo eadem inferre consueuit quæ Papaueris succus. Nec alijs expugnat auxilijs.

De Pharico.

CAP. XIX.

PHARICON, quod uocant, sapore syluestre Nardum imi-

D I O S C O R I D I S

Ctatur. Resolutionem neruorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum Absinthiten potui dare, cum Cinnamomo, aut Myrrha, aut Nardo gallico, quod Serinē aliqui uocauerunt, aut Spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo, iri, & rosīs ex uino. Derasumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

E X M. V E R G. C O M M.

Quid, qualeq; fuerit Pharicum, non satis inter antiquos scriptores constat: simplex alijs, alijs contra compositū tradentibus: & quod hactenus legisse me meminerim, nullo eorū, siue simplex, siue compositū fuerit genus eius, & substantiā indicante. Incerta posterioribus græcis ratio nominis etiā fuit, & si a gentibus & locis aliquot Græciæ dictum oēs testent. Quidam em̄ a Pharis in Arcadiā: quidā a Pheris in Thessalia: quidā postremo a Pharide in Laconia, cuius meminit Homerus, Pharietū dictum uoluerūt. Nec defunt, qui ab inuēto sic uocatū putent. Achæneus in tertio sui Dipnosophistæ, quo loco de Coroneis malis agit, nisi uitiū in eo sit, non Pharicum, sed Phariacum noīauit. Verba eius sunt, τὸ γόν φαρικόν φαρμακόν. &c. Nec ipse etiā, alioquin in huiusmodi multus & diligens, quicq; de nomine, aut substantia ueneni huius docet. Refert tamē, quod miretur aliquis, in cæteris non legi, neq; inter remedia a quocq; numerari, infringere ueneni huius uires mala Coronea: & ex Philarcho in. 6. historiā suarum narrat, Coronea hæc mala odoris sui bonitate localium uenenoꝝ uires hebetare: Pharicumq; hoc uenenū, Coroneis malis mixtū, amissa nocendi potestate euanesce: deprehensumq; id fuisse, dato homini Pharico qd inter Coronea mala fuisset, nullo mortis, aut ueneni maleficij secuto euentū. Cæteri itidem oēs proposito Pharico, descriptisq; notis, & traditis remedijs nihil ultra de eo docuerunt. Quo fit, ut credamus, tam notum tunc oibus fuisse Pharicum, qd nunc nobis incognitū est: & ut in re nota sit, tacuisse cætera omnes qui de eo agerent. Ne descripta re, male & scelerate agere, & ueneni uti discerent homines.

D

De Toxico.

C A P. XX.

Toxicum ex eo nominari uidetur, qd barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflatione torquentur. Incoercitus furor uarias ijs imagines obuersat. Quare uix medicinæ locus est, raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur. Rapi semen bibendum. Priuatim ijs conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. Malaq; coronea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet. Amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquum uitæ tempus degunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius. 16. uolumine, capi. 11. de Taxo arbore agens, his uerbis Toxica descripsit. Hanc Seftius Smilacem a Græcis uocari dixit, & esse in Arcadiā tam p̄sentis ueneni, ut si qui dormiat sub ea, cibūue capiant, moriant. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicāt uenena, quæ nūc Toxica dicimus: qbus sagittæ tingunt. Sunt, ut uidet Plinio, Toxica ex Taxi arboris succo confecta uenena. Huic autē ægre credat alijs, idem Plinijs Toxicis hoc esse. Siquidē non multo ante priuatim de Smilace. i. Taxo arbore egit, perfrictionesq; & strangulationes suo frigore facere dixerat: ideoq; non credendū aliter, & iterū de ea ab eodē nunc agi: p̄sertim non congruentibus, nec iisdē in utroq; ueneno notis. Relinquit ob eā causam, ut credamus a sagittis Toxicū noīatū fuisse, certi quondā g̃nis uenenū, qd ex q̃tidiano frequentioreq; usu antiquas sic appellauerit: scilicetq; tunc oēs uenenū, & ueneni propriū genus. Nunc autē in multiplici ad tingēdas sagittas, cuspidēsq; alias ueneno, quo passim uti, nisi obstarent leges, liceret, non facilem habet intellectum, nec discerni ex eo usu, & ab alijs potest, quæ multis cōmunem & eundem habet.

De Ixia.

CAP. XXI.

A

IXia quæ Vlophonon appellatur, inter potandum aliquid Ocimo simile redolet. Vehementem linguæ inflammationem excitat, Mentem mouet. Omnes excrementorum exitus supprimit. Strepitum cum animi deliquio ciet, lis intestina latrant, nec secedit quicquid. Post uomitionem, aluumque resolutam, auxilium præstat, aqua in qua Absinthiū maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæque syluestris semen, aut laseris radix. Item Tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpicio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces Iuglandes, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Idem Chamelææ, aut Thapsiæ, aut Absinthij succi sicilicum cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

EX M. VERG. COMM.

Viscum pluribus locis Plinius græcorum Ixiā hunc uocauit: duo diuersi generis in plantarum historia, nulla discriminis adiecta nota, eadem appellatione indicans. Quod an uicinitate nominis in græcis deceptus fecerit (Ixon enim illi arborum Viscum, Ixiā uero quod nunc tractamus uocāt) an sciens, uolensque, negata sibi in latina re appellatione, qua Visco penitus si milem rem indicaret, non est propositū nobis modo ostendere. Fecimus enim id in Chamæleonē: & ante nos certius, longiusque non multo ante hæc tēpora Leonicens diligentissimæ lectionis, & egregiæ eruditionis homo, in Epistola ad Menocium Lucensem medicū idem etiā fecerat. In qua multa breuitate, summaque diligentia ueterū & posteriorū scriptorū, de tota hac re dicta collegit. Quorū summa est, aliud ab Ixia hoc Viscum esse: hoc in multarū arborū ramis nasci, nec ueneni maleficiū habere: illum ad radices Chamæleonis, albi spinæ noxiū adnasci, pluribusque alijs inter se notis & uiribus distingui: patereque id in græcis, quibus Viscum ἰξία sit, non ἰξια: quæ uox a Visco quidem facta fuerit, non tamē Viscum significet, sed quod paulo ante diximus, Chamæleonē album: cui, quemadmodū hic tertio uolumine tradidit, aliquibus locis Viscum adnascitur: quo pro Mastiche ad nitorē cutis mulieres quondā utebantur. Et hūc non in arboribus natū, illud inter uenena numeratū quondā est: ideoque Vlophonos dictum: quoniam, ut in historia utriusque Chamæleonis hic docuit, canes, fues, quadrupedesque alias in cibo enecet. Non debuerat, ut uidet, cū Visco misceri Ixias, qui Viscarius potius adiectiua forma, que Viscum a Græcis notatus fuisse uideri potest: ideoque nos, ne simul æqui uoca uoce duo diuersa miscerent, alterum Viscum, alterū uoce græca Ixiā notauimus. Barbarus Pliniū secutus, in masculino genere græcorum exemplo Viscum Ixiā hunc uocauit: quod in dispescenda re non semper satis est. Illud uolumus legētes monere hoc loco, cū proponeret a principio uoluminis huius Diosco. quæ in tota natura ueneni maleficiū habent, inter radices Chamæleonē, non Ixiā numerasse: in reddendis deinde notis & remedijs, Ixiā, non Chamæleonē notasse. Nec dubitandum alicui erat, hoc, aut illo loco uitii esse. Idem em Ixias, & Chamæleon est: nisi Paulus Aegineta quinto suæ medicinæ, uolumine hisdem oibus uerbis scriptorē hunc cōmentarijs suis miscens, Ixiæ & Chamæleonis duo seorsum capita legētibz cognoscenda reliquisset. In quorū altero albi, in altero nigri Chamæleonis maleficia traderet notis & remedijs penitus diuersa. Respondetque id duorū Chamæleonū historiæ. Vterque enim Vlophonos æqua nocendi potestate notatur. Eamque rōnem, ut credimus, secutus Paulus Aegineta, seorsum de utroque inter uenena etiā docuit. Quod si easdē notas ambo haberent, hisdēque remedijs curarent, crederē ego hunc scriptorē breuitati consulentē, uno eodēque capite de utroque egisse. Sed cū diuersa in eis oia sint, uitii suspicari oēs cogimur: reliquūque in uenenorū censu Ixiā, in notis deinde & remedijs Chamæleonē. Neque em uerisimile est, reliquisse hunc, quod alij cōmentaria eius exscribentes, tradiderunt. Irrepissetque id uitii uerisimile est, ab aliquo, qui medicæ materiæ, & plantarū historiæ parum peritus, bis repetitū idem esse ratus: tanquam superuacaneam utrobique alteram reliquerit uocem. Persuademur nos hoc facile, ex eoque præsertim, quod in censu uenenorum propositus Chamæleon, in remedijs deinde redditus Ixiā est. Quod futurum non erat, nisi propositus

B

D I O S C O R I D I S

Cetus a principio Ixias cum Chamæleone fuisset. Nec proponendus Chamæleon, si reddendum aliquid in eo postea non erat. Ixiae tota res in scriptore hoc patet; nec repetere quæ præmonstrata sunt, opus est. Quid autem in Chamæleone desiderari possit, id nos ex Paulo Aegineta repetemus: qui ut cætera ab hoc scriptore accepta cōmentarijs suis inferuit, sic Chamæleonē etiā exscripsisse credendus est. Verba de Chamæleone nigro eius hæc sunt. Haustum Chamæleonem nigri erosio, dolorq; ingens sequitur: & cum stomachi euerfione totius corporis tremor. Accedit mox & conuulsio, biliosisq; & spumosi uomitus. Sunt etiā quibus singultus cum priuatione uocis, distortiq; uultus fiunt. Confert triticeæ farinæ cremor pinguis calidusq;. Tum uomitus & lactis potus. Prodest clysteribus etiā infundi quod lene sit. Profunt & fomenta emplastri modo imposita. Verū contra strangulationes, liuoresq; facientē Chamæleonē, proderit potum Absinthii, nitrumue cum aceto mulso, aut Raphanis. Proderunt & præcordijs imposita fomenta. Sunt hæc nigri Chamæleonis ex Paulo Aegineta notæ & remedia. Quæ ob eas, quas paulo ante diximus causas, ne quid huic operi deesset, addere placuit.

De Cerusa.

C A P. XXII.

ψυμίδιον

Cerusa suo colore proditur. Quippe palatum, gingiuae, lingua, & commissuræ dentium, candamore quodam inficiuntur. Singultus, tussim ac linguae ariditatem excitat. Iis extrema frigescent. Mens labat. Membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut maluae decoctum, aut lac calidum, aut Sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. Amaracinum oleum, aut Irinum, Persicorum ossa cum Lilij decocto. Columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plorauit, aut humore quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. Sed tum quoq; uomant. Conuenit etiā Thapsiae succus, aut Scammoniae cum aqua mulsæ potus.

EX M. VERG. COMM.

Sunt toto hoc capite plura, quæ alijs interpretibus, & nobis eadē non sunt. Diuersitatisq; nostræ una est causa, q̄ impressum scriptoris huius illi codicem secuti, alios eiusdem rei auctores non consuluerūt, nec quæ aptius & uerius dici poterant, cogitauerūt: ideoq; qualia se oīa obtulerūt, talia etiā reddita ab eis sunt. Nos contra auctore Nicandro, & antiquis græcorū medicis, qd in scriptore hoc erat, & Persicorū ossa cum Liliorū decocto, cum hordei decocto uertimus. Illi enim non *ἐν κρίνῳ ἀφελήματι*, quod est, cum Lilij, sed *ἐν κρίθῳ*, quod est, hordei decocto dixerūt. Eadem rōne quod legebatur, *ἢ κοκκυμύλοις*, significatq; cum prunis, cum prunorum gummi uertimus. Quicq; folijs ulmi cōtineri humor dicebatur, folliculis eius arboris contineri diximus. Illis enim, non folijs continetur. Pluraq; alia mutauimus, quæ monētibz illis naturæ rerum, & ueneni huius remedijs male respondebant. Quæ poterunt uolentes per se certius uidere. Cogitabunt etiā, in Persicorum ossibus, quæ Cerussæ aduersari hic ait, an trita ossium eorum putamina, an interiores nucleos intellexisse oporteat Nicander sane in Alexipharmacis suis putamina intellexisse uidetur. Versiculi eius sunt. καὶ τὰ κατατριφθέντα μετ' ἀργύροντος ὁλαίου σκληρὰ ἀπὸ περιστάσεως κάρνα βλάπτει διὰ τῆς ἰσχύος. Quod est. Quinetiam tritæ cum splendente oleo duræ Persicæ arboris nuces malum egregie difficiunt.

De Fungis.

C A P. XXIII.

μυκήτες

Fungorum alij genere, alij copia lædunt. Omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurrendum. Communiter ex oleo uomere cogendi. Mirifice iuuat lixiuia ex sarmentis, aut pyrastris surculis, epota cum sale, posca, & nitro. Pyra, aut folia pyrastris cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt, mansaq; eisdem auxiliantur. Aduersus Fungos gallinacea oua cum po-

ſca proficiunt, adiecta aristoſochiæ drachma. Item abſinthium cum ui- **A**
no melleq; ſumptum, & ex aqua potum. Apiaſtrum ex nitro, Panacis
radix in uino, Fæx uini cremata cum aqua, Aeris flos ex aceto, Radix
ſinapis & naſturtium eſu proſunt.

EX M. VERG. COMM.

Nascuntur ab æſtuo & autumnali imbre ſtatim euocante ſole Fungi omnes. Nec minus q̃
tonitrua tubera, oprabiles Fungi pluuias eo tempore hominibus faciunt: haud ſane omnibus,
ſed his qui, ut Heſiodus cecinit, infelicitatem ſuam & malum amantes, naturæ potius monſtris
& uenenis q̃ melioribus & tutioribus cibis uelci gaudent. Male, exceptis pratenſibus, autore
Flacco, alijs creditur Fungis. Male etiam, autoribus græcorum & latinorum medicis, in cibis
receptis uelcitur. Omnes enim, ut hic a principio ſtatim monuit, uel genere, uel copia nocent.
Eamq; ob cauſam debueramus tam male tuto cibo abſtinere omnes. Verum quoniam noui-
tate potius q̃ ſuauiſſime eius illecti, præſenti uitæ periculo æſtivas & autumnales coenas hoc cibo
etiam inſtruimus, debuerant cæteri interpretes in docendis factarum a Fungis ſtrangulationū
remedijs, diligentiores eſſe: meminifſeq; ambo, non præcipere Dioſco. contra Fungos bibendū
ex aceto æris florem, ſed atramentum ſutoriū. Nec ſi etiam χαλκόν & ὕδωρ paſſim in ſcriptore hoc
legatur, pluris librariorum incuriam, q̃ ſcriptoris huius decreta ſacere: in quo cum reſponde-
ant primis ultimis, & ſibi inuicem omnia, facile erat ex Atramēto ſutorio, quod Chalcanthum
græci uocant, locum emendare. Quæ enim ipſe hic ſcriptor pro Fungorum maleſicio illic mo-
net, huiuscemodi ſunt. *ἡ δὲ μύνηται καὶ οὐδὲν ἔστιν ὅτι*. Quod eſt, Et his qui Fungos hauſerint opem
fert. Priuatim inter ceteras quas habet Atramentum ſutorium uires, Fungis opem ferre a Dio-
ſco. dicitur. Quod Flori æris neq; ab hoc, neq; ab alijs tribuitur. Oportebat etiam alterum eo-
rum non coniungere, copulareq; ſimul, ſalem, & nitrum, ſed hoc, aut illud præcipere. Hic enim
alterutro uſi monet. Habetq; res certam ex natura rationem: quando ſimilis, aut non adeo di-
uerſæ naturæ ſunt nitrum & ſal. Sunt etiā plæræq; alia, quæ non ſunt nobis cum illis eadem, ſed **B**
leuiora, & ob eam cauſam relicta. Monemus illud etiam, quod a legentibus forſan deſyderari
poterit. Quæ hic iubet ſimpliciter, gallinarum oua cum poſca bibi, non uideri nobis integrit.
Siquidem græcorum medici ἀφὲς μύνης ἐν ὀνυράτω ſumi iubent. Quod eſt, in poſca elixa. Quin-
etiam quod hic ait, *μὴν ἐν τοῖς ὀνυράτοις*, id eſt, mel in cibo, illi *ἐν λιχιδίων*, id eſt, in eclegmate dicunt. Et
quam hic Panacis radicem tantum, illi radicem & ſemen. Addiderunt præterea, quoniā in Fun-
gis a uenenatis corroſi aliqui non tantum ſtrangulant, ſed ex diuerſa alterius ueneni ui inſteſtina
exulcerant, dandum in eo periculo copioſum abſinthium, caricarumq; & origani decoctum:
mulſa aqua cogendos ad uomitum qui in periculo ſunt: calida latuari aqua: imponendaq; præ-
cordijs emplaſtri modo farinam hordeaceam, hydrelæ maceratam. Relictum hoc ut credimus
a Dioſco. eſt: quoniam ad aliud ueneni genus pertineret. Quod ex ſuis notis cognitum ſuis re-
medijs etiam curandum eſſet. Hoc enim capite de Fungis, eorumq; maleſicio, non uenenato-
rū uenenis agebat. Monuerunt iſdem græcorum medici nos etiam, ut in extremo capite contra
q̃ alter ex interpretibus fecit, non Cardamomū, ſed Naſturtiū uerteremus. Illi enim manifeſte
ἡ δὲ καὶ ὁμοῦ ἐν τοῖς ὀνυράτοις, id eſt, in cibo Naſturtia Fungorum maleſicio aduerſari teſtati ſunt.

De Gyſſo. CAP. XXIII.

Lapidescens Gyſſum ſtrangulationem creat. Quare eadem pro- **70400**
ferenda ſunt, quæ manſis Fungis auxilia. Inter quæ habe-
tur maluæ decoctum, quod etiam olei uicem penſat. Vtpote cum pin-
gue ſit, euomenidocq; lubricitatem inducens, deradi corpora non ſinit.
Quod ubi duratur in lapidem, efficit. Quin etiam prodeſt oleum ex a-
qua mulſa, aut ficorum decocto. Lixiuiæ e ſiculneo cinere, aut ſarmentis
facta, cum uino copioſiore pota. Origanum, aut thymum cum lixiuiæ,
aut aceto, aut paſſo. Loca decocto maluæ proluenda.

EX M. VERG. COMM.

Non eſt quod in Gyſſo legentes moneamus, præterq; autoribus iſdem græcorum medi-
cis paſſum clyſteribus infundi, nō eū origano, aut thymo, lixiuiæq; & aceto bibi a nobis in ex-
Nn

C. tremo capite dictum fuisse. Illi enim remedium sic docent: uisumque est rationem habere, quod male uidentur similiter coniungi posse, & alternari diuersarum uirium acetum, & passum. Posuerunt tamen legentes quod magis probauerint sequi.

αἷμα ταύρου

De sanguine Tauri. CAP. XXV.

TAuri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem stragulatamque concitat. Fauicium meatus cum neruorum distentione praeccludit. Lingua rubescit. Cruore dentes inficiuntur. Quaedam concreti sanguinis uestigia, inter eorum commissuras restant. Quare uomitum uitabimus. Sanguinis enim globi per extractionem eleuati, magis stomacho inculcantur. Dari ergo opus est quae concretum sanguinem discutiant, aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese auxiliantur. Nec secus coagulum omne, cum aceto & laserpitij radice, aut lasere. Iudem & brassicae semen, cinisque ficulneus. Conyzae folia, cum pipere, & rubi succus ex aceto. Aluus resoluenda. Seruatis fluida per sedem ingeri consueuerunt. Stomachum, aluumque hordeacea farina ex aqua mulla perungere oportet.

EX M. VERG. COMM.

D

Sunt hominis & brutorum sanguinis notae, uires, & euentus uarij. Quemadmodum, uolumine longius dictum in sanguinibus a nobis est. Nunc unius tantum describenda malefica uis, & in tota sanguinum historia damnandus Tauri nup iugulati: quoniam celerrime coit atque durescit, ideoque pestifer homini, praesertimque potus. Veneni maleficio infamis, miserabili genere mortis graecorum historias & poetas implet. Deprehenderunt id in diuina re mortales, cum iugulatis ad sacrificium tauris, quae aderant superstitiosiores calentem adhuc biberent: noua & indigna deo ratione hac sanctitatem incolumitatemque suam augere se existimantes. Nullus tamen clarius hoc genus mortis quam Themistocles fecit, quae post pulsum e graecia Xerxes, exul a patria, accepto ab Artaxerxe exercitu, siue nolens, siue desperans quae illi contra graecos pollicitus fuerat praestare: in Ioniae Magnesia decerpto cultrario ipse taurum in sacrificio tenens, exceptum poculo sanguinem repente hausit: ut esset eo tempore anteposita uitae mors, perpetuum uoluntatis honorisque sui testimonium, quod semper ciues sui meminissent. Canereturque pro se in Helena Sophocles ἡμῶν δὲ λῶσον αἷμα ταύρου ὅτι ἵππιδιν. καὶ μέγα κλέος τῶν δ' ἔχεν δύο φημίαι. Et Aristophanes in egiptibus suis. βέλτιστον ἢ μὲν αἷμα ταύρου πινόν. ὁ θύμιον κλέος γὰρ θάνατος ἀριτότερος.

γάλα ἱμνυ-
τιασθῆναι

De Coagulato lacte. CAP. XXVI.

Eos qui coagulatum lac hauserunt, frequens strangulatio inuadit, quae in globulos quosdam lac coalescat. Quibus pro antidoto iuuandis, coagulum ex aceto damus. Et bibere saepius cogimus. Damus & calaminthae folia arida, item succum. Aut laserpitij radicem, aut laser cum posca. Thymumque ex uino, & lixiuiam. Sed nulla falsilago obijciat: quoniam magis lac coiret, & in caseum densaret. Neque illos uomere conuenit. Siquidem concretum lac sese in stomachi angustias insinuans, stragulat.

EX M. VERG. COMM.

Non habet ueneni maleficio Lac simpliciter coagulatum, alioquin nullus esset in cibo eius usus: sed quod antequam concreuerit admixto illi coagulo aliquis biberit. Coit enim in stomacho, & coaguli uis, quod illi admixtum est, concrecit in grumos: concretionemque illa interiores obstruit meatus: obstruistisque his, strangulationes facit. Plinius mali periculi huius genus diuersis locis diuersis uocibus indicat. Nos ex re, & ex graeci nominis uis, lac proposuimus quod admixtum habebit coagulum. Id enim ἱμνυνασθῆναι participium indicat. Ceteri interpretes coagulatum simpliciter lac uerterunt. Nobis placuit certiore illam rei indicationem sequi. Placuit etiam inter remedia nihil potius quam quod ignoraremus asserere, quo loco, scilicet relicto inane spacium non pro-

cul a fine capitis est. Quem alter interpretum dissimulauit, alter lutum simpliciter dixit. Dio-
scoridis uerba sunt, καὶ τὴν πηλοποιτικὴν κοίαν. Pertinetq; id ad lixiuæ genus aliquod: quale aut
em, non satis nobis constat: nisi forte hic præceperit utendum lixiuæ quæ non per cinerem, sed
terram traiecta fuerit. πηλόν enim lutum & aqua dilutam terrā græci uocant. Sed nihil in ea re
cōpertū aliqñ nobis est. Potuit forte etiam ea imperari lixiuæ, quæ non traiecta per cinerē aqua,
sed uino facta esset. πηλόν enim antiquissimi uinum etiam uocauerunt. Et in hanc partem incli-
nat nobis animus. Nihil tñ constituimus, integram rem peritioribus seruantes.

De Argenti Spuma. CAP. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum
magnis torminibus adfert. Et noñunq; pōdere suo intestina uulne-
rat. Vrinam supprimit. Corpus intumet, plumbeamq; deformitatem cō-
cipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris hor-
mini, semen, myrrhæ drachmæ septem. Absinthium, hyssopum, apij se-
men, aut piper, aut ligustri flos ex uino. Aridum palumbis fimum, cū
nardo & uino.

EX M. VERG. COMM.

Vna tantum litera Cyprus, quæ latinis Ligustrū est, a Cypero, q quadratus odoratus Iun-
cus isdem dicitur, differt. Ideo facile fuit in antiquis exemplaribus scriptoris huius alteram uo-
cem pro altera scribi. Diuq; nos anxij, cum uariarent in his antiqui etiam græcorum medici. Ni-
candrum testem secuti, Ligustrum uertimus. In eo em carminis necessitas non aliter q; ligustrū
legi pōsse & debere ostendit. Versiculus eius est, κνπρον τε βλαστία νανθία. Quod est, Et Ligustri
nuper florentes germinationes.

De Argento uiuo. CAP. XXVIII.

Argentum uiuum potum, eadem quæ Spuma Argenti infert.
Eisdemq; utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari con-
stat, sed postea euomant qui hauserunt.

De Calce, Sandaracha, & Auripigmēto. CAP. XXIX.

CAlx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota, aluum et intestina
cum uehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta quæ suf-
frenare & soluere possunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt. Cu-
iusmodi maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, uel fructus.
Tragi hærbæ, uel Orizæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pin-
guia, & boni succi.

De Lepore marino. CAP. XXX.

Qui Leporem marinum biberunt, piscium uirus olēt. Intercedē-
te aliquo tempore, aluus dolore afficitur. Vrina sistit. Et si quā-
do eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Om-
ne piscis genus auersantur, & odio habent. Fætido ac graui sudore
manant. Biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus subsequitur.
His dandū lac asininū, uel passum cōtinue, aut radicis maluæ, foliorūq;
decoctū, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scamo-
nij drachma cū aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria cōtrita cū ui-
no efficax ē. Anserinus sanguis ut tepebit potus. Sed cū pisces oēs res-
spuant, aspernenturq; solis fluuiatilibus cancris uesci possūt, bibuntq;
eos admisto uino, adiutiq; præcoquunt. Cumq; comesse pisces cœpe-

Nn ij

A

λιθάργυρος

B

ιδιάργυρος

τίτανος
σαδάραχ
αυρίπικόν

λαγώς θαλά-
τριο

Crint, suae salutis indicium est.

¶ De Rubeta.

CAP. XXXI.

φρσ

Rubeta, aut Rana palustris assumpta tumores ciet. Pallor corporis uehementer decolorat, ut plane buxum spectetur. Spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusque. Inuita genitura profusio consequitur. Adiuuantur secundum uomitionem multo meri potu, & harundinis radices binis drachmis, aut cyperi. Breuiter cogendi sunt, ut exercitationi & cursui se credant, ob torpore quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

¶ De Hirudine

CAP. XXXII.

βολίλλα

Deuoratae cum aqua Hirudines, si ori uetri adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem praebent. Eo enim argumento hausta Hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & syrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut betae, cum aceto, aut posita niuis glebula, cum posca. Nitru ex aqua gargarizetur, aut atramentum futorium aceto dilutum. Si faucibus haereant, iniecta lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur, et ad eam Hirudines exilient. Prouidendum etiam ijs, quae & si ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen caeteris uenenis pericula saepius adferunt. Qualia sunt alium Veratrum, Tapsia, Elaterium, Agaricum nigrum. Siquidem ea strangulatus concitat. Aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quae in Fungorum mentione & similibus retulimus. Nimis os autem deiectionum impetus, medicamentis quae excrementa suppressunt coerebimus. Nec negligenda quae gliscente sensim nocumeto, pericula ingerunt. Quo in numero sunt syluestris Ruta, Gith, et nouae Glacies.

EX M. VERG. COMM.

Pura & certiora pro haustis Hirudinibus docent graecorum medici. Primumque inter notas numerant quae nullae in hoc scriptore sunt, floridi, ut illi aiunt, id est, uiui sanguinis excreationes. In remedijs etiam lupinorum farinam addunt. Ex eorumque disciplina, ut uidetur, nouissimorum alter interpretum scriptori huic remedium illud addidit, quod alioquin in scriptoris huius codicibus inuentum a nobis haecenus non est. Causam etiam afferunt, cur frigidae aquae sensu, quae ore contineatur, proficiant faucibus haerentes Hirudines. Ea est, quod frigidae aquae appetentes, ad eam festinant. Adijciunt & illud, Cimices dedisse aliquos: quod hic ipse secundo uolumine in Cimicibus praecipit. Nec male suspicetur aliquis, deesse huic scriptori hoc loco inter remedia, quod alibi in historia cognitum, imperatumque fuerat. Galenus priuatim Allijs usum se fuisse testatus est, nec alio indiguisset remedio.

¶ De Axe.

CAP. XXXIII.

ξξξ

Axos flos est spinę eiusdem nominis. Eos qui uescantur, sola uomitio recreat.

¶ De Aqua frigida.

CAP. XXXIII.

φρυγόν 'ιδιωγ

Aqua frigida habunde pota, aut meracum uinum liberalius epotum, aut passum, praesertim a balneo, aut cursu, aut uehementi

exercitatione, strangulatus, & dolores infert. Vbi sanguinis missio pro
tinus, & uacuatio imminetia soluūt pericula. Sed de notis ueneficio-
rum remedijs, & cauendi modo, haecenus dicta sint. Subiungeremus
etiā antidota necessaria quae praecclare auxiliantur, quibus utimur, quae
le metridatium est, praesertim quod sanguine & scinco temperatur: ue-
rum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum de-
scriptione superfedemus.

MONENDI hoc loco legentes sunt, quas hic scriptor Antidotos tam saepe laudauit, & quas
subiecturum se commentarijs his in fine pollicetur, nullas aetate hac nostra in eius exemplarijs
bus, quae uidere haecenus licuit, inueniri, ideoque non expectandas a nobis.

¶ Finis LIB. Sexti.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Venenatis animalibus, & rabio-
so Cane, LIB. Septimus.

IO. RVELIO interprete.



DE BESTIIS quae uirus eiaculantur, & exitiali-
bus uenenis, ut circūitus medicinalis ad umbili-
cum perueniat, sermonem facere proposuimus,
& quidem caeteris non minus necessarium, ijs qui medicinae artem ex-
ercent. Vtpote cum adminiculo eorū quae in eo traduntur, doloribus,
periculis, & cruciatibus, homines liberari conueniat. Hic Tractatus in
summas parteis duas, sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui
de feris uirus inspuentibus differit, Theriacus dici solet. Qui uero de
amoliendis ueneficijs, Alexipharmacus: de quo cōmentabimur, simul
quae sequi consueuerunt, quaeque nonnihil auxilij ferunt, explicabimus.
Omnia in promptu & ad manū artificem habere oportet, propter ur-
gentem saepenumero uecessitatem. Siquidem pauca e uenenis & uiru-
lentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dila-
tionē admittant. Pleraque uero praesentaneam perniciem afferunt. Ho-
minum aut partim male alteris cogitantes, ingenita prauitate maleficiū
ita temperare statuerūt, ut spaciū curanti liberū non relinquant: par-
tim tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno, mortem sibi
cōciscere conantur: qui postea deprehensi, aut resipientes, & uitae cu-
pidi, praesentaneā opem poscunt. Non defunt qui hostiles sagittas illi-
nentes, aut fontes, aquasque puteanas hac labe poluentes, citam aduersa

Nn. iij

Crijs perniciē moliunt. In quibus ipsis maleficiū nō subito, sed aliquāto post respōdere natura sua cōparatū est, tū nisi primo quoq; tēpore cōerceat, & remedijs subīde excipiat ueneficiū, frustra postea succurrit, occupatis iā corporibus exitiali ui ueneni. Proīde nō uulgarī industria diligētiaq; in ea re utendū est: ut quod in alijs incōmodis ars cōsueuit, in his quoq; salutē mortalibus praebeat. Quin & apud priscos modus hic unus existimabat eius partis. Sed recētiore ipsū discreuerūt, nō minātes praeuentionē & modū praeuētē, salubris sanātisq; mediū statuēt. Qui parua & leui supra modū persuasione freti, magno in errore uersant. Siquidē treis in humanis corporibus cōstitutiōes esse cōtēdūt. Vnā, qua sani degimus. Alterā, qua sinistra ualitudine corpora laborāt. Tertiā, mediū inter utrāq; locū sibi uēdicat. In qua positi, sanitatē specie mētiunt, facileq; in morbos & pericula cōcidūt, ppter mortiferā uī quā in eorū corpus incūbit. Quēadmodū in ijs uidere licet, quos excādescēs rabie canis momorderit, necdū tamē aquā horrēt: in ijs quoq; qui cātharidas hauserūt, sed nōdū urinae tormēto cruciantur. Tripartito igit artē digeri, tripliciq; cōstitutiōi respondere tradūt. Salubre partē esse uolūt, quē sanitatē tuēt. Prēuētē, eandēq; phibentē, quē obstat q̄ minus in morbos incidant. Et in sanitatē, qua uitia discutiunt. Quibus ita respōderi pōt. Qd̄ primū p̄ illud additāmētū nō treis corporis tm̄, sed quatuor haberi cōstitutiōes fatendū esset. Quippe ut aliq; sunt, q̄ necdū morbo laborāt, morbo tm̄ maxime ob impendentē causam sunt obnoxij: ita sunt q̄ iā priore morbo defuncti, nondū tm̄ secūde ualitudini restituti sūt. Id qd̄ a morbo pximo sese recolligētib. cerne re licet, q̄ uiriū recreationē et robur desyderāt. Sed quēadmodū agrotātū cura ad partē medicamētariā ptinet, ita qd̄ morbos amoliē, eidē subijci par ē. Ad arcēdas em̄ ualitudines uehemētib. utimur auxilijs, altiore scarificatu, uisionibus, amputatiōe, derodētibus epithematis, potionibus p̄niciēi occurrentibus, et plerisq; alijs. Verū enim uero sunt usq; eo rudes nōnulli, ut ne remedia qdē appellent, quā morbos arceāt. Cuius sentētiē inire rationē haud p̄mptū est. Etm̄ cū uerbū ipsū, p̄cauere, tū opus p̄cauētis, modū omnino auxiliārē remediariūq; p̄ferūt. Mirū uero, nisi etiā sua illa distributione partiū, eos cōplectunt q̄ in pestilentis cœli statu morbo nondū correpti sunt, pesti tm̄ ppter obuersantis aeris occasionē, opportuni, & in morbum proni reddunt. Dicere forsitan q̄s posset, salubris institutionis alimētaria p̄cepta nō aliud esse, q̄ arcendorum morborum rationē. Quippe cum firma reddere corpora, et minus uitij obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degāt, nec morbis confligentur. Neq; id silentio prātereundum, quod peculiariter ad rē pertinet: non oportere medicinā partiū distributionē, totidē corporis cōstitutiōibus respōdere, sed naturas peculiarib. uniuscuiusq; notis

conijcere: ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur, non pluribus agendum. Illud magis adnotare cōuenit, affectus qui a uirulentis animalibus, uenenisq; contrahuntur, cecos uocari. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli sunt addicta causæ. Quapropter questionibus obseruatoriæ artibus, quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neq; ex se uerū deprehenditur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarijs usum exhibet, non facili coniectura colligi potest. Et si secundū proprietates prorsus cecos eos affectus concedimus, qui ab exitiis uenenis, & animantibus quæ uirulento morfu sæuiunt, contrahuntur, non tamē quod ad opus nonnullū usum præbet, datq; medendi occasionem, aut imperceptibile, aut cecum, nulliue causæ obnoxium reputatur, sed magis ab ipso quis impulsus, fidem quam habet & opinionem de abditorū cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, q̄ ut sensibus percipiuntur, euidenter tamē ex alijs correspondentibus deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plinistarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad hanc uerborū sententiam scribens. Nosse quis hoc potest, cum in alijs non paucis, tum in uiperis & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans: ut quamuis exiguo sint corpore, uixq; conspectui subiiciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt. In quibus nihil præter quamdam corporis exiguitatem, uehementiamq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim scorpionis magnitudo, aut corporis moles existimari potest, si ad eius ictum comparauerimus, aut reliquorum id genus carne perimentium, Quorum aliqua uehementes cruciatus excitant. Alia erodunt, & putredines cient. Nec desunt quæ præsentaneam perniciem moliantur. Nonne quod a phalangij morfu uirus ingeritur, uniuersum corpus excruciat? At neq; quis uehementiam ipsorum a mole deprehendere posset, cum prorsus exiguo corpore cōstent. Ergo q̄ hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum q̄ exacte deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ permixta corporibus molestiarum quæ exoriuntur, causa sit, in confesso est, & omnium consensu defenditur. Nec quisq; offendi posset usque adeo contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueraret, q̄ a materia mortifera partem corporis attingente. Porro id fuit quod inter utilia artis opera dicere cogit, nos nihil prorsus lædi ab incomprehensione per proprietatem communis causæ, cum euidenter, tum indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum peritiam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus, communem causam, quæ morbis accessit, esse incomprehensibilem. Et hanc in eo quem de causis scripsit commentario aptissime prodidit. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut

C in uenenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus trita medendi ratione contentos esse. Obseruatio igitur comprehensionis caussarum, nobis perfecte diuidentibus satisfacet. Primum enim per genus comprehendendi non possunt. Quod autem sit letifera uis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, medelam subscribit, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Quando subiunxit. Ad aquam dulcem, & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem in uomitū, propter ferientis uehementiam, & demorsæ partis fracturam, Cucurbitulas adfixit: urentia medicamēta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admouit: postremo partem amputauit. Secum reputauit medicamina, quæ ad summa cutis adijciuntur, immissæ ad intima perniciæ repugnare. Hæc itaq; quæ proposuit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur. Verū rudiuscule nomini attendūt. Nam apud ipsos palam immisa uis *φθοροποιόν*, id est, mortifera nominatur, *φθοροποιόν* autem aliquid esse uolunt, quod nullius rei sit causa. Aiunt hæc nomina *μάστιππος*, & *ἀνακαλίπτιν*, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda prolatione comprehenduntur. Enim uero quemadmodum in his uocibus *μάστιππος*, & *ἀνακαλίπτιν*, partes uernaculos & præcedentes non retinent significatus, sic in hoc uerbo *φθοροποιόν* partes productionis gratia non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad caussarum differentias transeunt. Affirmantq; caussarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam ualeitudinem creant, separantur, cuiusmodi sunt frigus, labor, insolatio, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postq; morbum excitant, hoc est, cum præsentibus sunt, & effectus eorū adsunt: cum crescunt, effectus augentur: cum decrescunt, minuitur: & cum desinunt, finiuntur. Quin per se prodeuntes effectus, alius cuius finis gratia esse possunt. Tales quidem probatissimæ sunt caussarū differentia, quarū nulli phthoropœon subijci potest. Euidens enim caussa non est, quoniā morbus ipse permanet, nec corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit. Quemadmodum accidit ijs qui a rabioso cane sunt demorfi. Quod si neq; euidentis caussa, neq; continens fuerit: neq; ad finem coadiuuantē caussam referri potest. Si uero a nulla caussarū differentia phthoropœon deducere possumus, caussam non esse fatebimur. Quod autem asserunt, nomina quædam in se non habere partis rerum significatiuas, sed nuda & simplici prolatione ficta esse: fateri necesse est. Verū non omnia, sed perpauca talem nancisci conditionem existimandum est. Namq; *πῶτις*, in hoc nomine *φθοροποιόν*, perinde atq; adsumpta profertur: sed peculiarissimam usurpat significationem. Quemadmodum enim *φθοράς*, id est, corruptionis nomen

C & magis minusue molestias excitant. Oportet autē ea quę pericula ferunt euincētibz auxilijs expugnari, & minus infesta mitioribus. Quippe absurdū fuerit, in maioribus tardiore medicamentorū usu homines in discrimen afferre: in minoribus uero, uehementiū auxiliōrū iniuria laceffere. Finitio a tēporibus in promptu est. Aut em̄ subito in pericula & præsentes molestias adducit, aut sensim & dilatas in tempus. Itaq; præsētibz multa simul auxiliā repræsētari oportet: reliquis paulatim. Hęc quadā artis formula breuiter definita sunt. Iam membratim procedamus.

¶ Signa rabiosi Canis & demorsorū ab eo. CAP. I.

DE rabiosi Canis morfu sermonem alijs prapōsuimus, qđ id animal domesticum ac frequens esse consueuit, & rabie sapius corripitur, ac perit, ab eoq; cauēri difficile. Inde periculū ineuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerumq; flagrantissimis aestibus in rabiem effertur. Interdū quoties frigora inceserunt. Rabiosus autem, potum & escam auersatur: Largam spumantemq; pituitam naribus & ore proijcit. Torue, et solito tristius intuetur. In omnes passim sine latratu irruit. Aequę feras, hominesq; tam familiares, q̄ ignotos mordet. Nec protinus infestum quicq; infligit, nisi ut uulnus dolorem. Exinde morbus ille, qui ab aquę metu Hydrophobicus graia est uoce appellatus, contrahitur. Euenit autē cum distentione neruorū, totiusq; corporis rubore, præsertim faciēi, cum sudore & languore quodam. Aliqui aurę splendorē fugiunt. Alij sine ulla doloris intercapedine uexant. Sunt etiā qui canū more latratus ædant, interuenientesq; morfu adoriūtur, ac mordentes simili uitio labefaciunt. Nisi forsitan narratione unū, aut alterum euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendā affirmat. Themisonem aliqui demorsum in idem uitium incidisse, & euasisse fatentur. Alij amico aquam expauescenti, morem gerentem, & officium exhibentem, quadam naturarum concordia similem subijisse affectum: sed post multos tandem cruciatus, seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, a quo multos anteq; ipsum experirentur, uindicauimus. Et complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

E X M. V E R G. C O M M.

NVmerātur ab antiquis græcorū medicis, præter dictas ab hoc scriptore plures alię rabidi Canis notę. Sitire scilicet tunc eos, non tamē bibaces esse. Quod Celsus libro. 7. etiam in timente iam aquā homine testatur. Anhelos præterea, suspiriososq; & languidis flaccidisq; auribus uideri. Quinetiā, quod hic ait, sine latratu omnibus pariter insilire, copiosius illi explicat, docentq; muros tunc penitus, & ueluti insanos fieri: eousq; ut nec domesticos etiam noscant. Quod licet a Dioscoride constitutū etiam fuerit, cum inquit, sine latratu omnibus pariter insilire, bestijs, hominibusq; contubernales, & alienos mordere: nescio tamē, quomodo certius illud est. Occasionem sane obtulit, ut quod male inter notas timētis iam aquā hominis in Dioscoride legebatur, *ἡ ἀνομία*, quā uocem alter interpretū, cum languore, alter, cū fastidio uertit, ad ignorantia huiuscemodi nos transferremus: & quasi *ἀνομία* legi oporteret, cum sui, domesticorūq; ignorantia, uerteremus. Inter cætera enim quę docent græcorum grāmatici, significare *ἀνομία*, id est, cognitionis priuatio est. Ania duertimus etiā, quo loco inanes pa-

cūm relīctū, & uicij nota adiecta a nobis est, in male sequacis sermōis ductu deesse aliquid. Ab
 exceptione em̄ quod sequitur statim membrū principium habet: non ineleganti tantū, sed in-
 firmo penitus sensū. Oportuit enim prius constitui aliquid, unde quod sequitur, exciperetur.
 Quale autē id quondam fuerit, manifeste Paulus Aegineta indicauit, qui hīdem huic scriptori
 uer his eadem docens, cum eo produxisset rem, moneretq; iam & ipse accurrentes mordere ra-
 bientes homines, morſuq; suo suā in alios affectionem transferre, subiecit statim plerāq; alia,
 & inter cetera, τὸν δὲ ὑποσώτρων ὡς τὸ πᾶθος ὑδρία ἴσμεν περιωδύνα, πλὴν ἐξ ἰσχυρίας ἢ ἀσθ. Quo-
 rum sensus est. Omnīū uero qui in hanc affectionem deuenerint, nullum nos seruatū scimus;
 prāterq; ex historia unum, duosue. Quæ si scriptori huic inferantur, apte spacium id totum ex-
 plebunt. Nos ea signamus, ut habeant uolentes, unde locum instaurare possint. Docent prā-
 terea hīdem græcorū medici, aliorū quidem accidentiū manifestam esse causā, occupatis scilī-
 cet ueneno illo paritibus cunctis. Metum uero aquæ fieri aliqui eorū dixerunt, ex nimia siccita-
 te: quasi in contrariū habitum mutata penitus humida eorū substantia. Verūtamen Ruffus an-
 tiquæ medicinæ grauis auctor, infanti ex atrabili genus id esse, testatus est, magna ueneni eius
 cum humore illo similitudine: nec secus q; atrabile infanītes scimus alios alia timere. Idq; sen-
 tire etiā uidentur, qui dicunt, Canis qui momorderit imaginem in aquis, opinari eos se uidere:
 eoq; metu territos aquā fugere, & auersari. Monent etiā, quoniā non statim rabidi Canis mor-
 ſum sequitur metus aquæ, sed circa quadragesimā fere a morſu diem adest, & aliquando seri-
 us, opinātes aliquādo homines non rabire Canem qui momorderit, festinata morſus cicatrice
 causā affectioni huic dedisse. Id ne fiat, docuerūt qua indicatiōe usus aliquis rabire, aut non
 rabire Canē intelligat. Lubentq; iuglandis concidi nuces, diligenterq; his uulnus obstruere &
 circūligare. Mox sequenti die solutas & ablatas, gallinaceis in cibo apponi: & si his a princī-
 pio non pascantur, fame ad uescendū cogi: futurū enim superstitēs uiuāt, si nō rabierit Canis.
 Sin cōtra, postera die peribunt. Tuncq; ad uulneris dilatiōem festinandū. Iterumq; post pau-
 cos dies eadem indicatione utendū: & si non perierint gallinacei, tunc a periculō tutū uulnus
 ad cicatricem perducendū. Creditur indicationis huius auctor quondā fuisse Oribasius. No-
 lumus illud etiā relinquere, uideri nobis, quod hic ait, nullum a metu aquæ seruatum sciri, &c.
 credidisse aliquos de his intelligendum esse, qui non a rabido Canē, sed rabiente & aquā iam
 timente homine morſi fuerint. Hic tamē simpliciter tradidisse id uidetur.

Remedia demorſorum a Cane rabioso. CAP. II.
Ratio medēdi duplex. Vna cōmunis, qua utendū in omnes mor-
 ſus, quos uirulentæ animātes impresserunt. Alia peculiaris pri-
 uataq; eorum dumtaxat, quos rabiosi Canes momorderint. Quæ nōnul-
 lis quidem summā opem ferre consueuit. Alijs uero inutilis, maxime qui
 ex multo iam tempore ictū acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū
 exponemus. Deinde cursim perstringemus, quæ ad cōmunem medendi
 rationē pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles, cum sarmentis albæ uitis crea-
 mare oportet, & cinerem eorum q̄ minutissime tritum habere reconditū.
 Itidem gentianæ radicem tusam, cribratamq; reponere. Quoties autē Ca-
 nis rabiosus morſum intulerit, in quaternos cyathos uini bina cineris can-
 crorum cochlearia, unumq; gentianæ coniiciantur. Hæc in polentæ ma-
 defactæ modū subacta, quatrīduo bibantur. Inter principia medicamen-
 tum hoc modo detur. Atqui si ab illato morſu duo, aut tres dies fluxerit,
 curationem auspicabimur a triplicato pondere, supra id quod ab initio
 retulimus. Optimū hoc aduersus rabiosorum morſus auxilium, quod
 & multis unum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiam
 num auxilijs contra inuitabile periculum muniamur, nihil ceteris uti
 prohibet. Satiū autem multo fuerit, medicamentorum scuitiam tole-
 rare, q̄ propter negligentiam in discrimen adduci. Nec ita in demorſis

Q De Ratiōe uictus in morſu rabioſi Canis CAP. III. A
 Væ ad partem iſtam pertinent præſidia, ita ſe habent. Cæterū
 uictus rationē ex ijs quæ ueneno aduerſantur, coniectura qua-
 dam colligere oportet: ſimul ut ueneni uires hebetet, reſtin-
 guatq; ſimul ut arceat, quominus ad intima pernicies illabatur. Etenim
 aſſumpta, pernicioſarū uirium penetratiōi reſiſtunt. Quorū utrumq;
 præſtare poteſt uini meraciōis paſſi, & lactis potus. Quippe qui hæc
 oīa capiunt ad curā, non nihil ueneno obijciunt, quod omnē eius acri-
 moniā obtundat. Simili modo alliorū, porrorū, cæparumq; cibis: q; ea
 difficulter cōficiantur & aboleantur. Nam multos dies huius cibi qua-
 litates remanent: quo tempore nec euincuntur, nec permutant a mortī
 fera ui. Cōtrarijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorū uſus accōmo-
 datur, & theriacēs, metridati, & eius quod eupatorio temperat, deniq;
 omniū quæ magnā aromatum partē ſibi uendicant. Quippe aromata
 omnia uiribus & ſubſtantia ægre permutantur. Quare in corporibus
 euincunt. Victus ratio hoc modo ſe habet. Noſſe conuenit, pauorem
 aquæ nō ſtato, definitoq; tempore exoriri. Plurimū tamē ad quadrage-
 ſimū uſq; diem neglectis deferri cōſueuit. Poſt ſemestre etiā nonnullos
 inuadit. Quendā poſt annū aquā horuiſſe, nobis præſertim cōpertū
 eſt. Narrant & aliquos poſt ſeptenniū aquæ metu fuiſſe tentatos. B
 Inter principia demorſorū a Cane rabioſo curandi ratio talis eſt. Verū enim
 uero ſi ea quæ retulimus auxilia primis diebus prætermiſſa fuerint, nec
 ſcalpro carnē circinare, nec uſtione experiri operæ precium eſt. Non em̄
 quod iam p̄tranſijt ſatis euocare poſſent. Nulla utiq; adiectionis utili-
 tas, ſed in caſſum corpora doloribus ſternentur. Alter uero curationis
 modus accedat. Deiection magnū præbet iuuamentū: utpote cū mouen-
 dō, corporis habitū traſmutet. Et quæ colocynthidē recipit hiera, item
 lac ſciſtum quod ſimul deiectionē moueat, & uenenum domare poſſit.
 Cibi acres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehementer retundi-
 tur, quotidie ſumi debent. Cæterū ſudores ante cibos, & poſt etiā cien-
 di. Dropaciſmi, ſinapiſmiciq; particulatim per corpus totum adijciendi.
 Sed longe omniū efficaciffimum auxilium, Elleboriſmus cognoscitur,
 quo cum fiducia nō ſemel atq; iterū, ſed frequentius ante quadrageſi-
 mum, uel poſt hoc tempus uti licet. Tantam em̄ uehementiā hoc auxi-
 lium habere fertur, ut quidā qui iam aquæ metū ſentirent, ſumpto El-
 leboro, ſimulac primum morbi impetum experirentur, fuerint ſeruati.
 Nam & iam uitio tentatos neq; parū adiuuare poteſt. Itaq; primū cu-
 ram contra rabioſi Canis morſus, breui ſermone expoſuiſimus. Iam ad
 alia quæ uenenatis morſibus ſauire conſueuerunt, tranſeundum. No-
 tas uno prætextu, deinde cōmunem medendi modū, qui omnibus con-
 uenire poſſit, explicabimus. Cuſum poſtremo ſubiungemus ea, quæ

C sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Subnectemus etiam uenenata quæ nullis cedunt remedijs.

¶ Finis LIB. Septimi.

PEDACII

D I O S C O R I D I S

De notis eorum qui a uenenatis demorfi sunt, LIB. Octauus,

IO. RVELLIO interprete.

¶ De Phalangijs. CAP. I.



φαλαγγίς

Emorfi a Phalangijs, locus quidē ipse, quasi ab impactu aculeo rubet, non intumescens, nec per ambitum calidus, sed mediocriter subrubens. Vbi uero contrariorum occursum refrigit, consequitur corpore toto tremor, distentiones circa poplites et inguina, conuulsionibus non dissimiles. In lumbis collectio exoritur. Perpetua urinae libido lacessit, multaque reddendis excrementis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor emanat. Collachrymant oculi, offusisq; nebulis caligant.

¶ De Scolopendra. CAP. II.

σκολοπένδρα

SI Scolopendra, aut dicta Ophiostene morsum intulit, locus per ambitum liuore sugillatur & conputrescit, interdumq; licet raro, seculatus atq; ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit. Vlcus id negotium exhibet, fere remedijs inuictum. Preterea toto corpore prurigo sentitur.

EX M. VERG. COMM.

Habet mare Scolopendras: de quibus secundo uolumine ab hoc, & a nobis longius actum est. Habet & terra: uerum multiplices, nec eiusdem formæ, maleficique omnes. Eam ob causam hic inter uenenata tantum numerat. Quæ quondam ab enecandis anguibus Ophiostene priuatim dicebatur. Notum omnibus Scolopendarum genus: priuatim tamen incognita nobis Ophiostene, quam unam in eo genere ueneni maleficium habere hic ostendere uidetur. Etsi posteriores graeci marinae etiam huiusmodi uim aliquam assignarint, discreuerintq; utriusq; morsus notas: a marina dicentes tumorem aliquando fieri pellucidum, & aque similem: a terrestri uero rubentem: quam hic tamen proposuisse credi debet, nec nisi de terrestri monuisse. Addiderunt ueteres graeci aliquid, nec tamen morsus eius liuescere, sed tumere, & extolli etiam locum tradiderunt.

¶ De Scorpione. CAP. III.

σκόρπιος

Scorpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indurefcit, ac intentus rubet, uicissimq; dolore premitur. Modo siquidem exaestuatur, modo frigore occupatur, labor repente fatigat: aliquando meliuscule habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigerant. Inguina extolluntur. Tubercula in sede prosiliunt. Capilli eriguntur. Pallor membra decolorat. Dolor tanq; ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur.

De Pastinaca marina.

CAP. III.

SI marina Pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidua conuulsiones, labor, & imbecillitas. Mens percussis laborat. Postea obmutescunt. Oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupefcit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur.

EX M. VERG. COMM.

Non adeo ueneni maleficio infamis marina Pastinaca est, ut non eadem naturæ & morbis aliquando utilis, suas ab hoc ipso scriptore laudes secundo uolumine inuenerit. Eas, omnemque eius historiam poterunt uolentes illinc, & ab alijs de natura animalium scriptoribus facile audire. Gregorij medici nullas ex morfu eius notas descripserunt: quoniam non posset piscis quod possunt uenenata alia latere, sed ex morfu eius statim mali causa omnis pateret.

De Mure araneo.

CAP. V.

AMure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula diluta sanie turgens exurgit. Proximæ partes liuent. Rupta pustula, deuorans ulcus, non ei dissimile quod serpit occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, et humoris offusio consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

Addiderunt ueteres grecorum medici Muris aranei moribus, quæ ab hoc scriptore non dicuntur has etiam notas. Dolores, qui pulsuum modo per interualla pulsant: & in singulis dentium eius animalis ictibus rubores: disruptam præterea pustulam illam candidum ostendere ulcus: nec solum propinqua depasci loca, sed corruptas etiam decidere ex his locis partes. Erant de araneo Mure dicenda multa quæ ueteres tradiderunt, nisi quæ satis esse possint secundo uolumine dicta a nobis iam pridem fuissent.

De Vipera.

CAP. VI.

SI Vipera momordit, corpus intumet, uehementer arescit, subalbidumque colorem concipit. Sanies a uulnere profunditur, suppuris, mox cruenta. Pustule adustis similes erumpunt, & antea depascens ulcus, quod in proxima repens non summa modo corporis, sed intima quoque corripit. Gingivæ ipsæ cruore suffunduntur. Inflammatio circa iccur erumpit. Tormina & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

EX M. VERG. COMM.

Feri in Vipere morfu præter numerata a Dioscoridis grecorum medici hæc etiam dixerunt. Dolores a principio in morfu ipso: mox toto corpore etiam: uiderique in morfu exiguo spacio inter se distantia exigua duo foramina: fluereque primum ex his sanguinem, & aquosum humorem: tum oleosum tantum humorem: postremo uiridi æruginis colore, quod Viperae uenenum aliquod esse crediderunt. Tumoribus præterea, quos hic numerat, liuores illi addiderunt: rubores itidem, oculorum uertigines, stomachi resolutiones, & animæ defectus. Cuncta hæc tamen illi tripliciter tradiderunt, non satis certa nobis indicatione, duo ne illi serpentium genera, an unum tantum duobus nominibus indicent. Nobis, quatenus obseruauimus in scriptoribus alijs, non uidentur differre Echis, & Echidna: duplexque unius animalis potius nomen quam duorum duo esse uidentur. Paulus Aegineta duo manifeste genera constituit. Inquit enim, *ἡνδρονόρον διὰ δόξιν ἀπαλάττειν οἱ ἀρχαῖοι ὑπὸ ἑχιδνῆς ἢ ἑχιδνῆς*. Quod est. Minore autem periculo euadere creduntur qui ab Echidna, quam qui ab Echis morfu fuerint. Ceteri tamen, ut diximus, duo hæc genera

Oo ij

D I O S C O R I D I S

C miscent, præsertimque latini, Viperam utriusque appellantes: tanta est similitudo, tamque in cunctis con-
gener earum natura. Barbarus inter pestis huius notas, *νῆρον* ab hoc scriptore fieri dictum, ca-
pitis gravitatem interpretatus est. Cum tamen ad soporem, ut sæpe alias testati sumus, ea vox
tantum in græcis pertineat. Alter ne bis de uomitu ageret, tremores reliquit: nesciens *ἰμῆτεν* cor-
ruptam illic uocem, *τρόμον* legi oportere: quod meliores græci omnes indicant.

στυτάλη
ἐμφισβῆνα

De Amphisbæna. CAP. VII.

C onsimilia eueniunt istis qui ab Scytala nomine, aut Amphisbæ-
na demorfi sunt. Eademque fere auxiliantur. Quare hoc uenenum
priuatam descriptionem sortitum non est, quæ non eidem generi as-
signandum sit.

EX M. VERG. COMM.

D iuersa duo hæc animalia sunt. Indicant id Lucanus poeta in. s. omnesque alij. Eapropter cum
male in scriptore hoc locus hic legeret, coniungere nec simul Scytale, & Amphisbæna, quasi
duplex unius tantum nomen esset, nos & rei ipsius, & aliorum scriptorum auxilio, locum in in-
tegrum restituiamus.

De Druino. CAP. VIII.

δρυίνος

A druino morsis pustulæ, molestique dolores incidunt, præsertim
qua dilutæ saniei emissarium subest. Quinetiam erosio, tormi-
naque consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

D iber ex Paulo Aegineta addere quæ cum maleficio suo hanc pestem certius aperiant. Eius
de Dryino uerba hæc sunt. In radicibus Quercus, a qua arbore nomen inuenit, uitam Dryinus
agit: tam malefica, parataque ad nocendum ui, ut calcatus tantum cute nudos hominis pedes re-
linquat, totisque cruribus tumorem faciat. Ferunt præterea, quod magis mirentur omnes, nuda-
ri cute manus pariter eorum, qui curationem eius tractauerint: & si quis interfecerit, male olere
bestiolam, suoque illo odore omnium aliorum odorum sensum aufeire. Inter notas morsus eius,
numerauit idem Paulus, etiam cum rubore circa morsus locum tumore fieri. Desyderauimus
& nos Dryini morsus notas uertentes, qua parte corporis erosiones illæ fiant: uerbi causa, sto-
machi, aut alterius cuiuspiam in homine partis. Nobis in stomachum inclinatur animus: sed in
nullo græcorum ea uox inuenta a nobis est.

De Hæmorrhoo. CAP. IX.

ἡμorrhόος

A B Hæmorrhoo ictis uehementes cruciatus accidunt, qui breuē
strigosamque prorsus raritatem ex continuo dolore præbent. Ex
plaga copiosus cruor effluit. Et si qua cicatrix corpore nonnufquam adfue-
rit, frangetur, & sanguine manabit. Excrementa per aluum cruenta eij-
ciuntur. Profluensque sanguis in globos coit. A pulmone sanguinem ex-
tussunt, & nullo denique remedio euomunt.

EX M. VERG. COMM.

F oeminino genere nono sui carminis uolumine Lucanus serpentem hanc Hæmorrhoidem
dixit: descriptisque longissime cunctis eius euentibus, miserabile omnibus Romani militis mor-
tem fecit. Nos plerumque in alijs de Hæmorrhoo hoc tradidimus. Eamque ob causam relicta nunc
omni eius historia, quæ etiam ex eo poeta repeti potest, monemus, uideri nobis in hoc capite
male legi locum cui uitæ notam adiecit, & in quo discrepant a nobis reliqui interpretes: ide-
oque relinquere peritioribus instaurandum quod in eo uarie legitur, ex dolorum continuitate
breuia, angustaque reddi corpora. Alij enim id totum aliter reddiderunt. Nos communio-
rem secuti lectionem eo quo legitur modo uertimus. Et quem reliquit Barbarus sanguinem, quoniam in
Dioscoride non legerat, ex alijs græcorum scriptoribus reddidimus. Ille enim e loco ictus mul-
tum excerni liquorem tantum ait, nulla eius liquoris indicatione: cum tamen sanguinis ea sit,
& sic in melioribus adhuc legatur.

¶ De Dipfade. CAP. X.

QVos Dipfas percussit, intolerabilis ardor premit. Sitisq; usq; eo pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla intercapedine ex-
cruciet. Et si potum affatim trahant, ilico in eandem sitim re-
labuntur. Iis uero qui per initia potum nō hauserunt, simile quiddam
prorsus accidit. Quare propter cōtinuam sitim, & Prester, & Causon,
aut Pfas appellatur.

¶ De Hydro. CAP. XI.

AB Hydro demorsis ulcus dilatur, & liuidum ac ingens eua-
dit. Sanies ex eo multa & atra & male olens, non secus atq; ijs
quæ serpunt ulceribus expuitur.

EX M. VERG. COMM.

AB aquis græci Hydron, Romani a natatu, qui tutus in eo elemento terrestrium animalium
morus est, Natricem nominauerunt. Pulcherrimum hoc anguim genus, qd in aqua uiuit nul-
lis serpentiū ueneno inferius aut ignatius. Ex quo Romanus Cæsar, turpis & malefici ingenij ho-
minem, Natricem se Populo Romano nominis & imperij sui hæredem alere lamentabatur.

¶ De Cenchro. CAP. XII.

Cenchri morsum, qui uipe:ino ictui similis est, putridū ulcus fe-
quitur. Carnes antea ut in aqua inter cutem prætumide, deflu-
unt. Letargo corripuntur, et ueterno pressi, somnos captant. Erasistra-
tus eos iocinere, uesica, coloq; conflicari autor est. Quippe dissectis in-
plis, omnes fere partes corruptæ reperiuntur.

EX M. VERG. COMM.

Puribus hic maculis uariata tingit aluū, ut Lucanus cecinit. Quæ qm Milij seminibus simi-
les sunt, quam frugem græci cenchron uocant, nomen serpenti hoc fecerunt. Plura quo dixi-
mus loco poeta ille de serpente hac egit, quæ poterunt uolentes ab eo audire.

¶ De Ceraſte. CAP. XIII.

ACeraſte percussis locus attollitur, cum duricia pustulosus. E pla-
ga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed circa concre-
mentum totum rutileſcit, genitale intenditur, mens labat, oculorum ca-
ligo exoritur, deniq; rigore neruorum distenti commoriuntur.

EX M. VERG. COMM.

Habet Ceraſtes hic cornu figura callosam in fronte carunculam, unde illi nomen factū est.
Cornu enim ceras, græci uocant. Diuersus hic ab his uermibus est quos Plinius in Cossorum
genere in arboribus nasci tradit: & Ceraſtas pariter appellat. Sunt Diosco. & græcorum medi-
cis, præsertimq; Paulo Aegmetæ de Ceraſte hoc omnia eadem præterq; ubi hic uisus fieri etc.
quod interpretes alij ad colorem simpliciter contraxerunt, rutileſcere & rufefcere dicētes. Nos
uero in alijs legentes, eorum sententiam potius secuti, uaricum modo tumere totum cor-
pus his diximus. Id enim magis placuit, cæteris notis magis congruere uisum. Tument enim
uaries, quam in hac peste præcipuam notam hic numerauit.

¶ De Aspide. CAP. XIII.

AB Aspide ictus, uulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu ci-
tra eleuationē conspicit. Sanguis exiguis ille qdem, sed ater de-
stillat. Caligo uelox oculos obnubit. Labor in totū corpus multiplex,
omnino leuis, & nō sine uoluptate cōsequit. Ideo Nicāder perpulchre
cecinit. At uir perit absq; labore, discolor, atq; uirēs. Aliquātulus cordis

Cæstus afficit. Frons ppetuo reuelligitur. Genæ cōtremiscūt, quasi sine sensu in somno uacillent. Hos mors tollit ad diei trientē non dilata.

E X M. V E R G. C O M M.

TRia Galenus Aspidum genera esse testatur: numeratq; primum eius quam Chersæam uocant: mox eam quæ Chelidonia dicta est: tertiam postremo quam Pryada nominauerunt. In omnium nominibus naturæ earum indicatio & nota aliqua est: sed nulla certior, & quam solam cognouisse nunc satis sit Pryade illa, quæ omnium perniciosissima est. Siquidem erecto in anteriorem partem collo, ex interuallo quod satis ea fore coniecerit, uenenum in hominem iaculat, eoq; nihil aliquando huiuscemodi timentem, & incautum conspuens perimit. Et quoniam græcis ptyin, expuere sit, ideo Pryada eam nominauerunt. Ex hoc genere ferunt Aegypti reginam Cleopatram, cum deuictō Antonio Augustum uictorem timeret, sinistræ mammæ admouisse, morsuq; eius seruicūtem, & uictoris triumphalem pompam euasisse.

De Basilisco. C A P. XV.

ERasistratus in libro quem de medicaminibus & uenenis condidit, de uocato Basilisco scite ita refert. Cum Basiliscus momorderit, uulnus ad auri colorem exflauescit. Itaq; in plurimis quæ uirus eiā culantur, comites notæ ita se habent. Transcentes utiq; ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

E X M. V E R G. C O M M.

DAro, ut græcorum scriptores retulerunt, uidetur Basiliscus: totius ideo historiæ eius fidē penes autores hic esse uoluit. Eo enim pertinet quod Diosc. inquit in cōmentario de uenenis & remedijs, Erasistratum de Basilisco testatum fuisse: cum momorderit, sufflauo, & quasi aureo colore plagam fieri. &c. Vidisse tamen eum eos oportuit, qui traiectam per caput eius diadematis figura, candidam lineam contemplati, Regulum ob eam causam nominauerunt. Lucas nihil de Basilisco aliud inquit, q̃, Sibilaq; effundens cunctas terrentia pestes, Ante uenena nocens late sibi summo uet omne Vulgus, & in media regnat Basiliscus harena. Quod Plinius 29. uolumine, cap. 3. cōfirmavit dicens. Basilisci, quē etiā serpentes ipsi fugiunt, alios olfactu necant: qui hominē uel si aspiciat tātum dicif interimere. &c. Venenī eius penetrat per oīa uim, non multo post idem poeta descripsit. Quod totum poterunt uolentes in eo uidere.

Cōmunis curatio in oēs icūs uirulentos. C A P. XVI.

ADuersus quidem omnem animalis icū, quod uenenum uibrat, oris fuctio conuenit. Sugentem uero oportet ieiunum nō esse, sed & cibum sumpsisse, & uino os abluisse. Postea exigū olei in ore continens icū exugat. Locus ipse spongia fouendus. Deinde scarificandus. Sed ulcuscula altius imprimere expedit: quo uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autē carnis, & sectio, scarificatione longē potentius opitulant. Namq; ab ijs duo peculiaria p̃sidia fiunt. Vnū, q̃ uirus e loco tollitur. Alterum, q̃ ante occurrens q̃ interna subeat, cū sanguine copioso excernit. Quod si locus carnis circūscriptionē nō admitat, cucurbitulę cum largiori flāmā adfigendę sunt. Sed iā de uestione supra in rabiosorum morsu differuimus. Si uero icū pars, utpote extrema, sectionē cōmode nō respuat, p̃sertim in omnibus serpētibus, ut aspide, cerasse, & similibus, p̃culdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt quę Epithemata uocant. Imponat sarmēti eius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio, subacta stacte, garo, & acri salsamento. Porri, cepe, & allia mō minutissime cōtrita illinunt, mō cremata uul-

neribus iniiciunt. Quinetiā dissecti gallinarū pulli cū maxime tepent, **A** percusso loco conuoluunt. Nec desunt q̄ hisce tanq̄ discordia quadam naturali pugnantibus utant. Verū huius rationē inire facillimū fuerit. Galline em̄ calida natura p̄dita sunt: argumēto, q̄ deuoratū insigne uirū eliquēt, & aridissima queq̄ semina consumāt. Itē nōnunq̄ harenas, lapillosq̄, q̄s faucibus insinuarint, dissoluunt. Itaq̄ animātis calore, spūs ic̄te partis imperiū capescēs, uenenū exigit. Nec me fugit, qd̄ i aegypto fieri soleat. Cū spicas Aegyptij metūt, ollā picis paratā habent, et appen- sam fasciā. Tunc em̄ maxime serpentū iniurias expauescūt, tum p̄pter spicilegij tempus, tū q̄ opacis simul abdite speluncis, & cauernis, denso q̄ aruorum cespite delitescunt. Molestiora em̄ animalia, et uirus eructātia Aegyptus in campis ferre consueuit. Vbi ergo aut in pedē, aut par- tem aliā morsum intulerint, assidentes, fasciam in ollam picis coniiciūt, & semel, aut iterum brachiū, aut crus paulum supra uulnus obligāt, & arctissime duo e presentibus dstringūt: locūq̄ secantes qua circūactis est laqueus, picē insillant. Cūq̄ satis uulnus excepisse uidet, laqueū re- soluunt, et cepis, alijsq̄ supra memoratis illiniunt. Præterea pix liq̄da cū sale trito et feruēte illita, p̄sentanco est auxilio, si iugiter innouet. Con- uenit et cedrus, & simū caprarū ex uino decoctū. Locū aceto calido, ca- **B** lamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiā nō desunt emplastra uehementissima, & calidissima, quæ uenenum elicere, expugnare & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & semine rorismarini componuntur. De quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus aut nō iniusta reprehē- sione eos incescit, q̄ incognitas ad hunc usum facultates conscripserūt: ut elephantis fel, testudinis sanguinē, aut crocodili oua, & cōsimilia. Nā cū iuuantia quēdā literis tradidisse uident, plane in hæc sola incidenti- bus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt: cū difficile, nisi regia fa- cultate, peruestigari possint: neq̄ quo nostra fides n̄s obstringatur, fre- quēti obseruatione sufficiens expimentū p̄stiterint. Quæ aut ad cōmunē omniū usum p̄tinēt, queq̄ facile suppeditari, & omnibus a serpente p- cussis auxiliū ferre queūt, subiungēda uident. Intubus itaq̄, & Erica, & Astragalus cū aceto potus, contra oēs serpētū morsus auxiliant. Itē Bi- tumē, et uirētes Platani pillulę in uino diluto coctę, & Paliuri decoctū, radix Aristolochię, et Bringij. Decoctę etiam Lauri bacce, et deuorate, Piperq̄ largius esitātū, Ruta, Anetū, et Cyclaminus. Coma porrorū pri- uatū ex pane, aut alliū, aut cepe, balsamētaq̄ q̄pacerima, origani decoctū cū uino potū, sceniculi, pulegij, calamithę porrorūq̄ succus cū melle de- sorptus. Hęc qdē a plātis congrunt. Ab animātibus uero quēdā cōmo- de peti solēt. Gallinaceorū cerebella in cibo, leporinū coagulū cū uino. Itidē castorij sextās. Testes marinæ testudinis sumpti, multū p̄desse tra-

D I O S C O R I D I S

C dunt. Mustella sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Inuenitur etiam prius exenterata, saleq; siccescens inueteratur: ex aqua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus quæ dari solent hæcenus. Percussis a serpente prodest alui deiection, diffluens sudor, urina copiose reddita. Composita etiã quædam recenter remedia polliceri traduntur. Vtopij, & myrrhæ singuli oboli, piperis quicunx. Ea melle excipiuntur, & instar ægyptiæ fabæ dantur. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini æthiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. Dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de cõmunibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs cõtra bestias quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

EX M. VERG. COMM.

C Opiofiores, certioresq; in cõmunibus his contra uenenata remedijs posteriores grecorum medici fuerunt. Neq; inmerito, accrescentibus arti quotidie nouis eorum experientijs. Quas deinceps obseruantes, qui salutis humanæ diligentius consulere, monuerunt, non esse cucurbitur his simpliciter utendum, sed anteq; uulneri admoveantur, propinquas confodiendas esse partes: ut pluribus quasi canalibus una cum sanguine & spiritu uenenum foras trahatur. Addiderunt præterea, in repleto hominis corpore, secta uena mittendum esse sanguinem: quod nullibi a scriptore hoc præcipitur. Et in admoendis morfib, aut ictibus uenenatorum, dissectis galinacis, cæteris omnibus mares anteposuerunt. Deficientibusq; his, ne quid ad faciendam homini medicinam deesset, dissecta eodem modo, & admoda animalia alia in eum usum receperunt. Aliam a Dioscoride causam reddentes: q; scilicet uenenum in se trahunt, & dolores leuant. Quinetiam uri locum, & ignis crusta uulneri induci iusserunt. Quod in scriptore hoc tm signat, cū de adustione dictū a se fuisse ait. Pluraq; alia, quæ longius poterunt uolentes ab eis audire.

¶ Finis. LIB. OCTAUI.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S



Cõtra Venenatos morsus LIB. Nonus,
IO. RVELLIO interprete.

N I H I L inter ferientium uenenatorū notas de Vespis, et Apibus articulatim digessimus: q; conspicue omnibus foret, & nihil excellens, aut notatu dignū in his obseruaretur: inter remedia tamẽ earum meminisse non fuit alienum.

A ¶ De Remedijs cõtra Vespārū, Apūq; ictus. C A P. I.
Duerfus Apū, Vespārūq; ictus, prodest illita malua, & hordeacea farina cū aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, a muria, aut maris aqua fatus.

EX M. VERG. COMM.

Q Væneglexit Diosc. Apū & Vespārū ictus, notas & signa posteriores exceperunt. Ab Apis ictu dicentes statim sentiri dolorē, rubere locū, tumere, propinquas & incrementum partes, spi

culūq; in uulnere relinqui. In Vespis deinde eadem, sed intensiora omnia: nec relinqui spiculū. Addiderūtq; in remedijs, lutū, & bubulum simū, quibus illeuisse ictus utile sit: & pter hæc con-
 cisa, & posita mori arboris folia. Relinqui autē ab Apibus in ictu spiculū Aristoteles. 3. de anima
 liū historia, & Nicander in Theriacis suis testant: suoc; illo telo castratas perire.

De ictu a Phalangio.

CAP. II.

Phalangiorū ictibus ficulneū cinerem, adiecto sale trito & uino im-
 ponere oportet, aut radicem syluestris punici q̄tenuissime tritā,
 aut aristolochiā hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris pro-
 luenda, aut apiastri decocto. Folia eiusdem illinenda. Lauacris perpetim
 utendū, & potionibus quæ hæc medicamēta recipiant, abrotoni semen,
 anisum, aristolochiam, cicer syluestre, cuminū æthiopicum, cedrides tri-
 tas, platani corticem, & trifoliæ hærbæ semen. Priuatim autē singulorum
 ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit. Item myricæ fru-
 ctus, & chamæpityos, & uiridiū cupressi pillularū decoctum, ammisto ui-
 no. Sunt qui fluuiatilem cancrū in succum redactū, cum aqua, aut lacte,
 assumpto ap̄i semine confestim molestijs liberare prodant.

EX M. VERG. COMM.

Sunt in græcis nec reprobandæ fidei codices, in quibus non Aniso, sed Anetho contra Pha-
 langiorum morsus pugnatur. Nos tamen eiusdem scriptoris huius decreta in Aniso secuti,
 quod utile his quæ uenenum ictu, aut morsu relinquunt, ab eo dictum est, Anisum, ut in com-
 muni lectione erat, reddidimus.

De morsu Scolopendræ.

CAP. III.

Si Scolopendra morsum infixit, sal q̄leuissime tritus ex aceto uulne-
 ri inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acida mu-
 ria perlendus. Danda in potu aristolochia cum uino, aut serpillum, aut
 calamintha, aut ruta syluestris.

EX M. VERG. COMM.

Adicerunt remedijs his ueteres græcorum medici pleraq; alia. Cinerem aceto macera-
 tum, aut scyllam uulneri iubentes imponi. Quodq; hic iubet, oxhalme souendum esse locum,
 auctore Archigene antiquissimo medico, calido oleo fieri aliqui instituerūt. In potionibus eti-
 am asphodeli radice usi sunt.

Remedia ad Scorpionis ictum.

CAP. IIII.

Percussus a Scorpione, præsentī est auxilio ficulnum lac in uulnus
 instillatum. Scorpis ipse qui ictum uibrauit, tritus, & percussio
 loco impositus, suæ plagæ remedium est: ob quandam, ut constat discor-
 diam. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa conue-
 nit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & em-
 plastri modo adiectum, auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam
 ductum, & calamintha, quæ trita illinatur. Et farina hordei in uino para-
 ta, in decocto rutæ. Semen trifoliæ hærbæ tritum, & uulneri injectum, o-
 pitulatur. Hæc ad affectum locū pertinent. Post hæc q̄efficacissimis po-
 tionibus utendum: cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ
 drachmæ cum uino. Tusa gentiana, & pulegiū decoctum, & bacæ lauri
 pauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere disco-
 qui debet. Cupressus cum uino, & ruta. Nec secus ficulneum lac, laserpi-

C tium si adsit: sin desyderetur, peucedani succo utendum. Efficax est potus trifolij succus, & ocimi semē. Omnibus autem ijs perpetuus lauacri usus, euocatus sudor, & dilutæ uini portiones registrum.

EX M. VERG. COMM.

Non poterat sine græcorū latinorumq; scriptorū aliquot ope integra huic scriptori Scorpionū morsus curatio nunc esse: tam longe ab antiquæ lectionis ueritate deuia, parum diligenter græcorū librarij eam fecerant: pro parthico lasere, peucedanū: & pro cyperide, cupressum modo nobis ostendentes. Id cæteri interpretes, aut in extremo opere festinantes, aut scorpionum iniurias parū timentes, qualia in impresso scriptoris huius codice omnia legebatur, talia etiam uerterūt. Cum tamē utriq; facillimū fuisset: & si græcorū medicos, præsertimq; Paulum Aeginetam nuncq; antea legissent, ex Plinio locum emendare: qui. 21. uolumine, capite. 18. de Cypero agens, inquit, Cypero uis in medicina. &c. pauloq; post, Radix aduersus serpentium ictus, & scorpionum præsertim remedio est. Aut si ex Plinio id etiam agere noluisse, in scriptore hoc saltem meminisse debuerāt, contra scorpionum ictus Cyperi radicem præcipue laudari. Sed omnium aliorum certissimus instaurandi eius loci auctor Paulus Aegineta illis fuisset, Cyperide contra scorpionum ictus manifeste utens. Debuerat & illud homines monere, nihil huiuscemodi cupresso, aut ab hoc, aut ab alijs tribui. Eodemq; modo pro Peucedano, cui nulla contra scorpiones uis est, parthicum laserpiciū mutare. Quod hic ipse scriptor contra uenena omnia in Silphio laudauit, id alter ex eis melioris codicis, quem ipsi etiam uidimus, ope adiutus, animaduertit, & felicius uertit. Sed certius totam & ipse scorpionum rem absoluisse, si eundem Paulum Aeginetam libro. 4. de his agentem diligentius audisset. Sunt enim in reliquo capite pleraq; alia, quæ ab eo, & ab altero parum apte uersa fuerunt: quæ nos breuitati consulentes, relinquimus. Multoq; magis, ut quæ addiderunt, mutaueruntue in his posteriores græcorum medici, breuiter dicamus: quæ huiuscemodi sunt. Althea, quæ hibiscus est, simpliciter hic uti iubet. Responderq; hoc decretis ab eo in ea herba in qua testatus est, Altheæ folia uenenatorum morsibus, & ambustis mederi. Illi autem semini has tribuerunt uires. Et quas hic subter sumi pauciores lauri baccas, illi decem tantū decernunt. Quinetiam, argenti laminā uulneri impositam, egregie prodesse testantur. Bibendum præterea Sulphur uiuum in uino additis piperis granis octo. Lasere liquorem cum tritis cancris, Nigellæ, & Aethiopici Cymini, & Viucis semen, cunctaq; æquali pondere cum uino iubent.

D

E Aduersus marinæ Pastinacæ, Scorpj marini, & Draconis ictus. CAP. V.

El qui a marina Pastinaca icitur, omnia quæ de Viperarū morsu paulo post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus a marino Scorpione, & Dracone inferuntur, qui molestos cruciatus ciēnt. Interdum autem, sed raro nomas excitant. Quibus absinthij, saluix, aut sulfuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuulsa, & uulneri imposita, sui ictus medela est.

EX M. VERG. COMM.

Venenis ex mari addidit hoc loco Dioscorides Draconem, & Scorpionem, nullis tamen descriptis antea eorum maleficij notis & signis. Quod quare factum ab eo sit, non facile est conijcere. Nisi forte, quia alia piscium q̃ terrestrium ratio sit: possuntq; terrestria fallere incautos, marina autem nisi in aperto nocere homini nequeunt, ideo relicta a scriptore hoc illa fuerint. Siquidem posteriores græcorum medici, & ipsi nihil huiuscemodi addiderunt. In remedijs tamen copiosiores præter ab hoc scriptore dicta præceperunt, plumbo confricandum esse marini Draconis ictum, Triti serpillio, aut elixa lente, aut uiuo sulphure obstruendum locum: eundemq; hois urina souendū. Et absinthiū in diluta uini portione dandū: dandum & ficulnearum furculorū in dulci uino dilutum. Contra Scorpj uero ictus, mullum piscem dissectum imponi iubent. Quod miretur aliquis a scriptore hoc relictum fuisse: cum secundo uolumine de Mullo pisce agens, inter cætera uim hanc illi tribuerit. Nisi satis fore credidit, semel quocunq; loco de eo traditum fuisse. Adijciunt præterea, uiuo sulphure confricandū esse locum, bibendasq; tritas lauri baccas numero tres.

De morfu Muris aranei.

CAP. VI.

A

SI Mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium per se uulneri exterius impositum, aut medicamento modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam Mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. Resistant quoque acini dulcis punici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita, nec non aquæ calidæ fots. Sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum ab rotoni decoctum, maxime si in uino derur. Præterea serpyllum, & galbanum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pillulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino, & chamælaeonis hærbæ radix. Nec desunt qui literarum monumentis tradiderunt, tritum Murem araneum contra suos ictus cōmode bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam dumtaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant, demorsum non alias exulcerari, nisi extrinsecus Mus araneus altiterit, tum quoq; auxiliari referunt.

EX M. VERG. COMM.

Multa sunt quæ alia, & aliter pro Muris aranei morfu ueteres græcorū medici docent. Primumq; inter ea quæ emplastri modo imponuntur, non dulcis punice acinos, ut cōmunis fere lectio habet, sed Malicorū imponi iubent, apriore remedij genere q̄ si quis acinos dixerit. Numerant mox agrestem maluam, & ex aceto tritum sinapis semen. Cumq; & ipsi calida aqua, uerumtamen marina (quam uocem deesse huic scriptori suspicamur) locum foueri præceperint, adijciunt statim, cremata hordea ex aceto imponenda esse. In portionibus deinde, non numerata ab hoc scriptore, adijciunt silymbrium, saluiam, hedinum agninumue coagulum, gentianæ radicem, aut uerbenacam, cunctaq; cum uino. Quinetia cum uino bibendum tritum Murem araneum dicunt. Facere ad hoc ueneni genus myrrham pondere semissis drachmæ, & aristolochiæ corticis drachmas quatuor. Sunt & alia ab eis in huiusmodi malo obseruata & tradita remedia, sed efficacissima, & præcipua hæc sunt. Post quæ erat dicendum nobis, cur in extremo capite uitij nota æditioni huic nostræ addita sit. Sed tam aperta erit græca intelligentibus eius consilij ratio, ut nihil iacturæ sit eam non tradidisse, præsertim in extremo opere ad ea quæ supersunt festinantibus.

B

Ad morsum Viperæ remedia.

CAP. VII.

SI Viperæ morsum impressit, finum caprinum cum uino impositum sopitatur. Item laurus & abrotonum & galbanum splenij loco superiectum. Origanum uiride inditum. Pulli gallinarū discerpti, & confestim admoti. Erui farina, aceto mulso subacta. Radicis cortex usq; eo tussus, ut in puluerem solutus abeat, & scylla tosta detritum chamæmelum, hordeaceum cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus ante calida foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produunt. Leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi he mina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta. Hæc in uino potari debent. Merum continuo bibendum, allia mandenda, & cepe, & porri recentes, salfamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc sunt. Per cussis a Serpente præclare auxiliatur medicamentum quod myrrhæ, pipæris, castorij, floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo constat.

D I O S C O R I D I S

C Hæc omnia in cretico passo teruntur, aut in alio probato uino. Erasistratus in eo libro, qui *περί συνδμνων*, id est, de uiribus inscribitur, pleræque alia tradidit, quæ ictis ab Vipera auxilium ferre possunt. Inter quæ talia maxime laudantur, gallinacea cerebellâ cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potû. Quinetiam bonum est digitum in liquidâ picem intingere, deinde uinû, quo digitus fuerit elutus bibere. Hæc sunt quæ contra Serpentium ictus auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Sunt toto hoc capite a scriptore hoc decreta, quæ contra Viperas imponi, comedi & bibi oporteat. Quæ item simplicia, & quæ composita eius mali remedia sunt. Adiecerunt his alij græcorum medici plura alia. Elixas in cibo ranas: in poculis meraci uini potiones, tam presentis remedio, ut si quis remedio eo utatur, nullo alio opus sit: Marinæ testudinis, cum agresti cimini succum, sanguinemque: Leporis, inulue triobolari pondere coagulum: Siccatu ceruini genitalis drachmam: Panacis cum uino radicem: Agarici drachmâ: Iuniperi baccas: Alphon deli radicem: Concisa pistacia: Viticis semen: inueteratæ mustelæ drachmas duas: Fluuiates marinosue caneros per se, & cum pediculari herba, quam Staphidagrium uocant, saleque & polio: Aristolochiæ, cum myrrha radicem: Gentianæ, baccarumque lauri parem mensurâ melle exceptam. Oribasius præterea priuatim, quam alij Aristolochiæ radicem, radicis ille corticem sumi iubet. Addit & castorium, & opium: iubetque, habita uirium ratione, in diluta uini portione dari. Lycus Sandaracam & Anethum adijciebat. Archigenes Lauri folia in oleo decocta imponi iubebat. Tamque in toto hoc genere remediorum abundant græci, ut multum illis merito secuta tempora debeant: qui dum salutis humanæ consulunt, nihil intentatum reliquerunt. Poterant plura alia etiam numerari, sed ex multis satis hæc fore opinati sumus. Poterunt enim uolentes a Paulo Aegineta & hæc & plura alia certius audire.

D **De Amphibænæ morfu. CAP. VIII.**
DE Amphibæna mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferere medijs ad Viperas scriptis, percussi ab ea, adiuuari soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

Breue quidem, non leuiter tamen corruptum in cunctis fere græcis, quos hæcenus uidimus, hoc caput erat. Id aliorum scriptorum, & eius qui mihi omnium uetustissimus & probatissimus græcus codex est ope, & ex hoc ipso scriptore in eam quæ legitur in ædizione nostra formam restitutum est.

Contra Druini ictus remedia. CAP. IX.

ADruino ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifoliû hæba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni quærcus genere. Tusæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quas hic dolorem lenire tantum ilicis radices tusas, & loco impositas ait, cæteri remedio esse dixerunt. Hic *παραποσύνειν*, quod ad leniendum dolorem pertinet, inquit, illi *ἐπὶ τὴν πληγὴν*, quod ad opem remediorumque & salutem.

De Hæmorrhoi, & Dipfadis ictu. CAP. X.

HÆMORRHOI, Dipfadisque morsus, uelut immedicabiles a plerisque maiorum deplorati relinquebantur. Quare si peculiariibus contra Dipfadem remedijs egeamus, cōmunia experiri operæ præciū erit. Protinus aut scarificatione uti, uisionem facere, & si locus patiat, amputatōe opus erit. Consequenter quæcerrima cataplasmata ad mouere, de quibus sepenūero diximus. Nec me fugit, acres cibos maxie a falsamē

tis utiles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interie-
cto breui spacio assumenda sunt, priusq; morbi genus emerferit: quo se-
mel erumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu Hæmor-
rhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantur, ut scarificati-
ones, uisiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in Diplade definiui-
mus. Quinetiam decocta uitis folia, & cum melle trita.

EX M. VERG. COMM.

Inuenisse se ab antiquioribus tradita Paulus Aegineta, quæ præter supra dicta uulneri impo-
nerentur, hæc etiam inquit. In Dipladis morfu concisa portulacæ folia ex aceto: Polentam ita-
dem; Rubiq; concisa cum melle folia, Plantaginem præterea, Hyssopum, Allium, Elaphobo-
scum, Porrum, Rutamq; & Vrticam. In Hæmorrhoi autem hæc ipsa, & præter hæc elixa uitis
folia cum melle concisa. Nec minus Hæmorrhoi ipsius crematum caput in potione datum:
aut cum Irino oleo Scordion herbam: comedendasq; in periculo hoc passas uuas. Non con-
uenit deinde nobis in hoc capite cum alijs, quo loco hic scriptor ait, ἡ δὲ διὰ τὴν ἀντιφάρμακον πινόμενον. Illi enim Drimiphagias frequentem in hoc scriptore uocem,
ad acres tantum cibos contraxerunt. Nos ut est communis & propria eius uocis in medicina
æstimatio, ad eas uomitiones retulimus quæ accremento ciborum quærentur. De quibus ac-
tum longius secundo uolumine a nobis in Omotharicho est.

De morfu Hydri.

CAP. XI.

Si morsum Hydrus adegit, prodest origanum tritum, & aqua suba-
ctum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut quærna
radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquato. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in diluto uino, aut poscæ
cyathis duobus: deinceps marrubij succus, uel decoctum utriusq; cum
uino. Fauus recens datur in aceto.

EX M. VERG. COMM.

Non satis certa in hoc capite omnia in græcis sunt. Pluribus enim locis a reliquor; græco-
rum disciplina uariant, quæ hic scriptor pro Natricis morfu constituit: non tam adeo diuersa
nobis uisa sunt, ut mutare aliquid, aut addere placuerit. Illud tantum monemus, quod Barbarus
ait, bibendū porri succum. &c. nos Marrubij dixisse, concordi in hanc uocem græcorum alio-
rum medicorū præcepto: qui prasi, id est, marrubij, non prasi, id est, porri succo uti iubent.
Potuit ille suorum codicum fidem sequi: nos cōmunem lectionem, & ueterum auctoritatem
magis amauimus. Addiderunt græcorū medici remedijs ab hoc scriptore numeratis Nastur-
cium, Asphodeli semen, floremq; & cum uino fœniculi semen.

De morfu Cenchriddij.

CAP. XII.

Morsis a Cenchriddio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semi-
ne illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllum cum
duodecim hastulæ regiæ drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolo-
chiæ radix. Item cardamomum, & gentiana.

EX M. VERG. COMM.

Corruptū, maleq; habitum a librarijs aliquot locis caput hoc est. Licetq; Pauli Aeginetæ
auxilio totum restitui posset, satis tamen nobis fuit pro Cardamomo, quod passim in eo lege-
batur, Cardamon, id est, Nasturciū uertere. Factumq; id est, non tam quia ut diximus Carda-
mo græcus ille scriptor manifeste utitur, q; quia hic ipse scriptor in Nasturcio dixerat, ἡ δὲ διὰ τὴν ἀντιφάρμακον πινόμενον. Quod est, Potum serpentibus remediū est. At Cardamomū etiam
id præstat. Scimus id quidem: sed utentibus ad hanc rem Nasturcio alijs in ambiguo, id potius
elegimus, qd græci alicuius scriptoris auctoritate defendi posset. Virū suspicati sumus illic etiā
esse, quo loco non integræ lectionis notā adieciimus. Credimus em̄ legi quondam potuisse ali-

D I O S C O R I D I S

Cter cum locū; καὶ ἰππιδος σὺν ἀσφιδέω λελιωμένον, ποτιζόμενα δὲ παραχρῆμα κενταυρίου τῆς ῥίζης δραχμαὶ δύο σὺν ὕδατι κνέθουσιν γ. Quorū sensus est. Et Serpillū cum Asphodelo tritum. Portiones autē statim Centaurij radices drachmæ duæ cum uini cyathis tribus. Nihil nos tamen mutauimus, locum legentibus signasse contenti. Sumusq; ad hoc Pauli Aeginetæ disciplina, & præceptis usi: qui totum scriptoris huius caput iisdem uerbis commentarijs suis adscribens & miscens, quo diximus modo totam hanc rem docet.

De percussis a Ceraſte.

C A P. XIII.

SI Ceraſtes, aut Aspis percusserit, cita partis amputatio suffragatur. Quare sine mora iſtam partem amputare, aut scalpro confestim circumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper admouenda. Siquidem uirus hoc ueneno Basilisci simile est.

De morſu Aspidis.

C A P. XIII.

Is qui ab Aspide feriuntur, quæ de Ceraſte scripta sunt auxilia danda debent. Nam uenenum hoc quemadmodum Basilisci, aut sanguis bubulus, celerrime in arterijs sanguinem cogit

E X M. V E R G. C O M M.

SEorſum, duobusq; capitibus de Ceraſte hic scriptor & Aspide egit, contra q̃ in Græcis alijs omnes fecerunt: qui simul de utroq; docuerunt, certius remedia hæc etiam tradentes. Dico autem certius, non quia plura, aut alia, sed quia expoſitis remedium illorum cauſis & tractationibus, certior legentibus totā hanc rem feciſſe uidentur. Nos eam relinquimus, non tam breuitati conſulentesq; q̃ quia nihil huic ſcriptori contrarium, aut aliud in eis eſt.

De Baſiliſci morſu.

C A P. XV.

DA Baſiliſci morſum, ut Eraſiſtratus author eſt, auxiliatur caſtorij drachina in uino pota. Item papaueris ſuccus. Iſtuum remedia ita ſe habent.

E X M. V E R G. C O M M.

QUæ ab Eraſiſtrato contra Baſiliſci morſum inſtituta quondam fuiſſe Dioſco. ait, ueteres græcorum medici incerta ſibi eſſe tradiderunt: propterea, q̃ eorū periculum nunq̃, aut rariffime ab aliquo factum fuerit. Et hæc quidem hætenus. Nobis ſane longe plura, & maiore q̃ a principio cogitauiſus operis incremento aucta. Dioſcoridi uero, & legentium deſyderio (tam late tota hæc res patuit, & nos tam multa, quod ſampridem ſentiſus, parum certe diximus) nunq̃ ſatis futura: niſi uoluntatem noſtram magis q̃ officium manes eiſ amauerint: & qua ſolent humanitate bonarum artium, & humanitatis profeſſores noſtra hæc exceperint: nec quatenus aliquid præſtitimus, ſed quid conati fuerimus, in honoris & officij cenſu nobis numerauerint. Reliquimus nos in extremo hoc opere quæ ab interpretibus alijs importune, & contra ſuam etiam iudicium addita huic ſcriptori fuerunt. Pro comperto enim uobis eſt, non eſſe eiſ, quæ tam leuiter, ſuperſtitioſeq; in eiſ docentur. Relinquimus & quæ ali quando polliciti ſumus in ultimo opere, addituros nos eſſe, Colorū proprias cum ſuis diſcriminibus uoces: & antiquorum ponderum, menſurarumq; omnium antiquas rationes: præſertimq; quibus græcorum menſuris & ponderibus antiqua Romanorum, & noſtrorum temporum pondera & menſuræ reſpondeant. Non tamen auferetur, quod nunc non datur. Cogitauiſus enim ueterum quorundam exemplo, & ex Theophrasti diſciplina, de floribus commentarium, in quo certior Colorum omnium, in natura ſumptis ab ea exemplaribus, ratio & hiftoria tradet. Adijcieturq; illi quod ad pondera illa, & menſuras pertinet. Nunc enim ampliore uolumine librarios & legentes deſatigare, uiſum non eſt.

Finis L I B. Noni.

QV AE SEQV VNTVR, NON VIDEN^r

tur esse Dioscoridis.

¶ De Rhamno.

Rhamnū, si quis eruat filente luna, & secū ferat, contra uenena, & improbos hoīes proderit. Pecoribus iuuādīs appendit. Nauigijs circūponi solet. Valet cōtra capitis dolores, & laruas.

¶ De Artemisia.

Artemisiā hārbam, si quis teneat dum iter facit, lassitudinē discutiet: & si in pedibus ferat, bestias, & lemures abiget. Si sanguis circa artus cōaluerit, ramulos ex rosaceo in olla ferue facito, & locum totum oblitino, cum somno indulgendum est. Strangulatui uuluae mirum in modum auxiliatur. Vrināe stillicidia, & opisthorthionum leuat.

¶ De Pentadactylo.

Pentadactylū, si qs circū corpus portet, nullo dolore afficiet. Oculos, strumas, callosos tōn- fillarū tumores, uua, articulos sub lingua, neruorū dolores, & dentes, pforā pernīciali fame cō- tractā iuuat. Remoratos a partu mēses eicit. Infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fa- scinū, & laruas mirū in modum cōmendatur. Vellito hārbam cum luna crescit oriente sole.

¶ De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa, doloribus oculorū au- xiliat. Contra hebetudines eorundē & capitis dolorē efficax est. Trita ex aceto, lassitudinē resi- cit. Strumas, callosos faucū tumores statim discutit. Febriū horrores sanat, si qs solū ex aduer- so stans ramulos tenuerit.

¶ De Dictamno.

Dictamnū siccātū manibus terito, & redigens in farinā adiecta uini stilla corpus tangito. Si quidē contra oēs serpentū iniurias auxiliatur. Vlcera, & putrescentes nomas prāpurgans ex- plet. Adactis corpori aculeis oblitit, ut p̄senti sit auxillo. Ad lienē, et in abditis locis uitia inflā- matione turgentia, redactū in farinā illinito. Hārbā uere, magnis aestibus, autūnoq; eruito.

¶ De Saluā.

Saluā singultū, tussimq; discutit. Omnibus malis ulceribus cum cāra & rosaceo sumpta au- xiliat. Lienis dolorē, dysenterīaq; pota cū uino albo pari modo sanat. Sanguinē excreantibus, potu medet. Ad extrahenda uuluae onera efficax est. Pessimāe mulieres pessum ex ea subijciūt, ut partus excuriant.

¶ De Cupressō.

Cupressus herba cōtra raucedines aurīculasq; pdest. Induratos tōsillarū tumores, aquā inf- cut, & coxendicū cruciatu p̄sanat.

¶ De Centaurio.

Centauriū contra inflāmata uitia, & pulsantes ictus ualet. Foeminis uuluae malo laboranti- bus auxiliat. Stillicidiū urīnā, calculorūq; tormēta leuat. Hārbam uere oriente sole legito.

¶ De Buphthalmo.

Buphthalmū crescente luna legere oportet. Facit aut contra pauores, laruas, & mala medi- camēta, fascinationes, ut pore cū eas auertat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluctionēq; cōfestim sistens auxiliat. Quin & uentrē resoluit.

¶ De Paonia.

Paonia hārbā per aestus caniculā ante solis ortū uellit, appensaq; cōtra uenena, fascinū, pa- uores & laruas pdest. Itē contra febrē cū horrore uenientē, diurnā nocturnāue, & aduersus ter- rianā. Prodit lemures a mōte in q̄ nascebat fugasse.

¶ De Moly hārbā.

Moly hārbā si secta radice feratur, ueneficiorum & fascinationis amuletum est.

¶ De Marina quercu.

Marinā quercū, cū rosaceo & oleo misceto, & facit illinito cū ad negocia te cōferes. Vegeti- ores reddit pueros imo uentri appensa, & ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Cōtra fascinū, & oīa maleficia pdest. Corpus tuei. Cum em fascinatē recedūt, arecentē ramulū oc- cludit: & cū p̄pius accedūt, aperit.

¶ De Chrysanthemo.

Chrysanthemon, si terra ante solis ortū eruat, & collo appendat, ueneficas mulieres, oēsqs fascinatē amolit.

¶ De Erysimō.

Erysimon cū uino tritū, aduersus uentris dolorē bibit. Si qs grana septē domū ingesserit, ri- xa & iurgia concitabunt.

¶ De Elleborine.

Elleborine aliquibus Epipactis, alijs Borion dicit. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bibit contra omne uenēnū, & iocineris uitia.

ARGENT. APVD IOANNEM SCHOT^r
tum librariū, 18. Augusti, Anno Christ. M. D. XXIX.

Chartarum numerus, prater Indicem, 183.

ῥάμνον

ἀρτεμισία

πενταδάκτυλος

πεντίστις

δίκταμνος

ἐλισσαίος

κυνάριον

κένταυρον

βούφθαλμος

παίονία

μόλυ

ῥιλον

INDEX VOCVM

ferè omnium quæ passim in COROL-
LARIIS Hermolai Barbari, Anno-
tationibus M. VERG. ipsiusq;
DIOSCORIDIS
Simplicium descriptione continentur.



INDEX

VOCVM

libri omnium deo patrum in C O R O S

A R T I S H E R E T I C A L I B U S A N N O S

canonibus M. V. R. G. I. P. I. P. I. P. I.

D I O S C O R I D I S

Simplicium de scripturae continentur.

2

Io. Schottus Librarius
Lectori. S. D.

Polliciti sumus Lector candi-
de, idq; ab ipso Operis nostri fron-
tis piceo, binos Indices, quod inge-
nue quidem fateamur. Verum ut
est sapientis, pro tempore mutare
consilia, longe melius compendi-
um in animum subiit, ut duos, in
unum contraheremus: nō tam ut
tibi uestiganti singula quæq; obui-
am, & ob oculos essent, q̃ urpen-
si quoq; nostri finem felicius adse-
queremur. Id ut boni consulas,
rogamus. Vale.

¶ Litera A.

ABACVS

Alabandicus 317 a
Abies duplex 335 c
Abietarij 62 c
abrotonum ibi. d 162 a
absinthium 101 a b
absinthij genera eo. c
absinthium marinum eo. b c d
absinthium Santonicum eo. c d
Acacalis 49 b c
acacia 55 c
acanthos ibi. 158 c d
acantha 92 a 158 c d
Acani 115 d
Acantha leuce 159 b
acanthica mastiche 224 a
acanthium 158 b
acanus seminalis 224 a
acarna 190 b
Accipenser 103 c
Acesa insula 321 c
acessis 317 c
acetabulum 142 d 285 b
acetaria 142 d
acetum 297 d 298 a b
acetum mulsum eo. b c
acetum scyllinum 299 b c
acerum stychiadicum 303 a
Acherois 45 d
Acherusion ibi.
achillea 223 a
achrofyalos 320 b
achudon 68 d
Achy 7 b 69 d
achyra 68 d
acida muria 298 d

acinea 169 d
acini 64 b
acinoë 169 d
acinos ibi.
acis 64 b
Acocion 95 b
aconia 333 d
Aconitum 239 d 240 a b
aconitum alterum 345
aconos 240 b c
acorma 169 d
acorus. um. 190 b
Acridophagi 2 a b
acris 92 b
acrodrya eo.
Actea 66 b
Acylon 279 c
Adamas 59 c 71 c
adarce 104 a
Adeps 331 a
adantos 100 d 102 b c
adanti miracula 258 c d
& 259
adanti genera eo. b
Adipion 68 c
adipos 61 c
Adnata 139 b
Ador 110 a
adorea ibi.
adoreum ibi.
Adorei quatuor discrimina ibi.
Adrachne 71 b c
Adustio 354 d
Aedon 89 d
Aëra 113 d
æromel 26 a c
ærizusa 336 a
Agallochum 7 c d
ægis 35 c
ægidion 64 b
ægylos 207 c
ægylops 260 a b c d
ægoethros 106 b
æmalea 104 a
æmation ibi.
æris coëctura quatuor parit 323 d
æris flos 310 d
æris species 311 c
æruo rafa 311 d 312 b
æruo scolecia 312 b c d
æruo aurificij eo. d
æruo ferri ibi.
æruo uermicularis ibi.
æs inauratum 320 b
æs ustum 310 c d

æthyopis 249 a
æsculus 59 b
æsculetum ibi.
æthal 34 c
æther 108 c
æritēs 336 b c
ætitis genera ibi. c
Agaricum 151 b. d
ageroson 231 a
agne 56 b
agneltra 57 d
agnos 56 b 49 d
agonos. 56 c
agria 44 b
agriandrys 58 d
Agricofal 327 c
agrifolium 75 c
Aiuga 212 a b
aiuga altera 210 a
aizoon 244 c d
aizoon genera ibi. & 245 b
Alabandicus 335 c
alabaster 328 c
alabastrum 335 b
alabastrus ibi.
alabastrites ibi.
alapathron 120 c
alarea 72 a
alaria ibi.
albuscus 143 b 50 b
alburna 102 c
Alcea 209 d 210 a
Alcyonium 330 c d
Alæ 339 b
alec 86 c
Alecule 87 c 86 c
Alectorolophos 231 d
Alex 87 c
Alga maris 247
Aliata 109 d
alicacabus 237 d
aliciaræ 229 a
alima 21 c
alipenon 58 c
alipres 24 c
alipaston 102 b
alison 189 c
alifum 210 d 211 a
Allectoris 91 a
allectryenæ ibi.
allectryon ibi.
allium 235 b d
Alemani 23 b
almytis 50 a
aloe 160 b c d
aloidarium 63 a 160 d

A. ij

I		N		D		E		X	
aloemon	28 e	anchusae genera	220 a c	apimelis	71 b				
alopeca	83 b	anchusa alia	220 b c	apinthium	161 b				
Alphita	108 e, 109 d	anchusa tertia	eo. c	apludæ	109 d				
Alfine	244 b	Andrachne	71 b	Apochyma	40 b				
althea	121 c, 209 b c d	androsace	205 b c	apocynon	86 242 b				
Alumena	324 c d, 325 a b c	Androsomon	211 c	apocrypha Dioscoridi annexa.					
atumen scissile	325 b	androsomon duplex	ibi.	folio ult.					
aluminis genera	ibi.	andrachon	239 a	apollinaris	235 c, & seq.				
alus	215 d	andraclon	ibi.	apollo myriceus	49 a				
alosus	327	andrachelon	ibi.	apospematissimus	320 b				
alutarij	90 c	androdamas	324 a	Appendix spina	158 d				
alutamentum	ibi.	Anemo	146 b	appherema	109 d				
Alysson	189 b c	anerectos	108 c	Apum ictus cura	358 d				
Alypon	281 b c	anethum	176 b	apospingifimos	331 d				
Amala	96 d	anifum	175 d	Apraginosif	64 e				
amaracus	26 d, 27 a	Anguium senectus	82 d	Apteros	92 b				
amaracinum duplex	ibi.	Anonis	159 a	Apuas	87 c				
amara	46 b c	anosteos	78 d	apulas	ibi.				
amarice	48 c	Anthalion	206 b	Apyrena	62 d				
amamelides	71 b	Anthemis	eo. b d, 140 b	apyrenon	ibi.				
amaracus	168 c d	anthemidis genera	eo. d	Aqua	296 c d				
amaranthus	ibi, 230 b c	anthena	ibi.	aquarum discrimina	ibi.				
Ambrosia	197 d, 198 a	antheles	48 a	aqua marina	297 b c				
ambra	46 b d, 47 a	antherices	108 a	aqua multa	295 c d				
Amellum	23 a b	antrhacida pisces	327 c	item folio	296 b				
amentum	60 d	anthyllis	206 b	aqua frigida	350 d				
Amiantus lapis	335 c	anthias	102 c	aquifolium. ia.	302 d.				
Ammi	176 d, 177 a	anthrenæ	106 b	item folio	59 d				
amilla	23 b	antinoius	271 d	aquiceli	36 b				
ammium	ibi.	antispodos	310 b	Arabis	137 b				
ammoniacum	187 a b	antiora	192 b	arabus lapis	314 d				
Amomis	9 d	antirrhinum	257 d	aracus	115 d				
amomum	eo. c d	antitaura	192 b	arachnion	57 d				
amorgis	56 a	Apalos panis	108 b	araneus	95 a				
amorgynæ	ibi.	aparathe	71 c	ara neorum genera	ibi.				
Amurca	55 d	aparine	189 a	Arbores resinam ferentes sex					
Ampeloprasum	134 d	Aperi	90 b	folio	35 d				
amphibia	160 d	Aphenum	7 c d	arbutus	71 a				
amphicaustis	109 d	aphi	17 d	arbuti genera	ibi.				
ampelitis	339 c	aphroditarium	63 a	Archemora	57 d				
amphisbenæictus	356 c	apharca	71 b c d	arction	249 b				
Curæius	360 d	aphritis	87 c	arcton	ibi. & c				
Amygdalus	71 c	aphros	ibi.	Arenga	86 c				
amygdalæ	ibi.	aphrya	ibi.	Argemone	146 c d				
amylum	113 d, 114 a b	aphryæ	ibi.	argemone altera	147 a				
Anabasis	127 b	aphyæ	ibi.	argentum uiuum	150 b				
anagallis	147 a b c d	aphaca	133 d, 134 a	item folio	320 a b c d				
anacacabea	69 c	aphia	134 a	argenti uiui genera	320 d				
anacacabos	ibi.	aphonitrum	329 b	Argyrion nama Chymistarum					
anacollia	177 c	aphroniteum	328 c, 329 b	folio	325 d				
anatis	104 a	aphroselenon	335 d	Aria	44 b, 311 c				
anatum differentia	ibi.	aphurca	71 c	arinca	111 c d				
anagyris	210 b c	Apium	366, 178 a b	aris	142 c				
anagnostis	272 d	apia	68 c	arifarum	142 c				
anarrhion	457	apios	ibi, 280 a b	aristæ	208 a				
anchusa	219 d, 220 a b	apiastrum	145 d, 193 d, 194 a						

XI		N		D		E		X	
Aristolochia rotunda	151 d	Atriplex	111 e d	Berberi	119 e	berberion	ibi.	126 e	
item folio	153 a	Atharathrion	111 c	bellis	120 a b	bellio	ibi.	123 b c	
aristolochia longa	153 d	atramentum librarium	140 a b	Beta	123 b c	betæ genera	ibi.	218 b	
aristolochiæ genera	160 a	Aureon	149 d	betæ sylvestris	212 d	betonica	213 a	123 c	
Armamentarij	47 c	auricula muris	150 a b	betylus	123 c	Bia	104 a	48 b c	
armenius lapis	118 b	auricula muris altera	160 a b	Biblos	103 c	Bilis	ibi.	103 c	
armillini	97 a	Auena	160 a b	bilis duplex	ibi.	bilis flauæ genera	ibi.	40 c	
Aron	141 b. 142 b c	auripigmentum	124 a	Bitumen	40 d	bitumen ex fulmine	40 d	184 b	
Arfacus	44 c	item folio	350 a b	Blachnon	170 b c	Blastus muselitis	7 c	88 d	
arsenicum	124 a	Axinomantia	334 a	Blatta pistrina	70 d	blattarum genera	ibi.	148 d	
Artemisia	197 b c. 207 b	axos	350 d	blataria	61 d	Blechron	164 a	164 a	
artemisia tenuior	160 d	¶ Litera B		blerhrum	184 c	Bliton	111 a b	ibi. a	
artemidorus	250 c	Bacca lauri	44 d	Blitoma	ibi. a	Boæca	86 d	ibi.	
artheredones	106 b	Bacacum	119 c	boæca	ibi.	bolbiton	121 b	243 a	
Aruina	102 c	bacchar	170 b. 5 d	boletus	243 a	bolica	ibi.	116 d	
Asarum	5 d. 6 a b	baccharis	170 b c	Borrage	236 c d	Bosmorus	112 b	198 b	
asarum	142 c	bacteria	47 c	Botis	116 d	botrys	198 b	78 d	
Ascion chalcon	311 a	Badrya	70 d	brabyla	78 d	Brassica	122 a b c d	122 a b c d	
asclepias	189 c	Baius	61 d	brassica genera	122 a b c d	brassica sylvestris	123 a	120. h	
ascyroides	211 c	Balanus myrepisca	269	brassica marina	120. h	Bredon	93 c	138 b	
ascyrum	160 b c	c. item folio	270 a	Bregma	138 b	bretanica	213 b	48 c	
Assius lapis	332 c d	balani fardinianæ	60 b	Bria	48 c	Bromus	112 a. 260 d. 261 a	32 b	
Asphalatus	12 c	balani	61 d	Bruchus	32 b	bruscandula	124 d	39 b	
asphaltus	40 c	balis	266 c	brutia	39 b	Brenthia	130 b	45 d. 59 e	
asphaltites	ibi.	balithum	ibi.	bryon	45 d. 59 e	bryon marinum	247 b	282 d. 283 a b c d	
asphodelus	143 a b	balauftium	63 b	bryonia	282 d. 283 a b c d	Bubleton	121 b	255 a b	
asparagus	124 b c d	balauftia	ibi.	Buceras	255 a b	bubonios	114 d	203 a	
asperugo	271 c	ballore	193 c d	buchreides	203 a				
aspidum genera	81 d. 357 c	balsamodes	107 c						
aspidis ictus	357 b	balsamum	11 b d						
Cura eius	361 c	balsami genera	160 d						
asphenium	205 c d. 2 a b	balsamina	273 c						
aspris	59 c	balthus	162 b						
Assula	11 a	Banchus piscis	88 c						
Astacia	72 a	Baptifecula	201 d						
Astaphus	267 c d	Barathon	42 d						
astaphylinum	174 b	barbula hirci	132 d. & 133 a						
asterius	95 b	barba louis	229 c						
aster	255 b	barbaria	46 a						
astorgion	95 b	barbari	ibi.						
astragalus	93 b. 212 a	bardones	93 d						
Attacos	92 a	barython	42 d						
attaga	103 d	Basiliscus	83 a						
atragenus	ibi.	basilisci morsus	357 c d						
athea	121 c	Cura eius	361 d						
attega	133 c	Batis	126 d. 44 c						
attelabis	92 b	batos	223 b c						
Athera	111 c d	batos Idæa	17 c						
ateramnon	116 c	batrachos	85 d						
ateramna	ibi.	batrachos halica	86 a						
atinia	46 b	Bechion	197 a						
Atractylis	190 a b	bechionis genera	ibi.						
atramentum sutorium	311 c	Belenionum	46 a						
item folio	312 a	Bentelis	116 c						
Et differentia eius	ibi.								
atramentum metallicum	323 a								

I N		D		E X	
Bbuccina	78 c	canchryæ	110 a	caros syluestre	105 d
Buffo	86 a	canchry	181 d. 182 a	Carpasium	162 d
Buglossa, os.	256 a b	Candidum oui	91 c	carpasi succus	346 c
bulbina	143 d	candaulos	111 c	carpesium	162 d
bulbus uomitorius	143 b.	candylos	ibi.	carpæ	58 d
	269 c 270 d	Canicæ	108 c	Carpinum	18 c
bulbus cibarius	143 c	canis ponticus	85 b	carpatinæ	217 d
bulborum genera eo, d.	144 a	canis marinus	ibi.	carpisculus	ibi.
Bumelia	45 b	carnis rabiosi signa	353 c d.	carpophyllos	165 a
Bunias	119 a	item folio	354 a	carphos	114 d
busi	329 a	Contra canis rabiosi morsum re-		carpum	ibi.
bunion 120 d. 121 a.	255 a b	media	354 b c	Carthamus	29 d
Buprestis	94 c. 343 c	Cura uictus idem in morfu canis		Carubum	78 d
buphthalmus	207 b c	rabiosi	355 a b	carubulum	ibi.
Butomus	207 c	canirubus	51 a	carus, um.	178 a
butyrum	98 d. 99 a	Canna	47 c	Caryon	72 b c
Byrsodepsicon	325 a	cannabis syluestris	210 a	caryophyllos	138 c. 170 c
byssos	108 d. 209 a	cannabis fatiua	eo. b	caryoridum genera	61 d
		cannabus	ibi.	Caseus	98 b
		Cantharus	94 c	caseorum genera	eo. c
		cantharides eo. b c.	342 d	caseorum differentia	eo. d
		item folio	343 a b	Cassia	7 b. 8 b. 48 b
		cantharidum genera	ibi.	castia fistula	8 b
		cantharis	108 a	castia cathartice	ibi.
		cantherij equi	89 b	castia myrrha	ibi.
		canthelij	ibi.	castia filiqua	ibi. c
		canthelci	ibi. c	castia lignea	ibi.
		canthonæ	ibi. c	castia genera	277 d
		Caper	90 b	Castanea	59 a. 60 a b
		capis	44 b	castanearum genera	eo. b
		capnos	250 b c. 92 d	castor	14 c. 85 a b
		Capra	90 b	castoreum	85 c
		caprificatio	75 c	Catacharce	358 a
		caprificus	85 c. 221 d	catacecaumene	394 a
		Capparis	144 d. 145 a b	cattyma	90 c
		& eius genera	ibi.	Caucalis	14 a. 131 c
		capparocolæ	79 b	caulias	184 d
		Cara	176 a	Cedraclion	43 d
		Carbasa	217 d	cedria	39 b. 43 b d
		Carbasinus color	217 d	cedrus	41 a
		carbatinæ	ibi.	cedri genera	ibi.
		Carcinos	80 c	cedrelate	ibi. & d
		Carchesium poculum	37 c	cedris	eo. b
		Cardamon	9 a	cedromelon	68 b
		cardamomum	3 c d	cedrula	ibi.
		cardamomi genera	eo. d	cedrium	eo. d
		cardia	4 d	cedrea	ibi.
		carduus	155 d. 117 b 158 a	cedrites	ibi.
		Carea	92 b	cedrinus liquor	ibi.
		Carides	239 d	Celester	51 d
		caries lignorum	46 c	celtica spica	5 b
		carion myristicon	46 a	celtis	69 c
		Carmininus colo	217 d	Cenchridae	113 a
		carmes	ibi.	cenchri morsus	357 a
		Caro	10 c. 176 a	Cura eius	361 b
		caron	ibi.	centaurium magnum	254 a b

¶ Litera C

Cacabis	103 d
Cacabos	ibi.
cacalia	14 a 254 d. 255 a
Cadmia	107 d. 308 a b c d
cachrys	46 b. 60 d
cadmia colores	308 b
caddiscus	257 b
cactos	241 d
Calais	336 c
calainus color	ibi.
calamintha	166 a b
calamites	86 a b
calamochnus	331 a b
calamus odoratus	10 c d
calamus	47 b
calamus Indicus	332 b
calcifraga	181 d
calistephanos	58 d
callitea	58 b
callichthys	103 c
callimus	336 c
calx	330 b. 338 d 330 a
Camatias	108 a
cammata	44 b
cammatida	ibi.
caminari	87 c
Campa	94 a
campæ	ibi. 78 a
campanæ	40 a
camphora	21 c
camptauli	47 d
Cancanus	14 a
cancanum	13 d
cancer	80 d

I		N	D	E	X
Centaurium minus	254 d	Chamae Platani	45 a	chymistarum uanitas	320 c
item folio.	255 a	chamēga	19 d 277 c d.	chymia scriptores	325 d
ccentaurea	254 a b	item folio	278 a b	Chytlon	16 d
centipedes	81 b	chamaeleon albus	155 b	Ciboris	87 c
Centuculus	299 a, 215 b	chamaeleon niger	eo. d, 156 a	ciborium	216 d
Cepa	254 d, 135 b	chamaecerasi	65 a	Cinnamomis	9 c
ceparum genera	135 b	chamerhaphanus	119 d	cinnamomum	8 c
cepra	210 c d	chamaedrys	191 c	cinnamomi genera	eo. d, 9 b
cephalo	61 d	chamaeleuco	197 a, 255 c	cinnamomū mosylicū	s d, 9 a
Cera	207 a	chamaezeleo	225 d	cinnabaris	319 b c
ceræ confectio	eo. b	chamaeryphes	241 d	cinera	157 a
cerana	70 c	chamaecillus	255 c	Cimbalaris	245 c
ceranthemos	193 b	chamaedaphne	263 d,	Cimices lectularij, & planta-	
ceras	93 d	item folio	264 a	rum	88 b
cerasbolon	116 c	chamaemalum	206 d	Cimolia	338 d, 339 a
cerastes	75 b	chamaelyce	276 c	cinerula	310 a
ceratophyllax	218 c	chamaezolon	62 b	Cinis foci	330 c
cerastemorus	257 b	chamaepyris	212 b	cinis fermentitius	ibi.
Cura eius	267 c	Characias	273 b c, 275 a b	cinaura	102 b
cerasia	64 d, 65 a	charadranos	227 b	Cicadae	92 a
cerasus	ibi.	charites	41 d	cicer	115 b c
cerasorum genera	ibi.	charma	193 a	ciceris genera	eo. c
cerasa amarasia	ibi.	charmi	217 d	cicercula, um.	ibi. 321 a
ceracia	eo. b c	Cheiri	254 b	Cices	62 b
ceratonia	eo. b c	chelidonia	148 d	cici	272 c d
Cercis	210 a	chelidonia minor	149 a	cica	ibi.
Cerea	5 d	chelidonium lapis	93 b	cicatrix	14 a
cerēia	60 b	chelones pisces	88 c	cicuta	246 a b, 240 d 141 a b
cerebellum gallinaceum	90 d	chelonia	140 c	cicutæ genera	241 b
cereum	107 c	chenes	102 d	cicum	63 b
Ceribia	108 c	chenoboscion	ibi.	cicures	ibi.
cerinthe	193 c	chelidonia phragmites	250 b	cicuri	ibi.
cerinthus	eo. b c	chenopus	170 a	cicerbita	127 b c
Ceroma	17 d	Cichria	109 b	cichorium	128 b
ceromata	21 c	chidros	ibi.	citreoli	129 d
ceronia	65 b	chironias	55 a	cicutaria	198 c d
Ceruleus lapis	228 b c d	Chole	103 c	Cion	272 c d, 78 d
cerulei genera	eo. b c	chondros	112 a c d	cionion	78 d
cernas	93 c	choridiola	320 c	Ciphilion	241 d
ceruiocellus	179 d	chorus Aphrodisias	2 a	Circæa	190 c d
cerusa	248 c d	choroni	64 b	Cirri	285 b
cerussa	216 c d, 217 a	Chrima	21 c	Cis	172 d, 316 b c
Ceryx	78 c	Chrisma	ibi.	Cistus	52 a b
Celyphum	52 d	Chroma	26 d	cistos	eo. d
cestrum	213 b	chromasus color	ibi.	cistaros	ibi.
Chalaxia	254 d	chryfocollæ genera	317 d	cissus, os.	ibi. & d, 148 c
chalcān	207 c	Chryfocolla	150 b c, 312 d 95 d	cissanthemon	140 c
chalcis	96 b	item folio	317 b	cissophyllon	ibi.
chalcidica	ibi.	chryfobalanus	61 c	cisseris	216 b
chalcantios	312 a, 311 a	chryfocorallium	79 d	cissybon	148 c
chalcanthum	ibi.	chryfocome	239 c d	Citron	7 c
chalcanthum uiride	223 c	Chrysanthemom	230 c d	citrus	67 d
chalceitis	222 b, 225 b	chryfogonon	229 d, 230 a	citromela	ibi.
chalceus piscis	227 d	chryfomela	66 c	citrinum pomum	ibi.
Chamae	29 c d	Chydræ	64 b	citrea mala	eo. c d
chamarum genera	ibi.	Chymistæ	320 b	citrago	194 a

I		N		D		E		X	
Citynus	63 b			colybista	ibi.	corydalis	92 d		
citynum	ibi.			Comaros	71 a	corydylis	ibi.		
Cleonia	15 c			comaron	ibi.	corymbia	183 a		
Clinopodium	190 d			Comites	47 b	corymbus	ibi.		
Clematis	214 d. 215 a. 282 a			comaris	335 d	corythalion	17 d		
clematis altera	215 a b			Conchis	116 c	Cosmofandalos	64 b.		
Clymenos	216 d. 217 a			conchylum	79 d	item folio	232 c		
Cnacon	286			Condylas	eo. d	Costus	9 d		
Cnicus	19 d. 285 a. 286 b			condrilla	118 c d	costus trifarius	ibi.		
cnipes	46 c			Congros	57 c	costi tria genera	10 a		
cneros	277 d.			Conia	276 a.	Cottabis	34 b		
cnestron	ibi.			conialis	330 c	cottabus	ibi.		
Coagulum	100 b c			coniatae chrissae	319 d	cottabica	ibi.		
Cocalia	80 c			conis	20 c	Cothon	115 b		
Coccalus	86 b			conifalou	17 d	Cotinos	57 b. 58 a		
coccalus	157 d			conisterium	ibi.	cotonea	66 b		
cochleae	80 b c			Conos	36 b	Cotes	317 b		
cochleis	eo. c			conum	33 d. 39 c	cotula	ibi.		
cochlax	ibi.			connarus	50 c	cotula	207 a. 215 d		
cochlia	ibi.			consecratrix	1 a c d	Cotyledon	245 c		
cochlearum genera	ibi.			confligo	111 b	Courmi	110 a		
cochleare	142 a			conspersio	102 b	Crada	75 b		
coccinea uestis	218 a			conuoluolus	215 b	Crambe	111 b. 113 a		
coccomelea	70 c			Conyza magna	100 a	crambalea	122 b		
coccomelos	ibi.			conyza parua	eo. b	crambus	287 a		
coccus	275 c			conyza tertia	ibi.	Cranius	70 a		
coccus	217 b c			Coptica fidelia	53 d	Cratægonum	202 c		
Codia	225 b			Corallium	311 d. 332 a.	cratægos	ibi.		
Codymalon	66 b c			item folio	147 c	cratægona	ibi.		
Coele	10 b			corallius	ibi.	Creocaccabos	104 a		
Coggiqrya	70 c			coralis	ibi.	Crepis	169 b		
Coicina	227 d			corali fastigia duo	331 b	crepula	ibi.		
coix	ibi.			Corchorus	147 c	Cremes	251 a		
Colchicon	243 c d			Cordylon	175 c	Cretura	14 a		
colocynthis	28 c d			cordumeni	3 d	Cremor lactis	103 c		
collection	58 c			Corianum	177 a b	Cribana.	97 c		
Colocasia	116 d			coriandrum	ibi.	crithanias	108 d		
Colorum ratio duplex	318 d			corion	ibi.	Crina	209 c		
color melinus	339 b c			coris	211 d.	Crimnon	24 c		
color paretanius	eo. c			Corma	212 a	Crinonia	110 d. 111 a		
colores floridi	218 a			Cornea	64 c	Crifion	191 a		
colores austeri	ibi.			cornocerasium	65 a	Crithmum	253 b		
color sanguineus	319			cornus	70 a	crispina	116 c d		
colostræ	97 c			cornus indica	ibi.	Crocum	50 d		
colostrati	ibi.			cornopæ	92 b	Croci genera	14 c d		
colostratus mons	ibi.			cornu ceruinum	93 c. 94 a	crocorula	eo. d		
colostrum, a.	ibi.			Coroneola	54 b	crocus farracenus	170 c		
colossinus	140 c d			coronarum genera	64 b	crocomagma	286 a		
Columbarum genera	104 d			corona	eo. c	crocodilos	15 b c		
columbaris	231 b			corolla	ibi.	crocodilea	156 b. 96 c		
colluthra	116 a			Coroneola	51 a	crocodilina	105 a		
colymbades oliuæ	58 a b			coronopus	117 a b.	crocodilitis	ibi.		
columbarium	78 d			corruda	124 d	Crotones	18 d		
columnarium	ibi.			Corfion	251 d. 252 a	croton	57 c		
colythra	75 a			Cortex thuris	32 d	Crymodes	111 a		
Colybus	115 d			Corylus	73 a	Crucialis herba	189 c		

I		N		D		E		X	
Crucialis herba	189 c	Damalis	102 d	Droxanus	188 c				
Cyaneus	318	Damalioni	ibi.	Druini morsus	356 d				
Cyanios	116 b	Daphnitis	7 b c. 8 a	Cura eius	360 d				
Cyanus	201 d. 318 d	daphnois	7 c	Drunculi	241				
Cydomalon	66 c	Daphnides	44 d	Druppa	16 d. 20 c				
Cyclaminus	140 a b c	daphnoides	ibi.	Dryos	58 d				
cyclaminus altera	eo. c d	daphnocoeci	ibi.	dryopetes	86 a				
item folio	141 a	Darcas	7 c	dryopteris	185 c d				
Cyllastis	108 c	Dasipodion	83 d	Duracina	90 d				
Cyma	122 c	Daucus, um.	131 c d. 174 b	¶ Litera E.					
cymbium	148 c	c d. item folio	180 c	E Benus	53 b c				
Cynocrambe	242 c. 286 c	Daucorum genera plura	ibi. c	Ebeni	58 c				
cynoctonos	ibi.	item folio	180 d	Ebur	91 b. Ebulus	279 b c			
Cynopa	120 d	Delphax	89 b	Ecdion	85 d				
Cynomaron	156 a	delphinum	180 b	Echis	81 d				
cynomoros	242 c	delphinum alterum	181 a	echidnae	ibi.				
cynomorphos	14 c	Demos	102 b	echios	220 d. 221 a b				
cynorhodos	51 d	Dendroides	274 b	echios genera	221 a b				
cynorhoda	54 b	dendrolibanus	33 d	Echinus marinus	77 b				
cynomya	272 d	dens caninus	90 c	echinorum genera	ibi.				
Cynoglossos	156 d	Derceumchios	83 d	echinometrae	ibi.				
Cynobates	256 d	Detis	135 d	echneis	ibi.				
Cyparissias	274 a	Dialptarion	51 d	Elaphoboscus	179 d				
Cyperus	10 b	Diacheron	12 d	elaphon	93 c				
Cyperus indica	ibi. b	dialeucon	15 a	clanz	60 a				
Cyperis	ibi.	diaphanes	310 b	clata palma	22 c				
cyperida	ibi.	diaporphylon	13 a	claterium	226 d. 227 a b				
Cypirus	2 d. 3 a c	diaxyton	12 c d. 13 a	clatine	224 d. 225 a				
cyphi	14 b c	dictamus	164 a b c d	Electrum	46 d				
cypsella	17 d	dictamus Cretica	ibi.	Electri genera	ibi.				
cyprus	51 c	diglaucion	187 d	elegia	47 c				
Cyribia	108 c	Didalis	110 a	Eleomel	16 a b				
Cystoolithos	336 d	Diphryges	523 c d	Eleos	57 d				
Cytinos	52 c	Diosbalanos	72 d	eleoselinum	178 c				
cytisus, um.	271 b	diospyros	208 b. 64 d	eleothrepton	ibi.				
Cubebae	262 d. Cuci	Diplas	81 d	elclisphacus	165 b				
Cucurbita	129 a b	dipsacum	156 b c d. 12 d	Elleborum album	264 b c d				
Cucumer satiuus	eo. c d. 167 b	dipsadis morsus	357 c	elleborum nigrum	ibi. & 165 a b				
cucumer sylvestre	366 c	Cura eius	360 d	eleogaron	87 d				
Cucurbitula	380 c d	Discus Solis	520 b	Elephas	93 c				
cucumis	ibi. c	Dolichus	117 d. 162 a	elephantus	ibi.				
Culmus	108 a	domiporta	80 d	Elymaus	31 d				
Cuminum sativum	176 b c	dorcis	13 b	elymaei	ibi.				
cuminum sylvestre	eo. c d	dorcidium	ibi.	elydrioi	286 a				
Cuneculus	83 d	dorx	93 d	Embasis	47 d				
cunila	167 b c	dorcas	ibi.	Embrion	46 c				
cunila gallinacea	167 a	doryon	238 a	empetron	281 d				
item folio	167 b c	dorycnion	ibi. & b. 344	Encardios	61 d				
cunila genera	200 b c d	& sequenti.	97 a	Encephalos	eo. d				
item folio	201 a b	dossuariz pelles	137 b	enorchos	ibi.				
Cunilaginis genera	200 a	draba	81 a	Enula campana	15 c				
Cupressus	41 b c d	Draco marinus	141 a b c d	enoplion	47 d				
Curallium	332 a	dracuuculus	eo. c d	enthæmon	58 c				
D	¶ Litera D.	dracunculus parvus	142 a	Epalelima	21 c				
		item folio	142 a	epargos	38 c				
Dama	93 c	Dropax	136 c	Epatica	229 b				
Damale	102 d								

I	N	D	E	X
Epecla	44. b	F Litera F	Foeniculum	180 a b
ephemerum	244 a b. 344 b	Olium sylvestre	Foeniculum erraticum	ibi.
ephemerum duplex	243 c d	Flos achaicus	Ferula	182 d 183 a
Ephialtion	208 a	Flos syriacus	Ferulae genera	183 a
Ephthon	322 a	Flomus	Ferulago	ibi.
Epidormismata	44 b	Fuligo	Furfugium	197 a
epidiphnides	ibi.	fumus	farfaria	ibi.
Epimelis	69 b	fuliginis compositio	flammea	201 a
epimelôn	71 b	fusternæ	flammearij	ibi.
epimelida	ibi.	fuligo Resinæ	fungi	242 d 243 a b
epimedium	218 d	fuligo picis liquidæ	fungorum genera	ibi.
epimetron	169 d. 170 a	fraxinus	fucus marinus	247 c d
epipactis	250 a	fraxini genera	fuci genera	ibi.
epispastron orchomenium	48 a	fraxinula	fumaria	250 b c
epipetron	169 d. 170 a	fraxinago	fidicula	259 c
epithymbrum	167 b	februa	Filix	283 d 284 a b
epithymbiton	92 d	fagus	Filicones	284 a
epithymum	98 c. 166 d	fragi duo genera	Filix foemina	60 c d
item folio	281 a b	fagus Scissima	Filicula	285 a b
epityum	58 b	ficus Aegyptia	fuligo pictoria	339 d 340 a
Equisetum	226 d. 227 a	faba græca	fungi	343 d 340 a b
equisetum alterum	227 b	faba Syriaca	ferrum	313 b
eranthemon	206 d	fraga montana	flos æris	310 d 311 a
eretria terra	333 b c	ficus Cypria	flos salis	328 b
Erefios	57 d	Ficus	Fex uini	329 c d
Ergasima myrrha	29 d	Ficorum genera	Fex acet	ibi. d
Erica	49 a	ficorum nomina	Fecula	ibi. d
ericeum mel	ibi.	Frugilega	Flos gypsi	330 b
erinaceus terrestres	77 c	Fiber		
erinos	221 d	fibrini testes		
eritimus	327 d	felis		
erithinus	ibi.	Fulica		
erigeron	246 d. 247 a	Ficedula		
eruca	131 d. 94 a	Fel		
eruca pinorum	343 b	Fimus		
Eruilia	118 a	fimi differentia		
eruum	117 d. 118 a	Fruentum		
Erisisceptron	12 c	Frit		
erythacus	44 c	Fertini		
erythros	61 b	farinæ nomina		
erysimon	137 b c d	furfures		
eryngion	159 d. 160 a	farris quatuor discrimina		
eryngiatum	ibi.	fabula		
erythrodanum	208 d	fabulus albus		
Escharulæ	106 d	farrago		
Eufragia	218 a	farraginaria		
eupatorium	225 a	foenugrecum		
euphorbium	186 b c	foenigræci farina		
euphorbia	ibi.	faba		
eumphalos	53 d	fabulum		
eupteros	259 d	fabalica		
exhalme	60 d	fabago		
exalipites	21 c	faba ægyptia		
exalburnare	102 c	Fremium		
exalburnatum robur	ibi.	Fel terræ.		
Excantare	132 b	item folio		

I		N	D	E	X
Manna thuris	34 a b	Memecylon	ibi. & d	Marciatum unguentum	ibi.
Manna	ibi.	Moracia	72 c	Marci pastilli	ibi.
Maza	34 c	moracillae	ibi.	Mydas	108 a 118 c
Mastiche	36 d. 37 a. 44 b	mollusca	ibi.	Mola salsa	109 b
mastiche, Silphium	ibi.	morus	73 a b	Maza	eo. d 110 a
mastichis duo genera	ibi.	maratha	eo. b	milium	112 d 117 a
maltha	41 b	moreos	eo. c	miliarium uas	112 a
mustax	44 a	morofycos	ibi. d	miliaridae aues	ibi.
mustacea	44 a	metrae	77 b	mel frugum	ibi.
mattiyae	ibi. b	myaces	79 a	malua	121 b c
magides	ibi.	myes	ibi.	metachæron	126 d
male	ibi.	Myiscæ	ibi.	medica	133 d
magis	ibi.	musce	ibi.	molyra	137 d
Milea	45 b	musculus	ibi.	malum terræ	140 b
Melea	ibi.	mytilus	ibi. & b	myfota, tis	140 d. & seq.
milon, Taxus	ibi.	myxa	80 c	Murtiolum	157 c
macer	45 d. 46 a	marafi	81 d	Murtius campus	ibi.
magadis tibia	47 d	marfi angues	ibi.	Murtea Venus	ibi.
Myrica	48 c	mulus piscis	84 b. mullus.	myrtus	ibi.
mices	57 d	mustella	85 c d	murtus	ibi.
moria	eo. d	mutili	86 a	myrtella	ibi.
Melandryon	50 d	maris	eo. c	melitis	162 a
myrobalanus	61 c	maruda	ibi.	mentha	165 c d
malum punicum	62 c d	maenæ	ibi.	mintha	eo. c
malorum punicos: genera	ibi. d	melandrys	87 b	menthastrum	eo. d. 166 a
Malicorium	61 c	muria	eo. d	melilotos	169 b
myrtus, a.	ibi.	muries	ibi.	marum	eo. b c. maru ibi. c
murta	ibi.	millepeda	88 c d	magnesia	eo. c
murtatum	ibi.	matalis	89 b	Moly	171 d. 172 a
murtatulum	ibi.	Mæfones	92 a	Molon	eo.
myrtatum opsonium	ibi.	Mæfonia	ibi.	melanthium	183 d. 184 a
Myrsine	ibi.	mæfon	ibi.	melanthemon	184 a
Myrti genera	ibi.	rhastacæ	92 b	melandryum	ibi.
myrta coniugalis	ibi.	moluris	eo. b	magydaris	165 a b c
myrtæ	ibi.	malleolus	93 b	malperon	185 b
melilotini	64 b	mulus	eo. d	Myxa	188 d. Myxaria ibi.
myrtidanum	eo. c d	myrmecion	95 b	marrubium nigrum	193 c d
myrtida	ibi.	muscarius	ibi. c	marrubium	194 b c
Malus, um.	65 d. 66 a b	mus araneus	ibi. & 96 d	marrubium duplex	ibi. c
Mala urena	ibi.	mygale	96 d. 97 a	mithridation	196 c
malorum genera	ibi. 66 a b	Mus	97 a	malanthemon	206 d
melea	66 a	marmotæ	ibi.	Muralium	207 a
musca	eo. c d	molce	100 c	Matricaria	eo. b
mala dulcia	eo. d	melandryon	102 c	malua	209 d
Melimela	ibi.	moschos	eo. d. 103 a	maluæ genera	ibi.
Mala orbiculata	ibi. 67 a	moscheuma	ibi.	medion	218 c d
mala syluestria	ibi. a	medulla	eo. d. 103 a	mathieronion	219 a
mala persica	eo. b	Myma	104 a	machieron pastilli	ibi. & b
mala præcoccia	eo. c	Mel	105 d. 106 a b	machieron	ibi. b
malum Medicum	eo. c d	mel Sardoum	eo. c	millifolia	223 b
malum Hespericum	ibi. d	mel Ponticum	ibi.	mercurialis	224 b c d
Mespilus, um.	69 a	mel Hereacleoticum	ibi.	mamiras	226 d
Mespilorum genera	ibi.	mel Manicum	106 c	Melanranis	228 d
mespilum trigranum	eo. b	mel Menomenon	ibi.	Meconium	234 b
myxa	70 d	Mazapanis	106 c	Mandragora	238 a b c d
madrya	ibi.	Marcipanis	ibi.	item folio	239 a b c

B ij

I		N		D		E		X	
* Limax	90 c	Lactuca	130 a b c	Laurus Alexandrina	269 a b				
Lepus marinus	83 b	Lactucæ genera	eo. b	Licium	270 c				
Lepus terrestris	ibi. c	Lactuca sylvestris	eo. c d	Lappago	271 c d				
Leporum genus triplex	ibi. d	& eius genera	ibi.	lactuca	274 c				
Lolligo	84 a	lanaria herba	139 c d	lactaria	eo. b c				
lolliguncula	ibi.	lepidium	145 b	lactariæ genera	eo. d				
lutra	85 a	lepidij genera	ibi.	lathyrus	275 c d				
lytra	ibi.	lutea	150 b c	labrusca	282 a b				
liquimarij	87 c	lepton	155 a	linozostis	286 b				
lupus piscis	ibi.	labrum Veneris	156 b c	lora	288 a				
liquor sociorum	ibi.	luma	eo. d	lapidum aliquot uires	337 c d.				
Lagonoponos	89 b	lumeſta	ibi.	item folio	338 a				
Lactes	ibi.	Lumariæ falces	ibi.	lapis Samius	338 c				
larinæ	larini eo. b	Leucacantha	159 b	lac coagulatum	348 d				
lerini	ibi.	ligusticum	173 c d	lepus marinus	350 b				
lebias	89 c	libanotidis genera	182 a b	Lutea	317 b c				
lichenes equorum	90 a	laser	184 b d, 185 a	lomentum	318 c				
lyſſon	eo c	laserpitium	ibi.	Lutum Venetum	321 a				
locustæ	92 a b	leucoporon	188 a	libri repumicati	326 b				
Loba	92 b	leucophæon	ibi.	latos piscis	328 a				
Lacerta uenenaria	94 d	Lithocolla	ibi.	lixium muſtum	330 a				
Lupus araneus	95 c	Lappa	189 b	lapis Iudaicus	335 c				
lacerta, um.	95 d, 96 a	leontopedalon	191 a	lapides ſpongiarum	336 d				
lumbrici	96 c	leucas	191 d, 192 a	lathocolla	ibi.				
lactis uſus	97 b	leucæ genera	192 a						
lactarium opus	eo. c	lychnis	eo. a b	¶ Litera M.					
lac muliebre	98 a b	lucernula	ibi. b	Martia radix. Iris	341 a				
lanarum medicina	99 b	lychnis ſylueſtris	eo. c d	Meon. Meu.	342 c d				
lanæ ſuccidæ	ibi. c	Lilium	192 d, 193 a b	Meu duo genera	343 eo. d				
lanæ uſtæ	ibi.	Lilij genera	193 b	Melligera	344 c d				
Lana, Erion	ibi. c	lomentum	198 d, 199 a	Malabathrum	346 d				
Lanarum discrimina	99 c	lilium ſylueſtre	201 b c	Malabathri genera	347 a				
lipos	102 b	liguſtrum candidum	201 d	Mottodes	347 c				
laridum	eo. c	lutearum genera	202 a	moſelytis blaſtos	348 a				
lorium	105 c	lithoſperma	208 b	myrrha caſſia	348 b				
Lyncurium	ibi.	Lonchitis	209 a b	muſcus	349 a b				
Lynx	ibi.	Lonchitis altera	210 eo. b	moſchus odoratus	349 ibi.				
libum	109 b, 114 c	Lyſimachia	213 d	muſcilion	350 b				
lutum Vulcani	109 c	limonium	218 a b	magma	350 c				
lepyria	111 a	lagopus	218 b c	medica	351 c				
leſſus	113 a	lagopyros	eo. c	Manna	352 a c				
lolium	eo. c d	lycopſis	220 d	Melligo	352 c				
linum	115 a	Lichen	229 a b	Meropium	353 a				
Lecithos	115 d, 116 a	Lycoſtonos	240 c	Melanthemon	354 a				
Lecithopolæ mulieres	116 a	lens paluſtris	244 b c	moſchata	354 c				
legumẽ omne tribus modis man- ditur.	ibi.	laſtoris	248 a	moſchomyra	354 ibi.				
lenticula	ibi. 117 b	lychnitis	250 d	moſcholea	355 ibi.				
Lens	117 b c	lorus urbana	ibi.	myra	355 d, 356 b				
Lupinus	118 a b	Lorophagi	250 d, 251 a	myracopa	356 ibi.				
Lapathum	120 a b	lorus ſylueſtris	251 a	myrrha	356 d, 357 b				
lampſana	eo. d	lorus Aegyptia	251 c d, 252 a	myrrha troglodytica	357 ibi.				
lupulus	124 d	lorometra	252 eo. d	Myrrha Caucaſis	357 ibi.				
lupus ſaliſtarius	ibi.	Leontopodion	257 a b	Myrrhæ genera	358 b				
lupus reptitius	ibi.	Lappa minor	259 d	Myrrhæ probatio	358 c				
Lauer	125 d, 126 a	lapparum genera	250 a	Myrrha Bœotica	359 b				

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London
1783/D/1

I	N	D	E	X	
Gonos Thalassios	97 c	Gramen Cilicium	ibi. c	Hippomani testes	84 c d
Gallaria piscis	98 c	granum tinctorium	217 c	Hyrca	57 b
Genitale Cerui	99 d	Galiopsis	246 b c	Hysca	ibi.
Gallina	90 d	galion	eo. c d	Hyn	ibi.
Gigleria	91 a	glauz	261 a b	Hyccara	ibi.
Gallinarum tria genera	ibi.	genista	269 a b	hyena	eo. c
Gallinaria	ibi.	Glans unguentaria	269 d	halme	87 d
Galerita	92 d	item folio	270 a	halos achne	ibi.
Ginni	93 d	geodes	337 c d	hepar	89 a
Gygenij	ib.	gypsum	349 b	hepatus	ibi.
Gaphagæ	96 c	item folio	350 a b	hippomanes	90 a
Grassos	102 b	Gypsi genera	ibi.	hippi	91 a
Grasson	ibi.	galena	315 a b	herodius	92 c
grassonia	ibi.	gastra	317 a	hirundo	93 a
grason	ibi. 108 a	garus	327 d	hirundinum genera	ibi.
gerania	109 d	gorgonia	332 a	Hinnus	95 d
grastis	111 b	gagates	334 a	Hinnulus	ibi.
gossampinus	115 b	gagis	ibi.	Holcos araneus	95 d
gossipion	ibi.	Galactites lapis	eo. d	Hippace	98 d
Githon	ibi.	item folio	335 a	Hippace	ibi.
gry	116 c	Galaxia	334 d	Hordæ	102 c
Gongylæ, lis.	118 d	Galaicos	335 a	hordicalia festa	ibi.
Gingidium	120 d. 131 a	¶ Litera H		hellops	103 c
gethyum	134 c	Hierida, Iris.	1 b	hypotrimna	104 a
gingiber	138 d	Hirculus	4 c. 5 a	hyposphagma	ibi.
glastum	150 b	Helis	10 b	hordeum	109 c
Glastum sylvestre	eo. c d	Hieracunta	21 d	hordei genera	ibi. d
Gentiana	152 b	Haormia	13 c	halica	112 c
glycyrhiza	153 c d	Heliakon	14 b	halix	ibi.
glycis ancon	162 a	Helenius	15 c. 8	helymos	113 a
gordylon	175 c	Hydrleon	16 d	Hium	116 c
gith	183 d. 184 a	Halmon, oleū.	19 a	Halisparton	105 c
Gitago	184 a	Hygromyza	21 c	Hippolapathum	110 c
galbanum	186 c d	Hydrorofata	22 a	humulus	124 d
galbeum	ibi. d	Hemisomata	34 c	hydropiper	139 a
glaucium	187 d	Herba	43 a	hastula regia	142 d
Glutinum	188 a	Harundo	47 a b	item folio	143 a
Gluten	ibi.	Harundinum genera	ibi. 48 a	Hedera	147 d. 148 b c
glutinum genera	ibi.	harūdo obliqua	eo. c	Hedera genera	ibi.
gluten atticum	eo. a	Hieratica	48 c	Hyslopous, um	162 b
gluten piscium	ibi.	halimus	49 d. 50 a	Hedyosmos	165 c
geranion	198 b	halimi genera	50 a	harmela	171 d
geranion alterum	eo. c	Hemicyprus	51 c	hieracia	177 b c d
gruina	198 c	hypocistis	52 b	hieracia parua	ibi. c d
gnaphalion	eo. d. 199 a	hebenus	53 b	Hippofelinum	179 a
gnapheus	198 d	hebeni genera	ibi. c	Hippomarathrum	180 b c
gnaphos	ibi.	Halmades oliuæ	58 a b	Hippophanes	198 d
gnaphalus	ibi.	hala	ibi.	hemerocallis	201 c
gnaphalides	199 a	hemeris	eo. d	horminum	204 a b
glycyfis	208 a	haliphlocos	59 c	hedyfaron	eo. a b
gladiola	219 a b	hypothymis	64 b	hemionion	205 d 206 a
gladiolus	ibi. b	hypomelides	71 b	hemionitis	ibi.
gramen	221 d. 222 a	homomelis	eo. b	heluron	207 c
graminis genera	ibi.	hegeteria	74 c	Helurios	ibi.
gramen harundinaceum	eo. b	Halicacabus	76 d	Hypericum	211 b
Gramen Parnasi	ibi. b c	Hippocampus.	78 a	Holosticon	216 b

I	N	D	E	X	
Mala insana	239 a b	Nardi species nouem	4 b	Nitrum	328 c d
Myctonos	239 d	Nardus Syriaca duplex	eo. c	Nittaria	eo. d
mycophonos	ibi.	Nardus Indica	ibi.	¶ Litera	O.
margyllios	241 d	nardus Celtica	4 d. 5 a	O Zis	7 c
margarides	ibi.	nardum montanum	5 b	O Oxyfchaenos	10 b
millefolium	252 b	niris	5 b	Olofchaenos	ibi.
myriophyllon	ibi.	nardum syluestre	eo. d	Opobalfamum	11 c
myrrhis	eo. c	nardum rusticum	ibi. 170 b	Orestium	15 c. 16 a
myla	eo. c	nardum syluestre	6 c	Opinais	16 c
Myagros	eo. d	nardum Creticum	ibi.	Oleum omphacinum	ibi. & d
Melampyros	ibi.	Net	13 b	& fit duobus modis	eo. d 17 a
myrtus sylueftris	262 c d	Narcaphthum	13 d	Omotribes	16 d
myrobalanos	269 d	nectarion	15 c	omphacium	ibi.
mollugo	271 c	nenuphar	16 c	omphax	ibi. 17 a
myrsinite	273 d	nigella	20 a	omphaciomet	ibi.
meconium	276 a	nux Indica	21 c	oleum Druppæ	ibi. &
Mercurialis	286 b	nucis pineæ	36 b	proba eius	ibi.
Mulsium	295 a b	nucum pinearum, 4. genera	ibi.	oleum sylueftris oliuæ	17 a b
melicraton	ibi. d	nux Sapinea	ibi.	oleum Candidum	ibi.
muria acida	98 d	naphtha	41 a b	omotribes	ibi. b
mel Heraclæ	345 c	neurospastus	51 a	oliuitates uariæ	ibi. b
mandragora	347 a	neruus passus	ibi.	oleum Sicyonium	17 c
Meconium	eo. b	Naucus	57 c	Oleum Cicorum	18 c d
Muris aranei ictus	356 a	Nacæ	ibi.	Oleum Amygdalinum	19 a
Cura eius	360 a	Netrindes oliuæ	58 a	Oleum Balaninum	eo. b c
melomeli	301 a	naueratites	64 a	Oleum Sesaminum	ibi.
molibdoides	314 c	nux	66 b	oleum Carinum	ibi.
molibdena	315 a b	nucipruna	70 d	oleum Hyofciaminum	eo. c
Minium	319 c d	nelia	71 a	oleum Cnidium	ibi.
miniare	eo. d	nux regia	72 b c	oleum Cnicinum	19 d
minium Sinopicū	320 d.	nux persica	ibi. c d	oleum Rhaphaninum	ibi.
miltos	321 a b	nux Auellana	eo. d	oleum Melanthinū	ibi. & 20 a
Miltopariæ naues	ibi.	narce	81 b c	oleum Myrteum	20 b
Misy	322 d.	napunculum	92 b	oleum Laurinum	ibi. c
melan	323 a	Nebron	93 c	oleum Lentiscinum	eo. d
melanteria	ibi.	Notæos	103 a	Oleum Mastichinum	21 a
musæa	326 b	Necta	104 a	Oleum Rosacium	eo. d 22 a
musæarij	ibi.	Nastos	108 d. 114 c	Oleum Elatinum	22 c
Muscium opus	ibi.	nelinos	113 a	Oleum Melinum	ibi.
Muria	327 d.	nasturtium	136 c	oleum Oenanthinum	ibi. d
Muria duplex	328 a	nycteris	147 c	oleum Anthinum	ibi.
Maltha	330 a	nycteritis	ibi.	oleum Telinum	23 a
Milios	333 a	nepita, eta	166 b	oleum Sampsuchinum	eo. b
militis	ibi.	nephastum	178 b	oleum Ocimum	eo. c d
magnes	334 c d	Narthea	183 a	oleum Abrotoninum	ibi.
magnetis genera	ibi.	nigella	184 b	oleum Narcissinum	24 d
melitites	335 a	Nymphæa	204 d. 205 a b	oleum Crocinum	25 a
Morochthus	ibi. a b	nymphæa altera	205 b	Oleum Gleucinum	26 b c
Molochitis	ibi. b	nautea	219 c	Oleum Aegyptium	28 b
Memphites	335 d	neuras	229 b	Orobia	33 a
		nerion	242 c d	oleum Picinum	29 d
¶ Litera N		Nux odorata	270 a	oxycedrus	43 a b
N Ar. Iris.	1 a	Narcissus	270 a b c.	oriptelea	46 b
Nardus, dum.	3 d. 4 a	item folio	271 a b	oxycantha	50 d
Nardi genera	ibi. & seq.	Nummus uenetus	320 c	Olea sylueftris	57 a
		Narica	327 d	Oleaster	ibi. & b 58 a

I	N	D	E	X
Oleastellum	eo. c	Oschos	eo. d	onyx 335 b
olea cilibraca	ibi.	Ocae	ibi.	Onychipuncta 336 b
olea medulla	ibi.	omphalos	196 b	Ophites 336 c d
ossarij	ibi.	oxylepes	108 d	Ostracite 337 a
olea Arabica	ibi.	ossa	110 a	¶ Litera P
olea uita longissima	ibi.	olyra	111 b	Parallelæ 2 a
olea Orchitis	eo. d	oryza	112 b	Piper aqueum ibi. b
ostracifinus	38 a	Onobleton	111 b	piperapium ibi.
oliuæ Colymbades	eo. a	olus	112 d	pseudocypirus 3 b
oliuæ uariæ	ibi.	olla	ibi.	pison 4 b
oliuæ cibariæ	ibi. b	ocimum	131 d, 132 a b	pyritis 5 c
oleum syluestris oliuæ	eo. b	ocymum	132 a	perpensa eo. d. 6 a
olea Aethiopica lachryma	38 c	orobanche	eo. c	perptesa 6 a
Onicicidæ	60 c	ornithogalum	133 a	Phur 6 c
oxyphoenicæ	62 b	Oxybaphon	141 d, 142 a	phyllon unguentum 7 a
oporotheta	66 b	Omoconitidis	143 d	pseudocasia 8 a b
opora	ibi.	Othonna	149 b c	pseudocinnamon 9 b
oxymala	67 d	ononis	159 a	Pyxacantha 11 c
Oen	70 b	origanum	162 d	Porrigo 12 c
Oien	ibi.	origani nomina	163 a	Phaiganon ibi. & d
Oa	ibi.	onitis	163 b	piperella 13 c
onomalidæ	71 b	Origanum syluestre	eo. b	perfica 15 c
Opisthocarpion	75 a	Ocimastrum	169 d	puluisculus 17 d
olynthos	76 a	Oreoselinum	178 c	patos ibi.
Odynolyon	77 b	olusatrum	179 a	phafelus Romanus 18 d
Ostrum	78 b	opos	185 a	paederos 18 b
ostrea	ibi.	omphacocarpon	189 a	plaste ibi. 30 b
onyx	79 d, 80 a	oenanthe	199 d	pediasmos myrrha 29 d
ostracon	eo. d	origanorum notæ	200 c d	plastinx 34 b
ostracium	ibi.	orchis Serapias	203 c	pinus 34 d, 35 a d
Ophloctena	81 b	Onosma	204 d	picea ibi. 35 a d
omotarichos	87 a b	oxosma	ibi.	paniculæ 35 a
oxalme	87 d	Onobrychis	211 a b	Piceaster eo. b c d
oxygarum	ibi.	ocimastrum	221 b c d	Pix ibi. b. 36 a, 39 a, 43 d
oxyporum	ibi.	ocimoides	ibi.	pinus germinatio terna ibi. b
oxyliparon	ibi.	oxyfa	226 c	peuce ibi. c
onos	88 c	oxys	ibi. d	pinus duo genera ibi. d
oniscos	ibi.	ophrys	ibi. d	pêda ibi. d
orthagoriscus	89 a	Oxychoenos	228 d	pityida ibi. d
Opla	89 d	Opium	234 b	pinæ nuces 36 b
Ouorum natura	91 c	Oenagra	235 a	Pitynon physema 38 c
oui Candidum	ibi.	osyris	261 c	Pixliquida eo. d
quorum differentia	91 c	opocarpasum	262 d	Picis confectio 39 a b
oua pnieta	ibi. d	oleastellum	277 d, 278 a	piciis uitia, & experientia ibi. d
oua chista	ibi.	olea cilibraca	ibi.	piciis genera ibi.
ouum	91 c d	Oenanthe	289 d, 290 a	Pix, & Refina quo differant 39 c
onos	92 b	Omphacium	290 b c	pissaleon eo. d
ossifragus	92 c	omphax	eo. d	pix sicca 40 a
ossifraga	ibi.	oxycratum	298 a	palimpissa ibi. b
Ophion	93 d	oxyrhodon	eo. b	pissaphaltos 40 d
Oogala	97 c	oxymeli	ibi. c	Panduna 44 b
Oxygala	98 b, 99 a	oxalme	eo. d, 299 a	Plesta ibi.
Oesypira	99 c	ostracites	317 a	Platanus eo. d
Oesypus, um.	eo. d, 100 a	obryzum	eo. c	platanifos 45 a
Ocs	100 a	omphacomeli	301 b	platanio eo. a
oxyngion	102 c	ôchra	318 b, 319 a	platanos ibi.

Mēsa	45 b	Prumnō	ibi.	portis	101 c
Populus alba	eo. c	Prumnula	ibi.	portax	ibi.
populus duplex	ibi.	Pistacea	72 a	Peciolus	eo. d
populitria genera	ibi. d	Pistacia	ibi.	paraspades	ibi.
plenes	46 c	pilistacia	ibi.	Pompilos	103 c
Populus nigra	46 d	psenos	75 c	Perdix	eo. d
phæton	40 d. d	persea	76 a b	perdicnm genera	ibi.
plōades	47 b	persicus	ibi. b	Peristeræ	ibi. b
papyrus, um.	48 b	Purpura	78 b	peristeri	ibi.
promala	eo. c	Porphyriones	ibi.	Propolis	107 c
paliurus	50 b	Papauerculum	eo. d	panificij nomina & genera	108 b
Phelyrea	51 c	Polyps	ibi.	pyrinos panis	ibi. c
phillyra	ibi.	pectunculi	79 b	panis fermentatus	eo. c
philyca	ibi. d	Prox	83 c	pityra	ibi.
Patella	53 d	Pastinaca	83 d	panis canicaceus	ibi.
Pyxacantha	55 a	phocæna	85 b	pepalis	ibi.
piper agreste	56 c	Psammos	eo. b	panis genera	eo. d. 109 a b
phaulia	57 c	porcelliones	eo. c	panis	109 a
patella	eo. d	phrynos	86 a	pelanos	eo. b
petalifmus	58 a	piscēs saxatiles	88 a	polenta	109 d
Pirenæ	eo. b	Piscij marinoꝝ geña.	ibi.	proconio n	ibi.
pityrum	ibi.	Pulmo marinus	89 a	potus pelusiacus	110 b
pityris	ibi.	Pulmo Suillus.	ibi.	pinum uinum	eo. b
phascon	59 c	Pulmo uulpis	ibi.	Poltos	111 a
prinos	eo. d	Pulmōes animantū	ibi.	poltarion	ibi.
Phyllodrys	eo. d	&	b	puls	ibi.
Panos	60 a	psyxæ	eo. b	pultarium	ibi. b
phanos	ibi.	Porcera	eo. b	ptifana	112 c
pogoniæ	ibi. b	Porcus	ibi.	panicum	113 a b
Palma	61 b. c	petalidæ	ibi.	placentarum differentie & gene-	
Palma ægyptiaca	61 b c	petali	ibi.	ra	114 b c
palma uictorialis	eo. c	Pulmo	89 c	pastillum	ibi.
Poma	61 c	pellis Calcedonia	90 c	pifus. a. um.	115 d
Phœnicobalanus	61 c 62 a	pullastra	91 a	phasiolus	117 c d
Phœnix	ibi. d	pnieton	eo. d	Petrea	113 a
Pienes	ibi.	parnopæ	92 b	portulaca sylvestris	113 d
Pfaros	b. d	Pes Locustæ	92 b	item folio	114 a
palmulæ caryotæ	eo. d	Phinis	92 c	Portulaca	ibi.
pateron	ibi.	phine	ibi.	plantago	115 a b c
palmulæ thebaides	62 a	pfara	92 c	plantaginis nomina	eo. c
palma Elate	eo. b c	Parcus	ibi. d	pepo	119 b d. 130 a
panchristos	63 a	Proca	93 d	pes gallinaceus	131 c
phthalæos	64 a	pityocampæ	94 c	porrum capitatum	144 b c
phyleones	eo. b	Pulex	95 b	Piper	137 d. 138 b c
pothos	eo. d. b	phalangius	95 c d	piperis genera	138 b
pancarpias	64 c	phalanx	ibi. d	Pharmacum medicum	ibi.
pomum 65 a b.	66 b	pedes blæsi	96 a	pharmacum Indicum	ibi.
pomum librale	66 b	pyriathes	97 c	piperitis	139 a
Præcocia mala	67 c	pyriephthon	ibi.	ptarmica	139 b c
pyrum	68 b c	pyctes	ibi.	ptarmon	ibi. c
pyrorum genera	ibi.	Pyos	ibi.	panis porcinius	140 c
Pyrastrum	eo. d	pus	ibi.	panis terræ	ibid.
Plus tyriaca	69 c	pietya	100 c	Pancratium	144 c
Prunus. na.	70 c d	pitya	eo.	phenion	146 b
Prunorum genera	ibi.	pimele	101 b	Pulminaria	158 a
Pruna Damascena	70 d	pion	ibi.	Poterium	158 a b

Phrynon	118 b	parthenium triplex	214 b	Papauer corniculatū	347 b
pæderpta	eo, c d	Pentaphyllon	225 c d	pharicūm	eo, b c
panactia	b.	Phoenix	226 b	phalangiorum iētus	355 c
pulegium	163 d, 164 a	Phoenicopteros	ibi.	Cura eius	359 a
pseudodictamnū	164 c	papyrus	228 d	pastinacæ maris iētus	356 a
Polium	167 b	prostibulæ	229 b	Cura eius	359 d
panax	167 b, 172 b d	Paronychā	eo, b	plumbū elotum	313 c d
panacis genera	172 d	peristereon	231 b	Plumbū ustum	eo, d 314 a
Panaces Asclepion	ibi.	Petonomos	ibi.	plumbū retostum	314 a
item folio	173 a	Panchromos	ibi.	plumbi genera	eo, a b
panaces Heraclium	173 a	Papauer erraticum	233 a b	plumbi recrementum	eo, b
panaces chironion	eo, b	papauer satium	eo, c d	platyophthalmos	314 d
pastinaca sylvestris	174 a	item folio	234 b	plūbago	315 a b
philtion	ibi.	papaueris satui genera	ibi.	plumbū oculi	315 a b
pastinacæ genera	ibi, b	item folio	234 b	plinthrum	317 a
petroselinum	178 d	Papauer corniculatum	eo, c d	Paretonium	eo, c
pastinaca gallica	180 d	papauer spumeū	235 a b	Plysmā	319 c
Pyrethrum	181 b c	psyllium	236 b c	proba cōmentitia	320 c
peucedanum, us.	183 b c	palmidium	241 d	proba Cuppellaria	ibi.
pinastellum	eo, c	pappos	ibi, a d, 246 d	pecton	322 a
philantropos	189 a	phycos	247 c d	psorieon	eo, c
philadelphum	ibi.	potamogeton	247 d	psora	ibi.
polyenemon	190 c	item folio	248 a	pompholyx	309 b c d, 310 a
Prason	193 d	Phlōmos	248 c d	pala	311 a
prasion	ibi.	personata	249 b c d	Phlāsios	eo, c
Phyllis	194 d, 195 a	petasites	eo, c d	Pyralides	312 c
phyllantion	195 a	persollata	ibi.	pyroti	ibi.
phyllantes	ibi.	persollata	ibi.	Pyraustæ	ibi.
phalangium	195 a b	persollyron	ibi.	Photimon	325 a
polium	196 a b	perasus	ibi, d, 250 a	parapheron	ibi.
phlogion	201 d	Petasones	250 a	pumex	326 a b c
phlox	ibi.	pseudobunion	255 b c	protostactum	330 a
phlogis	202 a	Phyteuma	257 a	Penis	331 d
phyllon	202 d, 203 a	polytrichon	259 c	Penita ossa	ibi.
phellandron	203 a	pteris	eo, d	peniculus	ibi.
profedamum	204 a	Polygala	261 b	phrygius lapis	332 c
parthenium	207 a b	Paralysis	266 c	Pyrites	eo, d, 333 a
Pæonia	270 d, 268 a	Paradelos	ibi, d	pyromachi	ibi.
phalaris	268 c	Pituitaria	267 c	Perdicites	334 c
petilus	213 b	Pomū Hierosolymitanū	273 c	Perdicates	ibi.
petilius	ibi.	Paralios	eo, d	Q Litera Q.	
polygonum	214 c b	platphyllos	274 b		
Proserpinaca	eo, b	pityusa	275 b c	Q Vercus	58 d
Polygonatum	214 d	peplos	276 a	Quercetum	59 b
polemonia	215 c d	peplis	eo, b	Querquetulana	ibi.
Phileria	ibi.	Portulacæ sylvestris herbes tres.		querquedula	ibi.
phoinæ uestes	216 c	folio	276 b	Quisquilium	218 a, 227 c
Phleos	ibi.	Pycnocomon	279 c	Quisquilæ	ibi.
periclymenon	217 a b	Psilothrum	283 a	Quinq:folium	225 c d, 226 a
Purpura	eo, d	Pteris	283 d, 284 a b	Quinq:folium duplex.	ibi.
purpurissus	ibi.	Pteris nymphæa	284 d	R Litera R.	
potamogetana	218 b	polypodion	285 a b		
pseudanchusa	220 a	polypus marinus	eo, b	Raphanitis	1 c
perdicialis	224 a	Palma uitis	288 a	Rizotomos	ibi.
perdicion	ibi.	psyllion	2346 a	Radix Marica	ibi, d
parthenios	ibi.	Pulicaris	246 a	Radix nautica	2 a b
				Radix Ruscī, Aceron	eo, b
				Rhizium.	14 a

Rhypon	27 d	Rapum terræ	140 d	Sanguis Herculis	14 c
Ricinum	18 d	Ranunculum	145 c	Symphicon	15 c
Rhodomeli	22 a	Rhaponiticum	151 d, 152 a b	Strigmenta Balnearum	17 c d
Resinā ferentes arbores	35 d	rhabarbarum	152 a	Strigmenta Palestrarum	ibi.
Resina lentisci	36 d, 37 a	rhafluuius	eo, a b	Strigmenta gymnasiolorum	ibi.
resina liquida	38 a b c	radix dulcis	153 c d	strigmenta	18 a
resina sicca	eo. c	ruta	170 d, 171 b	sinapi	20 a
resinarum species	ibi.	ruta syluestris	ibi, b c	stachys	21 a
resinarum usus	ibi.	ruta Galatica	eo. c d, & 172 a	sagda	21 c
resina Stillaticia	ibi. d	rosmarinus	181 c	sandalorum tria genera	21 c
resinæ ustio, & coctura	ibi.	rosmarinus coronarius	182 b c	Syrupa	24 c
rizophagi	47 c	Rosa lunonia	193 a	Syria herba & radix	26 d
Rhamnus	49 c	Rhapalos	205 a	stacte	28 b c, 30 b
rhamni genera	ibi. d	rubia	208 d	styrna	30 c
Rubus Canis	51 a	rubus	223 b c	styrax	31 b d
Rosa	53 c d	rubigenera	eo. c	styraces	eo. d
Rhodon	eo. d	rubus Idæus	eo. d	saba thurifera	33 a
rhodonia	ibi.	radix Idea	226 b c	strobili	35 c, 36 b
rhodontia patella	ibi.	radix rhodia	eo. c	Syce	ibi.
rhodiaca olla	ibi.	rhodius color	ibi.	syndesmon	36 a
rosalia	54 a	rhododaphne	242 d	Sapinus	eo. b
rosarum genera	ibi. & b	rufcus, um	262 c d, & 263 a	sapinea	ibi.
rosarum fabulæ	ibi.	Ricinus	272 b c d	scirpus	36 c
rhodides	ibi.	Radix syluestris	280 a b	Sphagos	38 c
rhachos	57 d	Rubeta	350 c	sabina herba	42 d
Robur	58 d	rhodomet	301 d	septa	43 d
Roboris quatuor genera	ibi.	rhodomelon	ibi.	septica	ibi.
Rhus	60 d, 61 a	rubigoferris	313 a	Secaculis	45 b
rhoon	ibi.	recrementum plumbi	314 b	Samaria	46 b
ros syriacus	61 a	recrementum argenti	315 c	Syringias	47 c
rhoos genera	ibi. b	rubrica Sinopis	320 d, 321 a	siticina tibix	48 a
rhoas	63 a	rubricæ Sinopis species	321 a	spina cerualis	49 d
rhoetas	ibi.	rubrica fabrilis	eo. a b	spina	ibi.
rhoiadriou	ibi.	Rubrica lemnia	eo. a b	spina acuta	50 c
rhoon	73 b	Raudum	311 c	sentes canis	51 a
Ricini	ibi.	Rodum	ibi.	strobil	52 d
Remora	77 b	¶ Litera S		spina Syria	55 c
remeligo	ibi.	¶ Andix nautica	2 b	spina Aegyptia	ibi.
rana	85 d	¶ Syngentiana	ibi.	spinarum genera	ibi.
rubeta	ibi.	3 b, & 10 b, 20 d		semnos	56 c
ranarum genera	ibi. & 86 a	Stimmi	4 d	Salix Amerina	ibi.
rotæ	90 b	Saliunca	ibi.	Salix	eo. d
repunculum	92 b	Sanguis Martis	5 d	salicis genera	ibi.
ramenta	93 b	Succinum	ibi.	Salix utinialis	ibi.
rhagion	95 b	Syrinx	8 b	Salix uitellina	ibi.
rhypara	107 c	Smyrris	ibi.	salix Gallica	ibi.
Rhitace	108 c	siliqua cassia	eo.	salix frugiperda	57 a
Redundago	eo. d	schoenon myrepiscos	10 b	salicis succus triplex	eo.
robis	118 b c	schoenos Hedyosmos	ibi.	salictum	ibi.
rapa, um	eo. d	schoenuanthos	ibi.	sansa	57 c
rupum syluestre	119 a b	schinos	ibi.	sansarij	ibi.
radix	eo. b c	sceptium elisei	12 d	sclauolæ	eo. d
raphanus	119 d	sphagnon	ibi.	secos	ibi.
raphanus syluestris	120 a b	splachnon	13 a b	Strepte	ibi.
Rumex	119 c	Seleniacum	14 b	Saronos	58 d
Radicula				Saron	ibi.

I		N		D		E		X	
Saroniacus sinus	ibi. 59 a	Saura	96 a.	Seps	96. a b	Saurion	eo. c		
Sibari thuri	eo. d	scincus	96 c			Siliquastrum	139 a		
Sphagnon	59 c. Splachnō ibi.	smynthea	97 b			Salic astrum	ibi.		
Scissima	eo. c d	serum lactis	eo. d			Seliquastrum	ibi.		
Suber	60 a. Smilax ibi.	schistum lac	ibi. & 98 a			Struthion	139 c d		
Sumach	61 b. Spathæ eo. c	saptus caseus	98 b			strutheum	ibi d. 140 a		
Spadix	61 d. Spathe 62 b c	simpe 79 c.	Seuum	102 b		spheritis	140 c	scilla	144 b c
Semita alta	62 d	stear ibi.	Staēs	ibi.		strumus	145 d		
Sclerococcō ibi.	Stomatice 63 a	sordæ eo. c.	Spondylis	103 a		sardonius risus	145 d		
Sidem ibi.	Sida ibi. a c	sanguis	eo. d.	104 a		spina alba	156 c		
Sidion ibi. c.	Stephanos 64 c	sanguiculus	104 a			spina Arabica	157 a		
Symphonia	65 a. Siliquæ ibi. b	scor 105 a.	Sorioli	eo. a		scolymon	eo. c d		
Syrica ibi. d.	Serica ibi.	faccharum	106 c d			spina syluestris	158 d. & seq.		
Salgamum	66 b	facchar eo. d.	Sitos	108 a		stichas	162 c	stachas	ibi.
Salgamanus ibi.	Struthea ibi. c	spicas eo. a.	Spicum	ibi.		Salua	165 a b		
Sorba, us.	69 a. 70 b	spica ibi.	Spica musica	ibi.		Sphaelus	165 b		
setanium	eo. b	stipula	ibi.			satueia	167 a b		
Sorborū differentia quatuor ibi.		Sitanias	168 a b			serpillum	167 d. 168 a		
Spinus	70 c. Sycaminos 73 c	syncomistos	ibi. b c			sampsuchum	168 b c d		
Sycaminea ibi.	Sycea ibi. 74 c	similago	eo. c			sertula eampana	179 a b		
Syce ibi. 74 c.	Sycomoros ibi.	simila	ibi. & d			sylua Barbarica	170 c		
Sycomorea ibi.	Syca 74 c	semidalis	ibi.			sylua conseminea	ibi.		
Sycada ibi.	Syreon 75 b	siligo	eo. d			sylua Ciminia	170 c		
Spicilega	78 b. Solinisia 80 a	semidalites	ibi.			sylua Rom.	ibi. d		
Sardonyx	ibi.	spolea 109 b.	Sisar	110 a		staphylinus	174 c d		
Sanguinecasta	eo. d	ficera ibi. b.	ficerites	ibi.		sefeli	175 a	filer	ibi.
Scorpio terrestris	81 a	spelta 110 c d.	siligo	111 b		Sesili æthiopicum	eo. b		
Scorpio marinus	ibi.	secale ibi.	Scrutum	112 d		sefili pelonnense	ibi.		
Scorpidæ ibi.	Scorpiæna ibi.	seræ uermiculi	113 a b			Seseli Cretense	ibi. b c		
Sedopendra	ibi. b	seræ populus	ibi. b			Syreon	175 c		
Serpentum genera	82 d. 83 a	sefama, um.	113 b c			lison eo. c d	sinnon ibi. d		
Staphlinus	83 d. Sepia 84 a	strusetanus	114 c			Smyrnion	179 b		
Sepia	84 a. Scillaros 85 b	fociolus	115 a			Sphondylion	182 c d		
Syagris eo. c.	Synagris ibi.	fuccidulus	ibi.			Silphium	184 d 185 a b c d		
Silurus	86 b. Silluarion ibi.	scrutum	eo. d.	116 a		styrpe	185 a styrpicum	ibi.	
Smaris eo. c.	Salfamētū 87 a	scrutiscum	ibi.			lagapenium	185 d.	186 a	
Salgama	ibi.	scruteum	ibi.			facapenū	186 a		
Salfamentorum genera	ibi.	scapus	116 c			sarcocolla	187 c		
Sarpeda ibi.	Sturio 87 b	scaphi	ibi.			ferrata 191 c	sandaraca 193 b		
Sconbri eo. c.	Salfugo 87 d	sifarum	119 d.	119 a		stachys 194 d	scordiū 196 b c b		
Salsilago	ibi.	scopa regia	121 a			scordotis ibi c	secula 201 d		
Sibariticum ferculum	87 d	scorpius	121 a			Scopa regia	202 a		
Saxatiles pisces	88 a	Sion, um.	125 d			Silaus	203 a		
Seps eo. c.	Scari eo. c	Sisymbrium	126 a b			Satyron minus	ibi.		
Subgrumus	89 a	Sisymbrium alterum	eo. c			silphio eo. c	satyrium eo. d		
Scropha	eo. b	sonchos, um.	127 b c			satyrium Erythroniū ibi. &	204 a		
suum differentia	eo. b	seris 127 d.	Sicya	129 c		satyryon	204 a		
scycotos	90 b	scandix	131 a b			satyrisinos	ibi.		
soleæ crematæ	90 c	sandix eo. b.	Smilax	132 b		satyrialis	ibi.		
falsa Mæsonica	92 a	scena	eb. c			Satyron Indica	ibi.		
sanqualis	92 c	scordium	135 d			Securi daca	204 b c		
strumus	92 c. Scobe 93 b	scordoprasum	136 a			Scelorythe	213 c		
salamandra	94 d	sinapi eo. b c.	Sinapis	ibi.		Sanguinaria	214 a b		
stelliones	ibi. 95 a	sinape	ibi.			Sanguinalis	ibi.		
stellionatus crimen	95 a	sinapi genera	136 b			sanguinaria foemina	ibi. b c		
stellatura ibi.	Stellare ibi.	sinapismus	eo. c			Symphitus	215 d. 216 a		

I		N		E	
Stæbe 216 c		Scorpios ibi.		T Litera T.	
Stymphalides 210 c		Smiris 317 a		Thelpide, Iris 1 a d	
Stypion 216 c. Stion ibi. d		salamandra 343 d. & 344 a b		Thaumasos, Iris ibi. & d	
Stuppa ibi.		Smilax 346 b. Sardonias eo. c		Thylacitis 5 b	
Sarxiphagos 217 c d		sanguis Tauri 349 c d		Thesa 5 d Tenbul 7 a	
Saxifraga, um, ibi.		Spuma argenti 350 a		Theristum 11 b Tarus 13 c	
Sanguisorba 217 d		Sandaracha eo. b		Thyia 13 c trogetes ibi.	
Sparganion 219 b c		Scolopendremorsus 355 d		terminalium 15 c. 16 a	
Sideritis 222 c		Cura eius 359 b. Scorpiōis ictus.		thyomata 21 b thus 32 c d 33 a b	
Sideritis alia ibi. d		Cura eius 359 b c. (ibi.		thus Stagonias ibi. 33 a b	
Sideritidis genera ibi.		scoria ferri 313 c. Stibiū 314 c d		thus Amynta ibi.	
Sideritis tertia ibi.		Stimi ibi. c. Stibi ibi. c		thuris uindemia duplex 37 a	
Salix 227 a		Stibij genera eo. c d		thus Carpiathum ibi.	
Schænobatae 228 c		Stæbe eo. d Sebaſte 315 b		thus Dathiathum ibi.	
Sycomora ibi. d Scirpus 228 d		Spuma argenti eo. c d		thus masculum ibi.	
Schœnicula ibi. & 229 a		item folio 316 a b		thus Aconium ibi.	
Schœnotroges 229 e		spumæ argenti genera 316 b		thus unde dicitur 33 b	
Schœniculæ eo.		Sandyx 316 c		thuris Cortex 33 d 34 a	
Sclarea 231 d		sandycinus color bi.		Thus corticosum 34 a	
Struthion 235 a		scytanum 317 c		Thuris micæ ibi.	
Solanum 236 d. 237 a		Sil 318 b c. Silis genera eo. b		Thuris manna ibi & b	
Strychnos ibi.		silaceus color 318 c		thuris substantia tripex 34 a b	
Strychnos genera 237 b		Silarum ibi.		Thuris fuligo 35 b	
Solanum fœmniferum eo. c d		scoridiola 320 c		Tæda 35 a 36 b	
Solanum manicū 237 d. & 238 a		Sphragis 321 c. Sory 323 b c		terebintitus 37 b c d	
Smilax 241 c d. 242 a		Sandaracha 324 b c		Thericlei calicis ibi c	
Scalia 241 d		Sandaracha duplex ibi. c		Tubecula 44 c	
Semperuium 244 c d		spodos 309 d. 310 a b		Tubetia ibi.	
Sedum maius ibi.		Spodion ibi.		Tibiarum distinctio 47 d	
Semperuium minus 245 a b		Squama æris 311 b c		Tiblae uariæ ibi	
Subgrundiariuū ibi. b		Squama ex acie de cussa 311 d		tonarius Arabicus 48 a	
Senetio 246 d. 247 a		Stomoma ibi.		tamarix 48 c d tetralix 49 a	
Stachytis 248 a		Santerna ibi.		tetragenia ibi. b tilia 51 c	
Stratiotes eo. a b		Stryeria 325 a b		toxiton 52 d thali 57 c	
Stratiotes chiliophyllos 248 b		Strongyles species duæ 325 b		Termis eo. d thlasia 58 a	
Stephanomata 251 d		sulphur 325 c d		Thunni 56 a tamarindi 62 d	
Saxifragum 251 c d		Sulphuris genera eo. d 226 a		triberes 65 d tuberū genera ibi.	
Smilax aspera 261 c d		Spuma metallorum ibi. d		Thya 68 a trogetes ibi.	
Smilacis genera eo. d. 262 a		Sis 326 b Spongia ibi.		Thelycrania 70 a	
Smilax leuis eo. a b		Sal eo. c d. 327 a b c		Thuria 76 a Thirion ibi.	
Sesamoides maius 265 c d		salis 327 c. Salsa ibi.		Telamones 78 b	
Sesamoides paruum 266 a b		Salaria uia ibi. Spuma salis. ibi.		Tenax ibi tellinæ 79 b	
Staphis agria 267 b c d		Salfugo eo. c d Saliautria. ib. d		Torpedo 71 b turpena ibi.	
Spartum 269 a b		Sardinus ibi.		Theutos 84 a	
Spartion 268 d		scorodalme 328 a		theritis ibi triglis 84 b c	
silybum 269 c		salis flos eo. c. Salnitru eo. d		thurio 85 b tursio ibi.	
sarmentula 273 d		spuma Nitri 329 a b		Tirsio ibi. torsio ibi.	
Sanicula 276 b		sphæde 329 d		Thunnius 86 d	
Sennicula ibi.		spongia 331 b c d. 336 b d		Tarichos 87 a b	
Scamonia 276 d. & 277 a b		spongiarum genera ibi.		Taus 91 b	
Sirapa 278 a		sarcophagos lapis 336 d		tetriges 92 a	
Sabucus 278 d		schistos lapis 337 d		tetrapelyris ibi b	
Sambuca 279 b		selenites 335 d. 336 a		Talus suillus 93 b	
Saxifraga 279 d		Spiragides 336 b		tetragynathus 95 b Tamisios 100 c	
Scorpionoctonon 287 c		spongiarum lapides eo. d		Tracta 102 b Tauræ eo. c	
Scorpioides 237 b		Smiris. 337 a		Tauri ibi. Tenax ibi. d	

C iij

I		N		D		E		X	
Tatyris	101 d	Tidymali genera	223 a b	unguentum Mendesium	28 a				
Tetartos	ibi.	&	274 b c d	unguentum Cinnamominū	eo. c d				
Tettaros	ibi.	Thymelaea	278 b c	unguentum Nardinū	eo. d				
tracta cera	107 b	tamum	283 c	Vnguentum Malabathrinū	eo. b				
tritium	eo. c d	tamnum	ibi.	Vnguentum Foliatum	ibi.				
tritici discrimina	eo. a	thelypteris	284 c d	unguentum Iaseminum	eo. c				
Triticum generosum	eo. c	Thalassomeli	297 c d	Viola	29 c d				
tritici tria genera	eo. d	Thymoxalme	299 a b	Vrofci	31 d				
typhodes	111 a	terra	333 a b	ulmus	46 a b				
tragos	eo. d	terra Eretria	338 b	ulmi genera	ibi.				
tinnunculi	113 a	terra Samia	eo. c	ungues rosarum	74 a				
teramos	116 c	terra Chia	eo. d	uitex	75 a b				
Telephium	124 a	terra Selinusia	ibi.	uiticis genera	ibi. b				
Tragos piscis	132 d	Terra Cimolia	ibi.	urinare	78 b				
tuber	133 b	Terra Pnigite	eo. 339 a	Vifulum	65 e				
thlaspe	137 a	Testae	ibi.	Va	70 a				
triorches	155 a	terra Fornacum	eo. b	Vnedo	71 a				
tragacantha	159 c	terra Melia	ibi.	uiperinae carnes	81 c d				
Tragoriganum	163 c	terra Ampelitis	ibi. c	uipera	ibi. d				
Thymus, um.	166 c d	taxus	346 b	uerres	89 b				
Thymi genera	ibi. d	toxicum	347 d	ungula asini	ibi.				
thyma	166 d	Turbystum	317 c	ungula caprae	90 b				
thymbra	167 b c	tutefobitis	ibi.	Veteramentum	90 c				
tordylon	175 c	Trimma	306	Veteramentarij	ibi.				
tordylen	ibi.	Terra Lemnia	311 b c	ueteratores	ibi.				
turdela	188 c	Trichitis	325 a b	uelfae	95 d				
teucrion	191 b	Trips	326 b	uermes terreni	96 c				
Trifago	191 c d	Trichides	327 d	Vli	96 d				
taura	192 b	Thetra	ibi.	uellera	99 c				
tora	ibi.	Titanos	330 a	uelumia	ibi.				
trifolium	195 b c d	Thracias lapis	314 b	Vnguen	102 c				
trifolij genera	eo. c d	Thyites	335 c	Vitulamen	eo. d				
tussilago	196 d	¶ Litera V		uifuradix	ibi.				
tomentum	198 d	V	1 a d	urina	105 b c d				
Typha	199 b	V	2 a	uruncus	108 a				
Tipha	ibi.	Venerca	ibi. b	utriculi	eo. c				
testiculus canis	203 a b	Vnguentiana	6 c	umbilicus	140 d				
testiculus alter	eo. c	Valeriana	11 b	Vlophyton	156 a				
triorchis	eo. c	Viola	16 a	Vlophonon	ibi.				
teucrion	205 d	uerbascum Idæum	16 b	unguentū Aegyptium	158 c				
tus terrae	212 b	uelenion	21 b	uinæ confeminales	170 c				
Tribulus	217 b c	unguenta unde dicta	ibi.	uiscum	188 b c d				
Tormentilla	eo. d	unguentarij prophani	ibi.	uisci genera	eo. c				
regula	226 b	unguentorum ratio	ibi.	uiscum Damascenum	188 d				
trigium	227 d	unguentorum proba	21 c	uerbascum syluestre	197 a				
trigium aliud	228 a	unguentum duplex	ibi.	uiola alba	201 d				
tragos	ibi. b	unguentum Cyrenis	22 a	uiolaceum	ibi.				
taxus	241 c d	Vinum Oenanthinon	23 a	uenerca	209 b				
taxica	ibi. c	unguentum Anethinum	23 d	Vibones	213 b				
toxica	ibi.	unguentum Sufinum	24 a b c	Vetonica	eo. c d				
Thaliatron	247 a b	unguentum Crocinum	25 a	Volucrum	216 d				
Thryallis	248 d	Vnguentum Cyprinum	eo. c	Vermiculatae uestes	218 a				
Tripolium	258 b	Vnguentum Irinon	26 a	uermiculus purpur.	217 d				
trichomanes	259 c d	unguentū Amaracinū	eo. c d	Vrceolaris	224 b				
thapsia	267 d	unguentum Megalinum	27 a b	Verbenaca	231 b c				
Thapfos	268 b c d	unguentū Hedychroon	27 b c	Verbena	ibi. b				
		unguentum Metopion	eo. c d						

I	N	D	E	X	
Vermīnacā	231 b	uinum Omphacites	294 b	uinum Aromatites	305 d
Verbenæ genera	ibi. b	uinum Deuteria	ibi.	Vinum e Pipere, Myrrha, & Iri-	
Verbenaca supina	eo. c d	uinum Grapinum	ibi.	de	306 a
Vacinium	232 c	uinum Amphis	ibi.	uinum Nectarites	ibi.
uesicaria	237 b c	Vinum Adynomon	ibi.	uinum e Nardo Syriuca, Celtica,	
umbilicus Veneris	245 b c	Vinum Melitides	eo. d	& Malabathio	ibi. c
umbilicus Veneris alius	ibi.	uinum Mulsum	295 a b	uinum Asparites	eo. b
urtica	eo. d. 246 a b	uinum Scylinum	299 d 300 a	Vinum e Nardo syluestri	ibi.
Vrticæ genera	246 a b	uina marina	300 b c d	Vinum Daucites	ibi.
Verbascum	248 c d	uinum factitium	ibi. c	uinum Saluittum	eo. c
uiola purpurea	254 b	uinum Cydonite	eo. d	Saluiatum	ibi.
uiolarium	ibi. b	Viscum	348 a b	uinum Panacites	ibi.
uinca perunica	264 a	Vitio	354 d	uinum Acorites	ibi.
ueratrum album	eo. b c d	uiperæ morsus.	356 b	uinum Selenites	ibi. d
ueratrum nigrum	eo. & 265 a b	Cura eius	360 b c	Vinum Marathrites & Anethi-	
Vux Taminæ	267 d	uirulentorum ictuum communis		res	ibi.
Vitis alba	282 d. 283 a b	cura	357 d 358 a b c	Vinum e flore salis	ibi.
uitis nigra	285 b c	uesparum ictus cura	358 d	uinum e Thymelæa	ibi.
uinum Polypodites	285 b	uinum Apitæ	301 b c	uinum Phthorion	307 a
uerrucaria	287 a	uinum Apiatos	eo. c	uinum e Chamælæa	ibi.
uitis uinifera	eo. d. & 288 a b	uinum Oenanthinum	eo. c	Vinum Chanæpytinum	ibi.
uitis insana	eo. 288 a	Vinum Rhōite	eo. d	uinum Mandragorites	ibi. b
Vitis trisera	ibi. a	Vinum Rhodite	ibi.	Vinum Elleborites	ibi.
Vitia	ibi. a	uinum Myrtites	302 a b	Vinum Samonites	ibi.
uitialia	ibi.	uinum Myratum	ibi.	X Litera X	
uitis syluestris	287 b c	uinum Myrines	ibi.	Iphion	3 a
Vua	eo. c d	uinum Myrsinites	eo. b c	Xylocinnamomum	9 b
uinacea	ibi.	uinum Lentiscinum	eo. c	Xylobalsamum	12 b c
uiarum refectioes	289 a b	Vinum Terebinthinum	ibi.	Xylaloen	13 c
Vua passa	eo. c	Vinum Palmenū	ibi. c d	Xylomacer	46 a
Vini natura	290. d.	Vinum Cathorchites	ibi. 303 c	Xiphia	85 b
& 291.	a b c d.	Vinum Silatum	318 c	Xeropyrites	108 b
Vinum	292 b	uippa	318 c	Xylon	115 b
uini electio, & uirtus	ibi.	uinum Sycites	302 d 303 a b	Xiphion	219 a b
Vini qualitas	eo. b c	uinum Sycomorite	303 b	Xiphias	ibi. b
uinum Proporon.	292 c d	uinum Rafinatum	ibi. b c	Xyris	219 c d
uariacq; alia	ibi & seq.	uinum Strobilite	eo. c d	Xanthinum	259 b
Vinum gypsatum	293 a	uinum Cedrinum	eo. d	Z Litera Z	
uinum picatum	ibi.	uinum Iuniperinum	eo. d 304 a	Ziger	7 b
uinum parachyton.	ibi.	Vinum Cedrite	304 a	Zegir	eo. c
uinum originale	ibi.	Vinum Picatum	eo. b	Zingiber	9 b
uinum Autoceras	ibi.	uinum Absinthite	eo. b c	Zibettum	13 b
uinum Phalernum.	ibi.	uinum Hyssopite	304 d	Zapetion	ibi.
uinum Albanum.	eo. b	uinum Chamædryites	eo. d	Zmyrma	30 b
Vinam Cecubum	ibi.	uinum Stichadites	305 a	Zygia	38 c
Vinum Surentinum	ibi.	uinum Cestrites	eo. a	Zopissa	40 b
uinum Adrianum	eo. c	uinum Tragoriganites	eo. b	Zeugitæ	47 c
uinum Præutium	ibi.	Vinum Bunites	ibi.	Zura	50 b
Vinum Histrianum	ibi.	Vinum Dictamnites	eo. c	Zizipha	65. d
Vinum Chium	eo. c d	uinum Prasfites	eo. c	Ziziphorum genus duplex	ibi.
uinum Maronem	ibi. d	uinum Thymites	eo. c	Zerraneola	92 d
uinum Lesbium	eo. d	uinum Thymbrites	eo. c	Zymen	108 c
uinum Ephesium	294 a	uinum Origanites	ibi.	Zythum, us	110 a. c
uinum Apyron	ibi.	Vinum Calaminthites & Abro-	eo. d	Zea	eo. c
Vinum Messogites	ibi.	tonites	ibi.	Zinziber	136 d
uinum Incommune	eo. b	uinum Conyrites	ibi.	Zygis	169 b

